



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>





600015159R



E. BIBL. RADCL.

2 2 15

15 15 15

15 15 15

15 15

15 15 15

JOANNIS KEPLERI

ASTRONOMI

O P E R A O M N I A.

VOLUMEN TERTIUM.



JOANNIS KEPLERI

ASTRONOMI

O P E R A O M N I A.

EDIDIT

Dr. CH. FRISCH

VOLUMEN III.



FRANKOFURTI A. M. ET ERLANGAE

HEYDER & ZIMMER.

MDCCCLX.

H. 715

TYPE 1. KNOWN SUBSTITUTION.

ASTRONOMIA NOVA

SEU

DE MOTU STELLAE MARTIS.

PROOEMIUM

Quae in hoc opere Kepleri, quod exhibet studiorum septennalium profundissimorum documenta, continentur, ipse proponit auctor cum in praefatione sua, tum in indice quem praemisit locupletissimo. Fundamenta in eo jecit astronomiae vere „novae,“ legislatorem se prae-buit per omnes sequentes aetates ingenio suo astronomis prae-lucentem. Nemo unquam, qui penetralia hujus scientiae ingressurus est, non perlustrabit hoc immortale opus, testimonium sagacitatis et industriae humanae majoris. Quodcunque adimus opus posteriorum astronomorum, nullum deprehendimus, 'in quo praetermissa sit mentio inventionum, quas prodit Keplerus in „Commentariis Martis“ ipsiusque procedendi rationis. Omnes in illis consentiunt laudandis, neque vero omnes aequae ponderant hanc ipsam rationem et conditionem temporum rerumque, quae Keplero in perficiendo hoc opere impedimento fuerunt. Quidam, parum cognoscentes viri ingenium, forte etiam minus imbuti ipsius scriptis, inventiones Kepleri quasi fortunae tribuunt. Alii, quamquam cognoscunt excellentem ingenii bonitatem eamque haud parvi habent, tamen minus quam par est respiciunt literarum studia, quibus initio seculi XVII. astronomus inniti potuit. In mathematicis, ut saepius jam dictum est, cognitio et scientia parum excedebant ea, quae Euclides, Archimedes, Apollonius suppeditabant, compendia; quae sub finem ejus seculi cuicunque matheseos generi subsidio fuerunt, omnia tum deerant, ne logarithmos quidem eo quo opus suum confecit tempore Keplerus suum in usum vertere potuit. Quare omnia, quae in illo haud pauca per scientiam mathematicam absolvenda erant, revocanda erant ad geometriam et trigonometriam elementarem, ita ut vix bis terve Keplerus ausus fuerit adhibere calculum algebraicum aequationesque. Observationes astronomicae, quamvis a Tychoe quantum tum fieri potuit excultae, longe tamen abfuerunt ab eo gradu perfectionis, quem hic ipse scopus exigebat, quem in Commentariis de motu Martis spectabat Keplerus. Tubus opticus nondum inventus erat, mechanica instrumentorum astronomicorum perfectio longe abfuit ab ea, quae in minimis, in quibus versabatur Keplerus inquirens motum stellae Martis, omnino necessaria fuit. Quare comparatione tantum difficillima et taediosissima, et via plerumque plane nova et intacta explendum erat, quod deficiebat singulis observationibus. Denique minime negligenda sunt ea, quae de astronomicis hypothesibus illis temporibus constant. Copernici hypothesis viam quidem aperuit ad verum cognoscendum, et ipse Keplerus qua potuit veneratione prosequabatur merita Copernici in emendandis priorum

erroribus, at unus fere tum temporis agnoscebat illius hypothesin; Tycho ipse tantum abfuit, ut transiret in castra Copernici, ut nova constituta hypothesi rem implicatiorem reddiderit; Maestlinus et alii plerique, cum quibus per literas egit Keplerus aut qui publici juris fecerunt opera astronomica, variis moti causis verebantur plane et plene transire in partes Copernici. Quare non tantum abjicienda et corrigenda erant, quae in Copernico falsa cognoscebantur, sed etiam Ptolemaei placita, aequalibus ex parte acceptissima, certe familiarissima, evertenda. Theoria epicyclica et eccentrica impugnanda erat, bellum denunciandum omnibus fere in astronomia tritis et stabilitis opinionibus. Quam pugnam iniit Keplerus imperterrito animo solus, non adjutus immo impeditus ab amicis, et vicit novam constituens astronomiam, quae ut diximus ratio et norma est astronomiae posteriorum seculorum.

Quae in contrariam partem attulerunt astronomiae prioris assecrae, luculentissime apparent e literis Davidis Fabricii ad Keplerum scriptis dum opus suum excolebat, quas desumtas e Manuscriptis Petropolitans praefationi nostrae subjunximus. Quae alia impedimenta obstiterint sequentes exhibent paginae.

Plerisque eorum Kepleri operum, quae continent volumina priora nostrae editionis, argumentum quam brevissime praemisimus. Quam si in sequentibus eadem ferme ratione qua in Optica exhibuimus, excusabunt nos, quas diximus, causae non minus, quam res ipsa, quae paucis verbis explicari nequit. Quam ob rem statuimus, ordine procedere chronologico, adhibitis iis, quae continent scripta a Keplero relictis non typis impressa et Hanschii epistolarum collectio, ut quantum fieri potuit speciem et formam adumbremus studiorum, quae Keplerus ad perficiendum hoc opus insumsit, et rerum, quae prodierunt ex his studiis.

Keplerum edito suo „Mysterio Cosmographico“ anno 1597 innotuisse Tychoni diximus Vol. I. p. 43; statuerat, ut cum Tycho conveniret, Wittebergam proficisci (initio anni 1599), sed cum ab Herwarto comperisset, Tychonem proximo tempore Pragam iturum, mutato consilio Graetii restitit, donec (9. Dec. 99) ab ipso Tycho per literas invitatus est ut ipsum Pragae conveniret. Libentissime huic invitationi morem gerens Pragam profectus (6. Jan. 1600.) indeque Tychonem, qui in arce Benathica domicilium suum posuerat, secutus est, ubi ipsi Tycho „omnia quae optavit ultro detulit.“ Deprehendit Tychonem ejusque domesticum Longomontanum in observatione oppositionis Martis cum Sole, et restituenda theoria hujus planetae (Comp. Cap. VII.) adjunxitque, quamquam hospes Tychonis, operam suam in enucleandis implicitis Martis motibus („anno 1600. a Februario in Majum; profeci autem tantum, ut eccentrici inaequalitatem mediocriter salvarem“). Junio Graetium rediit, initio Septembris pactione facta cum Tycho ad ipsum Pragam reversus est 30. Sept. 1600. Paulo autem post quam munus suum apud Tychonem susceperat aegrotavit, et febris correptus quartana et tussi periculosa parum profecit in iis quae ipsi Tycho mandaverat, donec coelo salubriore Graetii quaesito (Aprili — Sept.) Septembri demum anni 1601. convaluit. Brevi post (24. Oct.) Tycho mortuo, tradita ipsi observationum Tychonis collectione, mandatum est Keplero, ut conficeret ea, quae Tycho imperfecta reliquerat, Tabulas et quae alia digna viderentur ut publici juris fierent. Quae dum suscipit (editus est anno 1602. Tychonis Progymnasmatum tomus I, „pridie Cal. Augusti“) astrolo-

gicisque inservit disquisitionibus, quas Imperator Rudolphus ipsi mandaverat, iterum adiit Martem, quae dubia ipsi occurrerant in theoria hujus planetae a Tycho et Longomontano instituta, inquirens atque immutare conatus, quantum inter alias occupationes fieri potuit.

Propius autem Keplerum jam eo tempore, quo apud Tychonem versabatur, ad rem ipsam accessisse, patet e literis ad Maginum Cal. Jun. 1601. datis, quum valetudinis et rerum domesticarum causa Graetium reversus esset, quamquam calculum nondum sibi convenientem deprehenderat, quam ob rem Maginum adiit, ut se in illo adornando sublevaret (vide infra). Proponit Magino methodum suam, quam exhibet fere eandem in Commentariorum Capite 16, et quaerit „an et hic me demonstratione juvare possis?“ Fundamenta novae condendae astronomiae Magino haec proponit: 1) Planetarum motus referendi sunt, non ut hactenus creditum est ad medium, sed ad verum Solis locum. 2) Inaequalitates inferiorum planetarum prodeunt e motu Terrae. 3) Inclinationes planetarum orbitalium constantissimae sunt. 4) Omnium 7 planetarum theoriarum forma est eadem, quilibet circulum decurrit suum inaequali celeritate. 5) Datis tribus acronychiis observationibus deprehendi potest distantia Solis et Terrae et inde distantia planetae ejusque orbis. 6) Datis quatuor sitibus planetae acronychiis determinari potest aphelii ejus locus.

Quae omnia nondum numeris probata sed probabilia tantum et naturae rationibusque physicis consentanea in literis illis ad Maginum datis eam forte ob causam Graetio ex urbe exhibet, ne Tycho, „nimis rerum suarum parcus et custos suspicione plenus“ sinistri quid argueret, si apud ipsum Pragae ad aemulum Bononiensem scripsisset, adque Maginum scripsit, quia a Tycho (quem in literis ad Maestlinum et ex parte etiam ad Maginum ad verum depinxit) ea quae quaerebat, minime se consecuturum esse haud ignorabat. Sed Maginus quoque Kepleri expectationem destituit; plane, quasi nihil a Keplero accepisset, obmutuit, donec anno demum 1610, postquam Commentaria Martis impressa fuerant, rem movens parvi momenti adiit Keplerum per literas. Quae in praefatione ad „Supplementum Ephemeridum“ dixit, excusans diuturnum suum silentium, infra legentur; hic dubii quidem, nisi fallimur, hanc insuper silentii dicimus fuisse causam, quod forte Maginus mentem Kepleri non penitus perceperit, nec habuerit quid responderet, quam eandem causam silentii sui fuisse Maestlinus ingenue profitetur („Fateri cogor, tu nonnunquam sublimiora, quam quibus ingenium et eruditio mea satisfacere valent, quaerebas“). Ad hunc enim sub finem anni 1601. (20. Dec.) eadem fere, quae ad Maginum, scripserat, contendens, „theoriam se extruxisse Martis, ut sensus subtilitatem facile adaequaturus sit calculus“ (vide infra).

Initio anni 1602, occupatus in edendo Tychonis opere et emendandis Lunae observationibus indeque deductis tabulis Tychonis, Martem quidem observavit Keplerus (vid. Cap. XV.), parum autem in theoria profecit, quamquam in literis ad Longomontanum datis (1605) huic narrat, coepisse se anno 1602. observare et ad Martem rediisse ac invenisse, viam ejus esse non perfectum eccentricum, sed ovalem.

Ex iisdem literis apparet, Keplerum ab anno 1602. usque ad initium anni 1604. „parum respexisse ad Martem,“ cum, praesertim anno 1603, Opticam adornaret, quam absolutam „obtulit Caesari“ initio anni 1604, typisque exscribendam curavit aestate hujus anni. Ceterum apparet e sequentibus

Davidis Fabricii et Kepleri epistolis mutuis, Keplerum interjecto quoque tempore, quantum ipsi licuit per alias occupationes, inceptum minime plane rejecisse, sed semper animo tenuisse propositum eum finem, ut in melius mutaret astronomiam. In literis d. 18. Jul. 1602. (deperditis) eadem movisse videtur Keplerus, quae leguntur in literis ad Maestlinum et Maginum datis, eaque pluribus explicat in sequentibus (d. d. 1. Oct. et 2. Dec. 1602). Posterioris epistolae conclusio „parum mihi otii est, dum adorno partem astronomiae opticae“ confirmat ea quae diximus, Keplerum tum temporis in Martis theoriam nondum toto animo et studio omni incubuisse, quamquam ex aliis praeter illas ad Fabricium datis literis constantia viri elucet in perficiendo semel suscepto negotio. Eadem testantur literae Kepleri ad Herwartum datae anno 1602, in quibus refert Keplerus, „per biennium“ se theoriam Martis inquisivisse, et satis bene rem successisse. Anno 1603. (5. Jul.) addit: „in theoria Martis cetera sunt expedita, verba adhuc desunt,“ dum die 4. Julii Fabricio scripserat, motuum Martis inaequalitatem salvari posse per suam hypothesin, sed deesse sibi ad calculum geometricae generationis viae ovalis scientiam ejusque sectionis in data ratione. In literis ad J. Papium (tum temporis medicum Onoldiae, postea medicinae professorem Regiomontii) c. initium anni 1603, item in literis ad J. Conr. Gerhardum (medicum Donauverdae) Jan. 1604. datis, pluribus de Marte disseruisse videtur Keplerus, quarum prioribus lectis P. Virdungus ipsum per literas adiit, adhortans, „ut elaboret, quo colophonem perfectioni astronomiae necessarium imponi tandem videamus.“ Sic Gerhardus: „quod de restauratione astronomiae scribis, vehementer placuit, et rogo ut pergas, inchoatum opus ad perfectionem deducere suam, despectis ex alto ceteris, si qui vel ab aula vel a genere praedecessoris tibi obicem ponere nituntur. Nemo magnus sine invidia factus est unquam.“ Keplerus in responsione ad Virdungum data c. initium a. 1604. eandem movisse videtur querelam de impedimentis, quae studiis suis objiciantur, cum ille eam respiciens rescriberet: „*παλιγγενεσία* astronomiae avidissime exspecto; qua in parte te plurimorum desiderii satisfactorum haud vane spero, optans, ut difficultates, quibus es circumseptus, removeantur et tuorum laborum honestissima, quae debet, ratio habeatur. Similitates tibi cum haeredibus Tychoonis intercedere, invitus intelligo, quas jam sopitas et extinctas cuperem.“ Quae „similitates“ cum haud parum difficultatis Keplero moverint in perficiendo opere suo, de his infra pluribus dicendum erit.

Die 4. Septembris 1603. literas dedit Keplerus ad Anglum Edmundum Brutium, intime ingenium ipsius venerantem (comp. Vol. II. p. 568), in quibus de studiis suis Martialibus scripsisse videtur. Respondit Brutius (d. 5. Nov.) hunc in modum: Multas habeo in astronomia dubitationes, in quibus tu unicus me certior(em) facias. Nam ego opinor, mundos esse infinitos (Keplerus in margine: hoc praeambulum obstitit mihi, quo minus essem attentus ad sequentia). Unusquisque tamen mundus est finitus, sicut planetarum, in cujus medio est centrum Solis; et quemadmodum Tellus, sic neque Sol quiescit, volvitur namque velocissime in suo loco circa axem suum. Quem motum sequuntur reliqui planetae, in quorum numero Tellurem existimo; sed est tardior unusquisque quo ab eo distat longius. Stellae etiam sic moventur ut Sol, sed non illius vi sicut planetae circumaguntur, quoniam unaquaeque earum Sol est in non minori mundo hoc nostro planetarum. (K. Haec quidem semper tenui, sed modum non semper.) Elemen-

tarem mundum nobis proprium et particularem non puto, nam aër est et inter ipsa corpora, quae stellas vocamus, per consequens et ignis et aqua et terra. Terram autem quam calcamus nostris pedibus, nec rotundam nec globosam esse credo, sed ad ovalem figuram propius accedere. (K. Non plane contemnendum.) Nec Solis nec stellarum lumen ex materia, sed potius ex eorum motu procedere et dimanare iudico, planetae vero a Sole suum lumen assumunt, quia tardius moventur et propriis motibus impediuntur. Keplerus: Quid potius mirer? Stuporemne meum, qui patefacta mihi naturae penetralia his literis, cum illas acceperissem, introspicere contemsi adeoque oblivione sepelivi, ut ne postea quidem, cum clavem eandem ad haec penetralia quaererem et invenissem, literarum harum fuerim recordatus; an potius mirer vim veritatis, quae duobus sese non una via aperuit; an naturae ingenium, quae, quod Brutio dedit occulto instinctu a priori, mihi methodo et numeris et oculis eruendum concessit? His literis apparet compendium quoddam meae physicae coelestis in Marte proditae.

Hanc annotationem adscripsit Keplerus ad Brutii literas d. 5. Apr. 1610, eaque nos movit, ut illas hic adderemus; Kepleri quidem literae desunt, ad quas Brutius his respondit, neque elucet ex hac responsione, quid Keplerus scripserit; tamen relectis aliis literis, quas illo tempore amicis scripsit, parum dubii erit, in his quoque Keplerum de studiis suis disseruisse et talia tetigisse, quae mentem Brutii in respondendo ad similia pertraxerint. Ceterum praemissa confirmant, quae diximus, Keplerum per annum 1603. aliis districtum negotiis parum quidem profecisse in condendis Martis Commentariis, neque vero plane intactum rejecisse opus quod meditabatur, quoquoversum intentum ad monita amicorum, respicientemque auxilia ad promovendum inceptum.

Propius ad rem accessit anno 1604, quamquam etiam tum ipsum detinebant multae aliae occupationes. Initio hujus anni absolvendo operi de Optica incumberebat, per menses Majum, Junium et Julium aegrotabat, ab initio Octobris usque ad finem anni multum temporis consumebat in observanda describendaque „Stella Nova“ in Serpentario, quae tum effulsit. In literis ad Longomontanum datis, quae infra sequuntur, de studiis suis illo tempore plura refert. In opere ipso (Cap. XI et XV) refert observationes in Marte, quae Commentaria spectabant, a mense Februario in Aprilem habitas, quibus numerum complevit observationum locorum Martis in oppositione, quarum maximam partem e Tychonis desumsit manuscriptis, et quas adhibuit ad condendam stabiliendamque novam suam hypothesin.

Die 7. Feb. 1604. Keplerus, dubia et quaestiones Fabricii ponderans adque eas respondens, haec de disquisitionibus suis profert: omnes demonstrationes, ait, se ad Ptolemaei, Copernici et Tychonis hypotheses adaptaturum, cum Tychone jam „conventum esse“; deinde: ex observationibus acronychiis talem esse constituendam hypothesin, e qua locus planetae eliciatur etiam tum, cum non in oppositione fuerit. Figuram orbitae prodire hucusque ovalem. Rationem, qua propius ad scopum attingat, nondum a se esse inventam, quamvis paulo post quaerenti Fabricio „ellipoidem suum“ explicans et causam cur „hactenus expetendum esse putaverit“ addit: limitationem aliquam se nunc videre. Deinde problema affert idem, quod exhibet in Cap. XL. Commentariorum, addens: Dic quibus in numeris et eris mihi magnus Apollonius.

In literis d. 14. Dec. 1604. ad Maestlinum datis, de „laboribus“ suis in Commentariis loquitur et in fine addit, „cum de valetudine angar,

consilium cepi, opus apud academiam deponere," quod consilium ita quidem persequeretur, ut in literis ad senatum Tubingensem scriptis quaereret, num ipsi liceret, Commentaria Martis apud senatum deponere? (Comp. Vol. II. p. 34.) Restituta autem valetudine rem non ulterius urgebat. In literis (d. 18. Dec.) ad Fabricium item recenset labores suos in eruendis erroribus, qui hypothesi suae obstabant, formam fatetur orbitae planetae hucusque ab ipso assumptam ovalem, falsam esse, ergo mutandam esse illam formam, ita ut „via Martis perfecta fiat ellipsis." Ceterum addit, nondum se illam accuratius inquisivisse, inserturum vero Commentariis („in quibus totus nunc sum") falsam suam hypothesin, ut alii videant, quantum ipsi facesserit negotii.

Anno 1605. refert Keplerus Longomontano, causam se itineris ovalis Martis nondum plane pleneque demonstrare posse, comprehendisse vero ea quae explorata habeat capitibus 51. Certum esse ex Sole propagari vim, quae planetas rapiat; similia Hegulontio, mense Maji 1605, addens: Commentaria Martis edi non posse, nisi Caesar sumtus praebuerit. Mense Martio nunciat Maestlino, processisse se in Commentariis ad Cap. 52; causam celeritatis inaequalis planetarum esse vim Soli (circa axem convoluta) et planetis inditam magneticam vel quasi; dein arearum lege proposita addit: capita erunt 60 aut 70.

Per annum 1605. opus prope ad finem perductum esse videtur; ellipticam viam post multa vana experimenta et taediosum calculum deprehendit Keplerus „circa Paschatis tempus". Caput 57. de magneticis virtutibus conscriptum est aestate hujus anni (comp. literas ad Fabricium d. d. 11. Oct.)

In literis ad amannensem suum C. Odontium (Non. Aug. 1605.) scribit: Commentaria mea eo loco sunt, ut primum atque Tengenagius concesserit vel Caesar jusserit pecunia suppeditata, dum imprimantur limari et absolvi possint.

His non alienum a re putamus interponere pauca de iis, quos adhibuit Keplerus ad calculos et describenda Commentaria. Caspar Odontius per annum 1605. apud Keplerum versabatur, eumque in calculis adjuvit et sicut ipse affirmat „describendo operi de motu Martis operam locavit" (v. p. 14). Initio anni 1606. a Keplero discessisse videtur, ortis forte dissidiis inter ipsos, cum in literis Kepleri ad Sam. Hafenrefferum (comp. Vol. II. pag. 835.) legamus: Spero a Maestlino meo suppetias. Nam „truncum nodosum", quo utebar concessu Noribergensium, remisi academiae suae Altorfinae. Jam in eo sum, ut typis dem Comm. de Marte; quantus labor sit futurus, jam ex vilioribus opusculis judicare possim. Itaque ingenioso et industrio adjutore, qui nec descriptionem nonnullorum, nec figurarum delineationem, nec calculum omnivarium nec correctionem detrectet, opus habeo, et qui delectetur comprehensione demonstrationum, quod est unicum desiderium meum. Malo meo fato fit, ut legati Wirtembergici Dresdae sint tam diu; jam diu enim obtinuissem a Principe alumnus, qui sumtibus Principis mecum esset.

Haec Keplerus, qui item Maestlinum adiit, ut voti sui compos fieret (vide infra). In Odontii locum successit Victorinus Eichlerus, pastoris Goerlicensis filius (comp. vol. II. 831.), qui descriptis Commentariis (postquam, ut scribit pater Keplero, „describendo opus illud mathematicum, Atalantae laboribus tuis elaboratum, absolverit") „ob scabiem, quae in febrim degeneravit, ne foedissimo scabiei malo familiam vestram inficiat" a patre domum

arcessitus est aestate 1607. — Quos praeter hos duos et forte M. Seiffardum (comp. II. 804.) tum temporis Keplerus ad calculos suos adhibuerit, non constat. Benj. Ursinum anno demum 1609. cum Keplero convenisse, diximus vol. II. p. 572.

Absolutum opus nunciat Keplerus Herwarto d. 13. Jan. 1606, addit vero Nonis Junii: quam diu mihi stimulus non accedit per publicationem, opus cauda carebit; deinde Fabricio (d. 1. Aug. 1607.): Commentaria ut edam laboro diligenter. Impedire minatur Tegnaglius; denique Brenggero (4. Oct.): Versor in adoratione Comm. de motibus Martis. Exemplarium distractione mihi est a Caesare interdictum. Quaerenti Brenggero, quid haec verba significant, respondit Keplerus (Apr. 1608.) opus publice venale non fore.

His quae ex epistolis privatis desumpta sunt de tempore quo ad finem perduxit Keplerus opus suum, addimus testimonium publicum, quod Carolus Oberleitner ex tabulis Viennensibus publicis desumptum primum publici juris fecit (Acta Academiae Viennensis a. 1857). Die 29. Dec. 1606. haec dedit Imperator Rudolphus „An den edlen Helmharten Jörgen zu Tollet und Keppach, Freiherrn auf Kreussbach, Erblandthofmaister in Oesterreich ob der Enns, Hoffkammer-Praesidenten und Obristen Profiantmaister“:

Rudolff der Ander von Gottes gnaden, Erwelter Römischer Kayser, zu allen zeitten Mehrer dess Reichs.

Edler lieber getreuer, Uns hatt noch für zwey Jahren unser Mathematicus und getreuer lieber Johan Keppler ein Astronomisch Werk, genant Commentaria de Motibus Stellae Martis allerunterthänigst praesentirt, Welchs wir gnedigst ansehen, und es also beschaffen zu sein befinden, dass es zu publicirn der mühe wohl werth.

Derwegen, Und dieweil wir, zur erweiterung unserer und unserer hochgeehrten Vorfahren am Hauss Oesterreich angewohnten lieb, zur befürderung der Astronomiae nitt gern ehegedachts Buch, darinnen soviel herrliche gehaimnus der Natur begriffen, ersizen lassen wollten, Alss haben Wir ehgemelten Keppler ufferlegt, dasselb in druekh bringen zu lassen, Idoch das Er one Unser vorwissen und bewilligung nymanden kain Exemplar davon gebe, und so dann ein verlag hiezue von nütten, Alss seindt Ihme Keppler Vierhundert Gulden In unseren Namen zu liffen bewilligt, Bevehlen wir demnach gnedigst, du wollest die anordnung thuen, das mehrbesagten unseren Mathematico solche Vierhundert gulden unverzüglich zugestellt werden, das geraicht Uns zur sonderen gefallen, Es ist auch also Unser endtlicher willen und mainung, Und wir bleiben dir mit Kays. gnaden wohl gewogen, Geben auff unseren Schloss zu Brandteiss den Neun und Zwanzigsten Monatstag Decembris Anno Sechzehenhundert und Sechsten, Unserer Reiche, dess Römischen im Zwai und dreissigsten, dess Hungarischen im Fünff und dreissigsten und dess Behemischen.

Rudolff m/p.

Ad mandatum Sacae Caesaris Majestatis proprium

An. Hannewaldt m/p.

Hos ab Imperatore Keplero attributos 400 florenos exsolutos esse, neque vero ob defectum salarii constituti satisfacisse ad typum, ex his apparet Kepleri literis (d. d. 25. Aug. 1608.), quibus adiit „Der Röm. Kay. auch zu Vngarn vnd Böheim Königl. Mt. Herrn Hoffkammer Präsidenten vnd Rätthe.“

Wolgeborne Edle und Gestrenge Gnädige Herren.

E. E. G. G. Werden sich Wissen zu erinnern, das Ir Kay. Mt. mir vor einem Jahr Vnd drüber, ein buch, vmb Wölliches verfertigung Willen mir anfenglich mein bestallung gemacht, in druekh zu bringen Allergst. anbefohlen, vnd mir darzue eine summa gelts durch die Hoffkammer raichen lassen. Demnach aber Ire Mt. ferners von mir vnderthänigist berichtet worden, das mein Truekher, mit Wöllichem Ich contrahirt, nach empfangenem Exemplar Stöcke vnd gelt, ein so lange Zeitt verzogen, vnd zu Frankhfort andern geschöfftē abwartē, Haben Die mir Allergst. erlaubet, eine raise dahin zu thun, vnd sollichen Truekh ainest zu end zubringen.

Weiln nun E. E. G. G. Hochvernünftig zuerachten, das Ich eine solliche ferne raise ohne Zehrpfenning, vnd versorgung meiner Hinterlassenden Hanswütschafft, nit verpringen khönde; zumahl Ich dise Zaitt vber, als die sach sich verzogen, in abgang der Hoffzallung das obvermelte von Irer K. Mt. mir auff druckhung dises buchs verwilligte gelt, anderst vnd auff Haussnotdurfftē zu guttem Thail verwendet, Alss gelangt an E. E. G. G. mein gehorsame bitt, die Wollen mir zu gehorsamister Höchstschuldigster effectuirung Irer Kay. Mt. Allergst. Willens vnd entlicher verfertigung des Werkhs wölliches verhoffentlich Irer K. Mt. zu einem rhuem gedeyen würt, eine Jahrsbesoldung auss dem Hoffzalampt anschaffen, vnd ohne auffzug (zu gewinnung der Zeitt) zustellen lassen.

E. E. G. G. mich zu gnädiger gewährung gehorsamlich befehlend

E. E. G. G.

vnderthänig vnd gehorsamer

Johan Kepler

Irer Kay. Mt. Mathematicus.

His adscriptum est: Herrn Hofzalmaister vmb seinen bericht was man dem Kepler an seiner besoldung im Zalampt hinderstellig ist.

Ex Con. Cam. Aul. 25. Aug. 1608.

Polz m/p.

Johann Kepler Irer May. Mathematicus ist seiner monatlichen 41 $\frac{2}{3}$ fl. Besoldung bis zu End May verschinnen 1602 Jars bezahlt. Restierte Ime derowegen mit End Augusti nechsthin an der Zeit 75 Monat in gelt 3125 fl. Rhein. Weilen Er aber zu unterschiedlichmals 1929 fl. 40 Kr. hieran empfangen, verbleibt auff abzug noch 1195 fl. Rh. 20 Kr.

Item so haben Ir May. Ime Kepler laut verschlossenen Bevelch vmb seiner gehorsamen Dienst und von gnaden wegen 500 fl. aussem Hoffzalampt raichen zu lassen allergnädigist bewilligt.

1195 fl. 20 Kr.

500 fl.

Summa 1695 fl. 20 Kr.

Hoffzahlambt den 10. September 1608.

E praemissis elucet, opus absolutum fuisse jam circa finem anni 1605, quamquam non dubitandum, tempus inter hunc terminum et eum, quo typis impressum est, non plane sine fructu elapsum fuisse. Hoc tamen notamus, ex aliis Kepleri operibus, quae manuscripta inspeximus ex parte non ad finem perducta, apparere, Kepleri rationem scribendi hanc fuisse, ut perparum in literis suis mutaverit, et ea, quae mente sua prius conceperat, integro, ut sic dicamus, filo chartis mandaverit. Concludendum ex his,

absolutis capitibus prioribus 52 (Martio 1605) et maxima ex parte immutatis relictis, addidisse Keplerum his capita 53—58 mense Majo, reliqua, forte usque ad cap. 60 sub finem anni 1605; pars denique ultima (cap. 61—70) per annum 1606. inter alias occupationes eam accepisse videtur formam, quam retinuit typis exsculpta. Ceterum e literis ad Herwartum datis (Jan. 1603), quas exhibet annotatio 4, apparet, jam illo tempore de capitibus 58 et 68 cogitasse Keplerum. Ad typographum Lipsiam transmissum est opus pure descriptum mense Septembri anni 1607, typi lignei Frankofurtum mense Augusto, et typis denique exscribi coeptum sub finem anni 1608.

Dedicatio Kepleri scripta est d. 4. Apr. 1609. et typus finitus circa Julium vel Augustum mensem. Quaerenti denique Harrioto de „commentationibus astronomicis“ respondit Keplerus d. 1. Sept.: Commentaria de Marte, titulo Astronomiae novae ἀπριολογητον seu Physicae Coelestis, prostant jam Frankofurti. Exemplaria non habeo. —

Causae, quibus motus Keplerus tum demum opus suum publici juris fecerit, et per biennium amplius absolutum detinuerit, non tantum quaerendae, sunt in sumptibus deficientibus, quos a Caesare aegro extorsisse se saepius dicit. Parum dubium quin, sicut in edendis Opticis, librarius quidam suis sumptibus typum operis curaret, cum Kepleri nomen jam ante edita Commentaria haud parvi passim facerent, et Keplerum minime laterent angustiae aetarii aulici. Maxima pars culpa huc usque dilati typi alibi quaerenda est, in „dissidiis“ quae inter ipsum et haeredes Tychonis („Tychonicos“) orta sunt. — Tychone mortuo Keplerus mandatum accepit a Caesare, ut ea quae ipsi viderentur ex manuscriptis Tychonis publici juris faciat (Comp. Vol. I, p. 191). Paulo postquam suscepit hoc mandatum, incepisse videntur simultates inter edita Tychonis Progymnasmata, quod apparet ex his Kepleri ad Herwartum (d. 12. Nov. 1602) datis verbis: Miraberis de mendis in textu (Progymn.); verum est, aut ego nimium curiosus haeredibus visus fui in alieno aut haeredes nimis negligentes fuere, ut ideo me ad typos corrigendos non adhibuerint, et privato consilio opera studiosi Joh. Erikson quaedam mutaverint. Sed nec ipsi considerati fuere, dum praecipitantur omnia, nec me arbitrum invitis et offensis, imo et juridicas actiones minantibus ingerere debui. (Comp. cum his ea, quae Keplerus Longomontano scripsit p. 35.)

In prioribus literis (c. Aug. 1602; deperditis) querelas de Tychonicis et praesertim Tychonis genero Tenguagelio ad Herwartum detulisse videtur, qui in responsione (d. d. 24. Sept.) haec scribit: Dass D. Tenguagel den pretium in praesenti pecunia zuvor haben will, ist ihm vielleicht nit zu verdenken. Sed de re ipsa quid fiet? Ich trag Sorg, es werde nach lang über langem Verzug alles mit einander liegen bleiben, und der Herr, quod doleo, darüber auch mit leiden und um so viel weniger fruchtbarliche expedition erlangen. Ich finde, dass es zwischen den Erben und dem Herrn allein um Misstrauen und aemulationem zu thun, was der Hauptsache (editioni Observ. Tychonic.) und beiden zu Nachtheil gereicht. Ad quae rescripsit (d. 7. Oct.) Keplerus: Francisci Tenguaglii propositum equidem justum esse fateor; si tamen in prioribus literis mentionem ejus paulo alienorem feci, quod nescio, id de hisce temporibus intellectum volo, quibus non omnia expediunt, quae jure fiunt. Simultates aluerunt, privatim tamen; nescio, an cuiquam in aula innotuerit nos dissidere, praeter unum D. Pistorium. Quod etsi factum fuerit, non tamen puto otium esse ceteris de hisce leviculis cogitare. Nec diutius offensionem protraxi, quam ipsi injuriam. Tandem prorupit in apertum causa simultatum. Tenguaglius se ingerit in maturationem Tabularum Rodolphaearum; ita forsitan habent res ipsius hoc Westphaliae statu, ut opus sit his praesidiis. Ego, qui haeredibus Tychonis propter parentem jure faveo, impedire sane non possum nec opto; verum tamen gravor praejudiciis. Excusaturus suum propositum seu velaturus veram ejus causam — inopiam — fingit ad aulicos, sibi curae esse honorem parentis seu soceri, metuere ut praeclare capta studia contra ipsius propositum perficiantur, scire, quid is fieri voluerit. Haec speciem habent, quia

ego et olim et jam, vivo et conscio Tychone, Copernici sequor hypotheses. Itaque aut diversum ab eo quod sentio in philosophia defendendum, aut a Tegnaglio discedendum erit, quantum prospicio. Atque illud nunquam feci nec porro admittam; hoc ita faciam, ut dissidere, non odisse dicas: utrum idem et ille sit facturus nescio. Tomos observationum impressos ipsemet percuperem; quam vero spem tibi de Tegnaglii voluntate faciam, nescio. Mihi certum est, etsi imprimantur hand facile repertum iri, qui ex illis tabulas conficiat, nisi extreme impudens et famae negligens; nam semper illi aqua haerebit quicumque laborem susceperit. Utrum idem et Tegnaglius sit persuasus, nescio. —

Causam hic habes dilatae editionis Tabularum Rudolphinarum per hand exiguum temporis spatium (prodiisse anno demum 1627. constat), quamquam hand parum fecere aliae multae difficultates, de quibus alio loco agendum erit. Tegnagium vero minime parem fuisse huic negotio, elucet ex Kepleri verbis, quibus respondit Herwarti quaestioni: ich wolt auch nit unterlassen, quondam Tychonis Brahei haeredes dessen (edendarum tabularum Lunarium) zu avisiren, wann ich wüsste, wie solches geschehen sollte: denn ich, wer sie eigentlich seyen, nit weiss. (E literis d. d. 6. Jun. 1603.) Quod haeredes attinet Tychonicos, rescipit Keplerus (d. 5. Jul.), unus est instar omnium Franciscus Gansneb Tegnagl, nobili genere Westphalus et in praesens Caesareae Majestati minister aulicus; mathematicus enim non vult audire. Nihil honoris hac mentione M. Tuae impono.

Similia deprehendimus in literis Kepleri et Fabricii mutuis. Fabricius retalit (Martio 1602) Keplero, quanto gaudio ipsum affecerint „Tychonici“ Eriksen et Tegnagelius se visitantes referentesque „jucunda“ de Kepleri statu (comp. Vol. II, p. 432) additque his laudes unitas Kepleri, modum fere excedentes. Quibus motus Keplerus dubia de sinceritate amici rescipisse videtur, ad quae Fabricius sic respondit (1. 11. Aug. 1602): Scribis, me forte instigatum fuisse a D. Tegnageho ad te laudandum. Absit hoc a me D. Keplere, nec quisquam tale tibi de me persuadeat velim, me esse talem, qui in ullius gratiam vel odium aliquem vel laudandum vel vituperandum suscipere vellem. Esset illud hominis non insulsi solum, sed insulsiissimi. Quae tibi tribui et etiamnunc tribuo, illud merito fit et jure optimo; res ipsa probat. Ostendunt id libri tui editi, pleni eruditionis abstrusae &c. Testor sane, Tegnagelium tunc temporis optimo in te fuisse animo, et quidem tali modo, ut proxime scripsi. Qui vero factum fuerit, ut illa animarum amicissima a tui amore destituta fuerit, ego sane odorari non possum, nec ex praesentibus Tegnagelii literis ad me vel minimum cognoscere possum, animum ipsius alienatum esse. Sunt hand dubie in isto viro heroici animi motus subitanei in utramque partem, et ingenii divinitas quaedam in ipso est. Spero itaque, illas similitates subito exortas dissipatum iri.

Ad haec Keplerus sic respondit (1. Oct. 1602): Offensiones cum Tegnagelio, quod scribis, tempus et mea uti spero integritas et candor dispulerunt. Nubeculas tamen semper aliquas exhalat locus lacunosus — reliqua inquam familia. De genesi tamen ejus haec scripsi serio: Saturnus elevatus in ♄ Martis infelicitatem affert et duritiem animi; ♀ in ♂ h̄ suspiciones. Sed quia etiam ♂ in sextili ♃, ita ut sit △ h̄ ♃, plane uti scribis divinum notat ingenium, quod natum sit magna in artibus movere, si infelicitas ex h̄ non obstaret. Occasio contentionum ex malis familiae moribus et suspicacitate, et mea vicissim impotentia et insultandi libidine. His superveniens Tegnagelius argumenta sane non levia invenit, male de me suspicandi. Possidebam observationes, negaveram me ea possessione cessurum haeredibus; eram in spe salarii: ipsi vicissim ex aula nihil accipiebant. Sed illud peccavit Franciscus, quod post omnem satisfactionem non acquievit, sed me terroribus illatis ad levicula aliqua, quae mihi restabant praestanda, nunquam prius monitum ex abrupto adigere contendit, perinde ac si vile mancipium fuisssem.

Jam Keplerus, per aliquot annos rem intactam relinquens demum anno 1604. redit ad has similitates, Fabricio quaerenti „de statu Tychonicorum“ d. 7. Febr. haec respondens:

De statu Tychonicorum constare mihi non potest, quia me Tenguaglius summovet. Canis in praesepe nec fœnum ipse comedit nec aliis indulget. Accipit quotannis mille. Hic vellet, me meis inventis ipsius salarium tueri. Volui, si quartam partem de suis mille mihi transmitteret, communi ipsius et meo nomine cum omnibus meis coram Caesare comparere. Sed quia his mille solus frui vult, ego quoque non possum pro his mille spondere et cogor privatim meum salarium defendere; quod et feci traditis Optica, Ephemeride Martis et transformatione tabularum Lunarium Calendis Januarii. Hoc ille videns praetextum quaerit, me Tychonis placita convellere, nolle se me armare observationibus. (In margine: Quid tu Fabrici? Lunaria Tychonis negant Solem umbrae Terrenae metatorem, nullam concedunt dimensionem Solis, Lunae et Terrae distantiarum et proportionis corporum. Hoc correcturus ego peto observationes, ut correctio a Tychonicis ipsis proficiscatur et per Tychonicas observationes. Hoc est Tychonis placita convellere.) At verior causa, cupit me impediri, ut tempus habeat aliquid elaborandi; profitetur enim se sperare profectum, sed hoc valde inconstanter, subinde enim interjicit, hanc non esse suam professionem.

Ego sancta fide tibi juro, me nihil in ipsum aut ipsius salarium tentare. Hoc solum ago, ut observationes habere possim quas cupio, deinde ut me commemoratione veritatis defendam contra disseminatas criminationes, sicubi mihi indicantur. Acceperunt de 20000 partem quintam; de reliquo in spe sunt. Tycho uxorem duxit genere nobilem, fortuna tenuem. —

Quae si comparaveris cum iis, quae Longomontanus ad Keplerum et Keplerus ad Hegulontium (Vol. I, p. 369) scripserunt, plane constabit, haeredes Tychonis curam anxisse et sollicitos habuisse, Keplerum patris observationum thesaurum suos in usus vertere velle neglectis ipsorum commodis. Deinde cum Keplero a Caesare mandatum fuerit, ut conficiat Tabulas, quas Tycho promiserat, et parum hoc negotium succederet, eas ob causas quas supra ipsius Kepleri proposuimus verbis, stimulasse ipsum videntur cum haeredes tum aulae quidam ministri, ut promissis staret, quibus intempestivis monitoribus motus, cum insuper institueretur studiorum suorum inspector (comp. annot. 3), nominavit Martem suum quae plane insistentem Tychonis observationibus hypothesibusque, tacite vero propriam viam sibi reservans. Qua promissione facta fautores Kepleri in aula, Barwiti, Wackherius, Pistorius alique, non tantum Imperatorem Rudolphum jam ipsum Keplero faventem, sed etiam „Tychonicos“ eorumque nomine Tenguaglium eo adegerunt, ut ille sumtus, hi consensum tandem ad imprimendum opus in se reciperent. Consensum vero hunc non plane sine exceptione datum fuisse, patet e Tenguagelii praefatione, quam eo loco reliquimus, quo eam Keplerus operi suo adjunxit.

Quod attinet typum et formam, qua prodierunt Commentaria, pares erant liberalitati Caesaris. Typus clarus et satis magnus, charta admodum bona, forma major (in folio), paginae numero 837. Pleraque quae inspeximus exemplaria non exhibent nomen typographi neque locum, ubi typis exscriptus est liber; in uno tantum, meliori instructa charta, quod nobis praesto est, exstat in fine signum typographi Vögelini Lipsiensis, quod describit Kaestnerus in Hist. Math. Vol. IV, 238 addens: unten steht mit einer Hand aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts geschrieben: Buchdruckers Zeichen, steht es haim, ob ers hieher drucken oder auslassen soll, wie auch seinen Nahmen vornen her und den Ort Heidelberg. Haec verba et ea, quae Keplerus scripsit Brenggero (vide infra p. 31) unica habemus, quae Heidelbergam significant locum, quo opus typis exscriptum sit.

Si quis quaerat, quale fuerit iudicium aequalium de opere Kepleri, longe diversa est ad hanc quaestionem responsio ab ea, quae de aliis Kepleri scriptis ferenda est. Summa et scopus libri longe excedebat illorum captum, et solus fere Maginus publice illum laudare et eum in usum vertere conatus est; Maestlinus senescens obmutuit, imbecillitatem suam concedens, Fabricius nimium temporis in astrologicis consumebat somniis, Copernico parum tribuebat, forte etiam aegre tulit Kepleri liberum de ipsius studiis in planetarum motibus iudicium, quo factum est, ut publice non eadem alacritate rem aggrediretur, qua privatim cum Keplero de eadem egerat. Alii Tychonis, alii Ptolemaei hypothesibus addicti Keplerum Copernici addictissimum defensorem minus gratum habuerunt. Alii denique opus ipsum nunquam conspexerunt, e quorum numero unicum dicimus Odontium, qui, dum illud elucubrabat Keplerus,

per annum adfuit illudque ex parte quidem descripsit, Odontium, posthac professorem matheseos in academia Altorfina, qui dum munere hoc fungebatur, anno 1623. haec dedit Kepleri: anni sunt 18, ex quo tempore ego Pragae degens Nob. Tuae operam meam locavi in perficiendis supputationibus, motum, ni fallor, Martis concernentibus. Si quam partem ad elucubrationem operis illius contuli, quod post abitum meum paulo post publicae luci concessum audiui, est quod mihi gaudeam jusque superesse putem, ab antere illius exemplar petendi dono mihi oblatum. Librum quidem illum antehac emere animus fuit, verum praesentium temporum injuria vetat, quo minus tolerabili aliquo pretio emtum habere queam. Alio tempore dabitur forte illius procurandi occasio. — Keplerus ipse in „Epitome Astr. Cop.“ haec dicit: Undecimus est annus, ex quo Commentaria mea de motibus stellae Martis edidi. Qui liber, cum in pauca multiplicatus esset exemplaria, doctrinamque de causis coelestium inter spineta numerorum et reliqui apparatus astronomici velut abscondisset, cum et pretio libri tenuiores absterrentur, visum est amicis, recte me et ex officio facturum, si Epitomen conscriberem &c.

Litterae denique ab Hanschio collectae testantur hanc Kepleri sententiam, cum in nulla earum propius ad rem accedatur.

Manuscriptorum Petropolitanorum volumen XIV. foliis plus quam 1000 stadia refert Kepleri ad Martis motus indagandos. Opus ipsum saepius occasionem dabit, ex hac collectione quaedam excerptendi. Jam praemissis addimus ea, quibus exorditur illud volumen. Prima facies avertit epistolae Kepleri fragmentum, ad theologiae quendam professorem, si ex literis R (everendissime) D (omine) P (ater) haec concludere licet. Sequentia folia conspectum eorum praebent, quae mente Keplerus agitabat conscripturus opus suum.

Epistola haec est:

S. P. D.

Obsecro majorem in modum, ut R. D. P. ea, quae hic insunt philosophica cum metaphysicis, ut illa doceantur usitate in scholis vestris, conferat et me moneat sicubi impingo.

Mente carere possunt coelestia: de mente igitur disputo tantum in eum finem, si fortasse facultates magneticae et facultates animales non sufficere alicui videantur.

Facultatem magneticam pono in Sole, qua sic agit in corpora planetarum, ut agit magnes in ferrum: hoc tamen discrimine, quod magnes ferrum magis magisque attrahit per egressam virtutis suae corporalis immateriatam speciem: Sol planetas per eandem (ut sic dicam) manum non attrahit ulterius, sed retinere secumque circumducere nititur.

In planetis pono facultates, magneticis similiores. Habent enim binos polos, quorum altero fugiunt a Sole, altero appetunt Solem; hinc eccentricitas.

Nec una hujusmodi facultas sufficit planetae. Oportet et alteram addere pro latitudinibus: ubi valde haereo, an et quomodo sedibus distinguantur in uno et eodem planetae corpore. Haec facultas est illi magneticae similis, qua magnes ad polum dirigitur.

Cuilibet facultati magneticae adjungo facultatem animalem, convertendi corpus suum circa axem corporis, nulla repugnantia supposita, aequabilissima contentione virium. Haec derogat magneticae, illamque vincit.

Cum autem repugnet illa alias fortius, alias imbecillius, hinc mihi nascitur suspicio mentis, quae dictet, quid spectans animalis facultas recte pugnet: quia inaequaliter ei repugnatur.

Mentem, seu rationem dico non ratiocinantem, discurrentem (unde puto oriri numerandi facultatem), sed instinctam in creatione, qualis in plantis, in utero &c. Saepe quis commode sentit, at incommode aut inusitate, et sic obscure loquitur. Contra saepe quis novas sententias usitatis et consuetis vocibus efferens, non exprimit aut non imprimit lectoribus animi sui sensa.

Ego si possem via incedere media, non negligerem, itaque cupio juvari — (nil sequitur).

Folio sequente haec deprehendimus:

Axiomata physica de motibus stellarum.

1. Consentaneum, astra circumagi aut vi motrice aut nutu. Ex 3. et 11.
2. Coeli solidi nulli sunt.
3. Astrorum *σχημα* nulla. Ex 2.
4. Aura aetherea ponitur undique aequabilis.
5. Ubi est *ἀντισπασις*, illis circumagendis nutus non sufficit. Ex 7.
6. Ubi est intentio et remissio continua vi naturali consentanea, nutus solitarius non est verisimilis. Ex 10.
7. Vis naturalis mensuratur primario *ἀντισπασει* ponderum, aut vi motrice contraria, *ἐνθελξει*.
8. Vim motricem necesse est niti corpore ceu fonte.
9. Vis motrix opus habet propagatione a fonte, seu effluxu.
10. Huic effluxui naturalis est intentio et remissio per elongationem.
11. Antispasis aequalis in quiete consistit, inaequalis in motu. Ex 7.
12. In motu spectatur, praeter vim et mobile, etiam temporis ad spatium proportio.
13. Item in motu considerata est et amplitudinis mobilis proportio ad medii densitatem.

Fons. Vis affluens — pondus, seu *ἀντισπασις*.

Medium — — Amplitudo terminorum.

Spatium — — Tempus.

14. Cum de uno planeta agitur, nulla est consideratio medii et temporis. Ex 4. et 15.
15. Corpora planetarum sunt undique aequabilia, sc. rotunda.
16. Nutus signis opus habet, quibus dirigatur.
17. Ubi nulla continua signa, nullus continuus motus per nutum. Ex 16.
18. Ponatur, quod observata testantur, angulos anomaliae coaeq. esse in eversa prop. distantiarum, vel directa discorum.
19. Epicycli arcus esse in proportionem diametrorum.
20. Librationem contingere in epicycli diametro.
21. Epicyclus non movetur vi eadem, qua eccentricus. Ex 20, et 12 et 10.
22. Ubi nulla antispasis et nulla medii densitas, tralatio potest esse in momento per nutum.
23. Motus a spatio dependet.
24. Quaelibet vis naturalis habet definitivam celeritatem.
25. Effluxus imitatur celeritatem fontis.
26. Ubi nulla antispasis vel medii densitas, mobile imitabitur celeritatem fontis.
27. Intentio et remissio effluxus non est sine vel antispasi vel densitate medii.
28. Planetarum corpora habent vel antispasin vel proportionem amplitudinis ad densitatem medii. Ex 27. et 18. 19.
29. Punetum mobile tollit considerationem omnis densitatis medii.
30. Antispasis non est, nisi in corpore. Ex 31.
31. Quo majus corpus, hoc majus pondus.
32. Punetum tollit considerationem vis motricis. Ex 30. 31. 7. 5.
33. Puncti tralatio nulla est, nisi per nutum. Ex 32. 29.
34. Planetae aguntur vi naturali in eccentricis. Ex 28. 18.
35. Epicyclus non incitatur solo nutu. Ex 17. 19. 6.
36. Epicyclus incitatur vi. Ex 5 et 28. 12. 26.
37. Epicycli vis incitatur a vi Solis. Ex 36. 21. 19.
38. Epicyclo vis alias est alia. Ex 37. 10.
39. Sol convolvitur in zodiaci longum.
40. Sol non attrahit planetam in descendente semicirculo, pellit in ascendente, ut *magnes*.
41. *Magnes* non pellit ferrum, sed semper in situ unit, at non omni parte pollet hac vi.

42. Epicyclus agitur mixta vi propria et nutu.
43. Vis naturalis continua est.
44. Epicycli motus non est ex nuda vi naturali. Ex 43. et 20.

Praeparatio ad Commentaria in Theoriam Martis.

1. Brevis excusatio, cur veritas historiae minutatim consecretanda.
2. Occasio adventus mei in Bohemiam et suscipiendi hunc laborem.
3. Tabulae Solis Tychonicae, cum distantis Solaribus ex Progymnasmatibus.
4. Tabulae oppositionum mediarum ☿ et ☉.
5. Tabulae ☿ inde exstructae.
6. Quae in aliis locis occurrunt conceptiones de ☿. Ut exemplum in genesi Rudolphi. Relatio in Mechanicis, in libro Epistolarum ad Landgravium; in epistolis ad Maginum, quia is prior mentionem injecerat in epistola ad me. Item ex libro de cometa a. 77, quod pendeant omnes orbes a medio motu ☉.
7. Examinatio reductionum ex certis observationibus ad momenta oppositionum.
8. Examinatio motuum mediorum ☿ et ☉, competentium annotatis temporibus oppositionum mediarum ☿ et ☉.
9. Examinatio prosthaphaereseon, seu locorum verorum eccentricorum ☿^{tia}.
10. Demonstratio, quibus angulis usi sint in reductione ad eclipticam.
11. " " " " uti debuerint, et quanta hinc existat differentia.
12. Physica demonstratio, quod reducenda sit haec tabula ad veras ☿ ☉ et ☿ ex meo Mysterio.
13. Causae, cur in computandis locis eccentricis Tycho a vero non recesserit longius, h. e. aequipollentia hypothesium.
14. Demonstratio, quod intolerabiliter peccetur in prosthaphaeresibus orbis anni, si altera oppositio pro altera, vera pro media vel contra arripiatur.
15. Reductio tabulae ad veras oppositiones.
16. Ex datis Tychonicis circa oppositiones medias inventio aphelii et eccentricitatis ad suppositionem verarum oppositionum. Quod fit crassa Minerva. Idem ex datis Ptolemaicis, et motus aphelii hinc.
17. Ex 4 oppositionibus ἀπορρυγνός inventio aphelii et eccentricitatis via laboriosa et difficili, indeque computatio aliorum etiam locorum in tabula. Hic compendium pro aequationibus Ptolemaicis, et aequipollentia hypotheseos Copernicanae et Ptolemaicae.
18. Demonstratio per observationes, h. e. per investigationem proportionis orbium in aphelio et perihelio, quod inventa N. 17. eccentricitas veritati non sit consona, sed tantum facias ad moderandas aequationes. (Addetur suffragium Tychois circa latitudines. In hac demonstratione assumi debet Terra in longitudine media sui circuli: et prodibit ecc. media aequantis eccentricitatis.)
19. Ut autem et Terra ubivis accipi possit, et simul speculatio circa aequantem tanto rectius procedat, suspensa consideratione stellae ☿, redeundum ad examinationem distantiarum ☉ et ☿. Primum alleganda Tychois animadversio, qui aliquando novum circellum, aliquando ampliationem orbis anni suspicatus fuit, et in tabulis ☿ peculiare numeros adhibuit. Nos id ex vitioso omisso aequante Terrae prodire dicemus.
20. Idem Ptolemaeo in theoria ☿ et ☿ accidisse probabimus.
21. Rem ex ipsis Tychois observationibus propius probabimus, ubi primo omnium catalogus et dispositio observationum ☿ in Tychoe, unde necessitas harum observationum luculentissime probabitur.
22. Primum ergo propositum crasse ex huius observationibus aequali commutatione evincemus, ubi et methodos inveniendi haec momenta.
23. Idem ex observatione acronychia collata cum aliquot observationibus parallactica, ubi dimensio simul habebitur, quod sc. aequans hic quoque duplum habeas eccentrici.

24. Ex hoc fundamento habemus correctas distantias \odot \odot ad gradus singulos, cum aequatione eccentrici, simul et artificium construendi ista facilliter ad gradus coaequatos anomaliae eccentrici.
25. Demonstrabimus, usi hypothesi Ptolemaica, quod prosthaphaereses Tychoniuspian ultra unum scrupulum turbentur.
26. Ad ulteriorem probationem eccentricitatis dimidia in Sole, et simul ne aequationi \odot in hoc negotio subtili credere cogamur, quam supra nro. 18. suspectam reddideramus, aliquot aliis exemplis idem probare aggrediemur. Ubi, quia observationibus cum latitudine nobis opus est, dupliciter illas cavere docebimus, vel per correctionem anguli, vel per conum scalenum et correctionem in sine distantiae inventae.
27. Ergo adhibitis distantis Solaribus jam constitutis, vice versa probabimus paralaxes observatas in eodem eccentrici loco, addito, quantum fuisset erratum, si vel tota eccentricitas Solis, vel pars notabiliter major fuisset accepta.
28. Alio exemplo, quasi per regulam falsi, aut demonstrative ut in \odot , rursum eliciemus eccentricitatem Terrae.
29. Hinc jam ex consideratione duorum exemplorum concordium in \odot et \odot et assertionem Ptolemaica de ceteris planetis ingrediemur speculationem physicam aequantis, demonstrantes, ita esse motus, ut sunt distantiae.
30. Tentabimus imperfecta demonstratione compendium tradere investigandi.
31. Idem hoc experientia iterum refutabimus et computatione locorum in tabula \odot . An autem hoc rejectitum consentiat cum axioma: „ita motus, ut distantiae,“ ex distantis 45 in \odot collectis, facile probabitur.
32. Quia vero aphelium \odot hactenus suspectum est, consulemus aliquot observationes circa aphelium, cum aliquot circa perihelium, et tam diu operabimur, donec \odot invenerimus in dimidio tempore restitutionis cadere in loca opposita, ea linea indubie erit linea augium. Inde apogaea et perigaea distantia et eccentricitas confirmabitur.
33. Idem praestabimus circa longitudinem mediam in \odot , nam in \odot desunt observationes, ubi et in quarta temporis, ex aequatione, et in loco quadrato ex tempore, de aequatione maxima iudicium feremus, indeque de eccentricitate utraque, consultis etiam, quas inveneramus, distantis tribus. Plus autem acuto angulo tribuetur in inquisitione loci, minus acuto in distantia.
In marg.: Hoc capite nihil forte aliud, quam ut probemus, distantias intermedias non esse in circulo, et quae consulantur in anomalia coaequata, utiles esse in anom. eccentrici.
34. Hinc exstruemus distantias \odot ad gradus coaequatos cum aequatione eccentrici, ut in \odot , et quia simul innotuit proportio orbium, conjiciemus eas in numeros distantis Terrae respondentes.
35. Aequationes vero aequantis seu physicas ita moderabimur, uti opus esse viderimus, vel ex distantis operantes, vel ex triangulo, et conjiciemus in tempora, una cum Solaribus.
In marg. Hic ratio reddenda, quare physica cum experientia non consentiat, et quatenus consentiat, et quomodo ex physica vere computare possimus; quomodoque ex vicaria veram eliciamus.
36. Quod latitudines attinet, ostendemus, quo pacto nodos invenerit Tycho.
37. Correctionem nonnullam addemus ejus demonstrationis.
38. Nostro modo nodos ambos ex observationibus inveniemus, una cum motu nodorum ex Ptolemaeo.
39. Vel ex latitudine borea et austrina maxima, vel ex ortu et occasu \odot heliaco inquiremus inclinationem planorum.
40. Diameter nodorum per Solem transit.
41. Inclinationis est $\delta\alpha\lambda\alpha\gamma\gamma\alpha\varsigma$.
42. Inclinationum tabula.

Capita quaedam de novo recoquenda ad numerum.

- Cap. 32. Virtutem, quae planetam movet in circulum, residere in corpore, quod est apud centrum illius circuli, et quomodo moveat. Ubi comparatur luci et magneti, et assumitur et quasi proponitur, in Sole esse; et quomodo comparata sit; denique de filamentis Solis et ejus ratione.
- Cap. 33. Virtutem motricem attenuari cum discessu a fonte, demonstratio geometrica.
- Cap. 34. Consideratio metaphysica virtutis ex Sole. De statera, vecte. Cognationum earum cum luce. Emissa species immateriata. Superficies est. Imprimi potest.
- Cap. 35. Virtus Lunae movens, qui comparata sit. Ubi Tycho refutatur.
- Cap. 36. Planetas viam ire eccentricam vi insita, et motus eorum componi ex causis, ubi de flumine.
- Cap. 37. Qua forma et quibus mediis moveant virtutes planetis insitae. Affectant epicyclum, sunt geometriae capaces: Solis intuitu describitur epicyclum.
- Cap. 38. An virtus ipsis planetis insita non minus sit aequabilis, quam communis illa in Sole.
- Cap. 39. An virtus ipsis planetis insita conferat in longitudinem zodiaci, et mutatione latitudinis fixarum, translatione nodorum. Ubi responsio obij: cap. 34 et cur omnes in unam plagam, et naturam zodiaci.

Alia dispositio.

- Cap. 33. 2. Omnes planetae apogaei et perigaei intendunt et remittunt motum. Causa autem in planeta, aut in virtute loci; si in hoc, ergo stipula in apogaeo, ergo fons in centro communi. Hic exemplum statera et vectis.
3. Et cum recte aphelia pro apogaea fuit substituta, fons igitur in Sole. Suadet et ipsa rerum natura, ut Cap. puto 2. dictum. Te idem suadet et exemplum lucis; hoc breviter.
- Cap. 32. 1. Demonstratio, motus diurnos visos esse in dupla proportionem distantiarum apogaeae et perigaeae, veras vero portiones eccentrici in similes.
4. Cum tantundem sit in amplo, quantum in angusto, comparatur igitur luci, et species est immateriata, et rectis egreditur, et superficies est seu corpus.
- Cap. 34. 5. Cum moveat in gyrum, ipsa igitur abit in gyrum. Et cum re egrediatur, nec possit separari, Sol igitur et ipse abit in gyrum comparatur magneti, et cum non omnes rapiat aequaliter, celestis igitur omnibus. Exemplum \bigcirc et \odot .
6. Cum undique moveat in gyrum, nusquam aliter, Solis igitur flammulae magnetica circularia sunt.
- Cap. 36. 8. Objectio de dupla proportionem disci, et responsio.
- Cap. 35. 7. De virtute Lunae movente interjectio, et Tychonicae hypothese comparatio.
9. Cum sit virtus \odot simplex, concurrunt igitur causae 2 ad motum planetarum.
10. Et cum \odot tantum in concentrico, ipse igitur planeta eccentricitatem praestat.
11. De aequipollentia physica varia, ubi an epicyclum vel libratio obtineat: concluditur pro libratione.
12. Cum accedat, vim obtinet movendi suum corpus.
13. Cum inaequaliter vim exserat, lege libratoria, id non ab actione ex Sole, ergo vis est propria et absoluta. Exemplum lumine stellarum.

14. Quibus remigiis vim hanc exserat, ubi exemplum de flumine. Et quomodo remi directione nauta posset scribere eccentricum.
15. Talis remi directio tempore inaequali et librat et dimidiat, ex anticipato. Nam possem dicere, accidere hoc inaequaliter, ergo ut in remo.
16. Cum igitur vi extranea utatur ad corpus transvectandum, in suum corpus nil potest, nisi conversionem, exemplo remi.
17. Cum loci cognitionem non habeat, restituatur tamen cum concentrico, tributum igitur ipsi primitus aequabile quippiam virtutis et dimensum, cujus contentione nititur.
18. Ex 11. aliqua assumuntur, et demonstratur, quid inde sequi necesse sit, ut varietas appareat, simul ut fundamenta jaciantur sequuturo inutili labori. Nam posito, radios eosdem, idem centrum epicycli, planeta lege epicyclica movebitur in longum.
19. Etiam in latum posset ita moveri, sed iudicium differtur ad inferiora.
De quantitate Eccentricitatis. Nam corpus \odot parvum est, \odot magnum. Vicissim eccentricitas \odot magna, \odot parva. Causa igitur in corporis levitate, sed tamen considerandum, an etiam restitutiones tales, nempe \odot velocior, quam pro spatio et fortitudine.

Haec sequuntur per folia plura quam 900 conamina diversimoda, emendandi \odot motus per calculum, in quibus maxima ex parte Keplerus tentat loca \odot a Tychone observata acronychia in circulum redigere.

Folii 823—832 (a Keplero signatis numeris 519—528) haec deprehendimus, circa annum 1605. conscripta.

Quae in theoria Martis restent exploranda.

Duo sunt, quae theoriā Martis reddunt intricatam, sphaera Solis et sphaera ipsa Martis. Sphaera Solis non quidem in eo praecipue, quod hactenus exemplo antecessorum dispositio orbium Martis relata fuit ad medium locum Solis. Nam hoc jam praeventum est, et non debemus videri neglexisse eccentricitatem Solis, si planetam ad locum medium Solis referimus. Hoc enim ipsum includit inaequalem Martis a Sole distantiam in toto ambitu orbitae Solaris. Ac etsi aliquid infertur diversitatis hoc nomine, quae in aequatione eccentrici ad $5'$, in parallaxi vero ad $42'$ et amplius excurrit, id tamen accidit propter ipsum \odot orbem, ob hanc causam aliter ordinandum, ut postea dicemus. Sed hoc nomine venit aliqua ex orbe \odot in \odot diversitas, quod eccentrici \odot non est tanta eccentricitas, quanta aequantis Solaris est eccentricitas. Id ego deprehendi hoc modo. Quaevis aliquot articulos temporum, in quibus \odot praecise esset in loco eccentrici, ut ita mihi non opus esset cognitione dispositionis orbium \odot . Cum ergo per tres huiusmodi observationes trium parallaxium orbis annui tanquam per tria puncta processissem ad inquisitionem circuli, prodiit eccentrici Solaris eccentricitas circiter dimidia eccentricitatis a M. D. Tychone assumtae. Ut ita vel aequans Ptolemaicus vel circellus Copernicanus non minus in Sole sit statuendus, quam in ceteris planetis. Prodiit etiam apogaeum \odot , linea a Terra per eccentrici centrum trajecta, circiter 30° II, quod parum abest a 6° \odot .


Verum tamen cum rem hanc non per unam tantum trigam parallaxon annuam, ad idem eccentrici \odot punctum relatarum, sed per alteram atque tertiam explorarem, prodiit aliqua diversitas, et videbatur haec eccentricitas aliquanto minor, apogaeum vero jam in 28° II, jam in 8° \odot cadebat, seu

vitis et praecipitancia calculi, seu quacunque alia ratione. Cum igitur etiam per se ipsum suspectum sit, assumere quantitatem aequantis praecise dimidiam eccentricitatis totius, erit igitur ante omnia hoc ipsum majori praecisione tentandum, quam hactenus a me factum est.

Hoc fundamentum erit omnium quae porro in Marte tentari possunt. Ubi de quantitate convenerit, construat postea tabula ad singulos gradus ab apogaeo Solis, exhibens distantiam Solis a Terra. Simul etiam revideantur aequationes eccentrici Solaris, quae circa 45° ab apogaeo mutabuntur (si dimidia sit eccentricitas nova antiquae) unius scrupuli quantitate circiter.

Jam quod ipsum Martis eccentricum attinet, in eo primum aequationes non bene habent, (in marg. Haec demum die paschatis) ideoque vitiosa est proportio circellorum. Nam ἀπορρύθμιαι observationes habent hoc vitii, quod reductio locorum eclipticorum ad orbitam \odot facta est per latitudinem maximam boream et austrinam, quae debuisset fieri tantum per angulum inclinationis eccentrici. Hoc pacto $10'$ alicubi sunt addita, ubi non ultra unum fuisset addendum. Itaque exsurgit ex comparatione dextri et sinistri semicirculi differentia circiter $20'$. Quodsi de novo struantur prosthaphaereses, apogaeum quidem aut eodem loco manebit, aut parum admodum mutabitur, at variabitur proportio circellorum, forsitan et ipsa aequantis eccentricitas nonnihil emendabitur, sic ut maximae aequationes fiant paulo majores aut minores. Manebit apogaeum ideo, quia nodi sunt fere in longitudinibus mediis, et vere aequaliter a nodis aequalia per reductionem ad orbitam sunt addita. Mutabitur aequatio maxima propterea, quia per reductionem jam dictam Mars utrinque et ad apogaeum et ad perigaeum propius fuit admotus, quam re vera erat. Conditio vero circelli hoc affert, ut si removeat Martem ab apogaeo in utramque partem, propius eum ad perigaeum admoveat aut contra: sicque alterutro loco contrarium ei, quod debet, praestabitur, si solam proportionem circellorum mutemus. Itaque omnino et ipsam eccentricitatis quantitatem in subsidium advocare debemus. Proderit autem, hanc aequationum tabulam dupliciter restituere primum relata Martis eccentricitate ad medium locum Solis. Hoc modo constitutae aequationes calculo usitato servient nobisque prodesse poterunt ulteriora tentantibus; different tamen nihilominus a veris, in locis aliquibus circiter $5'$, propter causam post dicendam. Deinde etiam hoc modo erit construenda tabula aequationum, ut omnes primum oppositiones Martis et Solis reducamus ad verum locum oppositum Solis, deinde per angulum inclinationis maximae (si haec scrupulositas necessaria videbitur) versus locus oppositus Solis erit reducendus ad orbitam Martis, qua reductione nusquam ultra $1' 20''$ mutabitur locus Martis. Hoc pacto si struantur ex 10 observationibus acronychiis novae aequationes, cadet ipsarum aphelium (loco apogaei hanc vocem jam substituo) in $6^\circ \mp$ circiter, eritque eccentricitas aequantis a Sole paulo

Fig. 1. minor, quam a medio loco Solis. Licet id etiam experiri per triangulum ABC, ubi A est medius locus Solis, B Sol, C centrum aequalitatis Martis (more Ptolem.), AB eccentricitas Solis tota, ut hactenus illa fuit usurpata. AC eccentricitas maxima Martis hactenus credita. Erit ergo CB eccentricitas a Sole. BAC angulus circiter $47\frac{1}{2}^\circ$, quantum est inter $6^\circ \odot$ et $24^\circ \odot$. Atque ut hinc commode ad id transeam, cujus jam bis feci mentionem: sciendum, quod si ad Solem ipsum referantur eccentricitates, id aliter fieri non possit, quam modo jam depicto, trajecta



scil. linea ex B corpore Solis per C centrum aequantis antiquum, vel non multum mutatum. At si hoc fiat, tunc utique centrum viae planetariae, quam planeta ipse suo corpore decurrit, non poterit amplius esse in D, puncto lineae AC apogaeae, sed cadet necessario in F, punctum lineae CB apheliae. Quo pacto orbis Martis ad dextram loco suo movebitur. Etsi igitur utroque modo, vel si D, vel si F sit centrum eccentrici, semper iidem anguli aequalibus temporibus ad C constituentur: tamen cum \odot tantum duobus locis circa D et circa F currens, aequaliter utroque modo ab A vel B removeatur, ceteris vero locis omnibus, alias per D centrum, alias per F distantias faciat, hinc oritur aliqua parallaxis. Nam linea DF cadit circa $2^\circ \odot$, ibique et in loco opposito ostendit maximam distantiam orbitarum Martis. Sed si ad utrumque locum \odot , et in una et in altera orbita existentis, linea ex A ducatur, eae duae lineae nondum maximum angulum facient, quia ibi aequationes non sunt maximae. In longitudine vero media vel prope, cum sit adhuc magna orbitarum \odot distantia, fit angulus dictus variatae aequationis eccentrici circiter $5'$. In parallaxi vero annua $42'$ vel $45'$ hinc conflari poterunt.

Erit itaque explorandum, an parallaxes annuae locis ex hac speculatione emergentibus tantam variationem possint ferre? Quod etsi nondum ipse exploravi, tamen quin fiat nequaquam dubito. Nam hoc evidentissime ex latitudinibus acronychiis latiori modo consideratis apparuit, distantias Martis a Sole (retuleram enim diametrum nodorum ad ipsum corpus Solis, non ad medium locum Solis, quod etiam experiendum erit, an esse possit) maximas fieri circa 2 aut 6 m , non circa 24 Q . Idque pulchre cum triangulo supra posito consentit.

Sic constitutis tabulis, primo distantiarum Solis a Terra, post aequationum eccentrici, poterimus postea accedere ad investigationem proportionis anni orbis ad orbem Martis, quod etsi nondum certissime constat, tamen non longe aberit ab hac ratione, ut sit semidiameter \odot 151580, qualium semidiameter Terrae 100000; eccentricitas vero simplex 14160 circiter; sed cum hanc constituerem, nondum de Solis aequante scivi.

Porro in modo investigandi notabile aliquid altero paschatis die animadverti, quod per triangulum ABC explicabo.

C (Fig. 1) Sol ipse, B Terra, A Mars. Dabitur igitur ex antea requisitis CB ad singulos apogaei gradus, BCA est angulus commutationis, qui per verum locum Solis constituatur, BAC angulus parallaxeos. Sed A et C anguli sic sunt constituendi: fingamus, circulum magnum transire per locum Solis oppositum et per corpus Martis. In illius circuli plano est triangulum BAC. Rectius id explicavero per duo alia triangula.

Sit D verus locus Solis. DE ecliptica, DF orbita Martis, EF arcus circuli magni per polos eclipticae transcurrentis, dimetiens inclinationem plani Martii ejus loci. Datur ergo EF ad omnem a nodis distantiam. Datur etiam F locus \odot per distantiam a nodo coaequatam. Facile igitur invenitur beneficio anguli E recti locus E in ecliptica. Ergo ED commutatio usitata (nisi quod D est verus locus Solis). Denique igitur ex FE, ED quaere FD, veram anguli commutationis dimensionem, anguli scil. BCA (Fig. 1).

Eodem modo sit jam E locus eclipticus, ad quem visus locus \odot reducitur. F sit visus locus \odot . D verus oppositus \odot . Datur ergo ED

Fig. 2.



ex subtractione visi loci a loco causa eccentrici; datur etiam FE latitudo visa, et FED rectus. Hinc quaeratur FD, vera dimensio anguli parallaxeos BAC (fig. 1). Hoc nisi caveatur, multum infertur, praesertim ubi angulus commutationis est valde parvus, ubi latitudo se immiscet notabiliter.

Qualis mea opinio futura sit de Theoria Martis.

Calculatio quidem erit satis intricata, sed hypotheses simplices. Martis a vero loco ☉ eccentricitas tota erit circiter 18583, qualium radius orbis 100000, de qua debetur apogaeae et perigaeae 10670 circiter. Aphelium cadet in 29° 31', 2 circiter. Et additur 58" longitudini mediae Tychonicae.

Per hanc suppositionem in 8 certioribus *ἀπορρυγμοῖς* sitibus nusquam ultra 6' aberratur. At verus ille locus ☉, unde pendet haec eccentricitas ☿, non tantum distat a Terra in revolutione annua, quantum fert eccentricitas maxima. Minuitur enim illa in apogaeo et perigaeo circiter dimidia parte, utque sphaerae ☿ centrum (☉ in ☿ versante) propinquius, in ☿ remotius a Terra. Quod latitudinem attinet, illa etiam a Sole pendet. Habebit enim planum sphaerae ☿ constantem et non libratam inclinationem ad planum sphaerae ☉, circiter 1° 54' 36", et transibit diameter nodorum per ipsum corpus ☿: fientque non mediae sed verae oppositiones ☿ et ☉, indices locorum, ubi sunt nodi. Estque ideo semicirculus borealis major semicirculo justo, circiter 2°.

Hypothesites jam certo constitutis, ratio calculi talis erit. Colligentur medii motus ☿. Subtrahetur aphelium cum anomaliam, ex tabula prosthapheresium excerpatur aequatio eccentrici addenda vel subtrahenda motui medio, ut habeatur verus motus in eccentrico.


Secundo quaeretur distantia ejus vera (causa eccentrici) a nodo, et per hanc et angulum inclinationis maximae capiatur vel ex sinuum doctrina vel ex tabula peculiari inclinatio plani ab ecliptica competens illi loco eccentrici, in quo reperitur Mars. Simul etiam vel per distantiam a nodo et angulum jam inventum, vel per illam et angulum inclinationis maximae, vel denique per utrumque angulum determinabitur arcus eclipticae interceptus inter nodum et resultum latitudinis per corpus Martis transeuntem, qui arcus a distantia ☿ a nodo nusquam differet plus 1' 12".

Tertia ad susceptum tempus quaeretur locus Solis verus (de commutatione enim nodum fixas habeo cogitationes) una cum justa ejus distantia a Terra, in proportione qualium eccentricus ☿ est 10000, idque ratione habita aequantis ☉.

Cum hujus loci ☉ oppositum comparaveris ad locum ☿ causa eccentrici, quemadmodum ille praeeptis secundo ad eclipticam est reductus, emerget angulus, quem commutationis angulum simplicem appellabimus. Per hanc et angulum inclinationis supra praeeptis secundo inventum, tanquam per duo latera circa rectum in triangulo sphaerico quaeretur et angulus arcui inclinationis oppositus in faterum usum, et basis recto subtensa, quae basis perdet quantitatem anguli commutationis conequati, qui comprehenditur inter lineam per Terram et Solem, interque lineam per Solem et Martem prodeunt. Habemus du. latera cum inclusis angulo (sc. ☿ ☉), ☉ ☿ cum ☉ ☉ ☿: linea ☿ ☉ est in plano eclipticae, ☉ ☿ in plano Martis, ☿ ☿ intersequi utrumque planum: quaeritur quartus angulus (☿ ☿ ☉), cujus comple-

mentum prodet distantiam \odot ab opposito loco \odot in circulo magno per utrumque corpus trans-eunte. Quinto per hanc distantiam modo in-ventam tanquam per basin et per angulum, qui supra arcui inclinationis oppositus dicebatur, quaeretur in triangulo sphaerico latus utrumque circa rectum. Sit BAC sphaericum rectangulum. B oppositus verus \odot , CBA. angulus arcui inclinationis oppositus, AB distantia \odot visa ab opposito \odot vero. Est BCA rectus.

Quare dabuntur latera CA, latitudo \odot visa, et AB, distantia \odot visa ab opposito Solis vero. Sicque calculus erit absolutus.



His praemissis addimus ea, quae Keplerus cum amicis egit de opere suo, cum nondum re incepto, tum ex parte tantum perfecto, tum denique absoluto.

Keplerum inde ab anno 1597. multa per literas egisse cum Herwarto ab Hohenburg apparet inspectis vol. I. et II. Priores utriusque literae partim loca quaedam veterum ad chronologiam pertinentia, partim Tychonem, partim Kepleri opera et res privatas attinent. Jam vero anno 1599. cum Harmoniam tum Martis theoriā adiasse Keplerum e sequen-tibus patebit.

Keplerus Herwarto nunciat, „adornasse se prima lineamenta Harmonices Mundi“ (d. 14. Dec. 1599), qua relatione accepta ille, respondit: Die Libellos, so ihr Eueren jüngsten Schreiben nach ausgehen zu lassen willens, verhoff ich in kurzem zu sehen. Und da ich Euch in etwas willfährigkeit erweisen kann, habt Ir mich dazu willig und bereit.

Den Herrn bitt ich freund- und dienstlich, er wolle unbeschwert annum a Ch. VI. et VII. examiniren, ob nit darinnen ein \odot \odot quoad longitudinem et latitudinem zu befinden, quae in meridiano urbis Romae paulo ante Solis ortum inciderit. Begere solche Mühewaltung hürwiderumb zu beschulden.

Ich wolt des Herrn judicium über die Simonis Marii jüngst ausgegangene Tabulas Novas Directionum (Comp. Vol. I, p. 367) gern vernehmen; ich halte dafür, er habe mentem et inventionem Ptolemaei et Veterum, distribuendi duodecim coeli domicilia et constituendorum aspectuum, woll assequirt.

Und bleib Ime angenehmen Freund und Dienstlichen willen zu erweisen geneigt.

Datum München d. 18. Merz 1600.

DEs Herrn dienstwilliger

Hans Georg Herwart von Hohenburg Fürstl. Durchl. In Bayrn geheimer Rath, Pfleger zu Schwaben und der Landschafft in Bayrn Cantzler. Haec subscribo, quia conditionem meam mutavi, et me supremo Cancellariatu exoneravi.

Ad haec respondit Keplerus d. 12. Jul. 1600. (comp. Vol. I, p. 71 et Vol. II, p. 815):

Meam de Harmonia Mundi dissertationem jam pridem ad umbilicum perduxissem, nisi Tychonis astronomia ita totum me sibi possedisset, ut pene insaniverim; quamvis mecum deliberem quid jam porro hac in re sit faciendum. Etenim inter potissimas causas invisendi Tychonis fuit et haec, ut veriores eccentricitatum proportionem ex ipso discerem, quibus et Myste-rum meum et jam dictam Harmoniam examinarem. Non debent enim hae a priori speculationes in manifestam impingere experientiam, sed cum hac conciliari. Verum Tycho copiam earum mihi non fecit, nisi quantum obiter et aliud agens, inter coenandum, jam de apogaeo hujus, jam de illius nodis meminit.

Sed cum videret, esse mihi ingenium audax, rectissime fortasse mecum agere se existimabat, indultis ad meum libitum observationibus ipsis unius

planetae, Martis scilicet. In hoc tempus trivi nec de aliorum planetarum observationibus fui sollicitus: sperabam quotidie exitum in theoria Martis post alias quoque habuissem. At cum tempus elaberetur, spes tamen reditu mei in Bohemiam securum me reddidit. Igitur Mars, quantum ego quidem ex observationibus Tychonis hausi, jam incipiebat argute satis modulari tertiam duram, quam illi assignavi. Confirmavit idem et *Mysterium meum* duobus locis mirifice. Cum enim illic ego retulisset eccentricitates planetarum omnium ad ipsum corpus Solis valde mihi a Tychone metuebam, ne is referret ut Copernicus ad medium locum Solis. Atqui Mars constanter respuebat ullum aliud punctum, praeter ipsum centrum corporis Solaris. Tycho laetabatur meis his ausis; nam idem ait et sibi jam diu agitatum, sed libenter declinaturum intricatam rationem calculi, eoque cupere videre et aliorum meditationes. Deinde, cum ego sub finem *Mysterii* mei monuissem de aequante ☉, quem dolebam unico Soli vel Terrae negatum: jam ☿ apertissime et hoc testatus est, inesse in ☉ rationem aequantis. Et hoc est, quod Tycho quasi sub aenigmatis involucri (ut interdum solet) ad me perscripserat de variabili quantitate orbis annui, qui in ☿ efficiat differentiam $1^{\circ} 40'$ (L. 44.). An igitur exspectem, dum Tycho suas edat theoria planetarum, ambigo. Sed tamen, si praeoccupare visum fuerit, adhuc unum mihi deest, quod a M. T. petam, copia sc. Harmonices sive Musices Ptolemaei. Lustravi catalogum bibliothecae Viennensis, in qua librum exstat manuscriptum Spachius affirmat in catalogo philosophorum. Non reperi quaesitum. Scripsi ad Dasypodium. Habere se respondit, nihilque praeterea. At nisi ego sperassem, illum possidere hunc librum, non scripsissem nec petissem copiam. Ursus Praegae affirmaverat, puto ex Gesneri bibliotheca, impressum esse alicubi, puto Parisiis; et Otho, auctor ille Palatini operis, qui jam Praegae haeret, esse et sibi exemplar opinabatur. Ita nas ducor. Quodsi Ptolemaei opusculum nancisci nequeo, at Glareani Commentarium super hanc disciplinam, quod impressum est in folii forma, Ptolemaicae rationis fortasse mentionem faciet.

Quod petis, ut examinem annum sextum et septimum ante Ch., a fuerit aliqua conjunctio ♀ et ♂: differendum est in occasionem proximam. Jam enim occupatus sum in eclipsi ☉. Sed quantum ligna metallo, tantum nostra Tychonis cedit industria subtilitati.

Marii tabulas directionum vidi Benathkae a te missas, sed *παρεργον* ut cetera omnia praeter Tychonica. Certum est, aliam a Ptolemaica rationem esse Regiomontani. Sed vix melior esse potest Ptolemaica Regiomontani methodo. Nec dubito, quantum ex superficiali lectione mihi haere in memoria, Ptolemaeum Mario recte intellectum. Videris autem occulte monere, aspectuum variam esse rationem ideoque non esse adeo geometricum certum et constans negotium de aspectibus, uti quidem ego mihi persuadeam. Si hoc vis, respondeo, nihil esse cur in dubium vocentur meae rationes. Nam illorum aspectuum longe alia ratio est, nec de iis mihi sermo erit in meis Harmonicis.

Ceteram quae ad me missurus distulisti incertus de meo reditu, illud videre aveo: tunc ergo si M. T. videbitur, remittam Clavii Astrolabium. Ceteros libellos puto integros ad te redisse. Jamque ad omnes articulos literarum tuarum respondi. Itaque vale vir Magnifice et mei amantissime

et si consilium tibi salutare incidit, id cito ad me perscribes, si mea studia hac occupatione digna censueris.

Deo M. T. et me commendo.

Datae Graetii 12. Jul. anno 1600.

Nob. et Magn. Tuae

Studiosissimus

M. Jo. Kepler

Styrium Ordinum Math.

(Inscr. Dem Edlen und Hochgelehrten Herrn Hans Georg Herwarten von Hohenburg, der Rechten Doctori, Fürstl. Durchl. in Bairn geheimen Rath, Pflegern zu Schwaben u. d. Landschaft in Bairn Canzlern. Meinem Grossgünstigen Herrn. München.)

Postscripta.

Mitto ad te, h. e. ad emporium quoddam doctrinarum perfrequens et apud quod literati variarum nationum sese internoscere incipiunt, mitto, inquam, problema geometricum, quod ad Vietam transmittes, si astronomiae consultum cupis. Nam quicumque hoc demonstraverit, is mea quidem opinione praeclarissime de subtiliori et exquisita astronomia merebitur.


Jubet enim ex quatuor acronychiis planetae sitibus in zodiaco et temporis intervallis elicere et veram longitudinem mediam (his enim, quae ab auctoribus sunt tradita, fidere non possumus), et locum apogaei et eccentricitatem et proportionem eccentricitatis aequantis ad eccentricitatem viae planetariae: hoc est omnia, quae quis desideret scire, praeter parallaxes orbis annui.

Hactenus quidem eo sum usus, sed indemonstrato. Itaque ad finem (unici exempli) non perveni (in margine: Perveni quidem, sed inutile fuit, falsum enim erat unum ex assumtis. Sed scio perveniri posse) quatuor jam mensibus. Nam duplici fictione utendum est, seu ut ita dicam quadrata: rectissime vero ἀσχυρὰ aleatoria, ut Vietae verbo utar, quo usus est in demonstratione problematis Copernicani, de tribus hujusmodi ἀκρονυχιας observationibus. Quae quidem Vietae demonstratio spem mihi iniecit, posse hanc meam etiam quaestionem ab ipso solvi. Si priori mihi demonstratio occurrerit, ea et ipsum impertiar. Hactenus quidem eam frustra quaesivi, credo quod minus in hoc genere sum exercitatus. Hoc tamen certum habeo, proponi casum unicum et certum, non vagum. Cum quae nota sunt, omnia rationem habeant angulorum, existimavi diu, cossa utendum ad investigationem residuorum angulorum, quibus emergentibus statim patet ad linearum proportionem aditus. Loco problematis sit ipsa ἐκθεσις ὑποθετικῇ, perspicuitatis causa. Sint duo

puncta seu linea AB ad arbitrium, sintque anguli propositi quaterni c, d, f, e, facientes summam 4 rectorum. Sint et alii quaterni eandem summam facientes, sc. g, h, i, k, (in margine: Oportet autem certum existere, angulos hinc et illinc sic esse.

comparatos, ut casus possibilis sit. Hoc quidem assumimus et experimento constat. Demonstretur igitur, quae angulorum propositorum proportio reddat casum impossibilem.)


Fig. 4.



Oportet jam regionem circa B dividere in 4 angulos, aequales datis c, d, f, e, et regionem circa A in 4 aequales datis g, h, i, k, sic quidem, ut sectiones quaternae linearum ex B et ex A concurrentium incidant in circumferentiam ejus circuli, cujus BA utrinque continuata diameter est. Hic cylindros et conos et quicquid est suppellectilis geometricae expedi, Apolloni Gallice. Nam facit instituta restorationis astronomicae ἀναβῆαι, ut iis, quae jam demonstrasti, parum frui possimus ad majora adspirantes.

Modus quo ego sum usus in opere (quia hic problema illustrabit) hic

Fig. 5.



fuit. Esto circulus propositarum sectionum DEFG. Haec est via ipsius planetae ejusque quatuor in illa stationes. Centrum ejus sit B, diameter per puncta duo proposita (quae jam sint C, A. A centrum unde computatur eccentricitas, sc. ipse Sol, C centrum aequalitatis) transiens HI. Connectantur CD, CE, CF, CG, sic AD, AE, AF, AG. Item BD, BE, BF, BG; tum etiam DE, EF, FG, GD; denique GE. Dantur ergo DCE, ECF, FCG, GCD ex intervallis temporum inter observationes. Dantur etiam DAE, EAF, FAG, GAD ex distantiiis locorum zodiaci. Tertio, quia D, E, F, G sunt in circulo, ideo quadrilateri

DEFG bini oppositi, ut EFG; EDG, faciunt summam 2 rectorum, et EFG circumferentialis est dimidius centralis EBG, et BE, BG aequales sunt. Quarto postulatur, ut CBE, EBA faciant summam 2 rectorum. Haec ergo sunt principia demonstrationis petita, praeterea nulla. Cetera omnia quaeruntur. Ego itaque sic egi. Primum, ut in regula falsi solemus ponere id quod quaeritur, sic ego posui locum apogaei H certum. Hoc posito sequuntur anguli HAD, HAE, HAF, HAG, et complementa ad semicirculum IAD, IAE, IAF, IAG. Secundo posui quasi certam longitudinem mediam sive anomaliam eccentrici, hoc est HCD, HCE, HCF, HCG, cum complementis ICD, ICE, ICF, ICG. In triangulis igitur quatuor super communi basi AC, quae sunt ADC, AEC, AFC, AGC dantur anguli omnes, et basis AC permittitur arbitrio nostro: quaesivi ergo proportionem basis AC ad lineas AD, AE, AF, AG. Rursum ergo in quatuor triangulis ad communem verticem A, quae sunt DAE, EAF, FAG, GAD, dantur bina latera jam inventa cum comprehenso ad A: quaesivi ergo in singulis angulum unum ad basin, scilicet ADG, ADE, AFG, AFE. Hi quatuor, quia sunt partes absumentes duos in quadrilatero circuli oppositos, additi et mutuo debent facere summam 2 rectorum. At si hoc non fiebat, fuit mihi repetenda operatio, retenta positione longitudinis mediae et mutato apogaeo: retentis sc. inclinationibus HC ad concurrentes in C, sed mutatis inclinationibus HA ad concurrentes. Idque faciendum fuit non bis tantum (nam regula falsi aut cossa non quadrant huc) sed saepissime, donec anguli dicti facerent summam quaesitam. Tunc ergo pergens quaesivi in GAE ex datis GA, AE et GAE (GAD, DAE faciunt GAE) angulum AEG et GE basin communem triangulorum GFE, GBE. In triangulo igitur GBE datur GE, et GBE est duplus ad GFE, qui notus est in partibus GFA, AFE. Et quia aequicrurium, datur et angulus ad basin BEG. Antea vero dabatur AEG, datur ergo differentia angulorum AEG, BEG, scilicet BEA. Jam in BEA, quia nescio an B in lineam CA, ut necesse est (in constructione quidem id fieri

jussimus, ut et alia indemonstrata) ideo sic ago. Ex BE, EA notis et BEA comprehenso quaero BAE, qui si aequat HAE, factum est quod oportuit: sin minus, jam ad caput revertimur, et ipsam etiam longitudinem mediam mutamus, et ad unamquamque talem mutationem apogaeum toties est mutandum, dum duo oppositi in trapezio aequentur 2 rectis. Hoc est quod dixi, quadrata fictione utendum fuisse.

Opus Vietae de aequationibus apud Tychonem vidi a te missum, sed vidi tantum. Itaque nisi me fallit negligens ejus inspectio, hoc idem demonstrat, ex tribus locis in zodiaco et intervallis temporum geometricè quaerere locum apogaei et eccentricitatem simplicem sine aequante, et longitudinem mediam. Hac demonstratione usus est Tycho in theoria Solis, sed specialis illa est. Praesupponit enim duo aequinoctia. In Landgravianis demonstrationibus puto generaliore fuisse, quas hic aliquando vidi. Inveni his diebus et ego aliquam, quam Vieta cognoscere potest et cum sua conferre, si sunt ejusdem generis. Problema hoc:

super contiguas bases duorum isosceleon, unum habentium verticem, describere alia duo scalena ad unum verticem imperatos angulos habentia. Circulus esto BCD, repraesentans viam planetae seu eccentricum regularem super suo centro A, in eo tres planetae stationes B, C, D. Connexae igitur BA, CA, DA; item BC, CD, constituunt duo isoscele ad unum A verticem, quorum bases BC, CD: quae propter datos angulos ad A habent certam proportionem ad CA radium circuli. Super has igitur bases struantur duo triangula, quorum verticales aequentur propositis E, F (Fig. 7). Igitur anguli E crus alterum producat, angulus exterior bisecetur, eique aequalis statuatur ad B, C (Fig. 6) versus A et claudatur aequecurium BGC (aequales enim sunt qui ad basin BC), hocque circulo comprehendatur. Similiter anguli F (Fig. 7) crus producat, angulus exterior bisecetur, eique aequales statuatur ad C, D versus A clausumque aequecurium CHD circulo circumscribatur. Secabunt sese circuli BGC, CHD duobus locis.

Est altera sectio I. Connectantur IB, IC, ID. Dico: BIC, CID esse imperata triangula, scilicet IA esse eccentricitatem quaesitam et AIB distantiam apogaei ab IB, KAB vero anomaliam eccentrici, quae pendet a longitudine media et apogaeo. Cum enim GBC, GCB sint aequales, et uterque dimidius exterioris apud propositum E, juncti ergo aequales sunt illi. Sed trianguli tres anguli sunt 2 recti, et E cum exteriori sunt etiam 2 recti, ergo ablatis aequalibus E et G erunt aequales. Sed BGC, BIC sunt in eodem segmento, aequales igitur. Ergo BIC est aequalis imperato E. Eodem modo demonstratur CID aequalis imperato F, ergo ad unum I verticem super BC, CD bases sunt imperata triangula.

Ut supra. M. J. Kepler.

Fig. 6.





Fig. 7.



Ad haec problemata Herwartus non respondit, forte etiam potenti Keplero, ut Vieta consuleretur, non satisfecit. In responsione, quam ex parte proposuimus Vol. I, p. 73, haec legimus: Ptolemaei libros Harmoniae und dabei Aristoxeni Harmoniam hab ich auf sehr fleissig Nachsuchen gefunden. Hat solches der Bibliothecarius, weil es versetzt gewesen, nit finden können. Hab mich in Wahrheit selber erfreut, dass ich Euch jetzt vermeldes Büechl zuschicken konnte, und solches um so viel mehr, weil ich verhoff, Ir werdet darauf nunmehr zu eurem jetzt unter Handen habenden Werk vorderehen mögen.

Ich vermüthe, Es werde der Herr Brahe Euch die observationes Martis sub conditione silentii anvertranet haben; da nuhn dem also, begehre ich davon durchaus nichts zu wissen. Auf den Fall es aber nit wäre, were mir damit yorders wol gedient, da ich breviter sed dilucide theoriam Martis wissen könnte.

Sonst werdet Ir noch gedenken und von Braheo selbst vernommen haben, wie Braheus ad rectificationem veri loci Lunae ein circellum annuae variationis (in dem deliquio Lunae, so sie zu Wittenberg drucken lassen) introducirt, cujus initium statuitur Sole versante in principio Cancr, ita ut in priori semicirculo hujus circelli verus locus Lunae promoveatur in consequentia, et in posteriori retrahatur in praecedentia. Nun verstehe ich aber von Ime, das er diese variationem annuam praesertim circa perigaeum und apogaeum Lunae in Zweifel ziehe, idque propter eclipses duas vel tres, praecipue propter eclipsen Wittebergae ultimo die Januarii observatam, cujus initium nonnihil calculum suum anteverit.

Da ist mir eingefallen, ob vielleicht die aequatio oder aequans Solis, so Eurem Schreiben nach die Theoria Martis zu erkennen gibt, hierzu dienstlich, und vielleicht oben-geordnete variationem annuam aufheben oder verändern möchte.

Bleibe dem Herrn angenehmen freundl. und dienstwillen zu erweisen geneigt &c.

München in Eil, atque adeo in ipso discessu, cum altero pede jam currum conscendisse mihi videar. 25. Juli 1600.

In Optica (Vol. II, p. 76) retulimus quaedam Herwarti verba de studiis Kepleri, quae huc pertinent. Scripsisse diximus Keplerum ad Herwartum (literae desunt; scriptae videntur mense Sept. 1602) de illis, adque has literas respondisse Herwartum d. 24. Sept. Ut ea, quae sequuntur, melius comprehendant lectores, ex his literis pauca repetenda sunt. Haec igitur Herwartus: Wie es der Herr meint, er getraue sich, die verschieenen Kometen mediante hypothesi Copernicana zu defendiren, non intelligo. Ich verstehe es aber dahin, dass Er dafür halte, durch dieser Kometen observation werde man nit erzwingen können, dass dieselben supra orbem Lunae vel Solis existiren. Sed quis, quæso, exinde redundabit fructus? Per se et propter se profecto exiguus; quoad alia, fortasse aditus ad majora. Ungefähr das Gleiche fällt mir zu Gemüth über dasjenige, so mir der Herr de Theoria Martis andeutet. Dann auf den Fall, Lierdurch ratione cursus Solis gründlicheres erfunden werden oder sich bereits ereignet, ist es aller Mühe wohl werth.

Sin autem, censet Herwartus, res aliter se haberet, Keplerum nimio et frustraneo labore sine notabili profectu detentum fore et denique se in ambages implicaturum, e quibus perquam difficile se explicaturus sit. Nam continuandas esse observationes, quod mortuo Tychone dubium sit, priorum observationibus parum esse fidendum, et restitutionem seu potius inventionem apparentis motus quinque planetarum non unius esse ætatis, nedum unius hominis.

Quibus Keplerus respondit (d. 7. Oct. 1602.) hunc in modum: Cometarum quae de causa mentionem fecerim, excidit. Sententia tamen haec est: si quis Copernici sequatur hypotheses, illum hoc defendere posse, cometas nihil esse aliud quam trajectiones aethereas, moveri scilicet in linea recta pene aequaliter, ac tantum abesse ut confiniantur sublunares, quin potius jam non tantum per parallaxes diametri Terrae, sed etiam ex ipsis observationibus crassiori modo acceptis in aetherem reponantur et quaquaversum impetu capto ruant. Hinc tu ipse judica, qualis sit materia coelestis, si ubique cometas transmittit, et aliquando ibi est cometa, ubi Terra, Luna, vel Martis &c. stella paulo ante fuit. — Ita hic nihil a Tycho differo, nisi quod cometis circulos adimo, per quos ipsis Tycho pene divinitatem conciliavit. Magnitudo Tua videtur me dehortari a cura planetarum, nisi omnis cura in motu Solis poneretur. Id in cometarum negotio salutare consilium existimo, at planetarum cursuum dignitatem tantam esse puto, ut vel ob illos solos labor sit suscipiendus. Ac ego sane hoc non ago, ut quæram motum Solis simplicem per planetas corrigere; frustraneus is

labor est. Et tamen per biennium Theoriae Martis insudavi, nec poenitet; obtinui enim hoc, ut possim computare locum Martis, quantum omnes ejus observationes testantur, tam praecise, quam Tycho locum Solis computare potest (omnia ad haec nostra tempora). Praeterea agnovi veram naturam (motuum), quod magnifacio et jucundissime contemplor. Denique Solem in theoria Martis tanquam in specula sum contemplatus, quid et quantum is efficiat in omnibus planetis; ex Marte vero exemplum cepi tractandorum ceterorum. De praesentibus itaque temporibus per omnes astronomiae partes optima quaeque spero, quae vero de praeteritis et futuris mones, vera me quoque existimare puto te scire. At non ideo omnis cura deponenda, si summam praecisionem assequi nequimus. Incertitudo observationum veterum non tanta est; ut plane nihil illis tribui possit, quin potius, uti antiqui nostras motuum apparitiones praedixerunt latiori quodam modo nec omnino falsi sunt, ita nihil est quod nos teneat sollicitos, in futurum nos tanto propius collimatuos, quanto exquisitius ad tempora praesentia computare didicerimus. Distinguit M. T. inter luminaria et planetas, et illud unum spectare videtur, ut a planetis ceteris animum meum ad Solia et Lunae motus transferat. Video ex parte consilii hujus rationem. Sol et Luna chronologiae serviunt, ceteri quinque astrologiae, quam damnas. At etsi tecum omnino damnam illam (damno autem tantum in ea, quantum Picus), tamen opera Dei digna sunt consideratione. Et non omnino nihil ad chronologiam et anni rationem faciunt planetae ceteri. Ego enim, ex quo rationem aequationum physicam ex theoria Martis didici, simul didici rationem necessariam, qua annus, non tropicus tantum, sed ipse sidereus necessario variabilis efficitur, et unus alio longior, aucta eccentricitate Solis, ceteris vero omnibus manentibus. Itaque, si constaret aliunde, auctiorem olim fuisse eccentricitatem, necessitate summa inferrem, longiorem fuisse annum, itaque, ut ita dicam, essentialiter non accidentaliter h. e. vere Sol ad punctum mere fixum tardius reverteretur, et non tantum ad punctum ab illo fugiens, magis quam hodie.

Quibus addit Keplerus causam, cur non adeat restitutionem theoriarum Solis et Lunae, secundum constituta in planetis majore certitudine, quam exhibuimus Vol. II, p. 77. Ex Herwarti responsione (d. d. 20. Oct. 1602) haec desumimus: dass ich den Herrn ab investigatione motuum reliquorum planetarum abmahnen wollte, absit, und weil ich diesfalls vernehme, dass Er in constituenda quantitate anni Solaris laborirt, weiss ich nit, ob der Herr den errorem in calculo observirt, so Tycho in Progymnasmatibus einkommen lassen. Quae ad haec responderit (d. 12. Nov. 1602) Keplerus leguntur loco citato, e quibus apparet, Commentaria („seu quod aliud futurum est nomen“) proxime se perfecturum sperasse; quibus addit: Cum me his carceribus (edendis Optica et Comment. Martis) adstrinxerim ipse, intelligis sane, quidquid extra has metas erit positum (spectat his verbis quaestiones Herwarti chronologicas) jam non amplius a me in Magn. Tuae gratiam suscipi posse, donec opera illa, Deo favente, absolvantur, quamquam utrinque in via regia sum ad hoc ipsum, quod peragendum. De Optice constat, de Theoria Martis jubeo bene te sperare. Nam et in illa generalia quaedam, nempe magna partis astronomiae physicae portio tractatur, ubi sterno viam ad veram Lunae aequationem, ut nihil dicam de longitudine anni, quae ex causa physica cum eccentricitate variatur necessario, item quod verissimam Solis eccentricitatem demonstro illo ipso in opere.

Herwartus (d. 18. Febr. 1603) haec respondit: Von dem Werk, so der Herr ratione theoriae Martis unter Handen, hab ich anderwärts etwas Andeutung gethan und dasselbe zu sehen dadurch grosses Verlangen gemacht, wie es sich dann einmal mit Nutz & cum profectu wohl wird sehen lassen, und Ihme dem Herrn einen solchen Namen machen, den man nunmehr von Ihme dasjenig zu gewarten, so man von weyland Tycho Brahe ver-

hofft gehabt. Will demnach den Herrn Ihme selbst zu verhofftem Besten dahin treulich vermahnt haben, dass Er diess Werkh unausgesetzt an Tags Licht bringen wolle.

Keplerus (mense Maj. 1603) de studiis suis haec refert Herwarto: Causa silentii mei fuerunt Tabulae Lunares.¹⁾ Ante 6 septimanas ad colophonem illas deduxeram et spem conceperam, transmitti posse statim. At me suspicio erroris de novo in laborem coniecit et descriptor deerat, itaque differendae fuerunt et postponendae domesticis negotiis. Suaseras tu quidem, ut totis viribus in theoriam Martis incumberem, at jam antea, tuis exhortationibus suscepto stimulo, manum in tabulis admoveram, praesertim cum ad doctrinam eclipsium facere videretur, in qua versor. Itaque satius putavi ut pergerem, quamvis praeter opinionem hoc tantum fecit morarum; semper enim fit, ut labores in primo aditu contemnamus.

Jam per aliquot annos in literis ad Herwartum datis Keplerus Martem praetermittit vel verbo tantum illum tangit. Anno 1605 vero opus suum quasi maxima ex parte absolutum nunciat Herwarto, quaeque tum retulit, ea leguntur cum Herwarti responsione Vol. II, p. 83 a. Deinde d. 13. Jan. 1606, praemissis inquisitionibus chronologicis, his ad Martem reddit: Theoria Martis exspectat aliquem, qui sumtus in opus conferat. D. Pistorius in spem me erexit, nuncupata Caesari summa 800, qua opus habeam. Quae spes utinam mihi non damnosa et temporis jactura fiat. Quodsi etiam pecunia in promptu sit, prius mihi Tegnaglii consensus erit impetrandus, cui obstrictus sum. Ad Hipparchum igitur meum sum propensior. In Saturno puto jam prope peractam rem. In Jove parva difficultas. Epicyclus ♀ (mihi eccentricus) moderatam habet eccentricitatem. In ☿ aliquid tentare cogito: eo succedente jam Ephemerida in sequentem annum animo concepi, Deo vires et otium largiente. Laboravi in Hespero nonnihil ex quo redii (e Styria comp. Vol. I, p. 655.), sic et in Luna, ubi novas cudi tabulas, ut Luna ceteris fiat similis. Ex iis jam est facta Ephemeris opera studiosi. Saturni et Veneris tabulas prosthaphaereseon orbis annui generales inchoavi ante discessum, intereaque dum absum per studiosum pene perfeci. In Lunae motibus ad causas physicas referendis multum sudo. Etenim Luna dissimilis Marti in eo, quod duas habet inaequalitates reales, Mars unam solum realem, reliquam opticam ex orbe annuo. Sed tamen et hic magis nuper in una hora profeci, quam 5 praecedentibus annis. Exspecto tamen ut consentientia sibi mutuo deprehendam.

Habes abunde satis verborum. Vale Vir Nob. et Magn. meque porro quoque Tua benevolentia complectere.

In responsione (d. 16. Maj. 1606) Herwartus gratias agens pro disquisitione chronologica addit: Von Herrn Pistorio hab ich gern vernommen, dass der Herr Theoriam Martis gefertigt und in Druck geben wird. Darauf gewart ich mit Verlangen.

Keplerus sic respondit (Non. Jun. 1606.): Commentaria de restitutione tabularum et investigationibus motuum Martis jam sesquianno apud me desident. Coepi agere cum Caesare, quia jam non est occasio faciendorum sumtuum, ut mihi permitteret veniam, quaerendi alium operis patronum; neque tamen scio, ad quem potissimum sit eundum. Quam diu mihi stimulus non accedit per publicationem, opus cauda carebit, quae est in hac pecude pinguissimum.

Deinde, eidem Herwarto respondens de „annotationibus“ Praetorii in Tychonis Lunaria (vide finem hujus voluminis) addit Keplerus: quod attinet notas ad Lunaria, sequar consilium M. Tuac, ubi anno sequenti ad Hipparchi curam Deo dante prius transivero, si modo mihi per editionem Commentariorum de motibus Martis licuerit. Nam etsi Vögelinus²⁾ artem intelligit, nescio tamen an non iter mihi nihilominus Heidelbergam sit faciendum, quod vel bibliothecae causa alias facerem.

Tum ad alia transiens, in fine literarum ad priora redit, his illa illustrans: Superius coepi scribere de Comm. Martis tanquam ad scientem. Pars pecuniae, quam a Caesare accepi per manus D. Welseri factorum, transmissa est ad Vogelinum, quod nullum scirem typographum magis idoneum; commendatus quippe mihi fuit ab artis intelligentibus. Figurae excusae sunt Praegae et missae Frankofurtum mense Augusto; exemplar mense Septembri Lipsiam. Exspecto formam typi ad delibrandum. Pars vero reliqua pecuniae cum multis aliis a me consumpta est, cum non fiant justae solutiones aulicae. Itaque jam dudum venter meus famelicus respicit instar canis ad dominum, a quo semel jam fuit pastus. Equidem si D. Welserus pateretur se rursum exorari ad mille aut sesquimille solutionem (tantum enim eoque amplius mihi debetur), quantum inde mihi securitatis accederet, quantum temporis retinerem, totum id impenderem vel in Porphyrium (Harmoniam), vel in geographiam melius fortasse, quam si quaestorum mensas sectatus, aeraria diutissime pulsans, denique nihilominus eandem summam extorquerem. Nam Caesaris mora nullam partem pensionis deterit, mihi vero tempus consumit. (E literis „quas initio Novembris sum exorsus, vix hodie, 24. Nov. 1607. finio.“)

Pecuniae, quas expectabat Keplerus, autumno anni 1606. nondum fuerunt solutae, cum Herwarto, qui d. 13. Sept. 1608. scripsit: ich vermein, ich könne unschwer zuetmassen, was es ratione Serenissimi für eine Gestalt und Gelegenheit. Ich bitt den Herrn, er wolle sein Reis nach Frankfurt bald fürnehmen, et in itin (nit allererst in reditu) mich allhie besuchen, auch die Sachen dahin einrichten, damit er ein Zeit lang wo möglich oder doch so lang es seiner guten Gelegenheit seyn wird, bei mir allhie verbleiben und sich aufhalten möge; — cum his Herwarti responderit: Literas tuas, Nob. et Magn. Vir, 13. Sept. scriptas pro dolor tertio Octobris etiamnum Praegae haerens accepi. Viatico inhio hactenus frustra: nec sine eo ire queo. Remissus quidem sum cum trecentis ad Welserum: at nisi ille prius consensisse testetur, hac spe Praga pedem non moveo; quod, scio, ipse quoque probabis (18. Oct. 1608).

Haec sunt, quae in codicibus Petropol. et Monachienais deprehendimus ad Martem pertinentia inter literas Kepleri et Herwarti mutuas. Jam ad alios transimus, qui cum Keplero de edendo suo opere per literas collocuti sunt.

Keplerus d. 4. Oct. 1607. haec Brenggero refert: Clar. et Doct. Vir. Accepi literas tuas (comp. Vol. II, p. 53 et 586.) ante octiduum: ad quas quo minus respondeam, excusationem de occupationes meas, qui versor in adornatione Commentariorum de motibus stellae Martis, operosissimarum speculationum plenissima. Trado enim una philosophiam seu physicam coelestem pro theologia coelesti seu metaphysica Aristotelis. Utinam prius tu relegere meque monere possis quam edantur. Excudentur apud Voegelinum Heidelbergae. Exemplarium distractione mihi est a Caesare interdictum. In qua physica simul novam arithmetica doceo, computandi non ex circulis, sed ex facultatibus naturalibus et magneticis. Arcesso quidem et circulos, sed ad calculum, quatenus circulis explicatur ratio staterae, vectis et ponderum, et in parte tantum; de reliquo arcesso plana seu areas, quas describit planeta suo ambitu, ut in areis inveniam fortitudinem et debilitationem virium in motum collatarum. — Sed quorsum abripior! Non me Mars jussit scribere, sed aliud: „Est Deus in nobis, agitante calescimus illo.“ Nam tuae literae vaticinia sunt &c. (v. Vol. II. p. 60). Brenggerus respondit: Cl. et Doct. Vir, Amice colende. Redditae sunt mihi literae tuae, ex quibus intellexi, Te in Commentariorum de motu Martis adornatione occupari, quo nomine te excusas, quod literis meis non respondeas. Ego vero non tantum excusationem Tuam lubens accipio, sed etiam hortor et rogo, ne quid ab opere jam coepto avertere te patiaris, antequam ad finem illud perduxeris. Quod vero addis, te sineu physicam coelestem et novam arithmetica seu computandi modum, non ex circulis, sed ex facultatibus rationalibus et magneticis tradere, valde laetor, etiam, ut libere fatear, istius arith-

meticae rationem vel saltem imaginari mihi non possim, nedum intelligere. Verum facis tu, ut hic inter spem, atque metum haeream, quando scribis, Caesarem exemplarium distractione tibi interdixisse: quid ita? an ut ille tecum solus fruatur thesauro a te invento? numquid nobis ceteris eum invidetis? Absit! Consolabor ego me spe, quod illud interdictum non sit futurum diuturnum, sed paulo post relaxandum vel prorsus abolendum: ... Plura namc non addam, ne tibi sim impedimento, cum potius optem te adjuvare, et conatus tuos, si qua ratione possem, promoveré. Vale diu et feliciter. Kaufbûrnae 30. Oct. 1607.

Keplerus his respondit (30. Nov.): Cl. Vir. Non sic mentionem feci interdicti Caesaris de distractione exemplarium Martis mei que voti, ut tu prius quam imprimerentur illa legeres, quasi iis impressis legere non possis, sed ut post tuam recognitionem emendatiora prodeant. Nihil enim dubito, te multa moturum, qua es ingenii dexteritate, ad quae respondens ego clariorem textum sim facturus. Misi typos ligneos Frankofurtum Augusto mense, exemplar Septembri Lipsiam. De circulorum ejectione ex calculo ludere me diceas, ubi rem perceperis. Ex calculo non ejicio sed e coelo; id est orbes solidos nego, nego etiam esse planetas mentes circulum aliquem affectantes: contra affirmo, cieri planetas virtutibus magneticis. Jam scis ipse, omnem naturam participare de circulo; et ego sinibus arcuum plurimum utor, sunt enim mensura celeritatis, sunt et mensura accumulatae librationis. Cupis tu me juvare; cupio ego tua opera uti; impedimur intervallo 20 milliarium, quantum puto inter Kaufbeuram et Heidelbergam interesse. Explicare mea vota non audeo, tuam tamen censuram ante excusionem operis aliquo sumtu redimerem. Nam quam in tuo stylo mirificam perspicuitatem exosculor, ea mihi et naturali vitio et materiae insolentia saepe deest.

Hinc transit Keplerus ad harmonicos aspectus et ad Opticam aliasque, quas epistolae partes proponimus Vol. II, p. 53, 589, 829, sicut etiam Brenggeri responsionem d. nonis Martii 1608, cujus exordium tantum et conclusio huc referenda sunt. Eaque haec habent: Vir Clarissime, Amice carissime. Facis tu, quo plus de Commentariis Motus Martis ad me scribis, ut tanto majori desiderio ardeam illos inspiciendi, quos proximis nundinis prodituros spero. Quod Kauffburnam ab Heidelberga 20 milliaribus tantum separas, erras; nam itinere distant 30 mill. haud minore. ... Concludens scribit Brenggerus: Ista nunc sufficiant, suppeditabunt nobis Commentarii de motu Martis novam conferendi materiam, quos ex nundinis Francofurtensibus jam instantibus mihi afferri curabo.

Keplerus respondit: credo sane verum esse, quod scribis, teneri te desiderio Comm. de motibus Martis. Jam bis enim scripseram, publice venales non fore: tu tamen ut solent amantes spe contra spem sustentaris, te illos Frankofurto comparaturum. Utinam ex eo quo feriatos dies egerunt praela Voegelini, domino Junoni operante, tu Commentaria habuisses; sic enim lucidiores prodituros fuisse puto.

Quibus monitis Brenggerus nondum contentus typographum adiit („typographus quarenti mihi referri jussit, Caesarem omnia exemplaria ad se tracturum“), et quia ille ipsi non satisfecit, Keplerum rogat „ut viam sibi monstret, qua exemplum unum possit adipisci.“ Num desiderio Brenggeri satisfactum fuerit, nescimus, cum hinc inde nulla amplius exstet epistola neque Kepleri neque Brenggeri.

Ch. Severino Longomontano, qui infensus in Keplerum ob studia sua astronomica, Tychonicis minus quam illi placuit respondentia, invecus erat, *) sic respondit Keplerus: Quas ad me pridie nonas Majas dedisti literas, Christiane doctissime, postridie Cal. Jan. hujus anni opera Joestellii accepi. Principium durum fecisti, finem mitiorem. Sed bene habet, quod cujus rei causa adeo me militariter salutasti, in ea pridem pacem fecimus Tenguaglius et ego. Sic hodie procul dubio naves Anglorum et Lusitanorum, sese mutuo offendentes in Indiis, globorum ejaculationibus sese eminus excipiunt, paulo post, induciis ad colloquia factis, pacem inter Reges esse discent. Itaque pacifice tibi respon-

nium ego in Sole et Marte exploratissimum habeo, fateor me accommodasse hypothesin Lunae quadamtenus, quantum ejus fieri potuit salvo effecta Tychoniana hypothesis; sed tu de proportionibus divinis loqueris, innuens meum *Mysterium Cosmographicum*. Atque hoc ipsum en laudas, nisi me occulte forte notas ut *πολυπραγμονα*, qui physicam in astronomia tractem. Vos Tychoniani astronomi physicam, jure spoliata soliditate orbium, per injuriam destituitis in maxima incredibilitate et perplexitate volatus planetarum versantem. Cur non ego iterum illam juvem, formas physicas motuum per liquidum mare inquirens? Fateor tibi Christiane, me ex hoc quinquennio dimidiam minimum partem ejus temporis, quod mihi a sollicitationibus aulicis residuum fuit, physicis contemplationibus motuum Martis transegisse. Verum ita implexas puto scientias, ut neutra sine altera perfecta esse possit. Sed video, te hic non magnopere adversari. (Longomontanus: Ex hisce [ovalibus v. a.] igitur, et praeterea, si quid motricis virtutis et proportionis divinae certum in singulis inveneris, quod te mehercule divinitati in hac professione proximum faciet, id ad circulares motiones — quod facere quisquis potest — ita tandem revoces velim, ut phaenomena ipsa coeli nullam tuam vim nullam violentiam sentiant. Secus enim ex prioribus haud procedens neque musicam Platoniam, qua anima mundi viget, attingens, nos incertos in suspicionibus, tenebris ac erroribus adhuc es relicturus.)...

Quod vero prosthaphaeresium tabulas attinet, scito, me totum hunc annum, qua parte a morbo et a curis fui vacuus, in unius ♂ prosthaphaeresibus eccentrici versari, nec pudet dicere, me scopum nondum attigisse. Hypothesin habeo, jam ante 4 annos constructam, quae mihi planetam in eccentrico debitis locis sistit scrupulosissime. Sed non placet mihi, quia non est physica, sed vere id quod dicitur, hypothesis. Itaque hic vere tu mihi dixisti, non esse omnium planetarum rationem eandem. Nam etsi de Luna nihil affirmo, si physice examinaretur ex professo, quod hactenus non feci ex quo a te absum, hoc tamen tibi fateor, me in Marte viam longe aliam ire, quam in transformatione Lunarium institi. Jam et illudis mihi exemplo Rhetici (Longomontanus: meministi, mi amice Keplere, Benaticae olim operam inter nos fuisse divisam, sc. ut tu Martem, ego autem Lunam sub arbitrio magni Tychois curarem; an nunc forte tua in eo aut diffidentia aut desperatio [ignosce nihil hactenus mihi abs te praestitum intelligenti] casui D. Rhetici, modo vera de eo narrent, simillima, causa tibi ad Lunam usque resurgendi esset?); ridebo tecum. Te sane tua Luna, me quandoque spectatore, misere exagitavit, quandoque et me, scio. Me, si Mars meus male habet, decet te commiseratione tangi eadem passum. Sed tamen temporis tibi rationem reddam, quia id petere videris. Anno 1600. a Februario in Majum primum potissimam partem sperando et imaginando consumsi. Scis enim, me intra octiduum sub pignoris periculo voluisse arcana omnia absolvere. Profeci autem tantum, ut eccentrici inaequalitatem mediocriter salvarem (nisi quod una fundamentalium observationum 20' vitiosa fuit assumpta) et minuendam esse Solis eccentricitatem callerem. A Junio in Octobrem sum peregrinatus et familiam transtuli. Ab Octobri 1600. in Augustum 1601. quartana me tenuit. Interim scripsi contra Ursum, jubente Tycho, et alia ipsius studia pro ipsius arbitrio et meis viribus adjuvi. Speculatus sum indignante Tycho in Venere, Mercurio, Luna; in illis utiliter, in Luna plane frustra; speculatus sum et in Marte, correxi inaequalitatem primam, correcta vitiosa fundamentali observatione; etiamque ab Aprili in finem Augusti peregrinatum abii in Styriam, relicta Pragae uxore. A Septembri in Julium 1602. dedi operam liberis et fabricatus sum pulcherrimam filiolam. A Septembri, inquam, coepi laboriosissime inquirere proportionem secundae eccentricitatis Solis, in quo labore Tycho mortuus

est. Mensis nobis eo curando dum aegrotaret, et sepeliendo mortuo consumatus. Inde usque ad ferias Natalitias refegi Progymnasmata, scripsi indicem, concepi notas, quarum aliquae (ut rem indignissimam obiter addam) tantummodo privatae monitionis causa scriptae, postmodum per similitudines nostras, me non amplius consulto, fuerunt ita ruditer et cruditer, ut erant a me conceptae, citra omnem necessitatem impressae, consilio, ut ajunt, ne haberem ego, quo calumniarer. Ubi etiam praeceptum in computanda Lunae longitudine ex mea prava correctione (de qua eram seorsim deliberaturus extra feminarum strepitum: cui rei notam ad marginem posueram, ut amplius super eo conferrem cum haeredibus) me non amplius consulto fuit perversum: ut plane habeas tu vel Müllerus potius, quod mihi seu magis similitudinibus nostris succenseatis.

Sed regrediendum ad initia anni 1602; ibi tu noli rationem temporis exigere. Crede mihi, quod duos integros menses stando consumserim in equestri palatio. Nam mortuo Tychone 24. Oct. (1601.) Barwitius 26. Oct. mihi ultro salarium Caesareum annunciavit; id ut confirmaretur petendum erat, donec tandem 9. Martii primam accepi pecuniam. Paulo post migravi Emanntem, horae unius itinere cursitans quotidie in aulam. Ibi tum coepi observare et ad Martem redire, invenique, viam ejus esse non perfectum eccentricum, sed ovalem. Supervenit autem Tengnaglius et invenit lites me inter et Tychonianos (qua in re curiositatem tibi meam libenter fateor, ut olim quoque in literis), et me quarundam observationum non eratam custodem, quas ipsi quidem citra ullam controversiam tradidi; sed adventus ipsius meum salarium quassare videbatur. Itaque novae ortae sollicitationes et denique res eo rediit, ut juberer nominare studia seu opera, quae susciperem perficienda pro salario meo. Factum id est 1602. Septembri. Nuncupavi Astronomiae partem Opticam ad sequentia Natalitia, et Commentaria de motibus Martis ad sequens Pascha. Seposito igitur Marte sumsi Optica, et cum jam de excusione agerem, tum demum coepi de novo concinnare opus, neque tantum a Sept. 1602. in Natalitia 1602, sed in altera Natalitia 1603. iis incumbere. Iis perfectis occupatus fui pene hoc toto anno 1604. operis typographicis, itaque toto 1603. vix parum respexi ad Martem, condidi tamen Ephemerida ♂ et tradidi cum Opticis, etiamque illam nostram Pandoram, transformationem dico Lunarium, interjeci mensibus Martio, Aprili et duobus aliis in plenaria adornatione et descriptione consumtis. Ab initio anni 1604. redii ad Martem et Commentaria scripsi; simul tabulas prosthaphaereseon orbis anni generales et cuicumque restitutioni ♂ aptas, simul tabulas prosthaph. ex hypothesi physica, ubi, credas mihi, quadragies minimum usu venit, ut per 181 vices eadem operatio traduceretur. Nam rei subtilitas non est passa, per denos aut senos gradus saltare. Simul autem et operam liberis dedi, genuique filiolum Fridericum; simul et bimestri tempore aegrotavi et una uxor; simul nova stella exorta occupationes peperit; simul migravi in nimis longinquas aedes, et mille alia negotia domestica et in Styriam scriptiones tibi comperta non sunt, aulica ex Tengnaglio discas peto. Credo, quod dimidium temporis eripiant. Jam quid sit effectum vide. Ovale iter ♂ per auram aetheream est constans. Causa ovalitatis titubat. Ego hactenus causam attuli talem, ex qua sequitur, ingressum ♂ a circulo esse 1300 de 152500, quem ubi coepi illustrare, non invenio majorem 800 vel 900. Comprehendi tamen 51 capitibus omnia quae explorata habeo. Si moriar, scio haec omnia utilissima futura ulterius progressuro. Summa haec: Mars

se ipso libratur in diametro epicycli; rapitur a virtute ex Sole in mundum sparsa; utraque motio est inaequalis; libratio intenditur et remittitur non tantum lege duorum circularum, ut in Copernico, sed illi ipsi circuli intenduntur et remittuntur ad mensuram crescentis et decrescentis diametri Solis; quanto major apparentia disci Solaris in perihelio quam in aphelio, tanto major illic diurnus quam hic, vel eversa proportione, tanto diutius moratur planeta in uno gradu anomaliae coaequatae in aphelio, quam in perihelio. Raptus vero mensura est copia luminis ex Sole in planetam in qualibet distantia allapsi, nempe quantitas disci corporis Solaris. Quomodo ad mille parietes impingens hanc solam viam ire coactus sum, capitibus illis 51 descriptum.

Hoc simpliciter certum, ex Sole propagari vim, quae planetas rapit; cetera sic quidem dubia, ut tamen identidem simile quippiam aliud post aliud ad scopum me propius adducat. Habes de meo profectu. Ceterum Commentaria haec fortasse nemo nisi apud me viderit. Habes et rationem temporis prolixam. Quid vero tu jam agis, postquam me cum meo Marte delusisti? Nempe catalogum recensens eorum, quae in Luna Tycho et tu praestiteritis, et postea subjungis, me haec omnia aequiparare sterquilineo Augiae. Bona verba. Quin tu potius expectasti reditum tuum Hafniam, ut inspectis literis meis cernereres, an tale quippiam contineant. Adhaesit memoriae tuae Augiae vox. Ne quid quaeso per calumniam, quae solet plerumque occupari circa invidiosa. Atque ut videas, me tenere memoria, cui rei mihi Augia servierit, quamvis id tu ex praesentibus tibi literis meis rectius percipere potes, scito, me non dehonestasse astronomiam convicio, quam maximi jure facio, sed usum esse similitudine eaque minime in iis, quae tu vel Tycho praestitistis, elevandis, quod mihi aut ira caecatus aut malitia corruptus cum insigni injuria tribuis, sed in comparatione hypothesis antiquarum cum meo itinere ovali. Tu meum ovale iter dehonestasti, ego tibi centuplo absurdiores spiras antiquorum (quos etiamnum Tycho imitatus est, non nova fingendo, sed vetera relinquendo) opposui. Si succenses, a me non posse tolli iter ovale, quanto magis succensere debes spiras, quas sustuli. Quasi peccaverim in ovali relictis, cum ceteri antiqui non peccent tibi in tot spiris. Hoc est multari ob unum carrum fimeti relictum, cum reliquam Augiam expurgaveris; tuo sensu, qui repudias meam ovalem cea unum carrum fimeti, cum toleres spiras, quae totum stabulum sunt, siquidem mea ovalis sit unus carrus. — Sed piget, in manifestissima calumnia diluenda immorari. . . . Pro Deum! Nondumne satis probasti mihi, te mea epistola caruisse? Audes iterum in itinera ovalia insultare, cum scias, apud Ptolemaeum et Tychonem esse spiralia. Annon tibi descripsi in scheda modum? Annon dixi, in ipso etiam Copernico esse ovals, easque studio a Tychone traductas in suas hypotheses? Annon dixi, ovalem meam ex duobus principiis regularissimis componi? Jubes me omnia ad circulares motiones revocare; nondum igitur intelligis, quales ovals fabricem. Revoca tu tua et Ptolemaica et Copernicana ad circulos. Praestitisti? Praestiti et ego. Nolito putare, me mentibus divinissimis tribuere destinationem ovi, imo appetunt circulos, sed per accidens exorbitant, ut Ptolemaeo planetae appetunt epicyclicos et eccentricos motus, sed per accidens in spiras aguntur. Ratio est plane eadem. Qui meas ovals carpit, carpat et confusionem aspectuum in Calendario seu Ephemeride. Mones, sic physicas causas quaeram, ne interim coelum a me vim patiatur. Ego, mi Christiane, si 8'

in dubio ponere voluissem, potui totius hujus anni 1604. labore ter maximo supersedere. Itaque scias, diligentissime me operam dare, ut cum observationibus stem ad unguem. Nisi hoc agerem, non tot jam modos aequationum eccentrici physicarum, ad 20 fere, attentassem. Tu itaque differ judicium, donec fundamenta mea coram videas.

Denique vale et quam primum rescribe, ut, quo animo sis lectis hisce, videam.

Quae reliquae sunt harum (non adscripto tempore, quo datae sunt) literarum, quas descriptas exhibet Cod. Viennensis, leguntur in praefatione ad „Tabulas Lunares.“

Quae Keplerus in modo praemisissis de vi Solis planetas rapiente Longomontano scripsit, paulo post (Majo 1605.) ad vim Solis „magneticam“ transfert, Hegulontio Anglo (Heydono) de opere suo haec datus: Commentaria Martis edi non possunt, nisi ego assensum, Caesar sumtus praebuerit. Quae tu ex iis exspectas, correctissima loca stellae Martis, ea parum ego curo prae aliis, quae hic attentavi et divina gratia assecutus sum. Duae sunt, ut nosti, planetarum inaequalitates, altera ex Sole communis omnibus, altera cuique propria. Illam ego sic investigavi, ut sperem, omnibus quatuor residuis satisfacturam. Hanc pertinacissimis laboribus tantisper tractavi, ut denique sese naturae legibus accommodet, itaque, quod hanc attinet, de astronomia sine hypothesibus constituta gloriari possim. Quo nomine gratulor vestrae genti de inventa per Guilielmum Gilbert philosophia magnetica.⁴⁾ Nam ea plane mihi et in planeta Marte inventa est. Nam quid est, quod planetas circa Solem rapit (consentiunt enim Tycho et Copernicus in eo), quid enim nisi effluvium Solis magneticum? Quid vero est, quod planetas facit a Sole eccentricos, quod cogat ipsos ad Solem accedere, ab eo recedere? Nempe effluvium ex ipsis planetarum corporibus magneticum et directio axis.

Atque haec omnia ratiocinia in Marte sic sunt comparata, ut aut falsa esse necesse sit, aut omnibus planetis quoad qualitatem communia. Quo nomine clavem astronomiae penitioris in Opticis jure promississe videor.

Operi Magini inscripto: Supplementum Ephemeridum ac tabularum secundorum mobilium. Frankof. a. M. 1615, additae sunt literae quaedam Kepleri ad Maginum, quarum posteriores in annot. N. 80 sequente exhibuimus. Priorae autem earum hic inserendae sunt, cum proxime pertineant ad ea, quae Keplerus de iisdem agit rebus cum Herwarto et Fabricio. Maginus in epistola dedicatoria ad Agnelli Marescottum haec praemittit: In his Martis tabulis ac calculo sequutus sum terminos hypothesium Kepleri. Praeterea, ut Tibi in hoc quoque obsequer, publicavi eruditissimam Kepleri epistolam illam, quam ad me anno 1601. conscripsit, cum Tycho adhuc viveret, siquidem illa ipsa ad intelligentiam insignis illius operis de motu Martis multum lucis affunderet. Fateor autem ingenue, me ad illam tunc ut par erat non respondisse, cum suspicarer, eam fuisse Tychonis hortatu ad me conscriptam, ut ea a me ille obtinere posset, quae paulo ante ipsi Tychoni obtuleram, hac potissimum conditione, ut mihi vere commentationes orbium communicare vellet; et hanc meam suspicionem auxit, quod nullum postea acceperim ab ipso Tychone responsum &c.

Haec igitur dedit Keplerus Magino: Si mutua hominum notitia penderet a solo congressu et intuitu vultus, longiori forsan exordio mihi opus esset pluribusque ambagibus, quibus in tuam ignoti familiaritatem ego, Germanus homo, qui nunquam Italiam vidi, pervenire contenderem. Te mihi literae, coelestes artes, famaue celebris ita notum reddiderunt, ut summa praeditum humanitate erga externos merito credam; eaque fretus fiducia tuas aedes, non ante denuntiatione facta, da veniam, recta injussus ingredior, per literas tecum, praestantissime Magine, de communibus studiis collocuturus. Mathematicas disciplinas procerum Styriae stipendiis adjutus inde a 94. anno avide

colni; 95. libellum edidi, cui titulus est *Mysterium Cosmographicum*. Si tibi exemplar Paduam transmissum est, id ita ut volui factum est. Cum per literas Phoenicem nostrum Tychonem Braheum compellassem, uti suum ille super eo libello iudicium proderet, ad respondendum inveni promptissimum, adeo ut me ad sese suaque studia visenda invitaret. Haesit eo tempore in Cimbria; paulo post ut in Bohemiam venit iter suscepi, vidi, probavi, admiratus sum, concupivi, haesi denique: et jussu Caesaris, quod Tychoni credo promotori, familiam eo transtuli. Cur ita facerem, movit me potissimum, quod, quam jam diu meditor *Harmonicen Mundi*, perficere, nisi restaurata per Tychonem astronomia aut comparatis ejus observationibus non possum. Quid? hoc mali dicam esse in arte nostra, quae omnis justitiae fideique norma est et origo, quod in eam fraudes irruerunt, quibus decepti retinentur viri summi, quo minus ut par erat quidquid profecere in commune conferant, in publicum edant, petentibus communicent. Premittit Tycho pleraque: planetarum theorias restauratas, eccentricitates, proportionibus orbium ad examinanda mea harmonica quaesivi: Solis ille fixarumque canones, quaeque in Luna, et quod potissimum expetivi, in Marte jam olim perfecit, ea profert, cum correctiora sit editurus. Observationes quidem lectissimas porrigit, non tamen aliter, quam intra suos parietes. Labora, inquit, tu quoque; credo, quod Copernicanae hypotheseos defensorem alius ipse sententiae spectare constituit. Ego Tychonis observationibus potitus jam annum integrum Copernici hypotheses examino in Marte praecipue. Interim tu ad Tychonem scripsisti non semel; literas tuas partim legi, partim audiui recenseri. Admiranda tu quoque commemoraras, simulque premere illa et ipse profiteris. O rem indignam, adeo perditam esse tempora, ut viris doctis quoque in metu sit versandum! Quamvis tu quidem non obscuram spem feceris, communicaturum te tua cum illo, qui sua vicissim tecum communicet. Id ego postquam ex literis tuis intellexi, mirifice in tui amorem exarsi, idque tanto magis, quanto illa, quae in secreto habere dixisti, meos labores astronomiae forte non inutiles adjutura sunt. Ac etsi quidem ea, quae a Tychone habeo, vicissim tecum communicare non possum nisi ipso consentiente (fidem namque super hac re illi dedi), spero tamen, te fore mihi aequum, si ex eorum, quae proprio Marte adinveni, liberali communicatione candorem meum perspexeris; non quod iis te multum adjutum iri sperare possim (sum enim meae mihi tenuitatis conscius), sed ut animum ut dixi meum videas. Nam et hoc accedit, quod tanto rectius me juvare poteris, ubi videris, quibus in rebus verser. Si de mea fide dubitas, habes hic chirographum meum, quo bona fide promitto, me quicquid hujus mihi communicaveris in secreto habiturum, non pro meo venditaturum, nulli hominum quisquis ille sit communicaturum: sine dolo malo, sincere, si secus faxim, vir inhonestus habear.

Quae autem ego deprehendere potui, haec fere sunt.

In libello meo *Cosmographico* peculiare caput est, cum tabula a Maestlino computata, in qua hypotheses Copernici sic censui corrigendas, ut planetarum eccentricitates summaeque apsides ab ipso veri loci Solis centro deriventur, non a medio loco Solis. (*Prodr. Cap. XV.*; *Vol. I. p. 153. Comp. Comment. Cap. V.*) Id certissime ita habere deprehendi, Martis certissimis observationibus ad demonstrationum calculum revocatis. Alio ejus libri capite (*Cap. XXII. Vol. I. p. 181.*) monui de theoria Solis, quod ea non ut planetae ceteri ab artificibus aequantem sit adepta, sed sola simplici constet

eccentricitate, idque in suspicionem traxi falsitatis. At ex theoria Martis id inculentissime probari potest, Solem (vel in Copernico Terram), cum est in apogaeo, non ita alte ascendere, uti maxima ejus aequatio per suppositionem simplicis eccentricitatis requirit, sed deficere partem ejus circiter tertiam, per positionem aequantis salvandam. Aequationes tamen ubi maxime differunt, in anomalia 135° , scrupulo uno cum sexta parte differunt, nihil ultra.

Eodem in capite moneo de peculiari inaequalitate revolutionum Veneris et Mercurii, quod Copernicus ait centra eccentricorum revolvi in parvo circello, fierique centrum eccentrici Veneris, cum in apogaeo vel perigaeo est, centro orbis annui propius, cum in locis intermediis est, remotius, et eccentricitatem majorem; contra Mercurii in apogaeo et opposito loco eccentricitatem esse majorem, in quadrantibus minorem. Has, inquam, novas inaequalitates non obscure in dubium vocavi. Id autem quale sit et unde hae inaequalitates inferioribus inesse videantur, hoc ipso tempore deprehendo, quo Praga absum in Styria haereditatis causa (comp. Vol. I, p. 653.), nisi quod libris destitutus numeros applicare nequeo. Tu vero si schema feceris ad imitationem Copernici, et apogaea Solis, Veneris et Mercurii ordinaveris, simulque duos pro Terra circulos duxeris, alterum pro via Terrae hactenus credita, alterum ex Soli propiore centro pro via Terrae verissima, cui prior ille loco aequantis Ptolemaici inserviat (nam universalem theoriarum sive circulorum planetariorum ordinationem facio ad imitationem Copernici circa Solem immobilem; particulariter vero theorias singulas more Ptolemaico, cum aequipolleant hypotheses, administro, solo epicyclo excepto, qui tollitur a mobilitate Terrae); haec, inquam, si ita disposueris, facile tibi apparebit, has existimatas inaequalitates inferiorum nihil aliud esse, quam parallaxin ex motu, vel accessu et recessu Terrae ad orbem Veneris hactenus non satis cognito resultantem. Nam quia apogaea Solis et Veneris conjuncta fere sunt ideoque Terra a Sole longissime remota, cum putetur tam longe remota, quantum postulat Solis aequatio maxima in eccentricitate simplici, sit vero in rei veritate propior Soli, propior etiam erit orbi Veneris Soli circumposito: itaque Venerei orbis centrum ad Terram accessisse et in opposito Terrae situ ab ea recessisse putabitur. Ita quod inest globo Terrae (vel Soli, qui Veneris orbem gestat secundum Tychonem), id orbi Veneris inesse putatur; contrarium accidit Mercurio, nam ejus apogaeum perigaeo Solis propius est, quam apogaeo. Parco verbis, cum vel hactenus verborum minimum coram sagacissimo homine fecerim. Cum igitur hoc ita habeat circa inferiores, in magna dubitatione sum, an verum sit de Mercurio, quod geminum perigaeum habeat circa trientes. Si schema quale dixi feceris, apparebit demonstratio, qua φ in primo triente ab apogaeo majorem digressionem facere deprehenditur, quam in perigaeo, in altero vero triente minorem. Forte in illo altero non fit conspicuus aut non exstant forsitan in Ptolemaeo alterius trientis observationes; quae facile perquires, ego jam libris careo. Memini tamen, Ptolemaeum in φ ex duabus observationibus longe distantium annorum unam anni intermediis effinxisse, qua commode uteretur.⁹) Itaque mihi parum metuo a Ptolemaeo in hoc negotio. Adde, quod magnum aliquid infert inclinatio plani Mercurialis ad planum eclipticae, quam in forma hypothesis Copernici inveni majorem Lunari, sc. $7^{\circ} 45'$ c., quamvis latitudo visa nunquam tanta fiat. Itaque si 45° a nodo in alterum trientem ab apogaeo incidit, $16'$ alteratur punctum eclipticae respondens a puncto orbis Mercurialis, lineis ex Sole eductis, quae differentiae aliquid inferre et

illam *φαντασίαν* de gemino stellae perigaeo causis aliis concurrentibus adjuvare potest. Simile his est et procul dubio ex eadem causa manans, quod Ptolemaeus ejusque hic imitator in alia hypothesi Copernicus (Lib. VI) inclinationes planorum in planetis libratione aliqua, quae sit revolutioni Solis *ἀναλογος*, instabiles reddunt. Id mihi semper alienum a natura visum, etsi quidem latitudinum in meo libello non feci mentionem, at deprehendi in Marte inclinationem plani constantissimam, quoties in eundem locum eccentrici recurrit, quorumcunque Terra recesserit. Idem in Venere et Mercurio circa nodos eorum exploratum habeo.

Haec si Magine solertissime fueris unico mentis intuitu complexus, mecum equidem statues, omnium 7 theoriarum, quod motus siderum reales attinet, formam esse plane eandem eamque simplicissimam; quilibet enim in una revolutione constantissimum exactissimumque circulum decurrit, tardius supra, velocius infra h. e. prope Solem, idque non per phantasiam sed re vera. Nam Tycho etiam in Luna aequantem adhibuit. Ex qua concinnitate et simplicitate h. e. perfectione motuum coelestium quantum Copernico roboris accedat, facile perspicis. Nam etsi Tycho Copernicum quam proxime imitatur et repraesentat retenta Terra in medio immobili, illud tamen cavere non potest, quin vias, per quas planetae in liquidissimo aethere, quod ipsi facile credo, gyranter, in spiras inaequaliter semperque aliter contorqueat. At non ideo facilius fiet calculus. Imo quanto captu planior haec astronomiae forma, tanto computatu laboriosior, inventu intricatior.

Quod ad inventionem attinet, periculum in Marte feci; unde demonstrationum initium facerem non habui, erant omnia incerta. Quodsi quis fortunam periclitari et praesupponere aliqua ceu certa velit, eaque suppositione identidem variata quasi per regulam falsi paulatim ad veras dimensiones contendere, illi in tanto numero quaerendorum non facile apparet, qua in parte lateat error; processus vero singuli ab initio suppositionis usque ad finem pene infinitae longitudinis. Itaque divino me beneficio Magine praestantissime afficeris, si me doceres via faciliiori inquirere compositas eccentrici aequationes. Rem quidem eo perdux, ut mihi non plus duabus multiplicationibus opus sit. At dum nimia cupiditate feror in inquisitionem verissimarum proportionum, tabulas aequationum nullas condo, quibus in operando sublever: cum non ita magnus sane labor sit, 360 multiplicationes pro 180° perficere; labor, inquam, non ita magnus, si semel susciperetur. At toties novam condere tabulam, quoties assumpta symmetria falsa deprehenditur, id vero permolestum et praestabilius, tuo mystico numero uti ad eas solas aequationes eliciendas, quibus pro re nata opus est.')

Cum itaque diu laborassem variaque demonstrationum adminicula effinxissem, tandem in haec duo problemata incidi, quae ad rem maxime facere puto: quorum alterum plus certitudinis, alterum plus ingenii habere videtur.

Detur angulus motus medii planetae itemque Solis circa puncta aequantum ad temporis quodlibet spatium determinatum. Detur et locus Solis verus ad momentam quodlibet, cum quo datur et apogaeum et eccentricitatis compositae ad orbem proportio. Nesciatur vero longitudo simplex planetae (nam et circa hanc corrigendam artifices occupantur), nesciatur locus apogaei (potius *ἀφῆλιον*) planetae, nesciatur proportio orbium Terrae (seu Solis) et planetae, nesciatur proportio eccentricitatis planetae ad orbem suum, nesciatur proportio partium hujus eccentricitatis, nesciatur etiam in theoria Solis (vel Terrae) proportio partium eccentricitatis compositae. Dentur jam tres pla-

netae ἀπορρυγας observationes, et singulis binae aliae observationes adiungantur sic comparatae, ut planeta post integras revolutiones (quae inter data sunt) semper sit iterum in eodem loco sui eccentrici, linea ex centro Solis educta. Ex novem sic comparatis observationibus planetae datisque ceteris sint inquirenda omnia, quae nesciri dixi: 1) in qualibet observationum triga scitur locus sub fixis causa longitudinis, in quem cadit linea ex centro corporis Solaris per planetae corpus educta. Nam in vera oppositione cum Sole locus ille patet oculis, in binis vero sociis beneficio periodi cognitae scimus, planetam eodem esse reversum, ubi fuit in ἀπορρυγῶν situ. Cum ergo tres sint trigae, ter ergo scitur locus planetae sub fixis.

2) Cum planeta et Terra non faciant ullam unquam omnimodam ἀνομασίου, fit ut planeta ter eodem in loco sui eccentrici versante, Terra contra tria distincta loca possideat. Itaque cum detur locus Solis seu Terrae oppositus ad omnes tres vices, dantur etiam anguli commutationis veri et tales, quales ex angulis commutationis simplicis per utriusque et planetae et Terrae aequationes corrigentes exstrueremus, si jam haberemus tabulas.

3) Ex his habebitur per solutionem unius trianguli (Sol, Terra, Planeta) distantia Solis et Terrae, eaque bis. Nam Terra inter verum Solis et planetae locum versante, nulla fit longitudinis parallaxis seu commutatio. Itaque per aliud huic implexum problema, cum sciatur locus apogaei Terrae, scibitur etiam angulus anomaliae ad utramque distantiam Solis et Terrae. Ex duorum itaque locorum a suscepto puncto distantis et utriusque a loco apogaei remotione inquiritur quantitas orbis Terreni seu magni in ea mensura, in qua praesupposuimus cognitam esse planetae a Sole distantiam uno loco eccentrici sui; inquiritur indidem etiam distantia suscepti puncti (quod est centrum viae Terrae) a centro Solis. Hoc uti fit in una triga observationum, ita fit etiam in altera et tertia. Sed in altera planeta est alio loco sui eccentrici, in tertia est tertio loco sui eccentrici habetque inaequales a Sole distantias, quas semper initio demonstrationis ponimus esse 100000. Est itaque necesse, ut quantitas orbis Terrae alia atque alia prodeat, proportionem tamen eccentricitatis viae Terrae ad semidiametrum semper eadem prodeunte, quae admodum certa probatio erit. At cum certum sit, manere radium orbis Terrae circa centrum viae Terrae in eadem quantitate, suscipiemus jam hunc in quantitate 100000 et proportionaliter constituemus planetae in tribus locis distantias. Ita tres planetae inaequales a Sole distantias habebimus. Quemadmodum ergo facillima ratione geometres ex tribus punctis circulum describit, ita arithmeticus laboriosa via per octo (nescio an sedecim) operationes simplices ex tribus radiis inaequalis longitudinis ab uno puncto exeuntibus rimatur quantitatem semidiametri viae planetariae in proportionem, qualium est semidiameter orbis Terrae 100000; simul et distantiam centri a puncto illo uno (quod est centrum Solis) rimatur et inclinationem lineae per utrumque centrum trajectae ad radios dictos. Habita eccentricitate viae Terrae et planetae simplici, eccentricitas composita seu aequantis in Terra ante nota est, in planeta inquiritur ex angulis motus simplicis ad spatia temporum intermedia cum jam inventa eccentricitate viae comparatio. Quemadmodum et cognito loco apogaei (seu aphelii) planetae cognoscitur et longitudo simplex ejusdem correctae ad quodlibet tempus.

Alterum problema difficillime sine schemate explicatur; ego vero jam et instrumentis careo. Versatur in latitudinibus ἀπορρυγῶν. Praecognita

haec sunt: primo tres latitudines planetae accurate observatae, cum est in vera oppositione cum Sole; cum quibus innotescunt etiam loca longitudinis angulique interjecti. Deinde opus est ut sciamus loca nodorum; ea vero simplici observatione patescunt: nam cum planeta est in ecliptica, nulla parallaxis (nisi ea, quam habet communem cum luminaribus) illum alibi facit apparere, quam in ecliptica. Quorsum vero cadat linea ex Sole per planetam ejecta, ex mediocri et inartificiali aequationum et aphelii praecognitione mediocriter etiam praesciri potest. Tertio opus est nobis scientia inclinationis maximae planorum, quam sic investigamus: cum abest planeta aequaliter a Terra et a Sole, eadem est inclinatio ejus et latitudo visa. At circa exortus vespertinos et occultationes matutinas, potius circa quadraturas, cum angulus verae commutationis planetae aequatur angulo vel distantiae circulari Solis et planetae, sunt etiam aequales rectilineae distantiae dictae. Tunc ergo planetae latitudo observetur et constituatur ex mediocri praecognitione theoriae planetae, quo loco impingat linea ex Sole per planetam iens, factaque comparatione visae latitudinis (quae est etiam vera inclinatio) ad distantiam a nodo, in triangulo sphaerico inquiratur inclinatio maxima limitum. Tunc ergo scilbitur inclinatio planetae ad quemcunque situm ~~apog-~~
~~perigios~~, videtur vero latitudo; comparetur ergo visa latitudo cum calculata inclinatione et fingatur interea planeta aequalissime circa Solem ire, fiet hoc pacto, ut prodeant tres distantiae Terrae a Sole. Ex his tribus eliciatur quantitas orbis, aphelium et eccentricitas viae, ut supra. Erit hoc pacto eccentricitas planetae cum eccentricitate Terrae in communem eccentricitatem confusa, et utriusque aphelium in idem aphelium commune loco intermedio confusum. Et mirabile dictu, in hac majoris circuli eccentricitatis in minoris eccentricitatem infusione, quod prodit, circulus manet. Demonstrationem, nescio quomodo fiat, ut animo videam, verbis eloqui nondum potuerim. Cogita ipse. Mechanice quoque certam fidem feci. Ex hac confusione, jam adminiculante cognitione apogaei Solis, extricanda est utriusque sideris eccentricitas viae, quod totum negotium problematis aliquot explicui, sed jam chartis meis destitutor. Pulcherrima est speculatio: sed latitudinum anguli parvi, error observationis valde sensibilis, itaque probationis loco est, non inquisitionis.

Quae autem dixi de mediocri praecognitione theoriae planetae, sic intelligantur, quod sicut in theoria Solis (vel Terrae) ita propemodum in omnibus planetis aequationes eccentrici sciri possunt (solas namque has peto ut praecognoscantur), etsi verissima proportio partium eccentricitatis ignoretur. Nam error ex vitiosa proportione hac prodiens in Sole quidem non est major $1' 10''$ cum est maximus in anom. 135° . Et hic quidem error tantus est, quando, quae ex duabus partibus aequalibus composita est eccentricitas, eam cum prioribus astronomis ut simplicem imaginamur. At si compositam et nos faciamus ex partibus genuinis, faciamus item ex partibus non genuinis, aequationes utrinque exstructae multo adhuc minus differunt, dummodo summa partium eadem utrinque maneat: adeo quidem, ut in Marte, cujus est aequatio maxima, si a 92 usque in 120 varietur eccentricitas viae (in ea dimensione, ut est radius 1000), aequationes non turbentur plus $3'$. Verum ut et hoc addam, ipsas aequationes eccentrici sine praecognitione longitudinis mediae in hunc modum investigo problemate, quod necessitatem infert et tamen neque per geometricas demonstrationes neque per latius patentem cossam explicari a me hactenus potuit. Laboravi tanquam per

intermedio, recte habet et longitudo media; cum autem jam habeatur proportio linearum ad AC, quam suscepimus esse 100000, facile eam in alios numeros transponemus, ut BF sit 100000. Quodsi ergo 4 observationes in parte scrupuli recte haberent, essemus vel sic certi de porportione FB ad BA, nec opus esset tanto apparatu, quantum supra descripsi. Sed quia intra 3 scrupula certi non sumus de observatione, praesertim quando deductione opus est a die proximo, quando serenitas observationes admittit, ad diem verae cum Sole oppositionis, ideo in incerto relinquimur (ut supra dictum) in Marte quidem a 9200 in 12000 et ulterius, quae incertitudo in parallaxibus orbis annui intolerabilis est. Aequationes tamen hac via prope verum addiscimus.

Hactenus exposui, quibus in rebus a te Magine sollertissime adjuvari possint inventiones hae circa theorias planetarum Copernicanas. Nunc alterum caput de difficultate calculi aggrediar, consilium tuum expetiturus, quomodo censeas constituendas tabulas, quam formam calculi amplectendam. Copernicus uti potuit anomalia commutationis, quia centrum, circa quod numeratur anomalia, putavit esse centrum viae Terrae. Quid jam nobis proderit canon anomaliae commutationis, cum bis aequanda sit, nempe per totius aequationis et planetae et Terrae partem eam, quae constituitur ab eccentricitate viae? Oportet enim angulum anomaliae ad nullum aliud punctum stare, quam centrum Solis. Nulla hic aequipollentia hypothesis nos iuvat. Dimidio gradu in Marte erramus primum atque centrum Solis deseruerimus. At si stet angulus hic ad Solem, semper est alia atque alia distantia Solis et Terrae, quare etiam alia atque alia parallaxis annua, etiamsi planeta habeat unam et eandem anomalam eccentrici. Nam aphelia in tabulis perpetuis oportet considerari ut distantiam mutuam variantia successu seculorum. Ac etsi semper eadem maneat apheliorum distantia, tamen parallaxes erunt condendae non ad quadrantem, non ad semicirculum, sed ad integrum circulum, ubi si accedant etiam scrupula proportionalia, ut necesse esset, nescio an evitaturi simus omnem errorem. His omnibus accedit implexio mutua parallaxeon annui orbis in longum et latum, qui scrupulus me diutissime torsit caeca molestia. Nam cum prope oppositiones planetae cum Sole venitur, haec implexio non parvi est momenti semperque me impedivit, quo minus justam siderum a Sole distantiam investigare potuerim. Hic si etiam canone uti velimus aequandi propter latitudinem angulum commutationis, nescio an difficilior et taediosior sit futurus calculus tabularum, quam calculus triangularum. In hac ergo difficultate de forma calculi ea cogito, quae est naturae conformis; quam quia sine tua ope vix potero adipisci, itidem exponam. Colligetur ex tabulis planetae simplex longitudo et aphelium, et subtracto hoc ab illa per anomalam eccentrici relictam excerpetur aequatio eccentrici, qua corrigetur longitudo, ut fiat eccentrici longitudo aequata; excerpetur et distantia planetae a Sole per eandem simplicem anomalam, servanda in futurum usum. Hic labor erit in inferioribus plane idem; nam eccentricus eorum is dicetur circulus, quem in rei veritate describunt circa Solem. Quodsi carerent planetae parallaxi annua, jam inventa essent omnium planetarum ipsiusque Terrae loca in suis orbitis. Ergo pro 5 planetarum parallaxibus annui orbis jam secundo ad eundem modum quaeretur locus Terrae (vel Solis oppositus) cum distantia Solis et Terrae servanda. Tertio locus orbitae planetae comparabitur cum proximo planetae nodo (nodi motu simplici etiam ex tabulis collecto) et per distantiam a nodo et maxi-

nam limitis inclinationem quaeretur ex parte canonis rectanguli sphaerici, cujus latus a 0° ad 90° per singulos gradus, frons a $0^\circ 0'$ ad $10^\circ 0'$ per singula minuta procedit, excerpitur, inquam, ex hoc canone arcus eclipticae respondens arcui orbitae et inclinatio ejus loci, quem obtinet planeta.

Quarto, locus eclipticae inventus comparabitur cum loco opposito Solis vero. Differentia erit angulus anomaliae commutationis, qui quamvis re ipsa per utramque aequationem sit correctus, simplex tamen adhuc nobis dicetur, cum etiamnum aequandus sit, maxime circa oppositiones cum Sole. Hic angulus et inclinatio loci planetae in eccentrico quaeretur in illo canone et per haec duo excerpitur angulus.

Quinto, tabulis nullis juvari poterimus quin per utramque et planetae et Terrae a Sole distantiam et angulum anomaliae commutationis aequatum inter dicta latera comprehensum per 2 multiplicationes quaeramus angulum commutationis seu parallaxeos compositae seu confusae.

Sexto, haec parallaxis et prius servatus angulus in area canonis juxta se mutuo ostendent arcum elongationis planetae in ecliptica a Solis loco opposito et latitudinem.

Hic qua in re rem juvare possis exponam. Cum non sit cujuslibet, condere tabulas, tu vero excellas et abundes compendiis, canonis hujus partem planetis necessariam tibi condendam relinquo; nam ita quidem persuasus sum, quidquid D. Tycho sit editurus, fore ut haec Copernicana hypothesis propter intellectionis facilitatem juxta mansura sit, quam quidem in tabulas redigere dum vixero non desistam: tu vero jam pridem obtulisti tuam D. Tychoni operam in condendis tabulis. Ac sane si ex restitutione Lunari, quam apud Tychonem vidi, de planetis ceteris judicandum est, non nullius usus erit etiam apud Tychonem haec pars canonis. Nam quas habet Luna inaequalitates extra conjunctiones et oppositiones, omnes Tycho a vera conjunctione et oppositione regulares facit; ut jam non dicam de ingenti usu canonis rectanguli sphaerici in omni doctrina triangulorum sphaericorum, si frons ad 90° continuetur.⁶⁾ Prolixus admodum fui; cessabo igitur. Ubi haec grata tibi fuisse intellexero, plura monebo. Tu vero Magine celeberrime haec eo animo suscipe, quo ego scripsi. Sum artis astronomiae cupidissimus et temperare mihi non possum, quin artificibus consilia mea communicem, ut illorum admonitionibus subinde in hac divina arte proficiam. Peto majorem in modum, uti quam primum rescribas; nec est necesse ut ex abrupto ad singula respondeas, saltem indicationem facito, ubi has receperis. In Styria quidem non cogito ultra tres ad summum hebdomadas manere; itaque praestiterit, ut quae responsurus es Pragae Bohemorum mitteres ad Ill. D. Coraducium, Vicecancellarium Imperii, quem et has artes amare scio et me amare persuasus sum. Si tamen aliqua te incommoditas impedit (quamquam ecce, quid te impedit ad D. Tychonem scribere, cujus literis si quid ad me pertinens adjunxeris, id me semper uti spero apud D. Tychonem reperiet) Pragae scribere, mitte Graecium in Styriam ad Nuncium Apostolicum, is si Abbati Admontensi commendaverit epistolas, facile mihi reddentur.

Dum concludere volo, incidit, quod pene primo loco scribere volui. Theoria Lunae multum Tychoni difficultatis movet. Mihi videtur auspicanda a parallaxibus, quae contingunt ob sensibilem distantiam centri et superficiei globi Terreni. At parallaxium doctrina latitudinibus Lunae confusa est. Opus igitur esset praecognitione latitudinum. Utrumque ab utroque

pendet; cogitavi igitur, quomodo parallaxis sine cognitione latitudinis observando investigari posset. Modi duo inciderunt. Alter, si eodem die Luna semel alta semel humilior extra tamen terminum refractionum observaretur quando est circa limites, ubi intra duas horas parum mutatur latitudo. Expediit autem id etiam in principio Cancris fieri, ubi parum etiam mutatur declinatio. Verum quando Luna eodem die post meridianam altitudinem fit sensibilibus humilior, acquirit parallaxin in longitudinem, praecognoscendam cum ea inquiratur. Alter modus, ut distinctis temporibus observetur Luna, cum est in gradu nonagesimo, in limite eodem, in eadem remotione a Sole, semel altior semel humilior. At hae tres conditiones raro concurrunt; adde quod singulis scrupulis in hac altitudinis observatione committitur error unius semidiametri Terrae, quarum in eccentricitate viae Lunae paucae continentur. Itaque tertio huc confugio ut te orem, observes Lunam quoties potes in nonagesimo gradu et observationes una cum exactissima Bononiensis poli altitudine nobiscum in Germania communices. Curabo ego, ut nostras observationes tu vicissim habeas. Ita fiet, ut Luna interdum simul utroque in loco observetur sicque ejus in variis anomaliae locis altitudines innotescant. Nam Bohemia et Italiae bona pars in eodem meridiano sunt.

Vale, praestantissime vir meque tibi commendatum habe.

Graecii Styriae Cal. Jun. 1601.

Excell. Tuae

officiosissimus

Jo. Keplerus, Mathematicus.

Keplerum cum praeceptore suo M. Maestlino de „Martialibus“ suis studiis per literas egisse quis dubitabit perfectis literis, quas, dum Keplerus editionem Prodrumi meditabatur, mutuo dederant acceperantque. Keplerus consueverat Maestlinum de omnibus fere certiores facere, quae bona vel mala ipsi acciderant, quae nova in literis aut ipse invenerat aut ab aliis inventa acceperat, non respiciens Maestlini in rescribendo segnitiam. Sic retulit praeceptori ea, quae in Opticis profecerat (Vol. II, p. 12), quaeque de Stella Nova notanda ab aliis acceperat aut ipse observationibus, calculis et ratiocinatione deprehenderat (Vol. II, p. 582. 754), quamquam ab initio anni 1600. ad annum 1605. nihil responsi a Maestlino accepit; atque sic etiam, quum ad Tychonem Graetio Pragae transmigrasset, refert illi ea, quae ipse apud Tychonem agat, quaeque in studiis Tychoniciis relata digniora deprehenderit, nec non ea quae, Martis observationes aggressus, emendanda in unitatis astronomorum rationibus rata habeat.

Prior epistolarum Keplerianarum huc pertinens Martem ipsum quidem nondum attinet, sed satis luculentum praebet specimen studiorum Tychonis ejusque discipulorum, quam ob rem illam exhibendam censemus hic integram.

S. P. D.

Nihil hac vice fuit dicendum, Praeceptor amantissime, quam ut responderes proximis meis literis et R. D. D. Hafenrefferum et D. D. Zieglerum ad scribendum hortareris, mitterenturque literae Stuccardiam ad D. D. Engelhardum, vel potius Leobergam ad meam matrem. Consolatione enim egeo, qui quartana etiamnum laboro et insuper periculosa tussi, non sine suspitione hecticis, hoc est ipsius vitae cum periculo; jam et uxor aegrotat; jam nondum quarto penitus praeterito mense centum thaleros Pragae expendi; adde viaticum, parum certe mihi superest. Multa Tycho promittit, quae si essent ita in ipsius potestate, nemo esset me contentior. Itaque nisi haec mea festinatio et paschalis temporis destinatio mortis circa id tempus ingruentis omen est, migrandum erit omnino ad pascha. Ad vos me rapit amor patriae, quaecumque sit ejus futura fortuna. Rebus pereuntibus jam semel interfui, impavido sum animo.

Hoc inquam unum fuit dicendum. Sed quia jam sumta pagina est, impleatur. Tycho suarum observationum parcus est admodum. Mihi tamen earum copia quotidiana: modo descriptioni sufficerem. Electione igitur opus. Tu scribe, quae potissimum notanda et excerpenda tibi videantur. Hoc unum hanc Pragensem moram solatur.

Lunaris hypothesis, quam assumerunt, puto brevi lucem videbit. Ea exiguo aberrat. Fundamenta, hoc est observationes, non sunt pro instituta subtilitate in hoc sidere. Nam assumunt eclipses Lunares; si quis adstaret observatori, qui medium eclipseos diceret, probarem. Sed medium colligunt ex initio et fine, nec eo semper ita conspicuo. Coepisse cernitur, non incipere, et desiisse, non desinere. Ante et post semiquadrante horae de initio et fine dubitatur. In ceteris Lunae observationibus proposuere sibi orientalem vel occidentalem limbum, superiorem vel inferiorem limbum, et addunt vel subtrahunt visam semidiametrum. At eodem momento per diversos observatores ad instrumenta diversa collocatos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 scrupulorum diameter pronunciata fuit pro constitutione oculorum. Humentibus enim oculis major apparet. Itaque in observationibus Lunae 2 vel 3 scrupulorum frequens error est. Et tamen ita pertinax est Tycho, ut hypothesi suae aegre tantulum errorem condonare velit.

Mira vero haec habet illa hypothesis: primo in veris conjunctionibus et oppositionibus simplicissima utuntur aequatione (quam in Luna perinde ex 2 circellis conficiunt, ut Copernicus in 3 superioribus, hoc est ut Ptolemaeus per positionem puncti eccentrici et puncti aequantis: quae ratio in physicis fundatur). Circellos vero variationis alterius incipiunt a veris illis conjunctionibus et oppositionibus, quo fit, ut inaequalis fiat circellorum illorum motus. Id autem ut dolet Tycho, ita ego laetor. Adhuc enim vinco in eo, in quo aliquando ad me Gratium scribens modum me ponere jussisti harum speculationum, ne omnia fiant incerta (I, 213). Contendebam autem, ratione physica aequationes in quadraturis augeri.

Secundo, quocunque se vertant, commodius nil inveniunt, quam ut omittatur altera causa aequationis temporis, retineatur sola illa, quam Asc. rectae suppeditant. Statuunt itaque aestate $360^{\circ} 57'$, hieme $361^{\circ} 3'$ aequali tempore 24 horarum volvi. Id nihil aliud est dicere, quam aut primum mobile inaequaliter incedere, quod maximum monstrum est statuere, aut primum motum volitione Terrae fieri, quae celeriter volvatur hieme, tarde aestate. Hoc modo institutus calculus ad omnes observationes pulchre respondet, ut raro 4' aut 5' aberratio contingat.


Circellum unum inducunt propter 45° distantiae \searrow a δ , \nearrow ante et retro. Nam ibi deprehendunt anomaliam talem, ut etsi \searrow sit in apogaeo vel perigaeo, nihilominus aequae atque alias longius justo a \nearrow , δ distet. Lunam itaque nullius excentrici respectu deprehendunt celerem in \nearrow , δ , tardam in \searrow . Hoc iterum physicas meas rationes confirmat. Vigor nempe inest lineae diametrali.

Motus illi venit ex Sole, sed mediate per Terram, quam circumcurrit; sic fons virtutis motricis, qui in aliis planetis est punctum, in Luna est linea.

Alterum circellum describunt ita, ut transeat per centrum Terrae, dicantque centrum concentrici Lunae, qui 2 epicyclos (ad modum unius ex 3 superioribus) vehit, percurrere illum bis in mense, vero in antecedentia.

Intricatus et mirabilis efficitur motus, difficilis vero calculus. Diu multumque laboravi transformare illum per aequipollentiam. Tandem vidi

modum, qui nescio an ad unguem iussa facturus sit; certe in vicinia octo locorum in ζ , δ , \square , \square , \ddagger \ddagger \ddagger \ddagger facit. Is talis est: Luna, ut quilibet ex planetis, naturae consilio movetur in longum, latum, profundum. Nec sunt plures dimensiones. Motum in longum infert Sol planetis, ipsi de suo nihil addunt, nisi quatenus in diversis circuitibus a natura siti sunt. Motum in latum planeta ipse conficit, Sol huc nihil confert. Motum in profundum inter se partiuntur, planeta ascensu vel descensu, Sol accelerando vel tardando ultra ascensus vel descensus mensuram. Itaque centrum eccentrici ponitur a planeta, centrum aequantis a Sole. Suntque in quolibet planeta quatuor: medius longitudinis, inclinatio latitudinis, centrum eccentrici, centrum aequantis. Luna prae ceteris hoc habet, ut cum coelo suo moveatur, quaeque in aliis sunt simplicia, sint in hac duplicia. Duplicem n. habet fontem motricis virtutis, Solem per se, Terram per accidens, et ut dixi supra, ejus fons virtutis est linea. Respicit igitur non tantum Terram, quam circumbeat, sed etiam Solem. Omnia itaque sua quatuor habet duplicia. Primum, motus medius in linea diametrali velox est, tardior quo longius \bigcirc distat a diametrali linea. Hanc variationem per aequantem debemus salvare, quia a Sole seu a fonte virtutis simpliciter manat, Luna ipsa nihil confert. A Terra, BC concentricus \bigcirc , BAC linea diametralis. Cum ergo \bigcirc est in B, sit punctum aequantis in E, contra cum est \bigcirc in C, sit aequantis punctum in D. Quantitas AC ad DA ut 100000 ad 2400 fere. Nam in 45° aequatio maxima est $40'$ circiter. Sinus autem digressionis vel distantiae \bigcirc a linea BC multiplicatus in DA rejectis 5 figuris prodit lotum puncti aequantis.



Secundo: latitudo maxima in oppositionibus et conjunctionibus statuitur ex observationibus $4^\circ 58\frac{1}{2}'$; in quadraturis vero ex eodem observationum fundamento inveniunt maximam latitudinem $5^\circ 17\frac{1}{2}'$. Hoc totum ab inclinationis eccentrici variatione, hoc est ab ipsa Lunae divagatione, qua se ad nutum Solis componit, provenire, manente centro concentrici conjuncto cum centro Terrae, multis rationibus constat. Non potest enim fieri per appropinquationem latitudinis ad Terram, nec per revolutionem centri eccentrici circa Terram. Utroque enim modo proveniret inaequalitas aliqua in longitudine, quae non est commensurabilis ad observatorias inaequalitates. Itaque per omnes modos eunti mihi apparuit, cum nulla inaequalitatum ceterarum in unam hypothesin confundi posse, sed esse separatam penitus.

Tertio: eccentricitas Lunae augetur et minuitur per ipsam Lunam, quemadmodum omnis eccentricitas accidit per ascensum et descensum ipsius planetae. Sit F Terra, A centrum eccentrici, B principium anomaliae, ejus sc. apogaeum, C perigaeum. AF eccentricitas media, in ζ , δ . Dum autem Luna currit ab δ in \square , libratio centri eccentrici fit per AE, contra dum \bigcirc ita a \square in ζ vel δ , libratio fit per AD. Sit \bigcirc in δ cum Sole, erit centrum eccentrici in E, Luna egrediente in \square , erit in A, sed Luna veniente in C, erit centrum eccentrici in D. Dimensionem nondum possum addere. Non est tamen tanta, ut totum aequationis maximae in quadraturis excessum absorbeat, nec enim ultra $18'$ debet inferre. Hoc modo fit ovalis figura

viae Lunae, cum linea apogaei competit in lineam diametralem. At cum hae lineae crucem faciunt, circularis penitus est via Lunae.

Quarto: aequans gemino modo variatur. Cum enim aequans sit nil aliud, quam geometrica mensura physicae inaequalitatis in motu, quae inde est, quod sidus prope fontem virtutis motricis veniens celeriter incitatur, tarde cum discedit: convenit itaque, ut Luna simul et centro eccentrici in linea diametrali existente, huiusmodi acceleratio et tardatio vel nulla sit vel exigua; itaque punctum aequantis vel coincidat cum centro eccentrici vel illi sit proximum. Nam linea diametralis est fons virtutis omni sui parte. Cum vero digreditur \bowtie a \nearrow , centro eccentrici manente in linea, multum decedat necesse est celeritati, cum celerrima fuerit \bowtie in linea diametrali. Itaque alte ascendet aequans, facietque maximam aequationem. Jam si crucem faciant linea apogaei et diametralis, sitque \bowtie in \square , necesse est tardissimam esse, et altissimum aequantis punctum, tanto vero velociorem in altera \square , cum est in perigaeo. Et tamen prima inaequalitas intercurrentis efficit, ut \bowtie apogaea in \nearrow , \searrow adhuc velocior sit, quam perigaea in \square . Manente vero modo dicta cruce, cum \bowtie in \searrow , \nearrow incidit, quia a fonte virtutis vehementius incitatur, necesse est contemperationem fieri et punctum aequantis ad mediocritatem descendere. Sit F Terra, E centrum eccentrici, A aequans pro maxima aequatione \searrow , \nearrow , D pro maxima aequatione \square . Ergo centro eccentrici versante in \searrow , \nearrow , fit libratio in DE; illo in \square versante, libratio fit in AG. Media ergo aequantis distantia augetur, ut sit in \searrow , \nearrow FA, in \square FD. Prima ergo variatio est pro motu centri eccentrici a \nearrow vel \searrow in \square , cui respondet libratio centri circelli libratoril ex A in D, ut quantum interest inter lineas, tantum ab H in D numeretur ejusque sinus faciat additionem ad FA. Secunda libratio sic instituitur, ut quando \bowtie est in \searrow , \searrow , sit hoc punctum proximum puncto eccentrici, quantum potest per amplitudinem circelli; at cum est \bowtie in \square , sit hoc punctum remotissimum. Hoc modo conficitur illa varietas, quam jam modo physicis rationibus dixi consentaneam. Sed haec omnia indigent ulteriori lima. Maxima quadraturarum aequatio est illis $7^{\circ} 28'$.

Morbus me obscurum fecit, antea plus satis hoc obscuritatis dono praeditum. Mihi ipsi non satisfacio. Sed existimo te videre, plus difficultatis esse in una Luna (ut quidem apud Tychonem hoc sidus se noscendum praebeuit) quam in omnibus planetis. Ego per hunc meum morbum nihil aliud, quam quod contra Ursum scribo (jam fato suo functum superiori aestate), ubi nil tango, nisi quae attinent scientiam: potissima cura est de antiquitate et de veterum sententiis explicandis. Itaque vix est mathematicus tractatus futurus, sed tantum philologicus. Si qua tibi videbuntur, ea subministrato, lubenter enim admonebor, praesertim in problematibus ejus ad disceptandum propositis (v. Vol. I, p. 215 ss.). Aegre et ego fero, te usque adeo tacere, nec cum Tychone per literas conferre. Consultissimum sane faceres, si quantum posses studeres, observationes ei suas extorquere. Nam mira hominem fortuna exagitat. Semper perditio similis, utcumque tamen eluctatur, absurdo eventu, si media ad perniciem potius comparata respicias. Mitteres nonnulla ex tuis observationibus, credo, ut est in magnarum varietate humanissimus tamen, mitteret ad te si qua et tu postulares. Nam etsi omnia mihi patent: obliganda tamen prius fides fuit ad relationem: quam ego quidem pollicitus sum praestitutum, quantum philosophum decet. Sin metuis ut tuas literas publicet, per me age.

Vale, et oro te rescribe, ut recreationem habeam ex lectione.

8. Feb. 1601. Pragae.

H. T. Gratiss. Discipulus

M. J. Keplerus.

Propius Martis theoriam attingunt hae Kepleri literae :

S. P. D.

Clarissime vir, Praeceptor honorande. Quod tanto tempore taces, id me omnino credere jubet, te causam tacendi confinxisse, quam ultimis tuis literis mihi exprobrasti (v. Vol. II, p. 13). Ego rebus meis in alium statum transeuntibus non desistam, quoad vocem tibi expressero. Nam mihi certe non alio tempore magis tua opera et institutione opus fuit. Tychonem inaudisti mortuum. Caesar curam instrumentorum et imperfectorum Tychonis studiorum mihi imponere decrevit, salarium mihi denunciavit, petere jussit aliquam summam. Usus ego consiliis aliorum, quod meam quidem personam attinet, summam arbitrio Caesaris commisi, quod vero perfectionem operum Tychonis, quorum potissimo vivus Tabularum Rodolphaearum nomen fecit, dimidiam Tychonis summam sc. 1500 florenos annuos petii, pollicitus, si Caesar totos 3000 Tychonicos det, me bene collocaturum adscitis collegis et calculatoribus et exquisitis doctorum consiliis. Responsum quodnam futurum sit, tempus patefaciet. Ego plenus spe sum. Nam si mihi de potiori Deus prospexit, de materia sc. exercendi ingenii, utique et de sumtibus prospiciet. Adeoque si Deo curae est astronomia, quod credere pium est, jam ego spero, me in ea aliquid praestiturum, cum videam, quam fataliter me Tychoni Deus adjunxerit nec gravissimis incommodis ab eo divelli passus sit. Tycho quae praestitit, ante annum 97. praestitit, ab eo tempore res ejus in pejus ruere, ipse curis immanibus distineri, puerascere. Patria inconsiderate deserta ipsum affixit: aula haec plane perdidit. Non erat enim is, qui cum quoquam vivere sine gravissimis offensionibus posset, nedum cum tantae amplitudinis viris, sui sibi consciis, regum et principum arbitris. Tychonicum opus omnium praestantissimum sunt observationes, totidem justi libri, quot annis huic labori praefuit. Dein Progymnasmata (in eo stellae fixae, motus Solis et Lunae ad nostra tempora) meram spirant ambrosiam. Spero proditum instantibus nundinis. Nam id strenue operam do, indicem facio. Quae Lunam attinent, opera potissimum cujusdam Christiani Severini Longimontani Dani his ultimis annis confecta sunt, clavum tenente Tychone. Haec non repraesentant eam divinitatem, quae est in Solis theoria. De Cometis librum alium scripturus erat, de planetis omnibus doctissime et diligentissime commentatus est: sed fere more Ptolemaico mutatis mutandis, ut et Copernicus fecit. Videas, quomodo Deus dispenset sua dona, nec omnia possimus omnes. Tycho, quod Hipparchus, fecit, a fundamentis aedificii est, laborem exantlavit maximum. Non omnia possumus omnes. Desiderat Hipparchus ille Ptolemaeum, qui reliquos 5 planetas superexstruat. Dum vixit haec praestiti. Theoriam Martis extruxi, ut sensus subtilitatem facile adaequaturus sit calculus. Causa, cur incertioris motus creditus sit, non est illi peculiaris, sed communis omnibus planetis, in ipso vero evidentissima. Primum linea apsidum orbem ejus hactenus non secuit medium, trajiciebatur enim per centrum aequantis et centrum putativi orbis magni. At vera trajicitur per centrum aequantis et Solem ipsum. Ita centrum eccentrici (quem jam imagineris more Ptolemaico) inter punctum aequantis et Solem est, cum putaretur

inter aequantis punctum et centrum orbis annui, in linea alia. Deinde anomaliam commutationis efficit non circulus circa putativum centrum orbis magni, sed humilior. Nam id centrum aequantis Terreni punctum est, centrum vero Soli propinquius. Tertio de libratione planorum et variabili inclinatione comperi nihil esse. Ita simplicissima fit theoria Martis, constans unico circulo in periodos singulas. Theoria Solis vel Terrae ipsi plane fit similis, constat enim et ipsa aequante. In utroque demonstratio et numerorum necessitas cogit, ut dimidietur eccentricitas composita, quod Ptolemaeus fecit, etsi quis ita procedat, ac si incerta esset proportio partium; nam Tycho in Marte longe aliam circellorum proportionem statuerat. Haec autem dimidiatio aequationibus Solis a Tychone usurpatis nusquam ultra unius scrupuli differentiam infert, in aequationibus vero maximis circa aequinoctia plane nihil. Ita manet tota restitutio Solis Tychonica, tantummodo ascensus et descensus Solis minuuntur, et per consequens diametri Solis apparentis et umbrae diametri variatio fit minor, quod in eclipses redundat, exiguo, ut puto, vel damno vel lucro. His consideratis in duobus planetis supervenit speculatio invenitque causam aequantis esse mere physicam, patentem tamen dimensionibus geometricis. Nam ut distantia quaelibet ad aliam, ita mora planetae in puncto illius distantiae ad moram puncti alterius distantiae.


Cumque in duobus planetis res ultro successerit, sine ulla gratia vel respectu (ut ex foro petam loquendi formas) ex meris observationibus, mediantibus demonstrationibus: jam spe devoravi planetas ceteros venturos ad easdem leges: ipsum adeo Mercurium. Nam quod Venerem attinet, ille circellus, quo centrum eccentrici variatur, manifestissime cadit per positionem aequantis in Sole. Nam et dimensio congruit, dum Ptolemaeus ejus circelli semidiametron facit 208: at Solis eccentricitatem idem ponit 416, duplum illius. Mercurii vero leges illius circelli contrariae videbantur, propterea quia ejus apogaeum Solis perigaeo appropinquat magis, Veneris vero apogaeum Solis apogaeo.

Sed ut hi inferiores ad normam superiorum quadrent, opus est mutatione nomenclaturae, cum ipsi numeri et forma motuum mutetur. Etenim qui dicebatur apud Ptolemaeum eccentricus illorum, is est et manet ut in Copernico orbis annuus communis omnibus: qui vero Ptolemaeo epicyclus, jam dicetur eccentricus. Nam re vera illi orbes, qui hos duos circa Solem vehunt, ex Sole eccentrici sunt et causa eadem physica participant, ut quanto magis sunt eccentrici, tanto fiant tardiores in aphelio suo. Quae res cum in Venere exigua sit, parum ejus commutationes turbat; in Mercurio vero haec epicycli seu jam eccentrici velocitas et tarditas tantum potest, ut dum aequalis in eo motus ponitur, triangulo suas apsidas disponere putetur. Haec nondum omnia observationibus probata sunt, sed exemplis eorum, quae jam sunt constituta, spes optimae quaerendorum suggeruntur. Jam enim hoc in utroque patuit ex observationibus, inclinationes retinere easdem iisdem eccentrici (epicycli antiqui) sui partibus, ubicunque Terra sit. Adeoque jam de fraeno et ephippio cogito, cum nondum de equo sim certus. Formam inquam calculi meditor. Anomalia simplici non egeo, cum illa nihil sit nisi tempus: primum ergo cum tempore proxime minori quam est propositum ex senis tabulis sena loca apogaeorum seu apheliorum excerpentur. Inde in aliis senis tabulis (de Luna enim alia res est) cum tempore proxime minori quam est meum residuum

excerpam anomaliam coaequatam in gradibus integris, adjiciendam loco apogaei, cum distantia sideris a Sole paulo brevior quam est vera, demissa scilicet perpendiculari ex sidere, cum habet latitudinem, in planum eclipticae: quae quidem perpendicularis itidem excerpta erit cum distantia a nodo ex suis tabulis. Hoc pacto locum sideris proprium minimo negotio per 3 dimensiones habebimus, cui supervenientes parallaxes orbis annui nonnullis tabulis universaliter excerpti posse spero; sed ita erunt extricandae: comparabitur locus Solis seu Terrae cum loco sideris *ἀναπαλλαντῶ* pro habendo commutationis angulo, circa quem duo latera sunt distantiae Terrae et sideris a Sole. Per solutionem igitur trianguli hujus (per prosthaphaeresin, si placet, cum eam Jöstelius facillimam reddiderit (comp. Vol. II, p. 439) et inventionem anguli ad Terram habetur parallaxis longitudinis, per inventionem vero distantiae sideris a Terra, quod est latus tertium, ejusque cum sinu inclinationis supra excerpto comparisonem latitudo parallactica habebitur. Cumque distantia Solis et Terrae non detur semper in partibus iisdem (omnia n. ad verum Solis locum necessario redigenda sunt, observationibus testibus), duae erunt ergo multiplicationes pro angulo, una pro latere, una pro comparatione ejus cum sinu inclinationis. Ita quatuor erunt multiplicationes pro cujuslibet planetae loco. Non potest itaque carere tabula sinuum calculus iste. Est alius modus ex triangulis sphaericis, trajecto plano tertio, ut eclipticam secet in Terra, orbitam planetae in ipso. Haec tabulam primi mobilis Regiomontani (ad laborem minuendum) usque ad 10° per singula minuta extensam desiderat, qua reductio ad eclipticam et latitudo expeditur, sed nihilominus angulus ex lateribus rectilineis et comprehenso quaerendus est; itaque dubito, compendiosiorne sit futurus. Utinam quidem tertius aliquis daretur, qui et universalis esset possetque adhiberi ad omnem apheliorum Terrae et sideris distantiam. Nam ego sane non video, quomodo instituendum negotium, ut scrupula proportionalia retineamus. Primo enim, si sidus est in linea apsidum Terrae, anomalia quidem commutationis in utroque semicirculo aequalis est, ut si sidus sit alibi (ut ☿ apogaeus in ♈, cum ☉ sit in ♈), jam alter semicirculus commutationis in latus vergit. Et ne labore huic rei subvenire possimus, efficit aphelium Terrae alio motu promotum, quam aphelia planetarum, ut vel appropinquet vel recedat et qualemunque formam scrupulorum proportionalium turbet. Potest tamen ad unum seculum ratio iniri, posita eadem apogaeorum distantia: quod alijs considerandum et efficiendum relinquo. Mihi videtur vel ingeniosis vel servilibus et praeceptis alligatis ingeniis idem labor, sive quatuor multiplicationes simplices jubeantur facere, sive toties imo pluries logisticae multiplicare scrupula in excessum (ut de prosthaphaeresium compendio, in quo nondum exercitatus sum, nihil dicam), ut ita non magnopere desiderare debeamus scrupula proportionalia. Et me Christe, si bene perpendas, compendio negliguntur. Perpendamus. Primo per 4, 5 vel 6 series est colligenda anomalia commutationis: hujus loco jam loca Terrae et sideris pro re nata subtrahuntur a se mutuo. Deinde commutatio aequanda; hoc jam praestitum. Tertio cum anomalia eccentrici excerpta scrupula et logisticae operandum pro parte proportionali; quarto cum commutatione excerpta commutatio, et quinto excessus cum gemina operatione logistica pro parte proportionali, sexto per operationem logisticam pars de excessu scrupulis congruens inquirenda, tum addendum aut subtrahendum, ut jam nihil dicam de pluribus operationibus et cautelis ad latitudines constituendas. Pro his

omnibus in triangulo ABC, ubi A Sol, B Terra, C sidus, BAC angulus per subtractionem inventus, AB, AC distantiae per tempora ex tabulis suis excerptae; primum ego dicerem, si AC fit 100000, quid AB? Postea anguli BAC sinum DC et sinum complementi DA exciperem aequae eo BA immutatam subtraherem. Postea dicerem: si BD fit 100000 quid DC? et quaererem in tangentibus pro angulo prosthaphaereseos DBC, quae sunt duae operationes. Pro latitudine secantem hujus DBC anguli exciperem, et si 100000 fit DB, secans hic fieret BC pro tertia operatione. Jamque cum BC habeatur in partibus, qualium CA 100000, et sinus inclinationis C ex tabula itidem in iis partibus excerpatur, qualium omnis C ab A distantia est 100000, quarto loco dicerem, si BC fit 100000, quid sinus C? is in tangentibus latitudinem exhiberet. At si secantes fugimus, operemur sane per summam et differentiam BA, AC et tangentem dimidii residui anguli, ut quodque levissimum factu erit.

Fig. 10.



Haec de astronomiae statu te Praeceptor honorande certiores reddere volui, uti facile vides ideo, ut sententia tua mihi praeluceres, quod non frustra facies, uti de Caesare spero. De Luna jam olim scripsi et de aequinoctiorum praecessione quaeque illis cohaerent. Si tamen post curam Tychonis ultimam etiam Luna curanda, velim in principiis ipsis esse instructor. In Tychonis observationibus raros invenio corporales congressus. Illis autem si non plus, aequae certe multum tribuo ac observationibus per distantias in uno scrupulo habitis: quae crebrae sunt in Tychone, ubi Lunam semper in nonagesimo aut meridiano habere potuit, tempusque una patet. Sed etsi non ita propter parallaxes at propter Lunae diametrum visibilem utiles sunt congressus corporales, praecipue cum ☾ parte obscura stellam tegit aut cum mane tota cernitur. Nam diffundi lumen ejus pro oculorum habitudine certissimum est. Tycho si vera diceret de ☾ diametro in ☿ nulla unquam fuisset eclipsis Solis totalis. At hoc tam celebratum in historiis, ut potius ego de circulo lucente dubitem, an non fuerit aër aliquis Lunaris seu fimbria ipsius Lunae lucida. Obsecro, si plura habes hujus modi circulorum residuorum exempla quam unicum Clavii, ut id scribas. Consentit omnis antiquitas, majorem ☾ diametrum Solari. Tycho anno 1600. diametrum ☾ minorem Solari prodidit, ego majorem, tu quoque. Quidni fiat in oculo, quod in foramine demonstravi, ut lucida amplientur, tenebrosa constringantur? Nam et in oculo foramen est. De Sole nihil dubito, dimensus enim sum circino. Sed theoria Martis testatur, non altius Solem scandere, quam ejus diameter fiat 29' 30'' et 30' 30'', si medium assumas 30' 0''. Tu si variationem uno scrupulo majorem invenisti, scribe. Atque etiam congressus corporales, et quantam observaveris diametrum ☾ cum mane tota cernitur: idque quo tempore aut anomalia; adde verissimam altitudinem poli Tubingensis ex circumpolaribus, cum solstitia fallant, ut Tycho demonstravit. In Lunae hypothesi perquam dubius sum, cum enim in Terra et Marte constet, dimidiaae aequationis maximae sinum esse planetae eccentricitatem, credo idem et de Luna. Sed causam physicam nescio quomodo applicem. Tres sunt modi: duo, ubi Lunae manet semper perfectissimus in qualibet revolutione circulus (nisi quatenus ob progressum apogaei [hoc nomine jam anomaliam et epicyclum ☾ accipe] unus ex alio nectitur), quod plausibile est; alter, ubi motus ejus vere ovalis fit. Prior

duplex. Cum n. \bigcirc in δ , γ habeat aequationem maximam $4^{\circ} 58\frac{1}{2}'$, dimidii sinus 4336 esset eccentricitas. Et jam in δ , γ , ut distantiae sic tempora in gradibus aequalibus eccentrici confecta, at in \square ut distantiae ad invicem, dupla esset proportio temporum. Nam eccentricitatis aequatio esset semper $2^{\circ} 30'$, aequantis in δ , γ etiam $2^{\circ} 30'$. At in \square alia $2^{\circ} 30'$, sc. 5° , et tota $7^{\circ} 30'$. Consentunt parallaxes, quas Christianus in \square non potuit aliter invenire, quam 54—59 semid. Terrae exhibentes, quamvis eas coegerit ad hypothesin suam accommodans feceritque 52—61 in \square . Sed scis, in tot implexu causarum quam facile scrupulum unum ex una causa transferamus in aliam, cum singula singulas semidiametros faciant. Cogitavi ergo de aequatione quadraturarum, an illa sit dimidianda, et sint, \bigcirc in \square versante, ut distantiae sic tempora, at in oppositione ut distantiae; proportionis hujus $\frac{2}{3}$, inesse motibus. Iterum maneret circulus sed in majori eccentricitate. Tertio quid si utraque aequatio dimidianda et eccentricitas vere crescat in \square ? Nam de octantibus res est certissima, crescere hanc retardationem, ut crescunt sinus digressionis Lunae a diametro Solis per Terram eunte. Quodsi metiaris, invenies hic quoque fere superiorem mensuram, divisa tota periodo Lunae seu tempore ejus in 360. Si Luna semper curreret in virtute diametri, tempora 350 conficeret. Itaque hinc $45'$ excrescunt in octantes. (In quadrantes $2^{\circ} 30'$, sed nihil variant hic locum.) Estque causa mere physica. Considera quaeso quidnam ex superioribus et an aliud quippiam sit magis consentaneum.

De obliquitate eclipticae res est mira. Tycho hodie invenit $23^{\circ} 31' 30''$. Idem invenit ante annos 100 ex Regiomontano, Waltero, Wernero, bene applicatis observationibus. Idem ante annos 200 quidam Doctor Syndel hic Praegae, observavit alt. mer. Solis in aequinoctio et solstitio aestivo; ex quibus prodit (subducto calculo loci Solis ex Tychone) A. P. $50^{\circ} 4' 20''$; eclipticae obliquitas $23^{\circ} 31' 32''$, utrumque hodieum ita invenitur. Idem Prophacius Judaeus invenit ante annos 300. Paulo plus prodidit Albategnius ante annos 700. Et credemus, Ptolemaeum observasse $23^{\circ} 51' 20''$? Tycho dubitavit. Scribe quid sentias. Denique quas et quot eclipses vel inveneris in veteribus vel computaveris, ne actam semper agatur. Catalogum modo desidero, scio laboriosum esse describere calculum. Ego si vicissim H. T. in quacunque re gratificari potero, libenter faciam. Et spero fore hic nonnulla, quae desideres inspicere et cognoscere. Obsecro autem per nostras artes, ne ita plane obmutescas. Ego si scripsi, me publicaturum tuas epistolas (quod meminisse nondum possum) certe poenitet, fidem do, id non futurum.

Vale diu, Praeceptor Clarissime et quod me etiamnum ames, literis ascriptis testare. Saluto omnes praeceptores meos et mitto exemplaria orationis funebris, ubi meum carmen est. Errata sunt aliqua, ut multos miles pro multus. Et in nomine meo ex incuria M. est omissum, ne id putetis studio et contemptum factum. ⁹⁾

10/20. Dec. anno 1601. Praegae.

Excell. Tuas

Gratiss. Discipulus

M. Jo. Kepler.

Proxima, quae has subsecutae sunt, Kepleri literae datae sunt d. 20. Jan. 1604. (comp. Vol. II, p. 14) et cum Maestlinus non responderet, his iterum adiit Keplerum rogantem ad respondendum praeceptorem:

S. P. D.

Cum perpetuo tuo, Maestline praeceptor optime, silentio meam scribendi diligentiam toties jam expugnaveris: accidit mihi tamen, quod in bello desperantibus, ut tanto magis scripturiam, quanto minus proficio; et in victoriae parte ponam, salutem omnem desperare. Tu si lectis meis Opticis, quorum exemplar (una cum aliis quatuor per bibliopolam Cellium apud Te depositis, quae rogo ut Besoldo doctori petenti tradas) Tibi Francofurto dono misi, si lecta conceptione mea de nova stella, quam jam accipis, non permoveris ad scribendum: at saltem ob S. C^m Mt^m, cui grata sunt huiusmodi scripta, quaeque Ipsi varia acquisivi, aliquid scribas. Provocat ad te Roeslinus, cuius scriptum jam accepit S. C. Mt^m: communis haec mathematicorum est materia, quam non attingere desertionis crimen repraesentat.

In Commentariis de Motibus Martis si meos labores cerneres, opinor id diceres quod res est quodque etiam de Opticis dicere te non dubito, me scilicet non raro nodum in scirpo quaerere. Cur ergo non mecum communicas per literas? Saepe mihi non cogitanti inepta multa obveniunt, quae per literas ventilata facile agnoscerem. Omnis meus labor in hoc est, ut jam porro ex genuinis causis tam aequationes eccentrici justas quam distantias exstruam. Profeci autem per Dei gratiam eousque, ut non plus aberrem in uno quam in altero certusque sim, utrumque ab eadem hypothesi proficisci, ac proinde non posse esse vana, quae de virtutibus motricibus disputo. Cumque toties jam triumphaverim de Marte, hoc tamen etiamnum in causa manet: si eccentrici ratio distribuitur inter concentricum et epicyclum, scis, centrum epicycli inaequalis motus fieri in concentrico, id est concentricum super alieno centro aequaliter ire: quia etiam eccentricus movetur super alieno centro. Quodsi ergo motus et concentrici et epicycli simul intenduntur, simul remittuntur (id est si linea ex centro aequalitatis concentrici per centrum epicyclieducta monstrat apogaeum verum epicycli), tunc in effectum manet orbita planetae, quam corpore transit, perfectus circulus eccentricus. At observationes testantur, in longitudinibus mediis utrinque planetam ad latera ingredi circiter 900 partibus de 152500. Et ipsae rationes physicae suadent, epicycli motum super proprio centro plane aequabilem dicere, id est, lineam veri apogaei epicycli agere per centra concentrici et epicycli. At si hoc facias, planeta deflectet ab orbita circulari per 1300, debuit secundum observata tantum per 900. Quin etiam uti in longitudinibus mediis et versus perigaeum nimius est hic ingressus ad latera, ita versus apogaeum non satis magnus esse videtur. Unde videtur sequi, ipsum epicyclum non omnino aequabilem esse: neque tamen in motus inaequalitate cum concentrico convenire, sed exiguo velociorem fieri, planeta tam circa apogaeum epicyclum versante, quam circa perigaeum epicyclum (id est, lineam veri apogaei epicycli paulo sub centro concentrici esse in apogaeo, supra illud in perigaeo): idem Tycho Lunae tribuit, ut sit velox ceteris paribus, tam in ♄ quam in ♀.

Tabularum rationem jam inivi. Habeo Martis tabulas, ex quibus uno die ephemerida conficit diligens aliquis, eamque ad dies denos unius anni. Nec fiunt inutiles novis correctionibus, praeter unam distantiarum: ceterae sunt generales. Parallactica, quae in Opticis est, una salvat omnes latitudines, sine ulla computatione, per nudissimam excerptionem. Puto me aliquid consecutum; et cum interdum de valetudine angar, consilium cepi,

opus, quod edere vetor, apud academiam deponere. (Comp. Vol. II, p. 34.) Refertur est creberrimis et lectissimis Tychonis observationibus. Si levissima spes esset de Tegnaglio, quod aliquid sit profecturus, nil opus esse putarem meo consilio Tychonicis observatis. At crede mihi, non abs re metuo, ne quo pacto desertae pereant. Quaeso quid tibi animi, si Tychonis loco esses et ista cerneres, apud etiam succenseres mihi, hoc ausuro quod agito? De eclipsibus scripsi ante menses multos, ut et de stella Cygni. Sed nolo te agere, tange unum horum quatuor verbis, quibus totidem annorum culpam silentii elues. Vale meque ama. Praegae 14. Dec. 1604.

Excell. Tuae

Gratiss. Discipulus

J. Khepler. (sic!)


Quae Maestlinus ad tres praemissas literas responderit (d. 28. Jan. 1605) maxima ex parte exhibuimus Vol. II. p. 15, 582, 754. reservata conclusione illarum literarum hunc in locum. Gratulor, inquit, vehementer et gaudeo, Martis motum hucusque a te constrictum teque ipsum prope debellasse. Verum quae scribis, fateor me non omnino assequi posse, capite enim carere videntur. Unde colligo, te antea quoque de eodem ad me scripsisse, et numerorum illorum, quorum hic meministi, originem adeoque fundamenta mihi indicasse. Verum quoniam illud scriptum mihi non redditum est, ideo haec quae eis annectuntur aegre percipio. In ceteris tuum consilium probo. Sed hisce vale optime. Deus te cum tuis clementer conservet, ut quod agis feliciter peragere possis.

Actum Tubingae &c.

Quibus respondit Keplerus exultans gaudio quod silentium Maestlini quinquennale provocationibus suis assiduus tandem ruperit, brevi post acceptas Maestlini literas (5. Martii). Exordium hujus responsionis proposuimus Vol. II. l. c. Quibus praemissis pergit Keplerus:

De Martis motu scribam clarius. Invenio in theoria Terrae esse aequantem et ejus eccentricitatem 3600: eccentrici vero 1800 plane bisectione repugnante, ut in Marte et apud Ptolemaeum in omnibus tribus superioribus. In ♀ et ♂ hoc ipsum arguitur per circellum centri epicycli librantem vel circumagentem, et causa pulchra apparet, cur in contrarias Venerius eat Mercuriali: in Venere est dimensio exactissima. Nam eccentricitas ☉ 417, circelli ♀ semid. 208. Hypothesis Martis verissima haec est: eccentricitas 9300 circiter, aequantis vero 18600, aphelium in 29° ♀, nodus in 16½° ♀. Deprehendo certissime, ordinari eccentricum circa verum corpus ☉, non circa punctum medii loci Solis Copernicanum. Id ex observationibus plurimis probo Cap. 51. Proportio orbium 152500 circiter, ubi prius habebam 152650, cum a paucioribus observationibus starem. Distantiae a Sole non ut in circulo perfecto, sed ut in ovali, cujus haec tandem post infinitos labores descriptio in-

Fig. 11.




venta est, ut commutato eccentrico in concentr-epicyclum sit A Sol, AB radius, BD 9300, AE pariter, et E centrum aequalitatis puncti B circa A, et D circa B, idque fere (accommodo enim me hic ad antiquas hypotheses cum detrimento certitudinis), ut, inquam, his sic instructis sumamus pro distantia CA distantiam BA. Quanto igitur brevior est BA quam CA, tanto spatio orbita planetae deficit circa longitudines medias a circulari. Itaque hoc tandem falsum inventum est, planetam in epicyclo circumagi, quod tam diu pertinacissime tuebar, sed semper repugnantibus observatis. Non igitur circumagitur in epicyclo, sed libratur in ejus diametro: quod nisi statuatur, 15' et amplius discrepabunt parallaxes orbis annui ab observatis. Sed neque E est praecise punctum aequalitatis, pec-

catur enim in longitudine eccentrici 45° et 135° , in aequatione eccentrici circiter $8'$ ultro, citroque. Unde intelligitur, naturalem hypothesin non esse. Eliciuntur autem aequationes eccentrici veriores per aliam aliquam hypothesin, cujus eccentricitas aequantis 18564, eccentrici 11332. Sed nec haec vera est, quia distantias efficit vitiosas. Potes tamen ex hac aequatione eccentrici, ex illa distantias computare. Longitudini mediae in his addo $4'$ plus quam Tycho; igitur in meridie sequente completi anni 1592. est $7^\circ 5' 55' 16''$ a vero aequinoctio.

Hoc jam opus, hic labor fuit, reducere duas falsas hypothesas in unam veram, ubi verti me in mille formas, quarum aliquas forte in superioribus perscripsi. Nec aliter fieri potuit, nisi naturalibus causis investigatis, quae sunt huiusmodi: Solis corpus est circulariter magneticum et convertitur in suo spatio, transferens orbem virtutis suae, quae non est attractoria sed promotoria. Planetarum corpora contra se ipsis apta sunt ad quiescendum, in quocunque mundi loco collocantur. Itaque ut a Sole moveantur, contentione opus est, inde fit ut remoti a Sole lentius incitentur, propinqui velocius, quod est, eccentricum super centro aequalitatis moveri aequaliter. Jam quilibet globus planetarum rursum statuendus est magneticus vel quasi (similitudinem enim volo, non pertinaciter rem ipsam) et quidem linea virtutis est recta, duos habens polos, alterum fugientem a Sole, alterum sequentem. Hic axis vi animali tenditur in partes mundi easdem fere. Raptus igitur planeta a Sole jam fugiente polo obvertitur Soli, jam sequente: ita fit accessus et recessus ille libratorius; nec alium huius rei modum confingere potui. Nam et fugiens et appropinquans facit hoc ad modulum anguli, quem linea ex Sole per centrum corporis efficit cum axe, idque ceteris paribus. Atque hoc est, quod prius in geometrica hypothesi dixi, testari observationes, planetam librari, hoc est circa apsidas epicycli tardum, in mediis locis velocem in hac sua libratione fieri; cum tamen in raptu circa Solem semel tantum fiat tardissimus in aphelio, semel velocissimus in perihelio. Interim vero librationis semidiameter superior longiori tempore perficitur, quam aequalis semidiameter inferior; quia virtus magnetica ipsius etiam planetae remissius agit, cum longe distat a Sole; plane ut solent magnetes. Atque hoc est id, quod prius in geometrica hypothesi dixi, epicyclum (in cuius diametro fingitur fieri libratio) moveri circa centrum suum inaequaliter, eadem scilicet inaequalitate, qua ipsum centrum circa Solem, observationibus id testantibus.

At non erat satis, imaginatione constituere veram hypothesin, quin etiam ad calculos vocari debuit. O immanem et perplexissimum laborem! Vici tamen per Dei gratiam, et puto, te mihi concessurum sufficere, ut ex tribus anomalis DCE, DBE, DAE quacunque, modo aliqua data, reliquae investigari possint. Nam semel constructa tabula aequationum eccentrici, postea rursum prorsumque est utilis. Sit ergo data DBE anomalia eccentrici 90° . Et fiat ut sinus totus ad sinum anguli sic eccentricitas tota ad quartum, qui erit in hoc casu aequalis eccentricitati toti sc. 9300. Itaque de distantia \odot a \odot maxima 109300 aufero hanc portionem inventam 9300, restat 100000. Pro eo igitur,

Fig. 12.



tabulis aequationum eccentrici et distantiarum a Sole, accommodatis ad proximis centenarios ultro citroque et aptis Saturno et Jovi, ut in h. Prutenicae faciunt aequationem eccentrici maximam $6^{\circ} 30' 30''$, cujus dimidii $3^{\circ} 15' 15''$ sinus 5678 est eccentricitas. Sed quia hic ejus eccentricitas computatur non a centro Solis, sed a puncto, quod h. apogaeo est propius per 3600 in dimensione radii orbis Terrae 100000, hoc est per 360 in dimensione radii orbis h. 100000 (quia is fere decuplus ad radium orbis Terrae), ideo aufero 360 ab eccentricitate Prutenica, et 5318 remanet. Cupio igitur tabulam aequationum mea methodo constructam ad has eccentricitates: 5200, 5300, 5400.

Sic in 4 Prutenicae faciunt aequationem eccentrici maximam $5^{\circ} 14' 0''$, cujus dimidium $2^{\circ} 37' 0''$, ejusque sinus 4565: parum hic mutabitur sive ex Sole sive ex alio lineae apsidum puncto computetur, quia aphelium 4 est in initio ω . Cupio ergo tabulam aequationum eccentrici ad singulos gradus anomaliae mediae et ad eccentricitates hasce: 4400, 4500, 4600, vel potius 4300, 4500, 4700, ut postea verissimam proportionaliter investigare possim per omnes gradus anomaliae. Ego nunquam adhuc probavi, utrum excessus hujusmodi aequationum majoris super minorem constanter sese habituri sint ad invicem in proportionem sinuum, alias negotium esset facile. Imo vero non est hoc sperandum, nam per eccentricitatem 1800 perinde est qualicunque utare methodo, quarum ad viginti tentavi. Aequationes enim non variantur ad $30''$. At in eccentricitate 9300 aequationes variarum formarum multis scrupulis differunt. Non igitur ut Solaris aequatio 90° ad Martiam 90° , sic Solaris 45° ad Martiam ejusdem gradus. (Verum quidem de parte aequationis physica. Nam ut sinus omnium graduum sunt ad invicem, ita et planities triangulorum DAB (Fig. 12) sive magnae sive parvae. At in altera parte aequationis non item. Nam ibi prolongationes et decurtationes AD sunt quidem in proportionem sinuum DBE ex hypothesi, et multiplicata BA in 90 sinus exeunt itidem proportionalia. Sed haec deinde divisa in 180 lineas DA, amittunt illam proportionem (quare etiam arcus exhibent non hujus proportionis), sed est eorum proportio composita ex proportionem sinuum et proportionem distantiarum AD inversa. Quo minus ergo AD variantur ut in parva eccentricitate, hoc minus et illa.) Nam si uno scrupulo aberraret mihi ignoranti haec ratio, id magnum esset incommodum. Itaque ad quamlibet eccentricitatem seorsim computatio instituenda. Sed tamen potest prius fieri periculum in gradibus 90, 45, 135; nam verum et hoc est: multum distant 1800 et 9300, itaque nil mirum, sensibilibiter mutari proportionem aequationum; at 4300 et 4500 et 4700 sunt invicem propinquae. In summa, beaveris me missa tabula ad 5400 et 4400, ubi singuli gradus eccentrici methodo praescripta examinati fuerint. Tituli hi:

In Saturno: Eccentricitas 5400.

Anomalia media.	Anom. eccentrici.	Anom. coaequata.
Gr. Min. Sec.	Gradus integri.	Gr. Min. Sec.

In Jove: Eccentricitas 4400.

Anomalia med.	—	eccentri.	—	coaequata.
---------------	---	-----------	---	------------

Spero, quidquid laboris hoc erit, compensari posse. In ♀ et ♂ puto illos, quos epicyclos adhuc appellat Copernicus, statuendos eccentricos, quod jam ex parte probatum habeo ex observatis, ut et constantiam inclinationis orbitarum et ipsum angulum inclinationis maximae mediocriter. Nam in ♀

est circiter 4° , in γ plane ad 8° . Nam quod minor ejus latitudo maxima, est ob parallaxin. Omnino levissimum est redditum negotium latitudinis, quod nudissima excerptione ex tabula parallactica meae Optices perficitur. Sed tandem vale. 5. Martii 1605.

Hon. Tuae gratiss. discipulus

J. Kepler.

Maestlinus iterum obmutuit, certe nulla neque in Hanachio neque inter manuscripta ejus exstat responsio, et proximae, quae occurrunt Kepleri literae (d. d. 31. Martii 1606) testantur, ad hoc tempus non respondisse Maestlinum. Spem fecisti, inquit, vir clarissime, praeceptor honorande, te frequentius hoc epistolarum iter triturum. Id maxime optavi emissa epistola ecliptica (Epistola ad rerum coelestium amatores de Solis deliquio, quod anno 1605. mense Oct. contigit. Pragae 1605). Cumque hic meis sumtibus adsit tabellarius, is non sine literis discedere jussus est. Rogo itaque jam facias, quod in publica epistola rogo, neque nuncium differas.

Reliqua quae insunt his literis ad familiam Kepleri pertinent (petit a Maestlino, ut sententiam suam dicat de Tubingensi quodam, qui „ambire dicitur sororem Margaretham“), alio loco inserenda. Maestlino etiamtum silente, paulo post Keplerus haec prioribus addit:

S. P. D.

Literas te meas accepisse, Praeceptor honorande, certus sum. Responderunt enim ceteri, qui literas una tecum acceperunt. Excusationem silentii scio hanc habes, quod ingratam et periculosam dices materiam responsi futuram fuisse. Age, te libero hac molestia: fors an jam porro necesse non est. At illud peto, ut respondeas de eclipsi Solis, et si vis de aliis quae olim petebam. Aut sume materiam ex Opticis meis. Crede mihi, non ero insidiosus, metuis tu semper ne exagiteris, quasi sycophanta sim. Inter bonos bene agier. In epistolis non requiritur ἀκρίβεια mathematica, cujus tu virtutis auctoritatem praefers omnibus gratiis, et usque ad ingratum mihi silentium propugnas. Aut si te quid offendit in meis Opticis, eam sume scribendi materiam.

Jam agam tecum negotium privatum. β , γ , δ absoluti sunt, restant duo. Luna ter jam variata tabulis, ut sit electio et ut labor Sisyphius ille liberetur. Moles mihi tabularum incumbit uni, salarium impeditum est. Nuper tamen vinculo ordinantiae sum ad aulam adstrictus, rebus pereuntibus et navi scopulis imminente, omnibus ad enatandum discinctis. In hac colluvie indigeo studiosis. Rogo H. T. ut privatim et si fieri potest clam agat cum aliquibus stipendiariis, quos idoneos fore putas et agilibus ingeniis praeditos; nil refert, etsi nihil aut parum in mathesi profecerint; solam desidero cupiditatem discendi. Si de tali mihi constet ejusque manum viderem, adirem per literas aulam Principis Wirtembergici, rogans, ut eum iis sumtibus, qui in ipsum impenduntur Tubingae, apud me vivere pateretur. Insolens, sed promissionem habeo a magno quodam consiliario. Sed cupio prius de certa quadam persona ejusque qualitatibus esse certus, quam res palam fiat. Spero ea te humanitate esse, ut ad hoc saltem punctum censeas respondendum. Vale. 10. Junii 1606.

H. T. Gratiss. Discipulus

J. Kepler.

Hinc inde usque ad annum 1610. nulla occurrit epistola Kepleri et Maestlini, et quaedam Kepleri deperditae esse videntur; anno quem diximus 1610. excusat se Maestlinus ob „prolixam dilationem epistolarum“ neque vero in his neque sequentibus literis ullam facit Martis theoriae mentionem, quam forte, ut ipse supra de literis Kepleri testatur, etiam typis exscriptam minus intellexit.

Davidus Fabricius (comp. I, 304) quamquam astrologiae summo studio addictus et superstitionis plenus eamque ob rem Keplero plurimam negotii faceasens innumeris dubiis et quaestionibus, versatissimus erat in observandis sideribus et indefesso studio, non tantum astrologiam sed etiam astronomiam excolendi et in melius vertendi. Quam ob rem Keplerus, magni habens viri industriam et in observando habilitatem, quae ipsum praesertim ob oculorum hebetudinem deficiebat, non tantum libenter accepit ea, quae Fabricius de coelo nuntiabat, sed ab eo etiam atque etiam requirebat, quae nova in coelo observasset. Cui desiderio Fabricius satisfecit otio abundanti usus, quod testantur literae haud parvi numeri et ex parte quidem satis magnae, quas exhibet Vol. X. Manuscriptorum Petropolitanorum.¹⁰⁾ — Quarum Stellarum magna pars agit de Marte ejusque motibus et theoria, et quum illae responsionesque Kepleri scriptae sint inter annos 1602. et 1609, perspicue exhibent rationem procedendi Kepleri in „Commentariis Martis“ et lumen afferunt ad historiam inventionum Kepleri astronomicarum, quas exhibet hoc opus. Nisi ipse Keplerus in praefatione ad haec Commentaria et Cap. VII. affirmaret, se ad Martis motus inquirendos perductum esse primo tempore quo ad Tychonem Pragae transisset (anno 1600), Tychonici in Marte observando occupatis („si alium planetam tractasset, in eundem et ego incidissem“), idemque testarentur literae ad Maginum et Maestlinum praemissae, suspicio non esset absona, Keplerum a Fabricio ejusque quaestionibus motum Martis theoriam emendandam suscepisse.

Fabricius d. 13/23. Mart. 1602. (comp. Vol. II, p. 431) haec dedit Keplero: Vide mi suavisime Keplere, ut expectationi D. Tychonis, ut commendationi horum Uranicorum hospitem Francisci (Tengnagelii) et Joannis (Eriksen), ac denique spei nostrae de te dudum magno amore conceptae satisfacere annitaris et inceptum cursum pro virili continues, relaturus inde haud dubio immortalem gloriam. Adjuvato, quaeso, Herculeos Nob. D. Francisci conatus, promove commune bonum et Uraniam exulem armis Tychonianis in avitum regnum reducito. Ego quoque pro Urania fraternitate peto, ut tuas cogitationes de Uranicis rebus mecum saepius per literas communicare non dedigneris.

Ego quidem nunc primum ex meis observatis aggressus sum Martis motum, ut ipsemet perspicere possem, qua in re lateat scrupulus, an ex diversis acronychiis una et eadem eccentricitas per calculum prodeat, an ad medium vel verum motum Solis Mars cursum dirigat, et quae denique causa sit, quod latitudines acronychiae Martis non sint in eodem circulo? Retulit mihi D. Joh. Erichsen, te ex 3 diversis locis vel parallaxibus Martis ad unum et idem punctum eccentrici relatis inquirere annui orbis magnitudinem et insinuantem orbis inaequalitatem. Quomodo vero ea inquisitio per calculum instituitur, nec ipse mihi declarare nec ego conjicere potui. Ad proportionem enim instituendam praeter tria loca visa Martis etiam alia tria correspondentia requiruntur, sicuti in eccentricitate planetarum inquirenda 3 acronychia loca et tria media requiruntur. Quare rogo, ut modum istum exemplo uno saltem declares.

Cognovi ex eodem, te Solem propriorem Terris constitnere. Verum quomodo hoc conveniat eclipsibus et parallaxibus Solis observatis, non video. Videtur mihi, quod inaequalitas illa insinuans annui orbis Martis non causetur ex viciniore Solis ad Terram distantia. Totā ratio hypothesis Solis et observationes circa 45° ab apogaeo reclamant. Sed forte nos tuam mentem non sat assecuti sumus. Cupio idcirco latiore explicationem causarum. Ego ex meis observatis cognovi, Solem centrum orbis eccentrici Martis nequaquam esse posse.

Ex Domino Tychone (Tengnaglio?) intellexi, te motus planetarum non ad apogaea eorum, sed ad aphelia Solis referre. Verum prosthaphaereses acronychiae locis apogaeorum propius consentiunt quam locis apheliorum, et puto omnino, motus non ad veras sed ad medias oppositiones Solis et planetarum referendos esse. Crescit quidem latitudo Martis in nonnullis locis etiam post mediam oppositionem, at in omnibus locis illud nequaquam fit aut fieri potest. Circa apogaeum et perigaeum Solis solummodo fieri posse deprehendi, eo quod distantiae Solis a Terra circa ea loca parum discrepent vel variant in diebus sex vel octo. —

In literis die 28. Apr. (8. Maji) datis haec deprehendimus: In eccentricitatibus Martis eruendis juxta modum Copernici plurimum sudavi et valde turbatus sum, quod locus veri apogaei (qui ex acronychio anni 1585 facile constat) supputatae eccentricitati et contra non respondeat, sed ad 2 aut 3 gradus aberret. Tandem cognovi, hoc ex prosthaphaeresibus observatis simpliciter assumtis nunquam fieri posse, eo quod diversa ex diversis acronychiis prodeat eccentricitas, quod me hactenus latuit. Dii boni, quam egregie veteres astronomi et Copernicus quoque falsi sunt, qui ex tribus acronychiis simpliciter assumtis eccentricitates et apogaea inquisivere. Miror quoque, quod D. Tycho b. m. eccentricitatem Martis assumeret 20160, cum ea nec maximae nec minimae eccentricitati respondeat et proinde omnibus ex aequo non satisfaciatur acronychiis, aut meo judicio etiam respondere vix possit, quod tibi discutiendum relinquo, quia tu in hisce exercitationibus diutius versatus es. Ego nunc quasi

primum incipio manum admoveere aratro, utpote qui hactenus solis observationibus et fabricandis Uranicis instrumentis operam dederim. Cupio nunc abs te, mi excellentissime Keplere, in quibusdam doceri. Tu mihi D. Tychonis loco in posterum quaeso sis, et Cynosurae instar mihi in vasto hoc astronomicorum exercitiorum mari constituto et dubiorum procellis interdum egregie vexato et a veri itineris tramite dejecto, praeluceas. Quantus nempe sis, non solum Prodromus tuus ostendit, sed etiam D. D. Franciscus et Johannes mihi crebro aperuerunt.

Quo usque in motuum correctione progressus sis et quam feliciter, scire cupio. Vide tamen ne Mars tibi sit Mors; nimio enim studio saepe nobismet ipsis mortem conciliamus. — Ars — Mars — Mors. — Ars persequitur Martem, Mars vero Mortem causare solet rursum. — Ultimo quaero, an deprehendas Martis motum magis aphelio quam apogaeo respondere vel cui? Extemporaneum stilum eumque rusticum et impolitum boni consule. De verbis ego sollicitus nunquam, amo res. —

Eodem quo haec scripsit Fabricius die alias addidit literas, hac praemissa excusatione: Quid, quaeso, de tanta literarum mole deque tot quaestionibus et propositis dubiis dices? Certe si de tua humanitate dubitarem, te iis offensum iri existimarem. Tantum vero nunc abest, ut hanc meam familiarem compellationem te male habiturum putem, ut honori tuo cessurum et maxime credam, ut qui singularem de summa ingenii tui Uranici (cui nihil sane deest) felicitate et solertia opinionem dudum acceperim. Accipe igitur sereno animo, quae nunc tertio in mentem subito venerunt.

Postquam perplexum et laboriosum illud inquirendarum eccentricitatum opus aggressus sum, expertus sum, rem multo aliter se habere quam hactenus crediderim. Ego ex omnibus acronychiis unam et eandem eccentricitatem prodituram mihi persuaseram. Sed Dii boni, quae varietas, quae inaequalitas! Ex acronychiis prope apogaeum utrinque longe major eccentricitas datur quam in oppositis locis; inde constat, aliam quandam inaequalitatem ab eccentricitate Solari sese insinuare prosthaphaeresibus acronychiis. Quare nunc has quoque quaestiones, quae postmodum inciderunt, tibi discutiendas propono.

1) Cum ex singulis acronychiis singularis quaedam eccentricitas prodeat, circa apogaeum major, circa perigaeum Martis minor, quaeritur nunc, quae illarum omnium sit eligenda et juxta quam proportio circellorum sit constituenda? Sane nec minima nec maxima nec media eccentricitas omnibus acronychiis satisfacere potest.

2) Quaeritur, cum Tycho eccentricitatem 20160 in Marte acceperit, quo jure aut quibus rationibus id factum sit, cum nec summa nec infima, sed media eccentricitas et nec sic (ut reliquis quinque) acronychiis prosthaphaeresibus omnibus ex toto respondeat. Fieri igitur non posse puto, ut proportio circellorum juxta hanc eccentricitatem assumptam facta *ἀκριβώς* prosthaphaeresibus omnibus acronychiis respondeat vel respondere possit, nec vera quoque distantia Martis a Sole poterit dari. Eadem quoque ratio haud dubio erit in eccentricitatibus ex veris oppositionibus Solis et Martis inquisitis respectu aphelii. Quid hic faciemus in tanta varietate? Quae eccentricitas erit authentica, juxta quam erit proportio instituenda? Inprimis miror, qui eccentricitas Martis a Tychone assumpta tam veritati proximas prosthaphaereses acronychias praebere possit, cum non vera sit eccentricitas. Quaeso hanc quaestionem mihi dextre explices. Tu Thesei loco mihi sis, alias non facile me extricavero. Restaurationem integram tibi reservo, cum mei humeri ferre non possunt, nec otii nec rei familiaris ratio permittit.

3) Quaeritur, an motus apogaeorum trium superiorum certa ratione vel respectu ad motum Solis fiant, vel respectu motus periodici cujusque vel quomodo?

4) Quaeritur, quomodo, data distantia planetae a stellis ejusque altitudine, refractione separari debeat commodissime?

5) Quaeritur, an ratio redigendi eccentricitatem totam in duos circellos sit melior et verior quam illa, quae in linea apogaei ex dupla eccentricitate aequantis et eccentrici inquirat prosthaphaeresin puncti dati? —

Jam transgressus ad astrologica aliaque, sic concludit Fabricius:

Multa, multa sunt, de quibus tecum in posterum discurrere volo, nunc pluribus te onerare nolo, ne nimium importunus sim. Rescribe, si Uraniam promotam via, si Calliopen ejus sororem amas, si me quoque ut spero diligis mutuo. Ego exspectans exspectabo tuas literas. Vale &c. Raptim, ut in mentem venerunt.

Cur in Tabulis Lansbergi 3 cyphrae semper commate distinguuntur?

His autem Fabricius non contentus quaestionibus alias haud paucas superaddit separatis conscriptas scidulis, quas inscripsit: „Quaestiones variae cum astronomicae tum astrologicae, quarum brevem resolutionem desideranter a M. Keplero expetit Davides Fabricius *ἀστροφίλος*.“

Die 1/11. Augusti gratias maximas agens pro responsione Kepleri (desunt haec Kepleri literae, datae d. 18. Jul.) eumque laudibus cumulans, haec prioribus addit F.: Quod ex

trinis acronychiis diversa prodeat eccentricitas, tuo iudicio video confirmari. Cognovi illud non solum ex simplici illo triangulo prostaphaereseos, sed etiam ipsa methodo inquisitionis Coperniceae. Causa vero discrepantiae abs te adducta verisimilis videtur, licet non sat intelligam, quomodo tu ex quaternis acronychiis per regulam falsi semper eandem inquirere possis, praesertim cum ipsa hypothesis non consentiat nec praebeat veras distantias Martis a Sole vel veras parallaxes. Quare plurimum rogo ut in 4 acronychiis tuam methodum inquirendi demonstres. Modum „quadratae regulae falsi“ non intelligo. Mihi nulli arithmetici libelli ad manus sunt, ex quibus illam discere possim. Quod omnia in Marte vel ad verum motum Solis referas non ad medium, vel ad aphelium non vero ad apogaeum, miror. Adducis, esse differentiam 6' inter utramque hypothesin quoad acronychia. At ego in hypothesi Tychonis non invenio tantum errorem, qui 6' faciat, sed saltem 1' vel $1\frac{1}{2}'$ ad summum. Nam ex constituta eccentricitate media Tychonis exque utriusque eccentricitatis proportionem calculus talis eruitur, qui quam proxime acronychii observationibus omnibus respondet; circa solstitialia loca Solis parva deviatio est, non quidem propter erroneam reductionem, ut putas, in $26^\circ \times'$ (alias enim ut in principio ☉ major differentia incideret), sed potius meo iudicio propter paulo minorem eccentricitatem mediam et eccentrici proportionem nonnihil variatam; mediam eccentricitatem inveni 20050, eccentrici ecc. est 16250.

Hoc modo constituta hypothesi omnia acronychia in ipso minuto fere conveniunt. Quare tibi 6' differentia ex aliis causis esse videtur et quod alia reductione utaris quam visa. Etsi Tycho in eo falli videtur, quod per maximum angulum latitudinis visae in medias latitudines visas inquit, cum in eodem circulo parallactice non sint, tamen non omnino fallitur, cum per visam latitudinem unamquamque per se reductionem instituat. Nam cum planeta non in veras sed in visae latitudinis circulo versetur, quid prohibebit, illum non per veram sed visam latitudinem reducere? Certe non facile mihi hoc quisquam persuadebit, nisi aliis argumentis usus fuerit, quae observationum certitudine comprobata fuerint.

Quod de 3 parallaxibus annuis Martis in eodem loco eccentrici constituti dimidiam eccentricitatem Solis minorem invenis, probare non possum. Non enim temere discedere debemus a bene constituta hypothesi Solis per Tychonem. Si ex Martis parallaxi differentem eccentricitatem Solis inquirere voluerimus, certe non ex proprio sed alieno agro haec adducuntur. Oportet Solem in se considerare et ex suis propriis observationibus restituere, non ex observationibus Martis. Nam illa varietas annui orbis forte alias causas habet. Ex Sole potius bene constituto et reformato procedendum ad restitutionem Martis, non e contra; ex certis de incertis iudicatur, non e contra. Facile Tycho scrupulosus astrorum observator per sua magna instrumenta deprehendisset ex altitudine meridiana circa $15^\circ \Omega$ et Υ , si eccentricitas Solis dimidio minor fuisset. Quomodo enim illud minutum non observaret, qui dena secunda ut plurimum observavit.

Dimidia quoque eccentricitas medium motum Solis variaret. Nam anni quantitatem aliam daret, quam Tycho ex sua eccentricitate concludit. Variatio n. eccentricitatis maxime variat anni quantitatem.

Quod non sensibilem in eclipsibus quoque differentiam inducat dimidia eccentricitas Solis, vix persuaderi possum. Proportio Terrae ad Lunam et semidiametrum umbrae fit non in milliariis, sed integris diametris vel semidiametris fit, n. Lunae distantia a Terra ex parallaxibus sat cognita. Ergo ex non satis cognita proportionem illarum (ut vis) non excusatur differentia illa, quae ratione huius dimidia eccentricitatis in eclipsibus incidere posset. Vide igitur mi Keplere, quo deducaris ista praepostera restitutione Solis ex Martis parallaxi.

Taceo nunc, quod dimidia illa eccentricitas Solis etiamsi vera esset non possit omnem incidentem in orbe annuo varietatem excusare, sed multo major requiritur differentia, quae vel integram Solis eccentricitatem superet. Videbis hoc in observatione Martis, quando Sol fuerit in locis solstitialibus, et Mars tunc existat c. 90° medii motus a Solis loco medio. Inquire, et verum videbis. — In priori oblitus sum. Cum proportio eccentricitatis utriusque a priori quasi necessaria statuatur, nec illa constituta ex tribus observationibus, nec etiam ex quatuor acronychiis observationibus vera eccentricitas indagari possit, quaeritur, quomodo tu ex 4 acronychiis non considerata illa proportionem eccentricitatem habere possis?

Scribis, Tychonicos circellos, quibus utramque eccentricitatem excusat, unico tantum minuto differre a punctis eccentricitatum, quibus tu cum Ptolemaeo utaris. Cuperem abs te cognoscere causam et rationem contrarii motus circellorum Tychonicorum.

Problemata tua astronomica et tabulas Rudolphinas ad editionem primo tempore para, ut et alia tua inventa, ut tandem orbem diutina expectatione restitutionis Uraniae fessum tu primus reficias. Tychoniani in tuis ipsius inventis nihil tibi praescribere possunt. Tycho et tibi astronomiae restitutionem reservandam puto. Ego in astrologiae triumpho adornando toto hoc anno occupatus fui.

Quod latitudinem Martis etiam $1\frac{1}{2}'$, mensibus ante vel post oppositionem Martis et

Solis majorem esse asseris, magnopere miror. Quae de parallaxibus adducis, vix tantam differentiam excusabunt, cum non sit multo major quam in Sole.

Quaeritur, an centrum eccentrici Martis re vera fixum sit in Sole vel diversum ab eo locum habeat? Tycho primum vult. Quomodo tu existimas, Martem imaginarium quoddam punctum motu medio respicere, si ad medium motum ille referretur? Certe Sol non est imaginarium punctum et tamen illius motus ut verus ita medius consideratur? Si centrum eccentrici planetarum non est in Sole, tunc latitudines mutabuntur accessu vel recessu eclipticae ad illorum periodos fixas et uno loco perennes.

Quaeritur, cur duplex in planetis eccentricus et quae causa, quod una simplici eccentricitate motus apsidum excusari non possit? &c. Vale, Vige et Flore Excell. D. Keplero &c. Dabantur Rostervaviae in Or. Frisia d. 1. Aug. 1602.

(Inscriptio: Dem Erbaren und Hochgelarten Herrn M. J. Keplero, Kais. Maj. bestellten Mathematico. Meinem vilgunstigen Herrn und Freunde. Zu Prag. In des Herrn v. Lichtensteins Hauss auf dem Retzin zu erkunden oder gewiss in der alten Stadt in der Zelteergasse zum gulden Hirschen. Mit Fleiss zu bestellen.)

Responsio Kepleri, prima earum quas exhibent manuscripta, data est d. 1. Oct. 1602. (Comp. Vol. I, p. 306.) Sic exorditur Keplerus:

S. P. D.

Quisquis ille sit, cui literas commendasti, doctissime Fabrici, negligenter illas curavit. Audieram ex haeredibus Braheanis, jam pridem fasciculum literarum ad me spectantium in suas aedes delatum, sed repudiatum a se, quod nescirent, conclusas esse et aliquas ad se missas: tabellarium vero negasse tam longum iter literarum causa ingredi (nam in extrema fere parte novae urbis habito), fore ut qui literas quaerat ultro ad se veniat. Quaesivi illas per 3 septimanas, ignarus unde essent. Tandem fortuito mihi ignotus homo occurrit et utrum Kepleri mihi nomen sit percontatus, ad aedes me Archiepiscopi ablegat, ubi latuere. — Exordiris a nimio meo amore, quo nomine tibi gratias ago. Et cum plurima in literis sequantur, in quibus a me dissentire dicis, nescio quomodo te disputantem cum laudante conciliem aliter, nisi quod conflictu fulgorem veritatis elicere te posse speres. Quare hoc age mi Fabrici, disputes in posterum, non perores. Nam illa ratione nobis ipsi profuerimus, hac nocueris mihi. Non enim fovendus est amor sui, sed omni externa et interna vi pessumdandus.

De patriae tuae statu hic inaudivimus (II, 751.). Deus meliora meo Fabricio! Malum omen pestis simul et rebellio; metuo graviora. Te tamen tua professio apud hunc hostem non minus uti spero tutabitur, quam apud principem. Deus vero te tuosque ab infreni militum gregariorum licentia clementer tueatur.

Jam Keplerus „offensiones cum Tenguaglio“ adit, quas supra (p. 12.) diximus, deinde, interpositis disquisitionibus astrologicis (I, 306.) pergit: Miraris, ex 4 acronychiis prodire eandem semper commensurationem, et eam tamen falsam nec in parallaxibus aptam. Causam dicam: statim post apogaeum maxima est differentia ad aequationes ipsas in utraque hypothesi. Aequatio vero ipsa parva, nedum differentiata(?). Proxime vero ante longitudinem mediam vicissim aequatio magna quidem, sed insensibilis in utraque hypothesi differentia. Circa 45° tantummodo variantur aequationes per variatas hypotheses a simplici usque ad rationem 2 aequalium parallaxium et aequantis. Itaque succurrendum illis in 45°; nam per usurpationem simplicis prosthaphaereseos nimis illic magnae evadunt aequationes. Demisso centro eccentrici e loco priori, qui maneat centrum aequantis, fiunt illae majores paulatim. Tantum enim potest id centrum demitti, donec assequamur justum modulum aequationum ex quacunque prosthaphaeresi. Hunc circa 45°, ubi variatio maxima, talem eligemus, ut omnes hypotheses conveniant in longitudine media utque planetarum justum locum expresserimus. Quare si deviat adhuc, deviatio circa

23° anomaliae accidet et circa 68°, partibus sedecibus. At in tantillo spatio plane insensibilem deviationem esse, necesse est; nec enim de minima minuti differentia ante et post apogaeum in Marte contendam. Haec ergo causa est, cur falsa hypothesi vicem verae supplere queamus. De ipsa via investigationis existimabam te ex schematis explicatione certiores redditum. Artificium non est quod ex arithmetice disci possit, sed labor immanis. Quadrata falsam dico regulam (comp. p. 43.), quia si ter operandum in simplici regula falsi, hic novies fere operabimur: si illic quater, hic sedecies. Datur mihi tota diameter, pono semper eam esse 10000 vel 20000 prout placuerit; dantur anguli cum circa centrum aequantis tum circa centrum mundi seu Solem. Illi dantur ex differentiis temporum, quibus distant quaternae observationes; hi ex differentiis locorum in quibus Mars est visus. Oportet observare has leges (nam in regula falsi tractantur exempla semper secundum aliquas leges), ut tueamur 4 loca in uno esse circulo, quamvis hoc non veritas sed hypothesis nostra exigit; et simul ut centrum eccentrici tali proportioni sufficiat. Primo pono longitudinem aliquam mediam, pono item apogaeum aliquod. Ita statim initio facio 2 positiones, sed examino illas seorsim. Positis his duobus statim sequitur quantitas radiorum in triangulis super eccentricitate mea. Et tunc habetur quadrilaterum; examino ejus oppositos angulos, an valeant 2 rectos; si non, muto apogaeum et ab initio rem repetito manente interim longitudine media. Id toties facio, donec quadrilaterum sit in circulo. Ex 2 vicibus si recte sim operatus (nam longa est operatio) statim apparet, an radii terminus cadat extra lineam apogaei positam; si hoc, muto ergo longitudinem mediam utcumque et ad quamcunque mutationem repetito omnia illa, quae superius ab initio hactenus sunt dicta semperque curo, ut quadrilaterum sit in circulo. Tandem ergo, ubi jam per 2 longitudines medias semper 4 loca in circulo repererim, apparet, quid amplius de longitudine media sit faciendum, ut centrum penitus cadat inter 2 reliqua.

Haec tibi sint instructionis loco; in fine addam exemplum. Jam ad alia. Non putas mihi sufficere causas, cur pro medio Solis loco verum, pro apogaeo — aphelium comminiscar. Audi: illa 6' sunt argumentum parvae in effectum differentiae hypothesium, quod visiones quidem acronychias attinet; et indicium, quod re vera aliquid differant, non vero sunt mihi causa novationis primaria. Prima mihi causa hoc audendi speculatio mea, de qua vide tabulam Maestlini in Mysterio meo. Jam haec est ausi confirmatio, quod, cum differant hypotheses per 6', mea verarum oppositionum hypothesis tantum non erret, imo nusquam ultra 1½' vel 2'. Tertia et evidens causa seu potius confirmatio, quod meae ab aphelio non ab apogaeo deductae distantiae (in vera hypothesi) parallaxibus annuis satisfaciant. At utriusque hypotheseos distantiae multum ab invicem differunt. Jam tu mihi conaris illa 6' differentiae eripere; te minus invenire a Tychoniana hypothesi discedere observationes. Nego te hoc invenisse. Nego hypothesin Tychonis intra 1½' consentire. Nam primo fateris, in tempore horam et amplius aliquid deesse. At in una hora appropinquant sibi haec sidera per 3½'. Deinde concedis, falsam esse reductionem ad eclipticam, per quam 16' addidere, cum vix 1' debuissent. Ergo alia sunt loca visa, quae Tychonis hypothesi quadrant; haec ergo visis tam prope non quadrat. Tu sic argumentaris: cum planeta non in verae sed visae latitudinis circulo versetur, reducendus est non per veram sed visam latitudinem. Falsum antecedens; nec tamen id ad con-

sequens multum facit. Quo in loco planetam videmus, ex eo in eclipticam recta ducitur, determinans locum ejus eclipticum; haec est reductio visi loci ad eclipticam. Jam quia planeta nec in suo loco ecliptico nec vero videtur, sed loco intermedio (visus enim locus parallaxi orbis annuae in latum est implicatus etiamnum sub ipsam acronychiam visionem), rursus ergo eadem illa ad eclipticam recta, quae secat orbitam planetae, locum illi determinat in sua orbita. Angulus rectus ab ecliptica et arcu latitudinis subtenditur arcu orbitae Martis a nodo ad hunc locum, est ergo iste arcus longior quam a nodo ad punctum eclipticae. Certe nusquam Mars nisi in orbita sua versatur, minime in latitudine visibili, nec attinet ad proprios ejus motus, quam viam nobis videatur sub fixis describere. Nam sub fixis nec est intermixtas illis nec tortuosam viam describit nec regreditur, quae omnia videre nos putamus. Videris tandem provocare ad observationes rejecto iudicio rationum. At iniquum est postulatum. Quid? Nihilne in astronomia sequamur nisi quod observationes monstrarunt? Quae ergo subtilitas observandi docuit aequationem temporum idque veteres? de Tyconica non loquor. Haec ipsa quoque reductio unde primum orta? Ab observatione an a ratione? Puto a ratione. Ego doceo rationem, veram esse non doceo, quam eodem cum veteribus jure sequor; observationes per reductionem accommodo, ne pro veris vitiosas adhibeam. Qua ego ceu clave astronomiae reperta unice gloriari possum, eccentricitate Solis dimidiata, id negas te probare posse. Non tamen, ais, abs me constitutis discedendum. Non facio temere, auctore Tychone facio seu conscio. Nihil eorum tollo, quae ex hypothesi Tyconica sequuntur, et Ch. Severini (Logomontanus) vivo Tychone in Lunaribus hoc meum recepit et imitatus est. Tycho 3600 dixit hypotheseos gratia, non quod hoc jam sacrosanctum nobis esse debeat, ut sunt observationes. In alienum me agrum invadere arguis. Quaero ergo, quem agrum Copernicus invaserit, dum Solem penitus jubet quiescere? Numquid planetarum parallaxes? Eodem jure ego in casu plane eodem utor. Nam quomodo ex Solaribus observationibus ista deducerentur, quae, etsi concedas esse, ex iis derivari non possunt? Adeo me destitutum exemplis putas? Quid ergo in astronomia est, apogaeum Solis per eclipses probare? Aut quis id fecit? Male agatur cum astronomis, si circa quodlibet sidus in proprium agrum tanquam in ordinem fuerint redacti.

Ais, variationem illam annuam forte alias habere causas; ito ergo et 5 epicyclos infer in planetas, quibus centra librentur. Id quidem in Venere et Mercurio Ptolemaeus Copernicusque coacti sunt ob hanc causam ignoratam facere, in Saturno et Jove negligentes ob insensibilitatem; in Marte cum facere neglexissent, inobservabile sidus dixerunt. Verum tu usitata uteris sophistica (scio qua mente et credo praefationi tuae ac spero, te voculas aliquas hujusmodi non aegre laturum); exempli causa, si dicat aliquis, phasiam Lunae causam motum ejus esse circa Terram, sophista dixerit, forte aliam esse causam phasium.

Ex incertis putas judicari de certis. An igitur quidquam in astronomia rectius observationibus seu Solis seu Martis? Ex his enim iudico. Sed forte hoc incertum quod statuo, Martem post integram periodum in eadem semper altitudine a Terra et eodem loco sub fixis esse, linea ex Sole per illum ejecta? Num tu Copernicum aut Ptolemaeum sequaris, ut potius libres centrum eccentrici Martis motu non Marti sed Soli respondente? Ita jam non hoc tantum referet considerare, quo loco sui orbis ζ sit; nisi enim

etiam ☉ sit pristino loco, ♄ in suo reali loco non reperietur. Ego vero ex te ipso quaero, utrum ex his sit certius? Hinc stat auctoritas, sed palpitat in tenebris, illinc ratio physica. Quid enim post Copernici inventionem commune amplius orbi ♄ cum orbe ☉? Cur alter alteri leges praescribat? Fateor me initio sola probabilitate et calculi ratione fretum ausum esse, hoc controversum supponere tanquam in regula falsi. Exacta vero operatione jam hoc axioma dico ab observationibus esse confirmatissimum. Nam Copernicus cum suis librationibus per 2° aberrat, ego non per 2'.

Tycho, ais, illud 1' in 15° ♄, 15° ♀ deprehendisset suis instrumentis. Videris in Tychonis observationibus dum hic fuisti non satis versatus. Nusquam propius quam intra 36' (?) instrumenta consenserunt. Si uno usus est, dubitari de tantillo potuit, quia alterum id non confirmavit quod observatum est. Ad haec vidisses in observationibus, quoties cum loco Solis observationes contulerit. Non novum est 1—2½' differentiae superesse; solebat in observationibus *προσθαφαίρειν* quando hypotheses extruxit; nam de minimis non curat praetor. In aequinoctiis fateor rem ad 16' adduxit, sed magnus et taediosissimus labor prohibuit, quo minus in aliis observationibus idem minus necessarium faceret. Quoad praxin, ubi ex trinis et trinis observationibus hypothesin extruxit, semper aliqua in apogaeo et eccentricitate discrepant minuta, quin imo posteriori tempore ½° apogaeo addit, quod multum sane est in hoc negotio.

Vereris ne varietur medius motus. Falleris; nisi apogaeo variato nihil variatur.

Metuis pro anno. Falleris; mutatio haec talis non est, quae maximam aequationem, cujusmodi hodie est in aequinoctiis, mutet. Manente ergo vero loco Solis in eccentrico suo circa aequinoctia, non mutatur annus. Erras in eo quod putas, me simpliciter dimidiare. Nam quia 3600 subtendunt 2° 3' aequationis maximae, 1800 subtendunt 1° 1½'. At non vides, me residua 1800 aequantis eccentricitati tribuere, cujus in efficienda aequatione maxima partes sunt aequales. Ut igitur 3600 simplicem ego divisi in 1800 et 1800, centro eccentrici medio loco constituto, sic 2° 3' simplicem divido in 1° 1½' et 1° 1½'; illam ab eccentricitate eccentrici, hanc ab aequante dico venire.

Nec metnere desinis eclipsibus. Computa igitur quasdam (secundum meam methodum) et diameter Lunae 30" forte variatur. Quid? Ego tibi hanc leviculam formidolositatem penitus suffocabo. Quid tu putas umbram jacere? Terram an aërem? Si aër, cur ergo semidiametris Terrae utimur? Necesse enim est nos hic falli. Si Terra, ergo radius Solis refractus umbram jacit. Nam Sol occidens, cum per 34' summo margine infra est, adhuc cernitur, ergo per 34' attollitur, et radius exiens in purum aetherem aliis 34' refringitur, sic ut propter refractiones plus de Terra illustret quam Reinholdus in Theoricis computavit. Et oculus in mucrone umbrae constitutus videbit simul margines Solis et Terrae, quos remota refractione non videret simul, sed Solem longe post Terram latentem, minorem ad visum ipsa Terra. Sed de hoc negotio Deo volente in futuris nundinis Astronomiae parte Optica.

Nec sufficere putas Martis inaequalitatibus vel integram Solis eccentricitatem nedum dimidiam; quiesce, dimidia sufficit. Unde tibi haec notitia, qui nescis quam alte descendat Mars a Sole in aphelio? Hoc ipsum est quod supra dixi, alium medius Solis locus orbem Marti tribuit, alius est

superioribus. Itaque Martis in C tardus est motus circa ☉, in H mediocris, in F velox. Interim tamen aequalis manet motus circa B centrum. Hoc modo fit illa, quam superioribus literis innui, figura ovalis. Nam citius in H venit facitque distantiam AH, quam circa ☉ in locum a B quadratum: breviores itaque ad latera seu in longitudinibus mediis sunt distantiae, quam ratio perfecti circuli eccentrici exigit, et differentia versus perigaeum major est, quam versus apogaeum: quae justa definitio figurae ovalis est. Porro, quae ratio est motus ♂, eadem accelerationis puncti B causa nostrae intelligentiae. Si vis scire, in quo gradu celeritatis sit ♂, quaere per anomaliam simplicem ejus a ☉ distantiam. At si vis locum scire, oportet scire, quantum accumulatae omnes ab apogaeo distantiae in iis temporibus, in quae singulae inciderunt, in motu effecerint. At cum infinitae sint distantiae, quia infinita F, G, H, I, C puncta, et illae non aequaliter sparsae per circuitum circa ☉; confertiores enim quae longiores, quia ibi ♂ tardus, sparsiores quae breviores, hic vides difficultatem computandi loci eccentrici ex hypothesi vera et physica.

Modus tamen iste est: divido circuitum in 360° et fingo planetam moveri aequaliter quamdiu in uno est. Ita ordine ab apogaeo omnium graduum morae computatae dant cujusque anomaliam. Idem intellige per omnia (in depicto schemate Terrae). Haec ergo omnis hypothesis ♂. Proportio orbis ♂ ad orbem ♀ = 100000 : 152518, circelli ♂ semidiameter 180, ♂ in 6° ☉, ♀ in 29° ♀. Nodi ♂ in $16^\circ 20'$ ☉, ♀.

Jam dicam, quid mihi inter scribendum incidit et quomodo physicam hanc rationem, salvis omnibus quae nobis prostant efficienda, concinniore imaginemur. Nam videtur durum, planetam eniti e virtute ☉, quod est naturalis facultatis, et interim in nitendo remittere, intendere, pro ratione exigentiae circuli, aequalibus temporibus aequalia spatia describendi, quod est animalis facultatis. Concinnius esset ut omnem facultatem naturalem Soli transscriberes, cui maximam partem transscribimus; planetae vero tantum intellectualem quampiam facultatem tribueremus, cui non viribus sed solo nutu opus esset. Item in priori modo obscurior videtur ratio virtutis e ☉ egredientis, optamus dilucidior. Utrumque spero me efficere posse per modum qui sequitur. Via planetae per se in circulo magno est: nam parallaxes nihil ad ipsum; demus ergo ut inclinata sit ad imaginariam quandam eclipticam, a qua digrediat utrinque per $5^\circ 15'$, quanta est aequatio circelli 9165. Moveatur planeta in circello, ad illam imaginariam orbitam mediam erecto ad angulos rectos, sic ut proprius planetae motus transversus sit ad motum adventitium ex Sole. Hoc modo ascendet et descendet hinc inde in suo circello, nihil ipse nocens vel expediens promotione sua circa ☉. Antea vero dimidiam aequationem circellus iste confecerat. Nec jam nitetur contra motum ☉, quia is est non sursum vel deorsum, non ad polos, sed tantum in orbem. Planeta vero ibit et supra versus polum eclipticae descendens ad ☉ et infra versus alterum polum iterum ascendens. Conficiat gradus aequales aequalibus temporibus, metiatur descensum et ascensum suum specie ☉ occurrente; nam infra sub majori angulo occurrit. Diametrum vero ad latera metiatur respectu fixarum. Haec omnia sine viribus facere potest solo intellectu et nutu, quia globi coelestes versus Solem graves non sunt. Hic etiam simul pulcherrime mihi nascitur promotio nodorum, quod antea nulla concinna hypothesi poteram. De quo alias. Jam quomodo conficiatur tota aequatio dicam. Non quia Soli totam transcribo, modo vero prius

explicato tantum dimidiam potest; metues forsan ut tota illi transcribi possit. Scito ergo, ratione optima posse.

Nam in prioribus imaginatus sum lineam circularem et fontem virtutis in illam effluentis punctum mathematicum: in his dixi consistere mensuram graduum motricis virtutis ex \odot egredientis. At virtus jam concinnius fingitur non ex solo centro \odot , sed ex toto corpore egredi. Hoc posito dupla efficitur proportio virtutum ad proportionem distantiarum. Nam sit jam planissime (quod prius tantum in parte usurpaveram) eadem ratio lucis et virtutis ex \odot egredientis; quaeritur, si quis duplo propius ad \odot veniret, quanta sit apparitura \odot diameter? Fere dupla, prius sub $\angle \delta\gamma\epsilon$, jam sub $\angle \delta\beta\alpha$ (Fig. Cap. 36). At quia \odot non est diameter sed circulus, ergo cum dupla sit proportio figurarum ad proportionem diametrorum, fuerit igitur Solis area visibilis quadrupla prioris.

Hic est modulus incrementis ab appropinquatione lucis, sit itidem virtutis. Sol ergo duplam aequationem ejus conficiet, quae posset esse a 9165 circello, et composita via δ circa \odot plane ut prius manebit ovalis. Exspecto, qui tibi placeat haec speculatio. Mihi ego in ea egregie placeo et tibi gratias ago, quod me ad scribendum instigasti. Tentavi quidem saepe antea, sed impedimento mihi fuit circellus eccentricitatis, quem putavi nonnisi in longum moveri posse. Considera an gradum fecerim ad astronomiam physicam sine hypothesibus sc. fictitiis constituendam? Virtus in \odot certa est; ascensus et descensus planetarum itidem certus est ex sola specie apparente majore et minore. Multum enim interest inter δ δ , \odot in Q , et δ ejusdem in ∞ . Haec ergo non sunt hypotheses (seu, ut Ramus appellat, figmenta), sed veritas ipsa, ut stellae ipsae. Ego vero praeter eam nihil suppono. Ex his ergo hypothesibus tu ipse, qui otio ad astrologiam tantopere abundas, computa loca Martis mihi proposita, sed hoc discrimine, distantias δ \odot ex eccentricitate 9165 computa per anomaliam mediam; nam tibi necessariae sunt ad parallaxes annuas indagandas.

Loca vero eccentrica computa ex hypothesi vicaria hac (additum est schema sine explicatione, simile schemati Cap. XXVII.):

Anno 1600 Januario aphelium δ in $29^{\circ} 0' 35'' Q$; motus annuus $1' 7''$; eccentricitas eccentrici 11613, aequantis 6944, ut tota sit 18557; inclinatio planorum maxima $1^{\circ} 50' 45''$; ea constans est. Nodi anno 1600 completo in $16^{\circ} 20' \gamma$, μ ; limites in locis quadratis, in $16^{\circ} 20' Q$, ∞ .

Adjuro te per delicias tuas Uranias, ut tecum habeas ista, nec me Tychonicis prodas litemque mihi seras. (Nil sequitur.)

Fabricius die 4/14. Nov. 1602. ob „migrationem in urbem natalem Esenam“ (comp. Vol. I, p. 312) praemissas Kepleri literas nondum acceperat ejusque silentium diuturnum aggre ferebat.

Martem aggressus haec profert: Expeto ut mihi ostendas rationem calculandae eccentricitatis Martis ex quatuor acronychiis per quadratam regulam falsi, ut majorem tuis laboribus fidem habeam; quamvis valde dubitem, fieri vix posse, ut una et eadem eccentricitas ex diversis acronychiis tali processu prodeat.

Quodque scribis, latitudinem Martis ante et post conjunctionem, etiam per sesquimensam saepe majorem esse, quam in ipsa oppositione Solis, id videtur omnino meis observationibus repugnare. Per 5 aut 6 dies quidem differentia interdum observatur, sed id ex aliis causis venit et quidem circa solstitialia puncta tantum. Vide igitur ne nimium tuis speculationibus tribuas et Marti vim facias novis tuis hypothesibus. Ad medium motum Solis omnia esse referenda non dubito, cum Sol centrum trium superiorum sit, etsi non negem, ad apparentem motum Solis etiam reduci posse.

Solis eccentricitas nequaquam duplex est, ut tu vis, sed simplex, nam dimidia eccentricitatis differentiam, quae in Marte est, minime excusare potest, quacunque ratione rem con-

stittas. Rectius feceris, si Soli sua eccentricitas simplex permanserit, ne in motu ejus accuratissime a Tycho explorato luxatio violenta committatur et alia ratione Martis motus salvetur per circellum. —

Tandem accepta Kepleri responsione Fabricius (d. 8/18. Nov. 1602; comp. I, p. 312), respiciens verba, quibus Keplerus concludit, dicit: Non est quod vereris, vel illa vel alia Tychoniana aut aliis propalatum iri. In negotio reductionis ad eclipticam mihi plane satisfecisti. Miror, Tychonem tale quid non cogitasse. Verum est, Martem nec in viso nec per illum reducto circulo versari, sed in alio tertio. Ex falso igitur verum dari non potest. Quae ad probationem bipartitae eccentricitatis Solaris adducis, meas objectiones potissima parte diluunt. Gaudeo, me vano metu ex variatione hypotheseos Solaris orto liberatum esse.

Judicium meum de tuis cogitationibus motricem virtutem Martis spectantibus jam aperire non possum propter penuriam temporis. Nam heri tuae literae mihi traditae sunt.

In epistola d. d. 8/18. Dec. (Vol. II, p. 95) nondum accepta Kepleri epistola sequente propius ad rem accedit Fabricius, dicens:

Tu motum Martis ex duplici hypothesi, una vicaria altera vera inquirere laboras, quod argumento est, hypothesin hanc non esse per omnia veram vel saltem mancā esse. Ex vicaria prosthaphaereses Martis, ex vera distantias inquiris. Si vicaria vera, tunc utrumque daretur simul, si autem „vera“ per omnia esset vera, non indigeres vicaria. Laborandum ergo maxime erit, ut talis aliqua hypothesis excogitetur, quae quam proxime in omnibus ipse coelo respondeat, quod mihi non difficile adeo sane videtur, si imaginationem tuam de duplici Solis eccentricitate abjeceris. Haec, crede mihi, si recte judico unica et verissima causa est, quod duplicem etiam hypothesin Martis constituere necesse habeas. In Solis hypothesi centrum eccentrici supra Terram omnino esse oportet, sive quoad veterem suppositionem, sive recens a te excogitatam. At ad salvandos motus Martis dimidia illa eccentricitas Solis, quam tu a Terra sursum ponis, deorsum potius vel sub Terra imaginari debet. Hinc fit ut tuae distantiae veritati nequaquam respondeant, quia propter considerationem dimidia eccentricitatis supra Terram distantiae nimium a Terra (quae sub centro eccentrici Solis est) removentur et contra.

Haec velim te diligenter considerare et imaginationem in Sole abjicere. Quaeso hunc obiectum nodum ense veritatis mihi solvas; at noli iudicium praecipitare, ne sero poenitentia tibi eveniat. Bono haec animo in veritatis patrocinium scribo, quia post priores literas diligentius omnia consideravi. Tu Martem Soli nimis arcto vinculo alligas. — Secundo abs te quaero, quatenam sit verissima causa duplicis in Marte et superioribus ceteris et inferioribus quoque eccentricitatis. Hanc inquirere non utile solum est, sed ad demonstrationem maxime necessarium. Si causa vera cognita fuerit, maximum lumen mathesi inferetur. Ego omnino existimo, Solis eccentricitatem sese immiscere eccentricitati Martis, ut et reliquis, quae implicatio eccentricitatem quoque implicatam reddit. At si a Sole duplicis eccentricitatis causa aliqua erit, tunc ab apogaeo Solis una illarum eccentricitatum duplicium incipere debet, major vero eccentricitas ab apogaeo Martis. (Keplerus in margine: quod responsurus eram objectionibus de Marte, ipse urget seque implicat). Sic illa eccentricitas, quae a Sole causaretur, a vero suo principio quoque inciperet, ut alteri eccentricitati sese recte immisceret. At hoc non videtur fieri, quum juxta Copernicum motus circelli utriusque ab apogaeo planetae incipiat. Quomodo igitur vera esse poterit haec ratio, quae diversis causis unum et idem principium tribuit, cum potius singuli motus ad singulas suas causas essent referendi et adaptandi, videlicet minoris eccentrici Martis variatio ad apogaeum Solis, cum in illius linea haec eccentricitas consideretur; majoris vero eccentrici variatio ad apogaeum Martis. (Keplerus: non sane est.) Si hoc non concedes, certe Sol non erit sua eccentricitate causa duplicis eccentricitatis Martis.

Tertio, latitudinem Martis non vis considerari in apparenti circulo, sed proprio, in quo latitudo se proportionaliter habet, in alio non item. At juxta tua ratiocinia via Martis est ovalis, non circularis; quid igitur prohibet, ne et latitudines se non habeant proportionaliter, sed via ejus sit tortuosa vel ad ovalem quodammodo formam inclinet? Concludo igitur, in apparenti circulo latitudinis reductiones esse instituendas et hypothesi adaptandas; et proinde quoque Tychoniana hypothesis non erit male instituta juxta reductionem loci visi. Quod vero tibi videatur illa (quoad prosthaphaereses) nonnullam differentiam ingerere, illud potius eccentricitati non exactissime constitutae ejusque proportioni non omnino accuratae adscribendum existimo.

Quarto, scribis de aequipollentia hypothesium Copernici et Ptolemaei, quoad prosthaphaereses, quod num verum sit non video. Nam mutandam esse eccentricitatem ipsam nonnulli et numeros utriusque quoque eccentricitatis. Ergo ratio non erit eadem. Mea quaestio fuit et etiamnum est, an retenta eadem eccentricitate totali ejusque proportionem simili,

aequipollentia sequatur? vel una et eadem prosthaphaeresis Martis detur vel non, quae differentiae sit causa?

Quinto, causam miraculosae et vix credibilis apparentiae in latitudine Martis aequimense ante oppositionem acronychiam saepius expetui, nam longe hoc a veritate et ipsis observationibus recedere omnino puto.

Sexto, schema quoque et rationem calculi expeto, quomodo ex tribus parallaxibus Martis ad idem eccentrici punctum factis semidiameter orbis annui inquiratur, et si vis, exempla talium trium observationum mihi communica; nam ego non habeo talia exempla. Facies gratum, si mihi communicaveris.

In literis proxime sequentibus (d. d. 30. Jan. v. st. 1603) accepta Kepleri responsione haec scribit Fabricius: video tuam hypothesin bono fundamento niti, nisi quod moveat te duplici nti hypothesi, cum ex una illud fieri oportebat. Quare de ea ut videas moneo. Ego gaudeo, Tychonem talem successorem consecutum esse, qui cum fructu et decore inceptam restitutionem complere possit. Quaeso ut mittas nudam hypothesin Martis cum dimensione circulorum justa. Sic ego incipiam illam ad observationes meas accommodare. (Reliqua vide Vol. I, p. 323)

Interim advenerunt Kepleri literae responsoriae ad priores Fabricii quaestiones, datae d. 2. Dec. 1602. (comp. Vol. I. p. 312 ss., Vol. II, p. 95, 413, 752), in quibus haec leguntur:

De anomali incremento Martis latitudinum bis terve in diversis epistolis replicasti. Mones me, ne nimium speculationibus meis tribuam. At ego, ut verum fatear, ejus rei causam cum speculationibus meis nondum ex professo contuli, nisi quod scio, ubicunque latitudinem computem, semper ex mea hypothesi observatum locum in latum etiam reddi. Habeo itaque hoc ex Tychonis observationibus, qui a. 1593 mense Jul. et Aug. quasi miraculi loco annotat, latitudinem 14 diebus ante ☿ quadrante gradus fuisse majorem. Ego postea deprehendi, id mirum aut novum aut rarum non esse, nam in ☿ 45 diebus ante ☿ fuit minimus excessus. Idem deprehensum est pauciori dierum numero et in 3° ♀ oppositione facta. Tu putas, id in ☿ tantum fieri propterea, quod ☿ in apogaeo parum mutet distantiam a Terra. Suspicio est, nulla legitima conjectura, quam numeris probasses. Quid ☿ latitudinibus cum apogaeo ☿? An tu putas, si ☿ maneat in aequali distantia a Terra, ☿ etiam in aequali distantia a ☿ manere, itaque manere parallaxes orbis annui in latum? Quae enim causa facit diametrum ☿ apparere majorem, appropinquatio Terrae, eadem causa facit et latitudinem apparere majorem. Nec tamen sequitur, si Terra appropinquet, hanc in incremento esse, si discedat, in decremento: possunt enim sinus inclinationum Martis verarum et particularium majoribus increcere proportionibus, quam distantiae Martis et Terrae decrescunt et contra. Quare hoc phaenomenon non contingit in limitibus: tunc enim oppositio et latitudo maxima proxime coincidunt; non in nodis, tunc enim proportionibus diurnorum sinuum inclinationis particularis non vinci possunt ob suam magnitudinem a distantia ☿ a Terra, et si maxime vincerentur, insensibile esset. Fit ergo medio loco inter nodos et limites: maxime in ☿, ☿ ob vicinitatem utriusque itineris ☿ et ☿.


Sequitur quaestio, qua coelum Terrae misces te meque confundens et rem ipsam involvens, ut in his tenebris vix luculam eamque maligne perspiciam. Quaeris an centrum eccentrici ☿ re vera fixum sit in ☿? Minime, alias non esset eccentricus sed concentricus ☿. Et Tycho non eccentrici (quem nullum agnoscit), sed concentrici *ἐπικυκλοφορον* centrum in Sole ponit fixum, at non in vero loco ☿, sed in medio loco ejus; h. e. non in ipsissimo ☿ sed prope ipsum. Nosti enim hanc esse priorem quaestionem, cum adhuc planetarum eccentricitates cujusque proprias a communi centro separamus, omnino ut ante omnia quaeramus, Terrane an Sol sit in medio vel quasi, in centro vel quasi trium superiorum. Ptolemaeus Terram ait, Coper-

nicus et Tycho Solem. Quaeritur amplius, Martis motiones ad verumne Solis motum an ad medium sint referendae, quod perinde est ac si quaererem, linea apsidum eccentrici Martis per mediumne locum Solis an per ipsum corporis Solaris centrum transeat? Hic Copernicus et Tycho imitatione Ptolemaei stant a medio loco Solis, ego a vero loco. Invento centro vel quascentro communi trium superiorum, h. e. puncto in quo omnes lineae eccentricitatum trium superiorum concurrunt, jam is, qui eccentricum sequitur, sane eo ipso centrum orbis extra hoc medium dicit; qui concentricum cum epicyclo, centrum hoc ipso in hoc communi puncto, quod mihi centrum corporis Solaris est, collocat. Jam vide quomodo ego dixerim, Martem imaginarium punctum respicere, si ad medium motum \odot referatur, id est si anguli anomaliae eccentrici coaequatae stant ad punctum, quod est non ipse \odot , sed tale, quod monstrat medius \odot motus, quod interdum praecedat Solem, interdum sequitur, nunc supra, nunc infra Solem est; tum illi anguli stant ad punctum imaginarium. Ut intelligas, quid ego dicam imaginarium, crasse tecum loquar. Si anguli anomaliae coaequatae stant ad punctum medii motus Solis, vereor ut id punctum, si non sit ipse Sol, non sit par ferendae ingenti moli sphaerae Martis in Tychonis hypothesebus; vel, ut etiam in Copernico crasse loquar, vereor ut Mars id punctum, si non sit ipse Sol, ex oculis amittat. Tale enim punctum est quasi communis paxillus vel axis, a quo tres rotae seu sphaerae Saturni, Jovis et Martis circumportantur in Tychone. Fieri potest, ut his verbis aliud quoddam innuere voluerim, sed nolo multis conjecturis te confundere; mitto ista, si te impediunt. Non possum tamen praeterire verba tua: „Sol non est imaginarium punctum, et tamen ejus motus ut verus ita et medius consideratur.“ (v. s. p. 64.) Haec sunt verba se ipsum confundentis. Audi Fabrici: cum dico Solis motum medium, dico motum alicujus puncti, quod ante pone, supra infra Solem est. Imaginamur enim, eccentricum Solis moveri, ut centra ejus et mundi coeant; quem igitur situm et motum Sol in illo imaginario sphaerae situ et motu esset habiturus, cum dicimus locum et motum medium Solis, non quod ipsum Sol unquam conficiat.

Aliam jam affers objectionem: vereri te, si centra planetariorum orbium sint extra Solem, ut accessu et recessu eclipticae latitudines varientur. Nescio, quid velis. Quem dicis accessum et recessum eclipticae, in profundum an in latum? Ego nihil video, quod latitudinibus officiat. Forte tibi hoc suboluit quod apponam, quamvis mea opinione extra oleas. Sit A Sol, CD linea in plano eclipticae EF, B centrum eccentrici extra Sole. Hoc posito C apogaeum longius ab FE ecliptica digreditur, quam D. Hoc quidem vere ita fit, at non ideo anguli mutantur, sed manent iidem FAC et EAD. —

Nullus planeta vere duplicem habet eccentricitatem, nisi forte Luna in oppositione et quadratura, sed unam simplicem realem. Quam vero aequantis eccentricitatem dicimus, non est ista in planeta ipsa, sed nobis mensurandi causa ea fictione opus est. Planeta vero inaequalitatem illam conficit intuens in tale aliquod punctum eccentricum, unde diversae distantiae a Sole, fonte virtutis moventis, secundum quas etiam in diversa incitatione est et sic longiores moras necit

Fig. 15.




in arcibus viae suae aequalibus. Quare Sol longius vere (non apparenter) in apogaeo moratur quam in perigaeo; ad elongationem igitur virtutis concurrunt physica et optica causa tarditatis motus. —

Haec sequuntur responsiones Kepleri ad quaestiones Fabricii, diversissimas, quas locis supra citatis inseruimus. In fine epistolae redit Keplerus ad Martem, his Fabricio (ut prius Magino) rationem suam procedendi explicans, quam secutus est Cap. XVI. et XLII. Comment. Martis:

Jam ponam, quae duo toties a me petis.


Fig. 16.



Sit A Sol, B centrum eccentrici Martis, C centrum aequantis, AG, AF, AE, AD quatuor loca Martis in quatuor oppositionibus cum Sole veris. Ex quibus dantur anguli ad A. Anguli vero ad C dantur ex mutua tractatione quatuor anomaliarum verarum simplicium, temporibus respondentium, etsi falsus sit hisce seculis motus anomaliae, modo vere constet, ut constat quidem, restitutio integra quam proxime. His datis primum pone aliquam anomaliam pro vera, et sit illa vera, quam dant usitatae tabulae; ponuntur ergo anguli HCF, HCG, HCD, HCE. Secundo pone aliquod apogaeum seu potius aphelium;

ponatur id primo, quod dant omnes tabulae. In triangulis igitur F, G, D, E super communi AC stantibus dantur omnes anguli; assume AC in quacunque mensura, puta 100000, et computa latera AF, AE, AD, AG in proportionem AC. Habes triangula DAE, DAG, GAF, FAE, in singulis duo latera cum comprehenso; quaere ergo et angulos ad bases. Quando ergo composueris AFG, AFE, item ADE, ADG, debent hi duo oppositi D et F in quadrilatero in circulo aequari 2 rectis. Si non aequantur, mutanda est positio posterior apogaei, retenta positione priori anomaliae, idque faciendum toties, donec bini oppositi in quadrilatero aequantur duobus rectis; et tunc scio, quod positio apogaei (posita hac anomalia media) vera sit. Nulla arte scitur, sitne progrediendum an regrediendum apogaeo, oportet periculum facere. Semel autem animadverso quid proficiatur in aequandis duobus oppositis quadrilateri cum 2 rectis, si progrediamur vel regrediamur, et quantum etiam, jam nobis sunt oculi aperti ad proportionaliter semper propius accedendum. Quando ergo F, D duo recti sunt, h. e. quando per motionem et variationem apogaei D, E, F, G acumina angulorum in circulo fuerint recte, jam accedendum erit ad probandam priorem positionem anomaliae simplicis, verane fuerit an falsa, in hunc modum: in $\triangle GFE$ dantur latera cum comprehenso F, quaere basin GE cum angulis adjacentibus; et cum scis, quod GBE sit duplus ad GFE, quia in centro, ergo dantur in GBE, ex latere et angulis crus GB vel BE aequalia in proportionem AC, quod serva. Rursum in $\triangle GAE$ ex GAF et FAE junctis datur angulus GAE, et latera AE, AG dabantur; modo et GE dabatur, poterisque quaerere propter consensum ex GA, AE. Dantur hinc et AGE, et prius BGE, junctim ergo BGA (potest esse casus, ut subtrahendi sint¹¹). Ergo in $\triangle BGA$ dantur BG, GA, $\angle BGA$, quaeritur BA, et GAB. Ponebatur autem et verificabatur prius GAC, GAH ex apogaeo, est n. anomalia coaequata hujus loci. Si ergo EAH et EAB aequales, verificata est positio prima quoque; et sic porro. Sin minus, o improbum laborem, tunc oportet novam facere positionem &c. — Ubi per secundam positionem iterum ad finem est ventum,

Fig. 18.



eccentrici Martis in E puncto, BE parallela motus medii Solis. Distantia A et B centrorum utriusque orbis aequat eccentricitatem Solis integram.

Nota: Semidiameter minoris circelli aequat distantiam centrorum utriusque orbis; Solis quidem (absque aequante) et mei $1\frac{1}{2}$ eccentricitatis Solis. Hinc etiam indagari poterit causa utriusque eccentricitatis in Marte idque melius quam in tua.

Cum igitur in parallaxibus tu ad centrum A totam parallaxin inquiras, quae ad C, deinde ad B inquiri debebant, hinc fit, ut quanto centrum eccentrici Martis in Sole altius a Terra profertur quam debeat, videlicet ad quantitatem AB (ratione hypothesis), tantum oportet te rursus detrahare ab eccentricitate, vel quod idem est a distantia Martis a Terra, ut verum parallaxeos angulum consequaris.

Hic tibi ostendo veram causam tuae subtractionis, quam tu ex tua hypothesis commode defendere non poteris, et sic vides, centrum eccentrici in alio orbe vehi et frustra aequantem Soli tribuis. Si mea Uranica scripta apud me fuissent, omnia fusius declarassem. Hanc hypothesis multis nocturnis et diurnis cogitationibus effinxi et puto veritati responsuram. Constitueram eam hic ruditer effectam calculo comprobare, verum incidentes belli motus impediverunt; attamen valde placet, cum non vicaria hypothesis opus habeat, ut tua.

Commensationem a me in hac constitutam quantum in memoria teneo adscribo: Eccentricitatem Martis simplicem accepi 20050, semidiameterum majoris circelli 16280, minoris 3790; distantia centri orbis a Terra ad $\frac{1}{2}$ eccentricitatis Solis constituta. Anomaliam Martis aequabis per angulum CEB, per cognita latera CB, quod dimidia Solis eccentricitati aequale et BE radius et angulum ECB. Quaeso examines et calculo comprobas. Ego reductione Tychoniana ad tempus hoc usus sum et etiamnum utor, quare in hac hypothesis idem tu facias necesse est. Exacte omnia nondum ut dixi (ob illatum his regionibus bellum) constitui. (Keplerus: Ego vero non praeconcupio integram hypothesis quam postea comprobem; plurima pono principii loco, inde sequor observationes.) Sic tu aperte vides, Martem non verum sed medium Solis motum eccentrici sui centro aemulari. Exspecto tua fulmina imperterrito animo. Mihi placeo in mea, ut tu in tua. Miraberis imaginarium illud punctum vel centrum eccentrici tantum posse quam Sol in tua potest. Non dico quod tuus calculus in Marte a vero declinet, nondum enim haec comprobavi, et dico, hypothesis tuam imperfectam esse, cum ex una motus mensurare non valeas, nec subtractionis 2240 partium ab eccentricitate Martis rationem demonstrabilem reddere possis. Potest etiam haec mea ad verum motum accommodari, sed nondum tentavi. Quaeso mihi tuum iudicium censuramque libere et ingenuè patefacias.

Has sequebantur litterae Fabricii d. d. 10/20. Februarii, in quibus Martem intactum relinquit, sicut etiam in literis d. d. 14/24. Martii. In literis vero d. d. 7/17. Maji 1603. haec legimus:

Miror et valde miror, praestantissime D. Keplere, te tanto temporis spatio nihil litterarum ad me dedisse, cum tamen ternas aut etiam plures interim diversis temporibus scriptas a me acceperis, quas tibi a Cancellario Ostfrisco D. Thoma Francio, tui amantissimo, probe traditas fuisse nihil addubito. Si vero redditae non essent, ab ipso vel ejus secretario repetere eas poteris. Dedi quoque alias D. Andreae, Domini Minquittii secretario.

Contenta priorum litterarum non repeto, cum multa sint, addo tantum pro more et amore Uranico nonnulla.

In enucleatione lateris, quod in orbe annuo parallaxibus subtenditur, tu diversos modos in literis videris indicare, quorum tamen nullus (si modo sententiam tuam recte percepi) veritati respondere deprehenditur: vel ex loco Solis vero et dimidia eccentricitatis Solis latere et semidiametro orbis; vel 2) ad mediam anomaliam addis dimidiam aequationem, et nescio quibus lineis eam applices; 3) dicis, eodem modo investigari illud latius, quo distantia Martis vera investigatur. Jam non intelligo, quomodo haec consentiant, et cum tu Copernicanam hypothesis in Sole retineas et omnia invertas, eo minus omnia apte cognoscere potui. Faceres igitur meo iudicio rectius et utilius, si ad systema Tychonis vel motum Solis omnia constitueres et unum eumque exactum mihi modum (quem sequendum putares) ostenderes. Qua de causa te hisce rogatum volo, si vacat: sin minus, nolo te gravare *παρρηγως*.

Quae de hypothesis a me constituta ante annum vel $1\frac{1}{2}$ tibi proxime significavi, easi nondum exacte comprobata, quomodo tibi placeant scire cupio; ego certe mihi placeo in ea. Tu retinendo orbem Solis ad salvandos motus Martis in labyrinthos incidis et varia imaginari cogeris, jam addendo jam subtrahendo vel hoc vel illo modo angulos transformando. Vana

hypothesis iis non indiget, hoc certus sum, nec ulla in contrarium argumenta valebunt, si veritatis rationem habere velimus.

Jam Fabricius quaestiones affert de rebus astrologicis meteorologicisque, brevi post autem (d. 18/28. Jun. 1603) ad Martem redit, praemissis ut solebat querelis ob Kepleri silentium. Keplerus ad priores literas (d. d. 18. Nov. 18. Dec. 1602, 9. 11. et 20. Feb. 1603) simul respondit in longiori illa epistola (paginarum in folio 26), data 4. Jul. 1603, quam diximus et ex parte excerptimus Vol. I, p. 324 et Vol. II, p. 95. 414. 433. 752.


Quae ad Martem pertinent, haec sunt:

Ad ea, quae scripsisti 8. (18.) Nov. primo. In sola latitudine Martis haeres. At interea scripsi de ea sufficienter ex fide observationum Tychonis.

Ad eas quas scripsisti 8. (18.) Dec.: Placuerat bisectio eccentricitatis Solis, nunc eam accusas perversae hypotheseos Martis. Movet te hypothesis non sibi sufficiens, sed adsciscens quasi in auxilium alteram succenturiatam, quae falsa sit. Audi Fabrici, sola vera sibi sufficit, sed tu et ego ejus nimium operosa dictata nequimus exsequi. Summa haec est: Mars circulari lege Soli appropinquat, aequales epicycli arcus conficiens temporibus aequalibus. Ad singula vero momenta sui accessus ad Solem mutat modulum suae celeritatis. Nam in apogaeo tarde (circa proprium eccentrici centrum) voltitur. Et tamen ad singula momenta distantiae suae a Sole monstrat certum suae celeritatis modulum. Collectione igitur omnium distantiarum, quae sunt infinitae, habetur virtutis effusae certo tempore summa, igitur et emensi circa centrum eccentrici (adeoque et circa Solem) itineris. Ito tu jam et vel infinita ejus viae puncta, vel arcus in minutissima sectos, puta in dena scrupula, computa: invenies idem, quod ego invenio ex hypothese vicaria, vix dimidio scrupulo deficiente. Ego vero citius ero expeditus: tibi ab apogaeo incipiendum et per minima erit eundem, quare immanem laborem hauseris. Ad compendiosam vero solummodo calculationem genuinae hypotheseos et cujuslibet loci eccentrici seorsim sine diductione per minima usque in apogaeum aliquid mihi deest: scientia geometricae generationis viae ovalis seu facialis (*μεταποιεῖδος*), ejusque plani sectionis in data ratione. Si figura esset perfecta ellipsis, jam Archimedes et Apollonius satisfecissent.

Ego primum meam bisectionem genuinis et propriis principiis demonstrabo; sic ipsam facile hac criminatione corruptae sphaerae Martis sum liberaturus; adeoque in tuam gratiam transformavi hic omnia in formam Tychonianam sic, ut pomposa Tychonica sedem occuparet mediam, Copernicus ad lateris angulum se receperit.¹²⁾ Principii loco pono, Martis motui vero in eccentrico nullam aliam inferri variationem, quam apud Tychonem annuam a Sole circumlationem, apud Copernicum plane nullam. Id non tantum ab omnibus omnino astronomis est receptum, sed et rationi consentaneum. Ergo post integras anomalias Martis, quae certo dantur in tempore ex confessione omnium, erunt anguli AHG, ATF &c. ae-

Fig. 19.



quales, et lineae HG, TF &c. aequales, ubicunque Sol sive Terra in suo orbe consistat longe vel prope. Sunt autem HL, TL &c. omnes parallelae, quia apogaeum insensibiliter interea procedit. Neque tantum GH, FT &c. lineae aequales erunt, sed etiam si ex Martis locis in medium Solis locum lineae ducerentur; quod addo, ne tibi suspicionem moveat, quamvis haec mentio meo instituto non sit necessaria. Tertio ex calculo Tychonis dantur vera loca linearum AH, AT &c. sub fixis, quare et anguli HAT, TAE &c. vel in Copernico $\theta\alpha\eta$, $\eta\alpha s$ &c. (fig. ad Cap. XXIV.). Quarto ex observatione dantur certissima loca linearum AG, AF &c. sub fixis ad omnia loca Solis. Quinto θ , η , ϵ , ζ vel H, T, E, S praesupposita sunt esse sensibiliter in uno circulo. Quare his plane assumtis, non pluribus non paucioribus, necessitate triangulari datur proportio omnium AH, AT &c. ad HG, TF &c. Id etiam tentavi ductis rectis ex δ in locum Solis medium, secundum eccentricitatem 3600. Nam inventus est ille medius Sol inaequaliter distare a Terra ideoque non vere esse medius Sol.


Porro ex datis longitudinibus AH, AT &c. sic ordinatarum plane necessario sequitur certa aliqua eccentricitas eaque 1800 proxime, plane ut et ratio naturalis suadet. Hic te, Fabrici, virum praesta et non illa Christmanniana argumentandi forma me oppugnes (comp. Vol. II, pag. 431), cum principia videas ob oculos, quibus dissolutis ruet quod superaedificavi, stantibus stabit contra omnes Martiae hypotheseos furores. Nam ut jam pergam, stantibus his stabilitur una locus lineae HG sub fixis (quamvis hic etiam ex observatione haberi possit, si altera ex his 4 observationibus sit *apogaeos*, ubi Mars exiit parallaxi et spectatur in suo vero loco eccentrico, in quo etiam est post integras revolutiones, ubicunque tum Sol sit), stabilitur etiam proportio GH ad quamcunque ex A(α) ad radium ejus circuli, in quo sunt omnes H, T, E, S vel omnes θ , η , ϵ , ζ . Consimili plane methodo invenitur eadem distantia δ \odot , si δ sit circa apogaeum, et si sit circa perigaeum et si circa longitudines medias. Comparatione igitur facta invenitur E \odot eccentricitas et HG longior, quam ut vel in hoc vel in altero semicirculo stare possit. Unde discitur, Martis motum esse figuram ovalem, quod rursum physicis rationibus apprimè consentaneum est. Quare si motus intenditur cum appropinquatione δ et \odot , statim sequitur, ut hactenus quidem geometria fuit exulta, δ locum eccentricum computari non posse compendiose. Quaeritur ergo punctum circa B, circa quod quamvis imaginarium calculus compendiose procedat. Id autem quaerere necesse non est. Jam enim inventum est, cum acronychiarum observationum calculus per quaternas observationes institueretur.

Quid hic, quaeso, duplex Solis eccentricitas? Age paciscere mecum, utere Tyconica antiqua hypothesi acronychiarum, quae omnibus locis ad 7' circiter satisfacit dissimulato hoc errorculo. Postea utere hac forma demonstrationis, et sit tibi H locus Solis medius et HAT vel $\theta\alpha\eta$ anguli ex mediis motibus Solis prodeant, invenies nihilominus AH, AT &c. inaequales et eccentricitatem 1800, cum illas aequales, hanc nullam esse decuerit. Invenies E \odot eccentricitatem eccentrici longe aliam (saepius et in vario δ situ, in apogaeo, perigaeo, longitudinibus mediis ex B oppositis, iterata tota pragmatia) quam habiturus es in hypothesi acronychiarum, invenies duas δ a B distantias in mediis longitudinibus oppositis, breviores quam est HG(?). At quia omnia ad medium motum Solis reduxisti, invenies longiores in altero semicirculo, quamvis aequaliter ab apogaeo distent. Et alia

multa anomala contingent. Occurrendum est etiam sic tuae suspicioni: si causa ancipitis hypotheseos (quam tamen jam explicavi) esset in eccentricitate Solis, certe apogaeo \odot et \odot 48° distant: impossibile igitur esset, ut mihi idem in uno semicirculo prodiret, qui continet apogaeum \odot , quod in altero, qui perigaeum \odot habet. Atque ecce, in sequentibus tu te ipse arripis tibiue objicis ipsi, utramque inaequalitatem ab eccentricitate et \odot et \odot a suo incipere principio et confundi (v. s. p. 71), quamvis tu in alia materia usurpas. Nempe per apogaeum \odot speras aequantem Martis tollere, frustra hoc ipso argumento, quod aequans ex nudis acronychiis exstruitur, ubi \odot plane nihil facit, sed est, ac si \odot ex ipso centro mundi spectaretur. Mi Fabrici: gratiam quidem meretur tuum veritatis studium et sollicitudo. Ceterum haec res non agitur conjecturis et suspicionibus talibus. In aeternum nihil certi nancisceremur, nisi aliqua certa et firma praemitteremus. At tu putas, quod ego prius mihi fingam aliquam concinnam hypothesin, in ea exornanda mihi ipsi applaudam, postea deum illam ad observationes examinem. At longe falleris. Verum est, ubi hypothesis observationibus exstructa et confirmata est, postea mirifice gestio, si in ea naturae aliquam concinnitatem inveniam. At nunquam antea plane concludo. Ego sesquianno prius mihi de bisectione eccentricitatis somnia physica finxi, quam plane concluderim. Nam pro 1800 semper 2300 prodibant. At errores erant in observationibus male deductis ad eclipticam, quas tanto post tempore demum deprehendi. Iis sublatis celerrime 1800 prodire, et ex omnibus pragmatiis, quarum non minus sex, quasdam senis instructus revolutionibus pertractavi. Tunc sane mirificus apud me ortus est consensus, concurrentibus confertim et cum impetu mentis hinc observationum, inde physices ratiocinationibus.

Nam ut tua quaestionum vestigia continuo sermone sequar: scito (et puto me jam saepius inculcasse), aequantis causam esse *φωτισμένη*: non tamen ejus aequantis, quo nobis ad compendia calculi est utendum. Nam is per suam ipsius causam, qua locis eccentricis satisfacere demonstratur, arguitur falsitatis circa dispensationem distantiarum et viae planetae. Requirit acronychiae eccentricitatem AB, aequantem BC, docebo ego ex causa physica sine parallaxium auxilio (quamvis hae me primum docuerint) ex AB, BC inquirere quantitatem DE verae eccentricitatis, quae est dimidium de DF paulo brevior quam AC. Haec DE vera eccentricitas dabit veras distantias et viam \odot veram atque etiam loca \odot vera, sed laboriosissime.

Fig. 20.



De latitudinibus Martis satis inquiete. Prius placueram. Si via longitudinis, inquis, est ovalis, poterit et via latitudinis esse tortuosa, quare reductio Tychonis vera, tua vero, Keplere, opinio impingit in malam eccentricitatis ordinationem. O praedatorem! quam egregie mihi fugiendo negotium exhibes, nullam munitionem obsidens, nunquam aperto Marte congregiens. Quid opus suspitione? Ovale ego figuram primum ex observationibus demonstravi, postea naturali speculatione roboravi, sic ut ex duobus aequalissimis principiis unum tertium inaequale prodiret. Tu si tale quid praestiteris cum tua tortuosa latitudinis via, viceris, et ego inutiliter Tychonica taxaverim. At qui possis, cum haec tortuosa via latitudinis sequatur ex mea hypothese longitudinis, quae nondum est eversa, ne quidem obsessa? Nam tu quidem contra eam solita pila jacularis, suspiciones inutiles princi-


pium petentes. Id proba, male habere meam eccentricitatis ordinationem, destructis iis, quibus videas supraedificatam.

De aequipollentia hypotheseon sentio plagam in digito pedis minimo. Fateor, minimum aliquid mutandum est in dimensionibus, ut aequans Ptolemaicus et epicyclium Copernicanum paria faciant. Neque sic tamen plane aequipollebunt, si quis infra secunda scrupula posset descendere. Causam quaeres in Copernico, ubi de trium superiorum inaequalitate in genere agit.

De miraculosa, ut ais, Martis latitudine identidem tibi repeto, nihil me ex mea hypothese dixisse, adeoque ne quidem tentasse, sed ex ipsissimis observationibus cum esset Mars in λ . —

Revocas me (in literis d. 1/11. Febr.) ad theoriam Martis. Supra multa. Sequar te tamen. Causam petis probabilem, cur, postquam constitui acronychia eccentrici loca per certam eccentricitatem, ab ea postea in quaerendis parallaxibus aliquid demam? Respondeo: vitium omne ne sic quidem abest, cum aucta utar eccentricitate, nec plane loca ad unguem reddi possunt, si libet ἀκριβολογῆν: sed esset utendum justa eccentricitate, sed per operationem plani ellipsoidis seu metopoidis. At per vicariam et auctam eccentricitatem compendiosius et intra sensus subtilitatem descenditur. Aequipollent enim secundum magis et minus variae hypotheses. Primum, si utaris immanissima eccentricitate, nihilominus in apogaeo et perigaeo loca sequuntur, dummodo apogaei locus et revolutionis tempus verum habeatur. Reliqua loca omnia vitiose prodibunt. Deinde per eccentricitatem totalem quatuor loca in apogaeo, perigaeo, intermediis constitues vere, deerit aliquid locis ceteris omnibus: sic tamen ut nihil impediti fuerint veteres hoc exiguo defectu in Lunae motibus investigandis. In δ adhuc major eccentricitas Solis magnum in octantibus facit errorem.

Fig. 21.



Nam si BA tanta eccentricitas, quantam requirit BDA angulus aequationis maximae, tunc si BG, BD sint radii et GBC simplex anomalia, cadit AC nimis in consequentia, etiamsi AG, AD officium faciant. Ut ergo et AC plus in antecedentia secundum requisitum observationum inveniat, oportet ducere AF et tamen manere GBC anomaliā simplicem seu mensuram, aequalitatis; ergo sit sectio in F, quare FB minor quam CB, sit ergo aliqua aequalis CB vel DB radio, sit FE, sic ut FE, ED jam sint aequales. Itaque octo locis in ordinem redactis patet, qualiscunque hypothesis vera sit, haec tamen hypothesis una officium facit, etsi nonnihil reclamarent adhuc, quae inter GF et quae inter FD, si major esset eccentricitas. At ut in Sole locus C, referens quatuor loca ex simplici BA eccentricitate, nonnisi $1\frac{1}{2}'$ reclamant, ita jam in Marte sedecim loca intermedia minus reclamant: quamvis nec prius Solis, nec jam Martis hypothesis vera sit. Sit jam (Fig. 22) INKO perfectus circulus Martis et HP vera eccentricitas. Et quia ex causis physicis HI est longior quam PI, tardus igitur est planeta in I motu circa Solem; aequabilis vero est motus in epicyclo, quo accessum ad Solem conficit (quia ille ex Sole alienus et hic proprius est, ille a vi per spatium extensa magis magisque attenuata, hic nutui similior nullam capiens intensionem causa spatii, quia in ipso planeta semper), praecurrit

super arcum IO seu ejus angulum genuinum IPO seu planum IPO, sic ut anomaliae simplici, quae repraesentatur plano IHO, respondeat de eccentrico IO arcus seu IPO angulus, de aspectu vero IHO angulus. Haec si quis diligenter ad calculum revocat, is inveniet, sicut se habet angulus POH ad 360° sic se habere quam proxime aream IPO ad circulum, qui repraesentat iterum anomaliam 360° . Quare in hac hypothese physica cum perfecto circulo angulus aequationis et area trianguli sui in hac forma physica quam proxime faciunt aequalia adeoque tantundem, quantus est angulus BDA (Fig. 21) fere, ubi BA duplum est ad PH. Ergo hinc fit argumenti formae talis: eccentricitas maxima serviens longitudinibus mediis in sitibus acronychiis est dimidianda (pro annuis parallaxibus, testibus artificibus). Eccentricitas maxima, si fiat causa aequationis physicae, etiam dimidianda est (pro reddendis longitudinibus mediis aequatis in sitibus acronychiis). Ergo physica serviens acronychiis servit etiam parallaxibus et proinde vera est. Nam dimidiata (dimidiata id est bifariam dispartita inter puncta aequantis eccentrici et centri mundi) sicut in priore praemissa non servit acronychiis omnibus, Tychohe observante in Marte praecipue.

Atque haec quidem magno cum gaudio sic inveneram, persuasissimus nihil deesse huic considerationi. At non poteram acronychia loca in octavis circuli intra 7 vel 8' conciliare, si vel centies repeterem. Adeoque plane destiti existimans, vitium esse observationum. Duodecim tamen erant in promptu loca observata; saepe ad vicariam redii, dum cogitarem, illam ex quatuor observationibus exstructam omnibus duodecim accurate satisfacere. Interim obstabant illi parallaxes annuae. Desperata res erat. Ipsa desperatio spem ostendit. Manum enim de tabula tollens adque parallaxes annuas transferens, dum investigarem proportionem radiorum \odot et \odot (vel δ) deprehendi, mirabile dictu, IK (Fig. 22) tam longam esse, ut descripto super IK semicirculo INK nimis brevis esset hoc situ. Inciderat autem, me IK per corpus \odot descendere fecisse, non per medium locum \odot ; quare suspicio incidit, quanto ILK deficiat a semicirculo tantum IOK excessurum: itaque pedem revocandum nec alligandum motum δ ad verum \odot . Statim itaque probavi invenique eadem et in altero semicirculo, ut vanus metus fuerit vereque patuerit, δ ad latera ingredi utrinque. Incidit itaque de anomalia alia longitudini LH concilianda, fecique RHI angulum tantum, quanta erat anomalia media, usus hac fictione: si LQI esset transpositus in LHI, tum RH et LH sint futuri aequales (fingens Martem, numeratis quasi circa H Solem gradibus aequalibus anomaliae simplicis, tantundem epicycli lege LH lineam curtare seu ad H descendere). Hoc facto utroque in semicirculo, plane tantus jam apparuit excessus, quantus prius erat defectus. Ex quo patuit, non HR sed HS et HL esse aequales, hoc est Martem non secundum RHI variare distantiam suam LH, sed secundum SHI: sic curtare LH, ac si adhuc dimidia aequatione inferior spectaretur ex Sole per lineam HS, item ac si fecisset plus quam LPI angulum in eccentrico, nempe dimidia aequatione LPS majorem, sc. SPI, qui est aequalis LQI, quem hactenus jussimus anomaliam mediam repraesentare. Sic ergo δ dispensat suas distantias IH, LH, KH circa \odot ac si aequabili motu circa P centrum eccentrici ferretur: et per aequipollentiam δ in epicyclo aliquo, cujus semidiameter PH, aequalibus temporibus aequales portiones conficit; et jam statim aperta mihi via fuit ad ea quae supra praemisi et carcer dubitationum reclusus: itaque continuabo jam, quod supra suspensum erat. Si perfectus esset circulus

INKO, tota anomalia significaret circuli aream, quae major est area ellipoidis, itaque divisa in aream circuli constituit PO. At jam non est circulus sed ellipioidea, minus conficit et metitur totam anomaliam, ergo plus de anomalia cedit radio. Duobus igitur nominibus eccentricitas fit minor quam in perfecto circulo, cujus dixeramus esse dimidiam eccentricitatem ejus quae in vicaria. Nam primo quia ex divisione prodit quantitas radii PL, PX, ideo qui sunt supra PL et infra PX longiores, plus vindicant de anomalico tempore. Tempore igitur in medio attenuato circa L, M, eccentricitas quoque in proportionem attenuabitur, praesertim cum ab I multo plures occurrant longiores quam a K. Deinde fit aequatio optica POH, et HPO rectus, debebat igitur ei aequalis esse PLH, ubi iterum HPL rectus, cum autem PO hoc est PN sit longior quam PL, erit igitur et PH in perfecto circulo longior quam PH in deficiente. Ex his etiam patet, cur prius in perfecto circulo observationes octantium conciliare non potuerim. Tempora enim accumuluntur versus apogaeum et perigaeum contra omnem circuli legem. Vicaria vero hypothesis eo ipso in loco accommodata fuit, ubi maxima differentia, sc. in octantibus, quare nil mirum, vicariam officium in eccentricis locis facere. Haec omnia eo spectant, ut videas, qui fiat ut physica dimidiet aequantis eccentricitatem, cum vicaria plus dimidio sumat: etenim ne dubium existeret in ellipioide, prius demonstravi, hoc fieri debere in perfecto circulo, ut dimidium sumatur; postea in ellipioide minus etiam dimidio opus esse patuit.

Quid jam habes amplius quod te offendat? An quia compendiose nequit calculari? Nihil nobis, mi Fabrici, praeter geometriam deest. Doce me geometrice constituere, quadrare, secundum datam rationem secare ellipoides; statim docebo te ex genuina hypothesis calculare. Adeoque excita illa tua Belgica ingenia, ut hic me juvent. Eo usque perveni, ut sciam, circelli seu epicycli plano summam contineri defectus. Quomodo vero sit hoc spatium distribuendum ignoro, ut cuilibet portioni eccentrici plani suus defectus adjudicaret. Hoc scio mechanice seu per tentamenta numerorum, si ex A centro mundi lineas educam, et si BAGLFB aequale est spatium spatio CEKHDIC, majus tamen esse FAB spatio ECD, non obstante quod, si CAK rectus, tunc BFLAB aequale esse possit spatio KECDI et LAG spatio KHI, itaque brevius KHI aequale longiori KCI, quia hoc exilius, illud latius. Quodsi hoc solum sciretur, quanta esset portio ECD, KCI, computatio facilius esset quam in quavis alia hypothesisi. Possumus tamen inire rationem calculi, distributa ellipoidis orbita in partes 360 aequales, seu potius ex termino cujusque arcus educta linea ad centrum A . Tunc enim fient 360 aequibasia triangula, verticibus in A Sole coeuntia. Sciturque primi altitudo AC , fingitur alterum crus aequale, quia parum deest. Datur igitur area trianguli primi in proportionem areae CKH seu CIH subtracto defectu. Ex quantitate hujus trianguli datur tempus seu anomalia, ex anomalia altitudo secundi trianguli, ex altitudine area, ex area tempus et anomalia, quae juncta priori anomaliae ostendit altitudinem tertii trianguli, et sic consequenter usque ad 360. Praecipere equidem possum, tu exsequere.

Describe mihi et tuam hypothesin et petis, ut calculo examinem. Sed




Fig. 23.

quia addis, te sperare satisfacturam observationibus, et cogitationibus effinxisse: non faciam, inutilis labor. Es etiam irritandus. Ego vero non ut tu praeconcupio integram hypothesin, quam postea probem bona spe. Nam fallit nos aeternum spes haec. Pauca pono principiorum loco, inde sequor observationes.

Ad ultimas 7. (17.) Maj. 1603.

De computanda distantia Solis et Terrae quereris, te confundi tribus modis, unum optare. At ego ne confunderem, tertio loco te ad similitudinem quaerendae distantiae Solis et Martis ablegavi. Ipse vero primus modus, si minuta sectemur, habet hanc ipsam similem operationem et verissimus est. Secundus vero compendiosus quidem et in sensum nihil peccat, distrahit tamen Solem in operatione a similitudine ceterorum.

Igitur hoc habe praeceptum: cognito vero loco Solis si cupis ejus a Terra distantiam cognoscere, primum vide, quantum ab apogaeo distet; deinde adde huic distantiae ab apogaeo dimidiam aequationem ejus loci; tertio dic: ut sinus hujus auctae distantiae ab apogaeo ad totum, sic sinus illius verae distantiae ab apogaeo ad distantiam Solis et Terrae. In Marte puto propemodum idem locum habiturum, tu ipse periculum facias. Sin autem nimia eccentricitas non fert hoc compendium, mane ergo in proprio modo Marti adscripto.

Fabricius, non exspectans Kepleri responsa, die 18.28. Junii haec dedit Keplero: Juxta tuam hypothesin exempla aliquot \odot calculavi, sed veritatis scopum non attigerunt, quod speraveram fore. Video nondum sufficere tuam hypothesin observationibus. Ego ex variis exemplis cognovi, motum quandam annum commensurabilem Solari inesse Marti. Acronychia respondent hypothesi, at in locis extra acronychia non item. Non sufficit, aliam ponere eccentricitatem pro distantis in circulo Martis, sed oportet etiam motum commutationis Martis annum considerare, in quo omnis diversitas latet, non in ipso orbe aut orbis Martis dimensione, sed orbe annuo. Miror igitur, te in exemplis hoc non animadvertisse. Vide exemplum: anno 1587. 9. Jan. h. m. exstat Tychoni \odot in $2^{\circ} 47' \approx$; 1602. 18. Junii h. 10. p. m. \odot juxta meam exactam observationem in $27^{\circ} 43' \approx$. Tua hypothesi dat $28^{\circ} 12' \approx$, si recte memini. Sic etiam in aliis quae adhibui exemplis.

Quare ut diligentius tuam hypothesin consideres moneo, et motum commutationis exactius et penitius examines. Haec sane cum per calculum vera adinvenirem, libere tibi scribere non sum veritus.

Miror, Copernicum, Regiomontanum, Ptolemaeum et alios ex observatione aliqua semidiametri orbis annui proportionem ad orbem Martis inquirere voluisse, non aliter ac si in ceteris ita quoque esset, cum tamen ex universis exemplis longe alia detur semidiameter orbis, idque juxta quam virtute distantiarum (de acronychiis nunc loquor, ne distantiarum mutatio in aliis locis nobis hic quicquam objiciat), si distantiam acronychiam sumseris, angulum parallaxeos et angulum commutationis verae vel distantiam \odot a linea coaequata medii motus (biduo ante vel post \odot et \odot), et sic a posteriori inquisiveris semidiametrum, ex his per proportionem anguli ad distantiam \odot a \odot datur semidiameter minima in perigaeo \odot et maxima in apogaeo, propterea quod hic longior illic brevior distantia sit. Quare, quomodo Copernicus adhibitae distantiae \odot adminiculo veram proportionem orbium adinvenire potuerit? Cur semidiametrum orbis semel inventam ubique retinuerit, cum hoc nequaquam fiat re vera? Examina tu omnia acronychia loca, vel potius quae biduo ante vel post \odot veras contingunt, ergo vera semidiameter semidiameter vera non erit, nisi quae ex media distantia \odot 10000 datur in mediis locis, et retineri tamen in hypothesi nec potest nec debet; hinc quoque puto multam diversitatis accidere. Tu quidem semidiametrum orbis varias constituis juxta dimidiam eccentricitatem Solis 1800; sed parum hoc est ad excusandum illam diversitatem, de qua ego nunc scribo, cum ea tanta sit, quanta est tota eccentricitas Martis. Quaeso mihi hunc nodum latius explices, nam me mire perturbavit. Ego in calculando nunc plura invenio, quam unquam putassem. Quaeso mihi ad omnia semel rescribas et de tuis hypothesibus ukenus advehas, praesertim quod ad semidiametrum orbis annui attinet, idque per exemplum.

His ex parte satis perplexis verbis addit Fabricius in schedula perenigna: „P. S. Quaeritur an inquisitio eccentricitatis non possit perfici per dimidios arcus et sinus in semicirculo,

quod Copernicus per subtensas in toto circulo facit? Quod si fieri potest, quaeritur quomodo? iam ego magnam differentiam utriusque calculi invenio; quare unicum exemplum saltem declarando proponas. 2) Quaeritur, quomodo Tycho verum apogaeum venatus fuerit, quod ego ex 3 acronychiis consequor? 3) \odot mediae in abaco acronychio Tychoniano in tempore non se recte omnes habent."

His literis statim Fabricius sexto post die (4. Jul. 1603) alias subjunxit, quarum summa haec est: Gavisus sum magnopere, quod per te restitutus nobis esset Mars, sed audium meum post in maiorem tristitiam conversum fuit, cum per experimenta varia cognoscerem, observationes tuas hypothesis non respondere.

Deinde repetens exempla annorum 1587 et 1602 pergit: Cum tua hypothesis apud me in dubium venisset, ego inquisivi in illius fundamenta per observationes certas et cognovi notum \odot adeo implicitum et varium, ut paene desperaverim de motuum restauratione per illum conficienda.

Tu duplici correctione inaequalitati \odot consulere vis: 1) correctione distantiarum a Sole 2) orbis annui. Ego omnino puto, distantias retinendas esse (cum in prosthaph. acronychiarum optime respondeant) et potius de causa inaequalitatis orbis annui cogitandum esse. Tu vero et orbem \odot loco epicycli \odot habeas, ex una correctione duplicem facere cogeris et tamen \odot non satisfacis. Quare ut omisso orbe annuo \odot proprium \odot fabrices suadeo et res ipsa iubet, cum coelo non satisfaciat. Nam hanc solam esse causam duplicis tuae hypotheseos constituendae video, quod \odot orbi annuo alligare vis; facis idcirco dimidiam eccentricitatem \odot , ut \odot sic consulas, sed frustra. Nam dimidia illa eccentricitas Solaris non satisfacit ad inaequalitatem orbis excusandam nec mutilatio illa distantiarum a Sole. Quare ut retentis distantis cogites primum de varietate epicycli vel orbis moneo. Inaequalitas a te constituta sane varietatem non excusat.

In margine addit Fabricius: quae de orbis inaequalitate, non ab apogaeo \odot sed \odot incipienda scripseram (delevit dimidium eorum, quae in priori folio scripserat), falsa postea cognovi et paulo post (v. infra) clarius designavi.


Invenio maximam differentiam semidiametri orbis (retentis ubique distantis eccentrici ex calculo provenientibus) in apogaeo \odot ; per acronychium \odot illic existentis datur 6300, in anno 87. 8. Jan. $2^{\circ} 47' \approx$. Contra Marte in ipso hoc suo apogaeo existente datur epicycli semidiameter 6587 (anno 97.); in perigaeo Solis existente Marte anno 91. datur semidiameter 5700 circiter... Differentia semidiametri in apogaeo Solis et ipsius perigaeo ad 2° fere attingit. Causam huius inaequalitatis veram ut dicas rogo. Debebat certe unus epicyclus omnibus distantis adhibitis ubique convenire, sed non facit.

Etiam hoc tibi proponere placuit, quod in exercitationibus meis Martialibus cognovi, ex eccentricitate Martis et angulo inter \odot et \odot apogaea interjecto quidquam provenire, quod ulteriori speculationi inservire possit. Sit CB eccentricitas \odot 11613, angulus BCA $53^{\circ} 30' c.$; ut ergo angulus A ad BC sic angulus C ad AB et B ad AC: 6907, quod fere convenit cum altera tua eccentricitate \odot . Videtur igitur, Solem esse causam duplicis eccentricitatis \odot vel impliciti ejus motus.

Deinde dicis, eccentricitatem distantiarum verarum esse 9165; at ex angulo inter duo apogaea \odot et \odot per eccentricitatem \odot 11613 datur 9500 (BA). Vide igitur mi Keplere, quid haec tuae speculationi afferant, ut veras causas hypothesis tuae et ejus constituendae veram rationem tandem cognoscas. Certe si hac ratione quidquam a Sole et hoc angulo proveniret in Martis motu, tunc dubium non esset, mutato hoc angulo variari etiam aequantis eccentricitatem et distantiarum tuarum eccentricitatem. Quodsi quoque aphelii \odot lineam per punctum A (ac si illic Terra esset, non in C, ut hactenus opinati sunt) duxeris, videbis etiam normam motus et simul abditas causas quorundam. At judico, epicyclum assumendum esse abjecto orbe Solis, et melius uniformis ratio dari poterit.

Miror cur non accommodes tuam restitutionem ad modum Tychonis vel Ptolemaei potius, quod ut facias rogo; sic plures habebis tuae sententiae astipulatores aliquando.

Vide mi suavissime Keplere, haec candide, amice et libere tibi aperio, ut juvem tuos Herculeos labores, quos jam ipse per integrum mensem magno volumine conscripto expertus sum et eo magis miror. Ego in mille formis observationes accommodavi, sed per omnia illas consensere. Video omnium primo acronychia (\odot), ejus epicyclos vel semidiametros



Ego mi Fabrici huic ipsi omnino vicinissimam inter fundamenta adhibui (1587. 5. Mart. vid. Cap. XV.). Prodigiosum vero errorem, si soboles matrem non agnoscat. Itaque vide, ut calculo probe fueris defunctus; omnino enim ad ea revolvitur hypothesis mea per calculum, unde fuit extracta.

Producis et tuam 18. Jun. 1602. h. 10: δ in $27^{\circ} 43' \text{ m}$, ais meam hypothesis dare $28^{\circ} 12'$, alibi $28^{\circ} 6'$ (in literis d. d. 4. Julii.). Computavi, invenio δ in $26^{\circ} 45\frac{1}{2}' \text{ m}$, lat. $0^{\circ} 21'$ s. si bene computavi. Ergo tu deducendo observationem ad eclipticam integro gradu alicubi per oscitantiam auctus es, unde et latitudo vitiosa prodiit. Probo ex annis 85. et 89, quando δ in consimilibus locis semper minus habuit in coelo et observationibus Tychonis quam in Magino. Hoc loco ergo non poterit plus habere; haberet autem, si tua observatio rite haberet. Vide ne gradum unum in instrumento numerando praeterieris. Scribe mihi observationem ipsam. Alterum enim argumentum duco ex latitudine. Mars causa eccentrici est in $7^{\circ} 44' \text{ m}$, ejus nodus in $16^{\circ} 15' \text{ m}$, ergo inclinatio circiter $18'$; compertum enim habeo, quoties in nodum incidit, videri in ecliptica ubicunque Terra versetur. At cum sit pene in $\square \odot$, parum differet inclinatio a latitudine. Falsum igitur, latitudinem esse $1^{\circ} 15'$.

Quaeris (p. 84.) cur Copernicus et alii inquirant proportionem orbium semel, quae tamen mutetur in omnibus locis? Respondeo: positae quae ponunt, recte faciunt. Sic autem procedunt. Primo inquirunt eccentricitatis Martis proportionem ad orbem, quem assumunt 100000. Deinde ponunt eccentricum et orbem annuum esse perfectos circulos. His habitis habetur ad quodvis momentum distantia centri orbis annui a Terra in proportionem, qualium mediocris est 100000. Per hanc igitur certi loci distantiam eliciunt proportionem orbis annui ad illam distantiam et sic etiam ad mediocrem 100000. Manet igitur haec proportio orbis annui ad 100000, at non manet proportio orbis annui ad quamcunque hujusmodi distantiam.

Ad alteras 24. Junii. Putas (p. 85.), te errare in inquirenda distantia Solis et Terrae. Parum id est, quidquid est. Quamvis non sis erraturus, si ex praescripto agas, quemcunque modum sequaris.

Argumentaris, cum distantiae δ a \odot usitatae respondeant acronychiis sitibus, omnino esse retinendas. Non sequitur; nihil enim faciunt ad acronychios distantiae, etsi duplas sumseris, nisi forte ad latitudines, ex quibus quidem non satis accurate cognosci possunt. Jubes, ut Marti satisfiat, proprium Martis orbem condere; imo ne non satisfaceret Marti, aliquis omnino in apogaeo et eccentricitate similis Soli fuit adhibendus et idem (si Tychoni credimus, parallaxes Martis jactanti) plane aequalis Solari; ergo omnino ipsissimus Solis. Ita putas ex eo, quod alligem Martem Terrae vel Soli, gemina mihi opus esse hypothesi. Imo hoc a me habet δ , ut jam non sit alligatus Terrae, quod, nisi sic alligarem (si haec alligatio est), ne triplici quidem aut quadruplici hypothesi ipsi satisfacerem.

Quod tu semidiametrum orbis annui invenis jam 6587, jam 6300, jam 5700 (p. 85.), causa omnino potissima, quia ponis, quamcunque distantiam δ a \odot esse 100000. Debes autem ita ponere, ut illam per calculum invenis, in perigaeo minorem, in apogaeo majorem. Aut forte hoc tibi cavere videris sed ex falsa hypothesi, quam ἀπορρυγίαe monstrant non bisecantes eccentricitatem totam puncti aequantis, sed facientes eccentricitatem eccentrici 13000, cum deberent 9200 c. Ubi nota, Copernicum non eandem viam

insistere cum Ptolemaeo. Ptolemaeus primum crasso modo, supposita simplici eccentricitatis hypothesi, quaerit eccentricitatem invenitque quintam semidiametri partem. Jam non expeditis omnibus circa eccentricum, statim accedit orbem annuum seu epicyclum in apogaeo et perigaeo eccentrici constitutum, ubi parum in longum aberratur, invenitque simplicem eccentricitatem prius crasse constitutam non posse ab epicyclo tolerari, nisi ex parte praecise dimidia. Jam igitur rursus aggreditur ordinationem eccentrici, et quasi per falsi regulam iteratis operationibus in una qualibet prosthaphaeresi constituenda sudat, donec eam sat praecisam esse putet. Aliter Copernicus et vitiose, hoc est minus docte quam Ptolemaeus. Credit enim acronychiis solis non consulto epicyclo, putans se in hoc Ptolemaeum corrigere, et suspectam habens ejus relationem sine demonstrationibus observationum.

Puto te in altera assignatarum causarum peccasse, dum extruisti semidiametrum annui orbis. Accedit tamen et haec certa erroris causa: si Marte in certo loco eccentrici (existente), puta in long. media, bis extruisti orbem annuum, Sole non in eodem sui orbis loco versante, invenies hic quoque aliam atque aliam semidiametrum, quia re vera epicyclus Martis est eccentricus, h. e. nihil aliud quam ipse Solis orbis cum dimidiata eccentricitate. Propterea ego ex tribus hujusmodi diversis semidiametris orbis annui quaero eccentricitatem ejus et apogaeum, et invenio hoc idem cum Terreno, illam dimidiatam Solis. Quod tu in triangulo rectangulo inter centra, cujus alter angulus distantia apogaeorum, invenis vicinum aliquem numerum meo numero, id plane accidentarium est nec quidquam movet. Nam si divellerentur apogaea longius, variaretur hic tuus numerus, manente meo ex acronychiis deducto, quod quidem ipse olfecisti. Miror tamen propinquitatem (9165, 9500), sed scio connexionem nullam esse. Triangulo hoc usus ego sum in Mysterio ejusque tabella majore aliqua. Ab eodem etiam incepti anno 1600 Martios meos labores, ut videbis in Commentariis.

Dabitur opera Fabrici jamque cum Tychoe conventum est, ut omnes demonstrationes in tribus hypothesium formis expediantur. (v. a. p. 85.)

Censes acronychion hypothesin prius exacte constituendam, tam quoad loca longitudinis quam quoad distantias; inde progrediendum ad varia loca orbis annui eaque inquirenda; et quaeris quid de hac tua methodo sentiam?

Omnino ab acronychiis incipiendum ob simplicitatem, quia loca statim ex observatione patent. Ergo invenienda hypothesis ex iis, quae locum eccentricum monstret ad quodcunque tempus, etiam cum non est ibi acronychia oppositio. De distantibus vero acronychiis non reddimur admodum certi, nisi nonnihil ex latitudinibus, ubi tamen praesupponuntur multa. Oportet ergo distantias venari ex parallaxibus. At si simpliciter procedas per unam parallaxin et locum eccentricum, duo praesupponis: 1) locum hypotheseos valere etiam cum non sit oppositio acronychia, quod tamen initio nescitur; 2) praesupponis distantiam \odot et δ seu semidiametrum epicycli, planetam vehementis, perpetuo esse eandem, quod falsum est. Itaque ego primo omnium ex trinis parallaxibus δ eodem eccentrici loco quaero eccentricitatem orbis annui, tunc postea possum adhibere justas distantias, si opus esset. Non amplius vero opus est. Eadem enim opera elicio et proportionem orbis annui ad illam distantiam δ et \odot : quodsi quartam et quintam et plures adsciscam parallaxes ad eundem eccentrici locum, tanto magis fio certior, eundem eccentrici locum et eandem ejus distantiam a \odot valere, ubicunque Sol sit, et sic se ipso stare eccentricum δ , nec ullam subire inaequalitatem

a \odot vel ejus apogaeo pendentem. Quin etiam, ubi jam certus sum de eccentricitate \odot , possum jam, si maxime acronychiis carerem, eccentrica loca investigare quotcunque opus est ex binis acronychiis.

Sed pergo in eccentrici distantis; ubi multas distantias per totum eccentrici ambitum investigavero, facile patet et ubi sit apogaeum et quanta eccentricitas et an via ovalis. Tunc igitur hypothesis invenienda est, quae omnes hasce distantias repraesentet. Hanc hypothesis, quod recte tu mones, oportet sic esse comparatam, ut constet, posse per eandem etiam loca eccentrica reddi. At non est summe necessarium et calculari. Multa eminus adspicimus, ad quae ob defectum mediorum non pertingimus. Ego tamen plurimum laboro, ut calculo loca eccentrica, id est tabulam aequationum eccentrici ex distantiarum hypothesis condam. Despero quidem singula seorsim eruere, ut aliis hypothesis fieri potest. Omnia vero ordine ab apogaei gradu spero me olim exstructurum.

Cur ex prosthaphaeresi δ apogaeo Solis propiori detur simplex eccentricitas major, quaeris (v. s. p. 86.). Ego vero dubito de hoc tuo pronuntiato. Hoc scio, si tanquam in simplici triangulo utaris prosthaphaeresi δ longitudinis mediae, majorem invenies eccentricitatem quasi simplicem, quam si utaris prosthaphaeresibus apogaeo (non \odot sed) δ vicinioribus. Jam vero, cum in γ et Π sit longitudo δ media, \odot apogaeum in \odot , accidit ut haec sit \odot vicina. Cur autem minor et major hoc pacto evadat eccentricitas, causa est, quia falsum praesupponimus, simplicem et geometricam eccentricitatem, quae tamen ex dimidia parte est physica aequantia. Id uberius in proximis literis explicui.

Ex apogaei \odot linea nihil in δ eccentricum redundat, si ad \odot ipsum referas. Sed si ad punctum seu locum medium \odot : omnino redundat aliquid, at id non magnum quod loca attinet, majus quod distantias. Idque ego inter causas habui, cur theoriam hanc ordinarem ad verum \odot centrum. Praeterea redundat etiam aliquid ex apogaeo \odot in ipsum orbem annuum, ut jam saepius dictum, quod diversum est a jam modo dicto.

De Martialibus Tychonis quomodo processerit nihil scio, solum hypothesis et observationes acronychias habeo.

Schema ponis et in eo varias speculationes, quas me considerare jubes. Literas non possum internoscere, nec quid velis scio.¹⁾ Nec opus est, cum nil habeam quod dubitem. Summa tamen eo redit, quasdam inaequalitates ex apogaeo \odot in eccentricum δ venire, quod jam expeditum dedi.

Ad tertias 11. Aug. (v. p. 86.). Nihil me movet *ἀνωμαλία* latitudinum δ , ut novam in eccentricum anomaliam introducam. Etenim ex simplicissima inclinatione δ , additis parallaxibus antea requisitis, sequitur haec omnis anomalia. Ecce enim hoc ipso anno 27. Febr. vel 8. Mart. octiduo ante et post erit maxima latitudo sept. $2^{\circ} 45'$; 27. Sept. vel 7. Oct. maxima austrina $1^{\circ} 36'$: quod plane non quadrat cum δ vel γ cum \odot nec cum transitu δ per apogaeum et perigaeum eccentrici nec cum transitu per limites, miscentur omnia.

Ad quartas 22. Dec. In schemate a te primum scripto quaeris, quomodo AK ex observationibus innotescat? Respondeo, ex binis parallaxibus annuis, et praesupposita eccentricitate \odot distantisque \odot et Terrae. Sint AE, AF distantiae \odot et Terrae. EAF angulus inter loca Terrae. Ergo ex lateribus et angulo dantur anguli AEF, AFE et EF latus. Sed KEA, KFA sunt anguli inter loca visa \odot et δ , aufer FEA et EFA,

♂ ☉ metiantur tempora, et illae quidem ex hac posteriore eccentricitate extruantur.

Petis ut ellipoides meum declarem. Imo declarabo id, cujus causa putavi hactenus expetendum esse ellipoides (cum nunc limitationem aliquam videam).

Scribe perfectum circulum eccentricitate 9165 de 100000. Ergo (Eucl. III, 7) quodvis punctum semicirculi distabit aliter a suscepto loco eccentro: jam adscribe ellipoides his legibus, ut quae est proportio cujusque distantiae ad mediocrem, haec sit jam proportio mediocris arcus ad arcum ellipoidis respondentem distantiae, ubi fingitur planum circuli infinitis

Fig. 27.



lineis divisum; eas putavi in ipso plano inesse frustra. Siquidem ex B centro ducerentur lineae ad aequales gradus, imo ad infinita puncta aequaliter distantia in circumferentia, tunc quae est proportio omnium ad summam BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, eadem esset plani circuli ad planum IFCB. At non sic, si ab iisdem circumferentiae punctis lineas in A ducas. Summa n. harum linearum est major quam summa priorum, non obstante quod apogaea perigaeam compensare videtur, propterea et proportio totius ad partes turbatur.

Jam primo desidero nominationem et definitionem et geometricam descriptionem plani, quod sic sit ad planum circuli, sicut est summa infinitarum ex A ad summam infinitarum ex B in easdem aequaliter remotas circuli circumferentias vel puncta. Vel detur saltem planum aequale excessui summae distantiarum ab A super summam distantiarum a B. Deinde si ut summa IAC linearum ad summam IBC linearum ex iisdem punctis circumferentiae, sic sit CI arcus circuli ad CK arcum ellipoidis, ut KA, LA sint aequales (quae lex est describendi et incurvandi arcus hucusque per minima, quod addo, ne ejus curvitas non definita putetur), si, inquam, hoc ita sit, quaeritur angulus KAC. Dic quibus in numeris et eris mihi magnus Apollonius. Immortales habeo gratias Belgis tuis, ubi me sublevaverint (v. p. 87).

Inter scribendum incidit, quod nunquam antehac: sicut est planum quaesitum ad planum circuli, sic esse circumferentiam circuli totam ad circumferentiam ellipoidis. Itaque apparet necessitas quaesiti plani, quod non est ita difficile inventu; hoc enim habito arcus ellipoidis dabuntur. Erit autem alter et forte difficilior labor, inveniendi mensuram angulorum ad A (vel etiam ad B), quos arcus ellipoides subtendit. Erunt enim anguli anomaliae coaequatae, quia A Sol. Tu jam sta promissis et responsum intra 2 menses procura, ut scribis.

Diminutio verae eccentricitatis infra dimidium eccentricitatis aequantis in singulis quidem planetis variat, sed nihilominus in uno aliquo constans est et perpetua.

Ad quintas d. d. 26. Decembris. Ad ulteriorem declarationem problematis et ut appareat, quale planum quaeram. Centro B (Fig. 28) scribatur circulus CE divisus in partes quotcumque aequales. Sint semicirculi divisi puncta C, G, H, E in quadrante superiore, D, U, V, F in inferiore: et partes sint pari numero, ut bina puncta sint ex B centro opposita. Ejiciantur per B rectae in puncta, et in harum aliqua sumatur punctum A eccentricum et connectatur cum punctis circumferentiae. Igitur CB, BD et CA, AD

junctim aequales. At in omnibus aliis HB, VB summa minor quam HA, AV, sic GU minor quam GA, AU, sic FE minor, quam FA, EA.

Jam circulus extendatur in planum eique lineae ad rectos constituentur, distantiae quaelibet suo loco, et capita connectantur lineis. Erit quae per BBB (Fig. 29), una recta, sed quae per AAA conchoidi similis. Spatium vero comprehensum sub CDC' et BB duplum erit ad aream circuli, quia ducta transversa a B in C' constituit triangulum Archimedeum aequale circulo. Ergo consentaneum (forsan et demonstrari potest) etiam spatium sub CDC' et AAA' conchoide esse duplum ad quaesitam nostram aream. Vides autem, majus esse hoc spatium illo, quia in punctis E et O intermediis EA longior est quam EB, et OA' quam OB.

Atque haec descriptio sane tam est geometrica, quam illa Archimedis. Etsi vero contentus sum Archimedeae epharmosi in linea CDC', non tamen contentus sum hac delineatione lineae AAA', quia praecipitur, ut per minima eam, quae sunt infinita, et quia proportio spatii ad prius hoc pacto ignoratur. Cupio ut geometra aliquis me doceat comparationem planorum: deinde ut sciam, quota pars hujus incogniti plani superinsistat quotaecunque parti lineae CDC'.

An ergo (dic geometra) planum hoc circa cylindrum aptatum, ut capita CA, C'A' coeant, lineam conchoidea ordinat in circumferentiam ellipticam? minime. Sed relinquo geometrae refutandum.

Invento quod hic petitur, simul inveniuntur arcus ellipoidis. Nam ut planum AC' ad planum BC', sic circumferentia circuli CC' ad circumferentiam ellipoidis. Quae etsi brevior est quam 360° circuli, nihilominus tamen 4 rectos subtendit, non minus quam circumferentia circuli: eo quod et propior fit centro per partes, quam circumferentia circuli. Haec autem appropinquatio ad centrum rursum quaeritur, quomodo geometricae investigari possit, ut angulus ad susceptum punctum habeatur.

Itaque distantias ☿ a ☉ per tempora accumulatas numerat planum a me expeditum, distantiae hae iter planetae in ellipoides (non numerant, sed) constituunt, iter vero hoc cum distantis constituit angulum anomaliae coaequatae, respondentem tempori ab apogaeo elapso. Erravi igitur hactenus existimans, numerari distantias seu in summam colligi a plano ellipoidis, quod planeta describit. Minime alicubi enim moratur ibique multas accumulatur distantias. (Comp. Cap. XL.)

Declarationem observationum Braheaneorum (comp. Hist. Coel. ad tempora adscripta) quibus usus est Keplerus, ad finem hujus epistolae reservavimus, quam codex Petropolitae exhibet folio eo, quo Keplerus adit literas Fabricii d. d. 11. Aug. (supra p. 90), praemissa ea epistolae parte („de Tyconicis“) quam praemisimus p. 13.

Fig. 28.





Fig. 29.



Adscribam hic, pergit Keplerus, quadrigam observationum a me adhibitarum, ut fidere possis. Quibus subjungo quadrigam a me nondum in usum traductarum, ut tuo calculo adjuver in tentandis pluribus observationibus.

Anno 1585. 7. Maj. h. 11. 20' distabat \odot a Spica $52^{\circ} 13' 40''$, declin. $14^{\circ} 22' 30''$.
 1587. 27. Mart. h. 9. 45' cum \odot elevaretur $41^{\circ} 30'$, dist. a corde \odot $24^{\circ} 28'$,
 ab Arcturo $39^{\circ} 53'$. Declin. $7^{\circ} 18' 40''$.
 1589. 12. Feb. mane h. 5. 15' cum \odot elevaretur $19^{\circ} 36'$, dist. inter \odot et
 Spicam $21^{\circ} 7' 40''$, ab Ophiuchi sin. genu $26^{\circ} 11'$.
 Declin. $13^{\circ} 33'$.
 1590. 19. Dec. h. 7. 15'. Inter Spicam et \odot $15^{\circ} 0' 30''$, inter Lameam
 bor. et \odot $13^{\circ} 3' 30''$. Decl. $11^{\circ} 18' 30''$, alt. \odot 22° .

Ex adversariis meis fol. 335 est sylloge observationum omnium, quibus indita nomina a diei in una revolutione periodica numero post primam omnium, quae in Tychoe reperitur.

In revolutione	2. dies 483	— an. 1581 —	18. Martii.
"	— " 486	— " —	21. "
"	3. " 482	— " 1583 —	2. Febr.
"	— " 486	— " —	6. "
"	4. " 483	— " 1584 —	21. Dec.
"	5. " 483	— " 1586 —	8. Nov.
"	— " 486	— " —	10. "
"	11. " 485	— " 1598 —	23. Febr.
"	12. " 484	— " 1600 —	10. Jan.
"	— " 486	— " —	12. "

Careo primis 1581 et secundis 1583 et 1586, nisi 22. Oct. et 1. Dec. ante et post.
 Anno 1584. 21. Dec. h. 14. in $1^{\circ} 15' 17''$ \uparrow , lat. $3^{\circ} 31' 34''$.
 1586. 22. Oct. mane h. 6. inter \odot et cor \odot per sextantem $6^{\circ} 9'$ vel $10'$
 in consequentia. Declin. $13^{\circ} 0' 40''$ bor.
 1. Dec. mane h. 7. 30' distantia aequatoria inter \odot et cor \odot
 $25^{\circ} 12' 15''$. Declin. $6^{\circ} 2' 15''$ bor.
 Careo 1598. 23. Feb.
 1600. 20. Jan. st. n. nocte praecedente, cum cervix \odot culminaret, \odot in
 $12^{\circ} 15' 25''$ \odot , lat. $4^{\circ} 23' 43''$.
 Nocte, quae praecessit 22. Jan. \odot in $11^{\circ} 24' 30''$ \odot , sed
 in Asc. Recta erat $6'$ dubietas. Lat. $4^{\circ} 30' 4''$ bor.

(In margine: Heus tu cribrum hic ne esto, memor pactorum! Comp. p. 70.)

Fabricius contra consuetudinem ad has Kepleri literas die demum 27. Oct. v. st. respondit, responsum Kepleri expectans ad priores literas, plane oblitus, nullas expectandas esse (comp. Vol. II, p. 597) cum ipsi prius respondendum fuisset ad Kepleri literas.

Praemissis querelis ob Kepleri silentium jam unitatis quae, refert observationes stellae, tum temporis in Serpentario effulsit indeque transit ad Martem his verbis:

Venio ad hypothesin tuam Martis, quam ex aliquot observationibus examinavi, et deprehendo, eam in quibusdam locis enormiter aberrare. Anno 1595. 17. Dec. st. vet. h. 9. vesp. observavi Martem ab Aldebaran $23^{\circ} 40'$; altit. merid. erat $53^{\circ} 20'$, declin. $16^{\circ} 58'$; hinc datur locus ejus in $11^{\circ} 34'$ \odot , lat. bor. $1^{\circ} 42'$; juxta tuam hypothesin vero datur $11^{\circ} 21'$ \odot .

Mitto brevem calculi designationem. Motus medius $2^{\circ} 6' 28''$, aphelium $4^{\circ} 28' 56'$, anomalia $9^{\circ} 3' 10'$, prosthaphaeresis $10^{\circ} 28' 30''$, motus \odot aequatus $12^{\circ} 35'$ II. Simplex distantia \odot et \odot 100922, reducta 1539242, locus \odot verus $5^{\circ} 44'$ \odot ; distantia inter locum verum \odot et correctum \odot $23^{\circ} 9'$, distantia Solis et Terrae 96200; hinc datur \odot in $11^{\circ} 20\frac{1}{2}'$ \odot . Non puto me in calculo errasse.

Duo itaque puto in tua hypothesi esse, quae his causam praebant: 1) quod exacte dimidiam eccentricitatem Solis ponas, cum ad 3—4' minor esse debeat medietas inter centrum orbis annui et Terram (ita n. nunc hypothesin intello, non juxta Copernicum), quam tu statuis. 2) Distantiae non eo modo accrescunt vel decrescunt ut tu vis, sed longe aliter; nam distantiae omnes longiores esse debent, et circa medias longitudo differantia illa addenda distantia tuis maxima erit ad $9'$ circiter, et cum in hoc exemplo duae istae causae

concurrant, hinc fit ut differentia tabularum a coelo ad 13' excreseat. Quare scito, distantias tuas vel tuo modo collectas ab aphelio usque sensim augeri (ratione semicirculi punctati. Fig. 30.) In aliis locis saepe fit, ut cum semidiameter orbis annui aliquid addat angulo parallaxis, illud distantia tua minor justo recompenset et sic error ille non adeo evidens fiat.

Sic quoque exemplum meum ad annum 1602. 18. Jun. vesp. in ipso solstitio, quam observationem antea misi (p. 84). Datur locus ejus ex hisce in $26^{\circ} 51' \text{ } \cap$ cum lat. $0^{\circ} 26'$ bor.; differt a tabulis tuis 5', sic distantiae ad 7 vel 8' essent addenda. Contra vero semidiameter orbis annui 3' major (a Terra sc. usque ad Solem supputando), quam tu ponis distantiam Solis et Terrae, rursus aufert 3 illa minuta, ita ut differentia 5' maneat.

Quare admonitum te volo, ut juxta longitudines medias plura exempla adhibeas; praesertim in tali positu \odot et \odot , ut in schemate vides. Hoc exemplum et observationem hanc ideo elegi, quod cum Cancellarii loco \odot quam proxime conveniret, tam ad positum \odot quam \odot , et ut ex observato loco conficerem utcumque, an loco \odot in genesi Cancellarii a te supputato fidendum esset. Haud igitur ovalis erit hypothesis, ut hactenus existimasti.

Ego in Marte plurimum hactenus sudavi, etiam antequam tu tuam hypothesin mihi mitteres; at in multis mea opinio me decepit. Tibi igitur lubens subscribo et tuas inventiones absque ulla adulatione me venerari scito. Ubi voles, facile perficies quae desiderantur in \odot et reliquis. Tu enim natus es ad restitutionem illam perficiendam, meo judicio alter non erit, qui tibi palmam illam praeripiet.

In latitudine calculanda juxta tuum modum etiam aliquid desiderari puto; in exemplo 18. Jun. 1600. tu $0^{\circ} 21'$ lat. facis; ego juxta modum Copernici latitudinem invenio $0^{\circ} 26'$, quod etiam coelo respondet.

Observatio 19. Dec. 90. in \odot facta nequaquam veritati congruit. Falsae sunt distantiae, nam altitudo (si meridiana fuerit) non dat eam declinationem.

Locum \odot in triga tua (v. s.) ad 23. Feb. 98. desideras. En ejus locum ad 2. Feb. et 1. Mart. (stilo vet.): 2. Feb. vesp. alt. mer. \odot $62^{\circ} 58'$ in elevatione nostra $53^{\circ} 38'$. Distat a cornu bor. \odot per 8° , a capite mer. \cap $23^{\circ} 12'$.


1. Mart. vesp. ($1^{\circ} \odot$ in med. coeli) distabat \odot ab anst. capite \cap $16^{\circ} 25'$, a bor. $14^{\circ} 50'$, a Jove $23^{\circ} 5'$.

2. Mart. alt. merid. \odot $62^{\circ} 30'$, dist. a cap. anst. \cap $16^{\circ} 5'$. Ex his locum ad 23. Feb. facile colliges.

1600. 12. Jan. v. st. h. 11. p. m. \odot a Regulo $13^{\circ} 46'$; a cervice \odot $13^{\circ} 32'$; a Procyone $28^{\circ} 55'$, a mer. cap. \cap $23^{\circ} 17\frac{1}{2}'$; alt. mer. $58^{\circ} 12'$. Ex his datur \odot in $11^{\circ} \odot$, lat. bor. $4^{\circ} 29' 15''$.

Keplerus semper paratus agnoscere ea, quae in aliis laudanda deprehendit quaeque vera esse cognovit, sic rescripsit (d. 18. Dec. 1604.): Cum toties jam meum Martem frustra lacessiveris, tandem unguis immisisti in ulcera mea et me Christe annuos pene thesauros meos exhaustisti, usus et meis argumentis et mea erroris animadversione, denique iisdem causis erroris, iisdem remediis indicatis. Vel tandem porrigo tibi palmam. Dicit Matthias (Seiffardus), quanto me gaudio affeceris eadem mecum animadvertens; jam pridem enim haec mea querela apud ipsum fuit. Deprehendi, dum id ago, quod tu sero praecipis, scilicet dum plures observationes in longitudinibus mediis adhibeo. Nam ex quo convalui (Junio enim et Julio decubui cum uxore, illa ephamera, ego erratica et bilosa febris) hoc unum egi, ut totos annos 89, 91, 93, 95 tentarem. Igitur alicubi $15'$ a vero absum. Praesertim per illam ipsam observationem 1595. plurimum temporis consumsi, existimans falsam. Ac initio culpam rejeci ut tu in eccentricitatem \odot et jam aequationibus etiam ipsis \odot imminebam, quia certissima ratio est, praecise bisecandam eccentricitatem. Sed dum procedo in Commentariis, invenio in bisectione nullum esse dubium. At contra non tantum parallaxes annuae vitiosas arguunt mediarum longitudinum distantias \odot a \odot , sed etiam aequationes physicae. Inveni enim modum sat laboriosum, et differunt a vero in octantibus circiter

Fig. 30.



3'—4' huc illuc. Juvantur autem prolongatis distantis in mediis longitudinibus. Sic igitur est, mi Fabrici. Negativa circuli validissimis quidem nititur argumentis et ovalitas (frustra te concludente contra hanc), sed affirmativa harum distantiarum ex ratiocinatione mea nude dependet. Tu vitiose: Kepleriana ovalitas nimium curvat, ergo nulla plane ovalitas ponatur. Ego aequè vitiose: Ovalitas est aliqua, ergo haec erit, quam aequabilitas motus epicycli monstrat. In dimensione orbis annui 100000 circuli perfectio prolongat circ. 800 aut 900 nimis. Ovalitas mea curvat 400 circiter nimis. Veritas est in medio, propior tamen ovalitati meae. Neque tamen infra longitudes medias prolongandae, sed etiam supra etiamnum magis decurtandae sunt differentiae, quam mea fert ovalis: omnino quasi via Martis esset perfecta ellipsis. Sed nihildum circa hanc exploravi. Hoc verisimilius, epicyclum et in aphelio et in perihelio accelerari. Ita omnes planetae cum ☾ in hanc societatem Variationis Tychonicae venient.

Resipuisti, video, cum tua observatione anni 1602, quam cum mea hypothese jam intra 5' concilias; atque hoc dixeram. Totus nunc in Commentariis sum, ut vix otium habeam scribendi. Veni jam plane usque ad hunc scopulum prioribus expeditis. In ipsa quadratione ovalitatis meae (insero enim eam, ut alii videant, quanta molis fuerit) importunus quidam hospes per arcanos aditus sese in meas aedes intulit meque perturbavit 3. Dec. st. n. die ♀ mane quadrante ante 12. Bohemici horologii, nomine Fridericus Keplerus. Ante meum decubitum adjutus a studioso meo scripsi tabulas Martis. Compendium tale, ut intra unum diem scribere possim ephemerida longitudinis ♂ in unum annum, per denos dies proportionaliter agendo, nisi circa stationes. (Tabulae semper manent, quomodo-cunque mutata tabella distantiarum.) Periclitavimus et physicam hypothesin. O immanissimum laborem, de quo tamen parum ego degustavi; ne de morbo suspiceris. Sed tamen vide ne vaticineris, dum me cum hoc labore vitam finitum existimas.

De latitudine parum hactenus fui sollicitus, quod illam facile sequi, facile inflecti videam. Compendium tamen te non celabo. In triangulo inter ☉ ♂ ♂ vel quemcunque planetam ingredi parallacticam nostram (Vol. II. p. 434.) a margine cum angulis ☉, ♂ et in iis lineis elige aream, quae inclinationem plani e regione anguli ☉ exhibeat, statim eadem columna exhibet e regione anguli ♂ veram latitudinem. Si non invenitur tota inclinatio, quaeratur per partes utcunque dissepandas, prodit enim et latitudo per partes totuplas. Potest autem et inclinatio ipsa ex parallactica sumi, quaesita maxima inclinatione in capite vel fronte, distantia a nodo in margine.

Exempli causa sit inclinatio quaerenda ad distantiam a nodo 40°. Maxima ♂ inclin. est 1° 40' 45". At parallactica non excedit 66'. Ergo distribuo maximam inclinationem sic:

Ex regione 40° dat 65' 41' 47"	
45. 28. 55.	Haec in area parallactica.
45" 28. 55"	
Summa 1° 50' 45" Inclin. max.	1° 11' 11" Inclin. loci.	

Sit jam. angulus ad ☉ 1°, angulus ad ♂ 3°. Ingredior ergo a margine 1°, sc. cum angulo ad ☉, in ea linea perquiro omnes columnas, donec aliqua mihi placeat; placet autem col. 57, quia in ea e regione mei 1° invenio 1° 0'; apices ipsis ego affingo ex mea inclinatione maxima, in

qua est etiam 1° . Igitur in eadem columna ascendo in lineam anguli ad \odot sc. 3; ibi invenio $2^{\circ} 59'$. Jam quia non tantum habeo gradum unum in proposita mea inclinatione, sed etiam $11' 11''$, rursum ingredior per lineam anguli ad \odot 1° et quaero $11'$ aut certitudinis causa quadruplum aut quintuplum. Quaeram $55'$, quae invenio in columna 52: quae e regione anguli ad \odot 3° ostendit $2^{\circ} 43'$, cujus pars quinta est $33'$. Ergo haec est forma collectionis:

	<u>1° 0'</u>	<u>11' 11''</u>
1.	1. 0.	11. 11.
3.	2. 59.	33' 33'' S

Vel sic:	1°	3°
	1. 0'	2. 59'
vera.	11.	33'
	11.	33''
		3° 32' 33''

Nil sequitur. Quae his Keplerus praemisit, leguntur Vol. II, p. 97. 439. 597. 753.

Ad haec respondit Fabricius d. 4/14. Jan. 1605: Quod in hypothesis tuis Martis errorem in observationibus circa longitudines medias mecum deprehenderis, valde gavisus sum. Mire me exercuit observatio illa anni 95, quae similis est constitutioni ♂ in geniis Magn. nostri Cancellarii, tuae eruditionis Uranicae summi amatoris et admiratoris. Bisectionem exactam in Sole non facile credere possum. Video enim, ex nonnihil mutata dimidia Solis eccentricitate distantias ♂ a ☉ observationibus analogice juxta Solis motum in annuo orbe pulchre convenire, ita ut distantiae utraeque et ratione eccentrici et orbis ☉ se mutuo vel adjuvent vel tollant, prout observatio requirit. Tu nescio quo alio motu adveniente ♂ succurrere via, quod ut commodè fiat, procura. Exspecto tua Commentaria Martis desiderantissime et oro Deum O. M., ut sufficientes tibi vires largiatur, ne incepto operi et suscepio oneris succumbas. Faxit Deus, ut „hactenus invictum felici sidere Martem“ debelles. Et si maxime te moverit de solo, inferet te tuumque nomen vel invitus polo. Macte igitur virtute Vir! inceptum cum Marte bellum continuato et Uraniam exulantem ad avita regna feliciter deducito!

Concludit epistolam F. his verbis: Tempus et initium febris tuae scire cupio, et si quae alia hoc biennio passus es accidentia. Vale, et mihi diligenter responde, sic me etiam magis excitabis et alacriorem reddes. Literas tuas per Eberh. Schele, Ducis Luneburgensis apud vos legatum transmissas vel per alium tabellarium, quem ex ipsius iudicio cognosces. Adscribe, quo in statu sint res Uranicae; quando editurus sis Commentaria Martis; iudicium tuum de meo tractatu transmissio (de stella nova. Vid. Vol. II, p. 599 s.). Tengnagelium mone ut respondeat, item Ericksen.

Vale, Vale iterum, Vale mathematicorum decus. Viget et flore flos Uraniae. Saepius scribe ac rescribe. Saluta tuos et omnes Uranicos, D. Matthiam Sifridum.

Dabam Ostelae die ♂ ♀ ad vesp. 1605.

Tuae praestantiae

studiosiss. D. Fabricius.

(Inscriptio: Dem Erbaren und wolgelarten M. J. K. &c. zu Prage, in der Nienstadt, bei der Kirche Emaus zu erfragen, durch Herrn Peter de Vischer oder Eberhardt Scheele an ihn zu bestallen.)

His addit Fabricius biduo post: De tuis hypothesibus nuper scripsi sententiam. Consentunt illae coelo in omnibus fere locis, nisi quod circa medias eccentrici longitudines observationes ad 13' deviant, et necesse est distantias veras longiores esse, quam juxta meum modum dantur.

Eccentricitas quoque dimidia Solis, quam statuis, aliquanto major sumi debere videtur ad 3' c. in linea apogaei Solis.

Observatio Tychoonis in ♂ anno 90. d. 18. Dec. (p. 94) veritati non videtur respondere; ex distantiis ad Spicam et Lancem bor. datur locus $\delta^{\circ} 36' \text{ }^{\circ} 31'$ cum lat. bor. $0^{\circ} 31'$. Quia vero Laxx austr. eandem fere latitudinem habet, igitur si simplex distantia observata auferatur a loco Lancis austr., $15'$ differentia incidet. Ergo sudandum erit, quae observationes adhibeantur ad corrigendos motus. Studiosorum observantium (Tychoonis) non minima saepe fuit vel in iis negligentia vel incititia.

In apologia Miverii (v. Vol. II, p. 415) scribitur, Lansbergium magno quadrante obtinuisse declinationem maximam $23^{\circ} 28' 15''$; differt a Tychonis c. $3'$. Cuperem scire, nemode tanta varietas incidere possit? Nam etsi Tycho refractionem majorem ponat quam ille et alii, cum tamen ex locis refractis declinationem non hauserit, miror, inter illos articulos tantum discrimen esse, et quid tribuas Tychonianaee declinationi maximae scire cupio. Forte nec in Sole est tanta parallaxis, ut vulgo statuitur, quae et difficilis observatu est,

cum in eclipsibus tum alias. Forte haec, aliquanto major sumta, declinationem nonnihil etiam majorem justo facit. Neque tamen ego pro me dico, cum mea instrumenta non accurata sint et sic aliorum oculis me videre oporteat. Curabo tamen brevi quadrantem 4 pedum accuratissimum mihi fieri ad ☉ observationes, cum videam, tantam esse in ☉ omnium simplicissimo differentiam.

Quae has secutae sunt litterae (d. 10/20. Feb. 1605) nihil fere aliud quam astrologia continent (comp. Vol. I, p. 352.). Ad Martem vero redit Fabricius in literis d. d. 2/12. Apr., his more consueto incipiens querelis: Adeone ille tuus Uranicus ardor et amor deferbuit, ut tot meis literis ne unis quidem tanto tempore respondere dignari volueris? Scito, te non tam literarum cumulum in hoc silentio Uranico colligere, quam laborem in respondendo angere. Cave igitur tibi! Sed dices, differ, habent parvae commoda magna morae. Accipio et quiesco; Mars et Ars, de quibus in Commentariis promissis exquisite tractas, te facile mihi excusatum reddunt, tantum abest ut suspectum faciant. Perge ergo delictis tuis Uranicis et Martialibus frui, ita tamen ut eorum aliquando nos (quod summe desideramus) compotes reddas et expectationem meam non omnino in respondendo frustreris. Accepisti sine dubio proximas meas litteras longiores in nundinis Frankofurtensibus ad D. Legatum Vischorum transmissas. Habes illic quod respondeas.

De Marte jam ante saepe egi tecum, nunc idem facere cogor, adeo Mars semper adversatur nostris conatibus.

Ptolemaeus et Copernicus praesupposito libramento illo in ☉ statuunt ex observationibus, ut puto, latitudinem ☿ 5, 6 vel 7' ad summum; at tua hypothesis ultra gradum ad minimum in conjunctionibus concedit. Magna sane et enormis differentia; miror valde. Non dubium est Ptolemaeum ex observationibus, in rectiori illa sphaera et clariori coelo habitis, latitudines illas hausisse et si tanta quam tu concedis, esset latitudo ☿ circa ☿, certe vel absque omni instrumento cognovisset. Deinde video in tua hypothesi circa media loca longitudinis convenire latitudines, video proportionem linearum correspondere latitudinibus, quod in Ptolemaeo et Copernico non fit, ubi incommensurabilia illa omnia sunt ratione linearum inter se, quod mihi quoque non minus observandum videtur. Haereo igitur, quia circa ☿ ☉ sufficientes observationes non habeo; non dubito te habere, quare me fac ceteriorem de hac enormitate inter te et Ptolemaeum et quomodo Ptolemaeum vel excusare vel refutare velis.

Locus Martis in genesi D. Cancellarii a te supputatus mire me exercuit. Tu 1° 58' ☿ invenisti, ego 2° 21'. Non dubium est te per festinationem in calculo errasse, quod palam faciet observatio mea anni 95, 7. Dec. h. 7. p. m., quae locum ☿ in coelo dat 10° 35' ☿; hic tua hypothesis 7' minus dat et ad hoc tempus praescriptum anom. 91° 52', sicut et in Cancellarii genesi, idque exacte. Ergo utrobique necesse est aequalem differentiam esse.

Distantia ☉ et ☿ a me inventa 153178, distantia ☉ et ☿ 982170. Dimidiam eccentricitatem ☉ nunc probo et confirmo, at distantias ☿ omnino prolongare oportet ad latera ad 12' usque, et quidem ab aphelio ad mediam longitudinem proportionaliter; sic omnes observationes egregie conveniunt tuae hypothesi. Quomodo hoc ovalitati tuae conveniat, tu videris. Tu si ubicunque eccentricitatis rationem et modum et causas naturales ostenderis, facile nos in tuam pertrahes sententiam. Distantiae tuae ad dimidiam eccentricitatem ☿ constitutae non respondent prostaphaeresium distantis nec veris quoque distantis conveniant. Ego puto, si vera ratio prostaphaeresis constaret, constare quoque tunc veras distantias, nam ex eodem fonte provenire non est dubium, et antequam haec duo non fuerint ita conciliata, ut plane respondeant, non puto nos veram ☿ hypothesin habituros. Verum n. vero consonat. Tu prostaphaeresin et ejus lineas proportionemque sic adapta, ut distantiae inde provenientes sint verae et observationibus respondeant, et ex duabus hypothesibus unam fac, ne adulteratum conjugium constituatur inter vicariam et veram.

Haec ex amore verae artis profero, non sigillando tuam hypothesin, quam propter inventionem magnifico plurimum, cum videam, eam respondere sic satis bene observationibus, undecunque etiam illa diversitas distantiarum sit. Non despero te causam et modum invenire posse, si modo ingenium intendere velis.

Causam quoque scire desidero, cur in hypothesi ☿ semidiametrum eccentrici ☿ ad ortus Solis proportionem reducere potius volueris, quam contra, ut Copernicus et alii faciunt, qui in partibus eccentrici plures orbis anni semidiametrum inquirunt?

Obsecro, ut mihi compendia tua communices, quorum mentionem facis, quomodo Epheмери ☿ institui debeat ad decem dies. — His immoget Fabricius plurima alia, quae omni-modi spectant, et in postscripto deinde ad Martem reversus haec proferi:

Ad tempus Cancellarii: FRC anomalica media 91° 52', BCA angulus 5° 15'. Si hic angulus subtrahatur ab angulo 91° 52', manet angulus BAC 86° 37'. Ergo ut BAC ad BC radium sic ABC ad AC distantiam ☉ et ☿ reduct. 15270320. At minor haec distantia ab modo accepta, quam ab. 95. 7. Dec. h. 7. p. m. ostendit.

aequalis motus invicem, qui in se est inaequalis. Tunc juncta F, A lineam faciunt tam longam, quam si ex C eccentricus perfectus describatur radio AE, transibit enim per F.

Atque haec hypothesis falsa est, quod anno 1602. rescivi. Sin autem manente C puncto aequalitatis ipsius D linea ADO fieret linea apsidum verarum epicycli et O vera apsis epicycli, sic ut ipsi DCE anomaliae mediae constitueretur aequalis ODF, et DF inclinaretur ad AC, quod est perinde ac si dicam, epicyclum aequalibus temporibus moveri aequaliter circa suum centrum: tunc haec esset quam proxime hypothesis, qua sum usus per annum 1603 in a. 1604, quam et tu tenes. Et haberet mediocrem causam naturalem. At deprehendo ex primae excessu, secundae defectu, CA 9264 esse median-dam vel bisecandam in B, ut ducta BDS sit apsis epicycli vera, itaque C adhuc centrum aequalitatis D. Sed jam SDF est aequalis DCE anomaliae mediae: et DF minus inclinatur ad AC quam prius. Atque ex hac hypothesi jam quam proxime vera distantia exstruitur F ab A, sic et FAE quam proxime vera coaequata. Dico quam proxime, nunquam enim ita vere, ut cum ea physicae aequationis computatio instituatur. Porro haec hypothesis mihi (ut in delineatione meae ratiocinationis ut constitui pergam) non satisfecit, quod punctum B causa naturali carebat. Nam punctum C habet causam naturalem, quod sc. AC et DF aequantur, et quod tantundem est ac si dicam, ut distantiae sunt sic esse moras in aequalibus arcibus eccentrici. E contra vero alia res me ad causam naturalem invitabat, haec nempe, quod vidi succurrentem secantem aequationis epicycli maximae; AF scilicet ille esset (ad angulum $5^{\circ} 18'$) 100429, itaque FA longior est quam DA particulis 429. Et quia FA distantia sequitur ex usurpatione perfecti eccentrici, et 429 supra inventa est curtatio justa hujusmodi distantiarum pro hypothesi vera, ergo si pro FA sumamus DA, habemus justas distantias in longitudinibus mediis. Statim arripui hanc pro naturali hypothesin: planetam non versari in epicycli circumferentia RHI, sed in diametro KDO librari; jamque distantias et totam aequationum tabulam exstruxi inde.

At miser; his ipsis Paschalibus feriis demum experior re ipsa, quod, si consideratus fuisset, meminisse poteram, jam antea demonstratum esse in Commentariis meis, hujusmodi iter planetae compositum non esse ellipticum, quod superior mea argumentatio evicit, sed in octantibus ab ellipsi versus circuli perfectionem exire in buccas. Vitiosa igitur fuit argumentatio: libratio in diametro epicycli aequat ellipsin in longitudinibus mediis et in apsidibus, ergo undiquaque illam aequat. Falsum; atque hinc est, quod rursum ut in antiqua falsa hypothesi nec distantiae officium fecerunt nec aequationes eccentrici. O fructuosam societatem rei utriusque, quae nunquam non me dirigit in tot perplexitatibus! Jam igitur hoc habeo, Fabri: viam planetae verissimam esse ellipsin (quam Durerus itidem ovalem dixit) aut certe insensibili aliquo ab ellipsi differentem. Computavi inde aequationes eccentrici in sitibus acronychiis, officium faciunt ad unguem, de distantis quominus idem dicam fecit earum inquirendarum methodus paulo laxior, quae semper me circa 100 particulas in dubio relinquit, etiam cum optimae sunt observationes: nosti enim, optimas observationes uno minuto peccare posse. At unum minutum variat distantiam immaniter, si planeta prope ☉ aut oppositus ☉ fuerit. Hoc tamen certum habeas, quam proxime verum venire. — Itaque totam hypothesin tibi delineabo. Data anomaliam media (per notum tibi locum aphelii, cui $5'$ adimes jam, et notam motam

medium, qui manet) quaeritur anomalia eccentrici vel indirecte vel per tabulam. Per tabulam sic: aequationem maximam ex area trianguli aequatorii, quae est $5^{\circ} 18' 30''$ resolve in secunda et dispartire hanc summam per omnes gradus anomaliae eccentrici, rursumque in gradus redige; et appone ad illos suos gradus anomaliae eccentrici et juxta 90° anomaliae eccentrici erit $5^{\circ} 18' 30''$. Ergo per $95^{\circ} 18' 30''$ anomaliae mediae excerpitur 90, anomaliae eccentrici. Indirecte eadem anomalia eccentrici sic excerpitur: cum ante semicirculum semper sit minor anomalia media, post major, conjectura praeconcipe, quanto sit minor; ut, si anomalia media mihi daretur $48^{\circ} 46'$, vellem conjicere anomaliam eccentrici esse 45° ; sinus hic in summam secundorum $5^{\circ} 18' 30''$ multiplicatus et per 100000 divisus debet mihi relinquere $3^{\circ} 46'$ si bene conjeci, ut 45° et $3^{\circ} 46'$ efficiat datam mediam anomaliam. Habita anomalia eccentrici, ut 45° , multiplica ejus sinum 70711 in 430, curtationem, prodit 303, quam aufer a sinu 70711, manet 70408. Sume deinde sin. compl. anomaliae eccentrici, ei adde eccentricitatem 9264 in superiore eccentrici semicirculo, sc. a 270 in 90, aufer in inferiori a $95^{\circ} \frac{1}{2}$ in $264^{\circ} \frac{1}{2}$, vel ab eccentricitate aufer sinum compl., si is minor fuerit. Tunc: ut FD ad AD — (angulo FDA assumpto recto) — sinum illum curtatum (haec summa vel residuum), sic totus ad tangentem, quae offeret angulum anomaliae coaequatae. Is erit vel ipsa anomalia coaequata vel excessus coaequatae supra semicirculum vel alterutrius horum complementum ad semicirculum, pro re nata. Hujus vero anguli excerpe secantem: et fiat ut sin. tot. ad illam summam vel residuum, sic hic secans ad genuinam distantiam \odot a \odot . (Stultus ego; non vidi, me hoc modo exstruere easdem distantias cum libratoriis.)

N o t a.

Fundamentum hoc in ellipsi et circulo, ut diameter circuli ad breviorem diametrum ellipseos, sic FC ad NC per totum semicirculum, sic etiam FD arcus ad ND arcum; itaque etsi DNG brevior est quam DFG, si tamen relinquatur ipsi DNG appellatio 180° , tunc et parti DN relinquatur appellatio ea, quam vere habet DF. Ergo anom. eccentrici hic est DN, at non angulus DBN, quod me hoc Paschatis tempore et inde a Natalitiis fefellerat. Amplius, ut FC ad NC sic area DFA ad aream DNA. Igitur etsi area DFG major est quam 1800000 (quod probo peculiariter), tamen si areae DNG detur idem nomen quod areae DFG, retinebunt et partes DNA, DFA eadem nomina, licet DNB, DFB et ANB (?), AFB area metiens partem aequationis physicam. Igitur si circulus proferendus esset, tunc DF vel DBF esset anomalia eccentrici, et area DFA esset anomalia media. Sed jam in ellipsi non DBN, sed DN est anomalia eccentrici, et DNA area est anomalia media, et angulus DAN est anomalia coaequata, et AN vera distantia.

Denique utere orbium proportionem ea, quae est 100000 ad 152500. Si autem omnibus locis prodesse hoc videris, poteris uti 152400 vel 152600





Fig. 33.

In \propto 2 vel 3' deesse puto et huic et antiquis hypothesibus, forte propter falsam assumptionem in \propto . Nam δ habuit anno 93. in δ \odot magnam latitudinem. Sed non video, quomodo corrigere possim, ut nullum detrimentum inferatur locis reliquis. Et tamen possunt haec 3' in δ δ \odot efficere ad apparentiam 10—11'. Sed et aliud est quod desidero in hac hypothesi: nempe quod ad insaniam usque contendens causam naturalem confingere non possum, cur δ , cui tanta cum probabilitate libratio in diametro tribuebatur (res enim nobis ad virtutes magneticas pulchre admodum recidebat), potius velit ire ellipsin vel ei proximam viam. Fortasse tamen puto, virtutes magneticas non omnino respicere sinus, sed aliud aliquid.

Omnino sapit magneticam vim eccentricitas, ut est in Commentariis meis: ut si globus δ haberet axem magneticum uno polo \odot appetentem, altero fugientem, eoque axe porrigeretur in longitudes medias, tunc quam diu versatur in descendente semicirculo, maxime in longitudine media, porrigit polum appetentem versus \odot , itaque semper ad \odot accedit, sed maxime in longitudine media, nihil in apsidibus. Et tunc in ascendente semicirculo aequaliter fugit a \odot . Fortassis itaque (liceat enim mihi, jucundissime Fabrici, dum tecum loquor exerceri, dum exerceor proficere) alia aliqua lex est, qua magnes aliquis fugit et sequitur, quam sinus. Posito

Fig. 34.



enim, quod DFA sit corpus δ rotundum et DA axis magneticus: ego hactenus posui, quod Marte sic collocato, \propto ut Solem habeat in linea BC, sc. in K, ea sit proportio celeritatis ejus in accedendo ad celeritatem in recedendo, cum habet Solem in D, quae est proportio sinus (versus) IN ad sin. IB. Et in hac positione inventa est IN nimis parva, imo fere justa pro particula librationis, pro mensura; quid si ergo potius sic sit haec quoque vera celeritatis, ut NC ad BD aut alia aliqua? Nam si etiam in-

haereamus huic hypothesi magneticae, rationibus quibusdam cogemur alium aliquem modum quaerere. Primum, si \odot et poli magnetici D, A sunt in eodem plano eccentrici, non debemus suspitione quadam turbari, quasi aliud dicendum sit de solido corporis planetarum globo, aliud de circulo ejus maximo. Nam posito quod posuimus, globus totus potestate divisus intelligitur in infinitos circulos parallelos, a maximo utrinque ad minimos, qui omnes aequaliter versus \odot erunt dispositi, itaque proportio manebit eadem multiplicatis terminis. Sit ergo FDIA circulus quilibet in corpore planetae parallelus eccentrico, et sit FDI semicirculus appetens, FAI fugiens, Sole in BI versante fit aequilibrium, quia de semicirculo, qui Soli obvertitur, sc. DIA, dimidium DI est appetens, dimidium IA fugiens; Sole vero in BK versante, semicirculus RCM consideratur, in quo RI sunt partes appetentes, IM fugientes. Pone IG aequalem IM, igitur IG annihilabitur ab IM. Relinquitur RG considerandum pro mensura appetentis facultatis. Ubi MI complementum est ad IC discessum planetae ab apogaeo et IG similiter; ergo GR arcus est duplus ad IC discessum ab apogaeo. Quodsi partes appetentes aequae multae semper appeterent aequaliter quocunque angulo DBK, GBK &c., tunc omnino discessus ab apogaeo metiretur appetentiam et aequalibus temporibus aequalis esset distantiarum δ a \odot imminutio. Sed consideranda etiam fortitudo anguli. Nam Sole in BI versante, etsi nihil operarentur AI fugientes, non tamen DI appeterent, quia anguli DBI

nulla fortitudo h. e. quia Soli non obvertuntur DI partes respectu lineae suae virtutis BD, BI. Sed hic haereo in prodenda anguli mensura causa fortitudinis. Nam forte anguli DBC complementum CI metitur hanc? Non puto. Nam quando DBI incipit minui, tunc plus illi prodest ad appetentiae fortitudinem modulus aliquis imminutionis, quam cum pene totus absumitur. Nam igitur IN metitur fortitudinem omnino DBC? At huic id quod jam dixi repugnat multo magis (in margine: falsum hoc).

Tu hic mihi scrupulum moves de observatione δ anno 90. 18. Dec., dicis locum ejus computatum a Lance bor. et Spica differre a loco, qui exit ex usurpatione Lancis anstr. At ego nullam distantiam δ prodidi a Lance austr. (vide p. 94.)

Acquiesco in declinatione eclipticae a Tychone prodita citra controversiam, nec mihi Lansbergius ullum scrupulum movet hactenus quidem. Nec enim verisimile, quemquam hic Tychone diligentiorē esse posse. Nec ille suam obliquitatem inculcat, ut eam Tychonicae anteferat, sed ut collatione instituta veritas per has etiam tenues discrepantias confirmetur in iis, ubi discrepantia est nulla. Ita quidem est, dubitare quandoque soleo, an Tychonis calculus undiquaque verum locum \odot prodat. Causa mihi hujus dubii desumitur e re praesenti, quoties observationes in δ habitae non coire volunt ad communem circulum orbis Terrae prodendum. At certi quid statuerē aut temere hic a Tychone desciscere grave mihi est. De Solis parallaxi quidem paulo magis dubito, ut invenis in Opticis meis. At etsi unus scrupulus decedat, parum in obliquitate eclipticae peccatur, cum non multo major sit parallaxis Solis in γ quam in \odot . Esto enim parallaxis \odot tantum 2' quam Tycho dicit 3'; ergo in alt. 35° erunt 50'' diminuenda, in alt. 58° circ. 20''. Ergo obliquitas eclipticae circa 30'' minor. Inde et longitudo aestatis alia et eccentricitas \odot ; sed omnino perquam tenuia erunt.

Te quidem o Fabrici aequum est dolere, quod aliorum oculis videndum tibi est, et anniti ut tuis videas. Mihi ego meisque debilibus oculis de hoc alienorum oculorum beneficio gaudeo.

Redeo ad δ post aliquot septimanarum interpositionem. Sit nobis eadem figura corporis planetarii proposita, quae supra. Dixi supra, perinde esse sive planeta consideretur ut globus sive ut planum circuli; jam etiam hoc dico, perinde esse sive ut planum circuli consideretur sive ut linea. Nam certum est ex Gilberto et per se etiam sine ejus auctoritate, virtutem magneticam porrigi in rectum. Quare ut globus fingitur constare ex infinitis circularibus planis eccentrico parallelis, quorum omnium eadem est ratio, ita circuli planum propter hanc virtutis rectitudinem ex infinitis constat rectis, quarum rursum omnium eadem est ratio. Ergo planetae corpus ita considerari potest ut quaelibet recta, cum nulla aliam impediat, ut supra falso confluxi. Sit ergo AD (Fig. 34) axis magneticus fugiens in A, appropinquans in D, repraesentans unam ex infinitis rectis virtuosis corporis Martii. Sit autem B punctum medium inter AD, Sōle in BI; dictum, appropinquationem vel fugam fieri nullam, causa est quia A et D sunt in opere aequali. Ergo hoc est quasi aequipondium. Vide mea Optica Cap. I. Sit jam Sol in BCK, et centro B spatium BD circulus DC delineatur, et ex C, sectione circuli cum linea \odot , perpendicularis in DA ducatur. Si igitur CB sit trutina et AB, BD brachia librae, erit ut DP ad PA sic fortitudo anguli DBC ad fortitudinem ABC. Itaque fuga hic tanta est quanta DP,

appetentia tanta quanta AP. Aufer ab AP aequalem ipsi DP, quae sit AS, ergo SP est hic modulus appetentiae et AD mensura appetentiae angulo nullo. Et $AD : SP = BD : BP$ vel CN. Ergo sinus digressionis planetae ab apogaeo vel perigaeo metitur celeritatem accedendi.

Haec est demonstratio geometrica et certissima. Itaque si principia nostra bene haberent, omnino libratio fieret lege sinuum digressionis ab apogaeo. Sed quia experientia et ellipsis per experientiam certissime stabilita refragatur et vult librationem fieri per sinus versos digressionis ab apogaeo, sc. non per CN sed per NI, ergo principia nostra necesse est variari. Sumsimus autem pro CN perpendicularem NI in effectum. Ergo etiam in principiis pro AD sumere debemus perpendicularem FI. Nempé dicendum est, non tunc esse planetam in apsidibus, cum axis magneticus perpendiculariter incidit lineae ex Sole, sed tunc cum illi unitur (si potest). Quod etsi primo intuitu cum magnetica virtute in specie conciliare non possum, tamen me mirum in modum afficit. Nam in meis Commentariis relicta fuit haec objectio: si planetae per directionem axis in easdem mundi plagas virtute magnetica eccentricitates conficiunt, Terra idem faciet. At Terrae axis is solus directus est, qui porrigitur a ☉ in ♄, cujus directione accidit aestas et hiems. Circa hunc totum reliquum corpus diutius volvitur. Ergo apogaeum Terrae esset fixum in $0^\circ \gamma$, $0^\circ \approx$. At deprehenditur vagum et quidem jam in γ , \approx (quia Solis in ☉), olim vero in Π , χ . Ad hanc objectionem nihil respondere potui nisi hoc: rei cognatae similitudine modum similem demonstrari, non plane rem eandem. Hic jam experientia testatur, apsidum lineam in axis directi lineam competere, ergo Terrae apogaeum in $0^\circ \gamma$ esse stabile. Ubi una pars objectionis soluta est. De altera parte respondebo sic: in aequatione maxima circa $0^\circ \gamma$, $0^\circ \approx$ locum Solis Tychonicum nihil variari, si vel apogaeum a $0^\circ \gamma$ in $5\frac{1}{2}^\circ \gamma$ referatur. In γ et ☉ peccari quidem $11'$, sed illum errorem ex declinatione non posse deprehendi; in 45° (ex cujus declinationis observatione extruenda est theoria Solis) $7'$ quidem errari in loco Solis, si apogaeum $5\frac{1}{2}^\circ \gamma$ transponatur, sed illa $7'$ admitti posse, si declinatio ejus loci $2'$ erroris in observando admittat. Quodsi Tycho dicat, se declinationes vindicasse ab errore non tantum $2'$, sed plane $\frac{1}{6}'$: ergo id negare potero, eo quod parallaxis forte in minimis peccet aut obliquitas eclipticae. Objiciam ipsi suas observationes etiam in long. media. Nam anno 1588. 3. Martii eclipsis in $23^\circ \chi$ ostendit fixas $7'$ promotiores quam Tycho: et hic plane facit cum Landgravio. Aut dicam fortasse, centrum Solis vel Terrae in revolutione annua non manere exquisitissime in eodem plano et sub eodem circulo maximo, ut nec Luna in menstrua? De ☿ nondum ita scrupulose cogitavi, an ejus latitudo omnino constantissimam arguat inclinationem. Quid si autem haec causa, cur ego post 5 jam annos nondum tamen impetrare potui, ut operationes mea methodo institutae sibi ipsis consentaneas exhiberent distantias ☿ a ☉? Nam inter assumpta est locus ☉ ut certissime cognitus. Sed quid de veteribus, qui apogaeum in $5\frac{1}{2}^\circ \Pi$ posuere? Illi igitur in locis ☉ circa apogaeum dicendi sunt errasse $49'$. Nulla mihi religio hoc dicere, cum usi fuerint observatione solstitii imperceptibili.

Sed priusquam triumphum canam, cogitandum de physica causa, qui fieri possit, ut apogaeum conficiatur axe magnetico, manente in directa linea ex ☉? Quidnam est, quod simul fiat, ut ei causam transcribamus? Terra

in γ volvitur circa axem a septentrione per regionem \odot in austrum, contra in \simeq . Ergone haec causa recessus, illa causa accessus ad \odot ? Item in γ et \simeq dies aequantur noctibus in toto globo, in \odot , δ partes globi carent luce. An igitur haec causa accessus? (in margine: NB. refer in Commentaria.)

Sed missa in praesens hac inquisitione redeamus ad schema corporis Martii. Duo dixi: 1) sinum versum IN metiri portiunculam librationis, testante hoc experientia observationum. 2) Sinum rectum CN, vigore demonstrationis in Opticis positae, metiri fortitudinem accessus vel librationis. Haec duo putavi hactenus esse contraria, at videtur quod non. Nam alia est mensura fortitudinis librationis, alia mensura jam confectae particulae libratoriae. Illic IF repraesentat librationem totam, IN partem competentem anomaliae eccentrici per IC signatae. Hic DB repraesentat fortitudinem maximam, CN fortitudinem in anguli CBI momento. At ut DB non significat omnes fortitudines junctim, ita nec CN fortitudines omnes per totum arcum anomaliae CI. At si colligas summam sinuum 90, quae est 578943140, haec est mensura fortitudinum, quarum quidem effectus communis est librationis dimidium vel BI. Ita ergo etiam si colligas summam sinuum ad omnes gradus in CI, haec metietur portiunculam confectae librationis, quae si tantam prodet lineam, quanta est NI versus sinus, a quo stat experientia, tunc conciliavimus experientiam cum demonstratione librae. Videamus. Sit IC primum 30° . Summa sinuum 30 primorum est 79259831; 578.....: 100000 = 792.....: 13691. At sinus versus 30° est 13397, differentia perexigua. Sit secundo IC 60° , erit sin. vers. IN 50000, sed summa sinuum 60 est 290801743, paulo plus dimidio de 578...., quod est 289471570. (Comp. Cap. LVII.)

Rem igitur intra sensus propinquitatem adduximus optimis rationibus, Concludamus igitur, corpus planetae sic esse considerandum, ac si esset magneticum, quod accedat vel fugiat lege staterae, et diametrum virtuosam porrigi in longitudines medias. Illam vero objectionem de Telluris axe in apsidum lineam inconstanter tamen porrecto superis discutiendam relinquemus. Addam autem et hoc geometricum. In principio, cum sinus sunt parvi parumque de libratione decerpunt, versus sinus est dimidio minor summa librationis ex summis sinuum collectae, ut summa sinuum 90: 578... dat 100000, quid sin 1° —1745? Sequitur 30. Contra sinus versus 1° est 15, dimidium. Ex quo disco, quod alibi jam habui exploratum, non opus esse ut summas sinuum colligam et deinde per regulam de tri operer, tantummodo danda est opera, ut aliquo artificio nanciscar quadrata rectorum sinuum. Nam eorum eadem est proportio, quae summarum harum. At, inquis, quomodo nanciscar quadrata rectorum? Hoc te docebo ex Byrgianis fontibus derivato rivulo. Sinus versus alicujus arcus est dimidium quadrati de subtensa complementi 5 ultimis rejectis. Sit arcus 60° , sin. 86603, sin. vers. 13397, compl. 30° , dimidium 15° , sin. 25882, duplum 51764 est chorda arcus 30° ; quadra, reperies 26794 duplum sc. ipsius 13397. (Comp. ann 86.)

Ego, mi Fabrici, non literas ad te scribo sed commentaria. Ex quo cessavi scribere, tantum temporis est elapsus, ut jam vix ipse sensum capiam scriptorum nisi accurate relegam. Non lubet ergo nec pertexam; nam verum est quod ais (litteris 3. Apr. datis, quas hodie 4. Junii accepi), cumulatur mihi respondendi labor, non minuitur, dum aliae atque aliae tuae litterae superveniunt, quibus hodie acceptis ad tenorem respondendi redii.

Scias, distantias libratorias ad unguem satisfacere nobis. Probavi per stationes ab anno 82. in 95. Proportio tamen eccentricitatis et orbium fuit alia paulo. Eccentricitas sc. 9300 circiter. Et apogaeae distantiae ad medium radium orbis Terreni proportio quae 2 ad 3, non dimidio centenario de 100000 plus vel minus.

Hic confundam tuas literas ultimas primis. Quaeris (p. 98.), cur Soli tribuam distantiam 100000? Quia hoc peculiare est huic hypothese, ut tota theoria Solis adhibeatur ad omnes planetas et sic etiam ad Venerem et Mercurium. Nam in Venere circellum libratorium scias nihil esse aliud, quam hoc ipsum, quod distantia a Terra medii puncti, repraesentantis Solem, non manet eadem. Convenit dimensio. Nam eccentricitas Solis credebatur Ptolemaeo 4170; semidiameter circelli illius est 2080. Bisecat igitur eccentricitatem Solis, et ego utens distantias Solis a Terra variabilibus (in mea correctione) vel distantias Terrae a puncto repraesentante medium locum Solis variabilibus (in correcta Copernicana forma), non indigeo illo circello, qui hoc quoque nomine incredibilis, quod ad alienum orbem, Terrae scilicet, esset convertibilis. Habes unam causam, cur distantia Solis et Terrae sit 100000. Altera: quia pulchrum, veras omnium siderum distantias earumque proportionem ad invicem erui citra regulam de tri ex tabulis. Si nempe qualium δ a \odot 100000 talium \odot a γ est 400000, esset tunc \odot a η 900000.

In Cancellarii genesi (p. 98.) errorem non pertinaciter negaverim neque tamen fateri possum; quia vero ais, anno 95. d. 7. h. 7. p. m. fuisse similem positum et quia casus tibi circa longitudes medias eruendi distantias videtur aliquid difficultatis habere, age declarabo tibi superius et jam correctissimum praeceptum in hoc exemplo, tu ex eo de antiqua mea forma iudicabis:

1594. — 7 ^a . 28° 25' 39"	Solis locus. 25° 11' 16" \times
Nov. — 5. 25. 2. 23.	3. 50.
D. 6. — — 3. 8. 40.	25. 7. 26.
H. 17. — — — 22. 17.	30. 39.
Add. 3. 55.	10. 13.
1. 27. 2. 54.	2. 33.
4. 28. 59. 14.	25. 50. 51. \times .
(Anom. eccentrici) 91. 56. 20.	Dist. \odot δ 98225.

Quia sumus circa medias longitudes, conjicio aream trianguli aequatorii continere 5° 19' 10". Esset igitur complementum anomaliae eccentrici 86° 37' 10". Videamus an bene conjecerim. Sin. 86° 37' 10" est 99826, area maximi trianguli 5° 19' 43" (per eccentricitatem sc. 9300), hoc est 319' vel 19183", quae in sinum 99826 multiplicata dant 19150, quae sunt 5° 19' 10" plane ut conjeceram. Sed, inquis, hoc non est geometricum et quis semper tam felix conector esse potest? Vera objectio, sed mihi sufficiat, tabulam geometricam ad datas anomalias eccentrici posse construere, quod jam pridem feci et unde depromsi hanc tam felicem conjecturam. Ex eadem possem tibi statim dicere, complementum anomaliae coaequatae esse 81° 18' 50" et distantiam 100548. Sed exemplum pertexendum est citra tabulas. Igitur quia complementum anomaliae eccentrici est 86° 37' 10", dimidia libratio superior pene est absoluta, restant 3° 22' 50".

$$(80^{\circ}42'40'' + 36^{\circ}24'' = 81^{\circ}19'4''; [-14''] = 81^{\circ}18'50''; \sin. 3^{\circ}22'50'' = 5878 [\times 9300] = 547.)$$

Hic invenio 547 addenda ad radium et sic habeo distantiam justam. Dantur jam in ADC 3 latera, utere quibuslibet pro angulo A inveniendo. In praecepto jussi inquirere DC, estque sinus 99826 diminutus particulæ de 432 respondente sinui. Eaque DC et DA jussi uti et postea inquirere AC ex AD, DC; sed non est opus, ut video, inquirere DC, sufficit nobis AC et AD, cum AC simplicius detur. Igitur

$$AB + BD = AD \quad (9300 + 5878 = 15178)$$

Prodit DCA = $8^{\circ} 40' 56''$ (sin. DCA = $\frac{15178}{100548}$). Ergo A = $81^{\circ} 19' 4''$. Eccentricus locus $7^{\circ} 40' 10''$ II.

Utentes igitur proportionem 152500 invenimus:


100547	132. 44. 20	49. 19	7. 40. 10 II
50273	20. 53	2. 0. 32	25. 50. 51 \times
2514	1. 39. 3	1. 38. 38	161. 49. 19.
153334	⊙ 134. 44. 16		
vel 153233	25. 50. 51 \times		
982251	♂ 10. 35. 7 ♂.		
21600			
45. 0			
20. 53.			

Ecce repraesentatum locum ad unguem. Quomodo simul computes latitudinem, epistola ante hanc proxima perscripsi, potest etiam sic: multiplica inclinationem loci in $2^{\circ} 0' 32''$, prodit latitudo.

Dixi tibi simul compendiosum meum calculum (v. p. 98.); is constat tabulis 1) Solis, 2) loci eccentrici et distantiae Martis, 3) tabula indicis valde proluxa, sed jam confecta, 4) tabula anguli. Ex tertia cum 153200 a fronte et 98200 a margine ingressus invenio indicem, qui post correctionem rationalem facillimam evadit 21875. Ex quarto cum indice 21600 a margine et 161° angulo ad Solem ingressus invenio angulum $132^{\circ} 44' 20''$, et differentias pro indice 45', pro angulo $2^{\circ} 0' 32''$, quae eadem ut jam dixi est etiam utilis pro latitudine. Fuit haec laboriosissima sc. ante annum confecta. Cogito sic pro omnibus planetis facere si vixero. Possum enim construere sine observationibus, semper utiles ut sinus; si exemplum esset, mitterem.

Simul autem vides, vel jam tandem perfectum esse illud exoptatissimum conjugium et eliminatam adulteram illam vicariam. Omnia facta sunt quae petisti: causae sunt datae utriusque eccentricitatis, astronomiam habes sine hypothesis. Videtur quidem adhuc haec esse hypothesis, dum dico Martis eccentricum esse perfectam ellipsin. At prius hoc ex causis physicis conclusum est, non est igitur hypothesis in meis Commentariis; est vero in calculo, sed vera suppositio veri itineris planetarii, dantis distantias et aequationes. — Cum videas latitudines Martis cum meo calculo convenire (p. 98.) quotquot sunt observatae, debuisti omnino credere et illas convenire, quae non sunt observatae. At retrahit te Ptolemaei auctoritas, qui a me immaniter differt, nunquam in conjunctionibus ultra 7' latitudinem concedens, cum ego ultra 1° procedam. Quid igitur ego? Quid nisi ut moneam, incogitantis esse haec objicere. Quis enim unquam vidit ♂ in conjunctione ⊙? Certe vix a 60° distantia solitus est Tycho observationes inchoare; nam in conjunctione ⊙ valde parvus est ♂. Itaque nulla Ptolemaei observatio manduxit. Quae igitur ex sua opinione, sua hypothesis dixisti, mea opinione mea hypothesis destruuntur.

Fig. 35.



Haec Keplerus. Fabricius respondit d. 11. (21.) Jan. 1606, quaerens: cum in \odot . γ aut δ ex acronychiis longo temporum intervallo (10 aut plurium annorum) disjunctis, aphelii locus quaeratur, quaestio est, cui observationi acronychiae in praxi institutae aphelium respondeat? Certum n. est, unum et idem aphelium omnibus 3 aut 4 observationibus acronychiis respondere non posse propter motum aphelii interea factum. Tu redigis 4 observationes in circulum et sic inquis cetera. Existimo igitur, nec verum aphelium nec veram eccentricitatem sic dari posse, quia unum ex altero dependet &c.

His addit Fabricius rationem „post multas cogitationes“ constitutam, qua motus centri eccentrici \odot explicetur, subjungit vero statim cautionem: „ex festinatione male schema depinxi“ correctionemque explicationis suae. „Tu exactius hoc perpende et forte ansa tibi erit ad majora. Ego haec ob animi motus tristis clarius et fusius tractare nequeo.“ (Comp. Vol. II, p. 105.)

Deinde addit: Quando Hipparchus tuus et quando Martis Commentarius prodibit?

Nuper veram rationem mihi ostendere voluisti, quomodo angulus pro vera distantia \odot a \odot cognoscenda circa $5-6^\circ$ post mediam longitudinem \odot utrinque inquirendus esset. At adeo obscurus et varius in illis, ut nihil perciperim. Ostendetur mihi simplex ratio inquirendi istum angulum a 90° distantiae ab aphelio usque ad 96° idque utrinque a media longitudine versus perihelium. Tu conjectura nuper inquirebas istum angulum, at rationem a priori non dedisti. Certe ego invenio illic aliquid differentiae in observationibus, si angulus ille a 90° in 96° distantiae ab aphelio more solito quo cetera inquiratur; causam tamen discrepantiae non video. In ceteris omnia optime observationibus congruunt. —

Ad haec Keplerus non respondit, et Fabricius alias minime parce usus verbis jam ipse obmutuit neque per annum 1606. Keplerum iterum adiit. Consuetudinem vero literas dandi recepit initio anni 1607. eamque per annum 1608. eadem qua prius ratione tenebat: Keplerus in Martis Commentariis occupatus duas tantum remisit literas responsorias, ad alias Fabricii quaestiones minus quam antea respiciens, Martem firmiter tenens; memor forte illius: „docendo discimus“ et „se exercendi gratia“ Fabricio ea quae emendanda in astronomia, quae stabilienda in ipsius hypothesibus videbantur, sincere retulit.

Literae hae Kepleri datae sunt d. 1. Aug. 1607. et 10. Nov. 1608, easque, ut plenius perspiciatur id quod voluit Keplerus, non ut priores uno tenore proponendas censuimus, sed junctis Kepleri et Fabricii literis, quaestionibus vel objectionibus Fabricii singulis adjecimus responsionem Kepleri.

Fabricius (20. Jan. v. st. 1607): Per ovalitatem vel ellipsin tuam tollis circularitatem et aequalitatem motuum, quod mihi inprimis penitus consideranti absurdum videtur. Coelum ut rotundum est ita circulares et maxime circa suum centrum regulares et aequales motus habet. Corpora coelestia sunt perfecte rotunda, ut ex Sole et Luna liquet. Ergo non dubium est, omnes omnium motus per circulum perfectum, non ellipsin fieri, item aequaliter moveri super suis centrīs. At cum in ellipsi tua centrum non ubique aequaliter distet a circumferentia, certe motus aequalis maxime erit super suo proprio centro inaequalis. Quodsi igitur retento circulo perfecto ellipsin per alium circellum excusare posses, commodius esset.

Keplerus, praemissis quibusdam de observationibus Fabricii (Vol. II, 603.) pergit: Sed stella sepulta ad Martem mihi redeundum et cum Fabricio pugnandum. Ovali figura putas tolli aequalitatem motuum: equidem. At et spirales figurae tibi eandem tollunt, et Ptolemaicus aequans tollit. Etsi vero Copernicus reducere nititur aequalitatem motuum, non illam tamen reducit, quae spectatur in composito itinere planetae. In eo enim planeta incedit inaequaliter et praeterea exorbitat a circulo, quod fatetur ipse Copernicus. At principia, inquit, quibus motus ille efficitur, circuli nimirum, habent seorsim aequales motus. Fateor; sed non motus, qui phaenomenis congruum aliquid efficiant. Praeterea et mihi principia, quibus planetae motus efficitur, manent constantia. Differentia solum in eo, quod tibi sunt circuli, mihi virtutes corporatae. De cetero constans est mihi rotatio corporis Solaris eaque aequabilissima; constans circulatio speciei Solis immateriatæ et magneticæ; constans impressio hujus speciei seu virtutis motricis in planetam certo intervallo distantem; constans et circularissima licet tardissima conversio axis corporis planetae, unde progressus apogaeorum; constans virtus magnetica adunandi separandive corpora Solis et planetae in singulis angulis inclinationis axis planetae

ad lineam ex Sole. Quod autem planeta transit de gradu virtutis in alium, id fit egregia ratione ex jam positis principiis. Quid tu responderes philosopho, qui negaret, te ex rerum natura loqui dicentem: in toto ambitu planetae nihil esse nisi in uno ejus puncto? Numquid dices, hoc nil derogare perfectioni coelestis ambitus; planetam enim non posse esse in toto ambitu simul, sed cogi intra unius quasi puncti angustias, et tamen successive venire in alia omnia puncta? Idem ego dico: si in omnibus gradibus virtutis ex Sole consisterent planetae ibique manerent singuli, Sol experiretur eodem tenore omnes gradus virtutis suae in illos idque invariata; at quia planetae non possunt esse simul in omnibus gradibus virtutis ex Sole, succedunt tempore ex una in aliam, ut omnes impleant.

Quod ais, non dubium, quin omnes motus fiant per circulum perfectum, si de compositis (i. e. realibus) loqueris, falsum. Fiunt enim Copernico, ut dixi, per orbitam ad latera circuli excedentem, Ptolemaeo et Braheo insuper per spiras. Sin autem loqueris de componentibus, de fictis igitur h. e. de nullis loqueris. Nihil enim in coelo circumit praeter ipsum corpus planetae, nullus orbis, nullus epicyclus, quod Braheanae astronomiae initiatus ignorare non potes. Hoc ergo posito fundamento, nihil moveri praeter planetarum corpora, si jam quaeratur, qualis fiat linea corpore circumeunte? respondeo tibi ego non ex hypothesi suscepta, sed ex scientia demonstrationibus geometricis undiquaque munitissima, iter corporis fieri ovale, fere ut apud Copernicum, qui praeter corpus planetae etiam epicyclos et orbis movet. Quodsi darentur orbis solidi, possem utique et ipse facillime ovalem lineam repraesentare per concentricum et duos epicyclos, quorum semidiametri junctae aequent eccentricitatem eccentrici, sitque minoris diameter aequalis latitudini lunulae, qua differt ellipsis a circulo. Tribuerem enim epicyclo (majori) motum contrarium motui concentrici et aequalem ei in tempore restitutorio, epicyclo (minori) celeritatem duplam in partes easdem cum majori, et ponerem planetam simul in apogaeo utriusque epicycli, simul etiam et in perigaeo et in puncto (minori) epicycli, quod est a centro majoris remotissimum; ad latera vero concentrici esset in perigaeo (majoris) epicycli.

Ecce tibi suppellectilem Copernicanam levissima mutatione transpositam; ecquid placet? Mihi minime. Primum enim orbis nulli sunt; quid igitur juvat mentiri causas motus planetae ovalis? Deinde omnes hi tres, concentricus cum duobus epicyclis, fingerentur aequaliter jam tardi jam veloces, essetque mensura morarum in quolibet arcu distantia planetae a centro concentrici. At quae causa esset, cur concentricus motum haberet inaequalem? cur epicycli? et quae connexio hujus mensurae cum mensurato? Et est tamen haec mensura adeo propria hujus tarditatis, ut nullum centrum aequantis ne quidem libratile circulariter juxta se ferat aut pro se substituere possit. Ergo ut causa pateat connexionis inter mensurans et mensuratum, oportet mittere fictos circulos et ipsas amplecti distantias, quomodoque ex iis elliptica via ratione naturali efficiatur, perpendere.

Fabricius: Non sufficit salvare posse motus, sed etiam tales hypotheses constituere, quae principiis naturalibus minime dissentiant.

Keplerus: Mirifico consensu amplector hoc tuum dogma; et ea mihi causa fuit multi laboris in Commentariis Martis. Te vero quod attinet, admonitum volo, ut cum Osiandro transigas; qui praefationem scripsit in opus Copernici non apposito nomine (Comp. Vol. I. p. 245 et faciem aversam tituli hujus libri), transigas etiam cum Christiano Severini (Longomontano) qui putant,

media; area $\triangle EAB$ est excessus anom. mediae supra anom. eccentrici, EAF ergo pars aequationis una seu physica. Si ergo planetae iter esset circulus EF, tunc trianguli ejusdem angulus AEB esset defectus anom. coaequatae EBF ab eadem anom. eccentrici EAF et sic pars aequationis altera seu optica. Itaque ejusdem trianguli aequatorii area quidem esset pars physica, angulus vero pars optica aequationis. Atque sic haberes causam duarum operationum, duae enim causae sunt aequationis. Jam vide quid turbet ellipsis, imo quid proficiat. Manente enim prima parte aequationis physica ob causas supra dictas, jam pars optica, ob ingressum planetae ad latera, variatur quantitate anguli CBE.

Haec si diligenter consideraveris penitusque animo comprehenderis, causas calculi mei non miraberis amplius, sed scies, quid quavis operatione agas; computans enim aream EBF (h. e. aream BAE, nam EAF per se patet), computas summam distantiarum arcus CF et sic una tempus morae in CF. Hoc enim sic vult natura, ut quo longius planeta distet hoc diutius moretur. Computans vero angulum, non EBF sed CBF, redigis planetam in propriam et ovalem orbitam, ut justam habeat distantiam non EA sed CA; utrinque igitur supponis iter idem planetae FC non FE.

Fabricius: Si ellipsis tua veram hypothesin conformat, ex illa quoque dabis rationem, quomodo ex 3 acronychiis eccentricitas et apogaeum inquirendum, vel ostendes causam ex tua ellipsi, cur illa exquiri ex tribus non possint. Si motus undiqueque ellipsi respondent, tunc reciproce ostendere debes tanquam a priori, quomodo ex 3 acronychiis motus constitui possint, ut certe fieri posse ac debere omnino mihi persuadeo, et quam diu illa constitui non potes, tam diu ratio et hypothesis verorum motuum latet, nec ellipsis aut alia fictitia forma satisfacit animo, utut etiam motus coelo consonos praebeat. — Quare suda mi Kepleri in eo, ut ex 3 acronychiis statim et tanquam a priori eccentricitatem et apogaeum constituere possis, et ellipsin tuam facile abjicies et in excessu potius circuli latere veritatem invenies.

Keplerus: Quae sequitur objectio est expiscatio non objectio. Quid? tu me ita avarum putas, ut arte circumveniendum existimes ad prodenda arcana, quomodo ex 3 acronychiis hypothesis habeatur? Minime! Jam tentavi in Mercurio hanc artem, cujus est ellipsis evidentissima. Sed didici, ~~atque~~ omnium esse parabilissimam; sine ea conjectus fui in cossicos numeros molestissimos. Sic perpende, si daretur una observatio in ipsissimo aphelio, tunc statim altera addita observatio proderet hypothesin.

Tribus ergo datis observationibus h. e. trium coaequatarum differentiis, compara tempora interjecta. Ubi majus tempus interest, per priorem observationem statue aphelium et pertexe hypothesin per alteram observationem. Tunc ad tempus tertiae observationis computa locum pro tertia observatione idque ex hypothesi per 2 observationes inventa. Si igitur calculus observationem exprimit, peractum est negotium. Sin autem observationem calculus praecedat vel sequitur, tunc intelligis, aphelium falso susceptum, igitur pro qualitate excessus vel defectus primam observationem deduc ab aphelio et novo suscepto aphelio per primam et secundam, novam constitue hypothesin; id toties repete donec pro tertia observatione calculus congruat. *Ataxia* est, at casus omnino coactus et unicus est. *Ataxia* est etiam in illa methodo ex 4 observatis. Tu mihi nescio quid suspicionis de excessu circuli insinuas. Frustra! Nimis confirmatus sum de inventa per ellipsin veritate. Et quid argutaris de excessu? Omnis ellipsis ut deficit a circulo majoris diametri, sic excedit circulum minoris diametri. Copernicana excedens est ellipsis.

Fabricius: Si ellipsis tua geometrica esset, et distantia a Sole responderet loco, ad

eccentri: constituo excessum areae supra anomaliam eccentrici: et quia area motitur distantias omnes, distantiae moras seu tempus, igitur multiplicatione physica tempus colligo debitum huic anomaliae eccentrici.

Fabricius: Admiratus sum aliquoties, mi Keplero, ingenii tui subtilitatem summam; ac cuperam subtilitatem inventionum non adversari principiis naturalibus. Subtilis est Copernici hypotheseos inventio, at quam absurda sit, diffiteri non poteris. Ego omnino puto, veritati magis propinquum esse, quo quid simplicius fuerit, et veritas ipsa per se simplex.

Keplerus: Subtilitatem meam praedicandam putas, si non repugnaret naturae. Ego, mi Fabrici, damno omnem subtilitatem vel repugnantem naturae vel non necessariam. Dum vero mihi Copernicanam subtilitatem exempli loco ponis ob oculos, inepte facis, cum scias, quod tu damnes in Copernico me mirifice approbare. Cur igitur me hujus absurditatis vocas testem? Nimis vero late philosopharis de simplicitate veritatis. Est natura simplex, est et multiplex. Nec aestimanda est haec ejus simplicitas ex nostra opinione, sed ex se ipsa. Et vero mirum, si simpliciores quis attulerit hypotheseos quam ego constitui, in quibus planeta primum facultate animali directum tenet axem magneticum et successu seculorum nonnihil inclinatur, deinde idem planeta virtute corporali magnetica ad Solem accedit pro fortitudine anguli inclinationis axis ad Solem, tertio Sol planetam rapit in orbem pro modulo accessus ejus. Haec est genuina simplicitas, in ipsis spectata principiis. Ex his tam paucis si jam multa sequuntur, aequationis pars physica, optica, distantia, iter ellipticum, tunc ideo ob hos multiplices eventus negabis, principia esse simplicia? Oblitus es igitur Platonici illius: *οὐκ ἐν καὶ πολλὰ*?

Fabricius: Existimo, nunquam nos ad verarum hypothesium inventionem perventuros, nisi causae motuum penitus perspiciantur, et cur dimidia tantum eccentricitas adhibeatur in distantia, cum prosthaphaereses tamen aliam dent. Talem mihi da hypothesin mi Keplero, 1) quae primo intuitu primoque et uno calculo, non invariata hypothesi, ex eccentricitate totali veras exhibeat prosthaphaereses et simul veras distantias. 2) Ut ex illa ostendere possis duplicis eccentricitatis causam et rationem. 3) Quomodo ex eadem per 3 acronychia eccentricitas et apogaeum verum inquiri possit; et id ita, ut ubique circularitas et aequalitas motuum astronomice et geometricè retineatur. In his inquirendis per 4 annos laboravi et etiamnum laboro et lapidem astronomorum, ut sic dicam, inquirō.

Keplerus: Mirum vero, quales mihi scribas leges condendae hypotheseos ex tuo cerebro non ex coelo deductas. Directis verbis ea mihi imperas, quae totidem ego capitibus in Commentariis refutavi. Miseret itaque me tui laboris, qui tot jam annos *ἀδύνατα* tentas et in genere — actum agis. Inventas enim veras motuum causas, quatenus ab homine comprehendi possunt, constantissime assero.

Fabricius: Secantem in Marte adhibes pro ellipti; ac quae causa sit scire cupio.

Keplerus: De causa, cur secans aequationis opticae prodat ellipsis latitudinem, quaerenti respondeo ex Commentariis (Cap. LX.) sic: quando anomalia eccentrici est 90° et anomalia coaequata minor illa aequatione optica totali, puta $84^\circ 41'$, tunc observationes testantur, distantiam esse mediocrem, sc. 100000. At si iter planetae esset perfectus circulus, distantia tum esset secans anguli aequationis opticae 100432. Sit FAG (Fig. 37) 90° , BGA $5\frac{1}{4}^\circ$ circ., erit BG secans, quia AG radius et BA tangens. Ihe secans est 100432. Testantur vero observata, in hoc situ BH aequari ipsi AF vel AG, ut sic planeta non sit in G, sed in H. Ergo excessus BG secantis super BH, hoc est super AG, est latitudo lunulae resecandae a circulo, sc. fere HG. Habes ergo causam rei. Cur vero planeta in anomalia eccentrici 90° , h. e. dimidia totius, conficiat

cum sit, ideoque etiam cavendum, ne in FE numeremus tempus, sane et hoc esset contrarium verissimis motuum causis. Ergo quando planeta est in O, tunc ego ex D verum ejus locum nequaquam investigo; itaque non necessarium petis, ut hoc te doceam. Rursum tu dicis, FE simplicem (voluisti dicere „mediam“, quam Graeci *δμαλονησιον* vocant, simplex enim motus in Prutenicis ille dicitur, qui est a prima γ , cui ablatum est praecessiois motus), dicis igitur FE mediam et ad eam accommodas FD recte, sed hanc tu mediam dicis, puta quantitate, et putas esse hanc, quam ego dico eccentrici, cujus DAF coaequata. In his confunderis. Repetam enim, quod ex superioribus ipse potuisses. Data anomalia eccentrici elliptici FD, cujus nomen est in FE arcu circuli, erit area EAF mensura anomaliae mediae et angulus DAF erit coaequata. Datum ergo tempus, redactum in anomaliam mediam, quaerendum est in area perfecti circuli: quod quia geometricè nequit, tabulariter igitur faciendum. Nam tabulae facile construuntur ad singulos gradus anomaliae eccentrici FE (vel FD). Ergo dato tempore seu anomalia media, si tabulae factae non sunt, conjiciendum est de arcu FE, cujus sinus EC multiplicatus in valorem trianguli maximi BGA abjectis ultimis ostendit valorem $\triangle BEA$, quo excedit planum FAE sectorem FBE. Igitur, quia sector FBE et arcus FE exprimuntur in hac pragmatia numeris iisdem, additur ergo hic inventus valor trianguli BEA ad FE arcum (hoc est ad sectorem FBE), ut habeatur area FAE, quae si aequat datam (per tempus) anomaliam coaequatam, tunc bene conjecimus FE eccentrici anomaliam. Igitur inventa eccentrici anomalia FD vel ejus nomine FE, jam duabus viis pervenitur ad finem, vel per ED, quae habetur multiplicato EC in latitudinem lunulae 432, vel melius per DA, quae habetur multiplicato CB sinu complementi EF in BA eccentricitatem, et quod prodit (abjectis 5 ultimis) addito ad radium. Illo modo per DC, CA notas, hoc modo per DA, AC notas quaeritur coaequata DAC.

Quaeris hic, cur aream GBA in EC multiplicem et non in DC? Dixi supra causam. Nam et BAG terminatur ad circuli non ad ellipsis circumferentiam. Nam area ellipsis non metitur distantiarum summam in arcu ellipsis, ut nec area circuli metitur summam distantiarum in arcu circuli. At bona quadam fortuna geometrica fit, ut area circuli metiatur summam distantiarum in arcu ellipsis. Cujus rei contemplatio profecto mira et jucundissima est. Habes ergo causam triplicationis, tria enim quaeruntur: 1) physica retardatio, 2) distantia planetae a Sole (vel D ab FA et per hanc illa), 3) optica imminutio arcus. Tria haec sic suppeditat natura. Nam et Sol rotat planetam et planeta adnatat ad Solem et anguli alii sunt ad centrum eccentrici, alii ad Solem. Verte te in omnes formas, ex tribus unum non efficies. Etiam Ptolemaeus plures operationes postulat. Miraris rursum ut in literis, coaequatam statui ad punctum D, planeta ibi non versante, sed in O. Nego: ibi coaequata terminatur ubi est planeta. Nam in O (Fig. 32) planetam posui per fictionem, non calculum explicans sed aliud quippiam. Itaque DA est distantia, non OA, siquidem DAF sit coaequata.

Fabricius: Ex calculo colligis quidem tandem veram prosthaphaeresin et distantiam, idque ratiocinatione potius, quam geometricè; debebas enim in figura geometricè hoc quod intendis per lineas et triangula ostendere. Agitur hic non de valore areae, sed de distantia et lineis geometricis vel opticis.

Keplerus: Irascaris valori areae, cum agatur de lineis, caeco quidem impetu. Nam et area geometricum quid est. Quod vero astronomi hactenus

nullas areas adhibuerunt, factum est ex ignorantia causarum physicarum, quas in lucem jam protuli. In omni novatione imperiti irascuntur.

Fabricius: Necesse est, ut \odot non sit in D sed in O puncto, si prosthaphaeresis et distantiae convenire debent. At tu geometrica ex praesuppositis ostende per triangula, quomodo sit in O, vel ostende, quomodo DO inquiratur, et quomodo AO veram distantiam det, et OAF verissima anomalia sit. Hoc velim mihi ostendas et satisfacias tandem curiositati meae.


Keplerus: Rursum me urges, ut geometrica definiam punctum O, arcum DO, lineam AO, angulum OAF. Non est necesse nec possibile, ut dixi, habet enim FO arcus ellipseos suum nomen aliud quam FE: itaque non debent ista ex FE exstrui.

Fabricius: Cur non ex centro eccentrici mediam aut simplicem anomalias constituis et inde ex puncto S statim O punctum verum loci \odot in sua ellipsi demonstras et tandem ex eo puncto ostenso verissimam et coaequantam anomalias geometrica et astronomice exhibes?

Keplerus: Jubes ex centro eccentrici constituam mediam anomalias, sc. ut SBF sit media. Iniquum postulatum; sic enim et Ptolemaeo imperabis, ut faciat motum eccentrici aequalem non circa aequantis sed circa proprium centrum. Sed forte hic te non intelligo, mediam quantitate intelligentem, quam ego dico eccentrici. Tunc hoc quaeris, cur non BDS sed potius BE faciat anomalias eccentrici, et cur, quae facit anomalias eccentrici, ea non ostendat sectione sui cum elliptica locum planetae? Respondeo ut supra, FE se ipsa non est anomalia eccentrici, cum planeta in FD currat, sed est FE solummodo nomen ipsius FD: et fit ejus nomen non per EB sed per EC, cujus rationes non ex astronomia sed ex conicis petendae. Nihil interest astronomi, quale nomen cuilibet puncto ellipsis dem, dummodo illius angulum et omnes distantias metiar. Si metiar per circulum, facile fert astronomus, dum fatear, circulum hunc non ex astronomia sed ex conicis desumptum.

Fabricius: (die Paschae v. st. 1607.): S. P. Non puto tibi molestum fore, praestantissime mathematicorum nostri seculi princeps, et amice plurimum honorande, si saepius ad te scribam, licet meo studio tuos Atlanticos labores parum juvare aut sublevare possim. Puto tamen nihilominus, ejusmodi scriptiones mutuas suum habere fructum, quod saepe ad alia nunquam antea cogitata occasionem praebeant vel viam sternant. Eam ob causam Tuam Praestantiam quoque reverenter rogatam volo, ne meae importunitati crebrae succenseas, ad quam Uranicus ille impetus me impellit; et fateor certe ingenue, nisi tu mihi in multis quasi Ariadnes filum et Cynosura fuisses, jam dudum propter nonnulla dubia in salebris haerere coactus fuisset, immo jam plane abjecissem operosum hoc studium. At tua ut fidelissimi et ingenui praeceptoris institutione adjutus, majori quoque studio complexus sum hanc nostram Uraniam. Spero quoque, te minime deinceps commissurum, ut ea sic hinc in locis collabatur. Per biorem tuam hypothesin ex meis observationibus examinavi. Deus bone! quam valde exhilaratus sum, cum veritatem calculi tantam viderem et motus ex tua hypothesi erutos coelo exactissime convenire et ipse cognoscerem. Mitto meas quasdam obser-

Fig. 39.



vationes circa apogaeum et perigaeum, item circa medias longitudes. Sola ratio explorandi eccentricitatem orbis annui per 3 parallaxes ad unum eccentrici locum deficit, non quod communicata antea a te mihi non esset, sed quod in ipsa pragmatia difficultates antea non consideratas aut speratasprehenderim. Concise quidem et sine exemplo abs te tradita erant (p. 90).

Collatio enim arcus ad centrum C dupli et anguli alterius ad A eccentrici difficultatem injecit. Ego ex meis observationibus tria loca \odot apparentia ad unum eccentrici punctum accepi et feci KA 1000, et in ea proportionem latera AE, AF, AG inquisivi, et post per AE, AF cum comprehensione inquisivi EFA, item FEA. Ad eundem modum per AF, AG cum FAG quaesivi AFG et AGF; sic tertio quaesivi AGE AEG. Post FEA et GEA a se invicem subtraxi et

remansit GEF, cujus arcum FG ad C duplum accepi, et post complementum ad 180° in 2 secui, ut essent CFG et CGF aequales. Cum igitur \angle FGC conferrem cum FGA, non invenire potui talem differentiam AGC, quae totam, nedum dimidiam eccentricitatem Solis exhiberet, sed multo majorem. Quaeritur igitur, qua ratione collatio arcus dupli et anguli ad A constituti fieri debeat; an simpliciter fiat vel an forte anguli isti duo aequales adhuc aliter transformandi per reductionem aliquam? Secundo quaeritur, an non idem sit, sive in praxi FG arcus vel FE alter (respectiva tamen ad suos angulos relativos) adhibeatur?

Rogo plurimum et amanter, ut praxin illam ultimam a differentia duorum angulorum ad finem exemplariter mihi proponere digneris.

Cupio quoque scire, cur tria latera EF, FG, EG inquirere jubeas, cum tamen absque illorum cognitione anguli omnes ad A haberi possint?

Mitto tres observationes meas ad unum eccentrici punctum a me constitutas. Si placet, poteris has calculo subducere; sin minus, si tantum trium locorum Solis apparentium tres a Terra distantias computatas et per eas rationem operandi totam simpliciter tantum proponeres, plurimum me juvabis et ad comprobendam etiam hypothesis tuae veritatem.

Keplerus (pergens in literis d. 1. Aug. 1607): Absolutis iis, quae prioribus literis contra Martem moveras, jam et illa subjungam, quae die Paschae datis literis inferisti. Dicis, te mittere ad me Martis observationes a te adhibitae tres, ut inquireret eccentricitatem Telluris seu Solis. Non inveni illas. Methodus, ut illam recensuisti, bona est: itaque vel in assumtis vel in calculo errorem oportet accidisse. Confide igitur methodo et schema fac idoneum ad quod identidem respicias. Recte vero censes, nihil esse commune huic methodo cum usitata quaerendi eccentricitatem. Nam in illa dantur anguli ad centra utraque, hic dantur anguli ad unum centrum et distantiae ab eodem. Etsi nec illa antiqua carere possumus. Nam nostra methodo invenitur centrum eccentrici tantum, illa centrum aequantis: quod apud me degenerat in valorem areae.

Fabricius: Ad rationem tuam ex 4 acronychiis inquirendi aphelium et eccentricitatem quod attinet, videtur ea mihi difficilis et operosissima, quo etiam facile quis abstinere potest a calculo isto operoso (quem recte immanem laborem vocas). Cogitavi ego per hiemem, an non alia commodiori ratione hoc effici possit; item cogitavi jam antea per aliquot annos, quae causa sit, quod ex tribus acronychiis non detur aphelium et eccentricitas vera. Puto me tandem veram causam et veram facillimam rationem ista inquirendi adinvenisse vel saltem viam sat patentem aperuisse.

Cum in circulo omnis illa acronychiorum operatio et calculatio fiat, nunquam hoc simpliciter sic fieri potest; ratio, est quod acronychia non sint in circulo vel in ejusdem circuli circumferentia re vera fiant, sed juxta tuam hypothesin intra, vel juxta meam sententiam extra circulum. Ostendam vero id juxta meam rationem, quae mihi melius perspecta et magis ad probandum quod intendo commoda.

Jam proponit Fabricius „rationem“ hanc, addito schemate satis complicito, quod posthac emendatius transmisit. Summa, pergit, haec est: $15'$ secantis \odot in causa sunt, quod simpliciter ex 3 acronychiis aphelium non detur verum. Nam acronychia non sunt in uno et eodem circulo, sed evagantur utrinque extra eccentricum fixum et verum. Si igitur verum aphelium habere cupimus, tunc \odot loca reducenda sunt per haec $15'$ ad circulum, et post pro consequendo arcu tertio medii motus agendum, non aliter ac si tria illa loca essent in circulo, cum re vera non sint, at per reductionem circulo sint adaptata.

... Nullo modo dubito, mi Keplere, in his $15'$ mysterium illud hactenus latens inesse; ostendunt hoc distantiae circa medium longiores, quam in linea aphelii. Quare ut tu in tua hypothesi (vel ego in excessu circuli) per ellipsin et defectum circuli ratione $15'$ loca acronychia inquiris, ita contraria ratione ab acronychiis retrocedendum erit ad hypothesin et ejus constitutionem. Adhibe alia quoque exempla ad ostensam rationem traducta et videbis, quam proxime respondere. Certa in excessu et pro eccentricitate differentia exigua, at aphelium paulo plus variat.

An igitur ultima correctio ex praedicta causa sit vel ex motu variati interim aphelii vel praecessione coeli, quod primus arcus sit plus augendus vel minuendus, nondum certum scire possum.

Tu putas \odot ad latera ingredi circulum, ego potius egredi puto.....

Nisi ego, mi Keplere, multis officii mei quotidianis molestiis, domesticis curis et aliis impeditus, plus efficere in his per adhibitum correctum calculum; sed multa obstant.

Quare absque impedimento non semper possum, quod maxime curo. Cogita, suda, labora mi Keplere, ut aperta via progrediari et omnia penitus speculeris, sive in tua hypothesi sive per excessum potius circuli, ut rationem inde veram et facillimam eruas, inquirendi. Nam tuus modus adeo laboriosus et taediosus, ut primo intuitu absterreat &c.

Keplerus: Miram tuam audaciam! Tune me provoces confingendis hypothesibus? Cum ego planetam a circulo dicam ingredi, tu paria faciens dicis egredi. Obviant igitur invicem meus et tuus Mars in angustiis portarum, vide uter fortior. Non fert meus hunc aemulum.

Sic quoque Alexandri pugnacem imitata phalanga

Simia fert humeris Martia tela suis,

Tela: sed avulsos curva Jovis arbore ramos,

Quos magno boreas impete stravit humi,

Aut longa annorum series putredine: bello

Omnibus ut possint non tamen apta geri.

Ego mi Fabrici non ingenii volubilitate, non poetica aut pictoria fingendi licentia sum inductus, ut dicerem, ingredi Martem ad latera, sed observationum Braheanarum filum demonstrationesque secutus invictas. Tu licetingas, quod tibi animi libido dictet et fatigeris ad mortem usque, ingenium perdens, hoc scio, te frustra fatigari et actum agere, cum potius animum et ingenii vim ad certa transfers, et quia cupiditas tua ingenique volubilitas destituitur ab invicta fortitudine insistendi coeptis et a prudentia in deligendis laboribus; aggredere igitur Ephemerides ex tabulis jam factis, ut opera tibi non ita misere pereant, quin potius adspiret ad aliquod bonum publicum. Sed et illud non recte habet, cujus causa introducis istam evagationem. Causa enim, cur ex 3 acronychiis non possit aliquid certi concludi, est haec sola, quod liberam relinquimus sectionem eccentricitatis aequantis. At si imperetur certa, h. e. bisectio, jam omnino aliqua formatur hypothesis a 3 acronychiis, necessitate geometrica, sive jam circulum ponas sive ellipsin sive quamcunque figuram itineris planetarii. Tu vero videris confundi inter haec duo: nihil concludere et falsum concludere. Posita bisectione et posito circulo, tres acronychiae non concludunt nihil, non concludunt incertam vel vagam hypothesin, sed unam certam. At quia falsa fuit positio circuli, falsam etiam concludunt hypothesin. Falsitatis vero causa non est sola illa, quam tu infers 15' parallaxis seu prosthaphaeresis aequationum eccentrici, sed mutata linearum longitudo ad latera. Nam quod attinet latitudinem lunulae, efficit haec quidem aliquid in prosthaphaeresi aequationum, sed non efficit maximum, ubi maxima est latitudo lunulae. In anomalia coaequata 0°, 90°, 180°, 270°, 360° evanescit ista prosthaphaeresis et planeta spectatur ex Sole (vel quasi) eodem loco, sive in circulo currat sive in ellipsi. At in anomalia coaequata 45°, 135°, 225°, 315° est maxima, neque tamen 15', sed nisi fallor 8'. Ac ne haec quidem simpliciter, sed tantummodo tunc, cum planeta ex circulo ad ellipsis circumferentiam ingreditur in sinu recto anomaliae eccentrici. Si vero ponatur ingredi in radio veniente ex centro eccentrici, tunc plane nihil sensibile mutatur in aequatione; itaque omnis causa falsitatis hypotheseos, quae nascitur, in sola abbreviatione linearum tunc consistit. Denique video, te 15' et latitudinem lunulae accipere pro eodem. Latitudo lunulae, quae ab eccentrico Telluris seu Solis est resecata (indice secante arcus 1° 1' 13" dimidia aequationis Solis) est 15, verius 16, qualium radius 100000. Atque hae sane 16 particulae cum sinu recto anomaliae eccentrici accrescunt in longitudo medias. At lunula a Martis eccentrico circulo resecanda habet lati-

ordinem 432, multo majorem. Sed nec illud capio, cur vel illam vel hanc dicas 15'? Nisi forte, quia haec lunulae latitudo efficit nobis, si distantias ex perfecto sumamus circulo, errorem alicubi 15' in observationibus extra situm acronychium. At quid haec 15' ad aequationes eccentrici, cum sint aequationes orbis? Tot nominibus cum peccet tua speculatio e trivio arrepta, noli a me limam petere. Immo securim affero radicitus illam excisurus et igne aboliturus. Miseret me tui itineris, qui tantis laboribus, ut ais, huc usque tandem, id est ut interpreter eo pervenisti, ubi esses si interea dormivisses. Sed et consilia suppeditas quid agendum, ut ista tua perficiantur. Stulte consulis, docuit me Alexander nodum solvere Gordium. Itaque consulo ego tibi ne actum agas. Dico tibi, si centum superessent planetae, dummodo tales ejus observationes haberemus quales in Marte, meis inventis ad eorum hypotheses perveniri posse, siquidem illi naturam horum 7 planetarum imitarentur.

Verum ex defaecato animo (puto te a somno expergefatum, nam litera paulo variat), agnoscis tuos ipse labyrinthos et quaeris ex me, numquid ab anomalia coaequata, quae datur dato aphelio, perveniri possit ad tempus seu anomaliam mediam data eccentricitate. Omnino docui in Commentariis cap. LX. Via est geometrica, etsi longa, cum contra via a media seu tempore ad coaequatam sit *ἀντιστοιχιστος* per regulam fictionum. Miserum me, si 60 capitibus perscriptis nunc demum te monente de genuina causa utriusque eccentricitatis esset cogitandum.

Fabricius: Adjungo exemplum trium acronychiorum recte constitutorum. (Vide infra in Kepleri responsione.)

Inter 1595 et 1600: medius motus simplex tabularum $87^{\circ} 18' 42''$; apparens $81^{\circ} 6' 50''$
1600 et 1604: " $82^{\circ} 21' 10''$; " $70^{\circ} 1' 20''$

$\odot Q$ " arcus medius $87^{\circ} 18' 42''$; " at ratione V 14', ratione F 6' fere, summam 20' addo arcui medii motus VF ($\odot Q$), et fit in circulo TG $87^{\circ} 38\frac{1}{2}'$, angulus apparens primus $81^{\circ} 7'$, complementum ad 180° est $98^{\circ} 53'$ videlicet SGB (ipse Fabricius antea correxerat errorem in schemate commissum, dicens: „punctum Terrae medium vicinius centro“), duplum $197^{\circ} 46'$, subtensa 1976008 SG. Hunc duplo adjungo GSB correctum medium $87^{\circ} 38\frac{1}{2}'$, summa $285^{\circ} 24' 30''$, et sic tertius angulus SGB $74^{\circ} 35' 30''$, subtensa 1211731 SB.

De secundo triangulo: RBS, qui est apparens $28^{\circ} 52'$, duplum $57^{\circ} 44'$; subtensa SR 965546. Adjungo 2 correctos medios TG $87^{\circ} 38\frac{1}{2}'$ et GR $82^{\circ} 2'$ (nam ratione F 6' et ratione Q tertii acronychii 13', summam 19' subtraxi a medio tabularum motu $82^{\circ} 21'$), et fit summa medii motus $169^{\circ} 40\frac{1}{2}'$; et angulus RSB et sic tertius SRB fit $132^{\circ} 35\frac{1}{2}'$, subtensa SB 1831205.


Cum igitur SB bis habeatur in diversa mensura, igitur SB secundi trianguli reduxi ad rationem subtensarum primi trianguli SGB &c.

Keplerus: Jam conferam tuas tres cum meis in Commentariis.

Tu 1595. 30. Oct. h. 23. 55' in $17^{\circ} 31'$. \odot Ego — 31. Oct. h. 0. 39' in $17. 31. 40$. \odot
1600. 18. Jan. „ 13. 46' — $8^{\circ} 38'$. \odot — — — — 14. 2' „ 8. 38. 0. \odot
1604. 28. Mart. „ 16. 35' — $18^{\circ} 39\frac{1}{2}'$ — — — — 16. 28' „ 18. 37 $\frac{1}{2}$. \approx

Ut vero jam tu ex tribus his extruas hypothesin supposita ellipsi, parum mea refert. Lude ad satietatem. Meam sententiam supra dixi. Tem-

Fig. 40.



pus inter 1600 et 1604 est majus in proportione, ergo statuerem aphelium in postrema observatione in \approx , aut si praescirem, magnam esse eccentricitatem Martis, viderem vero parum differre proportiones temporum ad arcus coaequatos, hinc facile intelligerem, aphelium esse circa mediam in $9^\circ \mathcal{Q}$; posito ergo aphelio in $8^\circ 38' \mathcal{Q}$, jam conjicerem unam eccentricitatem, ex ea mediante tempore extruerem pro 1604 aequationem, minuendo vel augendo eam quoad responderet observationi. Ubi nota, posito aphelio in ipsa acronychia $8^\circ 38' \mathcal{Q}$, poni motum medium ibidem, unde is mediante tempore derivatur in 1604. Sic constituta eccentricitate per 2 observationes, jam etiam computarem pro tertia anno 1595. Certum autem est, locum computatum casurum ultra observationem ob vitium aphelii. Hoc animadverso aphelium tantisper promoverem primo magnis saltibus, usque in alteram observationem $18^\circ \approx$; postquam res in contrarium caderet, inciperem comparare proportionalitate utens, donec ad rem veniretur.

Sed objicias, clarum quidem quid velim, ubi confertur aphelium in ipsam observationem; quid vero, si extra? Tunc enim nescitur motus medius. Quid aliud nisi ut dicam sic: posito aphelio in $9^\circ \mathcal{Q}$, aequatio motus medii in $19^\circ \approx$ fit tanta; quare posito aphelio in $19^\circ \approx$, aequatio fit nulla. Dum igitur aphelium a $9^\circ \mathcal{Q}$ in $19^\circ \approx$ transponitur, motus medius tanto augetur, quanta fuit initio aequatio in $19^\circ \approx$. Ergo proportionaliter (nam proxime aphelium aequationes fere proportionantur partibus anomaliae mediae) transpositio minor minus augmentum postulat motus medii. Sed hac ἀμύγανη non est opus, ut jam videbis.

Fabricius: Tu duo, quae semper conjuncta sunt, separata facis et assumis pro lubitu aphelium; item medium motum, et haec duo separatim exploras, et ubi sigillatim tuae probae respondent, conjungis. Ego vero haec volo, ut cum aphelium et eccentricitas semper in certa proportionem respondeant, uno dato et illo per suam probam explorato, supersedere possimus de alterius veritate inquirenda. Quaero ideo, an dato aphelio vero cum eccentricitate vera veraque anomalia directa ratione ad anomaliam mediam medique motus constitutionem perveniri possit et quomodo?

Keplerus: An dato aphelio, eccentricitate et coaequata anomalia detur medius motus, dixi supra, repetam hic. Data eccentricitate datur latitudo maxima lunulae: hac data, datur maximus angulus aequationis opticae, igitur anomalia coaequata illi respondens et una angulus aequationiculae, quam causatur latitudo lunulae. Dato hoc angulo ad unam coaequatam, datur idem ad omnes coaequatas, et sic etiam ille, qui respondet nostrae coaequatae. Nam crescit et decrescit, ut rectangula quadrantis. Rectangulum quadrantis fit multiplicato sinu arcus in sinum complementi. Aequationicula haec in semicirculo descendente addita ad coaequatam constituit talem angulum, qualis fuisset, si planeta mansisset in circulo. Ex hoc igitur angulo, eccentricitate et radio (quia jam in circulo sumus) invenitur angulus anomaliae eccentrici, cujus sinus multiplicatus in secunda scrupula valoris maximi trianguli ostendit, quanto anomalia media superet anomaliam eccentrici. Valor maximi trianguli habetur sic, si dicatur: ut area circuli diminuta 5 cyphris (est autem 314159) ad secunda omnia totius circuli, sic dimidia eccentricitas ad valorem areae maximi trianguli aequatorii.

Hoc tenens jam vide, quomodo ex duabus observationibus et posito aphelio inveniat simul et eccentricitas et motus medius. Nimirum per aliam ἀμύγανη: oportet enim ponere aliquam eccentricitatem et cum ea in utraque observatione, methodo jam scripta, inquirere anomaliam mediam, conjunctis anomaliiis mediis, si tempus prodit majus debito, erit major debito

eccentricitas. Posita igitur minori eccentricitate et iisdem praestitis facile per proportionalitatem venit ad hypothesin, duabus observationibus et posito aphelio satisficientem.

Fabricius: Queritur, an dato excessu super semicirculo, subtensa dimidii excessus vel sinus rectus accipiat ad constituendum aphelium?

Keplerus: Queris aliquid, quod non percipio, ad doctrinam puto triangulorum pertinens, de excessu super semicirculum. Non possum tibi dicere plura quam haec: duorum semicirculi arcuum, qui juncti semicirculum faciunt, sinum esse eundem non nomine tantum, sed in effectu calculi etiam.

Fabricius: Credo te in acronychiorum calculo uti simplici motu medio tabularum, non composito, vel qui praecessionem aequinoctii implicitam habeat.

Keplerus: In hypothesi acronychiorum parum interest, unde fiat initium numerandi, a fixis an ab aequinoctio, modo, si ab aequinoctio, motus praecessionis interjecto tempore competens suis locis ab angulis auferatur, quod ego praestiti diligenter.

Fabricius: Hic ostendam etiam, vero aphelio dato circulum verum non dari &c.

Keplerus: Arguis, aphelio posito et 4 acronychiis, non dari verum circulum. De re ipsa tibi assentior, nam in commentariis ostendi, non omnes 4 observationes perfecte in circulum cogi posse. At de quantitate nego. Vix 3' coactione in circulum eripiuntur observatis. Tuam demonstrationem non lubet excutere, nimis multa peccat et taediosa est eo, quod frustranea re peracta. (Fabricius sententiam suam pluribus defendens addit: „deficiet aliquid aut abundabit ad 10, 20, 30 aut 40 minuta et plura paucioraque.“)


Fabricius: Cupio abs te cognoscere, cur in tua „Genesi“ secans eccentricitatis dimidiae 15' tantum accipiat pro defectu circuli, non plus aut minus? Forte, quod propter eccentricitatem linea ex Terra ad circulum producta tanto sit minor quam radius circuli, cum tamen, ratione motus, aequales esse debeant.

Keplerus: Risi te, qui in mea „Genesi“ invenis secantem; abacissores quidem praedicant astrologi, sed ii mihi non placent. Tu vero ex astrologo et astronomo confusus, cum „Hypothesi“ velles dicere, „Genesi“ dixisti ex abundantia cordis. Rem habes supra, secans est longior radio. Planeta in anomalia eccentrici 90° distat radio, punctum vero circuli in anomalia eccentrici 90° distat secante a Sole. Ergo planeta excessu secantis discedit a circulo.

Fabricius: Vellem ut simpliciorum tuam hypothesin facias. Geometrica est, sed cuperem etiam esse opticam. Tu aequantes eliminat; alia ratione geometrica illius vicem supplere conaris, videlicet per valorem vel aream trianguli; multiplicas dimidiam eccentricitatem cum radio et sic quadratum vel aream quadratam constituis CBFH et in eadem proportionem etiam ad singulas anomalias sinus aream trianguli constituis. At quid rei illi areae est cum hoc sinu? Requiritur angulus opticus prosthaphaereseos secundae, non valor areae geometricae. Per se vera illa sunt, at ratio non apparet applicationis. Sit I medium locus et MAK conaequata anomalia, jam debebas non per valorem trianguli, sed per opticum angulum (utpote KAT) ostendere, Martem in T constitutum per duplicem illam aequationem ad K et T puncta optice convenire observationibus. Si LH 15' secantem subtraxeris (in 90° anomalia) a radio, relinquit sin. 84° 41', et sic LH quasi vi quadam illam alteram prosthaphaeresin hic salvat, ita ut ALB unam prosthaphaereseos partem exhibeat, HAL alteram &c.

Plurimum rogo, ut causam geometricae illius operationis ostendas, cum optica ratio nulla suffragetur; item cur bis eccentricitatem adhibeas, semel quidem recte juxta centrum, et semel apud singulos sinus? Cogita de tali ratione, ut dato loco medio, exempli loco I constimilem illi des in tua ovali situm, sive in K sive in T, et post ostendas optice angulum IAK vel IAT totam prosthaphaeresin constituere, et AK vel AT veram distan-

Fig. 41.



tiem dare. Ego puto, te alteram prosthaphaeresis partem, ut et distantiam potius rationatione geometrica colligere, non vero astronomice et optice hoc ostendere posse, in schemate ita esse aut fieri oportere. Implicatio quoque indirecta trium diversarum anomaliarum ut difficultatem maximam calculo injicit, ita suspicionem movet, hypothesin naturalem non esse. Addam, quae inter scribendum mihi commodiora visa sunt ad intellectum tuae hypothesi. Triplicem tuam anomaliam sic intelligo: Constituis simplicem mediam in circulo E (Fig. 37), cui in ovali respondet C, ad hoc igitur punctum coaequatam constituis (EAC). Si vero producatur illa linea ab ovalis puncto ad circulum D, et illi loco congruentem rursus in ovali quaesieris K, erit punctum retardationis ζ , et sic ibi altera aequatio erit. At ostendendum, ad illud punctum retardationis geometricae ζ CAK re vera constituere alteram aequationis partem et AK distantiam veram. At distantia debet fieri per dimidiam eccentricitatem ad medium in ovali C non ad K; major igitur erit distantia in K quam in C. At poteris angulum CAK facere non opticum sed geometricum, vel habentem valorem istius anguli, et sic K punctum propius accedet ad C. At, mi Keplere, per valorem trianguli istum secundum aequationis angulum non oportet excusare, sed per opticum angulum, sicut in prima aequatione ad C fiebat.

Sic omnia ex uno fundamento procedunt. Sed forte istas tuas subtilitates non satis, quod magis opinor, percipio &c.

Keplerus: Recoquis ea posterioribus hisce literis, quae et in prioribus, sed dilucidius; movet te triplex aequatio. Verum sunt duae tantum, tertia liberat nos ab opinione circuli, cum vere ζ eat in ellipsi. Vis opticam aequationem, cum sit et causa physica inaequalitatum, quam salvo per aream trianguli: vide supra. Latitudinem lunulae facis 15, quae est 432: vide supra; cum sint particulae radii, tu facis minuta circuli: vide supra. Tribuis huic ingressui 15' in anomalia 90°, cum ibi effectus ejus in aequationibus eccentrici evanescat: vide supra. Nec potes concoquere, quod pro valore trianguli aequatorii, cujus latus unum est eccentricitas, ego dimidiam eccentricitatem multiplico in sinum anomaliae eccentrici, hoc est in altitudinem trianguli aequatorii, immemor principiorum geometriae, quod triangulum rectangulum sit dimidium de parallelogrammo rectangulo ejusdem altitudinis, et quod triangula aequibasias sint ut altitudines.

Anomaliam mediam, quae per tempus habetur, perperam numeras in eccentrico circulo, in quo deberes numerare anomaliam eccentrici, nec potes assuescere, ut numeres in area, quae subest illi arcui: vide supra.

Cum ubique crepes, totam hypothesin debere esse opticam, tandem suspicaris, naturalem non esse, sed ortam ex ratiocinatione h. e. ex phantasia mea, eo quod tres sint anomaliae. Immo, nisi tres sint, naturalem defendere non potero. Nam media a me dicta est numerus morarum; en naturam! mora est in rerum natura. Eccentrici anomalia est arcus itineris: en naturam! si quidem est in coelo locus, per quem planeta transit. Coaequata est angulus visionis ex Sole (vel quasi), en naturam! visio, opsis, optica causa est res in natura. Certissimum est, omnia tria concurrere ad inaequalitatem planetae. Tu vero ne nunc quidem, cum tres habes anomalias, satis habes. Oportet ut tibi quartam insuper nominem.

Nam ego duos illos arcus, ellipticum et circularem, qui ab uno sinu rescinduntur, pro una anomalia eccentrici habeo, hoc discrimine, ut arcus ellipseos sit illa vera et naturalis anomalia, dans et coaequatam per immersionem sui, et opticam; arcus vero circuli sit nihil nisi geometricum elliptici arcus nomen, mensurandi arcus et areae ellipticae causa inductum. Tu vero perpetuo obliviscens anomaliam mediam seu temporariam quaerendam esse in area ellipseos, hoc, inquam, obliviscens ex arcu circuli eccentrici facis mihi mediam anomaliam, cum sit haec anomalia eccentrici, vere quidem media, sed quantitate inter reliquas duas, at non sensu antiquo

astronomorum, qui voce media expresserunt Graecorum $\theta\mu\alpha\lambda\eta$. Ego, mi Fabrice, si astronomiam de novo traderem, sic ut mihi non esset opus loqui cum antiquis, uterer vocibus aliis. Dicerem moram, arcum, angulum, circulum; arcus elliptici nomen, morae mensuram, circuli aream.

Fabrice in literis d. 13. (23.) Apr. 1607. redit ad quaestiones priores de „tribus parallaxibus Martis ad eccentricitatem orbis annui inquirendam,“ deinde pluribus refert dubius de observationibus Tychonianis, refractionum vim in locis Veneris et Solis a Keplero demonstratam capiens, quaestionibus omnimodis more consueto repetitis sic concludit: Vale et rescribe quam citissime. De statu Tenguaglii et Ericksen valde sollicitus sum. Haec raptim et carptim scripta, plura et solidiora de tuis hypothesebus et earum examine a me facto in literis prioribus habebis.

Ad haec cum Keplerus non statim responderet, die 1. (11.) Junii 1607. Fabricius illum addit hunc in modum: Praestantissime et candidissime Vir, amice colendissime. Jam tot ad te mihi toto vertente anno literas, ut numerus exciderit. Cum igitur nihil reciperem, cepti dudum desperare, non quidem de tua amica benevolentia, sed de fortuna minus prospera. Venit nunc ad me D. Cancellarius, communis studiorum nostrorum patronus, et nunciat, si quid Fram scribere velim, pararem. Quare me denuo accingo ad scribendas literas idque tumultuario stylo, ne mora D. Cancellario per me injiciatur. — Jam immixtis quibusdam de Kepleri libro de stella nova (v. Vol. II. p. 602.) sic pergit:

Rogo ut ad omnes meas literas tandem aliquando plane respondeas, praecipue vero per exemplum sive verum sive fictum vel assumptum ostendas, quomodo per tres parallaxes datas annui orbis quantitas et eccentricitas inquiretur. Perscripisti mihi ante triennium rationem, verum admodum obscure et intricate. Ego nunc per hiemem tuam hypothesin Martis examinans etiam tentavi illam partem, sed non successit. Causam scire non potui &c.

Cupio scire, cur dimidia eccentricitatis \odot secans pro lunula accipiat vel pro defectu viae \odot , non major aut minor? Si verissimam causam dabis, multa dubia mihi auferes. Si in $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{4}$ eadem ratio magnitudinis secantis pro eccentricitatis dimidia proportione, necesse est ejus rei communem esse aliquam causam. Forte semidiameter circuli ex proprio centro et ex Sole (ad Tychonis enim hypothesin accommo omnia) ad circulum productus paralleliter facit illam motus differentiam; at tamen quomodo fiat non video &c.

Maxime quoque in prioribus mentionem feci, ut cogitares, cur ex 3 acronychiis observationibus verum aphelium et vera eccentricitas non detur? Causam ego invenio latere in $15'$ illis lunulae \odot ; si enim illa pro distantia \odot ab aphelio debito auferantur ab arcu medio tabularum duabus observationibus intercepto, vel ei addantur, tunc datur aphelium verum et illi semper connexa vera eccentricitas. Si enim in hac praxi unum scitur, tunc et alterum scietur.

Ego puto, me talem hypothesin \odot excogitasse (desiderantur saltem quaedam plenius examinanda per 3 parallaxes ad unum locum), quae sua facilitate nulli sit cessura. Salvatur quidem calculus per tuam, at implicatio et obscuritas et difficultas ipsarum hypothesium tuarum clare (ut pace tua dicam et suo tempore plenius videbis) ostendit, illas nondum genuinas esse. Nihil in mea nova hypothesi desiderabis, quam quod unicam librationem admisserim super centro \odot , nutante huc illuc aphelii linea per mobilem \odot eccentricum producta, ut altera pars aequationis compleatur. Respondent tamen omnia ad amussim cum prima hypothesi tua.

Keplerus in literis inceptis pergens, respondit: His paulatim conscriptis supervenerunt aliae tuae epistolae, prior 1. Junii, altera 13. Aprilis data et inclusa literis Ritterhusii (I, p. 344). Petis quae supra; non vacat novam subire operationem, mitto descriptum ex Commentariis. Secantis officium in arguenda latitudine lunulae habes supra, tua igitur causa, ingeniosa quidem inventa, at per se falsa est. Tuus eccentricus mobilis plane contrarium facit meae ellipsis; move illum in contrarium et creabis perfectam ellipsin, ut ego quoque initio harum literarum per aliam aequipollentiam creavi ellipsin. At nota, ut ille tuus libratorius circellus respondeat anomaliae eccentrici, quae celeris est in perihelio, tarda in aphelio, — ecce quaestionem non solutam, sed translatam. Tu vero exclamas, invenisse te causam rei, cur excessus secantis definiat latitudinem lunulae, nimirum quia eccentricus moveatur ad latus in diametro circelli, cujus semidiameter sit aequalis excessui secantis. O te ridicule deceptum! Quaeritur enim adhuc, quae sit causa motus illius ad latus, id est quaeritur causa quantitatis illius motus, cur praecise radius

aequet excessum secantis? Ego quaestionem non transtuli, sed causam indicavi et ellipsis et mensurae. Mars habet vim magneticam, quae pro ratione inclinationis axis magnetici ad Solem accedit et ab eo recedit; fortitudo accessus ratione physica mensuratur a sinu anguli inclinationis. Ex hac fortitudinis variatione resultat ultro regularis libratio Martis quasi in diametro epicycli (libratio, inquam, ad unguem talis, qualis est si epicyclus in concentrico statuatur inaequalis motus, Mars vero non in ejus circumferentia, sed in ejus diametro esse ponatur). Ex libratione porro resultat ultro via elliptica et quantitas resectae lunulae. Si enim in anomalia eccentrici 90° absolvitur dimidia libratio, cum nondum tunc sit dimidia axis ad Solem inclinatio (ut nimirum supra libratio sit tardior quam infra, sicut est et ipsa anomalia eccentrici), ergo in illa anomalia eccentrici 90° planeta distat radio, quia absolvit semidiametrum librationis; at si in circumferentia mansisset epicycli, distitisset secante aequationis opticae. Appropinquat igitur, ubi maxime, excessu secantis supra radium. Haec omnia geometricissime cohaerent, ut videbis olim Deo volente.

Fabricius: Ubi rationem meae hypothesis integrae plene consideraveris, videbis facilitatem, consonantiam et certitudinem, et admiraberis. Hoc vere tibi affirmare possum; quaeso saltem, ut rationem per 3 parallaxes ordine procedendi a primo ad ultimum mihi perscribas, ut \odot orbem cum \odot eccentrico per meas observationes pressius conferre possim; post integram meam hypothesin cum demonstratione et exemplis habebis. Scito me diuturnis cogitationibus ingenii vires plane prostravisse; putavi enim non committendum, ut hypotheses tanta difficultate laborent. In eo laboravi semper, ut motuum causas veras inquirerem, quare et laboremus uterque, ut ex 3 acronychiis inquiramus, quod tu ex 4 facis. Habemus rem in manibus, modo ingenii tui subtilitate viam ostensam excedere aliquantulum velis. Quodsi maxime tuae hypothesei inhaerere volueris, tamen si meam tuis Commentariis adungere volueris, in gratiam astrophilorum non detrectabo. modo ita tuis rebus visum fuerit; nihil ego quaero, quam artis veritatem multorumque utilitatem. Haec sunt, quae de mea hypothesei et 3 acronychiis calculo nunc fusiis tibi declarare volui. Pergo nunc ad alia.

Keplerus: Quod tu jam quasi causis inventis ad somnia tua relaberis, de causis, cur 3 acronychia non concludant hypothesin, habes responsionem supra. Tu postquam diu fatigatus fuisti, tandem invenisti *ἀποφαῖς* calculi, et tamen suades, ut hanc viam eam, qua opus non habeo. Ego enim via laboriosa quidem, attamen perspicua et insidiis carente, ad locum veni: te vero plura docere non possum, quam ipse teneo.

Quomodo meam lunulam transtuleris, dixisti, in circelli sc. transversum diametrum, qua centrum eccentrici libretur ex \mathcal{M} versus \mathcal{O} et vicissim; quae tamen hac correctione indiget, ut \mathcal{O} in \mathcal{M} versante centrum in \mathcal{O} secesserit et contra. Quodsi etiam indicaveris, quomodo salves aream trianguli aequatorii, et modum tuum aequipollentem videro areolae meae, tunc faciam quod petis et tuam hypothesin meis Commentariis adjungam. Nam negotium tuum pertinet saltem ad opticae aequationis partem; de physica parte (seu de aequatione, quam causatur punctum aequatorium Ptolemaei, secundus epicyclus Tychoonis et Copernici) nihil adhuc abs te est allatum, nec afferri potest, quod aequipolleat areolae meae. Si negligere velim $8'$, jam ego ipse haberem punctum aequantis Ptolemaicum. Sic in longitudine media, manente eccentricitate hac, puto circiter $3'$ minui maximam aequationem, ubi 2 epicyclis Copernico-Tychonicis utimur, quae $3'$ ante vel post oppositionem cum Sole possunt excrescere ad $10'$ vel $11'$; sin autem deteramus haec $3'$, tunc augenda erit eccentricitas, ita vitiabuntur distantiae apheliae et periheliae, ut tolerari non possint a prosthaphaeresi orbis annui. Adde quod in longitudinibus mediis contingit per duplicem epicyclum excursus a

circulari orbita valde magnus, qui tolerari non potest in prosthaphaeresibus orbis annui. Patet. Nam circulus ipse tolerari non potest, sed pro eo ellipsis, multo igitur minus excursus iste; exspecto igitur, quomodo salves physicam aequationis partem.

Fabricius: Quaeritur an in calculo 4 acronychiorum Martis adhibendus motus simplex aequinoctiorum vel compositus?

Keplerus: Pro re nata inquam. Nam certe habenda est praecessionis ratio; sed quomodo? Relinquitur arbitrio operantis. Soleo ego angulos inter 2 acronychias augere praecessione temporis interlapsi. Schema docebit, ubi minuendum.

Fabricius: Quando Commentarium Martis editurus sis scire cupio.

Keplerus: Diligenter hoc ago ut edam Commentaria Martis. Impedire minatur Tegnaglius, et tamen inter spem metumque relinquit dubium. Haec occupatio causa est, cur gravatim scribam. Et his literis quidem nihil tetigi, quod non attineat Martem. Persecutus autem sum omnia, nisi quod restat, ut de latitudine dicam. Inveni latitudinem maximam in aphelio $4^{\circ} 35'$ c., in perihelio $7^{\circ} 0'$ c., cum inclinatio utrinque sit $1^{\circ} 51'$.

De reliquis quaestionibus alias. Unum tamen non possum non addere de quo quaeris. (Si γ , scribit Fabricius, juxta elongationem in Aprili et Majo proximo observasti, communica, nam tum nolens per aliquot dies abfui.) Die 18. (28.) Maji Mercurius nobis hic Praegae visus est in disco Solis &c. (Comp. vol. II, p. 106.) Respondebo ad reliqua successive. De Marte vero vix quidquam amplius. Nam in Commentariis expoliendis laborem respondendi impendam.

Vale et observationes Saturni, Jovis et Mercurii mitte. Ego remissior fieri incipio, cur enim, morientibus instrumentis, supervivat mea observandi diligentia? (Comp. Vol. II, p. 760.)

1. Augusti; cum Martio incepissem intereaque peregrinatus essem in Lusatia, anno 1607.

Hon. Tuae

amicus Uranicus

J. Keplerus.

Litterae Kepleri, quae has subsecutae sunt, anno integro post (d. 10. Nov. 1606.) scriptae eademque ultimae sunt, quas Keplerus Fabricio dedit. Causam intermissi hinc inde commercii literarum nullam quidem deprehendimus in literis Fabricii, quas exhibet Vol. X. Mas. Petropol., neque in illa Kepleri epistola; ipse autem Keplerus refert illam in Ephemeridibus (anni 1617. Vide Vol II, p. 109.), cui si suspicionem addiderimus perscrutantibus nobis Fabricii literas obortam, in causa fuisse videtur taedium enucleandi ejus intricatam manum et perlegendi innumeras, saepius levissimas quaestiones adque eas respondendi, forte etiam postulatam Fabricii, ut hypothesin suam de Martis motibus subjungeret Commentariis, car Keplerus abruperit literarum dandarum assiduitatem.

Ceterum ex his ipsis ultimis literis elucet, Fabricium jam demum, instructum praecedentibus Kepleri monitis, mentem ipsius perceperisse, et ex parte quidem eodem quo Keplerus progressum esse tramite. Pergimus eadem qua supra ratione, Fabricii quaestionibus interponentes Kepleri responsa.

Fabricius (d. 27. Febr. v. st. 1608. comp. Vol. II. p. 106. 603.): Calculis astronomicis in tantam cerebri debilitatem prolapsus sum, ut ab eo tempore abstinnerim ab operosis calculationibus.

In η prosthaphaeresi puto te errorem commisisse reponendo aphelium in $25^{\circ} 15'$ γ . Ego ex meis observationibus, Decembri calculo subductis, in 26° reponendum existimo. Acronychiarum observationum exempla aliquot a me examinata intra 3 et 4' tuo aphelio non conveniunt. Quare posito aphelio $26^{\circ} \gamma$ ad anni 91. initium, et 4' longitudini tuae additis videbis, quam proxime in dimidio scrupulo convenire. Eccentricitas mihi 5420.

Keplerus (Exordium harum literarum vide Vol. II, p. 98. 107.): Mars cum formis et pecunia jam annum integrum haeret Heidelbergae. Hipparchus jam

demum incipit ex novo meo incubitu et fotu rursum incalescere; sed lentissime progredior.

Narras periculum valetudinis ex computationibus contractum. Post festum venio, medicinam tamen suadeo. Abstineas a constituenda hypothesi Martis, jam enim est constituta. Ego tantum insumi laboris, quantum sufficit vel decem mortibus, et pervici per Dei gratiam pervenique eo, ut contentus esse possim meis inventis et quietus. Antequam acquiescerem inventis, quiescere omnino non potui; ex praesenti igitur quiete argumentare de meis inventis.


Ex iis, quae scribis de Saturno, colligo, quae tibi causae sint, cur Saturni observata non mittas nec Jovis. Cupis aliquid et ipse praestare, in qua operis parte non vis habere aemulum. Mihi hoc non est cordi: si non tantum tibi mitto quantum postulas, in causa est, quod fugio laborem describendi et conquirendi. Pati possum, ut edas aliqua de Marte vel ante mea Commentaria vel post. Quicquam etiam, si brevibus possum, de tuis inventionibus addam meis Commentariis. Interim tuis ipsius observationibus es iniquus, quarum curam nemini permittis nisi tibi ipsi. Quid si non omnia possumus omnes! Quid si mihi Deus hoc dedit, ut melius uti possim tuis observatis quam tu ipse? ergo, si ego cessem et tu perperam utaris, frustra tu observasti.

Cum tu habeas in Saturno eccentricitatem 5420, ego 5700, mirum non est, nos etiam in aphelio differre. Tu enim procul dubio exstruis hypothesin ex centro Terrae, seu in forma Copernici ex centro orbis magni, ego vero ex ipso Sole vel in Ptolemaica hypothesi ex centro orbis Solis.

Sit B Sol, A centrum orbis Terrae, C centrum orbis Saturni. Mihi BC cadit in $25^{\circ} 15'$, tibi AC in 26° ; haec probe consentiunt. Sed hoc miror, cum mihi BC sit 5700, cur tibi longior AC sit brevior, sc. 5420? Ego mihi videor recte operatus et peto observata.

Fabrielus: Unicum est, quod omnino tibi scribendum putavi et quod me maxime perplexum reddidit, hoc: in Marte posita tua eccentricitate 926500, et lunula pro secantis ratione constituta 46200, ita ut lunula juxta meam hypothesin extra circulum sit non vero intra, ut in tua ellipsi fit, volo ad 95° distantiae mediae ab aphelio inquirere primam aequationem. Datur per tabulam foecundam (tangendum) angulus aequationis maximus $5^{\circ} 17' 30''$ c. Ubi vero eodem modo ad 96° quaesiveris, prodit aequatio $5^{\circ} 19' 7''$, diff. $1\frac{1}{2}'$, cum tamen circa maximae aequationis locum vix paucis secundis in uno aut altero gradu anomaliae mutetur. Ubi vero ante et post maximae aequationis angulum quaesiveris aequationes, non magis vel minus crescunt aut decrescunt aequationes proximae, quam re vera debent et vix in aliquot secundis mutantur. Res sane valde mira, nec causam indagare potui, licet plurimum laboraverim &c. Quaeritur, quae sit causa tam subitae et sensibilis variationis in aequationibus proximis, cum tamen ante et post illum 95° crescant et decrescant proportionaliter, nec ulla anomalia animadvertatur?

Keplerus: Quod in Marte mirum celebras, videre videor quale sit. Latitudo lunulae est lineola recta ad lineam apsidum. Illa si in perigaeo esset tota, maximum causaretur angulum. At in longitudine media coaequata causatur angulum nullum, quia continuata incidit in ipsum centrum Solis (Ptolemaeo Telluris), et sic per optica principia apparet sub ratione puncti. At anomaliae coaequatae 90° respondet media $100^{\circ} 43'$ circiter, ergo in anomalia media 90° lineola haec nondum subtendit nihil, sed causatur angulum $1\frac{1}{2}'$ c. Hoc mirum non est. Nam paulo supra mediam 90° causatur angulum majorem et in anomalia 45° causatur maximum. De quo invenies pulchram demonstrationem in meis Commentariis de ζ (Cap. LX.)



Fabricius: Si hoc meo modo in excessu circuli (per additionem partium lunulae ad sinum anomaliae) per rectangulum vel foecundam tabulam aequationis primae angulum vel anomaliam primo coaequantem inquisiveris et post per hunc aequatum angulum anomaliae secundam aequationem investigaveris, habebis totam prosthaphaeresin verissimam. Ut meam hypothesin, quam tua veriolem iudico, plenius perspicias, en schema. — Hoc schema additamque explicationem omittenda censem, cum quia ipse adscripsit Fabricius: „ex celeritate et incogitantia Martem pro libratione aphelii male collocavi“, deinde correcto his schemate priori, addit: „schema minus commode formatum“, et alteri: „nimia festinatio facit, ut commode totam hypothesin in uno schemate non depinxerim“; tum quia Fabricius non contentus tribus his irritis conatibus quartum quin etiam quintum ad idem redit, unde infra ea desumimus, quae ad rem pertinent.

Jam non respiciens male delineatas figuras exclamat Fabricius: quam jucunde, quam certo, quam facile, quam congruenter haec inter se et coelo consentiant, pluribus non demonstrepo. Tu fac periculum et Fabricii vigilias multis annis in hac re exantlatas admiraberis. (Haec verba sequitur secunda earum, quas diximus, correctionum, integrum consumens folium.) Deinde pergit: Vide, mi eruditissime Keplere, nunc utriusque hypotheses, confer illas, et iudica, utra sit facilior, ad probandum et persuadendum convenientior. Hoc scio, nullam unquam faciliorem in superioribus datam esse aut dari posse, et ad talem hypothesin ordinationem ego trium superiorum tabulas supputare incepti. Per eam ostensurus sum verissimam rationem, cur ex 3 acronychiis observationibus verum aphelium et eccentricitas hactenus dari non potuerit. Ego scio, scio inquam, per hanc meam hypothesin hoc fieri posse et in 6—8 horis totum illud negotium absolvi posse, quod tu per 4 acronychia vix 6—8 diebus in uno planeta perficies. Si tibi probabitur, ut non dubito, si examinaveris in praecipuis locis per observationes, et tuis Commentariis in fine adjungere volueris, rescribe, tunc ego omnia diligentissime et accuratissime cum veris demonstrationibus et exemplis, item calculandi ratione et aliis adumbrabo. Noli mi Keplere amplius 'somnia vocare haec mea inventa, ne graveris examinare quaeso; si non veritatem cum pari facilitate et jucunditate inveneris, tunc demum acue stylium, tunc imperiosius perstringe. Ego antea quiescere non potui aut volui, quam hanc invenerim hypothesin et veras causas multorum hactenus latentium mysteriorum plene et plane indagaverim, quod jam Dei beneficio post millenas curas, innumeras calculationes, vigilias operosas per 6 annorum spatium tandem inveni.

Tu noli librationem accusare. Quare mi Keplere non haec tam est naturae conveniens, quam mirificae tuae speculationes circa tuam hypothesin? Etsi maxime tua hypothesis salvet motus, operandi tamen ratio per tuas hypotheses tam est perplexa et operosa, ut vel primo intuitu aliquem detertere possit. Quodsi minus tibi probabitur vel etiam maxime, nolo tamen ut aliis eam communices, sed sub Uranica fide tecum sint omnia, sicut tua apud me hactenus tanquam in abditis Uraniae ut palladium Trojae latuere et ut mysteria reconduntur. Quae enim sic magnis laboribus a nobis inquiruntur, non debent aliis fucis ante tempus obtrudi. Filio meo sollicite tua inquirenti ¹⁴⁾ nolui literas tuas perlegendas dare eandem ob causam, ne vel incogitantia juvenili aliis in academiis propalarentur, antequam tu quidquam de illis publicasses.

Quare examina meam hypothesin et iudicium tuum candide (ut soles alias et in aliis) perscribe, et si quid contra objicere poteris objice, quid probes aut improbes significato; ego primo quoque tempore tuas literas et responsum ad quaestiones reliquas omnes exspecto; noli, quaeso, me diutius detinere. Ego nunc agrariis curis valedicere constitui, locavi aliis agros, ut tanto liberius astronomicis in posterum invigilare possim. —


Huic apologiae tertiam addit Fabricius correctionem („nimia festinatio“ &c.) iterum per integrum folium, qua nondum accuratius perspecta Keplerus ad praemissa respondit hunc in modum:

Ad tua vero haec inventa de Marte, quae Pythagorico affectu commendas meque invitas ad ea admiranda, quid dicam non habeo. Ridebo? At meliora meritis es egregio studio et cupiditate inculpata. Magni vero faciam? At minus hoc erit candidum facinus. Hoc solum tibi dico, aut te coincidere in effectum cum operatione mea aut aberraturum longissime ab observatis. Quid? Tu parum referre putas ad orbis annui aequationes, prolongentur distantiae Martis a Sole circa medias longitudes an decurtentur? Aut ubi ego decurto, tu malis prolongare? O te miserum! Quam parum memor es eorum, quae olim ipse expertus inque literis ad me prolixè datis testatus es. Non sufficit transigere cum acronychiis, oportet et reliqua in conspectu habere.

Jam vero Keplerus, inspecta correctione, abruptit stilum, de novo Fabricii hypothesin considerans. Antequam autem hanc Kepleri inquisitionem proponamus, afferenda est ipsa illa Fabricii correctio, quam spectat Keplerus in Commentariorum Cap. LV, dicens: D. Fabricius hypothesin meam Cap. XLV, quam ipsi pro vera communica-veram, erroris hujus nimis curtarum distantiarum in long. mediis coarguere potuit &c.

Haec igitur Fabricius, tertio ut diximus rem suam proponens in iisdem literis: Nimia festinatio facit, ut commode totam hypothesin meam in uno schemate antea non depinxerim. Hic ulterius explico: Pro lunulae partibus motus centri fit semper versus ☿ locum, at aphelii libratio super ☉ fit in contrariam partem anomaliarum mediarum. Sic tota mea hypothesis constat duobus librationibus. MN est maxima distantia eccentrici

Fig. 43.



utriusque, quando ☿ in N. et OP est lunula illa vel excessus circuli in ☿ 463000 circitor, ratione dimidia eccentricitatis a Sole BC. Lunula causatur a motu centri mobilis eccentrici a centro eccentrici fixi ad latera utrinque in diametro per librationem. Ut enim ED totus ad CD (semi-) diametrum (cui MN aequalis), ita distantia motus ☿ ab aphelio ad distantiam centri eccentrici a centro fixo vel ad partes lunulae. Et scito, centrum mobilis eccentrici semper in diametro ferri versus eam partem circuli, ubi ☿ constituitur. In exemplo sit media anomalia tabularum ICG, cui respondet in hypothesi HDF; sinus illius est HF, cui addo CD vel IH distantiam centrorum vel motum centri lateralem, et sic fit sinus IP, et sic datur rectangulum (triangulum) IBF ad Solem, ad quem semper media anomalia ☿ reducitur, nam dimidia eccentricitas CB hic additur sinui complementi anomaliae IC. Inquire igitur per tabulam foecundam angulum IBF, et fit aequata anomalia, et differentia utriusque anguli est prima prosthaphaeresis. Per hanc sic datum

anomaliam aequatam inquire secundam prosthaphaeresin per librationem aphelii KB sui super centro Solis ad latus, idque sic, ut tota anomalia aequata 90° (nam juxta aequatae anomaliae angulum ad Solem haec libratio aphelii fit) ad dimidia eccentricitatis quantitatem, sic data aequata anomalia ad sinum rectum secundae prosthaphaereseos. Junge prosthaphaereses et habes totam addendam vel subtrahendam.

Habes nunc omnia, mi Keplere, consona coelo, nisi quod eccentricitas CB ad $1\frac{1}{2}'$ mutanda sit vel minor fiat, quando a 95° aequatae anomaliae versus perigaecum eccentrici aequationes inquiruntur, ut sit 921000 pro aequationibus inferioribus, at 9285 manet semper pro superioribus eccentrici aequationibus.


Quaero ex te causam variandae post 95° anomaliae, vel minuendae eccentricitatis. Secundo quaero, cur mutatio in 96° statim post maximum aequationis primae angulum tam subita et sensibilis fiat?

Keplerus: Sed hem! quis mihi novus rumor ex area ipsa eccentrici Martis, intra quam perscripsisti correctionem tuae sententiae totis literis erroneae; quae causa fuit, cur nollem illam ponderare hactenus. Nam schemata de errore testabantur maximo primo intuitu. Si ☿ est ad sinistram aphelii, centrum eccentrici est ad dextram. Ehem! Hoc volui. Vere igitur abbreviantur distantiae ☿ et ☉ ad latera. Atque hoc est illud, quod ego dico. In reali convenimus; in hypothesi, qua perveniamus ad hoc reale, tu librationes adhibes eccentricorum, ego causas physicas, quae ad numeros tamen sint applicabiles. Quid? annon superioribus literis anni 1607 ostendi, posse me salvare hanc decurtationem per epicyclum parvum in eccentrico? Tua vero hypothesis quid aliud est, quam epicycli illius mei transfusio in libratilem eccentricum?

Haec ego dum rumino tuamque sententiam relego, invenio te una

libratione duo efficere, abbreviare distantias et partem aequationis physicam salvare: et (me Atlas!) valde miror convenientiam, etsi non puto, aequalia penitus futura, quae ex tua hypothese exeunt et quae ex mea. Cur vero sine calculo aliquid tribuam hypothese tuae, dicam. Constat mihi ex mea hypothese, CB latitudinem lunulae maximam sic esse ad BA, ut BA est ad BD (BE). Rectangula (triangula) igitur ex AB, BC et ex DB (BE), BA sunt similia, angulus igitur BAC tantus, quantus BEA. At BEA est quam proxime pars aequationis physica, ergo et BAC. Utrum autem plane coincident, facile est aestimare. Primum si tu utaris angulis BFC, BAC, tunc haec pars aequationis, quam ego opticam appello, exactissime convenit cum mea, si modo libratio BC restituatur cum anomalia DE, non cum GH. Nam via ipsa genuina ζ per D, F, H signa plane ovalis, elliptica, evadit, non minus quam si uterer circello duplicis restitutionis, ut scripsi priori anno. Nosti enim aequipollentiam hypothesium. Itaque via ζ ovalis est potius phaenomenon (sed demonstrationibus enucleatum) quam hypothesis. Ad illam salvandam tu hic affers librationem eccentrici, ego causas physicas, et aliter circellum. Laborem uterque eundem in computando subit. Ptolemaicis vero discipulis tu minuis laborem percipiendi te per circellum (tecum et ego per circellum). At iis, qui ad physicas causas rerum coelestium sunt intenti, ego satisfacio, causas seu librationis tuae seu circelli mei ostendens. (Schema in manuscripto deest. Secuti Kepleri verba et Fabricii delineationes nos illud, quantum potuimus, restitimus.)

Fig. 44.



Superest igitur pars aequationis physica a me dicta, quam tu per angulum BAC metiris, ego per aream trianguli, rursum physicas causas affectans. Videamus, an etiam hic coincidamus. Mea igitur aequatio proportionatur sinibus anomaliae eccentrici estque infra et supra E aequalibus intervallis et ipsa aequalis. Proportionantur vero etiam tibi librationes BC sinibus ejusdem anomaliae eccentrici; sic enim tuam corrigo hypothesin. Itaque si tu per proportionem AB ad BC exstrueres anomaliae eccentrici aequationem, quam ego dico physicam, tunc ad unguem paria mecum faceres. At non exstruis per hanc ipsam proportionem, sed prius per illam excerptis arcus. Differs ergo a me. Nam arcus excerpti non manent in proportionibus linearum, nisi in planetis ceteris, quorum est parva eccentricitas. Quodsi proportio maneret arcuum, quae est tangentium, tunc nihil tibi noceret, maximum angulum BAC differre a mea aequatione physica, posses enim BC nonnihil mutare, quod quidem et jam facis, usurpans pro mea 420 vel 432, tuam 436.

Videamus vero, quanta sit differentia inter arcuum et tangentium proportionibus. Esto maxima aequatio physica $5^{\circ} 43'$, ut tangens sit 10000. Igitur pars decima tangentis 1000 dat arcum $34\frac{1}{2}'$, decima vero pars de $5^{\circ} 43'$ est $34\frac{1}{16}'$. Bona aequipollentia in hac parte. Sumantur vero et dimidia, nam ibi differentia videtur maxima futura. Igitur 5000 dat arcum $2^{\circ} 52'$. Dimidium vero de $5^{\circ} 43'$ est $2^{\circ} 51\frac{1}{2}'$. Vicisti Fabrici hoc stadium et gloriari potes, te tua hypothese libratoria ad sensum paria facere cum mea physica. Itaque jam desino ridere tuum paeana, desino desperare de hypothesibus, quibus causae physicae exprimantur; desino negare mechanico Caesaris Byrgio, impossibile esse ut motum ζ , qui censis physicis admini-

stratur, ipse circulis exprimat. Tua enim haec libratio mechanicis opportunissima est, cum una fidelia duo parietes dealbet. Quid igitur? Num deseram infinita mea commenta super causis physicis, naturam coelorum a mei trianguli area ad tuas librationes traducam, affirmans, tuam hypothesin esse genuinam et rationalem propterea, quod simplex, meam fictam et a natura alienam, propterea quod area trianguli metitur tempora, angulus vero aequationem opticam? Non faciam, non enim hoc esset philosophari. Gratulor mihi potius, tuam hanc librationem hactenus delituisse, quoad de causis physicis res explorata est. Nam fateor ingenue, si tu praevenisses hac tua forma libratoria meam physicam, vidissemque ejus consensum cum observatis, me nunquam in causas motuum incasurum fuisse. Nam quis quaeso, versans animo librationes easque videns consentire observatis, quis, inquam, aliud suscipiat indagandum, quam causam hujus librationis, quasi verissime accideret? Quis non hinc sibi adamantinos eccentricos DE et GH axesque fortissimos AD et AG persuadeat? Quis putet, ista omnia effici posse forma diversissima virtutibus magneticis? Itaque complector animo ingentem dolorem, qui mihi fuisset oriturus super miserrimo labore, inquirendi causas rerum, quae non sunt in rerum natura, sed videntur esse, librationum nimirum eccentrici ejusque diametri fixae in corpore Solis, ac si quis clavum in parietem impactum crebris ad latera contorsionibus et retorsionibus niteretur evellere. At eheu! non vacat indulgere doloris imaginationi, qui praeventus et declinatus jam est: verus me dolor corripit super impendentibus, pro eo quo tibi gratulandum erat. Natam ais tibi filiam ex geometria matre? Vidi: pulchra est, at meretrix pessima futura est, abductura quam plurimis meis filiabus ex matre physica susceptis maritos suos. Traducet tua hypothesi ad se lectores et philosophos, dabit effugia hostibus physicae coelestis, patronis inscitiae, architectis solidorum orbium, mechanicis crassis, quibus se redimant e vinculis demonstrationum mearum physicarum, inque libertatem Deos fabricandi sese recipient. Redibitur ad intelligentias, duaeque collocabuntur ad duos circulos circa centrum B, quibus efficiatur isthaec libratio.

Neque tamen sine molestia illam adolescere patiar. Primum fateberis, te, postquam audivisti de via Martis ovali, coepisse cogitare de librationibus. Et ante aliquot quidem annos hanc Martiae viae contractionem ad latera nimiam a me constitutam coarguisti ex observationibus. Itaque excessum cum deprehenderis, rem ipsam tanto certius complexus es animo. Postea quam emendavi ego istos ingressus ad latera simulque genuinas causas inveni, tu versans meam hypothesin rursus prorsumque et cum observationibus comparans, testatus es, illam consentire: solam causarum incredibilitatem aegre tulisti, circulosque desiderasti pro areis, ut forma Ptolemaica hypothesium persisteret incolumis, quoad ejus fieri posset. Ex hypothesi igitur mea tuam efformasti; centro enim eccentrici B ad latus detorto per librationem BC, ut repraesentaretur contractio itineris planetarii DFH, quod varie fieri potest, deinde per hoc centrum C et per corpus Solis A ejecta linea apsidum AC, sub conspectum venit angulus BAC, idoneus alteri parti aequationis, quam sciebas me per trianguli aream salvare cupiebasque aliter salvatam. Haec itaque series inventionis testetur de rerum natura. Mihi, ut dixi, impossibile futurum erat, ex tua meam educere, tibi facile, ex mea tuam efformare, cum illo affectu meam tractares, quo de dixi. Ex observatis vero ipsis, non praeunte mea hypothesi, nescio an tibi proclive futurum fuerit, in tuam

incidere, etiam si plenis faucibus Ptolemaicam formam spirasses anhelus. Me igitur nuda duxit natura, nullis instructa vestibus hypothesium; tu ex aliquibus ejus membris, quae tibi a me monstrata minus laudabilia videbantur, occasionem cepisti, peregrinam illi vestem induendi, quo minus agnosceretur sincere, quin potius lectores inter membra et vestem hanc tuam (ut olim Americani inter equum et insessorem) non distinguerent, corpus dicerent, quod Fabriciana vestis est: denique ut novo ornatu placeret delicatis nuditatem fastidientibus: immo vero ut pro natura, generosissima puella, substitueretur spuria tua meretricio ornatu et moribus ad voluptatem comparatis, non ad ingenuitatem, h. e. Fabricio interprete: ut arti consuleretur, non alienatis philosophis. Sic igitur ipsa inventionis series arguit, peregrinam esse tuam hypothesin, non naturalem.

Deinde, quod in mea physica hypothesi vehementer abhorrueras, non dari directum progressum ab anomalia media quacunque ad veram competentem, sed interponi anomaliam eccentrici quantitate intermediam, a qua caperetur initium, id tu in hac tua non effugis, nisi cum majori damno inconstantis eccentricitatis. Tu enim si librationem BC, h. e. aequationis partem priorem accommodas ad anomaliam mediam GH, nunquam exprimes meam hypothesin et cogeris ab observationibus, ut fateris, variare eccentricitatem AB ἀνωμαλιᾶς. Itaque hactenus emendavi tibi tuam hypothesin, ut perficeretur libratio BC ad anomaliam ED, quam ego appello eccentrici. Hoc vero si fueris passus, eodem in luto mecum haerebis non quidem pudendo, nisi ex tua opinione, qui in me cupiebas emendatum.

Tertio: neque de simplicitate, qua maxime gloriari putas, tibi concedit mea. Tu ejusdem trianguli CBA angulo BAC quaeris partem aequationis physicam, latere vero BC constituis BH ad partem opticam BHA investigandam, una libratione (quae tamen duobus circulis administratur) duo efficiens, et coarctationem ad latera et moram in superioribus. Ego, tibi par, unius trianguli AHB area partem physicam, angulo AHB partem opticam aequationis inquiri, una naturali libratione planetae in linea recta a corpore Solis A, per spatium aequale ipsi AB efficiens duo illa eadem, quae tu libratione centri non naturali. Ubi mihi ad meam librationem non est opus circulis, ut tibi: sufficit enim vis magnetica ipsius corporis Martii eaque bruta, cum tu opus habeas duabus intelligentiis ad tuam librationem administrandam. Quarto: labor vero tibi major incumbit quam mihi. Primum enim ut BD ad sinum EBD, sic maxima distantia BC ad modulum justum angulo EBD (?) convenientem. Deinde ut AB ad BC sic totus ad tangentem, quo tangente est excerpendus angulus BAC. Mihi manet prima operatio, at pro secunda idem sinus (non jam etiam tangens) anguli EBD (?) multiplicatur (ubi nulla divisio ut tibi) in aream maximi trianguli, proditque statim id, quod tu per tangentem demum excerpere necesse habes, discurrens per tabulam tangentium. Reliquus labor circa angulum AHB est utrique communis.

Haec itaque de tua vicaria (verum nomen) hypothesi dicere volui. Tu procacitatem et hilaritatem meam in scribendo boni consule. Vides, me laudem illi tribuere veritatis circa effectum, tibi vero ingenii: et inprimis lactari super fortuna tuarum speculationum tibi gratulari. Nec, si veris illam coloribus depinxi, propterea premere illam te volo: quin potius, nisi jam impedis, partem ex illa faciam Commentariorum meorum, ut petiisti: idque in gratiam eorum, qui privati captus causa aut propter mechanicas effectiones Ptolemaicam formam amant, Fateor quippe, tuam hanc ordina-

tionem captus facilitate longo intervallo post se relinquere Ptolemaicos aequantes et eos tamen nondum sufficientes observatis exprimendis, cum tua aequipolleat meae physicae adeoque observatis coelestibus. Si haec ego odoratus fuisset ante 9 menses, lubenter scripsissem de iis. At nunc accusa tua schemata erronea de meo silentio: ex ipsis enim visis et de textu judicavi, qui intricatissima manu perscribitur a te.

Vale. 10. Nov. 1608.


Ultimae hae sunt ut diximus literae Kepleri ad Fabricium. Quae sequuntur paucae Fabricii ad Keplerum haec exhibent hoc loco notanda.

Die 2/12. Oct. 1608. scripsit Fabricius, praemissis consuetis querelis ob Kepleri diuturnum silentium: non puto te male habiturum objectiones meas. Meam hypothesin non commendavi propter certitudinem majorem, sed quod intellectu esset facilior. Facilitatem optatam per suppositam ellipsin dari non posse video; at forte in Commentariis ea solidius et luculentius demonstrasti. Noli igitur amplius cunctari. Jubes me abjicere phantasias meas de motu Martis et calculare potius Ephemerides ad communem utilitatem. At tu vides et scis, quam difficile sit sine compendiis ex hypothesibus calculare. Solutionem triangularem anguli parallaxis orbis et latitudinis semper timui.

Mitto hypothesin Martis. Videbis observationes huic consentire. Si adjunxeris libello tuo, gratissimum erit. Tibi copia sit vel mutandi textum vel corrigendi vel meliori forma disponendi, prout videbitur, saltem ut ipsa hypothesis salva maneat, cum scio, veram esse et coelo exactissime respondere.

Eam ut diximus quintam formam (sextam eandem fere misit cum literis d. 12/22. Mart. 1609) hypotheseos suae in mundum descriptam, quasi ad prelum paratam, inscripsit: Hypothesis Martis nova a D. Fabricio inventa; eamque concludit his verbis: Vale lector et feliciter ac utiliter laboriosis nostris inventis fruere.

Summa haec est. A Sol, K Terra; CL linea aphelii mobilis libratur utrinque a fixa



aphelii linea BO ad angulum CAB, qui dimidia eccentricitati DA respondet. Quando ♂ in aphelio vel apogaeo est, lineae CL et BO coincidunt; quando vero ♂ anomaliam veram 90° attigerit, habet maximam librationem, dimidia eccentricitati respondentem; in perihelio lineae iterum ununtur. Circellus RE ideo addendus fuit, quod observationes ostendunt, semidiametrum eccentrici circa longitudes medias utrinque radio majorem esse ad 15' sinum 430 (436). In hujus circelli circumferentia ♂ semper in consequentia movetur ad motum duplicatae anomaliae mediae, ita ut linea a perigaeo circelli ad ♂ corpus producta semper addatur sinui anomaliae mediae.

Commensuratio: AD = 925200, RE = 21800 (21500). Apogaeum ♂ anno 1600 in 29° 7' ♏. motus medius ad meridiem 1. Jan. 25° 27' 40'' ♏ (Embdæ). Semid. eccentrici ♂ 15250000.

Ratio calculi instituendi: Locus apogaei a media longitudine auferatur, ut habeatur anomaliam media, cujus sinus, ut et complementi sinus est

exscribendus; illi addatur pars proportionalis circelli (ut sin. tot. ad 43000 sic anom. mediae sinus ad quaesitum). Habetur hoc modo rectangulum ex sinu anomaliae aucto et ejus complementi sinu constitutum, quod solvendum est. Nam ut sinus compl. anomaliae (cui tamen prius eccentricitas est addita vel subtracta) ad radium, sic sinus anomaliae auctus ad angulum suum, qui cum angulo anomaliae mediae collatus dat priorem partem prostaphaeresis.

Pro altera parte: ut totus radius ad 925200, sic anom. prior aequata ad alteram partem, quae semper priori prostaphaeresi adjungenda est.

Pro distantia ☉ et ♂ sic agendum: ut angulus anomaliae per primam prostaphaeresin aequatae ad sinum auctum anom. mediae, sic sin. tot. ad distantiam. Ut semid. orbis ♂ 10000000 ad 152500, sic dist. simplex ☉ et ♂ ad distantiam in proportione orbis ☉. Per dimidiam eccentricitatem ☉ inquire quoque Solis distantiam, et sic cum his 2 lateribus et angulo inter aequatum locum ♂ et ♀ ☉ intercepto inquire parallaxis angulum, et datur visus locus ♂, qui post per angulum inclinationis ♂ juxta distantiam a nodo ad eclipticam reducendus est. —

Fabricius literis datis d. 12/22. Martii 1609 respondit ad praemissas Kepleri, „mitissime“ ferens ejus objurgationes. In annali, inquit, otio tuo saepe miratus sum sesquiannale tuum silentium. Accusas $\bar{\eta}$ in coelo, ζ in solo. Res mira! Arte hactenus debellasti Martem, nunc a Marte artem debellari et vinci pateris? Recte facis, qui recollectis viribus et redintegris copiis te vindicare studes, et bellum non solum Marti sed toti coelo inferre et regnum avitum Hipparcho redimere niteris. Fac, virum te praestes et Herculis clava obvios quosque scopulos et scrupulos, cuneos et nodos disjicias et dispellas et aditum nobis ad sacratissimum Uraniae palatium virtute tua perficias. In te animi totius Europae et omnium astronomorum oculi diriguntur, tu instar omnium es.

Vellem sane me aliquid in commune adferre posse, quod vero quam sit parum, et sentio et libenter agnosco. Videris mihi nescio quam invidi et minus liberalis animi notam innuere velle, quasi meas observationes tibi communicare nolim, quibus tamen te melius uti posses scribis. Fateor et concedo ultimum, at primum egregie nego. Egone te in nonnullis aemulum non ferrem aut quidquam celarem, quem in omnibus ut praeceptorem veneror, ut Apollinem ipsum in rebus dubiis consulo, cujus opera et consilio hactenus proficio? Nihil est in meis observationibus, quod non tibi libentissime impertiam.

Quod meam hypothesin attinet, mirum quam me tua festivitate recreaveris et judicio tuo confirmaveris. Candorem tuum amo et laudo, et ut tu innuis, ex tuis primum profeci et de transmutatione cogitavi, cum tua mihi intricata semper visa fuerit.

Jam proposita iterum hypothesi sua addit Fabricius: Si igitur eam, prout illam hic delineavi, invariata in tuis Commentariis in fine, veritatis tui calculi confirmandae gratia, addere volueris, rem gratissimam feceris; sin minus, tibi soli serva, donec ipse occasionem publicandi aliquando invenero. —

Hanc occasionem Fabricius non invenit; intacta conservavit Keplerus haec folia, quae post varios casus cum reliquis Kepleri manuscriptis tandem Petropolin migraverunt, unde ad nos pervenerunt liberalissime concessa ad hanc editionem.

Quam hypothesin quum Keplerus adjungere noluerit operi suo, eo tempore, quo has ultimas accepit, jam typis excuso, mentionem tamen honorificam fecit amici sui „Uranici“ Capite LV. Commentariorum.

ASTRONOMIA NOVA

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΟΣ,

SEU

PHYSICA COELESTIS

tradita commentariis

DE MOTIBUS STELLAE MARTIS.

Ex observationibus G. V.

TYCHONIS BRAHE.

Jussu et sumtibus

RUDOLPHI II.

ROMANORUM IMPERATORIS &c. &c.

Plurium annorum pertinaci studio elaborata Pragae

A S^{ae} C^{ae} M^{tis} Mathematico

JOANNE KEPLERO.

Cum ejusdem C^{ae} M^{tis} privilegio speciali.

Anno aerae Dionysianae CIO IO C IX.

P. Ramus Scholarum Mathematicarum
lib. II. pag. 50.

Commentum igitur hypothesium absurdum est: sed tamen commentum in Eudoxo, Aristotele, Callippo simplicius, qui veras hypotheses arbitrati sunt: imo tanquam Deos *ἀναγκαστὴν* orbium sunt venerati. At in posteris fabula est longe absurdissima, naturalium rerum veritatem per falsas causas demonstrare. Quapropter logica primum, deinde mathematica, arithmetica et geometriae elementa ad amplissimae artis puritatem et dignitatem constituendam adjumenti plurimum conferunt. Atque utinam Copernicus in istam Astrologiam sine hypothesibus constituendas cogitationem potius incubuisset. Longe enim facilius se fuisset, astrologiam astrorum suorum veritati respondentem describere, quam gigantei cujusdam laboris instar Terram movere, ut ad Terrae motum quietas stellas speculareretur. Quia potius e tot nobilibus Germaniae scholis exoriare philosophus, idem et mathematicus aliquis, qui positam in medio sempiternae laudis palmam assequare. Ac si quis caducae utilitatis fructus tantae virtutis praemio proponi possit, regiam Lutetiae professionem praemium conformatae absque hypothesibus astrologiae tibi spondebe; sponsonem hanc equidem libentissime vel nostrae professionis cessione praestabo.

Auctor Ramo.

Commodum, Rame, vadimonium hoc deservisti, vita digressus et professione: quam si tu nunc retineres, mihi quidem illam ego jure meo vindicarem; quod hoc Opera, vel ipsa tua logica iudice, pervincam. Tu modo subsidia rogans ampliatimae scientiae a logica et mathematica, ne quaeso excluderis adjumenta physica, quibus illa carere nequaquam potest. Et ni fallor facilem te das: quippe qui conformatori tuo praeter mathemata etiam philosophiam circumjicis. Eadem igitur facilitate philosophiam ipse etiam audi, rem valgo absurdissimam, non giganteo conatu, sed optimis rationibus defendentem: quod cum agit, nihil novum agit, nihil insolens, sed officio fungitur ob quod inventa est.

Fabula est absurdissima, fateor, naturalia per falsas demonstrare causas: sed fabula haec non est in Copernico: quippe qui veras et ipse arbitratus est hypotheses suas, non minus quam illi tui veteres suas: neque tantum est arbitratus, sed et demonstrat veras; testem do hoc Opus.

Vin' tu vero scire fabulae hujus, cui tantopere irascaris, architectum? Andreas Osiander annotatus est in meo exemplari, manu Hieronymi Schreiber Noribergensis. Hic igitur Andreas cum editioni Copernici praecesset, praefationem illam, quam tu dicis absurdissimam, ipse (quantum ex ejus literis ad Copernicum colligi potest) censuit prudentissimam, posuit in frontispicio libri, Copernico ipso aut jam mortuo aut certe ignaro. Non igitur *μυθολογεί* Copernicus, sed serio *παραδοξολογεί*, hoc est *φιλοσοφεί*, quod tu in astronomo desiderabas. ¹⁵⁾

D. RUDOLPHO II.

ROMANORUM IMPERATORI SEMPER AUGUSTO.

GERMANIAE, HUNGARIAE, BOHEMIAE &c. REGI. ARCHIDUCI
AUSTRIAE &c.

Augustissime Imperator.

Quod Sae Cae M^{ae} Vae, totiusque adeo Domus Austriacae serenissimo Nomini foelix faustumque sit, imperiis M^{ae} Vae tandem aliquando publice spectandum exhibeo Captivum nobilissimum, jam pridem auspiciis M^{ae} Vae bello difficili et laborioso a me acquisitum. Neque enim vereor, ut captivi nomen aversetur, qui jam olim est solitus, depositis clypeo paulisper et armis sese ipsum vincendum vinciendumque praebere lubentem et ludentem, quoties custodia, carcer aut vincula placuerunt.

Hujus vero spectaculi non major poterit esse celebritas, quam si panegyricum captivo praestantissimo scribam, publicaque voce pronunciem.

Etsi hunc in campum ingressuro splendor occurrit admirabilis, avertitque et perstringit oculos, ad tenue noctis lumen umbrasque scholasticas adsuefactos.

Itaque relinquo scriptoribus historiarum explicandam hospitis nostri magnitudinem, re bellica comparatam.

Dicant illi sane, hunc esse, per quem omnes exercitus vincant, omnes belli duces triumphant, omnes Reges imperent; sine cujus ope nemo unquam quenquam captivum cum laude abduxerit. Hunc jam meo Marte captum spectando suos illi oculos exsatient.

Dicant Romanae magnitudinis admiratores, hunc esse satorem Regum Romani et Remi, conservatorem urbis, protectorem Quiritium, statorem Imperii: quo propitio Romani militarem disciplinam invenerint, auxerint, perfecerint, orbemque Terrarum subjugaverint. Hunc igitur circumscriptum domnique Austriacae foelici omine nunc acquisitum gratulentur.

Ego me hinc ad alia recipio, quae sunt viribus meis accommodatiora. Neque tamen in ea professionis meae parte pedem figam, in qua mihi similitas intercedit cum commilitonibus.

Illi sane gaudium aliud licet gaudeant: constrictum vinculis calculi, qui toties ipsorum manus et oculos effugiens irrita solitus est reddere vaticinia maximi momenti: quippe de bello, de victoria, de imperio, de dignitate militari, de magisterio, de lusu, de ipsa denique vita abscondenda vel proroganda. Illi M^{ae} Vae gratulentur de domino geniturae in potestatem redacto, imo vero conciliato; quippe illis testibus Mars Scorpioni dominatur, qui cor coeli habet; in Capricorno exaltatur, qui oritur; in Cancro,

in quem Luna ingressa est, ludere solet astragalis lusum trigonicum; in Leone, quo Sol utitur hospitio, familiariter notus est; Ille denique et Arietis est dominus, cui subesse creditur Germania, planeque concurrens cum Sa Ca M^{te} Va habet imperium.

Hanc igitur triumphi partem illi licet occupent, nullam ipsis tam festo die rixandi causam exhibebo: transeat haec licentia inter jocos militares. Ipse ad astronomiam vertar, curruque triumphali invectus, reliquam captivi nostri gloriam, mihi peculiariter notam, omnesque adeo belli gesti confectique rationes explicabo.

Neque enim sine honore nobis est habendus, quem aeternus mundi hujus Architectus communisque siderum hominumque Pater Jova in prima corporum aspectabilium locavit acie; ut perenni curriculo per regiones aethereas Creatoris sui militaret gloriae: hominumque mentes alto sopitas veterno criminosa ignaviae ignorantiaeque exprobratione suscitaret, excursionibus suis exerceret, inque coelum ad Conditoris sui laudes investigandas irritando pertraheret.

Hic est ille potentissimus inventionum humanarum Domitor: qui omnibus astronomorum irrisis expeditionibus, elisis machinis, profligatis copiis hostilibus, secretum imperii sui cunctis retro seculis custoditum possederat securus cursusque suos exercuerat liberrimus et incircumscriptus: ut praecipuam querelam instituerit mystes ille naturae, Latinorum celeberrimus C. Plinius: Martis inobservabile sidus esse.

Fama est, Georgium Joachimum Rheticum, patrum memoria non incelebrem Copernici discipulum, et qui restaurationem astronomiae primum ausus concupiscere, mox non spernendis observationibus et inventionibus affectaverat, dum in motu Martis haeret mirabundus, neque se explicat, ad Genii sui familiaris oraculum confugisse, sen ejus eruditionem (si diis placet) exploraturus, sive veritatis impotenti desiderio, atque hic exasperatum immitem patronum, importuni sciscitatoris alternis capillitio arrepti caput ad imminens laquear adfixisse, iterumque dimissi corpus in pavimentum proturbasse, addito responso: hunc esse motum Martis. Fama malum, quo non aliud nocentius bonae famae; tam enim ficti pravique tenax est, quam nuncia veri. Non est tamen incredibile, Rheticum ipsum, non succedentibus speculationibus, conturbato spiritu consurrexisse furibundum, caputque allisise ad parietem. Quid mirum enim, si eadem acciderunt Rhetico, Martis provocatori, quae olim C. Octavio Augusto Caesari, cum dace Quintilio Varo quinque legiones perdidisset, ab hoste Arminio, Martis nostri Germanici pullo, circumventas.

Atqui, ut in ceteris imperiis, sic hic quoque nulla re magis innixa sustentabatur hostis nostri potentia, quam persuasionem et trepidationem vulgi hominum: quam contemnere semper ego viam ad victoriam esse petavi. Quippe cum essem in hoc naturae theatro mediocriter versatus: illud me usu magistro didicisse persuadebar, non multum distare, ut hominem ab homine, sic neque stellam a stella, hostem ab hoste: quare non facile recipiendum sermonem, qui de gentis ejusdem individuo uno temere aliquid insolitum sparsisset.

Imprimis vero laudanda hic est Tychonis Brahe, ducis in hac militia summi diligentia; qui Friderici II. et Christiani Daniae Regum, tandemque et Sa^e Ca^e M^{is} Va^e auspiciis, pene continuis viginti annorum noctibus, omnes nobis hostis hujus consuetudines exploravit, omnem militum

rationem observavit, omnia consilia detexit librisque moriens perscripta reliquit.

Quibus ego libris instructus ut in hanc curam Braheo successi, primum metuere desii, quem jam mediocriter cognoveram: deinde notatis diligenter temporum articulis, quibus ille ad pristina loca ceu ad cubilia sua ventitare soleret, Braheanas eo machinas, subtilibus instructas dioptris, velut ad certum scopum direxi, omnemque locum indagine cinxi, curribus magnae matris Telluris in gyrum circumactis.

Non tamen sine sudore successit negotium: dum frequenter ibi desunt machinae, ubi potissimus earum usus erat, aut dum viis lutosi, magno temporis, magno sumtum impendio, transvectantur ab imperitis aurigis, aut dum ejaculatus quarundam, mihi nondum exploratus, in diversa, quam putaveram, loca tendit. Saepe splendor Solis aut Lunae, saepe coelum nubilum directoris oculis imposuit, saepius objectus aëris vapidi globum elisum a recto tramite deflexit, nec raro parietes, obliquissime objecti, irritos ictus exceperunt quantumvis crebros. Accessit hostis in excursionibus industria, in insidiis vigilantia, nobis plerumque dormientibus; in repugnando denique pertinacia, qui expugnato aut prodito castello uno sese recepit ad aliud: nec eadem omnium castellorum ratio expugnandi, nec iter ab uno ad cetera expeditum, sed aut fluminibus interceptum, aut sentibus impeditum, ut plurimum vero incognitum: quae singula suis locis in hoc commentario perscripta sunt.

Interim in meis castris quod cladis, quod calamitatis genus non saeviit? Clarissimi Ducis jactura, seditio, pestis, morbi, domestica negotia bona malaque, utraque temporis extrahendo comparata: novus et improvisus et terribilis a tergo hostis, ut retuli in libro de Nova Stella; alio tempore Draco decumanus, longissima cauda, vomens ignes meaque castra infestans; militum perfugia et penuria; tyronum imperitia: et caput omnium, extrema com meatuum angustia.

Tandem hostis, ubi me persistere vidit in proposito, se vero nusquam in regni sui circuitu tutum aut securum, animum ad pacis consilia traduxit, missaque natura parente victoriae mihi confessionem obtulit; libertatemque pactus inter arbitraria vincula, brevi post arithmetica et geometria stipantibus, in mea castra magna cum alacritate transivit.

Non destitit tamen, ex quo deditione facta domi nostrae aequis amicitiae legibus conversatur, occultis illusionibus, quippe quietis insuetus, nobis ultro nescio quos belli metus incutere: si forte perterrefacti ridendi copiam ipsi faceremus. At ut nos animo forti vidit, nobiscum habitare serio consentit hostilitatisque deposita simulatione fidem suam nobis approbavit.

Unum hoc M^{tem} V^{am} rogat, ut quia magnas in regionibus aethereis clientelas habet (est quippe pater ipsi Jupiter, avus Saturnus, Venus soror eademque amica et jam olim praecipuum vinculorum lenimentum, Mercurius frater fidusque caduceator) eorumque ipse et ipsius illi desiderio tenentur propter morum similitudinem: velletque et illos secum inter homines conversari honorisque, quo afficitur ipse, fieri una participes: M^{tas} V^a quamprimum illos sibi reddat, expeditionis hujus reliquiis, quae se jam dedito nihil habent porro periculi, strenue confectis. Quam ad rem M^{ti} V^{ae} operam non inutilem (quippe exercitatus in pugnacissimo, gnarusque locorum) nec minus quam antea fidelem promptus offero: hoc unice orans atque obsecrans (quando hanc vocem, perinde ut orationem reliquam, crebra cum militibus, centurio-

nibus ducibusque per hos novem annos in hac aula conversatio mihi sup-
peditavit) Ca M^{tas} V^a aerarii praefectis imperet, ut de nervis belli cogitent,
novamque mihi pecuniam ad militem conscribendum suppeditent. Quae ego
sic oro, ut quae et a M^{te} V^a jam ante comprobata sciam, et ad Dei gloriam,
Augustique M^{ts} V^{ae} Nominis immortalitatem pertinere putem: Cui pridem
omnem meam operam devovi Eique me jam subjectissime commendo.

IV. Cal. Apr. anno aerae Dionysianae MDCIX.

Sae Cae M^{ts} V^{ae}

Subjectissimus Mathematicus

Joannes Kepplerus.

EPIGRAMMATA
IN HAEC COMMENTARIA DE MOTIBUS MARTIS.

URANIE AD KEPLERUM.

Desine Kepleride o, Martem contendere contra :
Submittit nulli Mars, nisi se ipse sibi.
Frustra igitur vinclis illum submittere tentas :
Qui liber saeculis exstitit innumeris.
Sic Musa. At contra ad Musam sic ille : Quid ergo ?
Anne oblita tibi Palladis historia ?
Horrificum Pallas potuit prosternere saxo
Gradivum : verum si modo Homere canis :
Quidni igitur quoque nunc, magna assistrice Minerva,
Sub juga quantumvis Mars truculentus eat ?
Adspice quem dedimus Rudolphino omine librum,
Gradivum dices nunc quoque dura pati.

A L I U D.

Retibus implicuit Martem Lipareius olim :
Iret in amplexus cum, Cytherea, tuos.
Nunc iterum capitur vinclis Gradivus iisdem :
Nec Venus in culpa est : culpa Minerva tua est.
Quippe Minerva dedit Tychohi haec retia : Tycho
Keplerio : hic Martis cruribus inseruit.
Res mira : artifices magni Vulcanus et alter :
Hunc tamen atque illum Keplerius superat.
Durarunt paucos Vulcania tempore vincla.
At contra aeternum haec Kepleriana manent.
Saxirupius fecit Pragae an. 1609.

A L I U D.

Coelos Keplerius Terrarum oppugnat alumnus :
De scalis noli quaerere ; Terra volat.
J. Seussius f. Dresdae.

PARAENETICUM

TYCHONIS BRAHE

Summi Astronomi, ad Astronomiae Cultores,
SUFFIXUM RESTITUTIONI STELLARUM FIXARUM,
Progymnasmatum Tomo I. Pagina 295. ¹⁶⁾

Et jam strata via est, multis prius invia saeculis,
Magno equidem et vigili tandem exantlata labore,
Scandere inaccessi liceat qua culmina coeli,
Et superas penetrare domos, habitacula Divum :
Seu lubeat fixas, vario seu tramite motas
Designare facies cursumque situmque probare
Sidereum, summi ut constant miracula Jovae.

Ergo agite o juvenes, quibus est vigor acris et altus
 Ingenii genique favor, quibus inclyta ab ortu
 Uranie Dium coeli inspiravit amorem,
 Et dedit aethereis Terram et Terrestria quaeque
 Posthabuisse bonis: qui non temeraria vulgi
 Judicia, aut tetricas voces curatis inertam;
 Obscuris talpas mittentes degere in antris,
 Perpetuo ut coecae maneant, velut esse cupiscunt:
 Huc spirate alacres; populo huc post terga relicto
 Tendite; nec mentem, quae pars est enthea coeli,
 Hoc patrio private bono; studium atque laborem
 Huc ferte unanimis; fesso ut succurrere Regi
 Alfonso liceat, pondus non viribus aequis
 Qui modo vicini tulerat successor Atlantis;
 Auxilium simul ut promptum Copernicus ingens
 Sentiat; Herculeo ne, dum se inferre labori
 Aggreditur fidens, oneri succumbat iniquo:
 Sicque poli, Atlantis cassi Alcidaeque columnis,
 Ingentem, jam jam nutantes, ferre ruinam
 Cogantur Terramque simul statione moventes,*)
 Barbariae hospitium (crassa ignorantia coeli
 Quam pariet) cunctosque homines pecudesque ferasque
 Turbantes casu ancipiti coecisque tenebris,
 Antiquoque chaos miscentes atria mundi.
 Hoc prohibete nefas pronoque occurrere damno,
 Et mecum excelsum validis conscendite Olympum
 Viribus, ut fissas mature ocludere rimas,
 Et stabilire novis coeli laquearia transtris,
 Jamque prius liceat, quam machina tota fatiscat.

Ecquis adest igitur, pulchram hinc meruisse coronam
 Obryzo, gemmis, ebore et rutilante pyropo
 Conspiciam firmamque magis sacclisque perennem
 Qui volet atque animis animum sociare supernis?
 Ecquis Terricolas inter, quos continet orbis
 Innumeros dabitur, cui tam sublimia cordi?
 Ecquis et auctorem mundi, per condita vasto
 Tot miranda polo spectacula, agnoscere gestit?
 Sicne omnes pariter tanta ad quaesita siletis?
 Quid mussare juvat? Manus est adhibenda labori,
 Ut tandem abstrusi pateant mysteria coeli.
 Si quos ambitio, lucrum, ignorantia, luxus,
 Tam celsis retrahunt ausis et ad infima trudent:
 Saltem aliis parcant nec commoda summa retardent.

Ipsae Ego, si facili aspirent mihi numina vultu,
 Et superare alto dederint obstacula quaevis
 Constantique animo, velut hactenus, omnibus ultro
 Annitar nervis, magni penetralia coeli
 Pandero terrigenis tectosque aperire recessus.

Tu modo mirifici sapiens Fundator Olympi
 Annue et adfer opem, tua facta stupenda notanti.

*) Subintellige Poli ruentes. Hic enim imperfectionem Astronomiae incusat, et ignorantiam ejus; non vero Hypotheses Copernici, Terram mobilem facientes.

Respondet auctor Operis.

O fulgens genere et celsis natalibus heros,
 Cui certa ante alios animi coelestis origo
 Et praestare dedit factis et tendere cantu
 Hortatuque novam morientibus addere vitam:
 Quid trepidum optatis et tanta incendia dudum
 Nutricantem animum flammis ventoque fatigas?
 Nam quamvis tanta orsa, meas superantia vires,
 Non alios poscunt, quam fert tua Musa, magistros,
 Ingeniumque animo minus ingenioque lacertos
 Nascendi mihi lege dedit natura: Sororum
 Nona tamen Dium coeli inspiravit amorem.

Dirus amor quid non mortalia pectora cogit?
 Ille mihi ingenium, validos dedit ille lacertos,
 Spe non aequa animans. Sed enim Junonis iniquae
 Scindimur haud aequo studia in contraria vultu
 Tuque et Ego: Tibi virtutis dedit illa colendae
 Materiem; mihi dura negat: redit astus eodem;
 Aethereis arcere locis furtoque Promethei
 Extimulante, sacros custodire arctius ignes.
 Ergo opibus te larga gravat, fulgore metalli
 Perstringens oculos, ut sint ad lumina segnes
 Coelica, purpureisque optent se jungere pompis,
 Quas sequitur blandus popularis sibilus aurae;
 Infandumque minetur fors contenta dolorem.

Macte animo forti victor Divaeque hominumque
 Affectusque tui: qui quae rationis ocello
 Affectanda probas, ausu constante secutus,
 A patre transmissos potuisti spernere census.
 Desine ad hanc privam socios accersere laudem,
 Verbaque fluminibus inscribere: Non bene, virtus
 Gazaque conveniunt; distant immane polusque
 Terraque, et alterius levis est respectus in uno.

Meque adeo aspernata immensum invidit honorem
 Diva potens; brevibusque ingentia vota coarctans
 Limitibus, nihil indulsit, quod spernere possem
 Musis postpositum, aut astrorum opponere curae:
 Vicissentque odia atque ausis ingentibus obstant,
 Ingeniumque potens superas volitare per arces
 Invida humi premeret Rhamnusia: me nisi primo
 In bivio vitae, coelorum arcana canendi
 Praevenisset amor, tua per vestigia gressum.

Ergo animo lustrans tritos erronibus orbes,
 Immanesque minas et hiantibus intervallis
 Moenia nec positae mundi ruitura columnis;
 Dum causas nox atra premit securaque veri
 Pruteno indormit sapientum turba magistro:
 Aggredior fidens oneri succedere tanto,
 Et stabilire novis coeli laquearia transtris;
 Materiem Samius famosam, quinque figuras,
 Euclides normam, mentem dedit inclyta Pallas;
 Uranie ingeminans non uno interprete plausus
 Accinuit celebrem, successu laeta, triumphum.

Miratus Brabae ausus dulcemque laborem,
 Concepto quamvis nolles decedere sensu,
 Multa super Terris dubitans, super aethere multa:
 Me tamen in numerum placuit transferre tuorum,
 Mi noctes aperire tuas inventaque longi
 Temporis; et claram coeptis affulgere lucem.

Vixissesque utinam, nec tanto digna paratu
 Praemia, tam meritos rapuisset Parca triumphos:
 Non alios visu et subtilibus instrumentis
 Pandere sese orbes, magni penetralia coeli
 Expertus, quam quos firmant mea transtra, fuisses.

Nunc quando properum Divae rapuere magistrum;
 Festivosque dies ornataque gaudia turbat
 Subductus, quem debuerant hilarare, patronus:
 Quid faciam? nisi Te veneratus imagine mentis
 Artifici in vitam, o Heros manifeste, reducam.
 Astabis Magnus stellata in veste Sacerdos.
 Hic ubi coeruleo surgunt altaria templo,
 Auctori constructa Deo; sex ordine flexus
 Circumeunt, totidem rapida vertigine lychni:
 In medio focus aeternaeque incendia lucis.

Accedo supplex meaque haec molimina docto
 Scripta libro, rerum suavissima thura parenti
 Arboribus sudata tuis collectaque cura
 Te patiente mea, manibus tibi trado levatis:
 Eja adole purus; sequor en, magnoque vocata
 Jungo preces castas: sapiens fundator Olympi
 Annuat almus opem, sua facta stupenda notanti.

Ejusdem Elegia scripta in Philothesio juxta manum et Symbolum Brahei,

Suspiciendo despicio.¹⁾

Da Generose locum neu dedignere sequentem:
 Quicquid sum, tua sunt munera, quicquid ero.
 Hactenus O curas hominum miratus inanes,
 In Te uno satyram ludere cesso meam.
 Curarum requies tua sunt monumenta mearum:
 Umbra fui sine te; te patre corpus ero.
 Terra mihi aërios nectat licet astrica gyros;
 Terra eadem centri stet tibi fixa loco:
 Antiquis equidem refero haec accepta Magistris:
 Nec de me, vivo displicuere tibi.
 Non tamen invalidus rutilos Mavortis ad ignes
 Haec, nisi per noctes, lumina sisto, tuas.*)
 Non nisi suspiciens regeres Tu rite dioptram,
 Telluris cursus inde ego despicerem;
 Metirerque citos gressus jugaque obvia Capro,
 Et quota pars centrum det tibi Phoebe viae:
 Ut parili gressu Solem fugiatque petatque,
 Gyretur raptu non tamen erro pari;
 Sed fontem versus vires acquirat eundo,
 Longius abscedens langueat inque vicem:

*) Ac si operis hujus Cap. 51. in schemate ad litteram K, stellam Martis, depictus esset oculus.

Unde globos septem septenae ex ordine mentes,
 Octavusque animus de patre Sole, vehunt:
 Innumerabilibusque vacat natura volutis,
 Et pereunt novies, de grege, quinque Dei.
 Falle Tycho denis rationem, falle minutis:
 Quae, nisi Tu, numeret nemo; ea cuncta ruent.
 O curas hominum, o quantum est in rebus inane!
 Quondam non alia si itur ad astra via.

Ejusdem epigramma de studiis Tychonis Brahei.

Fixarum Tycho descripsit Solisque meatus;
 Lunae curriculum junxit, et occubuit.
 Luciferas Phaethon dolet ascendisse quadrigas;
 Nil nocuit sollers haec tibi cura Tycho:
 Aeternum Endymion Trivia obdormivit amata;
 Aeternum Triviae te quoque sopit Amor.

L e c t o r i

S.

Pluribus te alloqui decreveram (Lector), nisi et occupationum politicarum moles, quibus hisce diebus plus solito distineor et praeproperus Kepleri nostri, hoc ipso momento Francofurtum ituri, discessus vix hanc quantulamcunque mihi scribendi reliquisset occasionem. Itaque tribus duntaxat verbis te monendum censui, ne te moveat Kepleri in aliquibus, potissimum vero physicis argumentationibus a Braheo dissentientis libertas, Tabularum Rudolphearum Operi nequicquam incommodans, et omnibus inde ab orbe condito Philosophis familiaris. Ceterum ex Opere ipso rescisces, ipsum in fundo Brahei, id est super ipsius restitutione fixarum et Solis aedificasse, materiamque omnem (observationes nimirum) Brahei opera fuisse congestam. Interim hoc insigni Kepleri Opere inter hos rebellionum et bellorum subinde repullulantium tumultus, dum res literaria Reip. compatitur, tanquam Tabularum et post illas Observationum tardius hoc nomine in lucem produntium Prodrômo frui; et alacriores in posterum operis tantopere desiderati progressus, et tempora foeliciora a Deo Optimo Max. nobiscum precare.

*Franciscus Gansneb Tengnagel in Campp.
 Sae Cae Mtis Consiliarius. ¹⁸⁾*

Introductio in hoc opus.

Durissima est hodie conditio scribendi libros mathematicos, praecipue astronomicos. Nisi enim servaveris genuinam subtilitatem propositionum, instructionum, demonstrationum, conclusionum, liber non erit mathematicus; sin autem servaveris, lectio efficitur morosissima, praesertim in Latina lingua, quae caret articulis et illa gratia, quam habet Graeca, cum per signa literaria loquitur. Adeoque hodie perquam pauci sunt lectores idonei: ceteri in commune respuunt. Quotusquisque mathematicorum est, qui tolerat laborem perlegendi Apollonii Pergaei Conica? Est tamen illa materia ex eo rerum genere, quod longa facilius exprimitur figuris et lineis quam astronomica.

Ipsae ego, qui mathematicus audio, hoc meum opus relegens fatisco viribus cerebri, dum ex figuris ad mentem revoco sensus demonstrationum, quos a mente in figuras et textum ipse ego primitus induxeram. Dum igitur medeor obscuritati materiae insertis circumlocutionibus, jam mihi contrario vitio videor in re mathematica loquax.

Et habet ipsa etiam prolixitas phrasium suam obscuritatem non minorem quam concisa brevis. Haec mentis oculos effugit, illa distrahit: eget haec luce, illa splendoris copia laborat: hic non movetur visus, illic plane excoecatur.

Ex eo consilium cepi, quadam luculenta introductione in hoc opus juvare captum lectoris, quoad ejus fieri possit.

Illam vero geminam esse volui. Primo namque Tabulam exhibeo Synopticam capitum libri omnium, cujus hanc utilitatem futuram existimo, ut quia materia est remota a notitia multorum terminique in ea varii, variae molitiones, magna invicem similitudine, magna cognatione vel generis vel partium: termini igitur omnes, molitiones omnes juxta invicem positae unoque conspectu comprehensae, collatione mutua sese invicem detegant. Verbi causa: Disputo de causis naturalibus, quae ignoratae coegerunt veteres, ut circulum aequantem seu punctum aequatorium ponerent. Id autem facio duobus locis, partibus scilicet tertia et quarta. Lector versans in hac lectione parte tertia putare posset me jam agere negotium inaequalitatis primae, quae inest singulorum planetarum motibus seorsim. Atqui haec conditio valet demum parte quarta. Tertia vero parte, ut synopsis indicat, de illo aequante disputo, qui sub nomine inaequalitatis secundae communiter omnium planetarum motus variat et primario in ipsa Solis theoria regnat. Huic igitur rei discernendae serviet synoptica tabula.

Verum enim vero ne synopsis quidem omnes ex aequo juvat. Erunt enim, quibus haec tabula (quam ego pro filo exhibeo ad remeandum ex operis labyrintho) nodo Gordio intricatior videbitur. In eorum igitur gratiam multa hic in fronte collocari debent acervatim, quae partim per opus dispersa non ita facile in transcurso animadvertentur. Detegam autem in gratiam potissimum eorum, qui physicam profitentur quique mihi, imo vero Copernico adeoque vetustati ultimae

irascuntur ob fundamenta scientiarum concussa motu Telluris, detegam, inquam, fideliter instituta praecipuorum capitum, quae ad hoc negotium faciunt, et sistam ob oculos omnia demonstrationum principia, quibus conclusiones meae tantopere ipsis inimicae innituntur.

Hoc enim ubi viderint fideliter praestitum, optionem postea liberam habebunt, vel perlegendi et percipiendi demonstrationes ipsas labore maximo, vel mihi professione mathematico super adhibita sincera et geometrica methodo credendi: ipsi vero, quod suarum erit partium, ad haec sic ob oculos collocata demonstrationum principia conversi, illa excutient, certi, nisi iis eversis non ruituram demonstrationem supraedificatam. Idem faciam etiam tunc, ubi more physicorum necessariis admiscuero probabilia, exque iis sic mixtis probabilem extruxero conclusionem. Nam quia hoc in opere physicam coelestem astronomiae permiscui, nemo mirari debet, conjecturas etiam nonnullas adhiberi. Haec enim physicae, haec medicinae, haec omnium scientiarum natura est, quae praeter oculorum certissimas indicationes alia etiam adhibent axiomata.

Sic igitur habeat lector, duas esse astronomorum sectas: alteram coryphaeo Ptolemaeo et ut plurimum allegatione veterum insignem; alteram recentioribus tributam, licet sit antiquissima: quarum illa errantium stellarum singulas separatim tractat causasque motuum singulis in suis ipsarum orbibus assignat, haec planetas inter se comparat, quaeque in eorum motibus deprehenduntur communia, ex eadem communi causa deducit. Atque haec secta rursum subdividitur. Causam enim, quae planetas efficit videri stationarios retrogradosque, Copernicus cum antiquissimo Aristarcho transcribit translationi Telluris domicilii nostri, quibus et ego subscribo: Tycho vero Braheus causam illam transcribit Soli, in cuius vicinia ait connexos esse ceu nodo quodam (non sane corporeo, sed quantitativo tamen) omnium quinque planetarum eccentricos circulos; atque hunc veluti nodum una cum Solari corpore circa Terram immobilem circumire.

Tribus hisce opinionibus de mundo singulis quidem adhaerent alia nonnulla singularia, quibus et ipsis hae sectae distinguuntur: sed illa singulatim particularia facillima ratione sic emendari et mutari possunt, ut ipsae tres capitales opiniones (quoad astronomiam seu coelestes apparentias) in effectum ad unguem aequipolleant et paria faciant.

Meum jam institutum in hoc opere potissimum quidem est, astronomicam doctrinam (praecipue de Martis motu) in omnibus tribus formis emendare; sic quidem, ut quae ex tabulis computamus, ea coelestibus apparentiis respondeant, quod hactenus non satis certo fieri potuit. Quippe stella Martis anno Christi 1608. mense Augusto paulo minus 4° superat illum locum, quem prodit calculus Prutenicus. Anno 1593. mense Augusto et Septembri sunt gradus paulo minus 5 in hoc errore: qui jam in novo meo calculo penitus est sublatus.

Interim vero dum hoc praesto et feliciter assequor, excurro etiam in metaphysicam Aristotelis, seu potius physicam coelestem et causas motuum naturales inquiri: ex qua consideratione tandem non obscura nascuntur argumenta, quibus sola Copernici de mundo opinio (pauculis mutatis) vera, reliquae duae falsae vincuntur &c.

Omnia vero omnibus ita connexa, implexa et permixta sunt, ut tentatis multis viis partim a veteribus tritis, partim ad eorum imitationem et exemplum structis, quibus ad emendatam calculi astronomici rationem pervenirem, nulla alia successerit, quam quae ipsissimis causis motuum physicis, quas hoc opere stabilio, insistit.

Ad physicas vero causas motuum indagandas primus gradus fuit, ut demonstrarem, concurrere illum eccentricorum non alio loco (prope Solem) contingere, quam in ipso centro corporis Solaris, contra quam Copernicus et Braheus crediderant.

Haec mea correctio si in Ptolemaicam opinionem introducatur, jubebit Ptolemaeum investigare motum non centri epicycli, circa quod epicyclus incedit aequaliter, sed puncti alicujus, quod in proportionem diametri tantum abest a centro illo,

quantum Ptolemaeo centrum orbis Solaris abest a Terra, et in linea quidem eadem aut parallelis.

Objici vero mihi potuit a Braheanis, me temerarium esse novatorem: se enim, cum veterum receptae opinioni insisterent et concursum eccentricorum non in Sole, sed proxime Solem statuerent, tamen calculum inde extruxisse, qui coelo respondeat. Et in traiectione numerorum Braheanorum in formam Ptolemaicam dicere mihi potuit Ptolemaeus, sibi, dum observata teneat exprimatque, reputari non alium eccentricum quam illum, qui describatur a centro epicycli, circa quod epicyclus incedit aequaliter. Itaque debere me etiam atque etiam videre quid agam: ne novo usus ratione id non praestem, quod ab illis jam sit praestitum in ratione veteri.

Huic igitur objectioni ut occurreretur, demonstratum est in prima operis parte, per hanc novam rationem eadem plane fieri seu praestari posse, quae per illorum veterum rationem sunt praestita.

Secunda vero operis parte rem ipsam sum aggressus, et non minus, imo multo rectius expressi per meam rationem loca Martis in apparenti Solis oppositione, quam illi expresserant per veterem rationem loca Martis in media Solis oppositione.

Interim tota parte secunda (quantum ad geometricas demonstrationes ex observationibus) in suspenso reliqui, uter rectius faciat, Illi an Ego; quando quidem observationes nonnullas (quippe regulam nostris machinationibus praefixam) utrique assequebamur, physicis vero causis consentaneam esse meam rationem, dissentaneam illorum veterem, partim ostendi parte prima, praecipue capite VI.

At demum parte quarta operis Capite LII. per alias quasdam observationes non minus infallibiles, quam priores erant, quasque illorum vetus ratio nequibat assequi, mea assequebatur pulcherrime, demonstravi solidissime, Martis eccentricum situm esse, ut ipsum Solaris corporis centrum in lineam apsidum ejus incidat, non vero aliquod punctum prope; itaque eccentricos omnes in ipso Sole concurrere.

Ut vero hoc non tantum quoad longitudinem obtineat, sed etiam quoad latitudinem: ideo parte quinta demonstravi eandem rem etiam ex observatis latitudinibus Capite LXVII.

Non potuerunt ista maturius in opere demonstrari, quia ingreditur in demonstrationes has astronomicas cognitio exacta causarum inaequalitatis secundae in motu planetarum: in qua similiter detegendum prius erat parte tertia novum aliquid, antecessoribus incognitum &c.

Etenim demonstravi parte tertia: sive vetus jam dicta ratio valeat, quae medio Solis motu, sive mea nova, quae apparenti utitur; utrinque tamen secundae inaequalitati, quae communiter omnes planetas attinet, permixtum esse aliquid de inaequalitatis primae causis. Itaque Ptolemaeo demonstravi, epicyclos suos non habere illa puncta pro centris, circa quae motus eorum sunt aequabiles. Sic Copernico demonstravi, circulum, in quo Tellus circa Solem movetur, non habere id punctum pro centro, circa quod ejus motus regularis est et aequabilis. Sic Tycho Braheo demonstravi, circulum, in quo circumit concursus seu nodus eccentricorum supradictus, non habere id punctum pro centro, circa quod ejus motus regularis est et aequabilis. Nam si concedam Braheo, ut differat concursus eccentricorum a centro Solis, necesse esse ut dicat, circuitum concursus illius, qui quantitate et tempore plane aequat circuitum Solis, eccentricum esse et vergere in Capricornum, cum Solis circuitus eccentricus vergat in Cancrum; idem vero accidere epicyclis Ptolemaei;

Sin autem concursum seu nodum eccentricorum conferam in ipsum centrum corporis Solaris, tunc circuitum hunc utriusque et nodi dicti et Solis communem eccentricum quidem esse a Terra et in Cancrum vergere, sed dimidio solum eccentricitatis ejus, quam obtinet punctum, circa quod Solis motus regularis et aequabilis est;

Et in Copernico Terrae eccentricum vergere quidem in Capricornum, sed dimidio saltem ejus eccentricitatis, qua in eundem Capricornum distet punctum, circa quod aequabilis est motus Terrae;

Sic in Ptolemaeo in illis diametris epicyclorum, quae a Capricorno in Cancrum extenduntur, tria esse puncta aequalibus intervallis extrema bina a mediis singulis distantia, a se mutuo vero intervallis tantis, in proportionem ad diametros, quanta est Solis eccentricitas tota, collatione facta ad sui circuitus diametrum: ex his tribus punctis, quae sunt loco media, illa esse epicyclorum suorum centra, quae vero hinc versus Cancerum sint, esse puncta, circa quae motus epicyclorum sint aequabiles; denique quae hinc versus Capricornum sint, illa esse, quorum eccentricos (ab iis descriptos) indagamus, si pro medio Solis motu apparentem sequimur, quasi illis in punctis epicycli ad eccentricum affixi sint, ut ita in cuiusque planetae epicyclo sit absolute tota Theoria Solis cum omnibus ejus motuum et orbium proprietatibus:

Hisce sic demonstratis infallibili methodo, jam et prior gradus ad causas physicas confirmatus est et novus ad eas gradus exstructus, in Copernici et Braheii opinione clarissime, in Ptolemaica obscurius et probabiliter saltem.

Nam sive Terra moveatur sive Sol, demonstratum certe est, id corpus quod movetur moveri inaequali ratione; tarde scilicet, cum longius abest a quiescente: velociter, cum ad quiescens proxime accessit.

Jam statim igitur apparet discrimen opinionum trium in physica: per conjecturas quidem, sed nihil cedentes certitudine conjecturis medicorum de usu partium aut quibuscunque aliis physicis.

Primus quidem Ptolemaeus exploditur. Quis enim credat, totidem esse theorias Solis (ad unguem similes inter se, imo vero et aequales) quot planetas? cum videat, Braheo ad eadem munia sufficere unicam theoriam Solis: axioma quippe in physica receptissimum est, naturam paucissimis uti quam possibile est.

Copernicum vero Braheo*) potiore esse in physica coelesti, multis probatur.

Primum Braheus theorias illas Solis quinque e planetarum theoriis sustulit quidem et ad centra eccentricorum deduxit, occultavit, in unam conflavit: rem ipsam vero, quae per illas theorias efficiebatur, reliquit in mundo. Planeta enim quilibet praeter eum motum, qui est ei proprius, Braheo non minus quam Ptolemaeo movetur etiamnum re vera motu Solis, miscens utrosque in unum, ex qua mixtura spirae efficiuntur; quod inde fit, quia orbes nullos esse solidos demonstravit Braheus solidissime: Copernicus vero planetas quinque motu hoc extraneo penitus exuit, causa deceptionis ex visus conditionibus educta. Adhuc igitur apud Braheum frustra multiplicantur motus, ut prius apud Ptolemaeum.

Secundo, si orbes nulli sunt, valde dura fiet conditio intelligentiarum et animarum motricum; dum ad tam multa respicere jubentur, ut planetam duobus permixtis motibus invehant. Ad minimum enim simul et semel cogentur respicere ad utriusque motus principia, centra, periodos. At si Terra movetur, pleraque effici posse demonstro facultatibus non animalibus sed corporeis, magneticis nimirum. Sed haec communiora sunt. Sequuntur alia, quae proprie nascuntur ex demonstrationibus, quibus jam insistimus.

Si enim Tellus movetur, demonstratum est, eam leges celeritatis et tarditatis suae accipere ex modulo accessus sui ad Solem et recessus ab eodem. Atqui et reliquis planetis idem evenit, ut ex hoc accessu a Sole incitentur vel inhibeantur. Demonstratio harum rerum est geometrica hactenus.

Ex hac certissima demonstratione jam per conjecturam physicam colligitur, fontem motus planetarum quinque in ipso Sole esse. Valde igitur verisimile est, ibi esse fontem motus Telluris, ubi est fons motus reliquorum quinque planetarum: scilicet itidem in Sole. Terram igitur moveri verisimile est, quippe apparente verisimili causa ejus motus.

E contrario, Solem consistere loco suo in mundi centro, cum per alia tum

*) Cujus honestissimam et gratissimam fieri mentionem et recordationem aequissimum est; cum totum hoc aedificium super ejus fundo exstruat, materiam ab ipso omnem mutuatus.

per hoc maxime fit versimile, quia in eo fons est motus ad minimum quinque planetarum. Sive enim Copernicum sequaris sive Braheum, utrinque in Sole est fons motus planetarum quinque, in Copernico etiam sexti, scilicet Telluris. Fontem autem omnis motus verisimilius est suo loco manere quam moveri.

At si Brahei opinionem sequamur, et Solem dicamus moveri: primum manet hoc demonstratum, Solem tardum incedere cum a Terra longe abit, velocem cum appropinquat, idque non ad visum tantum, sed etiam in re ipsa: hic enim est effectus aequantis circuli, quem per demonstrationem necessariam in theoriam Solis induxeram.

Super hac igitur certissima conclusione per conjecturam physicam supra usurpatam exstruendum esset hoc physicum philosophema, Solem una cum toto illo maximoque quinque eccentricorum onere (ut crasse loquar) a Tellure moveri, seu fontem motus Solis et affixorum Soli quinque eccentricorum inesse in Tellure.

Atqui corpora utraque Solis et Telluris inspiciantur fiatque iudicium de utroque, utri magis competat fons motus corporis reliqui: Solne Terram moveat, qui ceteros movet planetas, an Terra Solem, motorem ceterorum, tot vicibus se majorem? Ne igitur cogamur concedere, Solem a Terra moveri, quod absurdum: Soli immobilitas, Telluri motus est concedendus.

Quid dicam de tempore periodico motus dierum 365, quod cum sit quantitate intermedium inter periodicum tempus Martis dierum 687 et Veneris dierum 225: an non alta voce exclamat rerum natura, circuitum, in quo consumuntur isti dies 365, loco etiam medium esse inter circuitus Martis et Veneris circa Solem, et sic ipsum quoque circa Solem, Terrae igitur esse hunc circuitum circa Solem, non Solis circa Terram? Sed haec sunt magis propria *Mysterii mei Cosmographici*, nec erant commemoranda hic alia argumenta, quam quae pertractantur in hoc opere.

Igitur cetera metaphysica argumenta, quae pro Solis in mundo loco, qui centrum est, a dignitate sideris vel a lumine ipso ducuntur, vide in dicto meo libello et apud Copernicum; nec nihil apud Aristotelem lib. II. de Coelo, sub nomine Pythagoraeorum, qui ignis nomine Solem intellexerunt. Tetigi aliqua in *Optica* parte *Astronomiae* Cap. I. fol. 7. Adde et caput VI. praecipue fol. 225. (II. 131. 272.)

De eo vero, quod Terram par sit extra medium mundi circumire, invenies cap. IX. folio 322 (II. 332.) illius libri argumentum metaphysicum.

Veniam tamen ab lectore spero, si contra nonnullas objectiones, quae animos occupant hisque argumentis hoc pacto lucem eripiunt, remedia quaedam etiam hoc loco indicem. Neque enim valde aliena sunt ab iis, quae in opere disputo super causis physicis motus planetarum, praesertim tertia et quarta parte.

Multos impedit motus gravium, quo minus credere possint, Terram moveri motu animali seu potius magnetico. Ii perpendant propositiones sequentes:

Punctum mathematicum sive centrum mundi sit sive non, nequit movere gravia neque effective neque objective, ut ad se accedant. Probent physici, hanc esse vim puncto, quod neque corpus est neque aliter nisi ex sola relatione intelligitur.

Impossibile est, ut forma lapidis movendo corpus suum quaerat punctum mathematicum aut mundi medium, citra respectum corporis in quo est illud punctum. Probent physici, res naturales habere sympathiam ad id quod nihil est.

Sed neque hoc pacto gravia tendunt ad centrum mundi, quod fugiant extremitates mundi rotundi. Nam proportio, qua absunt a medio mundi, invisibilis est et nihil efficit in comparatione ad distantiam ab extremitate mundi. Et quae causa esset huius odii? quanta vi, quanta sapientia oporteret esse praedita gravia, ut tam accurate fugere possent ab hoste undique circumjecto? quantave sollertia extremitatum mundi ad persequendum hostem suum tam minutim?

At neque vertigine rapida primi mobilis excutiantur gravia in medium, ut in undis rotatis. Nam motus ille, si ponamus esse, non est continuatus usque ad haec inferiora: alias sentiremus ipsum et raperemur una etiamque nobiscum ipsa Tellus: imo praeriperemur nos, Terra sequeretur: quae omnia opponenti absurda sunt. Apparet igitur doctrinam vulgarem de gravitate esse erroneam.

Vera igitur doctrina de gravitate his innititur axiomatibus:

Omnis substantia corporea, quatenus corporea, apta nata est quiescere omni loco, in quo solitaria ponitur extra orbem virtutis cognati corporis.

Gravitas est affectio corporea mutua inter cognata corpora ad unitiorem seu conjunctionem (quo rerum ordine est et facultas magnetica), ut multo magis Terra trahat lapidem, quam lapis petit Terram.

Gravia (si maxime Terram in centro mundi collocemus) non feruntur ad centrum mundi, ut ad centrum mundi, sed ut ad centrum rotundi cognati corporis, Telluris scilicet. Itaque ubicunque collocetur seu quocunque transportetur Tellus facultate sua animali, semper ad illam feruntur gravia.

Si Terra non esset rotunda, gravia non undiquaque ferrentur recta ad medium Terrae punctum, sed ferrentur ad puncta diversa a lateribus diversis.

Si duo lapides in aliquo loco mundi collocarentur propinqui invicem extra orbem virtutis tertii cognati corporis, illi lapides ad similitudinem duorum magneticorum corporum coirent loco intermedio, quilibet accedens ad alterum tanto intervallo, quanta est alterius moles in comparatione.

Si Luna et Terra non retinerentur vi animali aut alia aliqua aequipollenti, quaelibet in suo circuitu, Terra ascenderet ad Lunam quinquagesima quarta parte intervalli, Luna descenderet ad Terram quinquaginta tribus circiter partibus intervalli, ibique jungerentur: posito tamen, quod substantia utriusque sit unius et ejusdem densitatis.

Si Terra cessaret attrahere ad se aquas suas, aquae marinae omnes elevarentur et in corpus Lunae influerent.

Orbis virtutis tractoriae, quae est in Luna, porrigitur usque ad Terras et proleat aquas sub zonam torridam, quippe in occursum suum quacunque in verticem loci incidit, insensibiliter in maribus inclusis, sensibiliter ibi, ubi sunt latissimi alvei oceani aquisque spatiosa reciprocationis libertas; quo facto nudantur litora zonarum et climatum lateralium et si qua etiam sub torrida sinus efficiunt reductiones oceani propinqui. Itaque aquis in latiori alveo oceani assurgentibus, fieri potest, ut in angustioribus ejus sinibus, modo non nimis arcte conclusis, aquae praesente Luna etiam aufugere ab ea videantur: quippe subsidunt, foris subtracta copia aquarum.

Celeriter vero Luna verticem transvolante, cum aquae tam celeriter sequi non possint, fluxus quidem fit oceani sub torrida in occidentem, quoad impingit ad contraria litora curvaturque ab iis; dissolvitur vero discessu Lunae concilium aquarum seu exercitus, qui est in itinere versus torridam, quippe desertus a tractu, qui illum exciverat, impetuque capto, ut in vasis aquaticis, remeat et assultat ad litora sua eaque operit: gignitque impetus iste per absentiam Lunae impetum alium, donec Luna rediens fraena impetus hujus recipiat modereturque et una cum suo motu circumagat. Ita litora aequaliter patentia iisdem horis implentur omnia, reductiones vero tardius, nonnulla diversimode ob diversos oceani aditus.

Hinc, ut obiter excurram, accumulatur syrtes, arenarum cumuli: nascuntur aut eraduntur in vorticosis anfractibus (ut pro sinu Mexicano) insulae innumerae; videturque Indiarum mollis, beata et friabilis terra hoc fluxu et eluvie aeterna tandem esse perrupta atque perfossa, adjuvante Terrae motu aliquo universali, cum olim a Chersonneso aurca versus orientem et meridiem continua fuisse perhibeatur, jamque effuso oceano, qui a tergo erat inter Sinas et Americam, litora illa Moluccarum aliarumque vicinarum insularum in altum exporrecta, quippe subsidente maris superficie, fidem hujus rei opprimunt.¹⁹⁾

Quin et Taprobane ex eo submersa videtur (ut quidem constat ex relatu Calcutiensium, aliqua etiam ibi locorum submersa esse olim) oceano Sinensi per effractas portas in Indicum infuso, ut hodie nihil de Taprobane exstet praeter vertices montium, qui speciem exhibent insularum innumerabilium sub nomine Malvidarum. Nam ibi loci sitam fuisse olim Taprobanen, ex adverso scilicet ostiorum Indi et promontorii Corii versus meridiem, facile est ex cosmographis et Diodoro Siculo probare; cum etiam in historia ecclesiastica quidam perhibeatur fuisse communis

Episcopus Arabiae et Taprobanae utique vicinae, non vero 500 miliaribus germanicis (imo vero per anfractus illi aetati usitatos amplius mille) in orientem remotae. Quae vero hodie Taprobane putatur Sumatra insula, eam existimo olim fuisse Chersonnesum auream isthmo Indiae conjunctam ad urbem Malaccam. Nam Chersonnesus, quam hodie credimus aurea, non multo magis Chersonnesus dici posse videtur, quam Italia. ¹⁰⁾

Quae quamvis erant alius loci, sic uno contextu explicare volui, ut majorem aestui marino et per hunc virtuti Lunae tractoriae fidem facerem.

Sequitur enim, si virtus tractoria Lunae porrigitur in Terras usque, multo magis virtutem tractoriam Telluris porrigi in Lunam et longe altius, ac proinde nihil eorum, quod ex terrena materia quomodocunque constat, hinc altam subvehitur, complexum hunc fortissimum virtutis tractoriae unquam effugere.

Leve vero nihil est absolute, quod corporea materia constat, sed comparate levius est, quod rarius est sive natura sua, sive ex accidente calore. Rarum vero dico non illud tantum, quod porosum est et in multas cavitates dehiscit, sed in genere, quod sub eadem loci amplitudine, quam occupat gravius aliquod, minorem quantitatem materiae corporeae concludit.

Levium definitionem sequitur et motus. Non enim est existimandum, illa fugere ad superficiem usque mundi, dum feruntur sursum, aut non attrahi a Terra: minus enim attrahuntur quam gravia, et sic expelluntur a gravibus, quo facto quiescunt retinenturque a Terra loco suo.

Etsi vero virtus tractoria Terrae, ut dictum, porrigitur longissime sursum, tamen si lapis aliquis tanto intervallo abesset, quod fieret ad diametrum Telluris sensibile, verum est, Terra mota lapidem talem non plane secuturum, sed suas resistendi vires permixturum cum viribus Terrae tractoriis, atque ita se explicaturum nonnihil a raptu illo Telluris: non secus atque motus violentus projectilia nonnihil a raptu Telluris explicat, ut vel praecurrant, projecta versus orientem, vel destituantur, si in occidentem projiciantur: atque ita locum suum, a quo projecta sunt, vi compulsa deserant: neque raptus Terrae hanc violentiam in solidum impedire possit, quam diu violentus motus in suo vigore est. ¹¹⁾

Sed quia nullum projectile centies millesimam diametri Terrae partem a superficie Terrae separatur, ipsaeque adeo nubes atque fumi, quae minimum terrestris materiae obtinent, non millesima semidiametri parte evolant in altum: nihil igitur potest nubium, fumorum et eorum, quae perpendiculariter in altum projiciuntur resistentia et naturalis ad quietem inclinatio, nihil inquam potest ad impediendum hunc sui raptum; utpote ad quem haec resistentia in nulla proportionem est. Itaque quod perpendiculariter sursum est projectum, recidet in locum suum, nihil impeditum motu Telluris, ut quae subduci non potest, sed una rapit in aëre volantia, vi magnetica sibi non minus concatenata, quam si corpora illa contingeret.

Hisce propositionibus mente comprehensis et diligenter trutinatis, non tantum evanescit absurditas et falso imaginata impossibilitas physica motus Terrae, sed etiam patebit, quid ad objecta physica quomodocunque informata sit respondendum.

Etsi Copernico magis placet, Terram et terrena omnia, licet avulsa a Terra, una et eadem anima motrice informari, quae Terram, corpus suum, rotans rotet etiam una particulas istas a corpore suo avulsas: ut sic per motus violentos vis fiat huic animae per omnes particulas diffusae, quemadmodum ego dico, vim fieri facultati corporeae (quam gravitatem dicimus seu magneticam) itidem per motus violentos.

Sufficit tamen pro solutis a Terra facultas ista corporea; abundat illa animalia.

Quod vero a celeritate motus hujus multi sibi terraeque nascentibus extrema metuunt, causam nullam habent. Vide de hac re Cap. XV. et XVI. libri mei de Stella Serpentarii fol. 82. et 84. (II, p. 672 s.)

Ibidem etiam invenies plenis velis navigatum per immensitatem orbis mundani, quae Copernico solet objici ut prodigiosa: demonstratur enim, bene proportionatam

esse: contra vero improportionatam et prodigiosam celeritatem coeli futuram, si Terra jubeatur suo loco et situ stare plane immobilis.

Sunt autem multo plures illorum, qui pietate moventur, quo minus adsentiantur Copernico, metuentes ne Spiritui Sancto in Scripturis loquenti mendacium impingatur, si Terram moveri, Solem stare dixerimus.

Illi vero hoc perpendant: cum oculorum sensu plurima et potissima addiscamus, impossibile nobis esse, ut sermonem nostrum ab hoc oculorum sensu abstrahamus. Itaque plurima quotidie incidunt, ubi cum oculorum sensu loquimur, etsi certo scimus, rem ipsam aliter habere. Exemplum est in illo versu Virgilii: „provehimur portu, terraeque urbesque recedunt.“ Sic cum ex angustiis vallis alicujus emergimus, magnum sese campum nobis aperire dicimus. Sic Christus Petro: Duc in altum; quasi mare sit altius litoribus. Sic enim apparet oculis, et optidi causas demonstrant hujus fallaciae. Christus vero sermone utitur receptissimo, qui tamen ex hac oculorum fallacia est ortus. Sic ortum et occasum siderum, hoc est ascensum et descensum fingimus: cum eodem tempore Solem alii dicant descendere, quo nos dicimus illum ascendere. Vide Optices Astronomiae Cap. X. fol. 327. (II, 335.) Sic etiamnum planetas stare dicunt Ptolemaici, quando per aliquot continuos dies apud easdem fixas haerere videntur; etsi putent, ipsos tunc re vera moveri deorsum in linea recta vel sursum a Terris. Sic solstitium dicit omnis scriptorum natio: etsi negant vere stare Solem. Sic nunquam quisquam adeo deditus erit Copernico, quin Solem dicturus sit ingredi Cancrum vel Leonem, etsi innuere vult, Terram ingredi Capricornum vel Aquarium. Et cetera similiter.

Jam vero et sacrae literae de rebus vulgaribus (in quibus illorum institutum non est homines instruere) loquuntur cum hominibus humano more, ut ab hominibus percipiantur; utuntur iis, quae sunt apud homines in confesso, ad insinuanda alia sublimiora et divina.

Quid mirum igitur, si Scriptura quoque cum sensibus loquatur humanis tunc, cum rerum veritas a sensibus discrepat seu scientibus hominibus seu ignaris. Quis enim nescit poeticam esse allusionem Psalmo XIX, ubi, dum sub imagine Solis cursus Evangelii adeoque et Christi Domini in hunc mundum nostri causa suscepta peregrinatio decantatur, Sol ex horizontis tabernaculo dicitur emergere, ut sponsus de thalamo suo; alacris, ut gigas, ad currendam viam. Quod imitatur Virgilius: „Tithono croceum linquens aurora cubile.“ Prior quippe poësis apud Hebraeos fuit.

Non exire Solem ex horizonte tanquam e tabernaculo (etsi sic oculis appareat), sciebat Psaltes: moveri vero Solem existimabat, propterea quia oculis ita apparet. Et tamen utrumque dicit, quia utrumque oculis ita videtur. Neque falsum hic vel illic dicere censi debet: est enim et oculorum comprehensioni sua veritas, idonea secretiori Psaltis instituto cursuique Evangelii adeoque filii Dei adumbrando. Josua etiam valles addit, contra quas Sol et Luna moveantur; scilicet quia ipsi ad Jordanem hoc ita apparebat. Et tamen uterque suo intento potitur: Davides Dei magnificentia patefacta (et cum eo Siracides), quae effecit, ut haec sic oculis repraesentarentur, vel etiam mystico sensu per haec visibilia expresso: Josua vero, ut Sol die integro retineretur sibi in coeli medio respectu sensus oculorum suorum; cum aliis hominibus eodem temporis spatio sub Terra moraretur.

Sed incogitantes respiciunt ad solam verborum contrarietatem, Sol stetit, id est Terra stetit; non perpendentes, quod haec contrarietas tantum intra limites optices et astronomiae nascatur, nec ideo se extrorsum in usum hominum efferat: nec videre volunt, hoc unicum in votis habuisse Josuam, ne montes ipsi Solem eriperent: quod votum verbis explicuit sensu oculorum conformibus; cum importantum admodum fuisset, eo tempore de astronomia deque visus erroribus cogitare. Si quis enim monuisset, Solem non vere contra vallem Ajalon moveri, sed ad sensum tantum; an non exclamasset Josua, se petere ut dies ipsi producat quacunque id ratione fiat? Eodem igitur modo, si quis ipsi litem movisset de Solis perenni quiete Terraeque motu. Facile autem Deus ex Josuae verbis, quid is vellet, intellexit praestititque inhibito motu Terrae; ut illi stare videretur Sol. Petitionis enim

Josuae summa huc redibat, ut hoc sic sibi videri posset, quicquid interim esset: quippe hoc videri vanum et irritum non fuit, sed conjunctum cum effectu optato.

Sed vide Caput X. Astronomiae partis Opticae; invenies rationes, cur adeo omnibus hominibus Sol moveri videatur, non vero Terra: scilicet cum Sol parvus appareat, Terra vero magna; neque Solis motus comprehendatur visu ob tarditatem apparentem, sed ratiocinatione solum, ob mutatam post tempus aliquod propinquitatem ad montes. Impossibile igitur est, ut ratio non prius monita sibi aliud imaginetur, quam Tellurem cum imposito coeli fornice esse quasi magnam domum, in qua immobili Sol tam parva specie, instar volucris in aëre vagantis, ab una plaga in aliam transeat. Quae adeo imaginatio hominum omnium primam lineam dedit in sacra pagina. Initio, inquit Moses, creavit Deus Coelum et Terram; quia scilicet hae duae partes potiores occurrunt oculorum sensui. Quasi diceret Moses homini: Totum hoc aedificium mundanum, quod vides, lucidum supra, nigrum latissimeque porrectum infra, cui insistis et quo tegeris, creavit Deus.

Alibi quaeritur ex homine, num pervestigare noverit altitudinem coeli sursum et profunditatem terrae deorsum: quia scilicet vulgo hominum videtur utrumque aequae infinitis excurrere spatiis. Neque tamen exstitit, qui sanus audiret, et astronomorum diligentiam seu in ostendenda Telluris contemptissima exilitate ad coelum comparatae, seu in pervestigandis astronomicis intervallis, per haec verba circumscriberet, cum non loquantur de ratiocinatoria dimensione, sed de reali, quae humano corpori terris affixo aëremque liberum haurienti penitus est impossibilis. Lege totum Jobi caput XXXVIII. et compara cum iis, quae in astronomica inque physica disputantur.

Si quis allegat ex Psalmo XXIV. Terram super flumina praeparatam, ut novum aliquod philosophema stabiliat absurdum auditu, Tellurem innatare fluminibus; nonne hoc illi recte diceretur, missum faciat Spiritum sanctum neque in scholas physicas cum ludibrio pertrahat; nihil enim aliud ibi loci innuere velle Psalten, nisi quod homines antea sciant et quotidie experiantur, Terras (post separationem aquarum in altum sublatas) interfluere ingentia flumina, circumfluere maria. Nimirum eandem esse locutionem alibi, cum sese super flumina Babylonis Israelitae sedisse canunt, id est juxta flumina vel ad ripas Euphratis et Tigris.

Si hoc libenter quis recipit, cur non et illud recipiat, ut in aliis locis, quae motui Telluris opponi solent, eodem modo oculos a physica ad institutum scripturae convertamus?

Generatio praeterit (ait Ecclesiastes) et generatio advenit, Terra autem in aeternum stat. Quasi Salomon hic disputet cum astronomis, ac non potius homines suae mutabilitatis admoneat? cum Terra, domicilium humani generis, semper maneat eadem, Solis motus perpetuo in se redeat, ventus in circulum agatur redeatque eodem, flumina a fontibus in mare effluant, a mari in fontes redeant: denique homines his pereuntibus nascantur alii semperque eadem sit fabula vitae: nihil sub Sole novum.

Nullum audis dogma physicum. *Novotetia* est moralis rei, quae per se patet et observatur omnium oculis, sed parum perpenditur. Eam igitur Salomon inculcat. Quis enim nescit, Terram semper eandem esse? quis non videt, Solem quotidie ab ortu resurgere, flumina perenniter decurrere in mare, ventorum statas redire vicissitudines, homines alios aliis succedere? Quis vero perpendit, eandem agi perpetuo vitae fabulam mutatis personis, nec quicquam in rebus humanis novum esse? Itaque Salomon commemoratione eorum, quae vident omnes, admonet ejus, quod a plerisque perperam negligitur.

Psalmo vero CIV. putant omnino disputationem contineri physicam, quando de rebus physicis totus est. Atque ibi Deus dicitur fundasse Terram super stabilitatem suam; illamque non inclinatum iri in seculum seculi. Atqui longissime abest Psalter a speculatione causarum physicarum. Totus enim acquiescit in magnitudine Dei, qui fecit haec omnia, hymnumque pangit Deo conditori, in quo mundum, ut is apparet oculis, percurrit ordine. Quod si bene perpendas, commen-

tarius est super Hexaemeron Geneseos. Nam ut in illo tres primi dies dati sunt separationi regionum, primus lucis a tenebris exterioribus, secundus aquarum ab aquis interposito expansi, tertius terrarum a maribus, ubi terra vestitur plantis et stirpibus: tres vero posteriores dies regionum sic distinctarum impletioni, quartus coeli, quintus marium et aëris, sextus terrarum: sic in hoc psalmo sunt distinctae et sex dierum operibus analogae partes totidem. Nam versu secundo lucem, creaturarum primam primaeque diei opus Creatori circumdat pro vestimento. Secunda pars incipit versu tertio agitque de aquis super coelestibus, extensione coeli et de meteoris, quae videtur Psalter accensere aquis superioribus, scilicet de nubibus, ventis, presteribus, fulguribus. Tertia pars incipit a versu sexto celebratque Terram ut fundamentum rerum, quas hic considerat. Omnia quippe ad Terram eamque inhabitantia animalia refert; scilicet quia oculorum iudicio duae primariae sunt partes mundi, Coelum et Terra. Hic igitur considerat, Terram tot jam seculis non subsidere, non fatiscere, non ruere: cum tamen nemini compertum sit, super quid illa sit fundata. Non vult docere quod ignorent homines, sed ad mentem revocare, quod ipsi negligunt, magnitudinem scilicet et potentiam Dei in creatione tantae molis, tam firmae et stabilis. Si astronomus doceat, Terram per sidera ferri, is non evertit, quae hic dicit Psalter, nec convellit hominum experientiam. Verrum enim nihilominus est, non ruere Terras, Dei architecti opus, ut solent ruere nostra aedificia vetustate et carie consumpta, non inclinari ad latera, non turbari sedes animantium, consistere montes et litora, immota contra impetus ventorum et fluctuum, ut erant ab initio. Subjungit autem Psalter pulcherrimam hypotyposin separationis undarum a continentibus, exornatque eam adjectione fontium et utilitatum, quas exhibent fontes et petrae volucribus et quadrupedibus. Nec praeterit exornationem superficiei Telluris a Mose commemoratam inter opera diei tertiae; sed eam a causa sua repetit altius, ab humectatione puta coelesti: et exornat commemoratione utilitatum, quae redeunt ab illa exornatione ad victum et hilaritatem hominis et bestiarum habitacula.

Quarta pars incipit versu 20, celebrans quartae diei opus, Solem et Lunam, sed praecipue utilitatem, quae ex distinctione temporum redeunt ad animantia et hominem, quae ipsi jam est subjecta materia: ut clare appareat, ipsum hic non agere astronomum. Non enim omisisset mentionem quinque planetarum, quorum motu nihil est admirabilius, nihil pulchrius, nihil quod de Conditoris sapientia testetur evidentius apud eos qui capiunt. Quinta pars est versu 26. de quintae diei opere, impletque maria piscibus et exornat navigationibus. Sexta obscurius annectitur a versu 28. agitque de Terrarum incolis animalibus, sexto die creatis. Et denique in genere subdit bonitatem Dei sustentantis omnia et creantis nova. Omnia igitur, quae de mundo dixerat, ad animantia refert: nihil, quod non sit in confesso, commemorat: scilicet quia animus ipsi est extollere nota, non inquirere incognita, invitare vero homines ad consideranda beneficia, quae ad ipsos redeunt ex his singulorum dierum operibus.

Atque ego lectorem meum quoque obtestor, ut non oblitus bonitatis divinae in homines collatae, ad quam considerandam ipsum Psalter potissimum invitat, ubi a templo reversus in scholam astronomicam fuerit ingressus, mecum etiam laudet et celebret sapientiam et magnitudinem Creatoris, quam ego ipsi aperio ex formae mundanae penitiori explicatione, causarum inquisitione, visus errorum detectione; et sic non tantum in Telluris firmitudine et stabilitate salutem universae naturae viventium, ut Dei munus exosculetur, sed etiam in ejusdem motu tam recondito, tam admirabili, Creatoris agnoscat sapientiam.

Qui vero hebetior est, quam ut astronomicam scientiam capere possit, vel infirmior, quam ut inoffensa pietate Copernico credat: ei suadeo, ut missa schola astronomica, damnatis etiam si placet philosophorum quibuscunque placitis, suas res agat et ab hac peregrinatione mundana desistens, domum ad agellum suum excolendum se recipiat, oculisque, quibus solis videt, in hoc adspectabile coelum sublati, toto pectore in gratiarum actionem et laudes Dei Conditoris effundatur:

certus, se non minorem Deo cultum praestare, quam astronomum, cui Deus hoc dedit, ut mentis oculo perspicacius videat, quaeque invenit, super iis Deum suum et ipse celebrare possit et velit.

Quo nomine mediocriter, non parum sanè, doctis commendata esse debet opinio Brahei de forma mundi: quippe quae mediam quodammodo viam incedens ex una parte astronomos, quoad ejus fieri potest, inutiles tot epicyclorum suppellectile liberat, causas motuum, ignoratas Ptolemaeo, cum Copernico amplectitur; physicis speculationibus aliquem locum dat, Sole in centrum systematis planetarii recepto; ex altera vero parte vulgo literatorum servit, motumque Telluris, adeo creditu difficilem, eliminat: licet per eam theoriae planetarum in astronomicis speculationibus et demonstrationibus multis intricentur difficultatibus nec parum turbetur physica coelestis.

Atque haec de sacrarum literarum auctoritate. Ad placita vero Sanctorum de his naturalibus uno verbo respondeo: in theologia quidem auctoritatum, in philosophia vero rationum esse momenta ponderanda. Sanctus igitur Lactantius, qui Terram negavit esse rotundam: sanctus Augustinus, qui rotunditate concessa negavit tamen antipodas; sanctum Officium hodiernorum, qui exilitate Terrae concessa negant tamen ejus motum. At magis mihi sancta veritas, qui Terram et rotundam et antipodibus circumhabitata et contentissimae parvitas esse et denique per sidera ferri, salvo doctorum ecclesiae respectu, ex philosophia demonstro.

Sed satis de hypotheseos Copernicanae veritate. Revertendum enim ad institutum, a quo feceram initium hujus introductionis. Coepi dicere, me totam astronomiam non hypothesibus fictitiis, sed physicis causis hoc opere tradere: ad hoc vero fastigium me contendisse duobus gradibus; altero, quod deprehenderam, in corpore Solis concurrere planetarum eccentricos, reliquo, quod in theoria Telluris intellexerim inesse circulum aequantem ejusque eccentricitatem bisecandam. Igitur hic sit tertius gradus, quod comparatione instituta partis secundae cum quarta certissime demonstratum fuit, etiam Martialis aequantis eccentricitatem bisecandam praecise, quod Braheus diu et Copernicus dubium effecerunt. Quare inductione facta ab omnibus planetis parte tertia ex anticipato demonstratum est, quandoquidem solidi orbes, ut Braheus ex trajectionibus cometarum demonstravit, nulli sunt, Solis igitur corpus esse fontem virtutis, quae planetas omnes circumagat. Modum etiam definivi argumentis talem, ut Sol manens quidem suo loco, rotetur tamen ceu in torno, emittat vero ex sese in mundi amplitudinem speciem immateriatam corporis sui, analogam speciei immateriatæ lucis suae: quae species ad rotationem corporis Solaris rotetur ipsa quoque instar rapidissimi vorticis per totam mundi amplitudinem; transferatque una secum in gyrum corpora planetarum intenso vel remisso raptu, prout densior vel rarior ipsa effluxus lege fuerit.

Expedita communi hac virtute, qua omnes planetae suo quisque circulo circa Solem invehuntur; consectorium erat meis argumentationibus, ut singulis planetis singuli tribuerentur motores, in ipsis planetarum globis insidentes: quippe solidos orbes jam ex sententia Brahei rejeci. Atque hoc ipsum quoque parte tertia egi.

Hac argumentandi via constituti motores isti incredibile dictu quantum mihi laboris exhibuerint parte quarta, dum distantias planetae a Sole, dum aequationes eccentrici prodere jussi, vitiosas produunt et ab observationibus dissentiant: non quod falso fuerint introducti, sed quia circulorum quasi pistrinis illos alligaveram, fasciatus opinione vulgari: quibus illi compedibus nexi opus suum facere non poterant.

Nec finis fuit fatigationis meae prius quam quartum ad hypotheses physicas struxi gradum: laboriosissimis demonstrationibus observationumque plurimarum tractionibus deprehenso, iter planetae in coelo non esse circulum, sed viam ovalem, perfecte ellipticam.

Accessit geometria docuitque, iter tale effici, si propriis planetarum motoribus laborem hunc assignemus, librandi corpus suum in linea recta versus Solem extensa. Neque hoc solum, sed et aequationes eccentrici justae et observationibus consentaneae efficiebantur per talem librationem.


Denique igitur aedificio fastigium hoc fuit impositum et demonstratum geometricae, librationem huiusmodi effici solere a magnetica corporea facultate. Itaque motores hi planetarum proprii probabilissime ostensi sunt nihil aliud esse, quam affectiones ipsorum planetariorum corporum tales, qualis est in magnete poli appetens ferrumque rapiens: ut ita tota ratio motuum coelestium facultatibus mere corporeis, hoc est magneticis, administretur, excepta sola turbinatione corporis Solaris in suo spatio permanentis, cui vitali facultate opus esse videtur. Nam parte quinta demonstratum, nostras jam introductas hypotheses physicas etiam latitudinibus satisfacere. Datum tamen fuit aliquid partibus III. et IV. etiam menti, ut motor planetae proprius cum animali facultate movendi sui globi conjungat rationem, si quis objectionibus nonnullis extraneis ad speciem validis territus, naturae corporum diffidere velit: modo talis aliquis hoc recipiat, mentem illam uti apparenti diametro Solis pro mensura librationis, sensumque habere angulorum, quos exquirunt astronomi.

Tantum igitur in gratiam physicorum dictum esto: cetera invenient astronomi et geometricae suo quaelibet ordine ex sequentibus singulorum capitum argumentis, quae paulo prolixiora esse volui, cum ut essent loco indicis, tum ut lector passim haerens in obscuritate sive materiae seu styli, secundum Tabulam synopticam ab his etiam argumentis aliquam lucem petat rationemque ordinis et cohaerentiam rerum in idem caput congestarum, si minus fortassis in ipso contextu sit conspicua, percipiat evidentius inter argumenta in paragraphos suos secta. Quare lector boni consulat, rogo.


SYNOPSIS TOTIUS OPERIS.

PARS PRIMA.

Distinctione inaequalitatem in primam et secundam. Capite I.



PARS SECUNDA.



ARGUMENTA SINGULORUM CAPITUM.

Cum alia sit methodus, quam natura rei docet, alia, quam cognitio nostra requirit: utraque artificialis: neutram a me lector sinceram expectare debet. Mihi enim scopus non hic praecipuus est, explicare motus coelorum, quod fit in libellis sphaericis et planetarum theoriis: neque tantum docere lectorem et perducere a primis et per se notis ad ultima: quam viam Ptolemaeus ut plurimum observavit: sed accedit tertium aliquid, commune mihi cum oratoribus, ut quia nova multa trado, id coactus fecisse manifestus sim, itaque demeream et retineam assensum lectoris et amoliar suspicionem de studio novandi.

Nil igitur mirum, si methodis superioribus admisceam tertiam oratoribus familiarem, hoc est historicam mearum inventionum: ubi non de hoc solo agitur, quo pacto lector in cognitionem tradendorum perducatur via compendiosissima, sed de hoc potissimum, quibus Ego auctor seu argumentis seu ambagibus seu fortuitis etiam occasionibus primitus eodem devenierim. Quodsi Christophoro Columbo, si Magellano, si Lusitanis non tantum ignoscimus errores suos narrantibus, quibus ille Americam, iste oceanum Sinensem, hi Africae periplum aperuerunt; sed ne vellemus quidem omissos, quippe ingenti lectionis jucunditate carituri: nec igitur mihi vitio vertetur, quod idem eodem lectoris studio per hoc opus sum secutus. Nam etsi Argonauticorum illorum laborum nequaquam legendo reddimur participes, mearum vero inventionum difficultates et spinas ipsam etiam lectionem infestant: at communis haec fortuna est omnium librorum mathematicorum, existentque nihilominus, ut sumus homines, quorum alios alia delectant, qui superatis perceptionis difficultatibus hac integra inventionum serie simul ob oculos posita ingenti voluptate perfundantur. Hac igitur methodo concinnatum esse opus universum jam patebit ex argumentis singulorum capitum.

Dedi autem operam, ut quoties textus aliquam demonstrationem geometricam delineationemve aut praeparationem expediret, litera cursoria (ut appellant officinae) exscriberetur. Id si non undique obtinet, vel materiae tribues, quae geometricis miscet physica, vel typothetis, qui mea signa non undique perceperunt.

Cap. I. Explicat, qua ratione astronomi deprehenderint, differre motum primum a secundis seu planetarum propriis; qua item ratione fuerint inventae in proprio planetae motu duae inaequalitates, prima et secunda dictae.

Occasio hujus capituli totiusque adeo primae partis haec est, quod cum primum ad Braheum venissem, deprehenderem ipsum cum Ptolemaeo et Copernico secundam planetae inaequalitatem censere a Solis motu medio. Mihi vero quatuor annis ante propter rationes physicas videbatur incipienda a Solis motu apparente, ut habes in *Mysterio Cosmographico*. Orta igitur inter nos disceptatione Braheus opposuit, se cum esset usus Solis medio salvasse observata omnia primae inaequalitatis; reposui ego: nihil hoc impedire quo minus Ego usus apparente Solis motu salvem eadem observata primae inaequalitatis: itaque in secunda inaequalitate cernendum, uter rectius faciat. Quod igitur Ego respondi, demonstrandum fuit parte prima operis.

Cap. II. Igitur cum esset propositum negotium perplexum de hypothesium aequipollentia: ejus ego initium feci a prima et simplicissima, quando concentricus cum epicyclo permutatur in eccentricum.

Ne vero jejuna esset geometria, disputavi super canis et physicis et rationalibus seu mentalibus, quibus utramque hypothesium aequipollentiam administrari motusque perfici consentaneum sit: idque aliter, si concedantur orbes solidi, aliter etiam, si negentur. Quippe Braheus ex trajectionibus cometarum demonstravit, nullos esse orbes solidos.

Cap. III. Stante hoc eccentrico simplici, seu qui aequipollet concentrico cum unico epicyclo, docetur, quid mutetur seu ad sensum oculorum seu in canis motuum naturalibus,

si medius Solis motus cum apparenti permutetur, hoc est si visus, imo potius si fons virtutis imaginatione transponatur in alium locum.

Cap. IV. 1) Absoluto eccentrico simplici transitur ad eccentricum cum aequante, hoc est cum eccentricitate duplici, quem Ptolemaeus quinque planetarum inaequalitati primae assignaverat. 2) Posita igitur soliditate orbium, demonstratur ejus absurditas; negata vero, concinnitas et probabilitas physica. 3) Ostenditur deinde, quomodo Copernicus hunc eccentricum cum aequante transmutaverit in concentricum cum duobus epicyclis. 4) Haec Copernici hypothesis positae orbibus solidis physice mediocriter habere, negatis vero absurda esse ostenditur. 5) Sed et hoc probatur, deficere illam a geometrica pulchritudine in itinere planetae. 6) Nec per omnia aequipollere eccentrico Ptolemaico: parvo quidem discrimine in prima inaequalitate, majori vero in secunda. 7) Ibidem et demonstratio methodi computandi compendiose aequationem ex utraque forma hypotheseos. 8) Modus obliterandi differentiam inter utramque hypothesin. 9) Denique hujus Copernicanae hypotheseos alia forma per concentrepticulum.

Cap. V. Hoc caput V. sic se habet ad IV, ut III ad II. Negotium enim magis serium agitur: 1) de iis, quae mutantur in hypothesi, si visus seu fons virtutis usurpatione Solis apparentis motus pro medio de pristino loco transponatur in alium: idque in forma Copernicanae hypotheseos, quae cap. IV. fuit postrema. 2) Quae item in causis motuum physicis ex eadem hypothesi mutantur. 3) Transpositio haec delineatur et instruitur in forma primae inaequalitatis Ptolemaica. 4) Demonstratur, duabus admissis lineis apsidum, altera antiqua, altera ex transpositione orta et sic mutata forma hypotheseos, aequaturas duorum generum datas apparitiones: manente eodem itinere planetae in coelo. 5) Constituta vero una linea apsidum eaque trajecta per antiquum centrum eccentrici, demonstratur, neque sequi necessarias apparitiones pristinas, licet manente itinere, neque plane retineri formam eandem hypotheseos. 6) Denique nova linea apsidum transeunte per centrum aequantis et retenta forma hypotheseos, demonstratur transponi iter in coelo. 7) Locus circuli et quantitas demonstratur geometrica, maximae differentiae seu aberrationis apparitionum a propositis per hanc transpositionem causatae. 8) Demonstratur, omnia ista locum habere, si manente visu transponatur aequali spatio centrum aequantis in plagam oppositam. 9) Omnia dicta de eccentrico cum aequante, qui Ptolemaeo placuit, applicantur concentrico cum duobus epicyclis Copernico-Braheano, quippe per caput IV. aequipollenti.

Cap. VI. Hic jam cap. V. demonstrata, praecipue numero 6. 7. 8. quodammodo traduntur in usum. Et hactenus quidem de iis hypothesibus agebatur, quae primae serviunt inaequalitati, diversae apud diversos. Jam porro adjunguntur et illae, quae secundae inaequalitati sunt tributae, quaeque ut capitales (prae iis, de quibus hactenus) a suis auctoribus Ptolemaeo, Copernico, Tycho Brahe denominantur. Usitate quippe Copernicanam hypothesin nominantes subintelligimus secundae inaequalitatis. 1) Has igitur initio comparo. 2) In Copernicana ostendo, quomodo primae inaequalitatis hypothesis fuerit accersita a Solis motu medio, quomodoque consurgat eccentricitas ex puncto Solis vicario. 3) Physice argumentor, id non recte fieri, sed debere eccentricitatem computari ab ipso centro corporis Solis. 4) Si inaequalitatem secundam a Solis apparente motu censeamus fieri, quod hic volunt rationes physicae. 5) Demonstratur hoc pacto, parum variari loca longitudinis in prima inaequalitate, multum vero differre distantias corporis planetae a corpore Solis. 6) Geometrica demonstratur locus in orbe magno Telluris, in quo visui constituto maxima distantiarum differentia maximum etiam errorem obijciat. 7) Quantitas erroris arithmetice operationibus colligitur excurrere posse ad $1^{\circ} 20'$ c. 8) In Ptolemaica hypothesi ostendo, quomodo primae inaequalitatis hypothesis fuerit accersita a Solis motu medio. 9) Generaliter ex physica seu metaphysica contemplatione multa disputantur tam contra medium Solis motum, quam contra ipsam hanc hypothesin. 10) In specie vero obijciuntur indidem aliqua Solis motui medio peculiariter. 11) Si inaequalitatem secundam a Solis apparente motu censeamus, satisfieri objectionibus physicis. 12) Situs, quantitas et forma novae hypotheseos demonstratur transpositione puncti aequatorii. 13) Discrepantia apparitionum primae inaequalitatis locusque in epicyclo, in quo contingit maximus error apparitionum secundae inaequalitatis, et quantitas hujus erroris applicantur ex superioribus. 14) In Braheana hypothesi ostendo, quomodo primae inaequalitatis hypothesis fuerit accessita a Solis motu medio, ideoque centrum concentrici Martii affixum orbi Solis, non in centro corporis Solis, sed juxta. 15) Contra Braheanam hypothesin pauca in genere, contra hanc vero affixionis formam specialiter plura ex physica discepto, contendens affixionem, ut ad captum loquar, in ipso centro corporis Solis fieri debere. 16) Situs, quantitas et forma novae hypotheseos per transpositionem puncti affixionis declaratur, et applicantur ex superioribus loca tam eccentrici quam orbis magni eccentricum (seu concentricum cum epicyclis) gestantis, in quibus error contingit maximus.

Atque hactenus porrigitur pars prima.

Kepleri Opera. III.

P A R S II.

Cap. VII. Particularius explico occasiones et quibus in theoriam Martis inciderim et quae me permoverint, apparentem Solis motum sequi primamque partem jam absolutam hoc modo praemittere. Summam habes ad argumentum capitis I.

Cap. VIII. Exhibet hypothesin primae inaequalitatis Martis, ut ea est a Braheo constituta, eamque in tabula, quae habet fundamenta, scilicet observationes acronychias, et effectum, computatos scilicet locos juxta observatos eorumque examen eo directum, ut appareret an haec hypothesis usque adeo scrupulosa consentiret observatis.

Cap. IX. Agit de emendata assumptione observatorum locorum. 1) Ostenditur necessitas, pro loco planetae in suo proprio circulo constituendi locum ei respondentem in ecliptica. 2) Refutatur aequalitas, quam tabula sequitur, arcum a nodo ad locum planetae visum locumque eclipticum pertingentium. 3) Refutatur et illa aequalitas, si alter arcus non in locum visum sed in locum verum orbitae terminetur. 4) Refutatur et modus reducendi per visae latitudinis angulum, et astruitur modus reducendi per angulum inclinationis planorum.

Cap. X. Pertinet eodem, examinataque suscepta loca tabulae, an a vicinis observationibus correcte et tuto ad oppositum Solis medii fuerint deducta, addunturque et de aliis subtilitatibus admonitiunculae, praesertim de parallaxi. Et hactenus examen tabulae.

Cap. XI. Meam ergo accommodationem ad Solis apparentem incepturus a reductione et deductione legitima, ut ne quid in ea peccem, prius inquiri parallaxes Martis diurnas. 1) Narro, quid de iis Braheus senserit. 2) Probo ex Brahei observatis per motus horarios et diurnos, insensibiles pene esse et minores quam putamus esse Solares. 3) Per ludum applico et meas observationes eodem spectantes: quibus peculiarem explico methodum inquirendi parallaxin diurnam per latitudinem stationariam.

Cap. XII. 1) Investigandi nodos Martis modus Brahei particularis ex observatione vicina et censura. 2) Modus alius, qui praesupponit cognitae aequationes eccentrici ex Prutenicis, Ptolemaeo aut Braheo. Quibus simul demonstratur, nodum descendantem, qui inquiritur quatuor observationibus, et ascendentem, qui duabus, esse in oppositae eclipticae locis.

Cap. XIII. 1) Inclinationis planorum paulo intricatiorem esse rationem ostenditur per omnes tres formas hypothesium. 2) Modus unus, praesupponens aequationes eccentrici cognitae, quando Mars vespertino occubitu vel exortu matutino per inaequalitatem primam in limitibus fuerit: tunc enim visa latitudo aequat veram inclinationem limitum ad eclipticam. 3) Ostenditur, in quanto arcu elongationis a Sole id verum sit, idque tam in Copernicana quam in Ptolemaica hypothesi: et perficitur aliquot observationibus circa utrumque limitem. 4) Secundus modus nihil desiderans nisi selectas et raras observationes, in quibus Sol sit in nodis, Mars in quadrato Solis: et hic per aliquot observationes perficitur. 5) Ampliatur, ut Mars ceteris manentibus alio loco possit esse, quam in quadrato Solis, et sic alia quam limitis, certa tamen, colligatur certi loci inclinatio. 6) Applicatur hic modus et Ptolemaicae hypothesi, quae habet aliquam difficultatem. 7) Tertius modus per observatas in Solis oppositis latitudines incedit, adjungens praecognitam proportionem orbium; traducitur autem per omnes tres hypothesium formas.

Cap. XIV. Ex demonstratis capitis XIII. porro refutatur opinio veterum, quasi plana eccentricorum sint librabilia. Demonstratur enim, inclinationem, intra quidem unius vel alterius seculi terminos, esse constantem.

Cap. XV. Ex observationibus vicinis arithmetice inquiruntur loca, quae possedit Mars sub articulos oppositionum cum Solis motu apparenti, eaque corriguntur per cautiones hactenus tractatas; denique exhibetur eorum tabula pro fundamento novae operationis.

Cap. XVI. Ad imitationem igitur veterum dissimulatis causis physicis ponitur, iter planetae esse circulum; poniturque intra ejus complexum esse punctum aliquod, circa quod aequalibus planeta temporibus aequales absolvat angulos; interque illud et centrum Solis versari centrum circuli planetarii, distantia incognita. His positis et assumtis quatuor observationibus acronychiis cum locis sub zodiaco et intervallis temporariis, inquiritur methodo laboriosissima situs utriusque centri sub zodiaco, distantia a centro Solis et proportio utriusque eccentricitatis, cum ad se mutuo tum ad radium circuli.

Cap. XVII. Comparatione locorum aphelii et nodorum, quae fuere tempore Ptolemaei, cum nostri temporis inventis, colligitur motus illorum, necessarius sequenti capiti.

Cap. XVIII. Tandem igitur ostenditur ex hac sic inventa hypothesi, quae apparenti motui Solis innitur, salvari omnem observatum longitudinis motum circa Solis oppositum, idque multo certius quam prius, cum hypothesis Braheana inniteretur medio Solis motui.

Cap. XIX. 1) Etsi hactenus officium fecit hypothesis inventa in motu longitudinis circa Solis oppositum, demonstratur, eam tamen officium non facere in motu latitudinis circa Solis oppositum. 2) Demonstratur autem, neque Braheanam officium hic facere, idque utrumque in forma Copernicana. 3) Idem in forma hypothesis Ptolemaica et Braheana. 4) Ostenditur, errorem circa latitudines in eo esse, quod non fuerit bisecta eccentricitas. 5) At si bisecetur eccentricitas, tunc hypotheses aberrare in longitudinis motu. Ex quibus causa patet, quae me impulerit ut desertis veteribus diligentius super his rebus inquirerem.

Cap. XX. 1) Ut priori capite per motum latitudinis circa Solis oppositum, sic nunc per motum longitudinis extra oppositum Solis erroris convincitur haec mea hypothesis. 2) Sic et Braheana, medio Solis motui innixa. 3) Demonstratio applicatur etiam formae motuum Ptolemaicae et Braheanae. 4) Digitus intenditur ad fontes errorum et ad correctionis modum. 5) Protheorema interjicitur, quales lineae in plano eclipticae sint substituendae lineis distantiae planetae a Sole in plano eccentrici planetae, quando planeta habuerit aliquam latitudinem.

Cap. XXI. Causae ex geometria petuntur efficientes, ut falsa hypothesis verum prodatur: et ostenditur, quatenus id fieri possit.

Atque hic finis partis secundae, in qua veteres sum imitatus.

P A R S III.

Cap. XXII. Mea igitur methodo usus, totum negotium de novo incipio non a prima sed a secunda inaequalitate. Et 1) explicantur occasiones, quibus inciderim in suspensiones de aequante circulo in theoria Solis regnante. 2) Demonstratio in tribus hypothesis formis: posito aequante (quod mihi placebat), videri orbem magnum (sive Ptolemaeo epicyclos) augeri et minui, quod Braheus assereret. 3) Traditur methodus observationes idoneas inquirendi, ex quibus aequans iste probetur. 4) Demonstratur res ipsa ex duabus selectis observationibus et supposita restitutione Braheana, quae medio Solis motui innititur.

Cap. XXIII. Inventis superiori capite duorum in zodiaco locorum distantis Solis a Terra et adjuncto loco apogaei Solis seu aphelii Terrae, demonstratione geometrica inquiratur et eccentricitas circuli Solis vel Terrae, qui perfectus praesupponitur esse.

Cap. XXIV. Demonstratur idem quod cap. XXII. sed observationibus quatuor magis promiscue oblatis, quae tamen Martem habent in eodem eccentrici loco: partem scilicet aliquam de Solis vel Terrae eccentricitate dandam aequanti circulo: idque etiam in tribus formis hypothesis inter se comparatis: atque etiam supposita restitutione Braheana motuum Martis, quae medio Solis motui innititur.

Cap. XXV. Inventis igitur superiori capite trium et trium in zodiaco locorum distantis Solis a Terra, demonstratione geometrica, quae nihil praeterea supponit nisi iter perfecte circulare, inquiritur non tantum eccentricitas circuli Solis vel Terrae ut cap. XXIII. sed etiam ipsius apogaei Solis vel contrarii aphelii Terrae locus, idem fere, qui a Braheo est inventus ex observationibus Solis propriis, cum hic sint observationes tantummodo Martis.

Cap. XXVI. Observationes hae quatuor cap. IV. medio motu Solis ad verum, a restitutione Braheana ad meam transferuntur; et colligitur idem inde quod cap. XXV. Et proponitur demonstratio in omnibus tribus hypothesis formis.

Cap. XXVII. Audaciori etiam methodo nullam plane praesuppono Martis restitutionem, et assumtis aliis Martis observationibus, non minus quatuor sic comparatis ut supra, demonstro non tantum eccentricitatem Solis seu Terrae et aphelium simul ut hactenus, et proportionem orbium hoc eccentrici loco, sed etiam ipsum Martis locum eccentricum sub fixis, qui prius praesupponebatur ex restitutione cognitus.

Cap. XXVIII. Eadem fere demonstrationis forma, sed assumpta Solis vel Terrae eccentricitate et aphelio toties jam comprobatis, adjunctis vero compluribus observationibus, puta hic quisque, sic comparatis inter se ut hactenus; ostenditur, semper unum et eundem prodire locum Martis eccentricum, fere ut cap. XXVII. Memineris autem, in omnibus praecedentibus partis III. capitibus praesupponi viam Terrae perfectum circulum, ut est quidem ad sensum. Nam propter parvam eccentricitatem ellipsis ipsi parum demere potest.

Cap. XXIX. Ponitur eccentricus perfecte circularis et eccentricitas cognita ejusque dupla eccentricitas puncti aequatorii. Tunc geometricae ex his positae inquiruntur distantiae, primo apogaea et perigaea, secundo distantiae in anomalia coaequantur 90°, tertio distantiae reliquae. Ibidem demonstratur et compendium, una operatione quatuor distantias inquirendi. Amplius demonstratur punctum circuli, quod semidiametro circuli distat a centro Solis. Denique demonstratur punctum aliud circuli, in quo una pars aequationis fit omnium maxima.

Cap. XXX. Distantiae Solis et Terrae in tabula exponuntur modusque docetur excerpdi, qui etsi ostenditur excedere limites principiorum et circuitum sideris ovalem efficit ideoque provocat juste ad sequentia capita XXXI. XL. XLIV. LV, ubi scrupulus hic tollitur: non tamen sensibilibiter abire docetur ab iis, quae hactenus erant demonstrata.

Cap. XXXI. Metuebat Braheus ne bisecta Solis eccentricitate suas ipsi aequationes Solis turbarem. Hic ergo metus tollitur demonstrato, seu per integram eccentricitatem seu per bisectam seu per duplicationem ejus quod a dimidia eccentricitate extrahitur, semper eandem in Sole prodire aequationem. Alius igitur scrupulus est cap. XXX. alius hic cap. XXXI. Ibi metuebatur distantis, hic metuitur aequationibus Braheanis; ibi causa metus est figura itineris, hic eccentricitatis ratio: illic anticipata fuit consideratio, hic propria hujus loci.

Cap. XXXII. Primum fit inductio, omnes omnino planetas uti aequante circulo seu bisectione eccentricitatis puncti aequatorii.

Super hoc principium geometrica demonstratione extrahitur universale hoc: moras planetarum in aequalibus arcibus eccentrici proportionari cum discessu planetae a puncto, unde consurgit eccentricitas. Arrigite aures physici, hic enim deliberatio suscipitur de impressione in vestram provinciam facienda.

Cap. XXXIII. Jam enim ex conclusione demonstrationis praemissae et adjunctis aliis axiomatibus mere physicis et confessis evincitur, distantias planetae a centro unde computatur eccentricitas esse causas dispensatrices morarum planetae in aequalibus eccentrici arcibus. Secundo docetur, causas has dispensatrices morarum residere in distantiarum termino altero, qui distantis omnibus est communis: scilicet in centro systematis planetarii. Tertio assumitur ad haec sic demonstrata, partim ex Parte Prima, ut probabiliter demonstratum, partim ex Quarta et Quinta Partibus, ut necessario et geometricè demonstratum; partim etiam hoc ipso loco et parte Secunda probabile efficitur, ipsum corpus Solis esse in centro systematis planetarii. Quarto hinc jam consentaneum efficitur, virtutem motricem seu morarum dispensatricem esse in corpore Solis. Accedunt argumenta physica.

Tunc obiter inferitur et hoc, Solem in centro mundi quiescere, Terram circa centrum mundi moveri. Hic animadvertat physicus, speculationes has physicas inniti motui Telluris, sed aliunde deduci et valere tam in Brahei quam in Copernici sententia. Quin potius e contrario his ipsis speculationibus jam motus Telluris et quies Solis inaedificantur.

Quinto demonstratur, virtutem motricem plane ut lucem recipere quantitates, extenuarique in majori ambitu, condensari in minori. Sexto hinc demonstratur, id quod movet planetas de loco in locum, esse speciem immateriatam ejus virtutis, quae in corpore Solis est, similem speciei immateriatæ lucis.

Cap. XXXIV. Pertexitur speculatio physica demonstraturque ex praemissis, speciem illam virtutis, quae vehit planetas, per mundi amplitudinem circumire instar fluminis seu vorticis, celerius quam planetas. Secundo hinc demonstratur, et corpus Solis circa axem suum converti: ubi probabiliter periodicum tempus hujus conversionis inquiritur simulque disputatur, quid Terram quidque Lunam moveat. Tertio corpus Solis probatur esse quasi magneticum. Et ostenditur exemplo Telluris, esse magnetas in coelo.

Cap. XXXV. Objectio solvitur, an motus siderum, si ex Sole est, impediatur interposito corporum, ut lux: unaque multa ex capite superiori illustrantur: quomodo scilicet virtus motrix et lux cognatae sint et altera alterius comes.

Cap. XXXVI. Solvuntur aliae objectiones. Prima quidem geometricè instruitur, argumentans a puncto corporis Solis ad lineam, ab hac ad superficiem ejus planam secundum apparentiam et sic etiam ad sphaericam, ut evincat, lucem spargi alia proportionem densitatis, quam ut aequiparari possit virtuti motrici. Sed respondetur ex principiis opticiis, principium argumentationis non posse esse punctum vel lineam, sed superficiem ipsam. Deinde negatur, considerandas quantitates apparentes disci Solis in effectum physico; quod potuisset pluribus declarari. Nam ne signum quidem esse potest hujus effectus physici, cum alia utatur proportionem, etsi infra fiat signum rei alterius. Et sic asseritur luci modus sparsionis plane commensuratus motuum planetariorum dispensationibus.

Alteri objectio pugnat in contrarium, lucem ineptam ad motus societatem, ut quae etiam ad polos spargatur; solvitur autem ex principiis susceptis, hoc est physicis, plane geometricè, ut ex solutione pateat causa naturalis zodiaci et cur planetae zodiacum nunquam deserant.

Cap. XXXVII. Quaeruntur ex positis principiis physicis occasiones ejus inaequalitatis in Luna, quam Braheus Variationem appellavit, quae Lunam novam et plenam velociorem reddit quam alias. Ubi remouentur duae falsae super hac re opiniones. Deinde inde quaeruntur occasiones, quibus aequatio Lunae in quadraturis major fiat quam in con-

junctione et oppositione cum Sole. Accedunt alia ad explicationem ejus peculiaris virtutis, qua Luna movetur, pertinentia.

Cap. XXXVIII. Praeter communem ex Sole vim motricem, planetas singulos singulis aliis causis motricibus dispensare motus suos, probatur duobus argumentis: uno ducto a motu longitudinis, altero a motu latitudinis.

Cap. XXXIX. Initio praemittuntur axiomata sex physica, necessaria ad inquisitionem virtutis, quae singulis planetis est attributa peculiariter. Regnant autem una toto hoc capite duae hae praeconceptae opiniones: prima, planetae ambitum ordinari in perfecto circulo; secunda, iter hoc ejus dispensari a mente. Disputatur igitur, quomodo mens ista ex itinere planetae circumferentiae possit efficere. Et primo demonstratur id fieri posse, si propria planetae virtus perfecto epicyclo moliatur corpus suum invehere, interimque rapiatur corpus etiam a virtute Solari. Huic modo quinque opponuntur absurda physica. Secundo demonstratur, id fieri posse, si planeta observet certum punctum extra Solem, a quo aequaliter distet in omni suo circuitu circa Solem. Verum et haec certi puncti incorporei observatio refutatur tribus absurdis. Tertio demonstratur, fieri posse perfectum circumferentia, si virtus planetae propria libraret planetam in diametro epicycli versus Solem porrecta, lege vero praescripta tanquam a circumferentiae epicycli decursu. At simul ostenditur, non posse describi justas librationes a planeta, si versetur is in epicycli diametro, sed nec respondere illas arcibus eccentrici confectis nec tempori nec anomaliae coaequatae: posito quidem quod ex composito itinere planetae fieri debeat perfectus circulus. Quarto negatur etiam hoc, vim planetae propriam mente quodammodo concipere imaginarium eccentricum vel epicyclum exque ejus praescripto distantias ad perfecte circulem ambitum requisitas ordinare. Quantisper igitur ambitum planetae putamus esse perfecte circulem, manet in dubio ad quam normam mens planetae propria librationes has sui corporis expendat. Sic ventilata norma librationis hujus, progredior etiam ad medium, quo comprehendere mens planetae possit hanc normam et librationem ab illa praefinitam. Sive enim epicyclus pro norma sit sive ejus diameter sive eccentrici centrum; omnia ista ut inepta comprehensu rejecta sunt indigentque medio commensurato ad comprehendendum apto, per quod comprehendantur a mente. Ubi astruitur, mentem planetae respicere ad crescentem et decrecentem Solis diametrum eaque uti pro argumento distantiae sui corporis a Sole idque verisimilitudine ducta a latitudinibus. Respondetur etiam ad objecta de Solis exilitate et de sensuum in planetis defectu. Neque tamen omnino *ἀναγνίσκον* esse sententiam de gubernatione mentis, in fine movetur. Denique et difficultas aperitur circa corporis planetarii locomotionem a vi insita animali. Et sic multis undique difficultatibus objectis illud unice agitur, ut opinio, quae hactenus erat praeconcepta, de itinere planetae perfecte circulari (partim etiam de gubernatrice librationis hujus mente) in dubium vocaretur rationibus physicis: paulo post penitus convellenda geometricis cap. XLIV.

Cap. XL. 1) Methodus quomodo pars aequationis physica, seu mora planetae in aliquo arcu eccentrici inveniat ex distantis punctorum ejus arcus a Sole. 2) Ibi est geometrica demonstratio, quomodo infinitorum arcus punctorum distantiae a Sole quam proxime insint in area, quae est inter arcum et lineas, quae Solem ad terminos arcus connectunt. Et quomodo unum triangulum inter Solem, centrum eccentrici et finem arcus, exhibeat utramque partem aequationis; angulo ad finem arcus optica; area physicam. 3) Demonstratio, in Sole aequales esse ad sensum partes aequationis, opticae et physicae. 4) Praemittitur demonstratio, triangula aequibasia esse in proportionem altitudinum 5) Per hoc theorema demonstratur, aream trianguli aequatorii crescere cum sinu anomaliae eccentrici: unde compendium existit computandi hanc aream. Simul ostenditur experimento numerorum, non differre sensibili aliquo partes aequationis: id primo in 90° deinde in 45° . 6) Exceptio sequitur minutula demonstrans, aream paulo minus habere, quam omnium graduum eccentrici distantias: et paulo plus quam omnium graduum anomaliae coaequatae distantias. 7) Geometrica demonstratio quadrilateri conchoidis, quod aequiparatur distantis omnium graduum eccentrici a Sole. Ubi provocantur geometricae ad hoc spatium quadrandum. 8) Spatium inter duas conchoides demonstratur non esse ejusdem latitudinis in locis a medio aequedistantibus. De hoc plura cap. XLIII.

P A R S IV.

Cap. XLI. Posito, iter planetae perfectum esse circumferentia, et assumtis trium eccentrici locorum distantis Martis a corpore Solis certissime demonstratis parte tertia, geometrica demonstratione elicitur locus apogaei falsus, eccentricitas falsa et proportio falsa.

Cap. XLII. Nova ratione inquiruntur duorum eccentrici locorum distantiae aphelio videlicet observationibus quinque; perihelio, tribus. Deinde per dimidiationem periodici temporis et zodiaci circuli certissime inquiritur locus aphelii, et deprehenditur idem qui parte secunda et prima. Ex eo corrigitur longitudo media Martis. Comparatione vero utriusque

distantiae elicitur vera eccentricitas et proportio orbium Martis et Terrae. Eccentricitate eccentrici certissime (licet non omnino subtilissime) constituta ex Solis observationibus, simul patescit, dimidiam esse de eccentricitate aequantis alibi inventa. Itaque etiam in Marte valere speculationes praemissas a cap. XXXII.

Cap. XLIII. Ponitur fundamenti loco quod hactenus erat demonstratum cap. XLII: eccentricitates esse inter se in proportionem dupla. Ponitur secundo, orbitam planetae ordinari in circulo perfecto. Ponitur tertio, quod cap. XXXIII. erat demonstratum, moras planetae in aequalibus orbitae arcibus esse in proportionem distantiarum illorum arcuum a Sole. His positis aequationes eliciuntur vitiosae, dissidentes ab experientia. Tunc fit admonitio, ubi non lateat illa falsitas. Huic rei necessaria est mensuratio spatii inter duas conchoides capituli XI, quae cum habeat nonnullam ἀρεχவிას, geometrae provocantur.

Sic igitur constat, falsae conclusionis omnino praemissarum aliquam esse falsam.

Cap. XLIV. Duobus argumentis demonstratur, orbitam planetae non esse circulum sed ovalem figuram.

In primo praesupponuntur demonstrata capituli XLI. XLII. Alias quippe distantias efficit perfectus circulus, cuius diameter erat cap. XLII. inventa, alias et quidem breviores ad latera requirunt observationes cap. XLI. repetitae. Sed ovalis figura admittit tales. Orbita igitur est ovalis.

In secundo argumento praesupponuntur eadem quae cap. XLIII. Moras de quibus experientia testatur, non admittit circularis figura, admittit vero ovalis. Orbita igitur planetae ovalis est.

Cap. XLV. In sequentibus lector ignoscet meae credulitati, dum omnes ex meo ingenio aestimo. Quippe mihi non multo minus admirandae videntur occasiones, quibus homines in cognitionem rerum coelestium deveniunt, quam ipsa natura rerum coelestium. Occasiones igitur has diligenter explico: non dubium quin cum aliquo lectoris taedio. Sed tamen jucundior est victoria, quae parata erat cum periculo, et nitidior ex nubibus Sol exit. Attende igitur lector ad pericula nostrae militiae; contemplare nubes nigredine horrendas; contemplare inquam, nam post has nubes certo Sol veritatis latet et brevi emerget. Explicantur igitur occasiones, quae me invitarunt ut ponerem denuo falsum, planetam vi insita moliri epicyclum perfectum ejusque partes aequales temporibus scribere aequalibus: eundem vero planetam rapi a vi extranea Solis aequalibus temporibus inaequaliter, ut hactenus. Hinc igitur demonstratur, orbitam seu iter ex utraque causa conformatum evadere in figuram ovalem.

Cap. XLVI. 1) Primum haec physica hypothesis, quae epicyclo propria est, permittatur in eccentricum. 2) Tunc docetur una ratio describendi lineam motus planetae ex hac sententia. 3) Recensentur quatuor ἀμυχaviai, quae circa hunc modum occurrunt. Ubi ostenditur, non esse idem medium inter terminorum summas, quod est inter ipsos terminos. 4) Proponitur secundus modus describendi hanc lineam et ostenditur huius quoque modi ἀμυχavia. Uterque modus utilis est interim operationibus per numeros. 5) Proponitur tertius modus describendi orbitam planetae conjunctione duarum hypothesisum. 6) Rejicitur quartus modus, quem quis tradere possit. 7) Demonstratur, lineam sic creatam vere esse ovalem, non ellipticam.

Cap. XLVII. 1) Posito vero, lineam itineris planetae perfecte esse ellipticam, demonstratur, aream ellipsis minorem esse quam aream circuli areola epicycli seu circuli ab eccentricitate eccentrici descripti fere. 2) Inquiritur area illius circuli et sic etiam plani oviformis. 3) Ostenditur, necessariam esse etiam geometricam sectionem illius areae oviformis in data ratione: ubi provocantur geometrae. 4) Meniscus, quo differt ovalis area a circulo, in rectum extenditur geometricè quantum potest. 5) Geometris proponitur contemplandum, an sic extensus duplus sit ad verum meniscum. 6) Cum non sit in promptu ratio dividendi ellipsin vel ovalem per se solitariam, demonstratur, ellipsin beneficio circuli commode dividi posse. 7) Posita igitur ellipsi et circulo divisa, ostenditur modus computandi et distantiam et aequationem. 8) Aequatio computata ad anomaliam 90°: ubi area in numeris quadrati diametralis exprimitur. 9) Modus ex ratione physicae aequationis corrigendi eccentricitatem. 10) Aequatio computata ad octantes anomaliae, ubi area trianguli aequatorii exprimitur numeris secunda scrupula significantibus. 11) His etiam falsis aequationibus deprehensis non minus quam prius cap. XLIII. circumspectantur causae erroris.

Cap. XLVIII. Omnia incommoda capituli XLVI. seu imperfectiones geometriae eliminare sum conatus confugiendo ab areis ad ooidis circumferentiae sectiones numerabiles.

1) Docetur, quomodo hac via ex distantis, quaeveniuntur ad aequales temporis particulas, geometricè inquiratur correspondens portio viae ovalis ex capituli XXXIII. demonstratis et supposita cognitione totius ovalis longitudinis. 2) Ἀρεχვიას, quae pro duabus distantis inter et finis alicujus arcus unicam distantiam puncti medii usurpat, ratio redditur geometrica. 3) Ἀρεχvia alia, quae tamen via geometrica incedit, demonstratur terminorum, in quae de-

sunt portiones ovalis, appropinquatio ad centrum eccentrici et sic angulus ad id centrum, quem subtendit portio ovalis; denique ex hoc is etiam angulus, quem eadem portio ovalis subtendit ad centrum Solis. 4) *Ἀρετὴ* alia inquirendae longitudinis viae ovalis, sed quae geometricas tamen speculationes alias comitatur. Dantur enim duo circuli, eorumque duo media, alterum arithmeticum, alterum geometricum, quorum illo major circulus efficitur, hoc minor. Duobus igitur argumentis ellipsis probatur aequalis medio arithmetico, altero communiori a contractu extremorum, altero geometrico plane, quo demonstratur ellipsis certo superare minus medium, igitur aequare majus medium probabile. 5) Processus unus inquirendi aequationes, qui negligit, quae numero 3. et 4. sunt dicta: perinde ac si ut in summa sic et in partibus se mutuo compensent. 6) Demonstratur geometricè, non esse in partibus aequales amplificationem visivam ex appropinquatione num. 3. et contrariam decurtationem ellipticorum arcuum num. 4. 7) Processus recensetur genuinus hujus capituli demonstratis omnibus consentaneus: et aequationes hinc inventae adhuc erroris arguuntur.

Cap. XLIX. 1) Methodus superior ostenditur principium petere et contra id peccare, quod erat ipsi propositum. 2) Missis igitur non tantum areis capituli XLVI. XLVII, sed etiam ovalibus circumferentiis capituli XLVIII, ad causas reditur, quibus ovalis efficitur. Et quia hactenus epicyclus in eccentricum erat transpositus, ubi confundebatur virtus planetae propria cum virtute ex Sole, resumitur igitur epicyclus cum concentrico et applicantur causae physicae ex cap. XLV. ut fundamentum inquirendi aequationes hac via recte habeat. 3) Methodus ipsa constructarum aequationum recensetur et aequationes ejusdem erroris arguuntur ab experientia, qui supra fuit cap. XLVII. 4) Diluantur igitur suspiciones erroris in calculo, quae supra cap. XLVII. nascebantur, et concluditur, peccare hypothesin ipsam cap. XLV.

Cap. L. Habet conatus sex, per distantias ipsas inquirendi aequationem, id est moram planetae in certo arcu eccentrici, usurpata priusquam scirem in plano inesse summam distantiarum. Etenim moras ex distantis esse desumendas certissimum est ex cap. XXXIII. At cum tres sint anomaliae: una, quae temporis est mensura; secunda, quae arcus eccentrici; tertia, quae anguli, quem subtendit ille arcus ad Solem: omnium trium anomaliarum partibus 360 aequalibus singulis singulas dedi distantias. Hoc itaque nomine triplex est facta consideratio distantiarum. Sic cum ex eodem cap. XXXIII. pateat, iter planetae diurnum in aphelio ad diurnum perihelii, apparens ex centro quasi Solis, esse in proportionem dupla conversam ejus, quae est inter distantias planetae a Sole aphelium et perihelium: quadravi igitur omnes distantias et divisi per mediocrem 100000, ut quod prodit id comparatum ad mediocrem 100000 repraesentaret illam rationem duplam, quae regnat inter diurnos apparentes ex centro Solis. Tribus igitur distantiarum generibus totidem genera tertiarum proportionalium accesserunt; quibus perquisitis speravi nihil a me praetermissum iri, quod ad effectum causarum naturalium (quae per distantias docent inquirere locum planetae eccentricum) pertineret: ut ita sex fierent modi.

In primo et secundo, qui habet distantias anomaliae eccentrici seu secundae, occurrit aliquid geometricum consideratione dignum. Summa enim 360 linearum tertiarum aequavit summam 360 radiorum seu primarum linearum. Id proponitur geometris demonstrandum.

Praeterea modorum horum sex comparatio haec est. Nam duo (quartus et quintus) rem. ducunt in absurdum et duplicant errores aequationum. Quatuor vero reliqui coincidunt cum modis capituli praecedentium, ex quibus duo (secundus et tertius) ponunt iter planetae esse circum, duo vero (primus et sextus) transferunt distantias et ovale iter praestant ex sententia capituli XLV. Et quantum illi excessu tantum hi peccant defectu habentque veritatem in medio.

Cap. LI. Deprehenso, aequationes vitiosas fieri per ovalem capituli XLV, jam etiam exploratur, an eadem et circa distantias peccet.

Igitur hoc capite assumuntur primo observationes, secundo distantiae Solis a Terra, quales sunt certissime demonstratae parte tertia; praeterea nihil ponitur seu inter demonstrationis principia assumitur. Ex his igitur demonstrantur distantiae Martis a Sole in plurimis locis eccentrici per totum ambitum: et quidem in locis ita selectis, ut singula ex singulis semicirculis ascendente et descendente aequaliter removeantur a loco aphelii supra non una via invento. Unde comprobatur aphelium et simul exploratur fides hypotheseos vicariae.

Cap. LII. Ex demonstratis capituli prioris demonstratur porro, partes aequaliter ab invento aphelio remotas, distantes aequaliter a Sole; distare inaequaliter a quocunque alio puncto extra lineam per Solem et aphelium: ergo lineam apsidum Martis per ipsum corpus Solis transire, cum eccentricus Martis ab omnibus aliis lineis absurde scilicet in duo inaequalia dividatur segmenta. Additur praecooccupatio, si quis illum eccentricum super aliud punctum vellet edificare, sic ut ab alia is linea, quam quae per Solem transit, in duo aequalia

secaretur, ipsum refutatum iri ab observationibus. Eodem modo demonstratur, cum Sol sit in eccentrici ovalis diametro longiore, punctum igitur Solis vicarium, super quo Copernicus exstruit eccentricum, esse extra illam longiorem diametrum. At verisimile nequaquam esse, ut eccentrici ovalis alia sit linea apsidum, quam longior ovalis diameter: igitur lineam apsidum non praeter Solem transire: et sic omnium planetarum lineas apsidum in ipso centro Solis concurrere, non in puncto aliquo medii loci Solis.

Cap. LIII. Peculiaris methodus inquirendi distantias Martis a Sole prope oppositionem ejus cum Sole: et simul demonstratio puncti orbis magni, ex quo error in distantia commissus apparet omnium maximus. Ubi praesupponitur differentia locorum eccentricorum duorum et distantiarum utriusque a Sole mediocriter cognita. Qua ratione simul ut prius Cap. LI. exploratur fides hypotheseos vicariae.

Cap. LIV. Collectione eorum quae passim sunt demonstrata, magna cautione constituitur et attemperatur proportio eccentricitatis et orbium.

Cap. LV. Tandem reditur in viam, unde capite XLV. deflexeramus. Inductione enim omnium demonstratur, uti circulus capite XLIV. ad latera nimis erat latus, sic ovalem capitis XLV. esse nimis angustam. Argumenta duo sunt. Alterum a distantia ductum: ubi comparantur observatae et cap. LI. LIII. productae cum distantia ex hypothesi computatis, ex proportionibus orbium capitis LIV. et forma motuum capitum XLV. XLVI. XLIX. Et ostenditur, observatas esse longiores. Alterum argumentum sumitur ab aequationibus. Nam aequationes ex circulo computatae cap. XLIII. peccabant in partem unam; quae vero ovali cap. XLV. computabantur per cap. XLVI. XLVII. XLVIII. XLIX. L. tantundem peccabant in partem alteram.

Cap. LVI. Hinc jam demonstratur, distantias non ex circumferentia epicycli deducendas, sive aequaliter in eo planeta incedat, ut cap. XLV, sive proportionem retineat motus eccentrici, ut cap. XLI, sed sumendas esse ex epicycli diametro. Praemissae eadem sunt quae in priori.

Cap. LVII. Cum rationes physicas capitis XLV. necesse sit aliquid falsi habere admixtum propter effectum falsum: jam patefacto genuino effectui instaurantur illae rationes physicae et continuatur speculatio capitis XXXIX.

1) Primo ostenditur, librationem in diametro epicycli (quae reddit distantias observatis consentaneas) tenere leges naturales corporum. 2) Cum libratio sit translatio de loco in locum, ostenditur, hanc translationem corporis planetae fieri et perfici a Sole, non minus quam parte III. circumlationem: sic tamen ut hujus librationis habentiae sint penes planetam ipsum. Id declaratur duobus exemplis, altero remorum imperfecto, altero perfectiori magnetis. 3) In applicatione magnetici exempli duae statuuntur utrinque et in magnete et in planeta facultates: altera directionis, altera appetentiae. Magnes dirigitur versus polum, ferrum vero appetit. Ita globus planetae dirigitur in fixas, appetit vero Solem. Directionis igitur opus, a qua pendet motus et locus aphelii, initio in dubio relinquo, sitne mentis an naturae. Appetentiae opus, a qua pendet eccentricitas, naturae transcribo et ostendo crassiori Minerva, mensuram librationis observando deprehensae consentaneam esse causae physicae per partes. 4) Postea accuratius ista tractans initio facto a directionis opere, et concessa, quod ei deroget aliquid declinatio ex appetentia Solis orta: sicut magnes in polum directus declinat tamen nonnihil ob ferrum et montes a latere vicinos; demonstro, posse naturali corporea quoque facultate, etiam sine mentis ministerio, salvari locum et tardissimam translationem aphelii in consequentia. 5) Appetentiae vero mensuram demonstro tenere rationem statera: et specialius, sinum rectum anomaliae coaequatae metiri fortitudinem appetentiae quolibet puncto temporis. 6) Circa librationem vero peractam quolibet tempore attende lector quid demonstrem. Ex cap. LVI. patet ejus mensura: nempe sinus versus anomaliae non coaequatae sed eccentrici. Ea mensura observationibus innititur. Hic igitur in id elaborandum mihi fuit, ut ex dicta mensura fortitudinis quolibet loco (erat autem sinus rectus anomaliae coaequatae) demonstrarem etiam hanc mensuram lineae librando confectae, scilicet sinum versus anomaliae eccentrici. Ut hoc obtineretur ostendendum fuit, quadrante diviso in aliquot partes aequales sinum versus alicujus arcus insensibili minorem habere proportionem ad sinum versus totius quadrantis, quam habet summa sinuum in arcu ad summam sinuum in quadrante. 7) Hic, quo minus cohaereret haec praemissa cum illa conclusione, duo obstata videbantur. Primum quod anomalia eccentrici, librationis mensuram exhibens, in superiori semicirculo major erat pluresque sinus exhibebat anomalia coaequata, fortitudinis exhibente mensuram. Responsum autem est, id recte fieri, eo quod in illa coaequata planeta etiam plus temporis consumat, quare et plus virium effundat. 8) Alterum obstaculum; sinus coaequatae breviores esse sinibus eccentrici in superiore sc. semicirculo. Ostensum igitur est, ipsum etiam sinum versus nonnihil deficere a summa sinuum arcus sui et sic aequipollere summae breviorum sinuum. 9) Quae obijci possunt exemplo magnetis partim diluantur,

partim occasionem praebent, natura in dubium adducta, ad mentem transeundi, ut appareat, an et quo pacto mens eccentricitatem librando queat efficere. 10) Itaque positae quae sunt cap. LVI. certissime demonstrata, versum sinum anomaliae eccentrici metiri librationem, demonstratur jam sinum versum anomaliae coaequatae metiri incrementum apparentis diametri Solis, hoc est non tantum incipere augeri apparentem Solis diametrum, cum incipit sinus versus anomaliae coaequatae, et maximam fieri cum hic est maximus, sed etiam mediam existere inter extremas, cum sinus versus anomaliae coaequatae est semidiameter, anomaliae eccentrici sinu verso tunc majore existente. 11) Contra hoc sinu verso anomaliae eccentrici existente semidiametro, demonstratur, diametrum apparentem Solis adhuc minorem esse, quoniam est media inter extremas. 12) Ut ostendatur, mensuram hanc esse convenientem et comprehensibilem mensuram menti planetae, primum instituitur collatio inter anomaliam eccentrici et anomaliam coaequatam, et negatur angulum anomaliae eccentrici, si pro mensura oblatus fuisset, a mente planetae comprehendi potuisse. 13) At anomaliae coaequatae angulum, cujus sinus versus proportionatur augmento diametri Solis, comprehendi a mente planetae, probabile efficitur. 14) Cum autem non hic angulus, sed ejus sinus versus metiatur incrementum diametri Solis, rationibus et suppositis physicis exemplisque rerum naturalium ostenditur, probabile esse, mentem planetae comprehendere posse sinum (id est physice fortitudinem) anguli hujus. 15) Instituitur comparatio duorum modorum hactenus traditorum, quibus motus planetariorum corporum proprii, hoc est librationes perficiantur: quorum alteri natura, reliquo mens erat praeposita: et concluditur denique pro natura, repudiata mente. 16) Inter argumenta hujus rei praecipuum est incertitudo geometrica, admissa in hac forma motus per ministerium mentis: quae explicatur. 17) Ostenditur, ex ea incertitudine existere posse occasionem progressus apheliorum. Sed quia supra (cap. XXXV.) alia causa progressus apheliorum insinuata fuit, ideo hic fit comparatio utriusque et ostenditur, solum interpositum, si efficacia ipsi relinquatur aliqua, progressum apheliorum non causari, neque si natura neque si mens moveat. 18) Itaque limitantur positiones physicae, ne aliud aliquid noceat interpositio. 19) Ut autem hinc esse possit progressus aphelii, ostenditur, associandum esse interpositui illud peculiare mentis opus, quod num. 17. ut absurdum rejiciebatur. Quo ut liberemur, concluditur pro ea sententia, quae num. 4. naturae transscripsit motum aphelii.

Cap. LVIII. 1) Inventa vera ratione librationis planetae ostenditur, quomodo ea stante possit effici orbita planetae (composita ex utroque motu, circumlationis scilicet et librationis) etiam forma buccosa; et quomodo per verisimilem errorem in hanc buccosam inciderim. 2) Illa orbita erroris arguitur per aequationes, veris distantis existentibus; contra quam hactenus, quando semper in distantis et in aequationibus simul errabatur. 3) Ostendo, quomodo quasi aliud agens et revocata ellipsi errorem ignarus correxerim. 4) Buccosam effici orbitam ex hypothesi erronea mihi usitata, demonstratur. 5) At quia orbita elliptica aequationes justas exhibebat, igitur librationem in orbitam buccosam deformatam in dubium venisse ostenditur.

Cap. LIX. 1) Ellipseos geometria propositionibus 10, quibus 2) demonstratur, propositione 11. non minus quam in buccosa, cap. LVIII. introducta et falsitatis convicta, etiam in ellipsi perfecta inesse distantias librationibus constitutas et observationibus innixas. Itaque cum ellipsis et distantias praestet et aequationes, orbitam igitur planetae esse ellipticam. 3) Indidem demonstratur prop. XII. aream ellipsis esse perfectissimam mensuram distantiarum ellipsis arcuum inaequalium circuli aequalibus respondentium. 4) Solutione objectionis de arcubus ellipseos inaequalibus ostenditur prop. XIII. ellipsin hanc principiis physicis partis tertiae examussim concordare. 5) Arcus ellipseos terminandos per ordinatim applicatas graduum circuli demonstratur prop. XIV. de initio et de fine quadrantis duabus perfectis demonstrationibus; de progressu vero intermedio imperfectius, per *ἐνδεΐξις* tamen satis luculentam: ubi provocantur geometrae. 6) Hisce conclusis, praesertim iis, quae num. 3. dicta sunt, et adhibitis, quae sunt num. 1, demonstratur eo amplius prop. XV. aream ipsius etiam circuli esse perfectissimam mensuram distantiarum, quae arcubus ellipseos inaequalibus (per ordinatim applicatas aequalium arcuum circuli constitutis) assignantur, attestante et operatione numerorum: quo utroque modo et observationibus satisfi.

Cap. LX. 1) Ex demonstratis cap. LIX. methodus constituitur aequationum. 2) Demonstratio praecepti, quomodo ex data anomalia eccentrici eliciatur anomalia media et anomalia coaequata. 3) Data coaequata et eccentricitate quomodo eliciatur anomalia eccentrici, modus unus, qui innititur speculationi pulcherrimae et plane geometricae super lineolis ingressus planetae a circumferentia circuli ad lineam apsidum, habetque quinque problemata et perficitur per rectangula quadrantis. 4) Alia methodus hujus problematis per regulas analyticas. 5) Data anomalia media seu tempore inveniendi anomaliam eccentrici et anomaliam coaequatam methodus *ἀνέκχως* quasi per falsi regulam: et causa cur methodus geometrica tradi non possit.

P A R S V.

Cap. LXI. Hypothesi longitudinis inventa, jam accuratius inquiritur ex observationibus locus uterque nodorum.

Cap. LXII. 1) Distantiis inventis accuratius jam inquiritur inclinatio planorum ex observatione acronychia; idque in utroque semicirculo. 2) Demonstratur proportio visae latitudinis ad inclinationem cujusque loci conversa distantiarum Solis et Telluris a planeta. 3) Tabella visarum latitudinum in opposito Solis, cum computatis ex nostra hypothesi comparatarum.

Cap. LXIII. 1) Traditur physica causa excursus in latitudinem. 2) Demonstratur geometricae ex hoc excursu circumiri planum. 3) Disputatur, naturae corporeae an mentis opus sit, et pro natura potius concluditur. 4) Disputatur, idem an alius ab axe, qui eccentricitatem causatur, sit axis latitudinum: et ostenditur, cujus formae corpus esse necesse sit, si sola ejus natura omnia facit. 5) Positis orbibus solidis traditur hypothesis latitudinis plana et expedita.

Cap. LXIV. Latitudinum doctrina tradita accuratius examinatur parallaxis diurna, et duobus argumentis, altero per locum nodorum, altero per inclinationem planorum, pene insensibilis esse convincitur.

Cap. LXV. 1) Quantitas maximarum latitudinum, tam in oppositionibus quam in conjunctionibus determinatur, concessio motuum omnium per omnes *ἑξαιρέτως*, iustoque saeculorum spatio. 2) Eadem quantitas ad nostrum saeculum determinatur.

Cap. LXVI. 1) Quantitas maximarum latitudinum extra syzygias investigatur et loca determinantur. 2) Traditur causa paradoxi circa latitudinem in opposito Solis. 3) Accurata methodus computandi latitudinem extra situm acronychium.

Cap. LXVII. Demonstratur idem quod cap. LXX, eccentricitates consurgere ex ipso centro Solis, non ex puncto Solis vicario: idque duobus argumentis, priori a locis nodorum, altero ab inclinatione planorum.

Cap. LXVIII. 1) Theoria mutatae fixarum latitudinis, proposita per causas physicas et eclipticam mediam seu potius circulum regium (ut viam regiam dicimus) introductum. 2) Ostenditur, boreum limitem eclipticae esse in Arietis gradu $5\frac{1}{2}$, itaque probabile efficitur, mediam illam seu constantem viam transire per loca apsidum planetarum. 3) Adstruitur media ecliptica seu potius circulus regius ex mutatione obliquitatis eclipticae vulgaris seu verae: ubi in margine est theoria praecessionis aequinoctiorum, per axis et polorum Terrae translationem annuam cylindricam et inclinationem tardissimam, quae eorum declinet. 4) Hinc evincitur, inclinationem planorum Martis et eclipticae non permanere omnibus saeculis eandem. 5) Ex collatione observationum Ptolemaicarum cum nostris obscurius idem colligitur.

Cap. LXIX. 1) Quid veteres observaverint circa Martem scriptumque reliquerint. 2) De inaequalitate praecessionis aequinoctiorum, pro et contra. 3) De inutili sphaerarum numero secundum recentiores. 4) An Solis eccentricitas olim major fuerit? sive de longitudine aestatis hiemisque seculo Ptolemaei. 5) Apogaeum Solis ad tempora Hipparchi incertum esse; et usitatus illi modus investigandi. 6) Loca fixarum ad tempora Ptolemaei esse incerta nonnihil, et modus investigandi. 7) Quid ex errore in locis fixarum redundet in theoriam Martis. 8) Ex tribus Ptolemaei acronychiis observationibus ad modernas aequationes accommodatis extruitur correctio motuum ad tempora Ptolemaei, idque vicibus octo, prout aliud atque aliud ex praecognitis Ptolemaei haecenus ventilatis fuerit immutatum. 9) Ut igitur cum hac incertitudine transigeretur, ostenditur, quod neglectu refractionis et vitio eccentricitatis Solis se mutuo tollentibus maneant ea loca fixa, quae Ptolemaeus ipsis assignavit in zodiaco. 10) Hoc fundamento constituitur epocha motus medii Martis ad tempora Ptolemaei et Christi. 11) Additur et epocha motus medii Solis a fixis temporibus Ptolemaei et Christi.

Cap. LXX. Examinatur ad tempora antiqua proportio orbium Martis et Solis, latitudo Martis et eccentricitas Solis, per duas antiquas et infidas observationes.

DE COMPARATIONE HYPOTHESIUM.

*) *Motus primus est totius coeli et omnium in eo stellarum ab ortu per meridiem in occasum et ab occasu per imum coeli in ortum, tempore 24 horarum; in schemate praesenti ABCD. Motus secundi sunt singulorum planetarum ab occasu versus ortum, ab A in E, ab F in G, temporibus longioribus. Circulus maximus sphaerae est, qui aequaliter distat ab utroque suorum polorum. Minores, qui sunt alteri polorum propiores; ut HLK polo Q propior est quam polo R.*

F] primae ad occasum veniunt [ut H per LK rursum in I]: tardio-
 rem Solem [in ABE], ut qui postridie in E existens, fixas I ad occasum inee-
 quatur, quibus pridie junctus erat per HA: hoc iterum tardio-
 rem omnium-
 que siderum tardissimam Lunam; quia cum hodie cum Sole [in A, ipsa in
 F] occubuisset, postridie [coelo toto et una ipsa per FMNOG circa Terram
 voluta] Solem occumbentem [in E] satis magno intervallo [EG] sequatur.
 Hinc Pythagoraei, cum inter sidera musicos sonos distribuissent, gravissimum
 Lunae tribuere, et inter lyrae chordas hypaten, propterea quod utriusque
 motus tardissimus esset. Hinc ortae voces *προηγουμενος*, *υπολειπτικός*, qua-
 rum illa primitus ei stellae quadrabat, quae postridie prior ad occasum
 veniebat (ut E Sol respectu G Lunae dicebatur *προηγουμενος*): haec vero
 stellae tardiori in primo motu [ut hic Lunae], quasi destitueretur et dere-
 linqueretur [in G] a celerioribus [E, I], de quibus vide plura cap. X.
 nostrae Optices.

Hanc primam astronomiae adumbrationem, quae nulla causae expli-
 catione, sola vero et tardissima oculorum experientia constat, et quae nec
 schematibus nec numeris explicari inque futura tempora depromi potest,
 cum perpetuo a se ipsa dissideat, adeo ut nulla spira alteri temporis mora
 aequetur, nulla ejusdem quantitatis flexu in vicinam transeat, hanc inquam
 aliqui tamen hodie, conculcato bis mille annorum labore, diligentia,
 eruditione, scientia, restituere conantur, vulgo admirationem sui, non irritum
 apud imperitos conatu, ingerentes; quos peritiores vel ineptire vel si
 philosophi audire volunt, ut Patricius ille, cum ratione insanire jure merito
 censent.

Successit enim astronomis ut intelligerent, duos confundi motus sim-
 plices, primum et secundos, communem et proprios, ex qua confusione
 necessario sequatur illa conglomeratorum motuum connexa series: itaque
 separato communi illo et extrinsecus advenienti raptu diurno, jam porro
 non fixas velocissimas, Lunam tardissimam, sed contraria ratione, hanc
 velocem se ipsa et motu proprio FG, illas plane vel tardissimas vel im-
 motas esse: cumque planeta quispiam, ut G Luna, a Sole E vel a fixis I
 est *υπολειπτικός*, eum in consequentia*) ferri per FG celerius, quam Solem
 per AE vel fixas per HI; at si *προηγουμενος* appareat inter fixas, motu
 retrogrado incedere: ut si Sol A cum fixa H ex iisdem pridie carceribus
 AH emissus, per BCDE pervenisset usque in P, fixa vero per HLK usque
 in I, Sol unius diei spatio per intervallum AP retrocessisset.

Magnus hic in astronomia profectus fuit ad discendam motuum sim-
 plicitatem. Pro infinitis enim spiris, semper nova ex fine prioris E vel G
 nexa, relinquebantur singuli pene circuli FG et AE et unus communis motus,
 seu omnium planetarum totiusque adeo mundi in plagam motibus propriis
 contrariam, seu secundum Aristarchum stante mundo, globi Telluris T circa
 axem QR in plagam eandem cum propriis motibus.

Separato jam primo et diurno motu et perpensis tantum iis motibus,
 qui collatione dierum aliquotprehenduntur et singulis planetis seorsim
 insunt, jam in his ipsis multo major apparuit confusio quam prius, cum
 adhuc motus diurnus et communis ipsis esset implicitus. Etsi enim haec


*) In consequentia est secundum signorum seriem ab Ariete in Taurum &c.
 quae series tendit ab occasu per meridiem in orientalem plagam et inde versus
 imum coeli rursum ad occidentem: ab F in G, ab A in E.

residua confusio etiam prius erat, minus tamen observabatur, minus oculos incurrebat, propterea quod motus diurnus valde celer esset, atque sic haec jam residua confusio, tunc in minutas partes dissecta, per plurimos dies plurimasque spiras diurnas spargebatur. Jam vero sublata illa minuta sectione et distributione propriorum stellae motuum in dies tam multos, sublato nempe motu diurno, toti motus stellarum proprii, quanti fuerunt, totaque plurium confusio manifestius enituit. Primum enim apparuit, tres superiores Saturnum, Jovem et Martem motus suos ad Solis propinquitatem attemperare; nam si Sol ad ipsos accedebat, directi incedebant et solito velociores; ubi Sol ad signa planetis opposita veniebat, ipsi viam jam emensam cancrino gressu relegebant; intermediis temporibus stationarii fiebant, atque hoc perpetuo, in quibuscunque zodiaci signis planetae deprehenderentur. Simul autem ad oculum patuit, planetas grandes videri cum retrocedebant, minutos quando directi et veloces Solis adventum expectabant. Ex quo facile patescebat, ipsos Sole propinquante in altum attolli et a Terris recedere, eodem in contraria signa discedente, rursum ad Terras descendere. Denique observatum est, haec jam dicta spectacula retrocessuum luminisque ampliati per signa zodiaci transponi ordine, qui ab occidentis plaga per meridianam in orientalem tenderet; ut quod jam in Piscibus contigerat, mox similiter fieret in Ariete, post in Tauro et sic consequenter.

Haec omnia si quis fasciculo uno componat simulque credat, Solem re vera moveri annuo spatio per zodiacum, quod credidere Ptolemaeus et Tycho Braheus, tunc necesse est concedere, trium superiorum planetarum circuitus per spatium aethereum, sicuti sunt compositi ex pluribus motibus, esse re vera spirales; non ut prius filii glomerati modo, spiris juxta invicem ordinatis, sed verius in figura panis quadragesimalis in hunc fere modum.

Haec est accurata delineatio motuum stellae Martis, quos per aetheream ille decurrit ab anno 1580 usque ad annum 1596, si verum est, Terram stare, quod Ptolemaeus et Braheus volunt. Eos motus ulterius continuare perplexum erat futurum: nam connexio infinita est, nunquam in se ipsam recurrens. Et nota, quod cum tanta requiratur vastitas orbis Martii, in angustissimo postea circello circa A Terram ejusque spatiolo B includi sphaeras Solis, Veneris, Mercurii, Lunae, ignis, aeris, aquae, terrae; atque de hoc ipso spatiolo uni Veneri cedere portiunculam potissimam, nimirum multo majorem in proportionem, quam Marti hic cessit de toto hujus schematis spatio. Similes autem spiras cogimur etiam quatuor reliquis adscribere, et Veneri quidem multo perplexiores, si Terra stat. Spirarum istarum causas, ordinem, constantiam et regularitatem explicat Ptolemaeus et Braheus: ille, epicyclis singulis in eccentricis planetarum singulorum circumductis, qui motum Solis imitarentur:

Fig. 47.



hic, eccentricis omnibus in orbe uno Solis circumductis. Spiras tamen ipsas in coelo re ipsa uterque relinquit. Copernicus uno motu annuo Telluri attributo planetas omnes spiris hisce perplexissimis omnino spoliat, planetas singulos in singulas nudissimas orbitas quam proxime circulares inducens, quam unam et eandem orbitam Mars jam dicto temporis spatio toties percurrit, quot hic vides corollas intortas versus centrum, una plus, puta novies, dum interim Tellus suum circulum recurrit sedecies.

Rursum autem animadversum est, hos uniuscujusque planetae spirarum articulos in diversis zodiaci signis esse inaequales; ut alicubi planeta per longiorem arcum zodiaci retrocederet, alicubi per brevior, jam longiore, jam brevior temporis spatio: nec idem perpetuo retrogradi planetae luminis incrementum: quodsi tempora et loca inter medios retrocessum articulos computarentur, neque tempora temporibus neque arcus arcibus erant aequales, neque quaeque tempora suis arcibus eadem proportionem respondebant: erat tamen unicuique planetae certum signum zodiaci, a quo signo usque ad oppositum per utrumque semicirculum omnia ista successiveangebantur.

Ex quibus observationibus intellectum est, duas inaequalitates apud unumquemque planetam in unum confundi, quarum prior cum reditu planetae ad idem zodiaci signum, altera cum reditu Solis ad planetam restitueretur. Harum itaque inaequalitatum causae et mensurae investigari aliter non poterant, nisi separarentur confusae inaequalitates singulaeque seorsim inspicerentur. Censuerunt igitur, ab inaequalitate prima incipiendum, quod esset constantior et expeditior; ut cuius exemplum in Solis motu videbant, qui alteri inaequalitati non erat obnoxius.*) Ut igitur ab hac prima inaequalitate secundam separarent, aliter non potuere, quam si considerarent planetas iis noctibus, quarum in principiis oriuntur occidente Sole; quos ~~anaproxius~~ appellabant. Nam quia praesentia et conjunctio Solis ipsos praeter morem accelerat, oppositio Solis etiam in contrarium ducit; certe ante et post hos articulos multum e suis locis, quos erant repraesentaturi per primam inaequalitatem, emoveantur. In articulis ergo ipsis conjunctionis et oppositionis cum Sole illa ipsa sua loca transeunt. In conjunctione vero Solis cum cerni nequeant, relinquitur sola oppositio cum Sole idonea huic rei.

Cum autem alius sit medius motus Solis, alius apparens,**) eo quod Sol etiam sit obnoxius inaequalitati primae, igitur quaeritur, quisnam horum exuat planetas inaequalitate secunda, et utrum planetae sint inspiciendi in oppositione cum apparenti an cum medio loco Solis. Ptolemaeus medium motum elegit; quod discrimen, si quod sit inter usurpationem medii vel apparentis motus Solis, observationibus censeret deprehendi non posse, fieret vero forma calculi et demonstrationum expedita usurpato motu Solis medio. Ptolemaeus Copernicus et Tycho in suis transsumptionibus sunt secuti. Ego, ut habes in Mysterio meo Cosmographico cap. XV, (Vol. I, p. 153.) apparentem locum et ipsum Solis corpus pro meta statuo: idque demonstrationibus, operis parte quarta et quinta sequentibus, evincam.

Prius tamen hac parte prima demonstrabo, quod is, qui pro medio

*) Sol habet unam solam inaequalitatem respectu temporis, intra quod illa absolvitur. Nam quod causas inaequalitatis hujus attinet, illae duae concurrunt tam in Sole quam in reliquis planetis, ut infra dicitur.

**) Apparens Solis locus est is, quem Sol per inaequalitatem suam occupare cernitur. Medius est is, quem occuparet, si inaequalitate sua careret.

apparentem Solis motum adhibet, omnino aliam planetae orbitam in aethere statuatur, quamcunque ex celebrioribus opinionibus de mundo sequatur. Quae demonstratio cum aequipollentiae hypothesium innitatur, ab hac incipiemus.

Caput II.

De prima et simplici aequipollentia eccentrici et concentrepticli, et earum causis physicis.

Ac initio hic amplector illam a Ptolemaeo lib. III. et Copernico lib. III. cap. XV. demonstratam aequipollentiam hypothesium, quae pro prima inaequalitate salvanda sunt susceptae; ubi eccentricus paria facit cum epicyclo in concentrico: siquidem linea apsidum in eccentro et linea per centrum epicycli et planetam in concentrico perpetuo maneant paralleli; et hic semidiameter epicycli aequet illic eccentricitatem; semidiametri vero illic eccentrici et hic concentrici sint aequales; moveaturque illic planeta in eccentro aequabiliter, sic ut aequalibus temporibus aequales arcus conficiat.

Fig. 48.





Fig. 49.



Sit primo A locus oculi et centrum concentrici BB, in quo epicyclos BC, BE: sintque arcus inter bina B, seu anguli BAB, aequales: et planeta primo in C, deinde in E, G: lineaeque BE, BG parallelae ipsi BC. Sit deinde β centrum eccentrici $\gamma\zeta$; et $\beta\gamma$, $\beta\zeta$ aequent AB: sitque a punctum, in quo oculus, et $\beta\alpha$ (eccentricitas) aequalis ipsis BC, BE semidiametris eisque parallelas: et arcus $\gamma\beta$, $\gamma\zeta$, hoc est anguli $\gamma\beta\alpha$, $\gamma\beta\zeta$ aequales et inter se et prioribus BAB. Dico, distantias AC, $\alpha\gamma$ aequales esse: sic AE, $\alpha\epsilon$; AG, $\alpha\gamma$; AD, $\alpha\delta$; AH, $\alpha\theta$; AF, $\alpha\zeta$; itemque angulos EAC, $\epsilon\alpha\gamma$ aequales: et planetam, quamvis aequalis motus, utrinque tamen visum iri tardum ex A, α , cum est in C, γ ; velocem, cum est in D, δ . Hoc, inquam, Ptolemaeus demonstravit lib. III. Nec verbis opus est. Schema loquitur geometrae. Ceteri Ptolemaeum adeant.

Quod physicam horum schematum explicationem attinet, plus alterum ab altero differt. Quod ut manifestum fiat, paulo altius est repetendum,

et aliter quidem explicandum ex Purbachio secundum Aristotelis principia, aliter etiam ex Tychone.

Ptolemaeus nudos nobis hosce circulos descripsit, quales geometria observatis applicata indicat. Purbachius modum constituit, quo decurrerentur, secutus Aristotelem, qui hoc idem in Eudoxi et Calippi geometricas suppositiones, quibus astronomiam tradiderant, attentavit.⁷²⁾ Cum enim auctores illi orbes 25 adhiberent ad demonstrandam omnem planetarum inaequalitatem, Aristoteles, solidis orbibus coelum refertum credens, alios 24 revolventes censuit interponendos; ut scilicet inferior quisque orbis eo raptu, quem propter contiguitatem superficierum erat a superiore passurus, liberaretur. Igitur, cum in universum orbes 49 (sive secundum Calippum 53 aut 55) accumulasset, singulis singulos motores addidit; quorum quilibet orbi suo et omnibus inferioribus, quos ille esset complexus, motum aequabilissimum in orbe superiore orbem suum proxime ambeunte, tanquam in loco quodam, praestaret, et a quo et plagae, in quam motus ferri debebat, et celeritatis, qua esset orbis ad suum principium restituendus, constans ratio procederet. Ac cum placuisset illi philosopho, motum aeternum esse, motores quoque aeternos statuit: qui cum infinito tempore moveant, infinitatis vero nullum materiatum capax esse sciret, immateriatos quoque et principia separata, quare immobilia esse voluit. Ac cum ex motus aeternitate mundum exstruxisset aeternum, essetque haec duratio essentiae, totius mundi bonitas et perfectio, opposita interitui, qui malus esset; principiis illis perfectionem summam tribuit, ejusque intellectionem et ex intellectu bono voluntatem id prosequendi, ne bonum non bene faceret; quo pacto mentes separatas, denique deos nobis introduxit, motus coelorum perennis ministros. Addiderunt et animam motricem, orbibus arctius alligatam eosque informantem, ut mens tantum adstaret: vel quod movens et mobile convenire in aliquo necesse videretur, vel quod potentia ratione spatii trajiciendi non infinita esset, uti neque motus ullus infinitus est, sed dimenso tempore per dimensum spatium. Hanc itaque potentiam movendi transscripserunt animae, eoque nomine tantisper materiata esse passi sunt, ut in coelorum orbibus inhaereret.

Atque haec mentis et animae copulatio sane perquam consentanea est particularibus astronomorum animadversionibus: quamvis philosophorum argumentatio potius metaphysica sit. Nam ut in homine alia est facultas movens, alia movente facultate utens, voluntas, secundum indicia sensuum, qui et instrumentis a facultate movente differunt et fabricae praestantia, quae in sensuum organis est admirabilior quam in facultatis motricis vehiculis: ita, si hos ipsos orbes Aristotelicos ad contemplandum proponamus, duo nobis occurrent: vis motrix orbi rotundo sufficiens, ex cujus vigore et constanti fortitudine tempus revolutorium oritur, et plaga, in quam eundem: quarum illa animali facultati rectius transscribitur, haec vero naturae intelligenti aut memori. Nam etsi quidem per hanc soliditatem orbium omnibus omnino motibus seu apparentiis coelestibus ita prospectum est, ut providentiae praesidium motoriorum relinquatur nihil, omnis vero varietas motuum ex dispositione et pluralitate orbium proficiscatur, nec quicquam aliud requiratur, quam ut animae motrices accipiant et retineant suum vigorem, et a primo creationis initio in plagam quaelibet suam incitentur et quasi e carceribus in spatia dimittantur: tamen considerandum est, hoc ipsum mentis illius supremae opus esse, planetam quemlibet in plagam suam,

quasi in certam et peculiarem provinciam, immittere: quod munus Aristoteles, qui de initio mundi nihil scivit aut credidit, ipsis motuum auctoribus necessario transscripsit. Et sectatores Aristotelis, quin et Scaliger professione Christianus, aperte disputant, hunc motum orbium esse voluntarium et principium voluntatis illis esse intellectionem et desiderium.²¹⁾

Ut igitur ad Purbachium redeamus, cum eo alii quidam, praecipue libellorum sphaericorum scriptores, primum schema sic explicant, ut imaginentur sibi unum orbem solidum concentricum crassitudine epicycli totius, et in eo epicyclum, in epicyclo planetam. His igitur duobus orbibus tribuerunt duas animas motrices (si considerationem physicam pertexant) eadem utramque proportionem virtutis, ut eodem tempore periodos suas in plagas tamen contrarias absolvant.

Alterum schema requirit duos deferentes (adhuc quidem immobiles, dum in hac motuum simplicitate manemus, mente removentes progressum apogaeorum), et unum orbem, crassitudine corporis planetarii, in eoque orbe animam, quae aequabili contentione illum circumagat in plagam eam, in quam a principio impulsa est. Concessa igitur hac soliditate orbium et reliquis assumtis, manebunt in primo schemate BC, BE, paralleli; in altero orbis γ circa β centrum ibit: etsi motores nec illic ad AC, nec hic ad β respiciant; diriguntur enim materiali necessitate seu dispositione et contiguitate orbium.

At quia Tycho Brahe certissimis argumentis soliditatem orbium destruxit, quae hactenus animabus illis motricibus (caecis etiam) pro baculo servire poterat ad vim debitam inveniendam; et proinde planetae in puro aethere perinde atque aves in aëre cursus suos conficiunt; aliter nobis igitur de his schematibus erit philosophandum.

Sit autem inter initia positum, vim omnem, qua motus huiusmodi administrantur, ipsius planetae corpus inhabitare nec extra id quaerendam.

Cum igitur planeta insita vi in puro aethere perfectum circulum conficere debeat, in primo schemate epicyclum, in secundo eccentricum, manifestum est, duo motoris huius fore munia; alterum, ut facultate polleat transvectandi corporis, alterum, ut scientia praeditus sit inveniendi circularem limitem per illam puram auram aetheream nullis huiusmodi regionibus distinctam: quod mentis opus est. Nihil mihi dicas, ipsam motricem facultatem, simplicis et brutae animae sobolem, aptam natam esse ad circularem motionem, plane uti lapidis natura sit per rectam lineam descendere; nego enim, ullum motum perennem non rectum a Deo conditum esse praesidio mentali destitutum. Et intra quidem corpus humanum omnes musculi principiis moventur rectilineorum motuum: nempe aut in sese recedendo turgent, aut discessu capitum extenuantur; illic, ut membrum ad musculum accedat, hic, ut recedat: quod idem et in circularibus musculis suo modo locum habet, qui meatibus custodes appositi, ubi filamentis circularibus extensi fuerint, laxant meatum, constringunt vero iisdem in angustioris circuli figuram recurrentibus. Nullum adeo membrum est, quod aequabiliter et expedite gyretur. Flexus vero capitis, pedum, brachiorum et linguae quibusdam artificibus mechanicis per multos rectos musculos huc illuc transpositos vel attensos expressi sunt. Qua ratione efficitur, ut facultas motrix, natura sua in rectum tendens, membrum illud contorqueat in gyrum. Sic aquae machinamentis quibusdam in sublime aguntur, non quod natura corporis, quod motum infert, in sublime tendat, sed quia dispositio canalium ef-

ficitur, ut pondere majore deorsum tendente aqua necessario sursum cedat. Quodsi etiam perfecte circularis motus esset quorundam membrorum, at ii non sunt perpetui, nec mirum de eo esset, cum mens animali facultati praesideat in humano corpore; at certe, si via ulla fuisset facultatem aliquam motricem sic instruendi, ut corpus aliquod gyrare possit, non fuisset in humano corpore neglecta.

Porro ut mens aliqua viam monstret circularem citra metam vel centri vel corporis alicujus, quod pro accessu vel recessu majore vel minore angulo appareat, id fieri nequaquam potest. Circulus enim iisdem et definitur et perficitur, aequalitate scilicet distantiae a medio et quantumcunque motrices hasce facultates extollas, circulus tamen ne Deo quidem aliud est quam quod jam dictum. Docent quidem geometrae, datis tribus in circumferentia punctis continuare circulum: sed hoc ipso praesupponitur aliqua pars circumferentiae (utpote per trina puncta iens) jam confecta. Quis ergo planetae hoc initium ostendet, ex quo reliquum iter conformet? Itaque fieri aliter non potest, quin planetae motor ex Avicennae ²⁴) sententia vel centrum orbis sui suamque ab eo distantiam sibi imaginetur, vel alia quadam proprietate circuli praestanda ad efformationem ipsius circuli adjuvetur.

Jam igitur aliter nobis informabitur hypothesis physica horum duorum schematum. Nam in posteriori, quod simplicius est, siquidem verum est quod posuimus, motorem, qui planetam per iter $\gamma\delta$ circumagit, in ipso planeta inesse, necesse itaque fuerit, in planetae motorem cadere quandam animadversionem apparentis magnitudinis ipsius corporis in α , ex γ , ϵ , η , δ , inspecti (vel quasi inspecti) proptereaue planetam niti, ut et aequaliter incedat (quod praestant integrae et non impeditae motricis animae vires) et omnes distantias $\alpha\gamma$, $\alpha\epsilon$, $\alpha\eta$, $\alpha\delta$ ita ordine repraesentet, ut illae ex eccentrico $\beta\gamma$ sequuntur lege geometrica; quem ad finem scire etiam debet, quanto $\alpha\gamma$ longior sit quam $\alpha\delta$, hoc est quanta sit eccentricitas viae, quam confecturus est, a corpore in α circa quod iturus est. Quo pacto hic motor planetae in multis simul occupabitur. Si hoc quis fugit, igitur necesse est ut dicat, planetam ad β punctum, quod omni corpore aut nota reali vacat, respicere et aequales ab eo distantias tueri.

Prius vero schema physice sic explicatur, ut concipiatur virtus aliqua

Fig. 48.





Fig. 49.



motrix, quae se ipsa sine corpore in B concentrico aequali virium contentione circumeat circa corpus in A, aequalesque ab eo tueatur distantias; altera virtus sit in ipso C corpore planetae, quae virtutem incorpoream in B animadvertere suamque ad eam propinquitatem aestimare et tueri, denique et eam circumire aequabiliter possit. Rursum itaque haec virtus in pluribus occupabitur. Sed et per se incredibile, virtutem aliquam immateriatam residere in non corpore, moveri in loco et tempore, nec tamen habere subiectum, se ipsam inquam movere de loco in locum. Atque ego horum absurdorum assumptione hoc ago, ut tandem obtineam, non posse fieri ut omnis motuum causa vel in corpore planetae vel alias in orbe ejus inhabitet, viamque struam ad formas motuum alias faciliores persuadendas.

Haec explicavi *ὑποθετικῶς*, si nempe astronomia de schematibus his testetur, quod iter planetae sit talis perfectus circulus eccentricus; quae si quid aliud invenerit, speculationes quoque physicae mutabuntur.

In hac igitur hypothesium aequipollentia non tantum apparentes anguli ad A, α , sed ipsa etiam verissima planetarum itinera per auram aetheream manent eadem utrinque. Qualem enim et quantum arcum planeta conficit ex C in E circa angulum CAE, talem et tantum conficit etiam ex γ in ϵ circa aequalem $\gamma\alpha\epsilon$ angulum.

Caput III.

De aequipollentia et conspiratione diversarum visionum et diversarum quantitate hypothesium ad efformandum unum et idem planetae iter.

Sequitur ut ostendam, quomodo idem hic planetae motus, in se manens aequalis, aliam tamen atque aliam speciem prae se ferre possit, et quomodo hic ambae formae aequipolleant.

Centris A et γ (Fig. 50. 51), intervallis vero AC, $\gamma\epsilon$ aequalibus, scribantur circuli CD, $\epsilon\zeta$, quibus agantur CA, $\epsilon\gamma$ per centra parallelae ad invicem: atque ad has inclinentur ductae per centra aliae, AB, $\gamma\delta$, itemque AD, $\gamma\zeta$ itidem parallelae. Scribatur etiam ex B epicyclus intervallo BE, itidemque ex D intervallo aequali DG, et collocetur planeta in E et G, ut DG et AB sint parallelae. Eidem intervallo BE aequale constituatur in linea $\delta\gamma$, quod sit $\gamma\beta$, in partes ipsi δ contrarias: et connectatur G cum A, ζ cum β . Aequipollebunt igitur hypotheses per praemissum caput: et oculo in A et β constituto, aequales erunt EAG, $\delta\beta\zeta$; aequales etiam EA, $\delta\beta$, item GA, $\zeta\beta$; denique arcus EG et $\delta\zeta$ aequales. Scribatur jam ex B, C, D epicyclus minor, intervallo BI, CF, DH: et continuetur AC in F: sintque paralleli CF, BI, DH: et collocetur sidus in I, F, H. Rursum igitur per cap. II. circulus IFH aequalis erit circulo $\delta\zeta$. Arcum igitur IF extende ex puncto δ , ut terminetur in ϵ ; et ab ϵ per γ duc $\epsilon\gamma$, ut $\epsilon\gamma$ sit parallelus ipsi CA: et intervallo CF aequale constituatur in linea $\epsilon\gamma$, quod sit $\gamma\alpha$, in partes ipsi ϵ contrarias: et connectatur I et H cum A, sic δ et ζ cum α . Rursum igitur aequipollebunt hypotheses per praemissum caput: et oculo in A et α constituto, aequales erunt FAH, $\epsilon\alpha\zeta$.

Fig. 50.





Fig. 51.



sic FAI , $\epsilon\delta$; aequales etiam FA , $\epsilon\alpha$; sic HA , $\zeta\alpha$ et IA , $\delta\alpha$; denique arcus FH et $\epsilon\zeta$ aequales et similes, ut et FI et $\epsilon\delta$, ex constructione.

Manente itaque via sideris eadem, oculo vero translato ex β in α , diversae sequentur apparentiae idque iisdem temporum momentis. Nam δ , ζ loca eadem diversimode inspiciuntur ex β et ex α . Vicissim manente oculo in A , et quantitate viae sideris EG , IH , situ vero ejus mutato, rursum sidus apparebit locis diversis, etsi eodem itineris loco consistat; quia totum iter translatum est. Cum ergo planeta, sive ex α inspiciatur, sive ex β , utrinque eodem momento in δ sit vel in ζ , et vero hypotheses aequipolleant, quare et I , E , loca diversorum epicyclorum eodem momento a planeta possideri dicendum est, itemque et G , H . Hoc tantummodo discriminis est, quod in primo schemate, oculo manente, iter planetae per variationem epicycli situ suo emovetur: in secundo vero schemate itineri planetae situs quoque idem manet, oculi vero situs tantundem mutatur in plagam contrariam. Potest tamen, si necesse est, et illic iter et hic oculus manere, transposito quod jam manet, per demonstrata superioris capitis.

Uſus hujus demonstrationis sequetur infra: nimirum, si prima inaequalitas superiorum planetarum salvari posset per capitis secundi hypothesin simplicem, tunc nulla oriretur difficultas, sive quis hanc inaequalitatem examinaret in media sive in apparenti oppositione cum Sole; nam iter maneret re vera idem, et planeta esset utrinque in iisdem punctis itineris ad quodvis momentum, tantummodo situs hujus itineris per spatium eccentricitatis Solis mutaretur in primo schemate: in secundo etiam (sita manente) punctum, unde computatur eccentricitas, tantundem transpouteretur.

In physica consideratione manent superiora, mutantur tantum quantitates in intentione virtutum motricium.


Caput IV.

De aequipollentia imperfecta inter duplicem epicyclum in concentrico vel eccentrepicyclum et inter aequantem in eccentrico.

Sic igitur res haberet, si locus esset hypothesi simplici capitis tertij in salvanda superiorum planetarum inaequalitate prima. Verum Ptolemaeus ad planetarum primam et simplicem inaequalitatem demonstrandam operosiori utitur hypothesi.

Centro B scribatur eccentricus DE, cujus eccentricitas sit BA, ut A sit locus oculi. Acta linea per BA ostendet in D apogaeum, in F perigaeum. In hac linea supra B spatium aliud BC extendatur aequale ipsi BA. Erit C punctum aequantis, punctum nempe, apud quod planeta aequalibus temporibus conficit aequales angulos, quamvis circulum non circa C sed circa B ordinet.

Fig. 52.



Copernicus hanc hypothesin (cap. 4. lib. V. ut et cap. 7. lib. IV.) inter cetera hoc quoque nomine notat, quod peccet in principia physica, statuens motus coelorum inaequales. Eligatur enim E punctum in circulo, quem planeta corpore peragrat, connectaturque cum C, B, A: et sit jam DCE rectus, ut et ECF. Cum ergo sint anguli hi aequales, constituti nempe aequalibus temporibus, et DCE exterior aequet CBE, CEB interiores: ergo parte CEB ablata residuus CBE vel DBE minor erit quam DCE; itaque FBE major quam DCE vel FCE. Sed DE arcus metitur DBE angulum, et EF arcus angulum EBF; minor ergo DE quam EF; et transit planeta per eos aequalibus temporibus. Ergo idem orbis solidus (quos opinatur Copernicus) in quo haeret planeta, tardus est, cum planeta orbe vectus incedit ex D in E; velox, cum it ex E in F. Totus ergo orbis solidus jam velox, jam tardus est. Quod Copernicus ut absurdum rejicit.


Quodsi virtus movens praesideret orbi solido undiquaque aequabili, non vero nudo planetae, merito haec ut absurda et ego rejicerem. At quia solidi orbes nulli sunt, vide nunc concinnitatem physicam hujus hypotheseos, si paucissima mutantur, de quibus infra. Etenim statuit haec hypothesis (quamvis ignaro Ptolemaeo) duas virtutes motrices, quibus planeta quilibet vehatur. Harum alteram ponit in A corpore (quod in reformatione astronomiae ipsissimus Sol erit) eamque ait niti, ut planetam circumagat circa se, sed gradus habere infinitos pro infinitis punctis distantiae ab A: ut, sicut est AD longissima, AF brevissima, sic planeta quoque sit in D tardissimus, in F velocissimus: et in univsum, ut AD ad AE sic tarditas apud D ad tarditatem apud E, ut infra prolixè demonstrabitur parte tertia. Alteram virtutem motricem tribuit hypothesis ista planetae ipsi, cui sufficit, ut vel fortitudine angulorum vel intuitu crescentis et decrescentis diametri Solis suos accessus vel recessus a Sole moderetur faciatque differentiam mediae distantiae a longissima et brevissima aequalem ipsi AB. Itaque punctum C aequantis nihil aliud est quam compendium geometricum computandi aequationes ex hypothesi plane physica. Quodsi tamen via planetae sit perfectus circulus, uti quidem Ptolemaeo placuit, oportet planetam insuper et sensum aliquem habere ejus celeritatis et tarditatis, qua ipse provehitur ab altera externa virtute, ut ad hujus praescripta etiam suos ac-

ante et post perigaeum quam in ipso perigaeo, quod Tycho, quatenus hic Copernicum est imitatus, in Lunaribus evenit.

Sed ne quidem simpliciter aequipollere binas has hypothesium formas demonstrabo numeris.

Et Ptolemaica quidem forma compendiosius quam ab ipso Ptolemaeo computari potest in hunc modum. Primum in triangulo CBE datur ECB vel DCE anomalia media*), datur etiam CB latus seu eccentricitas aequantis et BE radius orbis. Ut ergo radius orbis ad sinum ECB sic CB ad sinum CEB: et cum ECD aequet interiores et oppositos CEB et CBE junctos, ergo CEB ex DCE rejecto, relinquetur CBE. In triangulo ergo EBA angulus ad B datur cum lateribus circa ipsum; est enim BA eccentricitas eccentrici, EB vero est radius orbis. Secundum legem igitur hujus triangulorum formae datur angulus BEA; prius vero dabatur CEB, tota ergo CEA aequatio dabitur.

Fig. 54.



Utetur autem numeris Martis motui familiaribus. Quamvis enim Ptolemaeus CB et BA fecit aequales: Copernicus tamen hac lege solutus alias etiam proportionibus adsciscit, quod et Tycho Brahe imitari instituit. Sit CB 7560, BA 12600, qualium BE 100000: et sit primo DCE 45°, cujus sinus 70711. Ut ergo 100000 ad 70711 sic 7560 ad 5346 sinum arcus 3° 4' 52'', scilicet CEB. Aufer a 45°, restat CBE 41° 55' 8'', cujus dimidium 20° 57' 34'', quem arcum tangit 38304. Et cum sit EB 100000, BA vero 12600, differentia 87400, multiplicata in radium et divisa in summam 112600 prodat 77620: quod multiplicata in superiorem tangentem 38304; quod hic prodat, scilicet 29732, id tangit arcum 16° 33' 30''. Hic ablatus a superiore dimidio ipsius CBE relinquit 4° 24' 4'', nempe angulum BEA. Totus ergo CEA est 7° 28' 56'' in forma quidem Ptolemaica.¹⁶⁾ In Copernicana, quamvis ordinaria ratio quaerendae aequationis ex Tychonis tabulis Lunaribus tomo I. Progymnasmatum et ex Copernico ipso patet, utar tamen jam extra ordinem ratione alia, quae accommodata est anomaliae 45°. Sit βαλ (Fig. 53) 45° et λγ vel βγ 16380, γδ vel γο sit 3780 et ογλ rectus, duplus scilicet ad βαλ; γλ vero sit ipsi βα parallelus: et continuentur γλ et δα donec concurrant in μ; et ex ο ipsi γμ parallelus descendat οξ. Ergo λαμ est 45°, quare αμ aequae atque μλ est 70711. Adde λγ 16380, erit μγ vel οξ 87091. Et quia γδ, γο et ξμ aequales, subtrahere ξμ ab αμ: restat αξ 66931. Ut ergo οξ ad ξα, sic sinus totus ad 76852, tangentem αοξ vel οαβ, qui prodat 37° 32' 37'', qui differt ab arcu 45° per 7° 27' 23''. Differentia ergo Copernicanae aequationis a Ptolemaica hoc loco 1' 33'' sane peregrina.¹⁷⁾

Rursum in Ptolemaica sit DCE (Fig. 54) 90°; ergo cum sit ECB rectus et EB 100000, erit BC sinus anguli CEB, qui fit 4° 20' 8''. Quare EBC 85° 39' 52'', quare EC 99713. Ut ergo EC ad CA sic radius ad 20218 tangentem CEA. Hinc aequatio CEA est 11° 25' 48''. At in

*) Anomalia media est tempus lapsum, ex quo planeta in apogaeo fuit, artificialiter denominatum. Totum enim tempus, quo planeta ab apogaeo in apogaeum revertitur, instar circuli in gradus 360 dividitur. Anomalia vera est arcus zodiaci inter locum apogaei et apparentem (ex centro zodiaci) locum stellae. Aequatio est differentia utriusque anomaliae.

forma Copernicana tota $\eta\delta$, quae aequat CA, fit tangens, quia $\eta\delta\alpha$ rectus et $\delta\alpha$ radius. Ergo $\eta\alpha\delta$ est $11^\circ 23' 53''$. Differentia $1' 55''$.

Ita vides, quod aequationem eccentrici*) attinet, minimum aliquid deesse, quo minus hypothesium formae aequipolleant.

Discrepant tamen in distantiiis planetae a visu in α , proptereaque et in prosthaphaeresibus annuis. Nam in forma Ptolemaica, ut sinus anguli AEC ad AC, ita sinus totus ad AE, quae fit 101766, quando DCE est 90. At in Copernicana $\eta\alpha$ secans est anguli $\eta\alpha\delta$, scilicet 102012. Differentia 246 particulae, quae in prosthaphaeresi orbis annui paulo majus quid efficere possunt, ut infra parte quarta patebit. Possumus et illam minutulam aequationum differentiam obliterare, si, quam Braheus eccentricitatem Martis in forma Copernicana invenit 20160, eam in forma Ptolemaica statuamus 20103. Distantiae vero formae Copernicanae Ptolemaicis non possunt aequari, nisi aequatio 43 minutis varietur. In quadam aequipollentia tentata in hypothesi tabularum Lunarium Tychonis duos illos epicyclos Copernicanos in talem eccentricum Ptolemaicum cum aequatorio puncto transposui: nihilo minus tamen et epicyclum addidi propter aliam et peculiarem Lunae inaequalitatem.

Denique cum per cap. II. in hac forma Copernicana major epicyclus cum suo concentrico perfectissima aequipollentia possit transponi in eccentricum, cujus eccentricitas sit aequalis semidiametro epicycli majoris, superaddito ergo epicyclo minore ipsi huic eccentro Copernicano nascetur eccentricus epicyclus, paria faciens ad unguem cum duplici epicyclo in concentrico, nec plus hoc ipso ab eccentrico Ptolemaico cum aequante discrepans.

Caput V.

Quatenus haec quoque dispositio orbium, aequante vel secundo epicyclo usa, re ipsa manens una et eadem (vel proxime una et eadem), diversa uno et eodem momento spectacula exhibere possit, prout planetae vel in media vel in apparente oppositione cum Sole observentur.

Fit duobus modis: uno, in quo aequipollent forma Ptolemaica et Copernicana: altero, qui peculiaris est formae Copernicanae, quem ut alieniorem a nostro instituto prius expediemus; manet enim et propius apud sese quam reliquus.

Centro γ spatio $\gamma\delta$ scribatur eccentricus, in quo $\alpha\gamma$ sit primo loco linea apsidum et α visus: continuetur haec in ϵ ; sitque $\gamma\alpha$ quantitas eccentricitatis vel radii epicycli Copernicani majoris: nam de aequipollentia utriusque dictum est in fine cap. IV. Ergo centro ϵ spatio $\epsilon\eta$ scribatur epicyclus minor; et cum est centrum hujus in ϵ , sit planeta in η , incidens in lineam $\epsilon\gamma$, sic ut $\epsilon\delta$ eccentricum percurrat non stella, sed centrum epicycli stellam ferentis. Per caput igitur IV. expressa hic est forma Copernicana. Cui per caput III. constituemus aliam in veritate seu in indicatione ipsissimi


*) Aequatio eccentrici est in prima inaequalitate. Aequatio orbis est in secunda inaequalitate. Item prosthaphaeresis annua.

Ego vero, dum Copernicum ad meam ejus libri materiam accommodo, opus habui diversa fictione. Visus enim ab illo puncto in ipsissimum centrum corporis Solis per imaginationem transferendus fuit, atque inde (scilicet ex corpore Solis) computandi fuerunt abscessus corporum planetariorum, in eodem quidem itinere, quod Copernici suppositiones efformabant, sed (ut jam patuit) non plane idem iter causa particularium temporum effectum est mihi per hanc translationem lineae apsidum, differentia tamen perexigua et in illo quidem libello plane nullius momenti; ibi enim de solo situ itineris agebatur, qui hoc pacto mansit.

Ceterum in sequentibus ad vitandam confusionem eccentrico hoc Copernicano (quem non stella, sed centrum epicycli describat) non amplius utar. Differt enim ab ipsissimo itinere planetae, quod altius fit in perigaeo, humilior in apogaeo. At voce eccentrici porro utemur tantummodo in designando ipsissimo itinere planetae, vel puncti in cujus motu prima inaequalitas inest, quo pacto tantummodo Ptolemaicum eccentricum (vel proxime talem) par est nos imaginari. Ostensum enim est capite quarto, discrepaturum nostrum calculum aequationis (Ptolemaicae formae innixum) a Copernicano tantummodo duobus scrupulis, ubi maxime. Tum autem et facilius est modus computandi in forma Ptolemaica primae inaequalitatis quam in Copernicana. Denique haec Ptolemaica forma primae inaequalitatis (ut dictum) ipsi rerum naturae et sequentibus nostris speculationibus parte tertia et quarta est accommodatior. Propter aequipollentiam vero, si cui lubet, poterit is semper tunc quoque Copernicanum eccentrepicyclum, huc usque hoc capite quinto usurpatum, subintelligere.

Accedo jam ad priorem instituendae propositae aequipollentiae rationem, particularibus auctorum hypothesebus communem; quod in Ptolemaica forma prius demonstrabo.

Fig. 56.



Centro β scribatur eccentricus Ptolemaicus $\alpha\zeta$; sitque linea apsidum $\alpha\beta$, visus in α , punctum aequatorium γ .

Dum autem dico, visum in α esse, intelligo vel per fictionem vel vere; physice loquendo non tam visus in α collocandus est, quam ipsa virtus, quae circuitum circa se conciliat planetae tardum, velocem, pro ratione propinquitatis ad α ut supra dictum. Connectatur aliquod circumferentiae punctum extra apsidum lineam (puta η) cum γ, β, α ; esto ut per hanc hypothesein anguli $\alpha\eta$ per totum circuitum tanti proxime computari possint, quanti observantur ex α , et post certa tempora, quae metiatur angulus $\eta\gamma$, aequa-

liter. Ostendetur autem postea parte secunda, quomodo per observationes astronomicas deprehendatur, quantus angulus $\eta\alpha$ cuilibet $\eta\gamma$ debeatur. Rursum sit visus seu virtus movens in puncto extra lineam α , quod sit δ , deturque nobis, quod etiam in δ per astronomicas observationes certis temporibus certi anguli visorii sint deprehensi, hoc est quantum quolibet tempore planeta sub fixis promoveri videatur ex δ inspectus: detur etiam hoc, quod hae in δ apparitiones quadrent in hypothesein conformem priori,

tantum quantitate eccentricitatis mutata. Cum autem certum sit, uno et eodem tempore planetam in coelo unum et idem iter conficere, non vero aliud observanti ex δ , aliud ex α : certum igitur et hoc est, non posse planetam observatori utrique (et qui in α et qui in δ) videri aequalis motus eodem tempore. Sit enim portio veri itineris planetarii $\epsilon\eta$, atque illud conficiat planeta certo tempore, puta diebus 20: cum igitur α sit propius $\epsilon\eta$ quam δ , major igitur apparebit $\epsilon\eta$ in α , quam in δ , per demonstrata optica, ergo iisdem 20 diebus planeta plus videbitur promotus ei qui in α , quam ei qui in δ . Ac cum quilibet planeta perpetuo certum et eundem tueatur numerum dierum, quibus restituitur ad idem fixarum punctum, tarditatem contraria celeritate compensari oportet. Cum ergo planeta in portione $\epsilon\eta$ videatur tardior ei qui in δ , in alia igitur portione eidem qui in δ videbitur velocior, quam ei qui in α . Unde fit, ut alio loco tardissimus appareat ei qui in δ , alio ei qui in α . Ipse tamen planeta verissime non potest nisi uno in loco suae orbitae tardissimus esse.

His ita praeparatis quaeritur, an unum et idem verum in coelo iter planetae (quod praesupponitur) utrasque apparitiones repraesentare possit et ei qui in δ et ei qui in α , utrique suas et tales, quales Ptolemaicae calculi formae utrinque concedunt et admittunt.

Quodsi planeta in omnibus orbitae partibus aequalis celeritatis esset, responderetur per caput tertium, quod sic. Sed quia planeta in uno eccentrici loco *tardissimus est vera et reali mora, in opposito velocissimus, ideo respondendum, quod non plane. Causa haec est, quod duae retardationes permiscuntur; altera realis et physica in uno eccentrici loco; altera optica et apparens, in loco non jam uno, sed illo, qui a quolibet suscepto visus situ remotissimus est. Quando ergo visus α in lineam per β centrum eccentrici et γ centrum aequantis ductam incidit, in parte lineae stans opposita illi, quae habet γ centrum aequantis, tunc hutraque tarditas in idem punctum fixarum versus ϵ vergit. Quando vero discedit visus ex hac linea ut in δ , tunc ejecta recta ex δ per β centrum circuli ostendit tarditatis opticae locum η , cum vera et physica in ϵ sit. Atque harum inaequalitatum seu retardationum altera alteram diluit, accumulaturque in locum intermedium inter ϵ , η , ut si ex δ per γ linea ejiceretur in punctum ζ . Itaque si quis tali calculo uteretur, in quo $\delta\beta$ esset apsidum eccentrici linea, $\beta\gamma$ vero linea eccentricitatis aequantis, tunc quidem manente planetae vero itinere $\epsilon\eta$ repraesentaretur aliud in δ quam in α : nam ei qui in δ , planeta tardissimus esset in ζ , ei qui in α , tardissimus in ϵ . At non tale quippiam in δ repraesentaretur, quod per hypothesin priori conformem supra postulavimus repraesentari debere. Differunt enim hypothesium formae eo, quod illic β medium est in $\alpha\gamma$ (quod et physica ratio postulat, si in α sit virtus movens) hic vero β centrum eccentrici non esset medium inter δ , γ nec linea eccentricitatis aequantis (ut illic) per visum δ transiret: quae si etiam transiret per δ , ut $\delta\gamma$, non tamen secaret eccentricum in duo aequalia, quia non in centro β , nec pateretur planetam in locis oppositis hinc videri tardissimum, inde velocissimum.

Cum ergo constet, manente plane eodem itinere planetae in coelo, non posse plane eandem permanere formam hypotheseos, quaeritur amplius: si instituat eadem forma hypotheseos in δ , quantum mutetur iter planetae a priori et quantum haec nova institutio hypotheseos ex δ variatura sit priores apparentias in α . Primo, si collocetur centrum aequantis ex γ in

lineam $\delta\beta$, et ipsi $\beta\gamma$ aequalis fiat $\beta\mu$, plane situs itineris planetarii manet, sed planeta non in ι sed in η fit tardissimus, tarditate physica. Mutatur igitur in itinere planetae quod mutari non potest, quia physica tarditas non ut optica ad observatorum visionem sequitur. Etsi vero 20 diebus planeta idem $\iota\eta$ iter conficeret, quod in α majus, in δ minus apparet: tamen si partes hujus temporis consideres, vehementer turbabitur ratio applicationis earum ad partes hujus itineris, multoque magis in partibus aliis, quae non sunt interjectae inter lineas $\iota\eta$. Inprimis mutabitur visui in α sua aequationum quantitas notabiliter, si ei qui est in δ hoc eripueris, planetam non in ι tardissimum esse, hoc est si punctum aequantis ex γ in μ transtuleris. Ducta enim recta per $\gamma\mu$ in circumferentiae punctum ν , et connexis α , ν , erit sola haec aequatio $\alpha\nu\mu$ aequalis priori $\alpha\gamma\gamma$; supra ν vero aequationes ex μ erunt minores, infra ν majores: ut in η angulus $\mu\eta\alpha$ multo est minor quam $\gamma\eta\alpha$. Tum autem neque factum sic est, quod institueramus; nondum scilicet prior forma hypotheseos plane constituta est. Non enim ut $\alpha\beta$ ad $\beta\gamma$ sic $\delta\beta$ ad $\beta\mu$: nam $\beta\mu$ aequalis est ipsi $\beta\gamma$, at $\delta\beta$ major quam $\alpha\beta$. Sin autem facias ut $\alpha\beta$ ad $\beta\gamma$ sic $\delta\beta$ ad $\beta\mu$, major fiet $\beta\mu$ quam $\beta\gamma$. Unde sequitur, multo magis vitiatum iri visui in α suam aequationem, et quidem etiam maximam, propter auctam scilicet eccentricitatem. Non tantum igitur alio loco planeta futurus est tardissimus quam prius, sed etiam alia et quidem majore tarditatis verae mensura. Apparet itaque, aequipollentiam nobis expetitam institui non posse trajecta linea apsidum ex δ per β centrum eccentrici; cumque simul patuerit, quanti intersit, ut idem γ punctum aequantis retineatur, omnino igitur aut hac perrumpendum aut nuspiam.

Quid ergo futurum est, si ex δ nova linea apsidum per γ antiquum aequantis punctum trajiciatur et nova hypothesis antiquae conformetur? scilicet si centrum eccentrici ex β in lineam $\delta\gamma$ transponatur, fiatque ut $\alpha\beta$ ad $\beta\gamma$ sic $\delta\theta$ ad $\theta\gamma$, et sit θ centrum eccentrici? Nimirum hoc futurum est, ut non plane idem planetae iter in coelo maneat. Scribatur enim ex θ eccentricus priori aequalis $\epsilon\kappa\lambda$ et per θ , β recta continuatur in circumferentias, hinc in ξ , σ , et illinc in ρ , π . Quanta igitur est $\theta\beta$, tanta est et $\sigma\xi$ et $\rho\pi$: et tanto propior fit planeta in σ ipsi β tantoque remotior in ρ , quam si priorem eccentricum decurrisset. Sed et in alia plaga planeta fit tardissimus; prius enim in ι , jam in π est apsis. Atque ex hac contemperatione efficitur, ut priori visui in α constituto relinquantur quam proxime suae visiones: quod quidem hic solum quaeritur. Id autem jam numeris probabimus Martis motui familiaribus, etsi paulo alios Braheus prodidit, quod nihil nos impedit, qui hic tantum $\pi\rho\sigma\gamma\mu\nu\alpha\zeta\omicron\mu\epsilon\theta\alpha$.

Assumantur ista in $\delta\gamma\alpha$. Sit $\delta\alpha$ 3584 eccentricitatis Solis quantitas, qualium $\delta\gamma$ eccentricitas Martis 30138: et angulus $\alpha\delta\gamma$ $47^\circ 59' 16''$ differentia apogaeorum Solis et Martis. Ex tribus igitur datis et $\gamma\alpha$ dabitur, nova scilicet Martis eccentricitas, eritque 27971, et angulus $\delta\gamma\alpha$ $5^\circ 27' 47''$. Quodsi $\delta\gamma$ apogaeum prius Martis reponatur in $23^\circ 32' 16''$, $\alpha\gamma$ novum Martis apogaeum cadet in $29^\circ 0' 3''$ Q. ¹⁶)


Sit vero $\beta\xi$ 100000 et $\alpha\gamma$ talium 18034, quae prius erat 27971. ¹⁷) qualium $\delta\gamma$ 30138. Erit ergo in hac dimensione $\delta\gamma$ 19763. Utraque vero signis θ , β dividatur in proportionem tali, ut $\delta\theta$ ad $\theta\gamma$, item $\alpha\beta$ ad $\beta\gamma$ sint ut 1260 ad 756. Erit $\delta\theta$ 12352, $\theta\gamma$ 7411; et $\alpha\beta$ 11271, $\beta\gamma$ 6763: ut ita et super δ et super α construatur hypothesis primae inaequalitatis Ptolemaica. Tunc in dimensione priori qualium $\delta\alpha$ est 3584,

$\vartheta\beta$ vel $o\xi$ erit 1344; sed qualium $\beta\xi$ 100000, talium $\vartheta\beta$ vel $o\xi$ erit 880.²⁹⁾
Haec adserventur.

Ut principium calculi inveniamus, quo investigetur, quantum visui in δ mutantur suae apparentiae per transpositionem eccentrici ex $\rho\vartheta o$ in $\pi\beta\xi$, sic est agendum. Quia γ est commune centrum, in cuius circulo notentur tempora, notet ergo γs momentum in utraque hypothesis idem. Planeta igitur, si eccentricum so decurrat, erit tunc in s cum aequatione $\delta s \gamma$: sin eccentricum ξ decurrat, erit in ξ cum aequatione nulla, coincidentibus lineis αs apparentis et γs medii motus. Rursum post certum aliquod tempus, cuius sit mensura $\gamma\zeta$ vel $s\gamma\kappa$ (cui ad verticem constituitur $\delta\gamma\alpha$, qui jam inventus est $5^\circ 27' 47''$) sit momentum aliquod commune per $\gamma\kappa\zeta$ designatum. Erit igitur tunc planeta per eccentricum so in κ carens aequatione: per ξ vero in ζ cum aequatione $\gamma\zeta\alpha$. Ita semper planeta utrinque est in linea ex γ ejecta, ejusque puncto, in quo secat alterutrum eccentricum. Quodsi oculus esset in γ , nulla fieret apparentiarum diversitas, sive planeta in κ esset sive in ζ . Sed quia visus in hoc schemate ponitur ab artificibus in δ , a me in α , quaeritur ergo, quo loco circumferentiae distantia eccentricorum in hac linea ex γ ejecta sit visui in δ maxime sensibilis? Ut illa fiat sensibilis, concurrunt tria: primum ut distantia se ipsa sit magna, quo pacto circa $o\xi$ et $\rho\pi$ est maxima; deinde ut quam fieri potest recte objiciatur visui in δ , quo modo in ζ , κ et opposito loco evanescit per principia optica; in locis igitur intermediis infra ξ et supra ρ apparet maxima; tertio ut sit propinqua ipsi δ , qua ratione supra ρ fit propior quam infra ξ , eo quod centrum alterius eccentrici β ad dexteris partes ipsius δ declinet. Quodsi angulum rectum constituamus ad lineae $\gamma\delta$ punctum γ , perpendiculari ex γ in circumferentias ejecta, quam proxime ad locum venerimus, ubi maxima est haec apparentia. Transeat per γ perpendicularis ipsi $\delta\gamma$, quae sit $\sigma\varphi$, secans eccentricum ϑ in σ , v , reliquum in τ , φ ; et perpendicularis demittatur $\beta\chi$. Momento igitur $\gamma\sigma$ planeta erit in σ et τ , et momento $\gamma\varphi$ in v et φ . Quaerenda est inprimis quantitas $v\varphi$. Connectatur ϑ cum v et β cum φ ; igitur in $\vartheta v \gamma$ datur ϑv 100000, quia ϑ est centrum eccentrici v ; et $\vartheta\gamma$ est 7411 et $\vartheta\gamma v$ rectus: quare γv 99725. Idem in $\beta\gamma\varphi$ agendum. Sed prius debet innotescere $\beta\gamma$. Id patebit ex triangulo $\beta\gamma\chi$, in quo $\beta\chi$ est parallelus ipsi $\delta\gamma$, et rectus ad χ , et $\gamma\beta\chi$ aequalis ipsi $\vartheta\gamma\beta$, scilicet $5^\circ 27' 47''$ et $\beta\gamma$ 6763. Hinc latera inveniuntur $\gamma\chi$ 644, $\beta\chi$ 6732. Ergo in $\beta\chi\varphi$ recto angulo, cum sit $\beta\varphi$ 100000, eo quo β centrum eccentrici φ et $\chi\beta$ 6732, erit $\chi\varphi$ 99773. Adde $\chi\gamma$ 644, prodit quantitas $\gamma\varphi$ 100417. Erat vero γv 99725. Ergo $v\varphi$ quaesita est 692.

Connexis jam v , φ cum δ locis visus, quantitas $v\delta\varphi$ anguli sic invenitur: supra fuit $\delta\gamma$ 19763 dimensionis proximae: et angulus ad γ est rectus. Ut ergo $\delta\gamma$ ad $\gamma\varphi$ et γv , ita sinus totus ad tangentes angulorum $\gamma\delta\varphi$, $\gamma\delta v$. Prodeunt autem $78^\circ 51' 54'' \parallel 78^\circ 47' 30''$. Itaque diffe-

Fig. 56.



artifex ex iis locis et temporibus interlapsis constituerit hypothesin talem, in qua δ sit visus, $\delta\theta$ eccentricitas eccentrici $\theta\kappa$, et $\theta\gamma$ eccentricitas aequantis, et κ apogaeum; Keplerus vero superveniens observata loca et tempora mutet (nimirum ipse observet articulos et puncta, quibus planeta non medio sed apparenti loco Solis fuit oppositus) exque his locis et temporibus ipse aliam invenerit hypothesin, in qua visus in δ vel A relinquatur, eccentricitas autem prodeat AB eccentrici novi BI, et novi aequantis Γ eccentricitas A Γ , et apogaeum novum I: quaeritur jam, si prior artifex pristino suo puncto aequatorio γ adjungat novum eccentricum BI, an multo alia aequatio locusque planetae sub fixis per calculum sit proditurus, quam ipse prius ex suo eccentrico $\gamma\kappa$ invenerat: intellige quoad primam inaequalitatem; de secunda enim inaequalitate et quid quantumque hac ratione in illa mutetur, hic sermo non est. Respondetur ex hac aequipollentia transpositionum, quod perexigua discrepantia futura sit, eaque maxima circa puncta ν , Φ , non major 5', plane ut prius visu transposito: nisi quod jam $\nu\Phi$ linea propior est visui δ quam terminus ν : itaque angulus $\Phi\delta\nu$, qui prius erat 4' 24'', jam est 4' 43''. Contrarium in σ , T accidit.

Demonstratum est igitur in eccentrico Ptolemaico, quid turbarum oriatur, si quis oppositionibus planetae cum apparente loco Solis usus, seu visum seu orbem transponat novumque eccentricum extruat.

Ut eadem aequipollentia in forma Copernicana seu Tychonica, quae duobus epicyclis utitur, repetitis verbis demonstretur, non opus esse censeo. Tantum ex doctrina in fine cap. III. docebo, et hunc planetis convenientem eccentricum cum aequante ejusque in alias quantitates aliosque situs oculi transformationem delineare per binos illos epicyclos Copernicanos, ut oculus scilicet transferatur, iter vero planetae per auram aetheream (quantum per hoc quintum caput fieri potest) invariatur maneat, quod monui capite illo III. itidem fieri posse.

Constituatur triangulum $\delta\gamma\alpha$ priori aequale, et lineae lineis paralleli; agatur vero per α , $\alpha\beta$ parallelos ipsi $\delta\gamma$, et per δ , $\delta\theta$ parallelos ipsi $\alpha\gamma$, et centris δ , α duo scribantur concentrici aequales prioribus eccentricis $\delta\theta$, $\alpha\beta$; continuetur $\delta\gamma$ in $\zeta\lambda$ et $\alpha\gamma$ in $\epsilon\kappa$, et sint $\delta\zeta$, $\alpha\epsilon$ semidiametri (ut prius) et lineae apsidum, quia per idem γ transeunt. Secentur autem $\delta\gamma$ et $\alpha\gamma$ in η , ξ in proportionem qua prius: et $\eta\gamma$, $\xi\gamma$ bisecentur in ψ , ω . Tum spatio $\delta\psi$, centris θ , ζ scribantur epicycli ι , λ , et ipsi $\zeta\lambda$ sit parallelos $\theta\iota$. Centris vero ι , λ intervallo $\psi\gamma$, scribantur epicyclia per π , μ , ρ , τ .

Rursum spatio $\alpha\omega$ centris ϵ , β scribantur epicycli κ , σ : et ipsi $\epsilon\kappa$ sit parallelos $\beta\sigma$. Centris vero κ , σ intervallo $\omega\gamma$ scribantur epicyclia per $\pi\nu$, $\rho\tau$; et fiant $\theta\iota\mu$, $\beta\sigma\nu$ dupli ad $\theta\gamma\alpha$; sitque planeta in epicyclo $\kappa\pi$ proxime ϵ in ν , in epicyclo $\lambda\rho$ proxime ζ in τ . Igitur per hypothesin ex δ incidit planeta in $\epsilon\mu$, per hypo-

Fig. 58.



thesin vero ex α , incidit in $\tau\nu$; ubi vides, quod puncta μ , ν , item τ , ν parum differant, illa ex δ haec ex α inspecta, quando planeta circa apsidas versatur. At versus longitudes medias haec puncta tantum a se invicem dissidebunt, quantum in priori schemate ν et Φ dissident, eruntque omnia quam proxime aequalia et demonstrationes omnino eadem. Continuatim enim $\theta\iota$, $\epsilon\kappa$ ad concursum π , et $\zeta\lambda$, $\beta\sigma$ ad concursum in ρ , erunt $\theta\pi\epsilon$, $\zeta\rho\beta$, triangula aequalia ubique triangulo $\delta\gamma\alpha$, et latera lateribus parallela.

At quia demonstrationes hae per se satis erunt perplexae neque consultum, ut coacervatione epicyclorum et epicycliorum Copernicanorum seu Braheanorum magis involvantur, ideo in sequentibus et hanc formam Copernicanam seu TychoNICAM primae inaequalitati tributam valere jubebimus: nam ipsa secundae inaequalitatis ratio hypothesium trigemina ubique futura abunde satis nobis exhibebit negotiorum. Quicquid autem per Ptolemaicum aequantem cum eccentrico demonstraverimus, jam statim postulo ut pro demonstratis in hoc quoque Copernicano seu Braheano concentrico cum duobus epicyclis vel eccentrepicyclo accipiatur: nam perexigua inventa est differentia supra cap. IV.

Caput VI.

De aequipollentia hypothesium Ptolemaei, Copernici et Brahei, quibus inaequalitatem planetarum secundam demonstrarunt, et quid singular a se ipsis differant, quando ad apparentem et quando ad medium Solis motum accommodantur.

Dictum est hactenus de hypothsibus primae planetarum inaequalitatis, quae absolvitur, quoties planeta ad idem signum zodiaci redit. Nunc transimus ad alteram inaequalitatem, quae non in constanti aliquo et uno signo zodiaci, sed in conjunctione vel oppositione Solis cum planeta absolvitur. Hanc igitur vehementer mirati sunt homines: causamque alius aliam attulit, qua fieret, ut planeta junctus Soli redderetur velox, directus, altus et parvus, at e regione Solis retrogradus, humilis et magnus, intermediis temporibus stationarius et mediocris.

Latini auctores vim inesse censuere Solis aspectibus et radiis, qua planetae ceteri in rei veritate attraherentur: quorum sententia numeris nequit demonstrari, quare non est astronomica: sed nec verisimilis, inventis veris causis: et manifeste falsa, cum Saturnus incipiat retrocedere in quadrato Solis vel ultra, Jupiter in trino, Mars in biquintili vel ante sesquadruplum, inconstanti intervallo omnes.

Ptolemaeus dixit, loco certo circuli planetarii, qui sufficit primae inaequalitati, fixum esse non planetam ipsum, sed centrum epicycli planetam in sua circumferentia fixum vehentis, qui vicissim vehatur a circulo illo planetae capitali: formam motus hanc esse, ut si centrum epicycli sit cum Sole, planeta quoque sit in epicycli summo moveaturque cum Sole versam plagam eandem, Sole a centro hujus epicycli recedente (velocior enim est illo), planetam simul descendere in epicyclo: cum autem motus epicycli sit velocior circa suum centrum quam motus centri circa Terram, hinc fieri,

ut cum planeta partes epicycli inferiores peragrat, centro epicycli versante in opposito Solis, compositione motuum re vera sit retrogradus. Ita Ptolemaeus sententiam suam numeris et geometriae accomodavit, admirationem non sustulit. Adhuc enim causa quaeritur, quae omnes planetarum epicyclos Soli connectat, ut ii semper in congressu centri sui cum Sole periodum suam absolvant.

Copernicus cum antiquissimis Pythagoreis et Aristarcho, cumque iisdem una ego negamus hanc secundam inaequalitatem in ipso planetae motu proprio inesse, sed videri tantum, accidere vero annua gyratione Telluris circa Solem immobilem. Itaque, quemadmodum cap. I. motus diurnus a motibus planetarum propriis fuit separatus, sic jam secunda planetarum inaequalitas itidem a prima separatur a Copernico et quidem eodem modo. Nam primum motum alii artifices adventitium quidem in planetis agnoscunt, sed tamen credunt, illum re vera planetis inesse et inferri sic, ut eodem et planetae vehantur. Copernicus neque inesse per se neque inferri concedit extrinsecus, sed affingi tantum illis per fallaciam visus: dum enim Terra volvatur super axe suo ab occasu in ortum, visui nostro videri mundum reliquum volvi ab ortu in occasum. Eodem, inquam, modo Copernicus asserit, planetas non re vera fieri stationarios et retrogrados, sed videri: Terra enim alio insuper et eo annuo motu in circulo amplissimo (quem orbem magnum appellat) translata, eos; qui Terram credunt quiescere, putare planetas et Solem in contrarium transferri, et Sole inter Terram et planetam posito, componi in visione motus Terrae et planetae, unde videatur planeta velox, Terra vero inter Solem et planetam posita, videri relinqui planetam et sic retrocedere, eo quod Terra velocior sit planeta.

Tycho Brahe simile quid habet cum Latinis, non Solem quidem attrahere planetas per aspectum, sed planetas adulari Soli: niti enim, ut illum (quamvis euntem) in medio fere suarum circuituum retineant, ipsos vero genuinam viam circa Solem (quasi esset immobilis) ordinare. Quae ratione quilibet planeta in aura aetherea praeter viam propriam ipsam etiam Solis viam conficit, efficiturque ex motu utroque compositus ad unguem idem qui apud Ptolemaeum (spiralis nempe), ut cap. I. dictum. Et astronomice Ptolemaeus epicyclos in eccentricis statuit, Braheus eccentricos in epicyclo uno, qui est ipse Solis orbis.


Ego in sequentibus demonstrationibus omnes tres auctorum formas conjungam. Nam et Tycho, me hoc quandoque suadente, id se ultro vel me tacente facturum fuisse respondit (fecissetque si supervixisset), et moriens a me, quem in Copernici sententia esse sciebat, petiit, uti in sua hypothesi omnia demonstrarem. ¹¹⁾

Porro trium harum formarum perfectissimam aequipollentiam geometricam et jam statim et per totum librum, aliud licet agentes, demonstrabimus. In praesens persequendum est institutum et demonstrandum, omnino magnum aliquid in secunda inaequalitate peccari, si pro apparenti motu Solis medius susceptus fuerit, cum quo planeta in principio hujus secundae inaequalitatis opponatur.

Incipiam a Copernicana sententia. Centro β scribatur eccentricus Terrae $\gamma\sigma$, qualem Copernicus Ptolemaeo fidens est imaginatus, ut in eo sit $\gamma\beta$ linea apsidum, κ locus Solis immobilis et β punctum aequalitatis motus Telluris. Ducatur per β ipsi $\beta\gamma$ perpendicularis $\nu\beta\sigma$, secans circumferentiam in punctis ν , σ ; et connectantur ν , σ cum κ .

Copernicus igitur, Ptolemaicos numeros in suam formam hypotheseos

Fig. 59.



tralaturus, planetarum eccentricitates computavit non a α Sole, sed a β centro aestimato aequalitatis cursus Terrae. Eductis enim lineis ex β , utpote $\beta\gamma$, $\beta\nu$, $\beta\sigma$, quoties planeta et Terra in has incidunt, planeta supponebatur exuisse secundam inaequalitatem, quae ei accidebat ratione motus Terrae, ut si Terra in ν versante planeta inveniretur in linea $\beta\nu$ producta.

Porro hac ratione Copernicus visum per fictionem in puncto β collocavit. Dummodo namque planeta sit in linea $\beta\nu$, nihil interest ad designandum ejus locum sub fixis, sive ex σ adspiciatur sive ex β .

Eadem de lineis $\beta\gamma$, $\beta\sigma$

et infinitis aliis in β concurrentibus vere dici possunt. Ergo punctum β est concursus linearum visoriarum omnium et sic commune punctum fictum visionum omnium: re vera autem visio, hoc est Tellus domicilium nostrum in circuli $\sigma\gamma\nu$ aliis atque aliis punctis invenitur diversis temporibus. Cum igitur existimasset Copernicus, liberari planetam inaequalitate secunda quoties Terra et planeta invenirentur in una aliqua linea ex β exeunte, planetae loca visa sub fixis ad ea momenta oppositionum planetae cum medio loco Solis instrumentis mathematicis indagavit. Invento enim loco planetae in aliqua noctium circa oppositionem planetae cum Sole, si tunc medius Solis locus per calculum fuit inventus in puncto praecise opposito, is fuit articulus temporis: sin ea nocte adhuc distarent nonnihil, collatione duarum vel plurium noctium motuumque Martis et Terrae diurnorum intercedentium venatus est hunc ipsum articulum temporis et punctum seu locum, quem teneret eo articulo planeta. Ubi hoc factum toties et in tot locis zodiaci, quot sibi putavit esse necessaria (ut si factum fuisset in $\beta\gamma$, $\beta\nu$, $\beta\sigma$), jam per haec inventa planetae loca $\beta\gamma$, $\beta\nu$, $\beta\sigma$ sub fixis seu in zodiaco coepit artifex investigare inaequalitatis primae hypothesin, quanta nimirum esset eccentricitas planetarii circuli a suscepto puncto β et in quas zodiaci partes vergeret apogaeum, comparatis his angulis, quos loca deprehensa conformarent in β centro visus cum temporibus intercedentibus. Methodum autem hujus negotii infra suo loco patefaciam.

Esto jam confecta pragmatia et prodeat linea apsidum eccentrici $\beta\delta$, eccentricitas puncti aequatorii $\beta\delta$, centrum eccentrici in hac linea ejusque

puncto λ ; et respondeat haec hypothesis omnibus locis observatis sub articulos oppositionis planetae cum medio loco Solis.

Quid igitur est, *Keplere*, quod hic desideres in Copernico? Anne observationibus seu astronomorum experimentis negas hanc hypothesis per omnia respondere? Id quidem jam non agitur. Neque ego, cum hunc laborem auspicarer, ab observationibus in diversam sententiam sum adductus. Sed hoc est quod desideravi: *Continuetur $\beta\delta$ ut secet eccentricum in χ , ξ ; et circa χ sumatur punctum eccentrici, quod sit τ , connectaturque cum δ , λ . Cum ergo $\chi\tau$ metiatur angulum $\chi\lambda\tau$, angulus vero $\chi\delta\tau$ major sit angulo $\chi\lambda\tau$ quantitate $\delta\tau\lambda$, et sit δ punctum aequalitatis temporariae; ergo tempus per $\chi\delta\tau$ designatum est majus respectu totius periodi temporis per 4 rectos signati, quam arcus $\chi\tau$ respectu circumferentiae totius: tardus igitur planeta vere (non jam per visus phantasiam) per arcum $\tau\chi$, velocius in opposito arcu, et in χ tardissimus, in ξ velocissimus. Neque tamen in χ longissime recedit a κ Sole, neque in ξ proximus fit ipsi κ . At omnibus rationibus ipsaque adeo hypotheseos hujus, quam circa β punctum refello, testificatione consentaneum efficitur, hanc realem retardationem planetae oriri ex discessu a corpore Solis, accelerationem ex appropinquatione ad Solem ipsum in κ situm. Contra ne cogitatione quidem comprehendi potest, inesse vim in puncto β (quod caret corpore) potius, quam in κ omnino proximo (in quo Sol, cor mundi), quae vis planetam pro ratione abscissus et recessus sui tarde vel velociter circumagat. Ac etsi quis jam non concedat retardationes et accelerationes hujusmodi ex intimo eccentricorum complexu physice oriri, statuatur igitur has affectiones motus esse naturaliter penes ipsas facultates motrices in corpore planetae residentes, rursus eandem verisimilitudinem obtinebimus. Nam quae causa sit, cur mentes illae praeterito puncto κ (quod geometricam habet affinitatem ad motum, corpore enim vestitum est non exiguae magnitudinis) ad β punctum respicerent, quatuor solummodo semidiametris (vel secundum auctores, diametris) corporis Solaris ab ipso Sole remotum et corpore vacans nullaque re nisi unica imaginatione subnixum? Adde quod Copernicus lib. V. cap. 16. ipse agnoscit, Solem in κ plane fixum esse ideoque eccentricitatem $\kappa\delta$ constantem, cum β punctum, quod pro centro habet orbis annui, saeculorum successu luxatum esse perhibeat itaque $\beta\delta$ brevioris factam. Quo pacto β aut hodie non est amplius in centro mundi, aut olim non fuit ibi. At consentaneum est, vel originem motus ex centro mundi esse vel mentes motrices ad centrum mundi respicere, non igitur ad β sed ad κ , quod Copernicus fixum perhibet; id quod centro mundi competit. His adductis verisimilitudinibus conclusi, lineam apsidum, quae pro inaequalitate prima planetae efficienda usurpatur, non debere per β sed per ipsissimum κ transire. Tunc autem id obtinebimus, cum loca planetae sub fixis ea adhibemus, quae planeta possidet in articulo oppositionis sui et apparentis loci Solis. Et quidem cum puncta κ , β cum γ Terra in eadem sunt linea ipseque planeta una in eandem incidit, ut si sit in τ , tunc eodem momento planeta et medio et apparenti Solis loco opponitur manetque ei locus, sive per $\beta\tau$ sive per $\kappa\tau$ inter fixas excurrentem designetur, vereque exutus est inaequalitate secunda, sive ab apparente sive a medio motu Terrae pendeat. At cum Terra ad sui eccentrici latus seu longitudines medias venit, differentia satis magna intervenit. Iverit enim Terra a γ in ν (Sol nempe e regione a perigaeo et Capricorno in Arietem) et inveniatur linea*

medii motus Solis $v\beta$ in Ariete, linea vero visionis planetae in Libra praecise illi opposita, nempe $v\omega$. Cum igitur $v\kappa$ sit ultra $v\beta$ magis in consequentia, apparens igitur Solis locus est ultra planetae oppositum; et cum v sit Terra, visus domicilium, et ω planeta, et uterque descendant versus ξ , velocius tamen v Terra; linea ergo $v\omega$ posteriori tempore adhuc magis inclinatur ad lineam $v\kappa$ visibilis loci Solis: antecessit igitur apparens oppositio mediam. Tempore igitur, quod antecedit momentum signatum per βv , quod sit $\beta\theta$, planeta in lineam ex κ per θ eductam incidet, nempe in ζ . Et tunc $\theta\zeta$ linea visionis planetae (quod in exercitatio aliquis diligenter notet) plus in consequentia vergit sub fixis, quam $v\omega$ temporis posterioris: quia etsi $\theta\zeta$ praecedit lineam $v\omega$ in antecedentia, tamen perinde est ac si θ , v et omnia omnino puncta per Terrae circulum unum punctum et centrum sphaerae fixarum essent: quare non distantia terminorum θ , v , sed inclinatio linearum $\theta\zeta$, $v\omega$ efficit, ut lineae in diversa zodiaci loca incendant, eodem ad sensum coincisurae, si paralleli fuissent. Inclinari autem ζ versus ω patet inde, quod idem tempus supponitur, quo planeta ex ζ in ω et Terra ex θ in v movetur. Terra vero velocior est planeta. Majus igitur spatium θv Terra conficit, quam est $\zeta\omega$ spatium planetae.


Sed esse planetam antecedenti tempore plus in consequentia, facilius etiam doceri potest, cum sub oppositionem sit retrogradus, quod omnibus constat. Apparet itaque, quid in hac reductione a medio ad apparentem Solis motum in locis inaequalitate secunda exutis immutetur.

Nam in τ et opposito loco pristina loca manent in ζ vel ω : additur loco viso, quia $\theta\zeta$ (ut dictum est) magis in consequentia vergit quam $v\omega$: adimitur tempori interlapso, quia $\theta\zeta$ est visio tempore prior quam $v\omega$. In opposito loco fit contrarium, tempori scilicet additur, loco adimitur. Atque ita loca haec planetae a pristinis multum dissident. Quare et in operatione de novo instituta effectus prodeunt multo alii. Nempe cum visum fictione in κ Solem transtulerimus (eo quod planetam in τ et ξ positum inspexeramus, Terra in lineis $\kappa\tau$ et $\kappa\zeta$ versante, scilicet in punctis γ et θ), eccentricitas igitur jam a κ consurget. At supra capite V. ostensum est, visu ex β in κ translato et ex κ per δ punctum aequalitatis pristinam lineam ejecta, per hanc novam hypothesin novum quidem eccentricum strui, sed qui visui in β quam proxime suas visiones omnes imperturbatas relinquat. Igitur connexis δ, κ et linea divisa in μ , sic ut $\delta\lambda$ sit ad $\delta\mu$ ut $\delta\beta$ ad $\delta\kappa$, et ex μ designato novo eccentrico $\eta\epsilon$, qui priori $\xi\chi$ sit aequalis, acta etiam per κ, δ nova linea apsidum, consurget hypothesis nova, cujus apsis in η . Prius autem χ abusive apogaeum dixeramus, eo quod in linea $\chi\beta$ Copernicanum centrum β in locum Terrae Ptolemaicum successerat. Jam igitur η propria notione (cum in Copernicana hypothesi sumus) aphelium eique oppositum punctum perihelium dicemus, eo quod Sol κ longissime ab η recedat.

Dictum est, quid physice differant hae geminae opiniones, mea et auctorum. Ostensum etiam est, quomodo in forma Copernicana utraque geometricè delineetur. Tertio et illud inculcatum, astronomice in articulis conjunctionum et oppositionum nihil illos differre quod admodum magno sit faciendum. Sequitur ut, quod supra cap. V. inexplicatum mansit, demonstrarem, omnino magnam aliquam differentiam intercedere inter utramque hypothesin, si ex iis extra situm acronychion planetae locum computare jubearis.

Ducta igitur per λ, μ centra eccentricorum linea parallelos ipsi $\beta\kappa$, et

Fig. 59.



*Utramque discemus
ex resolutione triangu-
lorum $\delta\lambda\rho$, $\delta\mu s$. Nam
in $\delta\lambda\rho$ supra (p. 188) as-*

servavimus $\delta\lambda$ 7411, qualium $\lambda\rho$ 100000 et $\rho\lambda\beta$ $47^\circ 59' 16''$. Hinc prodit $\rho\delta\lambda$ $44^\circ 59' 10''$ et $\delta\rho$ 105123. Ergo in $\varepsilon\delta\mu$, cum sit $\varepsilon\delta\lambda$ $44^\circ 59' 10''$ et $\lambda\delta\mu$ prius fuerit $5^\circ 27' 47''$, totus igitur $\varepsilon\delta\mu$ est $50^\circ 26' 57''$ et $\delta\mu$ fuit supra 6763 qualium $\mu\varepsilon$ 100000. Igitur in $\varepsilon\delta\mu$ datis tribus et reliqua dantur, nempe $\varepsilon\mu\kappa$ $53^\circ 26' 17''$ et per hunc $\delta\varepsilon$ 104170. Prius vero $\delta\rho$ erat 105123; relinquatur ergo $\varepsilon\rho$ 953. Supra $\lambda\mu$ fuit 880, cui aequalis esset $\varepsilon\rho$, si signa ε , ρ essent in linea $\mu\rho$: sed quia hic ε est in linea $\delta\rho$ inclinata ad $\mu\rho$, nihil igitur mireris, longiorem esse $\varepsilon\rho$ quam $\mu\lambda$. Demissa jam ex β perpendiculari in $\delta\rho$, quae sit $\beta\iota$, in triangulo $\delta\beta\iota$ rectus est ad ι et $\beta\delta\iota$ est $44^\circ 59' 10''$ et $\beta\delta$ supra fuit 19763; ergo quaesita perpendicularis $\beta\iota$ 13971 et $\delta\iota$ 13978, quare $\iota\rho$ 91145. Oportet et quantitatem radii $\beta\nu$ conicere in eosdem numeros: supra enim, cum, quae nostrae $\beta\kappa$ hic respondet, assumeretur particularum 3584, $\beta\nu$ fuit praesupposita 100000. Jam vero $\lambda\rho$ 100000 praesupponitur, et est $\lambda\rho$ ad $\beta\nu$ supra assumpta ut 61 ad 40 fere, unde cetera exstructa sunt: ergo ut 61 ad 40 sic 100000 ad $65656\frac{1}{2}$ legitimam quantitatem $\beta\nu$.⁵²⁾ Tangat igitur circulus per $\varepsilon\rho$ transiens circulum $\beta\nu$ in puncto τ ; et $\varepsilon\rho$ per medium secta in o perpendicularis ipsi $\iota\rho$ insiat ψo ; et continuetur $\beta\tau$, donec in ψ secet $o\psi$; erit ψ centrum circuli. Est enim centrum circuli in linea per centrum alterius tangentis circuli et contactus punctum transeunte (Eucl. III, 11), quare in $\beta\psi$ linea. Rursum (Eucl. III, 3) centrum circuli est in perpendiculari bisecante subtensam $\varepsilon\rho$, quae sectionis puncta ε , ρ connectit: ergo in linea $o\psi$, quare in puncto ψ communi utrique lineae. Connectatur $\varepsilon\psi$ et ex β ipsi $\iota\rho$ parallelus exeat $\beta\alpha$, secans $o\psi$ in α . Igitur $\beta\alpha$ aequalis est lineae ιo , et αo aequalis lineae $\beta\iota$. Sed $\beta\iota$ jam inventa est 13971, ιo vero cognoscitur ex $\iota\rho$, $\varepsilon\rho$. Fuit enim $\iota\rho$ supra 91145, et $\varepsilon\rho$ 953, sed $o\rho$ est dimidium de $\varepsilon\rho$, ergo $o\rho$ est $476\frac{1}{2}$: ablato ergo $o\rho$ ab $\iota\rho$, relinquatur ιo vel $\beta\alpha$ 90668. Cum autem sit α rectus, ergo $\beta\psi$ poterit utramque $\beta\alpha$, $\alpha\psi$. Est vero composita $\beta\psi$ ex $\beta\tau$ nota (scilicet 65656) et $\tau\psi$. Ipsa vero $\tau\psi$, hoc est $\varepsilon\psi$, (cum sit o rectus) potest notam εo $476\frac{1}{2}$, et $o\psi$ compositam ex $o\alpha$ nota et $\alpha\psi$ ignota sed prius etiam commemorata. Oportet igitur $o\psi$ tam longam facere, ut si potentias ψo et $o\alpha$ junjas, latus $\varepsilon\psi$ vel $\alpha\psi$ non sit longius, quam ut potentia compositae ex $\beta\tau$, $\tau\psi$, diminuta potentia ipsius $\beta\alpha$, relinquat potentiam ipsius $\psi\alpha$ tantae, ut composita cum αo aequali primo assumptam ψo . Assumo ψo unitatem figuratum; ejus quadratum erit quoque figuratum. Appone quadratum ipsius εo 227052; erit quadratum $\psi\varepsilon$ vel $\psi\tau$ compositum ex his duobus. Est vero quadratum $\beta\tau$ 4310747477; quod si quadrato $\psi\tau$ addideris et rectangula compleas, constituetur quadratum totius $\psi\beta$. Est autem quodlibet illorum rectangulorum radix de 4310747475 \mathfrak{z} + 978763835536363. Atque sic habetur hoc quadratum $\beta\psi$ semel. Cum autem αo sit 13971, erit $\psi\alpha$ figurata unitas, diminuta per 13971. Ejus quadratum 1 \mathfrak{z} — 27942 \mathfrak{z} + 195185841. Cui adde quadratum ipsius $\beta\alpha$ 8220686224, ut constitutatur quadratum $\beta\psi$ secundo 1 \mathfrak{z} — 27942 \mathfrak{z} + 8415875065. Prius erat 1 \mathfrak{z} + 4310974527 et amplius radice de 4310747475 \mathfrak{z} + 978763835536363 duplum. Aufer utrinque unum censum et 4310974529, relinquatur illic — 27942 \mathfrak{z} + 4104900538, hic radice de 4310747475 \mathfrak{z} + 978763835536363 duplum, quae aequalia sunt. Simplo ergo radice illic est aequale — 13971 \mathfrak{z} + 2052450269. Ac cum hoc sit illius

radici aequale, hujus ergo quadratum illi ipsi erit aequale. Est autem hujus quadratum $+ 195188841 \text{ } \mathfrak{B} - 57349565416398 \text{ } \mathfrak{R} + 4212552106718172361$.

Abjice utrinque $195188841 \text{ } \mathfrak{B}$ et 978763835536363 , et adde utrinque $57349565416398 \text{ } \mathfrak{R}$. Stabunt utrinque aequalia; illinc $4115558634 \text{ } \mathfrak{B} + 57349565416398 \text{ } \mathfrak{R}$; hinc vero 4211573342882635998 . Et in minimis numeris $1 \text{ } \mathfrak{B} + 13934 \text{ } \mathfrak{R}$ aequant 1023329690 . Peracta aequatione prodit $\phi\psi$ unitatis figuratae valor 25772 .³³⁾

Cognita semidiametro circuli jam facile habentur anguli. Nam a ψ o aufer $\phi\alpha$ 13971 , restabit $\psi\alpha$ 11801 . Et $\beta\alpha$ est $90668\frac{1}{2}$, et $\beta\alpha\psi$ rectus, ergo $\alpha\beta\psi$ $7^{\circ} 30' 10''$. Sed $\alpha\beta$ vel $\rho\delta$ supra per $3^{\circ} 0' 6''$ annuebat ad $\rho\lambda$ vel $\beta\kappa$, quae in $5\frac{1}{2}^{\circ}$ \odot incidit, ergo $\rho\epsilon$ vel $\alpha\beta$ in $8\frac{1}{2}^{\circ}$ \odot . Ergo $\psi\beta$ in 16° \odot . Sole ergo (assumptis his numeris) perambulante 16° \odot , planeta vero medio et aequabili motu in $8\frac{1}{2}^{\circ}$ \mathcal{S} , at apparenti circa 27° \mathfrak{M} versante, $\rho\epsilon$ apparet maxima. Quodsi planeta sit ultra $8\frac{1}{2}^{\circ}$ \mathcal{S} , ultra scilicet $\rho\epsilon$, etsi tunc $\rho\epsilon$ minuetur, apparentia tamen augeri poterit in puncto ultra ν ob appropinquationem orbium. Quantitas jam statim habetur. Cum enim $\phi\psi$ sit inventa 25772 et $\phi\rho$ $476\frac{1}{2}$, erit $\phi\psi\epsilon$ $1^{\circ} 3' 32''$. Ei vero aequalis est $\rho\psi\epsilon$, quem hactenus investigavimus (Eucl. III, 20): nimirum quia totus $\rho\psi\epsilon$ ad centrum duplus est ipsius $\rho\psi\epsilon$ ad circumferentiam, et vero $\phi\psi\epsilon$ dimidius est ipsius $\rho\psi\epsilon$. Quodsi $\beta\delta$, $\kappa\delta$ bisecentur, et $\lambda\mu$ dimidium ipsius $\beta\kappa$ assumeretur (quo de infra), tum $\rho\epsilon$ et consequenter ejus angulus ad ν quarta parte posset major fieri. Ita vides tandem, quantum mea haec traductio hypotheseos a medio ad apparentem motum Solis in parallaxibus orbis annui turbet.


Aperta igitur est nobis janua per observationes quoque statuendi de eo, quod a priori et a consideratione causarum motricium deduxeram; scilicet lineam apsidum planetae, quae sola bisecat iter planetae in duos semicirculos aequales vigore et quantitate, hanc inquam lineam non praeter Solem (ut artificibus placet), sed per ipsum centrum corporis Solis transire. Hoc autem in successu operis demonstrabo ex observationibus parte quarta et quinta.

Jam eadem quantum fieri potest et in Ptolemaica hypothesei deducam.

Centro Ψ (Fig. 60) scribatur eccentricus Solis Γ , in quo $\Psi\Gamma$ sit linea apsidum et Terra immobilis in lineae $\Psi\Gamma$ puncto K , versus Γ , et Ψ punctum aestimatum aequalitatis motus Solis: erigantur ex Ψ , K perpendiculares $\Psi\Sigma$, KT ; et connectatur Σ cum K ; sitque $K\Sigma$ linea apparentis motus Solis, KT linea aequalis motus Solis.

Ptolemaeus igitur planetarum cursus expendit non in lineis $K\Sigma$, sed in lineis KT , eductis ex K parallelis ipsis $\Psi\Sigma$ per corpus Solis euntibus. Quoties enim planeta in has KT incidit e regione Solis, supponebatur expisse secundam inaequalitatem, quae ei accidebat (secundum opinionem Ptolemaei) ratione epicycli, et tunc instrumentis explorabatur locus planetae, in quo sub fixis apparebat, supponebaturque, centrum epicycli tunc inveniri in eadem linea. Id factum aliquoties et in diversis zodiaci locis: esto in lineis $K\Gamma$, KT et oppositis. Ex tribus igitur hujusmodi locis planetae (seu centri epicycli, qui secundae inaequalitati servit apud Ptolemaeum) coepit artifex investigare inaequalitatis primae hypothesin, comparatis his angulis, quos loca deprehensa conformarent in K centro Terrae et visus,

Fig. 60.



cum temporibus intercedentibus. Methodus hujus negotii in Ptolemaeo invenitur lib. IX.

Esto jam confecta pragmatia et prodeat linea apsidum eccentrici KAX , A punctum aequatorium, centrum eccentrici in hac linea et puncto A , et eccentricus XZ , et respondeat haec hypothesis omnibus locis observatis sub articulos oppositionis planetae cum Solis loco medio.


Hic quae Copernico objeci de concinnitate motus physici, non plane et in Ptolemaeo quadrant. Nam centrum quidem epicycli, qui secundae servit inaequalitati, hic aequae ac prius ipse planeta transfertur tarde, celeriter, pro suo ad K Terram accessu vel recessu in circulo XZ : inesse autem in K Terra (ut prius apud Copernicum in Sole, corde mundi) vim motricem, quae centra hujusmodi epicyclorum circumagitet, absurdum et monstrosum est statuere. Alia vero via impugnari ex physica potest haec hypothesis. Est enim huic formae quodammodo propria soliditas orbium, qua (per Tychonis Brahe observationes cometarum) destructa, haec per sese quodammodo cadere videtur hypothesis; statueretur enim vis motrix in centro epicycli (in non corpore sed puncto mathematico) residere et agitare se ipsam de loco in locum transeundo, idque aequalibus temporibus inaequaliter; simul vero et secum attraheret planetam ad propinquitatem diametri epicycli illumque simul circa sese gyraret aequalibus temporibus aequaliter. Haec tanta varietas in unam motricem mentem cadere non potest, nisi Deus sit, suffragante Aristotele lib. I. Metaphysicorum cap. 8, cui placet, singulis motibus aequalissimis et simplicissime circularibus singulas praesidere mentes: praeterea, qui virtus aliqua sedebit in non corpore, effluet ex non corpore in planetam? Quodsi etiam di-

vidas munia, et motricum intelligentiam unam in centro epicycli collocas, alteram in corpore planetae, ea quae in centro Terram (corpus nempe) respiciet et circumibit Terram in circulum inaequaliter, quae vero in puncto circumferentiae (nempe in corpore planetae) circumibit centrum incorporeum et id aequaliter. ~~Quaeretur~~ igitur ut supra, quibus illa adminiculis id incorporeum punctum circumveniat. Non enim per geometricam imaginationem, ut quod geometricam sui imaginationem non admittit; nec punctum mobile in non corpore vel imaginando subsistere potest; et nos homines huiusmodi puncta imaginantes adminiculis utimur tabellarum vel papyri, quae tractamus manibus, vel meminimus nos olim tractasse. At neque per physicam effluxionem virtutis (quae in centro epicycli) usque ad circumferentiam et corpus planetae. Jam enim sustulimus hunc virtutis effluxum, divisis muniis compositi motus inter binas mentes. Quin etiam in prima et eccentrica motione dubitatur, an virtus aliqua naturalis, ad motum inferendum comparata, possit in puncto aliquo subsistere, quod omni proprio corpore careat? multo magis an huiusmodi incorporea virtus se ipsam circa Terram circumagitare et de loco in locum transire possit? et multo maxime an motum alii per effluxum ex se ipsa communicare seu inferre possit, nulli innixa corpori ceu nido? Nam quae sublimia de essentia, motu, loco, operationibus beatorum angelorum et separatarum mentium mihi opponere aliqui volent, impertinentia sunt. Disputamus enim de rebus naturalibus dignitatis longe inferioris, de virtutibus nullo arbitrio ad variandam actionem suam usis, de mentibus minime sane separatis, cum sint conjunctae et alligatae corporibus coelestibus vehendis. Atque haec in genere Ptolemaeo objici possunt.

Sed aliquid etiam Ptolemaeo dicatur, ob quod in specie a suo motu medio Solis discedere et apparentem nobiscum amplecti velit. Etenim si virtus movens planetam (seu una, seu gemina) ad Solem respicit, ita ut planetam imo loco epicycli statuatur (epicyclum hic intellige Ptolemaicum, secundae inaequalitatis inservientem), quoties centrum epicycli e regione Solis stat, quaero ut supra, cur potius ad punctum imaginarium T (quod Solem ipsum per Σ notatum jam praecedat, jam sequatur, jam supra, jam infra stat) quam ad ipsum Solis corpus respiciat? aut quomodo virtus illa motum ipsius T circa K Terram percipere omnino possit, cum in Ψ corpus non sit? et an non sit verisimilius, epicyclum ad lineas $K\Sigma$ apparentis loci Solis, quando hae per centrum epicycli transeunt, restitui? Videamus igitur, quid in eccentrico immutetur per apparentis motus Solis usurpationem. Rursum igitur (ut prius) cum Γ Sol et Ψ centrum eccentrici Solis cum K Terra in eadem est linea, sic ut $\Psi\Gamma$ apparentis et $K\Gamma$ medii motus Solis coincident, tunc T centro epicycli manet hic locus, sive per KT sive per ΨT sub fixis designetur, vereque planeta est in linea KT seu ΨT et imo loco epicycli Φ , quia hic et ipsi Ψ et ipsi K proximus est: proptereaque planeta vere exutus est inaequalitate secunda. At cum Sol ad sui eccentrici latus seu longitudines medias venit, differentia satis magna intervenit. Iverit enim Sol a Γ in Σ et inveniatur linea medii motus Solis KT in Ariete, et linea visionis planetae $K\Omega$ in Libra praecise illi opposita, ut sit $TK\Omega$ linea una. Quia ergo Ptolemaeus statuit, planetam Ω in hac visione $K\Omega$ exuisse secundam inaequalitatem, ponit igitur Z centrum epicycli in $K\Omega$ linea. Cum autem $K\Sigma$ superaverit KT , apparens igitur locus Solis est ultra oppositionem cum planeta. Neque $K\Omega$ in posteriore tempore descendit, ut opponatur ipsi $K\Sigma$, sed ascendit versus $K\Phi$, quia partes imae

epicycli Ω sunt retrogradae et celeriores ipso Z centro, et ibi planeta, utpote in oppositione cum Sole. Antecessit igitur hic apparens oppositio mediam. Tempore igitur, quod momentum per KT signatum antecedit (sit autem $K\Theta$) cum Sol videtur in linea $K\Xi$, planeta in ejus opposito videbitur, puta in I per KI , quae est una recta cum $K\Xi$; et quia jam ponitur in hac vera oppositione exuere inaequalitatem secundam, ideo et centrum epicycli in hac linea ΞK videbitur, puta in O ; et quia planeta est retrogradus, ergo tempore $K\Theta$ priore quam KT planeta est in KI linea posteriore quam $K\Omega$. Sed KI et $K\Omega$ sunt partes linearum KO et KZ ; igitur et KO est magis in consequentia quam KZ . Apparet itaque, quid in hac reductione a medio ad apparentem Solis motum in linea centri epicycli mutetur. Nam in T et opposito puncto pristinae lineae motus centri epicycli manent: in Z promovetur haec linea et in ea centrum epicycli, adimitur vero tempori interlapso: in opposito loco fit contrarium, tempori scilicet additur, linea motus centri epicycli retrahitur in antecedentia. Atque ita hae centri epicycli lineae a pristinis multum dissident. Quare etiam, cum ex his aliquot locis visis centri epicycli (nempe ex locis visis planetae, post quem supponimus latere in eadem linea visoria centrum epicycli) nova et repetita operatione causas et mensuram inaequalitatis primae investigamus, effectus operationis a priori multum differt. Nempe cum in semicirculo, in quo est apogaeum, tempus fuerit imminutum, ut ita planeta fiat celerior, prodibit igitur eccentricitas aequantis minor. Et cum in ejus semicirculi quadrante majore BZ , qui habet apogaeum, aequaliter fuerit diminutum tempus quemadmodum in parte minore reliqua, multo igitur celerior in proportionem planeta redditus est in illa reliqua parte semicirculi. Perigaeum igitur ad illam appropinquavit et apogaeum a X versus Z descendit.

Fig. 60.



Quantitas autem novae hypotheseos sic patebit. Quia tum demum planeta Ω incidere ponitur in lineam ductam ex Z centro epicycli per K Terram, cum haec KZ est una continua cum $K\Sigma$, apparentis loci Solis, ergo $K\Sigma$ et quae ex Z per corpus planetae ducitur incedunt perpetuo paralleli. Ac cum jam acceperimus a Ptolemaeo, quo tempore linea medii motus Solis fuit KT per Ω ducta, planetam visum esse in linea $K\Omega$, negemus autem ei Z centrum epicycli simul esse in $K\Omega$, ducatur ergo (ex nostra positione) $K\Sigma$ parallelus ex Ω loco planetae, quae sit ΩO : centrum epicycli a nobis ponitur hoc momento in linea ΩO vel aliqua huic parallelo et proxima, prout Ω (signum planetae) in linea KZ propior vel remotior ab ipso K fuerit. Sit ipsi ΩZ ex quocunque puncto lineae KZ (quod jam sit Ω) aequalis ΩO ; et ex O ducatur aliqua in ZK parallelus ipsi $K\Psi$, quae sit OZ . Cum ergo $Z\Omega O$ sit aequalis ipsi $K\Sigma\Psi$, et $K\Sigma$ insensibiliter longior ipsa $\Psi\Sigma$ vel ΩO , eo quod $K\Psi\Sigma$ rectus, et angulus ad Σ non major sit $2^\circ 3'$ (unde qualium $\Psi\Sigma$ 100000 talium $K\Sigma$ 100064) igitur et OZ insensibiliter minor est ipsa $K\Psi$. Connectantur Z, A , et ipsi ZA parallelus agatur ad O . Cum ergo idem sit momentum temporis, quo centrum epicycli Ptolemaeo ponitur in Z , Mihi in O (quod in theoria Solis per ΨT communiter designatur); idque momentum in theoria Martis notetur per ZA in hypothesisi priori, quia A est punctum aequalitatis, notabitur id in nova per ei parallelon: novum igitur punctum aequalitatis, circa quod numerantur tempora, erit in hac parallelo ex O .

Et quia centro epicycli (secundum Ptolemaeum) in altera parte lineae medii motus Solis KT versante eadem contingunt (quae omitto ad longum deducere) rursumque aliqua parallelus ducitur lineae Ptolemaicae medii motus centri epicycli, ubi ergo novae duae paralleli concurrunt, in id punctum ex A demissa (quae sit AA) erit parallelus ipsi ZO vel ΨK et aequalis ipsi ZO et quam proxime aequalis ipsi ΨK , et novum A erit commune punctum aequalitatis in nova hypothesisi.

At supra cap. V. in fine ostensum est, si per A ipsi $K\Psi$ parallelus ducatur AA , et $K\Psi$ sit aequalis ipsi AA , et connectatur novum A cum K seceturque nova KA in M ea proportionem, qua prior KA secabatur in A , per hanc novam hypothesisin novum quidem eccentricum strui, hoc est situ differentem a priori, sed qui etiam in priori hypothesisi adhibitus visui in K suas visiones omnes fere imperturbatas relinquat. Descripto igitur ex M novo eccentrico, qui sit aequalis priori, et continuata utrinque KM , erit H novum apogaeum, centrum epicycli in B, O punctis novi eccentrici, planeta in A propior, in I remotior quam prius. At vero in locis aequalitate secunda involutis (siquidem planetae tribuatur epicyclus aequalis eccentrico Solis, quod necesse est ut faciamus, siquidem vim eorum, quae Copernicus et Tycho Brahe invenerunt, plane velimus in formam Ptolemaicam transfundere) omnino priores visiones per novum hunc eccentricum in illarum hypothesisin illatum turbantur vehementer: non quidem ideo, quia punctum aequalitatis A non manet idem, sed ideo, quia circa loca apsidum Solis centra eccentricorum Ptolemaici et nostri intervallo AM distant: quam distantiam etiam centrorum adeoque et locorum corporis planetarii distantia aequalis sequitur. Haec porro discrepantia non est maxima, centro epicycli versante circa longitudes medias Solis. Dictum enim est, illis in locis pene eundem esse locum centro epicycli in utroque eccentrico, quamvis parallelis ex AA distantibus. Est ergo circa apsides Solis maxima et major

circa perigaeum in Capricorno, continuata linea MA , ut secet eccentricos in P, E . Nam quanta est MA , tanta est et PE . Sed quia non designatur momentum idem per hanc unam lineam MA , cum non M, A , sed A sit punctum aequalitatis, ergo versus PE veniant paralleli ex AA , quae signabunt momentum idem: sintque AP, AE et ex P, E epicycli scribantur N, II .

Quaeritur, ubi maxima appareat haec discrepantia ratione circumferentiae epicycli? Et certum, quod non in partibus epicycli ipsi K Terrae proximis, quia essent ipsi K ad plagam eandem: nec in summis, quia nimis essent remotae: ergo in proximis partibus perigaeo epicycli: ergo Sole et cum hoc planeta non plane in perigaeo suo versante sed proxime, et in summa (ut breviter dicam) in punctis II, N eodem temporis momento convenientibus, per quae et K minimus circellus traducitur. Est autem ejus circelli centrum in linea per K ducta, quae continuata sursum et concurrens cum linea PA itidem continuata angulum $7\frac{1}{2}^\circ$ comprehendit.

Demonstrationem ex superioribus huc accommodet, qui non acquiescit; numeri quidem iidem manent, nisi quod apud Ptolemaeum MA major est, quam superius in ~~numeris~~ usurpatis $\mu\lambda$ (Fig. 59); quare et differentia visionis major, scilicet $NKII$.

Prius nempe erat ut $\delta\beta$ ad $\delta\lambda$ minorem quam est dimidia $\delta\beta$, sic $\beta\kappa$ ad $\lambda\mu$. Ptolemaeo vero esset, ut KA tota ad KA dimidiam, sic AA aequalis ipsi $\beta\kappa$ ad MA .

Denique eadem et in Tychonica hypothesis deducam. (Etsi apud Braheum orbis Martis secet orbem Solis; quia tamen generalia tracto in hac prima parte, et quae omnibus planetis conveniunt, malui hic excludere hanc intersectionem, multum enim obscuritatis in schemate fuerat ~~positura~~.) Centro B (Fig. 61) scribatur eccentricus Solis GS , ut in eo BG sit linea apsidum, C locus Terrae immobilis et B punctum aequalitatis ex sententia auctorum: nam in progressu ostendetur, punctum aequalitatis et centrum eccentrici in theoria Solis non esse idem. Erigantur ex B, C perpendiculares BS, CV ; et connectatur S cum C , ut sit CV linea medii et CS apparentis motus Solis.

Etsi igitur Tycho Brahe nondum plane concluderat, utrum planetas ad lineas CV , an vero ad CS referret, in prima tamen conceptione lineas GV habuit, uti quidem tomo I. Progymnasmatum fol. 477. et tom. II. fol. 188. declaratum reliquit: quam eandem viam ipsa quoque Ptolemaei et Copernici vestigia ipsi monstrarunt. Hanc a Tychone calcatam viam, si ad mentem Ptolemaei pergamus, dicere oportet, quoties planeta in lineas CV medii motus Solis incidit e regione Solis, toties illum exuere inaequalitatem secundam, quae ei accidit ex Brahei sententia, ob motionem centri eccentrici circa Terram eodem tempore cum Sole.

Nam ipsum quidem commune punctum, cujus respectu omnes planetas motum dicuntur habere eccentricum et in quo totum systema planetarium affixum esse concipitur orbitae Solis, hoc, inquam, punctum semper versatur in linea medii motus Solis, intervallo aequali ipsi BS a C Terra distans, et concentricum V describens aequalem eccentrico GS . Haec enim fuit Tychonis Brahe sententia: nisi quod solidos orbes ille negavit. Itaque quae de affixione totius systematis planetarii ad orbem Solis diximus, ad captum diximus eorum, qui orbes solidos credunt. Continuetur VC , et sit planeta in hac linea ultra C . Collocabit igitur Braheus in hoc casu punctum affixionis systematis planetarii in V . Visio igitur planetae fit

Fig. 61



per lineam VC. Ac etsi visus in C Terra est, perinde tamen est, ac si esset in V puncto, unde dependet prima, inaequalitas. Capiatur igitur instrumentis locus planetæ sub fixis, quoties in lineae CV puncto aliquo e regione V ultra C fuerit visus (esto in lineis CV, CG et oppositis) ut fuerit centrum systematis planetarii in circulo VP, Sol in S et G, corpus planetæ e regione in O, F; etsi in theoria Martis eccentricus planetæ ad eccentricum Solis in minori proportionem est, adeo ut eccentricus Martis et puncta O, F fiant ipsi C Terræ propiora quam S Sol: quæ una inter causas fuit, cur Braheus orbium soliditatem negaret. Ex pluribus igitur locis huiusmodi et omnino ex totidem, quot haberi potuere, Tycho Brahe solitus est investigare inaequalitatis primæ hypothesin, seposita amplitudine orbis VP, eaque pro unico puncto aestimata, quasi VP centrum systematis planetarii, seu punctum affixionis, interim quievisset. Ita comparisonem instituit temporis interlapsi et angulorum, quos VO et PF ex uno puncto eductæ (coincidentibus V, P), conformarant, qui quidem sunt iidem cum angulis OCF vel VCP.

Esto jam confecta pragmatia et prodeat linea apsidum eccentrici VLD vel PLD, D punctum aequatorium et L centrum eccentrici in hac linea, et eccentricus HO et FH, et respondeat hæc hypothesin omnibus locis planetæ observatis sub articulos oppositionis planetæ cum Solis loco medio.

Mitto in praesens diligentius excutere, utrum hæc hypothesin in genere physicis principiis sit consentanea, in qua Sol Terram circumit mente sua

motrice ad eam respiciens seseque (ut qui orbe careat) inaequaliter incitans pro accessu suo vel recessu a Terra (nisi Terram Sole praestantior facere et huic vim Solis motricem transscribere velis), idem vero Sol (ut in Copernico) vim motricem ~~emittit~~ ad omnes planetas, eos circa sese rotans eo gradu celeritatis, quo ~~sunt~~ illi gradu propinquitatis ad Solem; planetae interim nituntur suos ad Solem accessus et recessus in parvo epicyclo conficere simulque Solem (quacunque is circa Terram concedit) iisdem vestigiis insequi extra ordinem, atque ita quilibet planeta (maxime Sol) ad plura simul respicit, ipsique planetarum ~~trajectus~~ per auram aetheream vere (ut apud Ptolemaeum) spirales efficiuntur, qualiter capite I. depicti sunt: haec, inquam, an sint consentanea per occasionem alibi expendemus. Jam ponatur vera haec forma hypotheseos in generalibus. Quaeritur, utrum porro in specie sit consentaneum, planetas insequi ipsum Solis corpus S, G, an vero punctum V, P, corpore vacuum, quatuor semidiametris Solis (non plus) a centro Solis distans, quod jam supra Solem sit jam infra, jam ante jam pone: et amplius utrum magis consentaneum, vim, quae planetas in orbem circa Solem circumagit, in ipso corpore Solis S, G, an in tali aliquo puncto V, P corpore vacuo niduletur? breviter: si axis systematis planetarii (ut notionem vocis crasse a planeto deducam), quo cen clavo orbes planetarum orbi Solis annexi sunt, si hic, inquam, est proxime Solem, cur non in ipso Sole? Si axis hic seu punctum affixionis circumit Terram et proxime Solem et eodem plane tempore, cur propriam viam describit? cur non plane idem cum Sole iter observat? Omnino itaque concludo, siquidem vera sit universaliter Tychonis Brahe sententia de systemate mundano, sic esse accipiendam, ut centrum systematis planetarum non in V, P, sed in S, G in ipsissimo Solis itinere versetur, denique in ipso Sole insit, atque ad primam seu eccentrici inaequalitatem a secunda liberandam sit utendum oppositionibus planetae cum apparenti loco Solis, non cum medio. Quam rationem ipse Braheus postremis temporibus non gravatim est amplexus. Videamus igitur, quid in eccentrico immutetur. Rursum igitur (ut prius) cum Sol est in linea BC, ut in G, et planeta in F oppositus puncto P, erit F planeta Soli ipsi G oppositus: itaque idem planetae locus apparebit sub fixis per lineam GF, sive ea sit continua cum linea CP sive cum linea CG, quia utraque una factae sunt linea. Utraque igitur ratione planeta vere exutus est inaequalitate secunda. At cum Sol ad sui eccentrici latus seu longitudes medias venit, differentia satis magna intervenit. Iverit enim a G in S et inveniatur linea medii motus Solis CV in Ariete et linea visionis planetae CO in Libra praecise illi opposita, ut sit VCO una linea. Cum igitur CS superaverit CV, apparens igitur locus Solis est ultra oppositionem cum planeta. Cumque per hanc meam mutationem centrum systematis planetarii sit non in V sed in S, planeta in CO spectato, conneris igitur S, O signis, erit C Terra extra lineam SO, quare visio planetae per CO lineam adhuc implicata inaequalitati secundae. Neque CO in posteriore tempore verget in consequentia, ut opponatur ipsi CS, sed ascendet versus CF, quia motus Solis et una centri systematis planetarii omniumque ejus partium (itaque et ipsius O planetae et L centri eccentrici) est a linea CO versus F sursum et multo celerior, quam motus eccentrici vel planetae in O circa L, a puncto H versus inferiora: itaque O motu non eccentrici proprio sed extraneo retrahitur nonnihil in antecedentia, ut quidem per se constat, planetas in oppositione cum Sole esse

Fig. 61.



retrogrados. Tempore igitur, quod momentum per CV signatum antecedit (sit autem CT), cum Sol videtur in linea CQ, planeta in ejus apparentis loci opposito, puta in I, videbitur, et quia jam ponitur, in hoc casu exuere inaequalitatem secundam, ideo QCI erit linea una, hoc est, punctum a quo consurgit eccentricitas erit in linea CQ. Quia igitur CI visio planetae retrogradi prior tempore est ultra CO visionem posteriorem, ideoque magis in antecedentia vergentem, erit igitur et CQ ultra CV et Q novum centrum systematis ultra V vetus. Et cum ex OV sit facta IQ, plus distans in consequentia angulo OCI, linea vero apsidum VD vel PD (a qua motus incipit) maneat in omni circuitu sibi ipsi parallelos, apparet igitur, minori temporis intervallo statui planetam ulterius venisse circa centrum Q systematis, quam antea sub majori temporis intervallo circa V centrum systematis.

Apparet itaque, quid in hac reductione a medio ad apparentem Solis motum in motu apparenti eccentrico immutetur. Nam in G et opposito puncto versante centro systematis, linea motus eccentrici apparentis manet, in Q promovetur, in opposito retrahitur, cum illic tempus minuatur, hic augeatur. Atque ita hae lineae a pristinis multum dissident. Quare etiam, cum ex his aliquot locis visis planetae (e quorum regione supponimus inveniri centrum systematis, nempe in ipso Sole) nova et repetita operatione causas et mensuram inaequalitatis primae investigamus, effectus operationis a priori multo differt.

Nam quia punctum affixionis ex circulo VP, in quo Braheus ipsum

... in circulum GS transponimus, nimirum in ipsum cor-
 ... semper in linea, quae ipsi CB parallelus est, spatio CB
 ... punctum **prius** stat, scilicet supra V, P, in S, G:
 ... aequalitatis **manente** (iisdem scilicet momentis per CV
 ... puncta in O et **punctum** affictionis in S esse possit, oportet
 ... D et S vel G novam lineam apsidum trajicere. Quare ex
 ... capitis V. (quae supra in explicatione formae Copernicanae
 ...) ducta DS vel DG, et divisa in ea proportionem, in qua
 ... DV per L est divisa, ut sit punctum divisionis M, et centro hoc
 ... M, intervallo vero quo prius, scribatur novus eccentricus: ille non
 ... tantum reddet observationes has posteriores, ex quibus erat extractus, sed
 ... missus in priorem hypothesin, salvaturus est etiam observationes prius
 ... adhibitas intra praecisionem quinque scrupulorum.

Quae vero computationes instituentur extra situm acronychium et per
 priorem et per novum hunc eccentricum, alicubi (nempe circa **perigaeum**
 Solis) plus uno gradu dissidere poterunt, si **numeros familiares et stellae**
 Martis appropriatos per Braheum **proditos sequamur**.

Demonstrationem non est opus **repetere**. - Delineatio facillima est in
 schemate Copernicano (Fig. 59), si ex γ Terra parallelon ipsi $\beta\alpha$ eri-
 gas, inque ea intervallo $\beta\alpha$ centrum eccentrici Solis metegis supra γ , et hoc
 centro eccentricum Solis Braheanum traducas per α et deleas eccentricum
 Terrae Copernicanum.

Exposita igitur hac hypothesium diversitate earumque in primis in-
 aequalitatibus aequipollentia, in secundis discrepantia, primam operis partem
 concludamus, quae (si quid video) totius operis est difficillima ob labyrinthos
 opinionum pene inextricabiles et vorum aequivocationes perpetuas aut cir-
 cumscriptiones taediosissimas. Quae autem **me** necessitas impulerit, ut hanc
 doctrinam praemitterem, jam statim capite VII. patebit. Hebetior **aliquis**
 totam differre potest, donec quae sunt faciliora apprehenderit.

PARS SECUNDA.

DE PRIMA MARTIS STELLAE INAEQUALITATE AD IMITATIONEM VETERUM.

Caput VII.

Qua occasione in theoriam Martis inciderim.

Verum est, divinam vocem, quae discere jubeat homines astronomiam, in mundo ipso expressam non verbis aut syllabis, sed re ipsa et commensuratione humani intellectus sensuumque cum serie corporum et affectionum coelestium. Sed tamen etiam fatum quodpiam occulte homines alios ad alias artes impellit certosque reddit, sese, ut pars sunt creati operis, ita et in parte divinae providentiae esse.

Cum primum per aetatem philosophiae dulcedinem cognoscere potui, universam illam ingenti cupiditate sum complexus, nihil admodum de astronomia in speciem sollicitus. Aderat quidem ingenium; nec difficulter geometrica et astronomica, quae scholarum ordo suppeditabat, capiebam, figuris subnixus et numeris et proportionibus. Sed erant illa necessaria studia, nihil quod inclinationem potissimam ad astronomiam argueret. Cumque sumtibus Ducis Wirtembergici sustentarer, viderem vero commilitones meos, quos princeps interpellatus in exterarum nationes mittebat, tergiversari varie amore patriae, durior ego mature admodum mecum concluderem, quocumque destinarer promptissime sequi. Prima se obtulit functio astronomica, ad quam tamen obeundam (vere dicam) extrusus sum auctoritate praeceptorum; non longinquitate loci territus, quem metum in aliis damnaveram (ut jam dixi), sed inopinato et contempto functionis genere et tenuitate eruditionis in hac philosophiae parte. Hanc igitur adii instructior ab ingenio quam a scientia, multum protestatus, me jure meo ad aliud vitae genus, quod splendidius videbatur, nequaquam cedere. Quinam fuerint primo biennio successus horum studiorum, ex Mystério meo Cosmographico apparet. Quos praeterea mihi stimulos Maestlinus praeceptor meus adhibuerit ad reliquam astronomiam amplectendam, leges in eodem libello et epistola ejus viri, quae est Narrationi Rhetici praefixa. (Comp. Vol. I, p. 25.) Inventum illud omnino maximi feci, multoque majoris, quod viderem, et Maestlino idem tantopere probari. Neque tantum ille me exstimulavit intempestiva lectoribus promissione facta universi mei (ut ajebat) operis uranici, quantum ipse ardebam, ex restitutione astronomiae inquirere, an inventum illud meum omnem observationum subtilitatem pateretur. Jam enim demonstratum erat in ipso libro, consistere hoc intra subtilitatem vulgatae astronomiae.

Ex eo itaque tempore serio de observationibus comparandis cogitare

coepi. Cumque anno 1597 ad Tycho n e m Brahe scripsissem (I, 42), rogans ut suam de meo libello sententiam diceret, ipseque respondens inter cetera suarum etiam observationum meminisset, ingenti me cupiditate earum videntarum inflammavit. At vero Tycho Brahe, ipse quoque magna pars fati mei, ex eo non destitit me ultro hortari ut ad se venirem. Cumque me longinquitas loci esset absterritura, divinae rursus dispositioni adscribo, quod in Bohemiam is venit. Eo igitur veni sub initium anni 1600, spe planetarum correctas eccentricitates addiscendi. Cum autem primo octiduo didicissem, ipsum adhibere cum Ptolemaeo et Copernico medium motum Solis, esset vero apparens motus meo libello accommodatior (quod ex ipso libro patet), ab auctore impetravi, ut mihi liceret observationibus meo modo uti. Erat tum ejus domestico Christiano Severini ³⁴) sub manibus theoria Martis, quam tempus ipsi dabat in manus, eo quod versarentur in observatione acronychii situs seu oppositionis Martis cum Sole in 9° Ω . Si Christianus alium planetam tractasset, in eundem et ego incidissem.

Rursus ergo divina dispositione accidisse puto, quod eodem tempore ego advenerim, quo tempore Marti ille erat intentus, ex cujus motibus omnino necesse est nos in cognitionem astronomiae arcanorum venire aut ea perpetuo nescire. Recudebatur tabula mediarum oppositionum ab anno 1580, erat excogitata hypothesis, quae eas omnes repraesentare perhibebatur intra duorum scrupulorum propinquitatem in longitudine, cujus numeros vel paulo differentes capite V. usurpavi. Apogaeum initio anni 1585 ponebatur in $23^{\circ} 45' \Omega$, eccentricitas maxima, quae ex semidiametro utriusque circelli componitur, erat 20160, qualium semidiameter epicycli majoris esset 16380. Igitur in forma primae inaequalitatis Ptolemaica eccentricitas aequatorii puncti erat 20160 vel eo paulo minus. Ex hac hypothese exstructa erat et tabula aequationum eccentrici ad gradus singulos et correcti motus medii, additione facta ad Prutenicarum motum medium unius scrupuli et dodrantis. Et diducti erant hi motus medii, apogaei, itemque et nodi per annos 400, perinde ut in Solaribus et Lunaribus motibus tomo I. Progymnasmatum factum est. In sola latitudine sub acronychios situs itemque et in parallaxibus orbis annui Christianus haerebat. Aderat quidem hypothesis et tabella pro latitudinibus; sed non eruebatur inde latitudo observata. Quae res ipsi in Lunares motus incubituro impedimento erat. Cum igitur suspicarer id quod res erat, hypothesin non bene habere, accinxi me ipse ad opus secundum praeconceptas et in Mysterio meo Cosmographico expressas opiniones. Plurima sub initium erat inter nos concertatio, an posset alia institui ratio hypotheseos, quae tot loca planetae eccentrica ad unguem exprimeret? et an falsa esse posset illa, quae id hactenus per omnem zodiaci ambitum praestitisset?

Ostendi igitur ex iis, quae prima parte praemissa sunt, posse esse falsum eccentricum et tamen observationibus intra $5'$ et propius respondere, dummodo verum sit punctum aequatorium. Quod vero parallaxes orbis annui attineret et latitudines, eam palmam adhuc in medio sitam nec dum obtentam ab illorum hypothese: reliquum igitur esse, ut inquiratur, an non alicubi per $5'$ illi cum suo calculo ab observationibus dissideant.

Coepti igitur explorare operationis ipsorum certitudinem. Ex eo quoniam fuerint in hoc labore successus, taediosum et inutile est repetere. Persequar autem ex hoc quadriennali labore illa tantum, quae ad cognitionem nostrae methodi pertinebant.

Caput VIII.

Tabula Tychonis Brahe observatarum et computatarum oppositionum Martis cum linea medii motus Solis, ejusque examen.

Igitur tabula, de qua supra, fuit ista.

Planetæ ♂ motus in suo eccentrico e certis observationibus acronychiis per annos 20 (ab 1580 usque 1600) sedulo per nostra instrumenta habitis respectu variarum dispositionum, uti in subjecta tabula patet, accurata restituito.

Tempus æquale ♂			Long. obs. resp. circuli ♂			Latitudo vera obs.			Long. obs. resp. eclipticæ			Differentia			Simpl. Long. ♂			Apog. ♂			Præcessio æquin. nostra.			Supput.		
Anni	Mens.	D.	H. M.	°	'	"	°	'	"	°	'	"	'	"	°	'	"	°	'	"	°	'	"	°	'	"
1580	Nov.	17.	9. 40	6. 50.	10	II	1. 40.	0	B	6. 46.	10	4. 10	+	0. 27.	29. 46	3. 25.	21. 40	27. 58. 50					6. 50. 40			
1582	Dec.	28.	12. 16	16. 51.	30	☉	4. 6.	0	B	16. 46.	10	5. 20	+	2. 11.	34. 56	3. 25.	22. 17	28. 0. 38					16. 51. 26			
1585	Jan.	31.	19. 35	21. 9. 50		☾	4. 32.	10	B	21. 10. 26		0. 36	—	3. 22.	37. 46	3. 25.	22. 55	28. 2. 25					21. 9. 41			
1587	Mart.	7.	17. 22	25. 5. 10		mp	3. 38.	12	B	25. 10. 20		5. 10	—	5. 3.	27. 46	3. 25.	23. 32	28. 4. 10					25. 4. 50			
1589	Apr.	15.	13. 34	3. 54. 35		III	1. 6. 45		B	3. 58. 10		3. 35	—	6. 16.	53. 7	3. 25.	24. 10	28. 5. 55					3. 54. 33			
1591	Jun.	8.	16. 25	26. 43		0 N ^{*)}	3. 59.	0	M	26. 32. 0		10. 20	+	8. 7.	47. 30	3. 25.	24. 48	28. 7. 47					26. 40. 23			
1593	Aug.	24.	2. 13	12. 35.	0	†	6. 3.	0	M	12. 43. 45		8. 45	—	10. 10.	53. 50	3. 25.	25. 26	28. 9. 40					12. 34. 36			
1595	Oct.	29.	21. 22	17. 56.	5	☾	0. 5. 15		B	17. 56. 15		0. 12	+	0. 8.	26. 47	3. 25.	27. 35	28. 11. 27					17. 57. 14			
1597	Dec.	13.	13. 35	2. 34.	0	☉	3. 33.	0	B	2. 28. 0		6. 0	+	1. 24.	55. 47	3. 25.	29. 5	28. 13. 20					2. 32. 20			
1600	Jan.	19.	9. 40	8. 18. 45		☾	4. 30. 50		B	8. 18. 0		0. 45	—	3. 6.	46. 16	3. 25.	30. 6	28. 15. 5					8. 19. 57			

*) P. notat observationem Patavinam a Magino habitam cum Gellio Saceride Brahei discipulo.
N. observationem nostram (id est Brahei) Uraniburgi habitam. *)

Emendatio medii motus; long. δ inventa est ad initium anni 1585 abundare a numeris calculi Prutenici sesquialtero saltem minuto, vel ad summum $1\frac{3}{4}'$; quod rectius per omnia consentire videtur. Defecit autem tunc apogaei ejusdem situs ab ipso calculo eodem tempore $5^{\circ} 2'$, utrisque ad primam stellam γ more Copernicano comparatis. Hinc colligitur juxta nostram ab illa stella aequinoctii verni in antecedentia remotionem, quae erat tunc $28^{\circ} 2\frac{1}{2}'$; fuisse apogaeum δ in $23^{\circ} 25' \Omega$. Primo hic exposito in parte $23^{\circ} 20' \Omega$, ultimo in $23^{\circ} 45' \Omega$.

Inventa quoque eccentricitas maxima, quae ab utriusque circelli semidiametro componitur part. 20160, qualium semidiameter epicycli majoris, sive distantia centrorum a Copernico usurpata 16380; quae tamen utraque tam ab ipso quam a Ptolemaeo dissentit. Cautum, ubi fuit opus, de refractione parallaxis adhibita Solaris.

Examen mediorum motuum Solis instituimus ad expressa momenta temporis aequalis, quot tabula profitetur. Est autem ille locus \odot medius, in cujus opposito tabula δ stellam inventam dicit respectu eclipticae.

Anno	D.	Mens.	h.	Medius locus \odot				Visus locus stellae in ecliptica	Differentia	
				s.	o	'	"	'		
1580	17	Nov.	9. 40	8.	6.	48.	32	46. 10	2. 22	—
1582	28	Dec.	12. 16	9.	16.	50.	58	46. 10	4. 48	—
1585	31	Jan.	19. 35	10.	21.	10.	13	10. 26	0. 13	+
1587	7	Mart.	17. 22	11.	25.	5.	57	10. 20	4. 23	+
1589	15	Apr.	13. 34	1.	3.	53.	32	58. 10	4. 38	+
1591	8	Jun.	16. 25	2.	26.	45.	24	32. 0	13. 24	—
1593	24	Aug.	2. 13	5.	12.	34.	36	43. 45	9. 9	+
1595	29	Oct.	21. 22	7.	17.	56.	17	56. 15	0. 2	—
1597	13	Dec.	13. 35	9.	2.	28.	51	28. 0	0. 51	—
1600	19	Jan.	9. 40	10.	8.	18.	43	18. 0	0. 43	—

Vides hic medium locum Solis ab oppositione visi loci Martis ecliptici abesse interdum $13\frac{1}{2}'$, quod est fere triplum ejus, quod per translationem hypothesos peccari potuit. Quare non constringebat me ipsorum hypothesos certitudo, ne aliam quaererem.

Sed consilio admisere hanc discrepantiam: quod inde apparet, quia cum nodi sint circa $17^{\circ} \gamma$, η , limites circa $17^{\circ} \Omega$, ω , ut infra dicetur, additiones et subtractiones sunt factae potissimum in $17^{\circ} \odot$, $25^{\circ} \eta$, $4^{\circ} \eta$, $27^{\circ} \gamma$, $13^{\circ} \gamma$, locis intermediis: nullae in $21^{\circ} \Omega$, $18^{\circ} \eta$, nodis et limite. Ergo causa ipsis fuit, quod existimarent, planetam non exui inaequalitate secunda, nisi Sol tantum a nodo discessisset, quantum planeta in sua orbita. Neque tamen constans fuit hoc consilium. Nam in $3^{\circ} \odot$ maxima debuit esse variatio secundum hanc eorum mentem, quia \odot est vicinissimus 45° , ubi solet esse maxima haec variatio. At in $17^{\circ} \odot$ 5' subtrahere, in $3^{\circ} \odot$ tantum 1'. Cujus rei causa jam alia tabella sequitur, comparans loca (ad orbitam Martis reducta) cum locis \odot mediis ad haec momenta.

Medii loci Solis scrupula.	Scrupula visi loci Martis in orbita.	Differentia.
" "	" "	" "
48. 32	50. 10	1. 38 +
50. 58	51. 30	0. 32 +
10. 13	9. 50	0. 23 -
5. 57	5. 10	0. 47 -
53. 32	54. 35	1. 3 +
45. 24	42. 0	3. 24 -
34. 36	35. 0	0. 24 +
56. 17	56. 5	0. 12 -
28. 51	34. 0	5. 9 +
18. 43	18. 45	0. 2 +

Quare ne sic quidem omnem confecerunt differentiam.

Porro de hoc ipsorum consilio disputabimus paulo post. Jam etiam medium motum \odot examinabimus: cujus gratia vide sequentem tabellam.

Scrupula prima et secunda motus medii.

Computavi ex Brahe tabula.	Prostantur.	Differentia.
" "	" "	" "
29. 9	29. 46	0. 37 +
35. 26	34. 56	0. 30 -
37. 4	37. 46	0. 42 +
27. 16	27. 46	0. 30 +
52. 33	53. 7	0. 34 +
46. 45	47. 30	0. 45 +
53. 18	53. 50	0. 32 +
26. 5	26. 47	0. 42 +
54. 48	55. 47	0. 59 +
45. 39	46. 16	0. 37 +

Parum igitur in longitudine media desidero: nam quod ubique fere dimidium scrupulum abundat, fieri potest propterea, quod ego ex recentissima tabula motus medios computavi, in qua forte aliquid est immutatum certo consilio.

Sequitur tabula locorum eccentricorum Martis.

Computavi ex Braheanis.	Prostantur.	Differentia.
" "	" "	" "
49. 37	50. 40	1. 3 +
52. 59	51. 26	1. 33 -
9. 47	9. 41	0. 6 -
4. 49	4. 50	0. 1 +
54. 46	54. 33	0. 13 -
34. 45	40. 23	5. 38 +
33. 59	34. 36	0. 37 +
57. 37	57. 14	0. 23 -
31. 48	32. 20	0. 32 +
45. 39	46. 16	0. 37 +

Tolerabiliter omnia loca praeter 27° \times . Nam accumulatur hic ex diversis causis aliqua summula. Primum locus Solis est $26^{\circ} 45' 24''$ II. Jam computatus locus orbitae Martis $26^{\circ} 34' 43''$ \times . Et sunt illi adimenda $10' 20''$ ex tabulae sententia, ut reducatur ad eclipticam. Ergo locus eclipticus computatus esset $26^{\circ} 24' 13''$ \times , differentia ab opposito Solis $21' 11''$.

Caput IX.

De reductione loci ecliptici ad circulum Martis.

Sed tempus est, ut de hac reductione ad eclipticam vel orbitam planetae, quae fundamenti loco est, accurate disputemus.

Primum hoc nobis refert haec tabula ex observationibus: latitudinem boream consurgere ab $18^{\circ} \gamma$, in quo fuit $5'$, inde maximam visam in $21^{\circ} \delta$: post decrevisse et in $3^{\circ} \eta$ fuisse adhuc quidem $1\frac{1}{2}^{\circ}$, sed statim in $27^{\circ} \chi$ esse meridianam et valde magnam 4° ; majorem etiam in $13^{\circ} \kappa$. Ex quo colligitur crassiori Minerva, nodum ascendentem esse paulo ante $18^{\circ} \gamma$, descendentem multo post $3^{\circ} \eta$. Ergo circa $17^{\circ} \gamma$ et $17^{\circ} \eta$ erunt nodi, circa $17^{\circ} \delta$ et \approx limites. Itaque cum planum eccentrici Martis sit inclinatum ad planum eclipticae, accidet idem fere quod in ascensionibus rectis partium eclipticae, ut arcubus visis circuli unius non iidem arcus visi de circulo altero respondeant, nisi qui a nodis incepti in limites desinunt. Dico autem arcus visos, quia hic oportet animo segregare eccentricitatem planetae, et perinde agere, ac si iter Martis aequae in orbe fixarum esset ac ecliptica, illamque vere secaret. Et quidem cum quaeritur, quis sit locus planetae eclipticus, astronomi sic eum definiunt, esse nempe punctum eclipticae, in quo circulus latitudinis (ad eclipticam rectus) per locum corporis planetae sub fixis transiens eclipticam secet. (Loco ecliptico opponitur locus orbitae, seu locus ratione orbitae consideratus.)

Patet igitur per demonstrata Theodosii de Sphaera ¹⁶), nisi hic circulus per utriusque circuli (eclipticae et itineris planetarii) polos transeat, semper sectionibus suis inaequales arcus a communi circulorum sectione numeratos intercepturum. Et cum sit is circulus latitudinis ad eclipticam rectus, ergo si non per polos orbitae planetariae transit, erit ad orbitam obliquus. Semper igitur major arcus est inter locum planetae in sua orbita et nodum propiorem, quam inter locum ejus eclipticum et eundem nodum. Cum igitur planetas observamus, non prius nobis persuademus certa eorum loca definiisse, nisi ad eclipticam eos retulerimus; indicantes, in quo eclipticae puncto inveniatur circulus latitudinis per corpus planetae transiens. Est igitur locus eclipticus ob nostram memoriam et captum. Contra cum planetam in sua hypothesi computamus, versamur non in ecliptica, sed in ipso planetae itinere, quod est ad eclipticam inclinatum. Ut igitur observatus locus cum computato possit comparari, oportet aut prolongare arcum, qui est inter eclipticum locum et propiorem nodum, aut decurtare arcum, qui est inter corpus planetae et eundem nodum, ut ex illo fiat locus orbitae, ex hoc locus eclipticus. Id autem fit vel addendo vel minuendo, prout nodus locum planetae vel antecesserit vel secutus fuerit.

Hanc curam Ptolemaeus circa planetas non censuit esse necessariam: Copernicus in Luna non neglexit: Tycho Brahe subtilitatis causa diligenter est amplexus.

Ceterum in hac jam adhibita reductione duo habeo quae desiderem, quorum utrumque eodem elencho et schemate coarguo.

Sit A (Fig. 62) locus nodi sub fixis, AB arcus eclipticae: eique statuatur aequalis arcus AC et sub C videatur planeta. Ducatur etiam ex C arcus perpendicularis in eclipticam, qui sit CE.

Primum igitur veteres putarunt, cum E sit locus eclipticus et C locus

orbitae ipsius I planetae, tunc esse planetam in opposito Solis, cum is est in E, planeta in C spectato. At tabulae conditores putarunt, ut supra dictum est, planetam non esse accurate in Solis opposito, nisi ipsi AC (visibili distantiae planetae a nodo) aequetur arcus AB, elongatio oppositi Solis loci ab eodem nodo.

Atqui res secus habet. Spectatur quidem tunc planeta accurate in Solis opposito, at non est: et commoditas, quam ex oppositione planetae cum Sole quaerimus, plus vitiatur per aequalitatem AC et AB, quam ipsi sperabant eam emendatum iri. Cur enim observantur planetae in Solis opposito? Nimirum ideo, ut careant tunc inaequalitate secunda longitudinis. Atqui opposito Solis in B et planeta in C versante idque inter nodos et limites, planeta plus involvitur inaequalitate secunda longitudinis, quam si oppositus Solis esset in E, manente planeta in C. Sit enim G Sol centrum systematis planetarii, in quo omnes orbes eclipticam secant, idque vel in Copernicana vel Braheana forma: et connectatur G cum A et E punctis eclipticae; et in linea EG sit Terra, scilicet in puncto H. Connectatur H cum C: et ex puncto H spectetur G Sol in opposito ipsius E, planeta vero ex eodem H spectetur in C loco suo sub fixis in linea HC. Est igitur in hac visione planeta certo in linea HC. Est vero multo inferior fixis. Sit in lineae HC puncto I: et ex G per I ducatur recta, quae incidet in arcum CE: totum enim planum CEHG est sub arcu EC. Sit locus incidentiae F, et ex A per F in BC ducatur tertius arcus AF, secans BC in D. Manifestum est, planum eccentrici planetae ex H in C visi non ordinari sub AC, sed sub AF; et Solis opposito in E versante, planetam futurum vere sub F, illo vero in B collocato, hunc futurum sub D, siquidem utrinque appareat sub C. Est vero AD brevior quam crura isoscelis BAC. Ergo B oppositus Solis plus ab A removetur quam D locus, sub quo planeta est momento ab ipsis usurpato. Sol igitur vere ultra oppositum veri loci planetae stat. At hoc est contra ipsorum propositum.


At neque si orbita planetae sub AC esset, propterea ipsi AC aequalis esset sumenda AB. Nec enim, quia orbita haec vere est sub AD, propterea ipsi AD aequalis sumi debet AB. Nam quia planeta ideo in Solis opposito observatur, ut exuat inaequalitatem secundam longitudinis, longitudo autem censenda in ipsa genuina planetae orbita vel ei superstante AD; certe nisi oppositus Solis cadat in arcum ad ipsam orbitam rectum per locum planetae ductum, hoc est nisi ADB sit rectus, non erit B oppositus Solis junctus ipsi D secundum longitudinem. At vero si ADB rectus, tunc AB est longior quam AD, non igitur aequalis. Plane itaque convellitur illa aequalitas arcuum AC et AB in tabula affectata.

Quamquam quod effectum attinet, subtiliores sunt hae differentiae, quam ut discerni possit. Itaque neque ego refugio, quin oppositus Solis in E sit, AEF recto, quare AFE acuto existente, quamvis jam demonstratum sit, potius AFE rectum esse debere. Sed contra novam subtilitatis affectationem subtilibus etiam rationibus fuit agendum. Sequitur nunc etiam damnum ex hac subtilitate ortum.

Fig. 62.



Fig. 62.



Secundo igitur hoc desidero, quod in tabella reducendi rationem non bonam secuti sunt. Nam dato E loco Martis ecliptico et EC latitudine visa, computarunt ipsius AC longitudinem et posuerunt, tunc planetam in orbita sua quantitate AC a nodo removeri. Atqui orbita planetae (cujus primam inaequalitatem investigamus) non est sub AC sed sub AD, ut jam ostensum. Nihil igitur attinet arcus AC ad inaequalitatem primam, sed adulterat veras planetae elongationes ab A. Etenim visa latitudo est EHC, vera autem puncti F latitudo, seu inclinatio lineae GF ad eclipticam, est EGF. Itaque etsi secunda inaequalitas longitudinis absorbetur in oppositione cum Sole, latitudinis tamen inaequalitas secunda tunc est fere maxima et mensura ejus est HIG angulus. Quemadmodum igitur tota latitudo EC efficit, ut AC longior sit quam AE arcu EB: ita et pars hujus latitudinis visae FC vel HIG, quae est ex inaequalitate secunda, efficit, ut eadem AC longior sit quam AF: longior igitur justo. Atque hoc peccatum contemni non potest; excurrit enim ad 9'.

Potuit error vel ex eo deprehendi, quod angulus BAC,

- , quem tribuerunt inclinationi planorum eclipticae et orbitae Martis, non manet constans. Id enim ex resolutione patet, si quantam
- 4. 58 additionem tabula exprimit, tanto auctum ponas arcum AC exque
- 4. 58 eo et EC computes EAC angulum. Prodeunt enim anguli ut in
- 4. 0 adjecta tabella: ex qua apparet, in semicirculo boreali ipsos fere
- 4. 33 posuisse angulum maximae latitudinis borealis $4^{\circ} 33'$, in australi
- 5. 29 austrinae $6^{\circ} 26'$. Igitur planum eccentrici in subtensa nodos con-
- 6. 20 nectente, quae per Solem vel Terram transit, esset quodammodo
- 6. 26 infractum, quia minus inclinaretur pars superior quam inferior. Quin
- 4. 30 imo totum iter seu planum eccentrici planetae esset flexuosum, qualis
- 4. 22 est ipsa via per visas Martis latitudines sub fixis descripta, quae
- 3. 10 circulus non est.

Haec autem omnia simplicitati motuum coelestium sunt adversa; quod experientia multis exemplis docebit.

Vera igitur ratio reducendi ad orbitam est haec, ut cognito ex observationibus E loco planetae in ecliptica quaeratur angulus EGF inclinationis ejus loci, methodo quae infra sequetur: tunc quia E rectus, ex AE et EF, mensura anguli EGF, per doctrinam triangulorum quaeratur AF vel pro EF adhibeatur EAF angulus perpetuus. Cumque ex argumentis iis, quae inferius explicabo, appareat, angulum EAF in stella Martis esse non majorem $1^{\circ} 50'$ circiter, reductio quoque circa 45° a nodo omnium maxima non superat $1'$, pro quo tamen tabula alicubi $8'$ et $10'$ jubet addere. Quare ob hanc quoque causam peccare potest hypothesis ad $7'$ et $9'$, eo quod observationes, quae erant fundamenti loco, per hanc reductionem nonnihil damni sunt passae. Quare multo minus quam antea impediabar ab inquisitione novae hypotheseos.

Caput X.

Consideratio ipsarum observationum, ex quibus venatus est Tycho Brahe momenta oppositionum cum medio Solis.

Non praetereundum erat in tam subtili inquisitione, quin ipsa fundamenta penitus inspicerem. Et copiam mihi fecerat Braheus utendi suis observationibus. Sic igitur inveni.

I. Anno 1580 d. 12. Novembris hora 10. minut. 50. reponebant δ in $8^{\circ} 36' 50''$ II, sine mentione variationum horizontalium, quo nomine parallaxes diurnas et refractiones in sequentibus intellectas volo. Haec igitur observatio est longinqua et solitaria. Reducta fuit ad articulum oppositionis, usurpatione motus diurni ex Prutenicis. Nam in Maestlino die 12. in meridie δ ponitur in $8^{\circ} 20'$ II, die 17. rursum in meridie in $6^{\circ} 25'$ II. Ergo motus 5 integrarum dierum esset $1^{\circ} 55'$. In Stadio *) $1^{\circ} 52'$. Itaque die 17. hora consimili 10. 50' Mars debuit videri vel in $6^{\circ} 41' 50''$ II vel in $6^{\circ} 44' 50''$: hora 9. 40' (quem Tycho ponit articulum observationis) per $1' 4''$ promotius, nempe vel in $6^{\circ} 42' 54''$ vel in $6^{\circ} 45' 54''$. Ponunt $6^{\circ} 46' 10''$ II. Vides hanc oppositionem (quod scrupulositatem attinet) esse paulo incertiore, quod utatur diurno non observato sed aliunde mutato, qui ipse apud diversos auctores per hos 5 dies tribus scrupulis a se ipso dissidet.

II. Anno 1582 d. 28. Dec. h. $11\frac{1}{2}$ reponebant δ in $16^{\circ} 47'$ ☉ ex observatione. Sequitur $46'$ postea momentum oppositionis a Tychone assignatum, quibus planeta non integrum scrupulum retrocedit. Ponit igitur Tycho $16^{\circ} 46' 10''$ ☉. Hic adjectu schedae affectabatur correctio per refractionem $2'$, quam puto fuisse rudimentum nascentis tunc opinionis de refractionibus. Secutus autem est locum observatum illibate; quare non considerabat planetam quasi qui locum permutet: nec opus erat, utpote in ☉ extra refractiones et in medio coeli, ubi in ☉ longitudinis parallaxis nulla est.

III. Anno 1585 d. 31. Jan. h. 12. reponitur δ in $21^{\circ} 18' 11''$ ♍ et motus diurnus observationum collatione fuit $24' 15''$. Sequitur momentum oppositionis h. 19. 35' per horas 7. 35', quibus diurnus competit $7' 41''$ in antecedentia. Ergo momento destinato fuerit in $21^{\circ} 10' 30''$ ♍, quod et assumptum est. Nulla parallaxeos mentio. De refractione non erat necessarium, quia δ altus et in medio coeli. Itaque monitiunculam de refractione in tabula (jure) neglectam invenio.

IV. Anno 1587 ad 7. Martii h. 19. 10' deduxerunt locum δ ex observationibus, quod fuerit $25^{\circ} 10' 20''$ ♍. Hunc retinuerunt in tabula: tempus mutaverunt in h. 17. 22'. Differentia h. 1. 48' per diurnum $24'$ totidem (nempe $1' 48''$) efficit scrupula, non plus. Debuisset igitur $25^{\circ} 8' 32''$ ♍: quod et propius accedit ad oppositum Solis. Differentia nullius fere momenti.

V. Anno 1589 ad 15. Apr. h. 12. 5' magna diligentia constituerunt locum δ $3^{\circ} 58' 21''$ ♏ et correxerunt per parallaxin longitudinis, ut esset $3^{\circ} 57' 11''$. Supersunt horae 1. 30' ad momentum oppositionis assignatum, quae per diurnum $22'$ retroagunt planetam per $1' 22''$, ut sit in $3^{\circ} 55' 49''$. Assumsere $3^{\circ} 58' 10''$. Illud propius est medio motui Solis.

VI. Anno 1591 d. 6. Jun. h. 12. 20' ponitur δ in $27^{\circ} 15'$ ♏. Super-

sunt ad momentum assignatum d. 2. h. 4. 5'. Et diebus 4 inventus fuit promoveri per $1^{\circ} 12' 47''$. Competunt igitur diebus 2 h. 4. 5': $39' 29''$. Itaque ad momentum δ in $26^{\circ} 35' 31''$ \times . Variationibus horizontalibus in longum non est opus, quia δ in M. C. et initio δ . Tabula $26^{\circ} 32' \times$ habet.

VII. Anno 1593 d. 24. Aug. h. 10. 30' referunt δ in $12^{\circ} 38' \times$ cum diurno $16' 45''$ observato, idque circa nonagesimum, ubi parallaxis longitudinis nulla. Praecesserat momentum oppositionis assignatum, horis 8. 17' (erat enim h. 2. 13'), quibus competit motus $5' 48''$ in consequentia. Itaque in $12^{\circ} 43' 48'' \times$ cadit planeta. Et tabula $12^{\circ} 43' 45''$ habet.

VIII. Anno 1595 d. 30. Oct. h. 8. 20' invenerunt δ in $17^{\circ} 48' \times$ cum diurno $22' 54''$. Praecessit momentum assignatum horis 11. 48', quibus debetur motus δ $2' 7''$ in consequentia, ut fuerit in $17^{\circ} 59' 7'' \times$. Sed projectus erat in orientem ob parallaxin. Itaque illi forsitan ex alia meridiana observatione ponunt in tabula $17^{\circ} 56' 15'' \times$.

IX. Anno 1597 d. 10. Dec. h. 8. 30' semel δ reponunt in $3^{\circ} 30' \odot$, iterum in $4^{\circ} 1' \odot$: quorum medium est $3^{\circ} 45' \frac{1}{2}' \odot$. Secutum est momentum oppositionis post dies 3. h. 5. 5', quibus ex Magino competunt $1^{\circ} 15'$ in antecedentia. Ergo fuisset δ in $2^{\circ} 30' \frac{1}{2}' \odot$, qui in $2^{\circ} 28'' \odot$ reponitur in tabula. Causa observationis crassae per radium, ex tempore patet. Excesserat Tycho ex insula relictis instrumentis praeter radium: neque tamen negligere omnino volebat hanc oppositionem. Utinam vero mansisset hactenus. Eximia enim erat hujus oppositionis opportunitas (nec intra hominis aetatem adeo saepe recurrens) ad parallaxes Martis probandas.

X. Anno 1600 d. 13/23. Jan. h. 11. 50' erat ascensio recta δ

ex lucido pede II	134. 23' 39''
ex corde Ω	134. 27. 37.
ex Polluce	134. 23. 18.
Hora 12. 17' — ex 3. alae mp	134. 29. 48.
Medium ex aequo et bono	134. 24. 33.

Hinc δ in $10^{\circ} 38' 46'' \Omega$ idque h. 11. 40' tempore aequato et ad Uraniburgicum meridianum reducto. Die vero $\frac{24. Jan.}{3. Febr.}$ eadem hora in $6^{\circ} 18' \Omega$ collocabatur. Hinc diurnus prodibat $23' 44''$ et ad d. 19/29. Jan. h. 9. 40' locus in $8^{\circ} 18' 45'' \Omega$, uti et posuerunt.

Porro hanc discrepantiam ascensionum rectarum posui ideo, ut ostenderem, etiam in ipsa observatione aliquot minutorum incertitudinem inesse, nisi ubique summa diligentia adhibeatur nullis destituta commoditatibus. Venerant tunc instrumenta (nec ea maxima) in Bohemiam; necdum satis erant bene collocata et praeterea affecta ab itinere. Sed tamen usu venit saepius etiam in observationibus insularis, ut ascensiones rectae a duabus stellis deductae discrepent 3'. De quo cum consulerem Christianum (Longomontanum), an observationum seu visus imbecillitate accidere credere deberem, respondit: non insolens hoc esse.

Denique hoc quoque hic est monendum, profiteri Tychonem in tabula, se parallaxibus Solaribus usum in corrigendis locis Martis. At jam statim patebit, lubricum et imperceptibile esse negotium parallaxeon Martia. Parum tamen hoc efficit ad locorum hujus tabulae certitudinem, quia δ fere semper in medio coelo potest observari vacuus longitudinis parallaxi.

Caput XI.

De parallaxibus diurnis stellae Martis.

Initium novi mei laboris et restitutionis motuum inde ubi jam cessavi. Nam ex parte prima patet, assumenda quidem loca \odot sub oppositionum cum \odot verarum articulos, sed tamen sic non omnem exui inaequalitatem secundam, sed opus esse ut arcus in ecliptica numeratus reducat ad orbitam planetae. At orbita planetae prius est investiganda per inclinationem planorum et per nodorum cognitionem. Rursum inclinatio et nodi nequeunt sine parallaxi diurna cognosci siquidem haec sit grandiuscula. A parallaxi igitur incipiendum, cujus inquirendae modos duos ponam.

Prior modus (usitatus et ceteris) examinabitur in observationibus Braheanis.

Anno igitur 1582 cum \odot opponeretur \odot in \odot , incredibilem inveni diligentiam in observando, cum titulo Tychonis manuscripto pro inquirendis parallaxibus Martis, sed ex qua aut plane nullam aut perexiguam elicueris Martis parallaxin. Taceo quod (more solito) stellam \odot compararunt ad stellas eclipticae vicinas et plerumque longe distantes. Cum igitur comparatione matutinae et vespertinae observationis soleat inquiri parallaxis stellae mobilis (\odot enim \odot oppositus incedit motu retrogrado), hinc factum, ut fere ab aliis stellis mane, aliis vesperi \odot fuerit observatus. Cujus enim fixae mane copia fuit (altioris quippe quam est \odot) ea, si sit eclipticae vicina, vesperi (\odot jam in plaga occidentali versante) aut occidit aut ob refractionem inepta est in hoc subtili negotio. Alia igitur substituenda fuit. At si stellae fixae aliae aliis permutentur, semper minor fides est negotio, quam si eadem retineatur.

Cum autem Braheus passim viris doctis affirmaverit, ex hujus anni observatis inventam esse parallaxin \odot notabiliter majorem Solari, ego ut operationem seu calculum hunc penitus inspicere possem, totum librum diligentissime perlustravi. Et inveni quidem titulum, qui rationem profiteretur inquirendi parallaxin \odot ex illius anni observationibus. Sed en rem inopinatam. Locum \odot observando inventum accommodarunt ad schema Copernicanum, operosissime et diligentissime delineatum. In eo schemate immanem sumserunt laborem, omnia triangula, quae causa duplicis epicycli in concentrico nascebantur, solvendi numeris prolixissimis, tandemque hic erat finis calculi, ut pronunciarent, parallaxin Martis vere fieri majorem Solari. Aliud igitur Braheus proposuerat, aliud ministri calculi sunt exsecuti. Ille volebat, ut ex matutinis et vespertinis observationibus inter se comparatis inquirerent parallaxin Martis: hi vero inquisiverunt, quantam parallaxin faceret schema Copernicanum. An igitur ex hac sola suorum ministrorum fide Braheus de parallaxibus pronunciaverit, incertum est mihi. ¹⁰)

Nos ipsa observata (quantum ad negotium nostrum attinet) consulamus: Anno 1582 nocte inter 23. et 24. Nov. distantiae a fixis eadem manserunt diversis horis. Hic igitur stationis terminus fuit. Sequentis bidei motus fuit 11' et 15'.

Nocte diei 26. Dec. transiit inter secundam et septimam Π distans (per radium) a capite inferioris Geminorum seu a secunda $2^{\circ} 25'$ vel $2^{\circ} 26'$, sed a septima $1^{\circ} 8'$ vel $1^{\circ} 7'$, ut latitudo fuerit $4^{\circ} 9'$ circiter. Hora igitur

8. 28' distabat ab oculo γ $44^{\circ} 41'$, cujus latitudo $5^{\circ} 31'$ anst., longitudo $4^{\circ} 12\frac{1}{2}'$ II anno 1600. Hinc δ longitudo quasi anno 1600. $17^{\circ} 53\frac{1}{3}'$ ☿, hoc est completo 1582. $17^{\circ} 38'$ ☿; altitudo $40^{\circ} 50'$, extra refractionem igitur.

Vicissim h. 7. 15' matutina diei 27. Dec. distabat a corde ζ $36^{\circ} 43'$, cujus latitudo $0^{\circ} 26\frac{1}{2}'$, hinc ejus longitudo 1582 completo $17^{\circ} 28\frac{1}{3}'$ ☿, altitudo $14^{\circ} 4'$, in refractione igitur. Ab hora ergo 8. 28 $\frac{1}{2}$ vespertina in horam 19. 15' per horas 10. 46 $\frac{1}{2}'$ visus est retrocedere per $9\frac{3}{4}'$.

Pro diurno, notata die 29. h. 7. 47' distantia δ a pede Erichthonii australi $29^{\circ} 38\frac{1}{2}'$. Die vero 30. h. 8. 8' distantia ab eodem fuit $29^{\circ} 13\frac{1}{2}'$. Igitur horis 24. 21' mutata est per 25'. Atque hic diurnus mansit etiam die 27. Horis ergo 10. 46 $\frac{1}{2}'$ debebantur $11\frac{1}{2}'$: at vidimus tantum $9\frac{3}{4}'$. Haec expendamus. Parallaxis vesperi praecedente surgentem Martem orientaliorem (quia retrogradus) projicit in ortum, mane cadentem et occidentaliorem projicit in occasum. Sicut igitur parallaxis Lunae diurnae motum retardat ad visum: sic vicissim eadem parallaxis δ motum retrogradum accelerat. Si ergo sentitur parallaxis, per motum retrogradum nimis auctum sentitur. At hic diminutus est motus. Nulla igitur parallaxis. Vicissim vero contraria parallaxi refractione sentitur. Est autem refractione altitudinis 13° : $4'$ ex tabella fixarum, $8'$ ex tabella Solis (Prog. I, p. 79 et 280), cujus minima pars cedit longitudini, quia Cancer valde oblique descendit. Trium igitur ad summum minorum contigit refractione longitudinis, quae ad $9\frac{3}{4}'$ addita constituunt $12\frac{3}{4}'$ motum horarum $10\frac{3}{4}$ refractione liberum, qui si parallaxi etiam caruisset, debuit esse $11\frac{1}{2}'$. Ergo excessus $1\frac{1}{2}'$ est parallaxis longitudinis utriusque observationis: quod est plane minimum infidum et contemptum quippiam.

Die 16. Jan. anni 1583 vesperi hora 7. 30' δ distabat a lucido pedis Erichthonii $23^{\circ} 29'$, altitudo 51° . Sequenti mane hora 5. a corde ζ $43^{\circ} 58'$, in altitudine 15° . Et δ per regulam apparebat exequite cum utraque stella in eadem recta. Itaque cum motus δ versetur in hac linea, notavit Braheus, dari hinc parallaxin longitudinis adhibito diurno δ . Hic vero sic habetur. Die 16. Jan. h. 10 $\frac{1}{2}$ distabat a lucida pedis Erichthonii $23^{\circ} 27'$. Die 17. Jan. h. 10 $\frac{1}{6}$ ab eodem $23^{\circ} 12\frac{1}{2}'$. Diurnus ergo esset $14\frac{1}{2}'$. Ut igitur Braheo monenti pareamus, constituenda nobis est distantia pedis Erichthonii et cordis Leonis, quae invenitur $67^{\circ} 21'$. Hinc ablata distantia δ a lucida pedis Erichthonii $23^{\circ} 29'$, relinquit δ a corde Leonis $43^{\circ} 52'$ vesperi h. 7 $\frac{1}{2}$, quae mane hora 5. fuit $43^{\circ} 58'$ per $6'$ auctior. Horae intersunt $9\frac{1}{2}$, quibus de diurno debentur $5\frac{5}{8}'$. Hic ergo aggregatum utriusque parallaxeos non plus $0\frac{5}{8}$, nisi quod ei tantum accedit, quanta est δ refractione longitudinis in altitudine 15° . Hoc vero valde parum est; nam Cancer et Leo obliquissime descendunt, et δ latitudo magna borealis effecit, ut δ et cor ζ fere essent in eadem altitudine.

Die 17. Jan. vesperi h. 5. 20' δ a pede Erichthonii $23^{\circ} 16'$. Sequentis diei 18. mane h. 3. distantia haec fuit $23^{\circ} 9'$, vesperi h. 5. 5' fuit $23^{\circ} 1\frac{1}{2}'$. Itaque motus horarum 23. 45' est $14\frac{1}{2}'$, horarum vero 9. 40' est $7'$, debuit esse $6'$. Retinemus pro parallaxi longitudinis non plus $1'$. Refractione nihil turbat: nam utrinque δ altitudo fuit circiter 30° .

Sic a septima II h. 7. 34' distabat $7^{\circ} 51'$. Hora matutina 4. 52' distabat ab eadem $7^{\circ} 59'$. Horis igitur 9. 18' minuta 8; uno minuto sumus instructiores quam antea. De hac stella (in axilla II) sic scripsit

Braheus. „Nota, propterea distantiam δ ab hac stella accipio, quia cursus ejus quasi ab ea procedit, ut mane et vesperi distantia collata parallaxin δ ostendat.“ Quod transscribere volui, ut lector certum habeat, Braheo consilium non defuisse.

18. Jan. vesperi h. 8. 52' inter δ et cor Ω 44° 22'. Mane hora 4 $\frac{3}{4}$ eadem distantia 44° 27 $\frac{1}{2}$ '. Motus ergo horarum 7. 53': 5 $\frac{1}{2}$ '. Sequenti 19. Jan. h. 7. 3' fuit haec distantia 44° 32 $\frac{1}{2}$ '. Horarum igitur 22. 11' motus est 10 $\frac{1}{2}$ '. Et horis 8 debentur minus quam 4'. Lucramur pro parallaxi circiter 1 $\frac{1}{2}$ '.

Sed age, computemus ad diem 17. Jan. quantum debuerit esse augmentum motus horarii, ex parallaxi majori quam Solaris usitate creditur. Quia enim putamus, parallaxin Solis esse 3', habeat Mars 4'.

Anno 1583 d. 17. Jan.	h. 5. 20'	h. 15. 0'
Locus \odot	7° 22' \approx	7° 31' \approx
Ejus ascensio recta	309. 47.	309. 56.
Adde horaria tempora	79. 0.	225. 0.
Ascensio recta medii coeli	28. 47.	174. 56.
Gradus medii coeli	0. 56. δ	24. 29. \mp
Declinatio	11. 50.	2. 12. .
Ascensio obliqua ortus	118. 47.	264. 56. .
Gradus oriens	19. 41. Ω	26. 0. \mathfrak{M}
Nonagesimus ab ortu	19. 41. δ	26. 0. Ω
Inter grad. med. coeli et nonag.	18. 45.	28. 29.
Inter grad. med. coeli et vertic.	44. 5.	53. 43. Ergo
Inter verticem et nonages.	40. 40.	47. 41. hoc est
Altitudo nonagesimi	49. 20.	42. 19.
Respondet parallax. long. horis.	2. 36''	2. 58''
Et quia δ circa	10. 0. \odot	10. 0. \odot , ergo
Inter δ et nonagesimum	50. 19.	46. 0.
Respondet longitudinis parallaxis	2. 0'' in ortum,	2. 8'' parall. in occasum.

Sequitur motum δ horarium 4' debuisse videri majorem illo, qui ex diurno proportionaliter sequitur. Quod cum observationes repudiant, non est igitur δ parallaxis tanta.

Similes exstant observationes anno 1585, 1595 et passim, ex quibus parallaxis invenitur perexigua, saepe nulla. Nonnunquam et in contrarium rem recidissee manu Brahei annotatum fuit. Hic igitur primus modus esto parallaxeos δ inquirendae.

Jam alterum modum pulchritudinis causa addam, in quo Braheanis observationibus uti non possum. Meis igitur dum utor, exhibebo tibi spectaculum ridiculum, et docebo exemplo, ad quid Braheo opus fuerit tanta diligentia, instrumentorum subtilitate, ministris et reliquo apparatu. Duo mihi sunt instrumenta, quibus utor ex liberalitate G. D. Joh. Frederici Hoffmanni L. B., sextans ferreus et quadrans azimuthalis orichalcinus; iste duum semis, ille trium et semis pedum diametro, in singula scrupula uterque distinctus. (Comp. Vol. II, p. 760.)

Igitur hoc ipso tempore 1604, quo de parallaxibus cogito (Solis magis an δ haud queo dicere; nam postulat Hipparchus meus suis etiam eclipsibus Lunae a δ subsidium), commodissima se obtulit occasio observandi, si sub alio climate fuisset, Marsque altius paulo incessisset. Mars namque simul in longum et latum immotus haesit circa 19/29. Febr. anni hujus 1604,

idque in \sphericalangle , quare ab exortu δ usque in ipsum \odot exortum continuo decrescit angulus horizontis cum ecliptica. Itaque secundum cap. IX. Astronomiae Opticae parallaxis, si qua est latitudinis, continue crescit. Ex incremento vero per parallacticae columnas, e regione initialis et finalis anguli eclipticae cum horizonte quaesito, cognoscitur in fronte columnae parallaxis tota horizontalis.

• Sequitur series mearum observationum.

Nocte inter dies Jovis et Veneris, qui fuere $17\frac{1}{2}$, Febr. interea dum Corvus coelum mediat, erat inter δ et Spicam $9^{\circ} 44'$, inter eundem et Lancem boream $17^{\circ} 41'$; inter δ et Arcturum $29^{\circ} 13'$. Ut autem probaretur sextans, mensi sumus etiam, quod est inter Arcturum et Spicam $32^{\circ} 57'$, quod tamen debuit esse $33^{\circ} 1' 45''$, ut patet, si calculus consulatur adhibitis seu ascensionibus rectis et declinationibus seu longitudinibus et latitudinibus, quas assignavit Tycho sideribus hisce libro I. Progymnasmatum. Ergo distantiae meae minores justo fuere per $4\frac{3}{4}'$, quibus correxi δ a fixis distantias, ut fuerit a Spica $9^{\circ} 48' 45''$, a Lance $17^{\circ} 45' 45''$, ab Arcturo $29^{\circ} 17' 45''$.

Sumsi autem et altitudinem δ meridianam per quadrantem $32^{\circ} 4'$ et Spicae $30^{\circ} 50'$, quae cum habeat declinationem $9^{\circ} 2'$, relinquitur δ $7^{\circ} 48'$ declinatio. Ostendebat autem altitudo Spicae, non sat bene habere meum perpendicularum, nam altitudo aquatoris est in meo loco $39^{\circ} 54'$, itaque meridiana Spicae $30^{\circ} 52'$, δ $32^{\circ} 6'$. Ex declinatione igitur δ et distantia a fixa prodiit ejus asc. recta:

a Spica	. 305° 57' 36"
a Lance	. 306. 3. 17.
Differentia	. 0. 5. 41.
Medium ergo	306. 0. 26.

Nam certus non sum, annon regula mea, ferrea et ponderosa cum sit, impetu ruens solutis trochleis et impingens (quod factum aliquoties) pinacidia loco moverit, quae sunt luxatilia et exentilia. Sed ex hac ascensione recta primum ex tabula Tychonis ascensionum rectarum excerpitar cooriens in sphaera recta $28^{\circ} 1' 0'' \sphericalangle$, cujus declinatio ex alia ejus auctoris tabula est $10^{\circ} 48' 30''$, δ vero $7^{\circ} 48''$. Ergo abest ab ecliptica via obliqua in circulo declinationis per $3^{\circ} 0' 30''$. Angulus vero quem circulus declinationis facit cum ecliptica, ex peculiari tabula est $68^{\circ} 59'$, ejusque complementum $21^{\circ} 1'$. Et in mea parallactica sub titulo $60'$ invenio e regione $68^{\circ} 59' : 56' 1''$; sub $30''$ vero invenio $28''$. At quia ego in hac distantia δ ab ecliptica (quam appello basin latitudinis) habeo ter 60 ; ergo quod excerpseri sub 60 per 3 multiplico; prodiit mihi latitudo $2^{\circ} 48' 31''$. Idem labor e regione $21^{\circ} 1'$ ostendit mihi, quid loco coorienti sit adimendum, nempe $1^{\circ} 5' 4''$. Itaque δ locus erit $26^{\circ} 56' \sphericalangle$, quantum etiam ex calculo, cujus hoc opere fundamenta sum traditurus, elicio intra unum minutum.

Ad probandam vero latitudinem δ consului et distantiam ab Arcturo, adhibita stellae longitudine et latitudine ex Tychone et loco longitudinis δ jam invento: atque is reponebat mihi δ in latitudinem $2^{\circ} 47' 48''$. Prius $2^{\circ} 48' 31''$.

Die 19/29. Febr. transposueramus pinacidium coepimusque observare δ surgentem. Annotatae sunt autem ejus ab Arcturo distantiae hae: $29^{\circ} 22\frac{1}{2}'$, $24'$, $20'$, $22'$. Puto nos abundare uno denario minutorum: nam flante vento tantummodo carbone ardente lumen ad divisiones fecera-

mus, ut illae nosci possent. Et tunc altitudo δ erat 11° . Post culminavit dorsum α in alt. $62^\circ 37'$, correcto perpendiculari. Ostendebatur igitur altitudo aequatoris $39^\circ 55'$ iuxta proximam. Eo articulo altitudo δ erat 23° . Repetebamus igitur distantiam priorem, quae prodebat $29^\circ 14'$, $19'$, $13'$, $18'$, ergo procul dubio prius erat $12\frac{1}{2}'$, $14'$, $10'$, $12'$.

Refractio enim Martem horizonti vicinum primum attollebat versus Arcturum, post demittebat, Marte altitudinem aliquam acquirente. Sed ut tanta esset uno momento varietas in observando, frigus et penetrantissimi venti efficiebant. Nudis enim manibus ferrum tractari, claudi trochlea nequibat, tectis non secure firmabatur regula, quo ad minutum notaretur. Vindemiatrix altitudinem ostendebat in meridiano $53^\circ 5'$ paulo auctiorem justo, sed Spica $30^\circ 54'$ intra unum minutum justam. Martis culminantis altitudo $32^\circ 6'$ ut ante biduum, et Arcturi $61^\circ 13'$ iuxta. Hinc distantia Martis et Arcturi colligebatur $29^\circ 18\frac{1}{2}'$ per calculum. Cum igitur hoc tempore Mars stationarius fuerit secundum longitudinem, consentiente Prutenico et meo calculo, nihil igitur ratione divagationis in ecliptica potuit mutari in altitudine meridiana. Quare cum penitus eadem manserit (nam de uno scrupulo relinquit nos in dubio instrumentum meum) altitudo meridiana, neque latitudinis ulla interea accidit mutatio.

Die 22. Febr. vel 3. Martii probavimus sextantem, uti eo superius eramus usi, invenimusque inter Canem minorem et superiorem humerum Orionis $26^\circ 2'$, quam ostendit calculus $26^\circ 2' 15''$. Sic inter eundem Canem minorem et Palilicium inventi $46^\circ 22\frac{1}{2}'$, quam Tycho in epistolis indicat esse $46^\circ 22'$. Ergo cum culminaret quinta Leonis, firmata regula instrumenti super $29^\circ 17'$, minus distabant Arcturus et δ , at super $29^\circ 13\frac{1}{2}'$ jam plus distabant, denique in $29^\circ 15'$ culpa nihil poterat. Secuta insperata nubila per totum coelum. Rediit tamen mane 4. Martii serenitas, et cum jam culminasset Antares, posita regula super $29^\circ 19'$ cernebatur stellae utrinque aequaliter, videbatur tamen addendum aliquid: sed per $29^\circ 20'$ jam nimium erat additum. Perfecta observatione Saturnus antecedebat meridianum minus quam Jupiter Saturnum.

Nocte quae sequebatur 29. Febr. vel 10. Martii, luxato interea instrumento, fuit haec distantia primum inter $29^\circ 9'$ et $29^\circ 10'$ semihora prius quam cor Hydrae culminaret. Rursum explorantibus apparebat inter $29^\circ 12'$ et $29^\circ 13'$, quod jam altior esset et liber a refractionibus. Nam peracta hac observatione habebat altitudinem $19\frac{1}{6}^\circ$. At paulo post (nescio an luxato pinacidio) non potuit tolerari tanta: videbatur enim $29^\circ 9\frac{1}{2}'$. Cauda α quasi dimidio gradu aberat a medio coeli. Tunc altitudo δ $24\frac{1}{4}^\circ$. Cauda α culminans intra minutum justam habuit altitudinem $56^\circ 44'$. Cum de distantia δ et spicae tertia pars transisset meridianum, primo videbatur nobis $29^\circ 9\frac{1}{2}'$, non admodum bene applicato cylindro, qui erat praelongus. Ergo paulo post non potuit hoc tolerari, sed videbatur requiri $29^\circ 10\frac{1}{4}'$, quasi paulo minus. Visus est autem δ ab utraque cylindri parte. Tunc inter δ et spicam $9^\circ 26'$ et minus quam $9^\circ 27'$. Culminabat δ in altitudine $30^\circ 19\frac{1}{2}'$. Tunc inter δ et Lancem boream $18^\circ 25'$. Pro sextantis exploratione capiebatur, quod est inter spicam et lancem $27^\circ 39'$, debuit autem esse $27^\circ 34'$. Sic inter spicam et boream frontis η $39^\circ 32\frac{1}{2}'$, debuit esse $39^\circ 26\frac{1}{2}'$. Itaque $5'$ abundavit sextans. Id autem et calculus loci δ testatur. Nisi enim distantias δ a fixis quinque minutis minuas, ascensio recta per spicam et lancem $10'$ discrepabit: at subtractis (ita ut

examen jubet), exactissime coincidit eritque $205^{\circ} 27' 10''$, declinatio $7^{\circ} 35\frac{1}{2}'$, quare locus $26^{\circ} 18' 48'' \approx$; latitudo $2^{\circ} 47' 20''$. Vides manifeste latitudinem eandem, cum interim planeta $38'$ retrocesserit longitudinis. Quodsi per hunc inventum locum δ inquiras ejus ab Arcturo distantiam, prodibit $29^{\circ} 9\frac{1}{6}'$ et in vitioso instrumento $29^{\circ} 14'$. Cum jam cor Scorpii culminasset, distantia nostra (sed jam luxato et mox restituto instrumento) fuit $29^{\circ} 13\frac{1}{2}'$. Rursum igitur sextantem probavimus, qui inter polarem et caudam Cygni exhibuit $44^{\circ} 45'$: sed debuit esse $44^{\circ} 39\frac{1}{2}'$. Ergo pristina instrumenti conditio. Cum jam δ uno gradu superasset meridianum, non tolerari potuit $29^{\circ} 13\frac{1}{2}'$; plus tamen erat quam $29^{\circ} 12\frac{1}{2}'$, proxime $29^{\circ} 13'$.

Haec igitur observationum series, ex quibus amens sim, si rem subtilissimam exstruere nitar. Itaque non argumenta sed exempla exhibeo alii diligentiori et feliciori. Spero etiam lectores nausea incertarum harum tanto magis expetituos Tychonicas certissimas. Sed ad rem.

Primus et secundus dies tantum ad probandam stationem motus latitudinis concurrunt. Utrunque δ ab Arcturo distat $29^{\circ} 18'$, utrinque altus in meridie $32^{\circ} 7'$ vel $6'$. Me vero exercuere illi dies ad sequentes rectius obeundos, si necessaria instrumenta fuissent.

At 3. Martii, cum os Leonis culminaret, distantia fuit $29^{\circ} 15'$, cum cor Scorpii, $29^{\circ} 19'$ plus. Ergo interlapso tempore mutata est distantia per $4\frac{1}{4}'$ circiter. Et cum Arcturus et δ eandem pene longitudinem obtineant, arguit igitur haec distantiae mutatio parallaxeos latitudinis variationem. Non ignoro, $29^{\circ} 19'$ parum abesse a $29^{\circ} 18'$ et hanc ex analogia diei antecedentis debere esse distantiam hora etiam consimili, utpote stante Marte. Scio etiam, cum est os Leonis in med. coeli, Martem esse altum $12\frac{1}{2}^{\circ}$, obnoxium adhuc refractionibus. De hoc tamen dicemus postea. Nunc ista sane dissimulentur, ne exemplum nobis turbetur. Ergo cum fuerit altitudo nonagesimi $57\frac{1}{2}^{\circ}$ (circiter) culminante ore Leonis, ultimo vero $28\frac{1}{2}^{\circ}$, postquam culminasset cor Scorpii, quaeram in parallactica, in qua columna a distantia a vertice $32\frac{1}{2}^{\circ}$ in distantiam $69\frac{1}{2}$, mutatur area per $4\frac{1}{4}^{\circ}$. Invenio autem id fieri sub columna, cujus est frons $9'$. Esset igitur δ parallaxis maxima $9'$. Et cum distantia δ et Terrae hoc die fuerit ad distantiam δ et \odot ut 28 ad 60 (quod ex cognitione anticipata hypothesis Tychonis et Copernici crassiori Minerva habetur), erit igitur permutata ratio parallaxeon, et Solis parallaxis maxima circiter $4' 24''$, quae ponitur $3' 0''$.

Nunc autem perpendamus, quod δ in altitudine $12\frac{1}{2}^{\circ}$ fuerit in refractione, si fixarum refractionis tabula Huennae constructa Pragae valeat: ea fuit in hac altitudine $4' 20''$, de quibus $2' 18''$ debentur latitudini, quibus δ Arcturo factus est propior. At si Solis refractiones Marti quoque adhibeamus (quod saepius apparet), illa in hac altitudine est $8' 45''$, duplo major: quare et latitudinis parallaxis duplo major, et $4' 36''$. Hoc modo omnis varietas, quam prae se tulit observatio duobus his diversis momentis, esset a sola refractione. Illo modo relinqueretur parallaxi latitudinis $2'$, quantum variatur parallaxis sub columna, cujus frons $5'$, ut Soli hoc pacto obveniant tantum $2' 25''$ maximae parallaxeos. Ita refractionis nobis tertiam quoque diem suspectam reddidit et dubiam, denique plane inutilem. Scio, cum Arcturus et δ distent 9° , quae est latitudinis Arcturi supra latitudinem δ pars tertia, fieri tunc, ut non omnis latitudinis refractionis detrahatur distantiae

a Marte, et ut parallaxis plus variet Martis latitudinem, quam hanc ab Arcturo distantiam. Id autem ut perexiguum in majori metu dissimulandum duxi. Observet qui subtilioribus instructus est.

Jam in quarta die nihil aliud videtur agi, quam destrui omnis parallaxis δ . Distantia in meridiano debuit esse $29^{\circ} 9\frac{1}{2}'$ instrumento correcto, ergo vitioso $29^{\circ} 14'$. At inventa $29^{\circ} 13\frac{1}{2}'$ ultimo, cum major esse debuit parallaxis latitudinis (si qua esset) et per hanc major ab Arcturo distantia. Ab eo igitur tempore, quo δ ad altitudinem venit 19° , inventa est $29^{\circ} 12\frac{1}{2}'$, unico scrupulo auctior in fine: quae admodum exigua esset parallaxis. Et quae haec ratio? Cum esset altus 9° (culminante Hydra) distantia fuit $29^{\circ} 9'$, vitioso instrumento, et tamen in refractione, post in alt. 25° et prope M. C. rursum $29^{\circ} 9'$, idque bis diversis momentis. An nihil hic refractione potuit initio, ut constans ideo manserit arcus? An potius dicendum, me (cum mihi viderer diligentissimus) errasse observando? praesertim ob cylindri longitudinem.

Ex his tamen qualibuscunque observationibus certum efficitur, parallaxes latitudinis δ certo non fuisse majores $4'$, quantum instrumenti incertitudo occupat: credibilis, valde exiguas esse. Infra capite LXIV. habebis hujus rei plura argumenta.

Esse vero parallaxes Martis majores parallaxibus Solis, hypotheseos Tychoonicae et Copernicanae ratio arguit, ex qua facile Martis parallaxes computari possent, si de Solis parallaxi certi essemus. An igitur incerta est ratio, Solis altitudinem et parallaxes ex eclipsibus indagare? Omnino, quod quantitatem, paulo incertior, quod rem ipsam attinet, certissima. Non est Sol vicinior 230 semidiamentris Terrae, non tamen infinitis semidiamentris abest. At inter 700 et 2000 semidiamentros (quarum summarum illa in Mysterio meo Cosmographico, haec in observationibus eclipsium pro metis citimis et ultimis offeruntur) nondum videtur certus aliquis numerus demonstratus (Comp. II. 778), ut in Hipparcho meo probabo.

Caput XII.

Investigatio nodorum Martis.


Igitur, etsi non desunt adminicula investigandi planetarum primam inaequalitatem per observationes, etiam cum sunt impliciti inaequalitati secundae: sequar tamen hac secunda parte auctorum vestigia et observationes *inopuvious* fidei faciendae causa, cum ipsorum placitis aliqua contraria proleat, ne quis me post dumeta propriae methodi latitare clamitet.

Et cum jam patuerit, nihil in parallaxibus Martis diurnis a Tycho neurpatis desiderari posse, quod sit alicujus momenti, paulatim accedam ad reductionem locorum visorum Martis ad Solis apparentem locum oppositum.

Principio nobis est opus cognitione nodorum. Hos Tycho Brahe sic solitus est investigare.

Sit A (Fig. 68) locus nodi, E locus planetae in ecliptica anno 1595, C locus planetae visus sub fixis in $17^{\circ} 56' 5''$ γ , EC visa latitudo $0^{\circ} 5' 15''$ b. Praesupponitur autem angulus EAC quam proximè esse $4^{\circ} 34\frac{1}{2}'$, quanta est latitudo maxima bor. itidem observata anno 1585.

Fig. 63.



Igitur in CEA rectangulo (vel CBA isoscele: differentia enim nullius est momenti in hoc negotio) ex latere CE et angulo EAC inquisivit longitudinem EA, distantiae loci ecliptici a nodo. Haec operatio nihil peccat, quia EC parva est et propinqua nodo. Demonstrationis vero auctoritas commendat aliam. Dictum enim est cap. IX, angulum EAC non esse constantem: unde per diversas diversarum oppositionum latitudines diversa etiam loca pro nodo exhibunt. Neque enim EAC tam est magnus, quam magna latitudo maxima visa, quia AC inflexus est arcus: neque etiam AC, sed interior aliqua (puta AF) via est planetae, qualis ex centro Solis videretur: quare neque necessario A nodus erit, in hac quidem operatione.

Aliter igitur ego nodos investigavi, idque ex ipsis observationibus ad diem quo in nodo essent. Quas methodus, etsi jam quibusdam praeconceptis indiget et infra accuratius tractabitur parte quinta, tamen vel ob consensum solum praelibanda est. Praesupponebam autem, cum planeta vere motuque eccentrico est in nodo, nulla dispositione Terrae vel Solis fieri posse, ut appareat extra nodum.

Nam in hypothesi Copernicana hoc per se naturae rerum est consentaneum, ut motrix facultas stellae alicujus non sit alligata ad observandam stellam alienam (in quarum numero Tellus est) sed circuitus sui proprias habeat leges. In hypothesi Ptolemaica hoc esset perinde ac si diceret, epicyclum non respicere ad lineam ex Sole per centrum suum venientem, sed ad certa loca sub fixis, sub quibus planetam in plano eclipticae constitueret. In Tyconica eadem de eccentrico dicentur.

Quod igitur praesupposui, id verum inveni per has observationes.

I. Anno 1590 d. 4. Martii hora vesp. 7. 10' fuit declinatio δ 9° 26' sept., ascensio recta 22° 35' 10". Hinc prodit locus 24° 22' 56" γ , latitudo meridiana 3' 12": parallaxi et refractione contraria et paria proxime facientibus ideoque neglectis.

II. Anno 1592 d. 23. Jan. vesperi hora 10. 15' fuit δ in 11° 34' 30" γ , latitudo 0° 2' merid., altitudo δ 25°, ergo refractione (ex fixarum tabula Tyconis) nulla: parallaxis quanta proxime Solis, quia distant sextili δ et \odot et igitur a Terra aequaliter fere absunt, cedit autem pene omnis in latum. Ergo circiter 2' attollendus est δ in septentrionem, ut liberetur a parallaxi, sicque incidet in eclipticam. Nam 6. Febr. jam circiter 7' in boreali latitudine fuere.

III. Anno 1593 d. 10. Dec. vesperi δ fuit in nodo ascendente observatus. Nam post correctionem variationum horizontalium retinebat non plus 0° 0' 45" borealis latitudinis.

IV. Anno 1595 d. 27. Oct. h. 12. 20' latitudo δ vera post remotam parallaxin fuit 0° 2' 20" merid. Die 28. itidem remota parallaxi fuit latitudo 0° 0' 25" sept. Intermedio ergo tempore*) in nodo evehente fuit.

Numeri jam dies 687 revolutionis δ eccentricae a meridie 28. Oct. retro, incidet terminus illorum in 10. Dec. anno 93; cum nocte praecedenti

*) Sufficit ista crassa argumentatio praesenti instituto. Infra cap. LXI. et LXVII. diligentius omnibus expensis, invenitur in nodo fuisse die 29. hora 15.

fuisset δ proxime nodum observatus. Rursum alios 687 retro numera, qui desinent in 23. Jan. 1592, cum in ipso nodo fuit observatus. Si tertio idem feceris, incidēs in 7. Martii anni 1590, cum die antecedente quarto habuisset aliquam latitudinem meridianam, quam intra quatrimum reliquum confecit, ut circa 7. in nodum incideret.

Ex quo intelligitur: nihil referre, ubi Terra sit, vel sub fixis vel respectu ad Martem: nihil referre in Ptolemaica, ubi Sol sit respectu centri epicycli Martis et Martis in epicyclo: nihil in Tychonica, ubi centrum eccentrici seu Sol versetur respectu lineae ex Marte per Terram, ut in planum ecliptici δ incidat: esse enim semper eandem diametrum nodorum in Copernico et Ptolemaeo, seu semper sibi parallelon in Tychone: nisi quod successu seculorum nodi parumper transportantur; qui motus intra hos 6 annos non sentiebatur.

Sed age et alterum oppositum nodum quaeramus.

I. Anno 1595 d. 4. Jan. mane, cum δ observaretur hora 7. 10' in altitudine 8° a Spica \mathfrak{m} et Corde \mathfrak{M} , visa fuit ejus latitudo in $0^\circ 3' 46''$ b. ipse in $13^\circ 36' 40''$ γ . Parallaxis est parva, quia δ cum \odot , distans plus a Terra quam Sol, amplius duplo. Refractio contra est magna: ex tabula fixarum $6' 45''$, ex tabula Solis $11\frac{1}{4}'$, quae omnis fere abit in latum propter humilitatem nonagesimi. Itaque δ vere in austro aliquot scrupulis (circiter 2 aut 3' aut etiam plus) per refractiones Solis adhibitas.

II. Anno 1589 d. 15. Apr. noctu, δ latitudo visa borealis fuit $1^\circ 7'$, vehementer aucta parallaxi orbis annui ob appropinquationem Martis et Terrae. Post dies 21 latitudo decrevit ad exilitatem $6\frac{2}{3}'$ bor. Etsi igitur 6. Maji paulo lentius decrescit, sidere a Tellure abeunte: tamen parum errabimus, si proportionaliter agamus, ut sicut 60' diminutionis sunt ad $6\frac{2}{3}'$ residua, sic 21 dies faciamus ad numerum dierum, post quos in eclipticam Mars incidit: nam regula ostendit dies $2\frac{1}{3}$, ut 9. Maji fuerit in nodo. Numeratis inde ter 687 diebus porro, incidemus in mane 30. Dec. anni 1594, quo die δ in nodo fuisse oportet, indeque per 5 dies usque in 4. Jan. mane delapsum esse in meridiem. Et quidem ex observatione ejus ad dictum 4. Jan. aliquot ei scrupulorum latitudinem meridianam dedimus. Saepius hoc eccentrici loco non est observatus. Satis est, teneri a nobis illam observationem anni 1595, ne a nobis dissentiat: de anno vero 1589 nihil est quod dubitemus. Neque te moveat, quod anno 1589 diebus $2\frac{1}{3}$ dedimus motum latitudinis $6\frac{2}{3}'$, anno vero 1595 circa 4. Jan. diebus 5 non tot damus. Nam ut in hoc opere apparebit, latitudo per orbis annui parallaxes plurimum in conjunctione cum Sole (ut 1595) attenuatur, in oppositione (ut 1589) augetur. Convenit igitur, minorem videri anno 1595 motum diurnum latitudinis, majorem anno 1589.

Quomodo jam habentur loca utriusque nodi sub fixis? Nimirum si ex tabulis δ (quas ideo praesupponimus) crassa Minerva eliciatur utrinque medius motus Martis. Id sive per Prutenicas sive per Tychonicas, adhibita aequinoctii vera praecessione, praestiteris, invenies anno 1594 d. 30. Dec. mane medium locum δ in $27^\circ 14\frac{1}{2}'$ \mathfrak{M} , anno 1595 d. 28. Oct. mane in $5^\circ 31'$ γ . Itaque apparet, diametrum nodorum non transire per centrum aequalitatis motus, sed longe infra. Plus enim est a $5^\circ 31'$ γ in $27^\circ 14\frac{1}{2}'$ \mathfrak{M} , quam ab hoc in illum. Sin autem Tychonicis aequationibus fueris usus, addendum erit hic $11^\circ 17'$, illic subtrahendum $11^\circ 30'$, ut prodeat illic

$16^{\circ} 48' \text{ } \varnothing$, hic $15^{\circ} 44\frac{1}{2}' \text{ } \text{m}$, loca \varnothing eccentrica coaequata. Nodi (ut vides) fere ex centro systematis planetarii sunt oppositi in $16\frac{1}{2}^{\circ} \text{ } \varnothing$, m circiter, quod Ptolemaeus Terram, Copernicus et Tycho Brahe punctum proxime Solem dixerunt.

Quantum autem mutaturi simus in his locis nodorum, ubi transposita theoria Solis a medio ad apparentem motum Solis aequationes mutabuntur, infra parte quinta patebit.

Caput XIII.

Investigatio inclinationis planorum eclipticae et orbitae Martis.

Nodis et limitibus superiori capite ex sententia Brahei et mea quam proxime inventis, jam etiam inquirendum est, quantum vere inclinetur planum orbitae Martis ad planum eclipticae.*) Id ab ipsis observationibus deducere non ita promptum est. Nam angulus inclinationis hujus constituitur apud centrum systematis planetarii, quod Copernico et Tycho ni Sol est.

At visus in Solem nunquam inducitur, ut ex eo haec inclinatio sub fixis videri et mensurari possit. Ex alio vero loco (angulo etiam alio) spectabitur maxima digressio limitis ab ecliptica. In Ptolemaica forma videri possit expeditior ratio, sed non est. Nam demonstrabitur, planum epicycli manere perpetuo parallelon plano eclipticae. Pone ergo centrum plani epicycli in limite alterutro, sit planeta in eadem linea longitudinis ex centro visus per centrum epicycli: vel erit remotior a visu quam centrum epicycli, et sic distantia ejus ab ecliptica minor apparebit quam distantia centri epicycli ab eadem ecliptica; vel erit propior visui et sic major apparebit eo quod quaerimus.

In hac difficultate solatur nos hoc unicuique, quod id, cujus causa inclinationem inter principia quaerimus, non est tale, ut summam subtilitatem desideret. Licebit igitur nobis uti modis iis, qui de inclinationis quantitate testimonium eminus perhibent: quorum tres ponemus.

Apparet autem ex jam dictis, tunc nos rectissime adjutum iri, si observationem nanciscamur Martis ad tale momentum, ubi Mars aequaliter et a Terra et a Sole absistens linea ex Sole per se ducta in 16° vel $17^{\circ} \text{ } \varnothing$ vel ∞ (loca limitum) referatur: in forma Ptolemaica, ubi, centro epicycli in 16° , $17^{\circ} \text{ } \varnothing$ vel ∞ versante, Mars aequaliter cum centro epicycli a Terra absit. In solo Mercurio hoc problema locum non habebit.

Sit B (Fig. 64) Sol, A Terra: constituatur super AB isosceles ACB, et sit planetae locus C, punctum eclipticae plani: erectaque perpendiculari CE in orbitam \varnothing , corpus \varnothing in E sit. Aequaliter igitur apparebit EC et ex B Sole et ex A Terra: per se patet.


*) Inclinatio et latitudo differenter intelligantur.

Inclinatio de angulo ad Solem vel centrum systematis planetarii, quem Copernico faciunt lineae in corpus \varnothing et locum ejus eclipticum ejectae. Latitudo sit angulus, quo quaelibet inclinatio ex Terra spectatur.

In Ptolemaeo inclinatio est angulus rectarum ex Terra per centrum epicycli et per locum ejus in ecliptica ejectarum. Latitudo est angulus, quem faciunt rectae ex centro Terrae, altera per corpus planetae, altera per locum, qui ei in ecliptica respondet, ejecta.

Ut autem sciatur, qua in dispositione δ aequaliter absit a \odot et δ , nota quod, quando lineae ex C δ et A δ in B \odot cadentes faciunt rectum angulum CBA, tunc CB brevior est quam CA. Itaque oportet BA locum oppositum \odot et BC locum δ eccentricum minus distare 90° , ut CAB, CBA aequentur. Ergo BC in $17^\circ \Omega$ vergente, \odot oportet esse ultra $17^\circ \gamma$ et ante $17^\circ \eta$. Contra si BC sit in $17^\circ \omega$, \odot debet esse ultra $17^\circ \eta$ et ante $17^\circ \gamma$, quibus circumscriptionibus nobis designantur matutini exortus vel vespertinae occultationes, sextiles vel quintiles δ et \odot .

Fig. 64.



In forma Ptolemaica si C Terra sit, A centrum epicycli, B Mars, CAB non poterit esse rectus, ut CA, CB fiant aequales. Itaque anomaliam commutationis oportet esse majorem 90° vel minorem 270° .

Si etiam praecisius paulo cupis agere, assume ex Copernico vel anticipata Tyconica restitutione proportionem orbium δ et \odot [in Copernico], δ et \odot [in Tychone], eccentrici et epicycli [in Ptolemaeo] crassa Minerva ut 1525 ad 1000, et eam in $16, 17^\circ \Omega$ ut 5 ad 3, in $16, 17^\circ \omega$ ut 11 ad 8.

Cum ergo triangulum ACB sit isosceles, et AC, CB crura aequalia, AB vero 1000 qualium BC ducta in $17^\circ \Omega$ est $1666\frac{2}{3}$: qualium ergo (demissa CD perpendiculari) AD dimidia de AB est 1000, erit AC $3333\frac{1}{3}$, quae inter secantes quassita refert CAD vel CBD angulos $72^\circ 33'$. Sic in $16, 17^\circ \omega$, qualium AB 1000, est AC 1375, et qualium AD 1000, est AC 2750, exhibens in tabula secantium angulum $68^\circ 40'$.

Versante ergo BC in $16, 17^\circ \Omega$ vel circa, oportet AC visum locum δ et AB visum \odot distare $72\frac{1}{2}^\circ$: vel illa BC in $16, 17^\circ \omega$ versante, has $68\frac{2}{3}^\circ$ digredi oportet. Et quia duorum (CAB, CBA) in $17^\circ \Omega$ summa est 145° , erit ACB 35° in $17^\circ \Omega$. Quare per lineam AC δ vel in $22^\circ \eta$ (Sole per AB in $5^\circ \gamma$) vel in $12^\circ \omega$ (Sole in $30^\circ \gamma$ versante) spectari oportet. Ita in $17^\circ \omega$, quia summa (CAB, CBA) est $137\frac{1}{3}^\circ$, erit ACB $42\frac{2}{3}^\circ$. Quare Martem per AC vel in $24\frac{1}{3}^\circ \gamma$ (Sole per AB in $16^\circ \omega$) vel in $0^\circ \gamma$ (Sole in $9^\circ \Omega$ versante) spectari oportet. ⁴⁰⁾

Primum fieri proxime potuit mense Nov. anno 1586 vel 1588. Alterum Aprili anno 1581, 1583, 1596, 1598. Tertium Sept. vel Oct. 1587, 1589. Quartum Majo vel Junio 1580, 1582, 1595, 1597. Ad ultimum casum observationes idoneae desunt, eo quod Mars in γ brevium ascensionum (\odot in Ω noctes claras efficiente) observari vix possit aut omnino videri.

Anno igitur 1588 d. 10. Nov. mane h. $6\frac{1}{2}$ visus est planeta δ in $25^\circ 31' \eta$ cum lat. $1^\circ 36' 45''$ bor., \odot in $21^\circ \eta$ (28°). Ergo quia \odot tantummodo $62\frac{1}{2}^\circ$ distat a δ , cum debeat distare per 72° , ut triangulum (quod requirit problema) fiat aequicrurum: Mars igitur adhuc longius a Terra abest quam a Sole. Itaque minor apparebat latitudo ejus loci, quam erat vera inclinatio. Sequenti 5. Dec. mane h. 6. δ visus est in $9^\circ 19\frac{3}{4}' \omega$ cum latitudine $1^\circ 53\frac{1}{2}'$ bor., Sole in $23^\circ \gamma$. Ergo quia Sol distat a Marte per $73\frac{1}{2}^\circ$, digressio puncti orbitae (quod tunc Mars occupabat) paulo minor fuit quam $1^\circ 53\frac{1}{2}'$, debuit n. interesse 72° . Nunc cum intersit plus, minor evasit distantia δ et \odot , quam δ et \odot : major igitur apparentia inclinationis, ejus quidem puncti de plano eclipticae. At quia tamen 5. Dec. planeta motu eccentrico jam aliquot gradibus superaverat limitem, veras suas ab ecliptica digressiones iterum minuens, majores igitur fuerunt in

ipso limite. Quare tollentibus se mutuo causis, maxima planorum inclinatio erit circiter $1^{\circ} 50'$.

Ita anno 1586 d. 22. Oct. mane h. 6. sub auroram inter δ et cor ϱ interfuit $6^{\circ} 9'$ in consequentia. Declinatio δ ab aequatore erat $13^{\circ} 0' 40''$ bor. Hinc invenitur ejus visa longitudo $0^{\circ} 7' \text{ mp}$, latitudo $1^{\circ} 36' 6''$ bor.

Sol haerebat in 8° m , distans 68° a Marte: debuit plus distare. Longior itaque linea inter Martem et Terram, quam inter Martem et Solem. Minor itaque visa latitudo digressionis planetae vera ab ecliptica, et quidem longe ante limitem. Die vero 2. Nov. mane h. $4\frac{3}{4}$. (\odot versante in $19\frac{3}{4}^{\circ} \text{ m}$) δ visus est in $5^{\circ} 52' \text{ mp}$, cum latitudine $1^{\circ} 47'$ bor. Distat Sol a Marte per $73\frac{1}{2}^{\circ}$ pene justo modulo. Sed δ antecedit limitem boreum aliquot gradibus, circiter $16^{\circ} 17'$. Igitur justa fere hujus loci latitudo apparuit. Sed ea in ipso limite major arguitur quam $1^{\circ} 47'$, scilicet $1^{\circ} 50'$ circiter. Sequenti 1. Dec. mane h. $7\frac{1}{2}$. distantia aequatoria inter cor ϱ et δ fuit $25^{\circ} 12\frac{1}{4}'$, cum declinatione δ $6^{\circ} 2\frac{1}{4}'$. Hinc invenitur longitudo $20^{\circ} 4' 30'' \text{ mp}$, latitudo $2^{\circ} 16' 30''$, Sol in 18° x , distans 88° a Marte; debuit tantum $72\frac{1}{2}^{\circ}$. Quare minor est facta linea inter Martem et Terram, quam inter Martem et Solem: et digressio ex appropinquatione major apparuit quam erat re vera. Minor igitur ejus puncti digressio ab ecliptica quam $2^{\circ} 16\frac{1}{2}'$, et multo quidem minor: at non ita multo major quam $1^{\circ} 47'$. Hic igitur quantitas inclinationis maximae $1^{\circ} 50'$ confirmatur eminus.

Vice versa anno 1583 d. 22. Aprilis hora noctis $9\frac{1}{4}$. observatum, inter Martem et Canem interesse $20^{\circ} 58'$, inter hunc et cor ϱ $22^{\circ} 47\frac{1}{2}'$. Hinc invenitur locus δ in $1^{\circ} 17' \varrho$ cum latitudine $1^{\circ} 50\frac{3}{4}'$ bor. Sol erat in 11° x , distans a Marte 80° , debuit $72\frac{1}{2}^{\circ}$. Propior igitur justo est δ . Est igitur digressio vera ejus ab ecliptica major visa latitudo. Sed δ amplius 21° est ultra limitem boreum. Itaque in ipso limite rursum major fiet ejus digressio ab ecliptica. Rursum itaque tollentibus se mutuo contrariis causis, inclinatio maxima est $1^{\circ} 50'$.

Sic anno 1596 d. 9. Martii vesperi h. 8. visus fuit in $15^{\circ} 49' \text{ II}$, cum latitudine $1^{\circ} 49\frac{3}{4}'$ bor. Sol in 30° x , distans a loco Martis 76° : debuit minus paulo distare, itaque paulo minor vera Martis ab ecliptica digressio, quam latitudo visa. At neque maxima haec digressio fuit, cum nondum fuerit δ in limite intra 25° circiter. Rursum itaque stabiliter eminus maxima limitis digressio $1^{\circ} 50'$ circiter.

Jam in limite altero 17° III , etsi rariores sunt observationes, est tamen in promptu una: anno 1589 d. 15. Sept. vesperi h. $7\frac{1}{4}$. visus est δ in $16^{\circ} 47\frac{1}{2}' \text{ x}$, cum latitudine meridiana $1^{\circ} 41\frac{3}{4}'$. At correctione adhibita ob refractionem luminis, quam erat passus in hac humilitate, erat locus $16^{\circ} 45\frac{3}{4}' \text{ x}$, cum latitudine $1^{\circ} 52\frac{1}{4}'$ meridiana. Sol erat in 2° III , distans $74\frac{1}{4}^{\circ}$ a Marte: debuit tantum $68\frac{3}{4}^{\circ}$. Ergo visa latitudo paulo major est digressionis puncti ejus ab ecliptica. Illud tamen non omnium remotissimum est, cum aliquammultis gradibus sit ante limitem. Itaque hic quoque se mutuo causae tollunt. Sequenti 1. Nov. h. $6\frac{1}{4}$. visus est in $20^{\circ} 59\frac{1}{4}' \text{ x}$, cum latitudine $1^{\circ} 36'$ meridiana, Sole in 19° m . Cum igitur jam non amplius 62° a Marte distet, debuerit vero $68\frac{3}{4}^{\circ}$, minor igitur est visa latitudo, quam vera ab ecliptica digressio: at simul et minor digressio hujus puncti quam limitis, quia punctum hoc est ultra limitem.


Sol in $2\frac{1}{2}^\circ \text{ m}$ supra nodum. Terra ergo infra nodum versus Martem. Itaque ex appropinquatione major fuit visa latitudo quam inclinatio plani ecliptici. Post dies 14 Sole in nodum competente, si iterum $28'$ decrevisset (quantum imminuta est praecedentibus) 14 diebus, restarent $1^\circ 45'$. At non manet proportio eadem imminutionis, Terra discedente a sidere vel hoc a Terra. Semper enim in remotioribus minor est imminutio. Nihil igitur hinc contra inclinationem maximam $1^\circ 50'$ depromi potest: quin potius ea eminens confirmatur.

Demonstratio latius extendi potest. Sit (Fig. 65) BA linea ex Terra per corpus Solis ducta in locum nodi 17° m vel γ : et spectetur planeta quocunque zodiaci loco. Latitudo igitur, quam habere videtur, motitur inclinationem puncti de plano, tantum vere distantis a limite, quantum δ abesse videtur a limite. Spectetur δ in BG. Duc ei parallelon AH. Quanta igitur apparet latitudo in G ex B, tanta est inclinatio puncti H. Et BG, AH vergunt in gradum eundem sub fixis, quia paralleli. Ut in observatione 1585 d. 26. Apr., quia \odot in $16^\circ \gamma$ et δ in $21^\circ 26' \text{ Q}$ visus est, cum lat. $1^\circ 49\frac{3}{4}'$, ergo inclinatio in $21^\circ 26' \text{ Q}$ motu eccentrico est $1^\circ 49\frac{3}{4}'$. Ac cum $21^\circ 26' \text{ Q}$ absit a limite 5° , et sinus 85° parte $\frac{1}{250}$ minor sit sinu toto, erit et hic maxima inclinatio parte $\frac{1}{250}$ sai major, scilicet $1^\circ 50\frac{1}{2}'$ circiter.

In Ptolemaica hypothesi demonstratio hujus rei sic procedit.

Sit A Terra, AB linea per Solem et ejus oppositum in $17^\circ \gamma$ vel m ,

Fig. 66.



AD linea visionis Martis, D δ , BAD rectus. Erit ergo AD in 17° Q vel ∞ . Et quia D δ , quae ergo ex D exit parallelus ipsi BA (quia motus Martis in epicyclo motum Solis in suo orbe sequitur) per C centrum epicycli transibit. Sit in AD, E punctum, et ipsi AC aequalis AE. Itaque quia AC non erit in 17° Q vel ∞ , non etiam tantum ab ecliptica distabit, quantum E limes boreus: nec igitur D tantum distabit ab ecliptica, quantum E, quia CD et omnia epicycli puncta aequaliter distant ab ecliptica, cum planum epicycli ad hypothesium aequipollentiam efficiendam perpetuo ponatur parallelum plano eclipticae. At quanto D vel C minus ab ecliptica distat quam E, tanto propius est D ipsi A quam E, ut ita distantia

D tanto major, et utraque eodem angulo ex A spectentur. Nam ut distantia C ab ecliptica ad distantiam E ab eadem, sic sinus arcus CB (hoc est AD) ad sinum totum AE ex doctrina sphaerica inclinorum circulorum, eo quod ECB circulus inclinatus sit super AB. At C et D distant aequaliter, ut jam dictum. Ergo ut distantia D (vel perpendicularis ex D in eclipticam demissa) ad perpendicularem ex E: sic AD ad AE. Triangula igitur ADD et AEE similia erunt (cum sint rectangula in D, E, punctis eclipticae, et laterum proportionalium), sed et concurrentia lateribus (AD, AE) in plano eclipticae ab eodem (A) puncto descriptis et in idem longitudinis punctum in 17° Q vel ∞ vergentibus. Ergo et AD, AE lineae in orbita concurrent: hoc est, linea ex A \odot per D δ educta in hoc situ incidet in E locum centri epicycli, quando id est in limite. Et sic idem erit angulus et inclinationis maximae limitis et visae latitudinis Martis in hoc situ.

Tertius modus calculo et praeconcepta orbium proportionem indiget: quem tantummodo delibabimus propter consensum: nam accurata et genuina

ejus tractatio reservatur in partem quintam et caput LXIII, nec hic est necessaria.

In tabula oppositionum Tychonis fuit latitudo visa in $21^{\circ} 16'$ Ω : $4^{\circ} 32\frac{1}{6}'$. Sit A Sol, B Terra, C Mare in eccentrico. Ergo linea AE per B Terram inter fixas excurrentes incidet in eclipticam, AC in orbitam Martis. Et cum δ sit in $21^{\circ} \Omega$ proxime limitem, angulus EAC proxime erit maximus. Quem sic investigo. Sit BA 1000, AC 1664, et EBC $4^{\circ} 32\frac{1}{6}'$. Ut ergo AC ad sin. EBC sic BA ad sin. BCA $2^{\circ} 43' 27''$ qui ablati ab EBC, relinquit angulum BAC quaesitum $1^{\circ} 48' 43''$, qui in ipso limite esset hinc circiter $1^{\circ} 49'$, et nonnihil variatur, si proportio BA ad AC variatur, de quo infra. Hoc modo ex quacunque acronychia observatione, cujus latitudo grandiuscula sit, inquiritur primum inclinatio illius puncti orbitae, post inclinatio maxima, consideratione distantiae a nodo vel limite. Ut anno 1593 d. 24. Aug. latitudo visa sub oppositionem cum \odot proditur $6^{\circ} 7'$ meridiana, δ in $12\frac{1}{2}^{\circ} \times$. Sit igitur BA 1000, AC 1389 ex anticipato. Ut igitur CA ad sinum CBE sic BA ad sinum BCA $4^{\circ} 21' 10''$, qui ablati a CBE relinquit BAC quaesitum $1^{\circ} 42' 10''$.⁴¹⁾ Abest vero locus iste 26° circiter a limite, 64° a nodo. Ut igitur sinus 64° ad hanc digressionem ab ecliptica $1^{\circ} 42'$ sic sinus totus ad maximam planorum inclinationem, quas prodit $1^{\circ} 53'$, ubi de superfluis tribus scrupulis non est ut simus solliciti: prodeunt enim ex suscepta proportionem, de qua infra parte quarta.



In forma Ptolemaica erit A Terra, C centrum epicycli Martis, D punctum imum epicycli, eo quod Mars in oppositione Solis versetur.

Et quia EA Solis linea in ecliptica est, planum vero epicycli ponitur parallelum plano eclipticae, erit CD parallelus ipsi EA. Ergo BAC et ACD aequales, inclinatio scilicet eccentrici et epicycli. Sed et aequalis est CD ipsi BA ob plenariam hypothesium aequipollentiam, vel certe, ut in Copernico AB ad AC, sic epicycli Ptolemaici semidiameter DC ad CA lineam ex Terra in centrum epicycli. Ergo et CDA, CBA aequales, et EBC, BAD aequales, latitudo scilicet apparens.

Caput XIV.

Plana eccentricorum sunt atalantia.

Imposuit Ptolemaeo hypotheseos suae perplexitas, ut monstra multa congesserit in doctrinam latitudinum. Cum enim perpenderet, planum epicycli in omnes partes torqueri, neque statim videret per illas hypotheseos suae nebulas, epicycli planum eclipticae plano parallelum esse, triplicem confinxit latitudinem, et ut contraria contrariis fulcirentur,⁴²⁾ omnino luxavit e parallelo situ suum epicyclum; nec ex fide observationum, quas non ita crebras habuit, nec ex mensura earum ubi habuit (quia certitudini diffusa) mediocritates elegit, extrema in errore ponens.

⁴¹⁾ Vide Epitomen Astronomicam Maestlini in explicatione theoriae superiorum fol. ultimo. ⁴²⁾

Hinc videas, nullam omnino in usitato calculo (puta in Magini Ephemeridibus) contingere conjunctionem Martis et Solis, quae non sit (uti dicunt) per corpus. Quod si verum sit, frustra natura temperamentum latitudinum confinxerit, ne corporalibus conjunctionibus crebro contingentibus nimiae essent exagitationes sublunarium virtutum.

Copernicus, divitiarum suarum ipse ignarus, Ptolemaeum sibi exprimentum omnino sumsit, non rerum naturam, ad quam tamen omnium proxime accesserat. Qua de re lege Rheticum in „Narratione.“ Gavisus enim, suis appropinquationibus Telluris ad sidera latitudinum species augeri, non tamen ausus est, residua latitudinum augmenta Ptolemaica (quae haec appropinquatio Telluris non assequeretur) rejicere, sed (ut et illa exprimeret) librationes planorum eccentricorum confinxit, quibus inclinationis angulus (Ptolemaeo constans et fixus) variaretur, atque is (quod monstri simile sit) non ad leges motuum eccentrici proprii, sed Telluris orbis plane alieni. Vide Copernicum libr. VI. cap. 1.

Cum hac impertinenti diversorum orbium colligatione causa motus (incredulitate mea armatus) semper pugnavi, nondum etiam visis observationibus Tychonis. Quo impensius mihi gratulor, observationes mecum stare, ut in multis aliis praeconceptis opinionibus.

Sed ne quis ob hoc ipsum mihi fidem deroget, quod observationes cum praepudicio tractem, en jam solidissime demonstravi, librationes inclinationum eccentrici nullas esse. Tribus enim modis investigandae inclinationis maximae propositis, in primo Sol erat circa sextiles et quintiles Martis, hoc est tam propinquus conjunctioni Martis, quam prope Mars videri et observari expedite potest; in secundo erat in quadrato Mars; in tertio plane in opposito ejus. At in omnibus tribus locis Sole versante, ☿ in eodem eccentrici sui loco consistens, unam et eandem inclinationem limitis ($1^{\circ} 50'$ circiter) in boream, et in opposito loco tantundem in austrum prodebat. Sic capite XII. Marte motu eccentrico in nodis versante apparuit, quocunque loco sui orbis Sol constitisset (seu proximus Marti seu ab eo remotus) nullam unquam visam esse Martis latitudinem. Et infra parte quinta pluribus probabitur, constantem esse declinationem cuique loco orbitae Martis ab ecliptica.

Itaque hoc firmissime concludamus, inclinationem planorum eccentricorum ad eclipticam (cur enim non in genere concludam, quod ut uni soli planetae insit, causam nullam habet? quamvis idem et in Venere et Mercurio ex observationibus demonstratum habeam) plane nihil variari. Et qui Ptolemaeum sequitur, is hinc discat, planum epicycli parallelon esse ad planum eclipticae perpetuo. Nam id in limitibus centro versante jam demonstratum est: in nodis vero versante centro, epicyclum plane in eclipticam omnibus partibus competere supra cap. XII. probatum est.

Jam quis mihi fontem porriget lacrimarum, quibus ex merito suo deplorem miserabilem Apiani industriam, qui in suo Opere Caesareo ^(*) Ptolemaei fidem secutus tot bonas horas impendit, tot ingeniosissimas meditationes perdidit, ut spiris et corollis et helicibus et volutis et universo illo intricatissimorum flexuum labyrintho figmenta hominum exprimeret, quae natura rerum pro suis plane non agnoscit? Sed ostendit nobis vir ille, se divinis ingenii perspicacissimi dotibus facile naturae parem esse potuisse: de cetero animum oblectavit suum praestigiis hisce (in quibus naturam ipsam provocaverat) fortissime superatis et in schemata conjectis, palmamque inde famae perennis est adeptus, quicquid operibus ipsis fortuna ista detrimenti

attulerit. De automatopoeorum vero *αὐτοματῶν* quid dicemus, qui sexcentas, imo milleducentas fabricant rotulas, ut de latitudinibus (hoc est de figmentis humanis) in operibus suis expressis triumphare pretiumque eorum intendere possent?

Caput XV.

Reductio locorum visorum in noctium extremis ad apparentis motus Solis lineam.

Hac peracta inquisitione et demonstratis locis nodorum, inclinatione planorum ejusque constantia (quae erant ad futuram reductionem necessaria), jam definiemus, quae loca orbitae suae planeta possederit, cum ei Sol ipse e diametro opponeretur. Omitti potuerunt annis 1580 et 1597 in argumentando, quod testimonium nullum idoneum perhibeant deficiente observationum certitudine.

I. Posito tamen, quod anno 1580 d. 12. Nov. h. 10. 50' δ visus sit in $8^{\circ} 37' \text{ II}$, et 5 dierum motus fuerit $1^{\circ} 55'$: cum itaque Sol haeserit tempore dicto in $0^{\circ} 45' 36'' \gamma$, et motus ejus ad dies 5 sit $5^{\circ} 5'$, summa utriusque motus fiet $7^{\circ} 0'$. Distat vero \odot a δ $7^{\circ} 51' 24''$. E quibus 7° integri conficiuntur diebus 5 seu horis 120. In eadem igitur proportionem residuum $51' 24''$ conficietur horis 14. 41'. Itaque articulus oppositionis fuit die 18. Nov. h. 1. 31' ⁴⁴). Locus in $6^{\circ} 28' \text{ II}$ in ecliptica. Abest autem hic a $16\frac{1}{2}^{\circ} \gamma$ 20° . Cupio scire, quanto fiat longior arcus orbitae a nodo usque ad arcum latitudinis per $6^{\circ} 28' \text{ II}$ continuatus. Igitur ex Philippi Landsbergii Triangulorum doctrina ⁴⁵) (quem virum honoris et gratitudinis causa nomino, qui optimas et aptissimas secures ad substructiones astronomicas in copia et e propinquo et vili temporis pretio mihi suppeditavit; quae citra illum e longinquo et cum ineptis manubriis magno cum operarum impedimento petendae fuissent) tangens lateris 20° multiplicatus in secantem anguli $1^{\circ} 50'$ inclinationis, abjectis 5 ultimis, excrescit tantum $18\frac{1}{2}$, particulis, quibus circiter $35''$ respondent. Mars igitur, stans e regione $6^{\circ} 28' \text{ II}$, promotior est in sua orbita per $35''$. Ponendus itaque in $6^{\circ} 28' 35'' \text{ II}$, correctiuncula sane non necessaria. Latitudo $1^{\circ} 40'$ bor.

II. Anno 1582 d. 28. Dec. hora noctis sequentis 11. 30' visus est δ in $16^{\circ} 47' \ominus$, cum esset \odot locus verus $17^{\circ} 13' 45'' \gamma$. Transierat igitur articulus oppositionis. Fuit autem motus Solis diurnus $61' 18''$, Martis $24'$; summa $85' 18''$. Et distabant hoc momento sidera per $26' 45''$. Ut igitur $1^{\circ} 25' 18''$ ad 24 horas, sic $26' 45''$ ad horas 7. 32'. Quae subducta ab horis 11. 30' relinquunt articulum verae oppositionis die 28. Dec. hora 3. 58' post meridiem. Locus $16^{\circ} 54' 32'' \ominus$ in ecliptica et per reductionem (quae $50''$ impetrat) in $16^{\circ} 55'\frac{1}{2} \ominus$. Latitudo $4^{\circ} 6'$ borea ex fide tabulae Braheanae oppositionum. Nam inter observationes differentes invenio latitudines: nocte post d. 26. Dec. $4^{\circ} 6'$ vel $4^{\circ} 2'$: nocte vero post 29. Dec. $4^{\circ} 8'$ vel $4^{\circ} 6'\frac{1}{2}$.

III. Anno 1585 d. 31. Jan. h. 12. 0', visus fuit δ in $21^{\circ} 18' 11'' \text{ Q}$. \odot in $22^{\circ} 21' 31'' \infty$. Transierat itaque oppositio vera. Distantia $1^{\circ} 3' 20''$ Fuit motus Solis diurnus $61' 16''$, Martis $24' 15''$, summa

85' 31". Ut autem 1° 25' 31" ad horas 24, sic 1° 3' 20" ad horas 17. 46', quibus de motu Martis respondent 18' proxime. Itaque tempus 30. Jan. h. 19. 14'. Locus Martis in ecliptica 21° 36' 10" ♊. Pro reductione minimum aliquid subtrahitur, quia Mars jam est ultra limitem. Itaque extensio arcus orbitae a nodo sequente vergit in antecedentia. Verum quia tantum 4 aut 5° abest Mars a nodo, plane insensibilis efficitur subtractio. Latitudo ex fide tabulae Tychonicae 4° 32' 10" bor. Nam observatio die 31. Jan. h. 12. dedit 4° 31'. Residuum Tychonici addidere ob parallaxin diurnam.

IV. Anno 1587 nocte quae sequebatur quartum Martii hora 1. 16' post mediam noctem inventus est locus Martis ex corde ♊ et spica ♍ 26° 26' 17" ♍, cum lat. visa 3° 38' 16" bor. Quia vero Mars attollebatur 37 1/2° supra horizontem, parallaxis diurna consideranda venit, adimitque longitudini parum aliquid, ut hoc nomine planeta sit in 26° 26' ♍ cum latitudine paulo majore. Nam quia Sol pene duplo ejus distat a Terra, quod Mars ab ea distat, pene itaque duplo major erit Martis parallaxis quam Solis, et posita Solis 3', Martis fiet 5' circiter. Oriente autem 9° ♌ distat nonagesimus a vertice 55°, e quorum regione sub titulo 5' in parallactica nostra exhibetur latitudinis parallaxis 4' (Comp. annot. 39 et 48.) Itaque latitudo ex centro Terrae visa fuisset 3° 42' 22" borea. Id infra parte V. serviet nobis ad parallaxes Martis accuratius examinandas, ubi et de justissima inclinatione et de certissima hujus loci distantia Martis a Terra constiterit. Verus Solis locus in 23° 59' 11" ♋. Sequebatur igitur oppositio vera. Distabant sidera per 2° 26' 49". Diurnus ☉ 59' 35", ☿ 24': summa 1° 23' 35". Ut haec ad 24 horas, sic 2° 26' 49" ad d. 1 h. 18. 7', quibus de motu Martis competunt 42' 7". Itaque tempus verae oppositionis 6. Martii h. 7. 23'. Locus ☿ 25° 43' 53" ♍ in ecliptica. Subtrahenda vero sunt 55" pro reductione ad orbitam. Fuit igitur in orbita 25° 43' ♍. Latitudo decrescebat. Erat igitur paulo minor quam 3° 38' b. vel 3° 42' per parallaxin correctam.

V. Anno 1589, d. 15. Aprilis hora noctis sequentis 12. 5' inventus est planeta in 3° 58' 20" ♍ cum latitudine 1° 4' 20" bor. decrescente. Fuit altitudo Martis 22 1/6°, ubi refractione ex fixis nulla, ex Solis tabella 3 1/2°. Parallaxis vero duplo circiter major solari, nempe in horizonte 6'. Oriebatur vero 24° ♌. Ergo nonagesimi a vertice distantia est 64°, exhibens latitudinis parallaxin diurnam 5' 24", quae an tanta fuerit, infra ex accurata latitudinum consideratione apparebit. Nam latitudo tunc prodiret borealis liberata parallaxi diurna (si nullam sit passa refractionem) 1° 9' 45" bor. Et quia altitudo nonagesimi 26°, ideo longitudinis in horizonte parallaxis est 2' 38". Distat vero Mars a nonagesimo 40°, a 4 ♍ in 24 ♍ numerando, qui sub titulis 2' 38" exhibent justam longitudinis 1' 42", quibus Mars in consequentia projectior est, quam si ex centro Terrae fuisset inspectus, idque posito, quod nullam sit refractionem passus. At mihi probabilius est, easdem cum Sole (maiores nempe quam sunt fixarum) refractiones subisse, eo quod oppositio ☉ et ☿ cieat aërem, fixae vero observentur aëre defaecatissimo. Sed tamen sit sane refractione nulla et reponatur nobis ☿ in 3° 57' ♍. ☉ erat eo momento in 5° 36' 20" ♌. Jam ergo superaverat. Mars Solis oppositum 1° 39' 20". Diurnus Martis, ut patet ex collatione diei 13. Apr., est 22' 8": Solis 58' 10", summa 1° 20' 18". Ut haec ad horas 24, sic 1° 39' 20" ad diem 1. h. 5. 42'. Ergo articulus oppo-

sitionis fuit die 14. Apr. h. 6. 23' p. m. Locus in $4^{\circ} 24' 30''$ η vel paulo ulterius, si refractionis contingerit aut parallaxis diurna prius nimium magna sit assumpta. Pro reductione ad orbitam insensibile quippiam esset adimendum, cum vix 12° absit a nodo, circiter $24''$, quae sunt nullius momenti: essetque δ in $4^{\circ} 24'$ η cum latitudine $3'$ auctiore quam prius. Etenim latitudo inde ab octavo Martii decrescebat, neque maxima fuit in oppositione.

VI. Anno 1591 nocte, quae sequitur 6. Junii h. 12. 20' inventus est δ in $27^{\circ} 14' 42''$ γ cum latitudine $3^{\circ} 55\frac{1}{2}'$ mer.: ubi de refractione quidem (quae magna fuit, cum Mars in meridie non majorem 6° altitudinem haberet) cautum ex tabula refractionis fixarum: parallaxeos vero nulla facta mentio. At δ jam distat a Terra dimidio distantiae Solaris. Quare parallaxis horizontis ultra $6'$ (posito quod Solis sit $3'$), quam tamen omitto, partim quia refractionis ex tabula Solis (quae ut dixi probabilior est) supplebitur per $4\frac{1}{2}'$ auctior quam ea, quam hic Braheus usurpavit, quibus parallaxis pene tollitur: partim quia Mars in meridiano et prope punctum brumale nullam habuit longitudinis parallaxin. De latitudine tamen videndum infra parte quinta, annon aliquot scrupulis minor fuerit, parallaxi scilicet planetam nimis in austrum projiciente.

Fuit Sol in $24^{\circ} 58' 10''$ Π . Differentia inter sidera $2^{\circ} 16' 10''$. Diurnus \odot $57' 8''$, δ (dierum 4) $1^{\circ} 12' 24''$, quia 10. Junii h. 11. 50' fuit in $26^{\circ} 2' 18''$ γ , unius ergo diei, $18' 12''$. Summa diurnorum $1^{\circ} 15' 20''$. Respondent dies 1 h. 19. 24', quae ad diem 6 h. 12. 20' additae (quia sequitur oppositio) monstrant d. 8. h. 7. 43'. Locus δ in $26^{\circ} 41' 48''$ γ : cui adduntur $52''$ pro reductione ad orbitam, ut sit quamproxime $26^{\circ} 43'$ γ . Latitudo $6'$ major quam 6. Junii, quia ex observationum fide hic crescit latitudo usque ad diem ab oppositione quadragesimum, et inter 6. quidem et 10. Junii $13'$ fere. Igitur neglecta parallaxi et salva quantitate refractionis esset $4^{\circ} 1\frac{1}{2}'$.

VII. Anno 1593 d. 24. Augusti h. 10. 30' inventus est locus Martis eclipticus in $12^{\circ} 38'$ γ cum latitudine $6^{\circ} 5' 30''$ austr. Altitudo tanta, ut variationes horizontales se mutuo conficerent. Sequenti 29. Augusti h. 10. 20' visus δ in $11^{\circ} 15' 24''$ γ cum lat. $5^{\circ} 52' 15''$ austr. Decrescebat enim vehementer. Nam ante 10. Aug. maxima fuit, 14 diebus ante oppositionem. Motus 5 dierum $1^{\circ} 22' 36''$ et diei unius $16' 31''$. Locus \odot d. 24. Aug. h. $10\frac{1}{2}'$, $11^{\circ} 2' 31''$ η . Distant sidera $1^{\circ} 35' 30''$. Diurnus \odot $58' 20''$: summa diurnorum $1^{\circ} 14' 51''$, quibus requiritur ad oppositionem dies 1. h. 6. 57', ut fuerit illa 26. Aug. mane hora 5. 27'. Locus δ $12^{\circ} 16'$ γ . Latitudo $6^{\circ} 2'$ merid. proxime, siquidem vere variationes horizontales se mutuo confecerint.

VIII. Anno 1595 d. 30. Oct. h. 8. 20' inventus est planeta in $17^{\circ} 47' 15''$ γ non longe a nonagesimo, ut de parallaxi securi simus, quamvis et de illa cautum sit. Latitudo $0^{\circ} 5' 10''$ bor. Locus \odot $16^{\circ} 50' 30''$ η . Distant sidera $56' 45''$. Diurnus \odot $1^{\circ} 0' 35''$: δ $22' 54''$, ut collatione circumstantium observationum apparet; summa diurnorum $1^{\circ} 23' 29''$. Quibus si dividatur distantia siderum, prodeunt $40' 47''$ diei vel horae 16. 19'. Itaque vera oppositio d. 31. Oct. h. 0. 39' post meridiem. Locus δ $17^{\circ} 31' 40''$ γ , qui reductione non indiget ad orbitam, cum pene in ipso nodo versetur. Latitudo circiter $0^{\circ} 8'$ bor. Sed analogia praecedentium et sequentium dierum docet lat. $5'$ bor. circiter.

IX. Anno 1597 die 10. Dec. h. 8. 30' sit sane (uti supra p. 218) locus \odot $3^{\circ} 45' \frac{1}{2}''$ \ominus : locus \odot in $29^{\circ} 4' 53''$ \times . Distantia siderum $4^{\circ} 46' 27''$. Diurnus \odot $61' 20''$, \odot $23' 40''$ (nam anno 1580 in Π fuit diurnus $23'$, anno 1582 in 17° \ominus fuit $24'$), summa ergo diurnorum $1^{\circ} 25' 0''$. Quibus elementis ostenditur, sequi tempus verae oppositionis post dies 3. h. 7. 14', d. 14. Dec. mane h. 3. 44' Locus \odot $2^{\circ} 27' \frac{1}{2}''$ \ominus $^{\circ}$). Reductio ad orbitam (ridicula sane hoc loco, cum observatio ipsa aliquot scrupulorum incertitudinem habeat) requirit $52''$ circiter addenda; itaque correctus locus $2^{\circ} 28' \ominus$. Latitudo ex fide tabulae $3^{\circ} 33'$ bor.

Ejusdem noctis (quae sequitur diem 10. Dec.) h. $12' \frac{1}{4}$, invenit Fabricius in Ostfrisia locum \odot in $3^{\circ} 40' \frac{1}{4}''$ \ominus cum latitudine $3^{\circ} 23'$ b. Qua observatione in longum quidem res pene eodem recidit. Nam horarum 3. 40' motus est $3' \frac{1}{2}''$: ut ita et per Braheanam observationem h. $12' \frac{1}{4}$ \odot in $3^{\circ} 42'$ \ominus esse potuerit, $2'$ ultra Fabricianum locum.

X. Anno 1600 d. 13/23. Jan. h. 11. 40' tempore Uraniburgo accommodato visus est planeta in $10^{\circ} 38' 46''$ Ω . Locus \odot $3^{\circ} 26' 30''$ --- . Distant sidera $7^{\circ} 12' 16''$. Diurnus \odot ad dies aliquot sequentes est $1^{\circ} 1' 3''$: \odot $23' 44''$, summa $1^{\circ} 24' 47''$. Sequebatur ergo oppositio post dies 5 horas 2. 22'', nempe 19/29. Jan. mane hora 2. 2' antelucana. \odot in $8^{\circ} 38'$ Ω . Reductione non est opus, cum sit proxime limitem. Latitudo ex fide tabulae $4^{\circ} 30' 50''$ bor.

XI. Anno 1602 d. 18/28. Febr. vesperi h. 10. 30' instrumentis Tychonicis (adjuvante studioso Matthia Seiffardo a Tychone relicto) accepi distantiam Martis a media caudae Ursae majoris $52^{\circ} 22'$. Cumque distantia inter Cor Ω et Procyonem fuerit $37^{\circ} 22' 20''$, quae debuit esse $37^{\circ} 19' 50''$, hinc intellectum, abundare sextantem $2' \frac{1}{2}''$. Correcta ergo Martis a cauda Ursae distantia $52^{\circ} 19' \frac{1}{2}''$. Et cum latitudo fixae sit $56^{\circ} 22'$, ergo subtractione facta relinquitur $4^{\circ} 2' \frac{1}{2}''$, siquidem Mars praecise fuisset in eadem longitudine cum fixa. Sed quia interfuit differentia $3' \frac{1}{4}''$ (ut ex sequentibus observationibus apparet), correctiuncula est adhibenda.

Sit enim AB in parallelo eclipticae proximo $4^{\circ} 43' 30''$, B Mars, C fixa, et BC $52^{\circ} 19' 30''$. Diviso secante BC per secantem AB (*ἀρεχνας* ratio est reddita in libro de stella Serpentarii. Vol. II p. 653) prodit secans CA $52^{\circ} 14'$, qui ablatum a $56^{\circ} 22'$ (latitudine fixae) relinquit $4^{\circ} 8'$ boream visam latitudinem Martis. $^{\circ}$) Eodem tempore invenimus inter \odot et cor Ω $19^{\circ} 23'$ (correcte $19^{\circ} 20' \frac{1}{2}''$), inter \odot et claram alae \mp $21^{\circ} 20'$ (correcte $21^{\circ} 17' \frac{1}{2}''$). Ex quibus duabus distantiis (mediantibus latitudinibus stellarum et Martis) inventa est longitudo \odot in $13^{\circ} 19' 6''$ \mp consentientibus vicibus.

Fig. 68.



Aliter h. 12. 40' inventa est altitudo meridiana Martis duobus quadrantibus $50^{\circ} 19'$, qualium cauda Ω $56^{\circ} 45'$. Ex declinationibus igitur et ascensionibus rectis fixarum et distantis nostris exstruitur locus \odot $13^{\circ} 19' 30''$ \mp . Lat. $4^{\circ} 7' 55''$ idque modo Tychonico, cui modum alium adjunxi, consensus ostendendi causa, et ut appareret, quamvis demonstratio non exquisitissima sit, posse tamen alicubi compendia vel calculi vel captus nostri adhiberi: nam minus operae est in priori modo quam verborum. Oriebatur 5° \mp Pragae. Itaque distabat nonagesimus a vertice circiter $32' \frac{1}{2}''$. Et quia Mars amplius dimidio ejus, quo Sol abest a Terra, abfuit, parallaxis igitur circiter $5'$ e regione: $32' \frac{1}{2}''$ (in parallactica nostra).

exhibet latitudinis parallaxin $2' 41''$: ut fuerit latitudo sept. quanta ex centro Terrae spectaretur $4^{\circ} 10\frac{3}{4}'$. Et quia altitudo nonagesimi $57\frac{1}{2}^{\circ}$, longitudinis igitur in horizonte parallaxis $4' 13''$. Sed quia Mars a nonagesimo abest 38° , respondet hujus loci parallaxis longitudinis $2' 36''$, qua liberatus Mars reponeretur in $13^{\circ} 18' \mp$ proxime. Locus Solis eo momento fuit $10^{\circ} 16' 42'' \times$. Distantia siderum $3^{\circ} 1' 18''^{48)}$. Diurnus $\odot 1^{\circ} 0' 4''$: $\delta 24' 5''$. Nam in $21^{\circ} \varrho$ anno 1585 erat $24' 18''$, in $26^{\circ} \mp$ anno 1587 erat $24'$, summa diurnorum $1^{\circ} 24' 9''$. Sequebatur igitur vera oppositio post dies 2 horas 3. 43', scilicet d. $\frac{21. \text{Febr.}}{3. \text{Mart.}}$ h. 2. 13' antelucana, δ in $12^{\circ} 27' 35'' \mp$. Pro reductione ad orbitam auferenda $40''$, ut sit δ in $12^{\circ} 27' \mp$, latitudine paulo minore quam prius: decrescebat enim latitudo: igitur circiter $4^{\circ} 10'$ aut $4^{\circ} 7\frac{1}{3}'$, neglecta parallaxi.

Sed quia observationes a morte Tychonis rariores a nobis sunt habitae, nec continuatis diebus, lubet securitatis causa consulere etiam illas observationes, quas David Fabricius in Frisia Orientali, sedulus astronomiae cultor, mecum communicavit.

Die 16. Febr. stilo veteri h. 5. matutina cepit distantias planetae a cauda Leonis ob latitudinem, a collo Leonis et vice versa a clara australis alae \mp ob comprobendam gemino argumento ejus longitudinem. Possim uti argumentatione Tychonis, qua uti solebat tomo primo Progymnasmatum, quando declinatio planetae (ut hic) defuit. Sed quia modus ille diffunditur in operationes, malo brevitatis causa agere ut prius in meis observationibus. Nam nihil subest periculi.

Primum ala \mp ad tempus nostrum est in $4^{\circ} 36' 30'' \approx$ cum borea latitudine $2^{\circ} 50'$. Ab ea invenit Fabricius distare δ in antecedentia $20^{\circ} 18'$. Ergo reponitur Mars proxime in $14^{\circ} 18' 30'' \mp$, quod praesciendum est crassa Minerva: paulo post corrigetur haec longitudo. Est vero cauda ϱ in $16^{\circ} 4' \mp$ cum boreali lat. $12^{\circ} 18'$, et δ a cauda inventus est distare per $8^{\circ} 17'$. Quaeritur distantia ejus paralleli a cauda, cum sit longitudinis differentia $1^{\circ} 45'$. Diviso secante $8^{\circ} 17'$ per secantem $1^{\circ} 45'$, prodit secans $8^{\circ} 6'$ arcus quaesiti. ⁴⁹⁾ Qui a $12^{\circ} 18'$ boreali fixae latitudine ablatus relinquit Martis borealem latitudinem $4^{\circ} 12'$. Hanc jam pro certa assumo et cum fixarum latitudinibus comparo secundum leges triangulares: invenio longitudinem Martis ex ala Virginis $14^{\circ} 19' \mp$: ex collo $\varrho 14^{\circ} 23' 36'' \mp$: quorum medium est $14^{\circ} 21' 18'' \mp$: ut sextans distantias justo auctiores prodiderit, unde et latitudo prodiret $4^{\circ} 14'$ borealis.

Nocte quae sequitur 23. Febr. h. 12. observavit Martem a 5 fixis; a cauda Leonis et Arcturo pro latitudine, a spica Virginis sequente pro longitudine vice una, a collo et corde Leonis antecedentibus vice versa. Mechanice seu conjectando praevideo δ incidere in $11\frac{1}{4}^{\circ} \mp$, et inventus est distare a cauda $\varrho 9^{\circ} 24'$. Hinc latitudo ejus prodit $4^{\circ} 6'$. Et jam per hanc et fixarum latitudines additis distantibus, a Regulo $17^{\circ} 26'$, collo $\varrho 17^{\circ} 51'$, Spica $37^{\circ} 28'$, Arcturo $44^{\circ} 15'$: prodit locus Martis, ex Regulo $11^{\circ} 21' 23'' \mp$, ex collo $\varrho 11^{\circ} 20' 52''$, ex Spica $11^{\circ} 17' 40'' \mp$. Rursum (ut vides) distantiae peccant excessu. Nam a corde et collo truditur Mars minus in consequentia, a Spica et Arcturo in antecedentia, et magis ab Arcturo, quia is magnam habet latitudinem septentrionalem. Medium (neglecto Arcturo) $11^{\circ} 19' 20'' \mp$ est quam proxime verum. Et latitudo quoque auctior, scilicet $4^{\circ} 7' 40''$ bor. Igitur a 15. Febr. h. 17.

ad 23. Febr. h. 12. per dies 7. h. 19. motus est Mars $3^{\circ} 0'$. Horis 187: 160'. Una hora propemodum $1'$. Si etiam hoc perpendas, die 16. Febr. parallaxin (si qua est) ademisse, die 23. Febr. nonnihil addidisse longitudini.

Et quia sequitur ultima observatio tempus oppositionis a me inventum diebus 2 h. 21. 47', adde igitur motum huic tempori respondentem $1^{\circ} 7'$, prodibit locus $12^{\circ} 26'$ mp. Consensus itaque pulcherrimus est nec major esse potest, quod soli simus uterque nec iis instructi commoditatibus, quibus Tycho Brahe. Latitudo etiam die 16. erat $4^{\circ} 12'$, die 23. $4^{\circ} 7\frac{3}{4}'$. Consentaneum igitur, ut intermedio die 21. esset $4^{\circ} 9'$ et per parallaxeos de tractionem paulo major. Scilicet et ego ponebam paulo minorem quam $4^{\circ} 10\frac{3}{4}'$ hoc est $4^{\circ} 10'$.

XII. Denique anno 1604, cum jam scriptam Ephemerida exhibuissem, in qua planeta nocte inter $\frac{29. \text{ et } 30. \text{ Mart.}}{8. \text{ et } 9. \text{ Aprilis}}$ reponeretur in lineam ex Arcturo in Spicam, id quidem manifeste apparuit. Nam vespere 8. Aprilis propendebat in ortum, 9. Aprilis jam in occasum. Tunc sextante Hofmanni inveni (coadjutore meo Joanne Schulero) inter Arcturum et Spicam $33^{\circ} 4'$, debuit esse $33^{\circ} 1\frac{1}{2}'$. Ergo abundabant $2\frac{1}{2}'$: statim inter Arcturum et δ $29^{\circ} 43\frac{1}{2}'$: ergo correcte $29^{\circ} 41'$. Cumque sit Arcturi latitudo $31^{\circ} 2\frac{1}{2}'$ borealis, relinquebatur latitudini δ $2^{\circ} 21\frac{1}{2}'$. Tunc inter cor ϱ et δ $54^{\circ} 8\frac{1}{2}'$, et statim inter cor ϱ et Spicam tantundem: debuit autem $54^{\circ} 2'$. Abundassent itaque $6\frac{1}{2}'$; prius tantum $2\frac{1}{2}'$. Haec ambiguitas $4'$ unde esset, discerni non potuit impedimentis objectis, ut pergere observando non poterimus. Sit autem (ut prius) excessus $2\frac{1}{2}'$, quare distantia inter δ et cor ϱ $54^{\circ} 6'$ et peccatum circa Spicam, forte quod pro Spica Mars resumtus, erant enim propinqui invicem. Prodit hinc latitudo Martis $2^{\circ} 21\frac{1}{2}'$, longitudo $18^{\circ} 25'$ \simeq . Hora habetur ex eo, quod culminabat dorsum Leonis, cujus ascensio recta $163^{\circ} 13'$ tempore observationis. Solis vero in meridie locus $18^{\circ} 56' 24''$ γ , cujus ascensio recta $17^{\circ} 27' 55''$. Hinc differentia ascensionum $145^{\circ} 45'$, quae resolvitur in horas 9. 43'. Oriebatur $22\frac{1}{2}^{\circ}$ μ , ergo nonagesimi distantia a vertice 39° , distantia Martis et Terrae paulo major dimidia Solis et Terrae. Parallaxis ergo $5\frac{1}{2}'$ circiter, et latitudinis $3' 28''$. Ergo libera latitudo $2^{\circ} 25'$, quae an recte liberata sit, infra considerabimus. Et quia altitudo nonagesimi 51° et Martis a nonagesimo distantia 56° , ergo longitudinis parallaxis $3' 32''$. Esset itaque Mars in $18^{\circ} 21\frac{1}{2}'$ \simeq . Locus Solis ad momentum nostrum $19^{\circ} 20' 8''$ γ . Distantia siderum $58\frac{1}{2}'$. Solis diurnus $58' 38''$, Martis $22' 36''$. Nam anno 1587 in μ est $24'$, anno 1589 in 4° μ est $22' 8''$; summa diurnorum $1^{\circ} 21' 14''$. Quibus elementis conficitur, oppositionem veram praecessisse horis 17. 20', nempe die $\frac{29. \text{ Mart.}}{8. \text{ Apr.}}$ h. 4. 23' matutina. Locus δ $18^{\circ} 37' 50''$ \simeq . Pro reductione ad orbitam subtrahe $39''$ circiter, ut sit locus Martis μ $18^{\circ} 37' 10''$ \simeq . Latitudo exiguo major quam $2^{\circ} 25'$, sed neglecta parallaxi est $2^{\circ} 22'$ borealis.

Atque haec 12 loca eccentrica Martis (exuta scilicet, quoad longitudinem, omni inaequalitate secunda) omni possibili diligentia constituta sunt. Si quid me in tam spinoso labore fugit etiamnum (fugerat autem aliquando per 18 mensium spatium, me falso fundamento, falso inquam, applicatae observationi inniti et in vanum tam diu laborare), id equidem nulla ratione possum animadvertere.

Exponam itaque loca omnia in sequenti tabella, additis longitudinibus mediis ex Tychone (potui vel ex Prutenicis vel ex peculiari computo, qualem Ptolemaeus praemisit suis demonstrationibus: sed nihil opus. Nam si correctione indigebit motus medius, postmodum eam inveniet. In praesentia nobis serviet nihilominus ad interstitia temporum metienda sine errore sensibili).

	Stylo veteri				Longitudo	Latitudo	Long. media
	Anni	D.	Mens.	h.	° ' " s.	° ' "	s. ° ' "
I.	1580	18	Nov.	1. 31	6. 28. 35 II	1. 40 b.	1. 25. 49. 31
II.	1582	28	Dec.	3. 58	16. 55. 30 ☉	4. 6 b.	3. 9. 24. 55
III.	1585	30	Jan.	19. 14	21. 36. 10 ♀	4. 32 $\frac{1}{2}$ b.	4. 20. 8. 19
IV.	1587	6	Mart.	7. 23	25. 43. 0 ♄	3. 41 b.	6. 0. 47. 40
V.	1589	14	Apr.	6. 23	4. 23. 0 ♃	1. 12 $\frac{1}{4}$ b.	7. 14. 18. 28
VI.	1591	8	Jun.	7. 43	28. 43. 0 ♂	4. 0 m.	9. 5. 43. 55
VII.	1593	25	Aug.	17. 27	12. 16. 0 ♄	6. 2 m.	11. 9. 55. 4
VIII.	1595	31	Oct.	0. 39	17. 31. 40 ♂	0. 8 b.	1. 7. 14. 9
IX.	1597	13	Dec.	15. 44	2. 28. 0 ☉	3. 33 b.	2. 23. 11. 56
X.	1600	18	Jan.	14. 2	8. 38. 0 ♀	4. 30 $\frac{1}{2}$ b.	4. 4. 35. 50
XI.	1602	20	Feb.	14. 13	12. 27. 0 ♄	4. 10 b.	5. 14. 59. 37
XII.	1604	28	Mart.	16. 23	18. 37. 10 ♄	2. 26 b.	6. 27. 0. 12

Caput XVI.

Methodus inquirendi hypothesin pro inaequalitate primae salvanda.

Ptolemaeus libro IX. Operis Magni capite 4. primam inaequalitatem planetarum aggressurus praemittit superficiariam quandam declarationem suppositionum, quibus velit uti, cujus summa haec est: cernimus planetam in oppositis semicirculis inaequaliter immorari. Ut a 2 $\frac{3}{4}$ ° ☉ per ♀ in 26 $\frac{3}{4}$ ° ♂ minus est semicirculo; a 26° ♂ per ☉ in ☉ plus semicirculo, et tamen inventus est planeta diutius commorari in illo quam in hoc, cum ex aequalitatis lege contrarium oportuerit, nam a media longitudine 2° 23' 18" in 9° 5' 44" sunt 6° 12' 26" plus semicirculo, hoc est plus quam dimidium temporis periodici planetae: ita a 12° 16' ♄ per ♀ in 12° 27' ♄ est propemodum semicirculus plus 11'; subtracta vero longitu-

distans media illius loci ($11^{\circ} 9' 55''$) ab hujus longitudine ($5^{\circ} 14' 59''$), deprehenditur interesse $5^{\circ} 5' 5''$, plus nempe dimidio; per $5^{\circ} 5'$ planeta quirit $\frac{1}{10}$ per $\frac{1}{2}$ in $\frac{1}{2}$ tanta brevius commoratur. Quodsi loca vicina angustiam expendas et arcus interjectos cum temporibus seu arcibus mediae longitudinis compares, deprehendes planetam in certo et uno loco sub zodiaci latissimum, in opposito velocissimum, in interjectis (pro ratione propinquitatis ad alterutrum) paulatim cursum intendere vel reverti.

Haec arguunt primo motum planetae (quamvis inaequalis appareat) curvationibus tamen administrari, quarum haec est successiva moderatio aequae in item reditio. Nam si planeta rectis lineis angulos conformantibus moveret (ut si latera quinquanguli perambularet, in quibus cogitationibus otium fuit), pro ratione linearum aliquando subita fieret commutatio motus celerioris in tardiorum evidenti discrimine, idque non uno sed pluribus zodiaci locis contingeret pro laterum multitudine. Cum autem tanta inaequalitas, post remotam inaequalitatem quae ex Sole pendet, etiamnum restet in motu planetae: ergo simplicis circuli positione (cujus in centro visus constituitur) vel administrari vel demonstrari non poterit. Potest autem per compositionem plurium circularum vel quasi (ut Ptolemaeus libro III. praemisit), idque duobus modis quam simplicissime: vel eccentrici circuli vel concentrici cyclo usurpatione.

Elegit itaque Ptolemaeus eccentricum pro prima inaequalitate, distinctionis et captus juvandi causa, eo quod epicyclus secundae inaequalitati esset necessarius. Deinde hoc generale dictum ruminans negat nudum eccentricum planetis sufficere. Nam postquam crebro expenderit, quid fieri consentaneum sit, circumeuntibus unâ epicyclo pro secunda et eccentrico pro prima inaequalitate salvanda, collatis observationibus apparuisse, quod epicycli centrum multo propius accedat ad Terram in apogaeo, longius fugiat in perigaeo, quam simplex eccentricus ille, qui primam inaequalitatem praestat, patiat: hinc continuo sermone delabitur ad mensuram hujus appropinquationis refertque, se deprehendisse, quod centrum ejus eccentrici, qui epicycli centrum fert, sit praecise medio loco inter centrum visus seu Terrae et centrum aequalitatis seu eccentrici inaequalitatem primam salvantis. Nec ulla demonstratione allata hoc tamen principio nititur in tribus superioribus.

Copernicus (ut saepe alias) hic quoque magistrum religiose sequitur accommodata sua forma ad hanc quoque mensuram. (Vide de hoc marginem ad caput XIX.)

Id vero non immerito mirati sunt astronomi et (ex ore Maestlini) ego quoque, ut vides in *Mysterio Cosmographico* cap. XXII fol. 79 (Vol. I, 183). Ceterum quod illo loco citati libelli putavi, Ptolemaeum caeca conjectura usum ad hoc statuendum, id secus habet. Potuit enim demonstratione optima ex observatione idonea id evincere, ut infra demonstrabo; tantum hoc in artifice desideres, quod observationes illas cum demonstratione ad posteros non transmisit.

Cum itaque tunc quidem existimarem, hoc *μεγα λαν αίτημα* esse, viderem etiam a Copernico non obscure addubitari, dum de mutata Martis eccentricitate disputat, numeris ejus ab hac dimidiatione discrepantibus: cogitavi de methodo, quae me ad proportionem utriusque eccentricitatis

(quia, ut dixi, non erat certum, duplam esse) cognoscendam perduceret. Cumque Ptolemaeus tribus *ἀπορρυτοῖς* observationibus et hac praeconcepta opinione de proportionibus eccentricitatum evinceret et apogaei locum et correctionem longitudinis mediae, denique et quantitatem eccentricitatum: vidi ego, si problema hoc enervaretur (surrepto axioma de proportionibus eccentricitatum), vagum futurum et casus non unius, itaque quarta insuper observatione *ἀπορρυτοῦ* vicissim firmandum. Hac igitur arte instructus anno 1600 ad Tychonem veni laetusque didici, ab ipso quoque investigatam non assumptam hanc proportionem, ut numeri ejus indicant. Facit enim eccentrici (Copernici, cujus definitio est initio cap. V. hujus libri) centrum distare a visu 13680 particulis, quarum aliis 3780 punctum aequalitatis ab hoc vicissim distet, quod esset in forma Ptolemaica, ac si distantiam centrorum visus et eccentrici faceret 9900, reliquam inter centrum eccentrici et punctum aequalitatis 7560.

Potui quidem et ipse uti dimidiatione pro certa, idque meliori jure quam Ptolemaeus, quia in Mysterio meo cap. XXII. causam ejus dimidiationis physicam attuleram; verum ob id ipsum ad Tychonem veneram, ut ex ejus observationibus in mea placita libello dicto promulgata certius inquirere possem: quod quidem feci sine praepudio et etiamnum facio. Quodsi supervixero, quoad astronomia suam puritatem et perfectionem nanciscatur, ut in causa (quam in illo libello ad ejus tribunal devolvi) pronunciari possit, polliceor lectori, me libellum illum retracturum et confirmatis, quae vera deprehendi, reliqua quae secus habent fideliter detecturum. (Comp. Vol. I, p. 102.)

Sed ad rem. Centro B (Fig. 69) scribatur eccentricus FG: in eo per B diameter apsidum HI, per aliquot annos quasi immutabilis. Hoc si periculum erroris haberet, non deessent nobis media hoc quoque cavendi. In hac infra B sit A visus, supra B sit C centrum illud, apud quod anguli spatiis temporum proportionantur, cum circa A (ut paulo supra dictum) non proportionentur. Sint autem F, G, D, E observationes quatuor per ambitum circuli dispositae, sic quidem ut planeta, exutus inaequalitate secunda, sic appareat, quasi visus in A fuisset. Nam apud Ptolemaeum quidem A vere locus est visus seu centrum Terrae, apud Tychonem vero et Copernicum visus est in linea FA, GA, DA, EA, et A Sol est. Supra vero dictum est, utraque ratione planetam inaequalitate secunda perinde exui. Connectantur autem puncta omnia cum omnibus: et sit AF in $25^{\circ} 43' 17''$; AG in $26^{\circ} 43' 4''$, AD in $12^{\circ} 16' 4''$, AE in $17^{\circ} 31' 3/4''$. (Comp. tab. p. 241.) Hinc dantur quatuor anguli circa A, nempe FAG $91^{\circ} 0'$, GAD $75^{\circ} 33'$, DAE $65^{\circ} 15' 3/4''$, EAF $128^{\circ} 11' 1/4''$. Qui sunt corrigendi nonnihil ob praecessionem aequinoctiorum. Sub fixis enim planeta non tam longe promotus est in E ultima observatione, quam indicatur per hos numeros. Quare FAE paulo est major, reliqui tanto minores. Eodem modo ex subtractione longitudinum habentur et anguli circa C.

Propositio. Oportet jam angulos FAH et FCH tantos assumere, ut iis positis et puncta F, G, D, E stent in uno circulo, et B centrum illius circuli sit inter C, A puncta in linea CA.

Solutio non est geometrica, siquidem algebra geometrica non est: sed fit per duplicem falsam positionem.⁶⁹ Nam et algebra hic nos deserit, quia nomina artis recte communicata per rectas non derivantur in angulos,


nisi fortasse quis universam doctrinam sinuum in unam hanc operationem conjicere velit.

At vide quid facere jussi simus. Nam si angulum FAH assumserimus, cum linea AF habeat locum certum sub fixis, alterum quoque crus AH assumetur habere locum certum sub fixis. Esto vero AH linea apogaei, Copernicana et Tyconica notione linea aphelii. Ergo jubemur assumere et ponere, quod erat quaerendum. Nam ut hoc aphelium addisceremus, hanc viam coepimus ingredi. Eodem modo cum AH (id est CH) locum sub fixis per hanc nostram positionem fuerit adepta transeatque per C centrum aequantis circuli (ideoque etiam per initium, a quo partes ejus incipiunt numerari, utpote ab apside, quae concipiatur supra H), et jubeamur assumere angulum FCH, ergo et CF linea nanciscetur locum in aequantis circumferentia. Atqui haec est longitudo media, quae loco viso planetae in F respondet, et hujus longitudinis mediae notitiam quaerebamus. Assumimus igitur praeter apogaeum et aliud quoque ex iis quae quaerebantur.

Verum enimvero non est insolens neque geometricis neque arithmeticiis neque dialecticis, uti argumenti forma ad impossibile ducentis, ut, si videant, ex assumtis sequi aliquid absurdi, ea tanquam falsa rejiciant, idque tantisper, quoad amputatis hoc pacto excessibus et defectibus ipsa veritas (quae penes mathematicas disciplinas in medio utrorumque latitat) detegatur. Id autem fit in praesentia in hunc modum.

Capiat linea CA nomen et sit ita data. Quia igitur assumitur FCH

Fig. 69.



et FAH et per consequens etiam reliquarum linearum inclinationes ad HCA, et AC est commune latus quatuor triangulorum (CFA, CGA, CDA, CEA) quorum sunt dati anguli: igitur in mensura ipsius AC dabuntur quatuor lineae AF, AG, AD, AE. Et quia in novis quatuor triangulis FAG, GAD, DAE, EAF latera jam sunt data cum angulis ad A inter bina latera, non igitur ignorabuntur singuli ex singulis triangulis anguli ad bases, nempe AFG, ADG, ADE, AFE. Sed AFG et AFE sunt partes anguli GFE. In quadrangulo vero DEFG (siquidem est inscriptum circulo, quod est hic inter

hypotheses) convenit, binos oppositos angulos (ut GFE, GDE) simul aequare summam duorum rectorum. Junctis igitur quos jam invenimus quatuor angulis, si summa differat ab hac duorum rectorum mensura, pronuntiabimus assumpta falsa esse: sive in alterutro assumptorum falsitas insit sive in utroque.

Retento igitur altero FCH etiamnum, mutato vero reliquo FAH, redibitur ad caput et denuo inquiretur summa quatuor angulorum. Quae si longius a duobus rectis recesserit quam summa prior, argumento est mutationem ipsius FAH perperam esse susceptam. Contrarium igitur illi faciendum. Ut si forsitan addidisses, jam minuas: vel contra. Sin autem propius ad justam mensuram accessisti, in via te esse intelliges. Et tunc comparatione facta ejus defectus, qui fuit in principio, ad eum qui jam restat, eadem in proportionem perges augendo vel minuendo angulum FAH.

At non ideo certum est, secundam istam correctionem tuis quatuor

angulis fustam statim mensuram conciliaturam. Non enim circularium augmentorum eadem est proportio quae rectorum. Repetendus tibi labor erit iterum atque iterum, dum tua summa quaesitorum angulorum sit 180° vel proxime tanta: minima enim tuto negliges.

Ubi hoc fueris consecutus, ut anguli F, D (ideoque et residui G, E) vere stent in eadem circumferentia, jam porro et alterum eorum quae sequi convenit explorandum est, utrum videlicet B centrum illius circuli stet inter C, A in eadem linea. Nam de hoc supra dictum, quod Ptolemaeus id omnino assumeret, et rationes physicae requirant, ut ibi sit tardissimus motus, ubi sidus ab A Sole distat longissime, ut in H: quod non aliter fieri potest, quam si A, B, C sint in eadem linea. Ut hoc inquiratur, jungantur (GAD, DAE) noti, ut angulus GAE noscatur, et in GAE ex hoc angulo et lateribus (GA, AE) quaeratur latus GE. In triangulo igitur GFE angulus GFE stat ad circumferentiam, ergo GBE angulus ad centrum duplus est ejus. Prius autem GFE investigatus fuit per partes GFA, AFE. Rursum igitur in triangulo GBE aequioro datur GBE angulus et GE latus. Quare non ignorabuntur anguli ad basin et GB radius circuli in proportionem AC eccentricitatis initio assumptae. Et quia jam habetur BG et BGE, prius vero habebatur AG et AGE, subtracto igitur AGE a BGE (vel vicissim, si usu veniat) relinquitur AGB. In triangulo igitur AGB dantur AG et BG et interjectus angulus AGB. (Quaeratur angulus BAG.) Qui si discrepat a CAG primum assumpto, argumento est, ipsum B, contra quam fieri par erat, cadere extra lineam CA. Rursum igitur falsa prominciabimus assumpta FCH et FAH. At quia retento FCH, mutato vero FAH, in aliud etiam absurdum impingitur, scilicet quod D, E, F, G loca non quadrat in circulum (uti jam supra hoc usu venerat, antequam ipsum FAH tantae quantitatis ultimo constitueramus): patet igitur, etiam FCH esse mutandum. Mutetur igitur, hoc est alia assumatur quantitas ipsius FCH pro lubitu, et retenta ea, per quatuor, quinque vel sex vices varietur FAH tantisper, donec rursum quatuor anguli ad F, D juncti faciant duos rectos: et tunc per triangula GAE, GFE, GBE, BGA contendatur ad secundam inquisitionem ipsius BAG, comparatione ejus facta cum CAG jam ultimo constituto. Ubi rursum videbis, an longius a vero recesseris an vero ad propinquitatem veneris, et secundum qualitates excessuum vel defectuum proportionumque additionum subinde ad caput redibis, donec BAG tantum deprehenderis quantum CAG vel HAG in illa vice assumeras. Eo ubi perveneris, tunc denique in triangulo BGA dabis ipsi BG nomen rotundum (centum millium) et in eadem proportionem (mediantibus angulis) quaeres et BA eccentricitatem eccentrici et CA eccentricitatem aequantis; unde subtracta BA relinquit CB. Tunc et de apogaei loco et de correctione motus medii (quae in ultima operatione supposueras) pronuntiabis quod bene habeant, quantum quidem hanc formam hypotheseos attinet.

Si te hujus laboriosae methodi pertaesum fuerit, jure mei te misereat, qui eam ad minimum septuagies ivi cum plurima temporis jactura, et mirari desines hunc quintum jam annum abire ex quo Martem aggressus sum, quamvis annus 1603. pene totus Opticis inquisitionibus fuit traductus.


Existent acuti geometrae Vietae similes, qui magnum aliquid esse putabunt, demonstrare hujus methodi ~~descriptum~~. Id enim et Ptolemaeo et

Copernico et Regiomontano objectum in hoc negotio a Vieta.⁶¹⁾ Eant igitur et schema geometrice ipsi solvant et erunt mihi magni Apollines. Mihi sufficit ad quatuor vel quinque conclusiones ex uno argumento (in quo quatuor observationes et duae hypotheses insunt) exstruendas, id est ad viam e labyrintho remeandam, pro lumine geometrico flum *ἀστρον* (quo tamen ad exitum dirigaris) ostendisse. Si difficilis captu est methodus, multo difficilior investigatu res est sine methodo.

Sequitur nunc exemplum praeceptionis hujus in propositis 4 observationibus. Reducuntur autem omnes loci causa praecessione ad primam observationem: ubi longitudo visa in $25^{\circ} 43' \text{ m}$, longitudo media $6^{\circ} 0' 47' 40''$, motus annuus fixarum est $51''$, ut Braheus demonstravit in Progymnasmatia. Ergo ab anno 1587. d. 6. Martii in annum 1591. d. 8. Junii sunt 4 anni, 3 menses, quibus respondet de motu praecessione $3' 37''$. Ergo ponendus nobis est visus locus anno 1591. in $26^{\circ} 39' 23'' \text{ x}$, longitudo media $9^{\circ} 5' 40' 18''$. Sic ab anno 1587. d. 6. Martii in annum 1593. d. 25. Augusti sunt anni 6, menses $5\frac{1}{2}$, quibus competit motus praecessione $5' 30''$. Ponendus itaque Mars in $12^{\circ} 10' 30'' \text{ x}$, longitudo media $11^{\circ} 9' 49' 34''$. Denique ab anno 1587. d. 6. Martii in ann. 1595. d. 31. Oct. sunt anni 8, menses 8 fere, quibus respondet motus $7' 18''$. Itaque reponendus Mars in $17^{\circ} 24' 22'' \text{ x}$, et longitudo media $1^{\circ} 7' 6' 51''$.⁶²⁾

Ponemus autem primo apogaeum vel aphelium anno 1587. in $28^{\circ} 44' 0'' \text{ Q}$. Secundo ponemus longitudes medias per $3' 16''$ augendas, ut sint longitudes mediae $6^{\circ} 0' 50' 56''$, $9^{\circ} 5' 43' 34''$, $11^{\circ} 9' 52' 50''$, $1^{\circ} 7' 10' 7''$.

Fig. 69.



Et quia CH est	28° 44' 0'' Q
et CF	0. 50. 56 \approx
Erit FCH	32. 6. 56.
Sic quia CH est	28. 44. 0 Q
et CD	9. 49. 34 x
Erit HCD	168. 54. 26.
Compl.	11. 5. 34.
Sic quia CH est	28. 44. 0 Q
et CG	5. 40. 18 z
Erit HCG	126. 56. 18.
Compl.	53. 3. 42.
Sic quia CH est	28. 44. 0 Q
et CE	7. 6. 51 x
Erit HCE	111. 37. 9.
Compl.	68. 22. 51.

Pro angulis aequationum.

CF 0° 50' 56'' \approx	CG 5° 43' 34'' z	CD 9° 52' 50'' x	CE 7° 10' 7'' x
AF 25. 43. 0 m	AG 26. 39. 23 x	AD 12. 10. 30 x	AE 17. 24. 22 x
CFA 5. 7. 56.	CGA 9. 4. 11.	CDA 2. 17. 40.	CEA 10. 14. 15.

Pro lineis ex A.

Cipiat AC nomen 10000. Ut igitur anguli aequationum ad AC sic anguli C ad lineas ex A. Dividendi sunt igitur sinus angulorum C in 10000 multiplicati per sinus angulorum aequationum.

Sin. FCH 53163	AF	Sin. GCH 79928	AG	Sin. DCH 19240	AD	Sin. ECH 92966	AE
Sin. CFA 8945		Sin. CGA 15764		Sin. CDA 4004		Sin. OEA 17773	
44725	5	78820	50	16016	4	88865	5
84380		11080		3224		41010	
80505	9	11035	70	3203	80	35546	2
3875		45	3	208		5464	
3578	4			200	5	5333	30
297				8	2	131	7
268	3						9)
29	3						

Pro angulis ad A.

AF 25° 43' 0" mp	AG 26° 39' 23" x	AD 12° 10' 30" x	AE 17° 24' 22" x
AG 26. 39. 23 x	AD 12. 10. 30 x	AE 17. 24. 22 x	AF 25. 43. 0 mp
FAG 90. 56. 23.	GAD 75. 31. 7.	DAE 65. 13. 52.	EAF 128. 18. 38.
Complementum ad semicirculum 89. 3. 37.	104. 28. 53.	114. 46. 8.	51. 41. 22.

Pro angulis ad F, D.

Anguli AFG, AFE, ADG, ADE, sunt propemodum dimidia de complementis angulorum A ad semicirculum: minores tamen qui ad F, eo quod lineae AG 50703, AE 52307 breviores sunt inventae quam AF 59433: et majores qui ad D, eo quod dictae lineae AG et AE sunt longiores quam AD 48052. Ac cum illi quatuor circa A aequent quatuor rectos, igitur et eorum complementa ad semicirculum junctim aequabunt quatuor rectos: quia quatuor semicirculi sunt octo recti. Dimidium ergo de summa complementorum sunt duo recti, quantos optamus fieri GFE, GDE junctim. Quantum ergo, qui ad F, deficiunt a dimidiis suorum complementorum, tantundem oportet eos, qui ad D, excedere sua complementa. At tangentes differentiae angulorum ad bases in hoc genere triangulorum habentur, si laterum differentias dividas per summas laterum et quotientem in tangentes dimidiarum complementorum multiplices. Ergo si binae differentiae angulorum ad F aequent summam ad D, angulus F cum angulo D aequabit duos rectos.

	FAG	GAD	DAE	EAF
Dimidia	44° 31' 48"	52° 14' 27"	57° 23' 4"	25° 50' 41"
Tangentes	98373	129093	156271	48438
	AF 59433	AG 50703	AD 48052	AE 52307
	AG 50703	AD 48052	AE 52307	AF 59433
Differentias	8730	2651	4255	7126
Summas	110136	98755	100359	111740
Diferent. F	4° 27' 30"	D 1° 59' 4"	D 3° 47' 10"	F 1° 47' 59"
		3. 47. 10		4. 27. 30

Summa duorum ad D 5. 46. 14. Summa duorum ad F 6. 15. 29.4)

Ergo hinc apparet, F et D summam esse minorem duobus rectis, quia minuenda differentia superat addendam.

Quantitas defectus est 29' 15". Soio vero ea multiplici reiteratione hujus laboris, additione 3' 20" ad aphelium summas coire. Id probabo.

Manebunt igitur anguli aequationum cum suis sinibus, ut et tangentes complementorum dimidiarum angulorum ad A.

Sed HCF 32° 3' 36'', GCI 53° 7' 2'', DCI 11° 2' 14'', ECI 68° 19' 31''
CFA 5. 7. 56, CGA 9. 4. 11, CDA 2. 17. 40, CEA 10. 14. 15.

Ergo AF	59341,	AG 50740,	AD 47815,	AE 52281
AG	50740,	AD 47815,	AE 52281,	AF 59341.
Ty. angul.	44° 31' 48''	— 52° 14' 27''	— 57° 23' 4''	— 25° 50' 41''
	98373	— 129093	— 156271	— 48438
Hinc F =	4° 23' 41'';	D = 2° 11' 37'';	D = 3° 59' 10'';	F = 1° 45' 18''
			2. 11. 37	4. 23. 41

Summa ad D = 6° 10' 47''; ad F = 6° 8' 59''⁶⁶⁾

Hic summae differunt non plus 1' 48''. Itaque jam nimium promovimus apogaeum, atque id per 12'' alia est retrahendum. Sed de tantula differentia cura est non necessaria. Componemus illam ex aequo et bono, ut in methodo nostra ulterius progredi possimus. Prius enim, cum peccaremus defectu per 29' 15'', summa differentiarum ad F et D fuit 12° 1' 44''. Jam ubi excessu 1' 48'' peccavimus, summa haec facta est 12° 19' 46''. Cum itaque 31' fuerint in summa differentiarum 18', ergo 1 $\frac{1}{2}$ ' faciunt propemodum 1', ut justissima summa evadat 12° 18' 44'', cujus dimidium 6° 9' 22'' est summa vel ad F vel ad D. ⁶⁷⁾

Pro triangulis GFE, GBE.

In FAG dimidium compl. fuit 44° 31' 48'', in FAE 25° 50' 41''; summa 70° 22' 29''. Hinc aufer summam differentiarum 6° 9' 22'', restas GFE 64° 13' 7''; duplum ergo erit in GBE 128° 26' 14'', cujus compl. 51° 33' 46'', dimidium 25° 46' 53''.

Et quia GAD = 75° 31' 7''
et DAE = 65. 13. 52

Ergo GAE = 140° 44' 59'', compl. 39° 15' 1''.

Erat etiam primo GA = 50703; et AE = 52302
secundo . . 50740; 52281

Differentia .	37	21
Ergo jam .	50739	52282.

Quaeritur igitur GE ex GA, AE lateribus et GAE angulo.

Angulus AGE = 19° 55' 51''.

Ut sinus AGE ad AE, sic sinus GAE ad GE.

GE = 97041. ⁶⁸⁾

Ergo in GBE: ut GBE ad GE sic BGE ad BE; BE = 53860.

Et quia fuit AGE = 19° 55' 51''

Jam vero BGE = 25. 46. 53

Erit BGA = 5° 51' 2''; compl. 174° 8' 58'', dim. 87° 4' 29''.

BG = 53860, AG = 50739, ergo BAG = 117° 21' 37''.

Ultima vice promovimus aphelium adhuc per 3' 8''. Ergo quia AH 28° 47' 8'' Q, et AG 26° 39' 23'' X, fuit HAG vel CAG 117° 52' 15''. ⁶⁹⁾

Ergo B parumper egreditur lineam CA versus G: quia CAG major est quam BAG scrupulis 30' 38''. Hoc autem habeo ex multiplici experientia, quod per additionem dimidii scrupuli ad longitudinem mediam B inducatur in lineam CA. Simul autem, ut quadrangulum stet in circulo, promovendum est aphelium per 2'. Id lubet explorare simulque eccentricitatem demonstrare. Cum igitur addantur ad CF et socios 30'', ad CH vero 2', minuetur HCF per 1' 30''.

Igitur HCF 32° 2' 6'', GCI 53° 8' 32'', DCI 11° 0' 44'', ECI 68° 18' 1''. Anguli vero aequationum per 30'' augentur et minuantur. Igitur

CFA 5° 8' 26'', CGA 9° 4' 32'', CDA 2° 17' 10'', CEA 10° 13' 46''; hinc
 AF 59201, AG 50775, AD 47887, AE 52322; et
 F 4° 18' 36'', D 2° 9' 52'', D 3° 57' 24'', F 1° 42' 41''
 3. 57. 24 4. 18. 36.

Summa una 6° 7' 16''; Summa altera 6° 1' 17''^{*)}

Ses minutis abundamus, quae tolluntur retractione aphelii per 38''; ut, quia
 fuit in 28° 49' 8'' Q, jam erit in 28° 48' 30'' Q.

P r o b o.

HCF 32° 2' 44'', GCI 53° 7' 54'', DCI 11° 1' 22'', ECI 68° 17' 23''; hinc
 AF 59219, AG 50769, AD 47931, AE 52317
 AG 50769, AD 47931, AE 52317, AF 59219
 AF + AG = 109988; AG + AD = 98700; AE + AD = 100248; AF + AE = 111536
 AF - AG = 8450 AG - AD = 2838 AE - AD = 4386 AF - AE = 6902
 Quotiens 7683 — — 2875 — — 4375 — — 6188
 Prius 7662 — — 2927 — — 4426 — — 6168
 Dif. 21 — — 52 — — 51 — — 20
 98373 129093 156271 48438
 Tang. augm. 21 67 80 10
 Arc. augm. 41'' 2' 14'' 2' 39'' 19''
 2. 39 41
 Prius 6° 7' 16'' Prius 6° 1' 17''
 Jam 6. 2. 23 Ecce aequalitatem. Jam 6. 2. 17.^{*)}

Rursum itaque quadrangulo in circulum incluso quaeratur, an B sit
 in linea CA. Et a summa 70° 22' 29'' supra constituta aufer jam
 inventam differentiam 6° 2' 20'', remanet GFE = 64° 20' 9''; dupli
 compl. 51° 19' 42'', dimidium BGE = 25° 39' 51''. Ultimo fuit GA
 50769, AE 52317; compl. GAE 39° 15' 1'', dimid. 19° 37' 30''; AGE
 19° 55' 54''. Hinc GE = 97103.

BGE - AGE = BGA = 5° 43' 57''; dimid. compl. 87° 8' 1½''; BG =
 53866, GA = 50769; hinc tangens ½ (GAB - GBA) = 59114.

GAB - GBA = 30° 35' 22''
 87. 8. 1
 BAG = 117° 43' 23''
 Compl. 62° 16' 37''^{*)}

Aphelium 28° 48' 30'' Q
 AG 26. 39. 23^x

CAG = 117° 50' 53''. Adhuc B per 7' 20'' egreditur lineam CA versus G.

Unde intelligimus, quia prius additione 30'' ad motum medium et
 82'' ad aphelium promovimus per 23' 18'', nos reliqua 7' 20'' consum-
 tuos additione 9'' ad motum medium et 25'' ad aphelium. Tota igitur
 additio ad Tychois longitudinem est 3' 55''. Et aphelium ponitur in
 28° 48' 55'' Q.^{*)} In tam parvo autem errore nihil incommodi accipit,
 qui in CAG triangulo ex angulis et lateribus cognitis inquirat BA, quasi
 B sit praecise in linea CA.

Sinus BGA = 9988, sinus BAG = 88520, ergo BA est 11283, quatum
 BG 100000. Ut vero 53866 (BG) ad 100000, sic 100000 ad AC; ergo AC = 18564
 et BC = 7281, quatum BG 100000.^{*)}

Sed ut omnis error excludatur, agamus proportionaliter. Primo fuit

BG 53860, AG 50739, BGA 5° 51' 2", BAG 62° 38' 23";			
Jam: 53866	50769	5. 43. 57	62. 16. 37
Differentia 6	30	7. 5	21.46 <i>Amplius tertia parte</i>
pergendum 2	11	2. 25	8.
BG corr. 53868; AG 50780; BGA 5° 41' 32"; BAG 62° 8' 37"			
(+ 5° 41' 32" = 67° 50' 9").			
$\frac{100000}{53868} = 18564; \frac{\sin. 5° 41' 32''}{\sin. 62° 8' 37''} = 11332.$			
Manet igitur eccentricitas tota 18564			
eccentrici vero 11332			
et aequantis 7232. ⁶⁴⁾			

In forma Copernicana et Tythonica esset diameter parvi epicycli 3616, majoris 14948. Vel secundum ea, quae in fine capitis quarti dicta sunt, pro sinu tangens sumatur in hunc modum:

Investigetur aequatio maxima ad gradum nonagesimum. Sit HCG 90°; erit BC sinus anguli BGC 4° 8' 51", et GBC 85° 51' 9", et GC 99738. At in forma Copernicana C stante ad centrum concentrici, erit GC 100000. Ut igitur CGA angulus aequationis maneat, idem Tythoni et Copernico in eadem proportionem augendus est: $\frac{1856400000}{99738} = 18613$, Co-

pernico-Tythonica eccentricitas composita. Et haec in tangentibus exhibet 10° 32' 38" communem aequationis angulum ad gradum anomaliam 90. Ergo minoris epicycli diameter correcta 3628, majoris 14988.

Confer ista omnia cum cap. V, ubi restitutionem Tythonicam a medio ad apparentem Solis motum transposui, et vide quam sit exiguum discrimen.

Atque hac methodo ex quatuor ἀπορρυγμοῖς ὁ locis hypothesis primae inaequalitatis est investigata. In qua hoc cum Ptolemaeo posui: loca omnia planetae per coelum disposita ordinari in circuli unius circumferentia: item iis locis physicam retardationem esse maximam, ubi planeta longissime a centro Terrae (secundum Ptolemaeum) vel Solis (secundum Tythonem et Copernicum) digreditur: et fixum esse punctum, ad quod mensura hujus retardationis expenditur. Cetera omnia demonstravi; siquidem forma demonstrandi est, ad impossibile ducere. Utrum autem haec a me inter demonstrandum assumpta vere ita habeant an secus, id in sequentibus patebit.

Jam etiam reliqua loca octo ad hanc hypothesis consensus causa examabo. Sed ut examen sit universale et legitimum, immiscebo etiam apogaei motum. Hunc igitur prius investigabo.

Caput XVII.

Apogaei et nodorum motus superficiaria inquisitio.

Tam certa erit haec inquisitio, quam sunt observationes (imo vero traditiones Ptolemaicae) certae. Absque hoc artifice fuisset, minus adhuc hodie nobis constaret de his tardissimis motibus. Adeo praeter illum nemo inventus est, ex quo literas excoluere nationes, qui hic nos juvaret.

Ponimus hic quae apud Ptolemaeum inveniuntur non undiquaque certissima. Primo, fixas fuisse praecise in iis zodiaci locis, in quibus a Ptolemaeo collocantur. (Ptol. VII.) Secundo, veram fuisse Solis eccen-

tricitatem, quam Ptolemaeus prodidit 4153, qualium semidiameter orbis est 100000. (Ptol. III, 4.) Tertio, apogaeum Solis haesisse in $5\frac{1}{2}^{\circ}$ II (ibidem). Quarto, apogaeum δ (motu ejus ad medium Solis motum accommodato) inventum in $25\frac{1}{2}^{\circ}$ \odot . (Ptol. X, 7.) Quinto, eccentricitatem δ fuisse 20000, qualium semidiameter 100000 (ibidem). Sexto, proportionem epicycli (Ptolemaeo) vel orbis annui, (Tycho et Copernico) ad orbem Martis fuisse ut 100000 ad 151900. Quare qualium semidiameter orbis Solis vel orbis magni est 100000, talium erit eccentricitas Martis 30380. (Ptol. X, 8.) ⁶⁶⁾

Agemus ut capite V. Sit A punctum, ex quo descriptus est orbis magnus, C punctum aequatorium Martis, B centrum orbis Solis. Et quia AB est in $5\frac{1}{2}^{\circ}$ II, AC vero in $25\frac{1}{2}^{\circ}$ \odot , ergo CAB est 50° . Et AB ponitur 4153, AC vero earundem partium 30380. Datis igitur duobus lateribus et angulo comprehenso, habetur angulus CBA $123^{\circ} 27'$. Et quia BA vergit in $5\frac{1}{2}^{\circ}$ \nearrow , vergit igitur BC (subtracto angulo $123^{\circ} 27'$) in $2^{\circ} 3'$ \searrow circiter, idque tempore Ptolemaei. Simul CB eccentricitas aequantis post transpositionem ad verum motum Solis fuit 18353. Supra hanc inveni ex transpositione Tycho-nicae hypoteseos 18342: uno mutato, quod pro quantitate orbis Martii 151386 veriore usurpavi 152500. Sed haec obiter. Jam ad rem.

Fig. 70.




Tabella motus apheliorum et nodorum.

De motu apheliorum.
Quia circa tempora Ptolemaei praecessio aequinoctiorum exorbitabat, ante et post nulla plane suspicio talis est residua. Separabo hanc et locum angis expendam ad fixa sidera. Fuit autem cor Leonis illa aetate in $2^{\circ} 30'$ \searrow . Ergo praecessit aux Martis seu aphelium hanc stellam $27'$ anno Christi 140. circiter. Nostra aetate invenit Tycho Brahe sidus hoc anno Christi 1587. in $24^{\circ} 5'$ \searrow , cum aphelium processit in $28^{\circ} 49'$ \searrow , distans a corde Leonis per $4^{\circ} 44'$ in consequentia; quibus si superiora $27'$ jungas, summa ($5^{\circ} 11'$) est motus annorum 1447 intermediarum ab anno Christi 140 in 1587. Motus igitur annuus est propemodum $13''$: motus annorum 30: $6' 29''$. Quibus si rursus addideris motum fixarum seu praecessionis Tychonici, qui quam proxime aequabilis est et temporibus omnibus (solo excluso Ptolemaico) idem, nempe pro annis 30: $25' 30''$, conficies summam $31' 59''$: annum ergo motum aphelii Martis ab aequinoctio hoc tempore $1' 4''$.

Anni	Aphelium	Limes & Nodi
	' "	' "
1	1. 4	0. 40
2	2. 8	1. 21
3	3. 12	2. 1
4	4. 16	2. 42
5	5. 20	3. 22
6	6. 24	4. 3
7	7. 28	4. 43
8	8. 32	5. 24
9	9. 36	6. 4
10	10. 40	6. 45
11	11. 44	7. 25
12	12. 47	8. 6
13	13. 51	8. 46
14	14. 55	9. 27
15	15. 59	10. 7
16	17. 3	10. 48
17	18. 7	11. 28
18	19. 11	12. 9
19	20. 15	12. 49
20	21. 19	13. 30
21	22. 23	14. 10
22	23. 27	14. 50
23	24. 31	15. 31
24	25. 35	16. 11
25	26. 39	16. 52
26	27. 43	17. 32
27	28. 47	18. 12
28	29. 51	18. 53
29	30. 55	19. 33
30	31. 59	20. 13

	Aphelium	Limes & Nodi
Mens.	Secund.	Secund.
1	5	3
2	11	7
3	16	10
4	21	13
5	27	17
6	32	20
7	37	23
8	43	27
9	48	30
10	54	33
11	59	37
12	1' 4	40

De motu nodorum.

Cognitionis causa hoc quoque jam expediemus, quamvis non ita necessarium. Et quia Ptolemaeus (XIII, 1) limitem boreum Martis ait esse *περί τα τελευταία του Καρπου, και ογδοος περί το άπογοτατον*, fuerit ergo in $29^{\circ} \odot$, scilicet $3\frac{1}{2}^{\circ}$ ante cor \odot . Quamvis Ptolemaeus (III, 6) ob facilitatem calculi reponat limitem boreum in ipsissimum apogaei locum, scilicet in $25\frac{1}{2}^{\circ} \odot$. At hodie est in $16^{\circ} 20'$ \odot circiter, nempe $7^{\circ} 45'$ ante cor \odot . Subtractis $3^{\circ} 30'$, deprehenditur limes boreus et consequenter nodi per $4^{\circ} 15'$ retrocessisse a corde \odot , quod quidem consentaneum est et Lunae motio-

nibus, cujus itidem apogaeum sub fixis progreditur, nodi retrocedunt. Annuus igitur motus in antecedentia est $10'' 34'''$: annorum 30. est $5' 17''$. Quae aufer a motu praecessionis $25' 30''$, relinquuntur $20' 13''$. Et totidem scrupulis Martis nodi hodiernis 30 annis ab aequinoctiali puncto moventur itidem in consequentia.

	Anno 1589	Anno 1591	Anno 1593	Anno 1595
	s o ' "	s o ' "	s o ' "	s o ' "
<i>Aphelium anno 1587</i> . . .	4. 28. 48. 55	4. 28. 48. 55	4. 28. 48. 55	4. 28. 48. 55
<i>Movetur annis intermediis</i> . . .	2. 15	4. 32	6. 48	9. 14
<i>Aphel. anno supra scripto</i> . . .	4. 28. 51. 10	4. 28. 53. 27	4. 28. 55. 43	4. 28. 58. 9
<i>Longitudo media</i> . . .	7. 14. 18. 28	9. 5. 43. 55	11. 9. 55. 4	1. 7. 14. 9
<i>Addo</i>	3. 55	3. 55	3. 55	3. 55
<i>Correcta long. media</i> . . .	7. 14. 22. 21	9. 5. 47. 50	11. 9. 58. 59	1. 7. 18. 4
<i>Ergo angulus C (Fig. 69)</i> . . .	75. 31. 11	128. 54. 23	11. 3. 16	111. 40. 5
<i>Sinus</i>	96823	79961	19174	92934
<i>Eccentricitas aequantis</i> . . .	7232	7232	7232	7232
	65088	50824	07282	65088
	4339	6509	6509	1446
	578	651	072	651
	14	43	51	22
	2	1	3	3
	7002	5783	1387	6721
<i>Pars aequationis</i>	4. 0. 55	3. 18. 55	0. 47. 42	3. 51. 14
<i>Angulus B</i>	71. 30. 16	123. 35. 28	11. 50. 58	107. 48. 51
<i>Dimidium</i>	35. 45. 8	61. 47. 44	168. 9. 2	53. 54. 26
<i>Tangens</i>	72002	186464	963600	137171
<i>Quotiens</i>	79643	79643	79643	79643
	557501	798430	7167870	796430
	15929	637144	477868	238929
	16	47786	23893	55750
		3186	4779	796
		478		557
		32		8
<i>Tangens</i>	57344	148506	767440	109247
	29. 49. 54	56. 2. 40	82. 34. 30	47. 31. 49
	35. 45. 8	61. 47. 44	84. 4. 31	53. 54. 26
<i>Angulus ad A</i>	65. 35. 2	117. 50. 24	166. 39. 1	101. 26. 15
<i>Aphelium</i>	148. 51. 10	148. 53. 27	148. 55. 43	148. 58. 9
<i>Locus Martis in</i>	4. 26. 12 III	26. 43. 51 X ⁿ	12. 16. 42 X	17. 31. 54 X
<i>Debet</i>	4. 24. 0	26. 43. 0	12. 16. 0	17. 31. 40
<i>Diferentia</i>	2. 12	0. 51	0. 42	0. 14

Vides igitur studiosae lector, hypothesin hanc methodo superiori investigatam non tantum fundamenta sua quatuor vicissim per calculum restituere, sed etiam reliquas omnes observationes intra duo scrupula tenere; quam quidem magnitudinem semper stella haec in acronychio situ amplitudine corporis occupat et excedit. Quo argumento cognoscitur, si quis superiorem methodum repetat assumtis aliis atque aliis observationum quadrigis, semper eandem eccentricitatem, eandem ejus sectionem, idem aphelium motumque medium quam proxime proditurum. Pronuncio igitur, situs acronychios hoc calculo tam certos exhiberi, quam certae possunt esse observationes per sextantes Tychonicos, quae (ut praedixi) ob grandiusculam corporis Martii diametrum, ob refractiones et parallaxes nondum certissime cognitae, in nonnulla (certe 2') ambiguitate versantur.

Denique vides, nihil obfuisse transpositionem acronychiarum visionum a medio ad apparentem Solis motum, quo minus certitudinem calculi Tychonici, quae mihi medium Solis motum deserturo pro argumento opponeretur (comp. p. 71), non tantum imitaretur, sed etiam superarem.

	Anno 1597	Anno 1600	Anno 1602	Anno 1604.
	s o ' "	s o ' "	s o ' "	s o ' "
<i>Aphelium anno 1587</i> . . .	4. 28. 48. 55	4. 28. 48. 55	4. 28. 48. 55	4. 28. 48. 55
<i>Movetur annis intermediis</i>	11. 30	13. 43	15. 56	18. 11
<i>Aphel. anno supra scripto</i>	4. 29. 0. 25	4. 29. 2. 38	4. 29. 4. 51	4. 29. 7. 6
<i>Longitudo media</i> . . .	2. 23. 11. 56	4. 4. 35. 50	5. 14. 59. 37	6. 27. 0. 12
<i>Addo</i>	3. 55	3. 55	3. 55	3. 55
<i>Correcta long. media</i> . . .	2. 23. 15. 51	4. 4. 39. 45	5. 15. 3. 32	6. 27. 4. 7
<i>Ergo angulus C</i>	65. 44. 34	24. 22. 53	15. 58. 41	57. 57. 1
<i>Sinus</i>	91171	41280	27528	84759
<i>Eccentricitas aequantis</i> . .	7232	7232	7232	7232
	65088	28928	14464	57856
	0723	0723	5062	2893
	072	145	362	506
	51	58	14	36
	1		6	6 1/2
	6593	2985	1991	6130
<i>Pars aequationis</i>	3. 46. 50	1. 42. 40	1. 8. 26	3. 30. 52
<i>Angulus B</i>	61. 57. 44	22. 40. 13	14. 50. 15	54. 26. 9
<i>Dimidium</i>	30. 58. 52	11. 20. 6	7. 25. 8	27. 13. 5
<i>Tangens</i>	80045	20046	13021	51433
<i>Quotiens</i>	79643	79643	79643	79643
	477858	159286	79643	398215
	00318	319	23893	7964
	40	48	159	3186
			8	239
				24
<i>Tangens</i>	47822	16965	10370	409628
	25. 33. 30	9. 4. 14	5. 55. 14	22. 16. 32
	30. 58. 52	11. 20. 6	7. 25. 8	27. 13. 5
<i>Angulus ad A</i>	56. 32. 22	20. 24. 20	13. 20. 22	49. 29. 37
<i>Aphelium</i>	149. 0. 25	149. 2. 38	149. 4. 51	149. 7. 6
<i>Locus Martis in</i>	2. 28. 3 ☉	8. 38. 18 ♀	12. 25. 13 ☿	18. 36. 43 ☿
<i>Debet</i>	2. 28. 0	8. 38. 0	12. 27. 0	18. 37. 10
<i>Diferentia</i>	0. 3	0. 18	1. 47	0. 27 **)

Caput XIX.

Per latitudines acronychias redargutio hujus hypotheseos ex auctorum sententia constitutae et comprobatae per omnia loca ἀκρονυχια.

Fieri quis posse putaret? Haec hypothesis observationibus ἀκρονυχιας tam prope consentiens falsa tamen est, sive observationes ad medium Solis locum, sive ad apparentem examinentur. Ptolemaeus id nobis indicavit, dum bisecandam esse docet aequatorii puncti eccentricitatem per centrum eccentrici planetam ferentis. Nam hic a Tycho Brahe et a me eccentricitas aequatorii puncti non fuit bisecta. Copernico *) quidem

*) In Saturno et Jove simpliciter bisecuit, hoc est forma Copernicana quadrantem epicyclii semidiametro tribuit: in Marte vero, cum epicyclio tribuisset quadrantem eccentricitatis Ptolemaicae, nostra vero aetate totam Ptolemaicam minorem esse factam contenderet, reliquit tamen epicyclio quantitatem pristinam. Itaque centrum eccentrici (ut cum Ptolemaeo loquamur) 40 particulis propius admovit centro orbis annui quam centro aequantis circuli. Lib. V, cap. 16. Vide etiam cap. XVI hujus libri.

religio non fuit, id alicubi negligere, nam observationibus usus est omnino paucissimis, ratus fortasse, neque Ptolemaeum usum esse pluribus, quam in Magno Opere referuntur. Tycho Brahe hic haesit. Copernicum enim imitatus proportionem eccentricitatum constituit hanc, quam requirerent observationes acronychiae; quam cum redarguerent non solum latitudines *ἀκρονυχιαί* (nam his accidit etiamnum aliqua augmentatio ex inaequalitate secunda orta), sed etiam et multo quidem maxime observationes aliarum cum Sole configurationum inaequalitate secunda affectae: hic ille substituit et ad Lunaria conversus est, cum ego superveni.

Methodus autem, qua et absolveretur universa theoria Martis facile, si quae praemissa sunt rite haberent, et qua non rite habere demonstratur, haec est.

Fig. 71.



Primum per latitudines in situ *ἀκρονυχιαί*. *Exponatur in forma Copernicana linea DE in plano eccentrici Martis: in qua sit A Sol, D limes boreus, E limes austrinus vel proximus illi punctus: et per A trajiciatur recta HL, competens in planum eccentrici orbis Terrae. Concipliantur autem AH et AD in uno plano circuli latitudinis: sic AL, AE: et sit Terra anno 1585 in linea AH, scilicet in B, anno vero 1593 sit in lineae AL puncto C. Quia ergo AB et AD vergunt in $21^\circ \text{ } \varnothing$, ubi A Sol ex B apparet in $21^\circ \text{ } \text{---}$, vice versa vero E et C in $12^\circ \text{ } \text{X}$, ubi A Sol ex C Terra in $12^\circ \text{ } \text{---}$ apparet, est vero apogaeo Solis vicinior $12^\circ \text{ } \text{---}$ quam $21^\circ \text{ } \text{---}$: brevior igitur est BA quam AC. Excerptam autem has lineas ex folio 98. tomi I. Progymn. Tychonis Brahe, et ponam illas bene habere, quamvis infra (methodo nos eo deducente) paulo alias esse demonstraturus sim. Ibi igitur exhibetur BA 97500, AC 101400. Fiet autem in secutura correctione BA paulo longior et AC paulo brevior, non tamen aequales. Jam quia supra (cap. XIII.) duobus a praesenti negotio diversis modis BAD angulus in limite circa $16^\circ \text{ } \varnothing$ fuit inventus $1^\circ 50'$ circiter, ergo hic 4 aut 5° a limite $1^\circ 49\frac{1}{2}'$. Sed HBD visa latitudo anno 1585 fuit $4^\circ 32' 10''$. Hinc datis angulis HBD et BAD, datur etiam eorum differentia BDA $2^\circ 42' 40''$. Ut vero sinus BDA ad BA notam, sic sinus DBA ad DA. Quodsi BA assumitur 97500, prodit DA 163000. Sin illa est 100000, DA erit 167200. ")*

Sic cum sint C et E anno 1593 in X , distetque δ per 26° a limite, 64° a nodo: ut igitur sinus totus ad sinum inclinationis maximae $1^\circ 50'$, sic sinus 64° ad sinum CAE inclinationis hujus loci. Est igitur CAE $1^\circ 39'$. Sed latitudo visa LCE fuit $6^\circ 3'$, ergo angulus AEC est $4^\circ 24'$. Rursum igitur, ut sinus AEC ad AC notam, sic sinus ACE ad AE. Quodsi AC assumitur 101400, prodit AE 139300 fere. Sin illa est 100000, haec prodit 137380 fere. Cum autem $21^\circ \text{ } \varnothing$ absit ab aphelio circiter 8° , linea AD in ipso aphelio circiter 150 particulis longior erit (quod cuilibet distantias ex inventa hypothesis computanti et in hos numeros transfundenti patebit), nempe vel 163150 vel 167350. Et cum $12^\circ \text{ } \text{X}$ absit a perihelio circiter 13° , AE in ipso perihelio circiter 300 particulis brevior erit, nempe aut 139000 aut 137080. Ita habetur longitudo linearum AD et AE in ipsis apsidibus, quando sunt partes

*eiusdem rectae DE. Iungantur igitur DA 163150 vel 167350
et AE 139000 vel 137080*

Tota igitur DE 302150 vel 304430

Dimidia DK 151075 vel 152215

Ergo AK eccentricitas 12075 vel 15135.

Transfundantur hi numeri in pristinos, ubi radius eccentrici fuit 100000.

Ut igitur 151075 ad 100000 sic 12075 ad 8000,

vel ut 152215 ad 100000 sic 15135 ad 9943. ⁶⁶⁾

Eccentricitas igitur eccentrici verissime (indicibus latitudinibus acronychiis) versatur inter 8000 et 9943, qualium radius orbis eccentrici est 100000. At hypothesis nostra ex observationibus acronychiis longitudinum exstructa prodebat eccentricitatem eccentrici 11332, diversam longe ab eo, quod est inter 8000 et 9943 loco fere medio. Ergo falsum oportet esse aliquid eorum, quod assumseramus. Assumptum autem erat, orbitam, qua planeta transiret, esse perfectum circulum: esse in linea apsidum punctum aliquod unicum, in certo et constante intervallo a centro eccentrici, circa quod punctum aequalibus temporibus Mars aequales angulos conficiat. Horum igitur alterutrum aut forte utrumque falsum est. Nam observationes usurpatae falsae non sunt.

Valet autem eadem demonstratio etiam contra hypothesin illam, quam constituunt observationes ad oppositum medii motus Solis reductae: quia latitudines tempore inter utrumque articulum intermedio manent proxime eadem. Quare iis eccentricitas eccentrici ostenditur 9943, quae tamen supra (cap. V.) ex restitutione Braheana assumpta fuit 12600, vel in aequante Ptolemaico 12352, qualium tota aequatorii puncti eccentricitas 20160 vel 19763.

Pro schematis nostri transformatione ad formam Ptolemaicam sit DE linea apsidum, A Terra, D, E centrum epicycli in summa et ima apside: et ex D atque E punctis educantur versus A Tellurem rectae paralleli ad BC planum eclipticae: in quibus sumantur DF, EG radii epicycli aequales ipsis BA, AC: et planeta in F et G. Erit igitur FDA inclinatio aequalis inclinationi BAD, et linea visionis AF cum pristina BD parallelos. Quare et DAF et HBD visa latitudo eadem. Idem de triangulis ACE et EGA congruis dicendum. Itaque demonstratio et quantitates linearum correspondentium eadem.

Occurret lectori dubitatio, quare epicycli Martii semidiametrum faciam inaequalem sibi ipsi, nempe DF longiori BA, et EG breviori CA aequalem. Respondeo ex parte prima, fieri hoc propter transpositionem observationum ab oppositione cum medio Solis ad oppositionem cum apparente Solis. Quodsi maneamus apud medium motum Solis (pugnat enim praesens argumentatio etiam tunc), manebunt DF et EG aequales hucusque saltem. Sed vide de hoc partem primam cap. VI.

Pro forma Braheana, relicto alterutro triangulo, puta DBA, ut sit B Terra immobilis, A Sol anno 1585, continuetur AB, ut BH sit ipsi AC aequalis: sitque H Sol anno 1593 in 12° μ : et ipsi AE fiat aequalis et parallelos HI in partes easdem, ut sit Mars perigaeus in I, apogaeus in D; ecliptica HBA; inclinatio BHI, BAD: latitudo perigaea IBA, apogaea DBH. Rursum igitur summa DA et HI prodibit eadem, cujus DK dimidium et KA eccentricitas. Sola differentia haec, quod Ptolemaeo

planum epicycli, Tychoni planum eccentrici transponitur a septentrione in austrum et contra, manens sibi ipsi parallelon: in Copernico manet utrumque eodem situ.

Interim et hoc nota. Compositam eccentricitatem inveneram capite XVI. 18564, cujus dimidium 9282 est inter 8000 et 9943 loco fere intermedio. At docuerat nos et Ptolemaeus (ut supra dictum), dimidium ejus, quod ex acronychiis sitibus inveniretur, dandum esse eccentricitati eccentrici. Non igitur nihil fuit quod ipsum permoverat: nec temere nobis est repudianda haec bisectio, cum de ea testentur latitudines observatae.

At contra si bisecemus inventam 18564, loca quidem circa longitudes medias eccentrici acronychia sat praecise repraesentabimus, at non aequae loca circa octantes et versus apsidas.

Exempli causa sit anni 1593 oppositio. Anomalia simplex capite praecedente fuit $6^{\circ} 11' 3'' 16''$. Multiplico sinum $11^{\circ} 3' 16''$, scilicet 19174 in 9282: prius erat in 7232 multiplicandus: prodit sinus 1780 arcus $1^{\circ} 1' 12''$, seu partis aequationis, qui additus ad $11^{\circ} 3' 16''$ efficit semiaequatam anomaliam $6^{\circ} 12' 4'' 28''$, cujus complementum $167^{\circ} 55' 32''$: dimidium $83^{\circ} 57' 46''$. Cujus tangens 945500 circiter in 90718 distantiam periheliam multiplicatus et per 109282 apheliam vicissim divisus producit tangentem 784880. Cujus arcus $82^{\circ} 44' 20''$ ablatus a priori $83^{\circ} 57' 46''$, relinquit $1^{\circ} 13' 26''$ aequationis partem alteram. Quae addita ad anomaliam semiaequatam et haec ad aphelium, refert planetam in $12^{\circ} 13' 37''$ ♄: ubi differt a priori hypothesis tribus scrupulis et fit ab observatione habita remotior. Debuit enim esse $12^{\circ} 16'$ ♄.

Id luculentius apparet in 17° ☿ anno 1582. Nam adhibita bisectione cadit Mars in $17^{\circ} 4\frac{3}{4}'$ ☿, differtque hic calculus a nostro $7\frac{1}{2}'$ circa 45° ab aphelio, ab observatione vero $9'$.

Atque ex hac tam parva differentia octo minutorum patet causa, cur Ptolemaeus, cum bisectione opus habuerit, acquieverit puncto aequatorio stabili. Nam si aequantis eccentricitas, quantam indubie poscunt aequationes maximae circa longitudes medias, bisecetur, vides omnium maximum errorem ab observatione contingere $8'$, idque in Marte, cujus est eccentricitas maxima; minorem igitur in ceteris. (In prostaphaeresibus tamen orbis anni alicubi ista $8'$ erroris excrescunt usque ad $30'$.) Ptolemaeus vero profitetur, se infra $10'$, seu sextam partem gradus observando non descendere. Superat igitur observationum incertitudo seu (ut ajunt) latitudo hujus calculi Ptolemaici errorem.

Nobis cum divina benignitas Tychonem Brahe observatorem diligentissimum concesserit, cujus ex observatis error hujus calculi Ptolemaici $8'$ in Marte arguitur; aequum est, ut grata mente hoc Dei beneficium et agnoscamus et excolamus. In id nempe elaboremus, ut genuinam formam motuum coelestium (his argumentis fallacium suppositionum deprehensarum suffulti) tandem indagemus. Quam viam in sequentibus ipse pro meo modulo aliis praeibo. Nam si contemnenda censuisssem $8'$ longitudinis, jam satis correxissem (bisecta scilicet eccentricitate) hypothesin cap. XVI. inventam. Nunc quia contemni non potuerunt, sola igitur haec $8'$ viam praeiverunt ad totam astronomiam reformandam, suntque materia magnae parti hujus operis facta.

Caput XX.

Ejusdem hypotheseos redargutio per observationes extra situm acronychium.

Nunc ad alterum argumentum accedam, quo falsa demonstratur capite XVII. inventa eccentrici eccentricitas (non obstante, quod veros exhibet longitudinis motus): nempe ex observationibus aliarum cum Sole configurationum extra oppositiones, quoties planeta in apsidibus eccentrici versans observatus fuit.


Anno 1600. d. 5/15. Martii circa mediam noctem visus est Mars in $29^{\circ} 12' \frac{1}{2}'$ ☉ cum latitudine $3^{\circ} 23'$ bor. Fuit ejus longitudo media per nostram additionem correctam $4^{\circ} 29^{\circ} 14' 58''$, aphelium vero in $4^{\circ} 29^{\circ} 2' 45''$. Igitur anomalia $12' 13''$, quae requirit aequationem $2'$ subtrahendam per hypothesein locorum eccentricorum supra constitutam. Igitur locus Martis eccentricus in $29^{\circ} 13' \text{ } \Omega$: Solis locus in $25^{\circ} 45' 51'' \text{ } \propto$.

In schemate sit A Sol, B Mars, C Terra. Erit igitur ex subtractione CB ($29^{\circ} 12' \frac{1}{2}'$ ☉) ab AB ($29^{\circ} 13' \text{ } \Omega$) angulus CBA $30^{\circ} 0' 30''$: ex subtractione vero CA ($25^{\circ} 45' 51'' \text{ } \propto$) a CB ($29^{\circ} 12' 30''$ ☉) erit BCA $123^{\circ} 26' 39''$. Ut autem sin. CBA ad CA, sic sin. BCA ad BA. Est autem CA distantia Solis a Terra ex Tychonis tabula 99302 (quae etsi vitiosa, tamen veritas hanc inter et 100000 consistit, ut infra cap. XXX. audiemus). Ergo AB inter 165680 et 166846.

In perihelio sumatur observatio, quae est habita anno 1593. d. 30. Julii sequentis noctis hora 1. 45'. Inventus est Mars in $17^{\circ} 39' 30'' \text{ } \propto$ cum latitudine $6^{\circ} 6' \frac{1}{2}'$ austr. Longitudo media Martis $10^{\circ} 26' 16' 38''$, aphelium $4^{\circ} 28^{\circ} 55' 43''$. Abest igitur Mars a perihelio $2^{\circ} 39' 5''$, quibus per hypothesein supra inventam competunt $32'$ aequationis subtrahenda, ut sit locus eccentricus Martis $10^{\circ} 25' 44' 30''$, locus Solis apparens in $17^{\circ} 3' 0'' \text{ } \Omega$.

In schemate continuetur BA in D: et sit AD in $25^{\circ} 44' 30'' \text{ } \propto$, ED vero in $17^{\circ} 39' 30'' \text{ } \propto$. Ergo EDA $21^{\circ} 55' 0''$. Et quia ED $17^{\circ} 39' 30'' \text{ } \propto$, et EA $17^{\circ} 3' \text{ } \Omega$, ergo AED $149^{\circ} 23' 30''$. Ut autem sin. EDA ad EA, sic sin. AED ad AD. Est autem EA distantia Solis a Terra ex Tychonis tabula 102689, vitiosa quidem, sed tamen certo major quam 100000. Ergo AD est inter 140080 et 136409. Sed cum stella Martis $2^{\frac{1}{2}}^{\circ}$ distet a perihelio, brevior erit AD in ipso perihelio circiter 15, itaque inter 140065 et 136394. Utraeque vero cum apogaeae tum perigaeae sunt augendae, eo quod haec per observationes ad eclipticam relatas computatae sint. Itaque AD et AB sunt lineae in plano eclipticae. Qua de re cape hoc

Fig. 72.



Protheorema, saepius infra usurpandum.

Observationibus stellae Martis ad eclipticam relatis, et per eas lineis in plano eclipticae investigatis, ostendere longitudinem linearum, quae iis e regione in plano orbitae propriae respondeant.

Exponatur BAD (Fig. 72) linea in plano eclipticae, et per A, quae Solem seu centrum mundi denotat, ducatur recta LAM in plano orbitae, ut stella sit in L et M. Sit autem Terra in C, et triangulum CAB pars plani eclipticae, ad quod planum trianguli LBA intelligatur rectum: et connectantur puncta C, L, B: continenturque lineae ad superficiem sphaerae fixarum, AB in β , AL in λ , AC in κ ; sintque $\kappa\beta$ arcus eclipticae, $\beta\lambda$ arcus circuli latitudinis, $\kappa\lambda$ arcus transversus. Igitur observatio loci stellae sub fixis refertur ad eclipticam, traducto arcu circuli latitudinis ad eclipticam $\kappa\beta$ recto per locum stellae visum: et triangulum CLB est pars de plano illius circuli. Sed et $\lambda\beta$ ponitur circulus latitudinis ad eclipticam $\kappa\beta$ rectus. Duorum igitur circularum ad eandem eclipticam rectorum plana (CLB et LBA) sese mutuo secant per lineam LB. Quare (Eucl. XI, 19) sectionis linea LB perpendicularis erit ad planum eclipticae CBA ejusque lineam BA, hoc est LBA erit rectus. Inventa igitur longitudine BA in ecliptica et cognito angulo LAB, non poterit ignorari longitudo LA quaesita: quod erat faciendum.

In praesenti igitur negotio, cum inclinatio, seu angulus LAB sit $1^\circ 48'$ hoc loco, ergo LA est in praesenti dimensione longior per 82 particulas quam BA, et AM per 72 longior quam AD.

Correctae igitur apogaeae fient	165762 vel 166928	AL
Perigaeae	140137 vel 136466	AM
Summae	305899 vel 303394	LM
Dimidia	152950 vel 151697	KL
Eccentricitas	12812 vel 15371	KA ⁹⁹⁾

Transpositis his numeris, ut ex KL vel KM fiat 100000, eccentricitas eccentrici est inter 8377 et 10106. At nostra hypothesis postulabat 11332, quae utramque illarum superat. Ergo falsum postulabat.

Nec te moveat, quod altera 10106, quae exstructa est ex usurpatione ipsarum AC et AE aequalium, propiuscule ad 11332 accedit. Nam cum hic observationes ad Solis apparentia loca expenderim, eccentricitatem ex ipso centro corporis Solaris exstruxerim: non erunt igitur AC, AE aequales; quare eccentricitas haec multo minor quam 10106, et omnino esset 8377, si distantiae Solis a Terra 99302 et 102689 rite haberent, quas adhibere pro 100000 et 100000 demonstrationis hujus necessitas cogit. At quia infra hae Tychonicae distantiae corrigentur et ad radii mediocritatem propius adducentur, ideo eccentricitas hic quaesita inter hos terminos 8377 et 10106 certo consistit, nempe appropinquat medio totalis eccentricitatis 18564 prius inventae, scilicet 9282.

Ut eadem demonstratio etiam in Ptolemaica secundae inaequalitatis hypothesi procedat, age ut priori capite. Duc ipsis CB, CA, ED, EA majoris schematis parallelos AI, BI, AF, DF: et finge Terram in A, centrum epicycli (versus punctum circa quod epicyclus rotatur, distans a centro epicycli tota eccentricitate Solis) in D, B: Solem in H, G: ut AH sit aequalis et parallelos ipsi EA, et AG ipsi CA: ut sit anomalias commutationis coaequatae angulus HAD, GAB: Mars vero pro B vel L

in I, et pro D vel M in F: eruntque ipsis BI et DF (lineis motus planetas in epicyclo) paralleli lineas AG, AH (motus Solis). Cetera per se patent.

Pro forma et hypothesi Tychonica secundae inaequalitatis maneat A Terra, H, G, Sol: et ipsis AD, AB paralleli et aequales agantur HF, GI, ut sit Mars iterum in F et I. Erunt igitur et lineae visionis AF, AI eadem quae Ptolemaeo, et paralleli lineis visionis ED, CB majoris schematis. Quare in easdem a Sole partes vergent, et summa linearum HF, GI aequabit priorem BD; eritque propter parallelas lineas demonstratio plane eadem quae ab initio capitis.

Eandem vero demonstrationem vitiose constitutae eccentricitatis eccentrici (ut priori capite) etiam restitutioni Braheanae, quae nititur medio motu Solis, accommodabo, ne quis existimet, hanc dissonantiam ideo evenire, quod observationes a medio ad apparentem Solis motum perperam transposuerim.

Anno 1600 d. 5. Martii fuit ex sententia Tychonis longitudo media $4^{\circ} 29' 11'' 3''$: apogaeum in $23^{\circ} 41' \Omega$. Ergo anomalia simplex $5^{\circ} 30'$: quae requirit ex ejus sententia aequationem subtrahendam $1^{\circ} 7' 11''$, ut sit locus Martis eccentricus $4^{\circ} 28' 3' 52''$, Solis vero motus medius $23^{\circ} 44' 31'' \propto$. In schemate superiori sit A punctum medii motus Solis, distans a centro Solis tota eccentricitate Solis. Angulus igitur CBA $28^{\circ} 51' 22''$ et BCA $125^{\circ} 28' 0''$. Atque hic demonstratio cogit, tam AE quam AC assumere aequales, scilicet 100000, manentibus quae a veteribus et Tychone posita sunt, quae infra parte tertia ventilabuntur: ubi ostendetur, paulo minorem esse distantiam Terrae a puncto medii loci Solis, hoc est epicyclum Ptolemaicum vel annum orbem Copernico-Tychonicum non ordinari aequaliter circa id punctum, circa quod aequales anguli conficiuntur temporibus aequalibus. Sed jam insistamus fundamentis positis: et sit CA 100000, erit igitur AB 168760.

In perigaeo anno 1593. d. 30. Julii, cum fuerit longitudo Martis ex Brahei sententia $10^{\circ} 26' 12' 43''$, apogaeum $23^{\circ} 34' \Omega$, ergo anomalia simplex $182^{\circ} 38' 43''$, quae requirit aequationem $35' 52''$ addendam. Itaque locus Martis eccentricus $10^{\circ} 26' 48' 35''$: locus Solis medius $18^{\circ} 24' 31''$. Ergo in schemate erit EDA $20^{\circ} 50' 55''$ et AED $158^{\circ} 45' 0''$. Sit iterum EA 100000, quamvis infra (ut jam dictum) paulo major est futura. Ergo AD 137300. Quam minues per 15, ut in ipsum perigaeum competat: sitque 137285. Alteram vero augebis circiter 100, ut in apogaeum ipsissimum competat: eritque 168860. Utramque vero augebimus (ut prius) ob planorum inclinationem, additis in apogaeo 82, in perigaeo 72: eruntque absolutae

AB 168942

AD 137357

BD 306299

BK 153150

KA 15792, eccentricitas ex puncto medii

motus Solis seu (in forma Ptolemaica) in linea apsidum per centrum epicycli ducta.

At qualium BK est 100000 talium KA est 10312. Requirebat vero restitutio Tychonica ex acronychiis concinnata et capite VIII. exhibita majorem quantitatem ipsius BK, scilicet 12352.

Ostensum itaque est, etiam Tychonicae restitutioni accidere hoc incommodi, ut alia eccentricitas eccentrici prodeat ex acronychiis, alia ex reliquis observationibus.

Interim etiam in hac restitutione Tythonica observationes ad bisectionem viam praeceunt. Tythonis enim eccentricitas tota puncti aequatorii est 20160, dimidium 10080, vel in aequantis Ptolemaici forma 9882. Et hic invenimus 10312, quod propius ad hanc dimidiationem accedit. Accedet autem multo propius et infra hanc descendet (nempe ad justissimam 9282): ubi AC majoris schematis, hoc est BI minoris et sinistri, et cum ea AB vel GI (distantia apogaea) fuerit minuta; vicissim AE dextri schematis ejusque aequalis et vicaria DF sinistri et cum ea AD vel HF (distantia perigaea) fuerit aucta. Minori enim parte aucta, majori diminuta, differentia minuitur inter utramque.

Culpam autem hujus discrepantiae inter diversos modos eccentricitatis quaerendae (ut idem memoriae causa saepius repetam) sustinet solum vitium assumptionum, quae mihi fuere consulto cum Tythone et artificibus hucusque communes. Nam hinc certo concluditur, non esse certum et fixum punctum in eccentrico planetae, circa quod planeta perpetuo aequalibus temporibus aequales angulos conficiat. Nam illud omnino (siquidem alterum assumptorum de circulari orbita sideris retineremus) librandum nobis esset in linea apsidum sursum deorsum, quod quomodo cum rationibus naturalibus conciliari possit, non video.

Imo vero et alterum assumptorum infra cap. XLIV. destruetur, nempe orbitam sideris non esse perfectum circulum, sed ovalem: et longissimam omnium esse diametrum apsidum; brevissimam vero, quae per centrum figurae transit in longitudinibus mediis. Mirum itaque non est, observationes reliquas extra oppositionem cum Sole non consentire huic hypothese capite XVI. constitutae, cum duo falsa in eam assumerimus.

Caput XXI.

Causa, cur falsa hypothesis verum prodat et quatenus?

Porro quia ego axioma hoc dialecticorum, ex falso verum sequi, vehementer odi, propterea quod eo Copernici (quem sequor magistrum in hypothesis universalioribus systematis mundani) jugulum petatur: operae pretium putavi, lectori ostendere, quomodo hic ex falso verum sequatur.

Primum jam vidisti, non plane verum sequi. Cum enim iter planetae per unum eccentrici planum duobus modis consideretur, nempe et ratione longitudinis sub certis gradibus et minutis zodiaci circuli, et ratione altitudinis seu distantiae a centro mundi quod circumit, quam aliis zodiaci locis exhibet aliam: nostra falsa suppositio invexit quidem planetam debitis temporibus in debita loca longitudinis, at non debitam ei praestitit altitudinem. Non igitur plane verum sequebatur ex falsa hac hypothese. Deinde non ideo idem est effectus (circa solam etiam longitudinem) et verae hypotheseos adhuc incognitae et falsae a nobis assumptae, quod ad sensum effectus idem videtur. Potest enim minimum aliquid deesse, quod sensus non capiat.

plicissima et aequabilissima eligere, ideo quaeremus circulum, qui circa suum centrum moveatur aequaliter, qui nobis efficiat quod est propositum. Constitutis igitur partibus in AK, AL aequalibus ab A inceptis, scilicet AK, AL, connectantur puncta K, L recta secante MP in C: et centro C spatio CK scribatur circulus eccentricus MN, cujus motus sit circa centrum regularis. Repraesentabit haec hypothesis planetam debito loco, in lineis quatuor AM, AN, AK, AL. At non haec hypothesis sola, sed multae aliae hoc possent facere, quia generale hoc habent et verissimum quidem, ut punctum aequalitatis motus sit in linea, quae loca planetae in lineas AK, AL incidentis connectat, ejusque eo puncto, quo secat haec linea MP. Cumque ex praemissis absorpserit haec hypothesis errorem omnium maximum hypothesis prioris OP, nempe KAV, LAX circa quartas temporis, nec novum errorem committat (cum circa AM, AP priori aequipolleat): quare si haec hypothesis adhuc peccat, id multo minus erit peccatum quam KAV. Et quia in CM, CN, CK, CL officium fecit, peccatum (si quod superest) recedet in quatuor loca inter jam dicta intermedia fietque circa octavas partes temporum, cum in C sit temporis mensura. Bisectis igitur MCK, KCN angulis, ducantur per C duae novae lineae, secantes circumferentiam in Q, T, R, S: erit circa haec puncta error maximus, si quis est. Referet autem haec hypothesis planetam circa octavas temporum in lineas AQ, AR, AS, AT. Sit jam (ut in Marte), ut non debeat planeta post octavas temporis restitutorii apparere in lineis AQ, AR, AS, AT: sed illic in lineis AF, AE superioribus, hic in AG, AD humilioribus. Ergo si prius error KAV fuit $10\frac{1}{2}^{\circ}$, jam error QAF vix erit paucorum scrupulorum. Deprehenditur autem in Marte QAF vel RAE $9'$ circiter, sed SAG vel TAD circiter $28'$.

Tertio igitur et haec hypothesis corrigatur; quod ut varie (et nominatim per librationem puncti C in linea CA) fieri potest, ita nulla religione impedimur, punctum aequalitatis C fixum retinere in distantia CA ob angulum KAV, et planetae viam etiamnum retinere circularem. Quae tria ex arbitrio suscepta, non demonstratione evicta, cogent nos eccentrici centrum ex C puncto aequalitatis motus deprimere in B, ut sit HI pro MN, et corpus planetae ex Q, R, S, T discedat, manens tamen in lineis CQ, CR, CS, CT (quia apud C manet dimensio temporis), veniatque in signa F, E, G, D et fiant QF, ER, SG, TD tantae, ut QAF, EAR fiant $9'$, et SAG, TAD $28'$. Hoc facto absorptus erit et ille error in octavis temporum, et hypothesis octo locis justissimam exhibebit longitudinem. Quare iterum si quis restat error, is erit in sedecimis temporum, locis intermediis. At quia tertius hic eccentricus HI tam primo aequipollet in locis AM, AP, quam secundo in locis insuper AK, AL: nullum igitur novum ingerit errorem. Et quia secundi error erat maximus in octavis temporum, qui jam est absorptus, restabit igitur in sedecimis de veteri errore error multo minor. Quodsi proportionem utamur, ut, quia primi eccentrici error fuit $10\frac{1}{2}^{\circ}$, secundi error $9'$ vel $28'$, nempe illius septuagesima et vicesima quinta pars, jam iterum totuplos faciamus secundos errores tertiorum: plane intra sensuum defectum negotium coegerimus etiam circa sedecimas temporis.

Ita vel jam patet, quatenus et quomodo verum sequatur ex falsis principiis: nempe id, quod in hisce falsum, speciale est et abesse potest; quod vero necessitatem affert veritati, sub generali ratione verum omnino et ipsum est. Denique ut falsa haec principia tantummodo sunt apta certis

locis per totum circulum: ita neque verum citra illos ipsos locos omnimode sequitur, nisi quatenus accedit huic negotio, ut a sensuum subtilitate differentia aestimari amplius non possit.

Atque haec eadem hebetudo sensuum tegit etiam hunc errorculum, qui in octavis temporum superest. Superesse autem sic demonstro.

Nam si ex B rursus scribatur perfectus eccentricus, ut sint aequales BD, BE, BF, BG; fecerimusque BC tantam, ut QAF angulus imperatus existat: non equidem aequae arbitrio nostro relinquatur, quantum exhibere volumus angulum SAG. Fiet enim omnino necessarius. Veniat ex A perpendicularis in QT, quae sit AZ. Sit autem AC (ut supra) 18564 qualium CQ 100000. Et quia ACZ 45° , fiet AZ vel ZC (utraque harum partium) 13127. Ergo ZQ 113127 et AQZ $6^\circ 37' 5''$, et QAZ $83^\circ 22' 55''$, cujus tangens 864092. Sumatur autem FAZ $9'$ minor; erit ejus tangens FZ 844900. Sed qualium AZ est 13127, erit ZF 110910. Quare QF 2217.


Est autem major QF quam TD, quod sic demonstro. QT est diameter circuli, aequalis ergo est ipsis FB, BD semidiametris junctis. Sed BF, BD simul sumtae sunt majores quam FD, ergo et QT major quam FD; communis auferatur FT, major igitur residua QF quam TD. Et tamen nos ex abundanti patiemur aequalem esse. Subtrahatur CZ 13127 a CT, ut ZT relinquatur 86873. Igitur ex AZ, ZT noscitur ATZ estque $8^\circ 35' 33''$. Igitur ZAT $81^\circ 24' 27''$. Et quia ZT 86873, addam ei aequalem ipsi QF, ac si esset TD, scilicet 2217. Fiet ZD 89090. Sed qualium AZ est 100000, fiet ZD tangens anguli ZAD 686291. Itaque hic angulus $81^\circ 42' 35''$. Sed ZAT fuit $81^\circ 24' 27''$. Ergo TAD vel SAG minor est quam $18' 8''$ differentia, eo quod TD sit minor quam 2217.

Ecce hic necessarium angulum TAD, qui debuit esse $27\frac{1}{6}'$. Itaque si QAF pro $9'$ facias $12'$, fiet TAD $24'$. Atque utrinque planeta $3'$ fiet altior justo. Aequatio ergo nimis videbitur magna: quare eccentricitas nimis magna. Minuetur igitur parumper, ut in lineis AK, AL planeta circiter $1\frac{1}{2}'$ fiat depressior, atque in D, E, F, G totidem (scilicet $1\frac{1}{2}'$) altior.

Ita per hanc contemperationem variarum cansarum fit, ut errore altero alterum compensante calculus intra sensuum subtilitatem adducatur, deprehendique non possit specialis hypotheseos falsitas. Itaque gloriari non possit haec vafra meretricula de veritate (pudicissima puella) in suum lupanar pertracta. Honesta quaedam femina meretricem praeaeuntem arcte sequebatur ob viarum angustiam et turbam hominum: quam stulti et lippi logicarum argutiarum professores, qui frontem ingenuam a perfricata nequeunt discernere, censuere meretricis esse pedissequam.

Atque haec procul dubio causa est, cur cap. XVIII. in \odot , \mathcal{Q} , \mathfrak{M} et passim alibi adhuc unum et alterum scrupulum desit. Sed neque error deprehendi

Fig. 73.



facile possit, cum observationes usurpatae non incidant in apsidas et quartas octavasque temporum.

Conclusio secundae partis.

Hactenus itaque traducta fuit hypothesis primae inaequalitati serviens (in qua Braheo cum Copernico convenit; utrique vero nonnihil in forma a Ptolemaeo dissentiunt) a medio motu Solis, quem omnes tres auctores adhibuerunt ad apparentem motum Solis. Deinde ostensum est, sive apparentem motum Solis et hypothesin cap. XVI. inventam sequamur, sive medium motum Solis et hypothesin cap. VIII. ex restitutione Brahei propositam, utrinque sequi falsas distantias planetae a centro seu Solis (Copernico et Braheo) seu mundi (Ptolemaeo). Itaque quae prius aedificaveramus ex observatis Braheanis, posterius ex aliis ejusdem observatis rursum destruximus: quod necessario nobis contigit, probabilia nonnulla sed re vera falsa (imitatione priorum artificum) secutis.

Tantum quidem operae datum est imitationi huic priorum artificum, qua secundam hanc Commentariorum partem concludo.

COMMENTARIORUM DE MOTIBUS STELLAE MARTIS

PARS TERTIA.

INVESTIGATIO SECUNDAE INÆQUALITATIS, ID EST MOTUUM SOLIS VEL TELLURIS.

SEU CLAVIS ASTRONOMIAE PENITIORIS.

UBI MULTA DE CAUSIS MOTUUM PHYSICIS.

Caput XXII.

*Epicyclum seu orbem annuum non aequaliter circa punctum aequalitatis
motus situm.*

In hunc igitur modum antecessores nostri primum inaequalitatem primam mensi sunt. Postea calculo constituto, qui locum planetae eccentricum repraesentaret ad quodvis momentum, conversi sunt ad inaequalitatem secundam (quae a Sole pendet) explorandam, comparantes locum visum seu apparentem cum loco eo, quem eccentricus et sola prima inaequalitas planetae assignarent. Cum autem mihi hanc eandem semitam eunti anceps bivium apparuerit superiori capite XIX. et XX; et observationes (fidissimi duces) cum observationibus pugnare sint deprehensae: cogitandum fuit de tota ratione itineris aliter instituenda, methodo quae sequitur.

Primum hac parte tertia aggrediar secundam inaequalitatem et in illa per observationes indubias demonstrabo vel confirmabo vel refutabo, quae hucusque in principiis posui, dubio tamen assensu: nam hac veluti clave inventa reliqua patebunt. Postea parte quarta ad inaequalitatem primam accedam.

In Mystério Cosmographico cap. XXII. cum physicam causam aequantis Ptolemaici vel secundi epicycli Copernico-Tychonici redderem, mihi ipsi objeci in fine capitis: quod, si causa a me allata genuina esset, omnino per omnes planetas valere debuerit. Cum autem Tellus, una ex sideribus (Copernico), vel Sol (reliquis), aequante hoc hactenus non indiguerit, speculationem illam incertam esse volui, quoad astronomis amplius liqueret. Suspicionem tamen concepi, fore et huic theoriae suum aequantem. Postquam in Tychonis notitiam veni, suspicio haec in me confirmata fuit. Nam Braheus in literis anno 1598 ad me in Styriam missis haec verba ponit: „Orbis annuus juxta Copernicum, vel epicyclus secundum Ptolemaeum non videtur ejusdem semper magnitudinis, quoad ipsum eccentricum colla-


tione facta; sed alterationem adducit in omnibus tribus superioribus sensibilem, adeo ut angulus differentiae in Marte ad $1^{\circ} 45'$ ($40'$) excreseat." (Comp. Vol. I, p. 44.)

Idem eodem tempore in appendice ad Mechanica seu narratione de suis studiis perstrinxit. Nec multo alia verba tomo I. Epistolarum fol. 209. ⁷⁹⁾ ubi existimat, causa eccentricitatis Solaris immisceri quandam inaequalitatem etiam eccentrici aequationibus et sitibus acronychiis; quod parte prima refutatum quidem est, non redundare in situs acronychios, vel certe minimum aliquid; at videtur per correctionem quandam de quadrangulationibus Martis cum Sole intelligi debere.

Jam tum, cum orbem annuum audirem augeri minuique, dictabat mihi genius, id phantasma oriri ex eo, quod orbis annuus Copernici vel epicyclus Ptolemaei non aequaliter a centro illo distet, circa quod aequalibus temporibus aequales conficere ponitur angulos. Nam quae causa physica, augeri et minui circuitum centri systematis planetarii ^{*)} (Tychonici) vel circuitum Terrae (Copernico) vel epicyclum sidus gestantem (Ptolemaeo)? quae haec, inquam, in astronomia sine exemplo novitas, sine versimilitudine absurditas? Quin potius credi par erat, alibi Solem (Copernico) vel centrum systematis planetarii (Tychonici) vel corpus planetae (Ptolemaeo) a suscepto aequalitatis puncto (quiescente apud Copernicum et Tychonem, circumeunte in eccentrici circumferentia apud Ptolemaeum) longius distare, alibi brevius: atque id procul dubio in linea apsidum. Atque huic rei commodam occasionem videbatur suppeditare mea illa ex Mysterio meo Cosmographico derivata suspicio, si nempe in theoriam Solis (vel theoriam, ut ita dicam, epicycli Ptolemaici) aequans introduceretur.

Esto ut incipiat inaequalitas secunda a linea medii motus Solis, ut hactenus placuit artificibus (ne quis meam novationem, qui apparenti Solis motu utor, in hoc negotio suspectam habeat), et consurgat in schemate praesenti eccentricitas planetae apud Copernicum non a centro Solis A,

Fig. 74.



sed a C puncto, circa quod regularis esse ponitur Terrae motus. Id vero punctum C sit non orbis Terreni DE, sed tantum aequalitatis centrum, longius ab A Sole distans, quam B centrum orbis Terreni ED. Dico, his concessis, observationes tales exhibitum iri, ex quibus quis suspicari possit, orbem annuum DE augeri minuique. Erigatur ex C perpendicularis ipsi DE, quae sit CF, et sit Martis stella bis in F, et cum Terra est in D et cum in E, et connectatur F cum punctis D, E. Quia ergo C est punctum aequalis motus Terrae in DE, erit FCD, FCE anomalia commutationis et (ut ponimus) aequalis utrinque. Quodsi igitur aequales essent CD, CE (ut hactenus putabatur), tunc et DFC et EFC anguli seu parallaxes orbis essent utrinque,

^{*)} Centrum systematis planetarii est communis sectio linearum, quae per singulorum planetarum apsides traducuntur. Atque id punctum est vel proxime corpus Solis, ut Braheo initio placuit, vel in ipso centro Solis, ut ego corrigo.

apud utramque anomaliam commutationis, aequales. At quia CE major quam CD, major etiam apparebit angulus CFE angulo CFD. Propterea ille, qui non attendit, hanc amplificationem contingere tantum in E vel vicinis locis, et contrariam diminutionem in D loco contrario tantum, censebit totum orbem annuum interdum fieri ampliorem, mensura CE, interdum angustiores, mensura CD: propterea quod talis aliquis cum hactenus usitata astronomia praesupponit, C punctum aequalis motus esse idem et centrum circuli DE.

In forma Ptolemaica sit Terra in C: lineae medii motus Solis CK, CL, pro eo quod prius Copernico fuerant DC et EC: et sit centrum, circa quod motus epicyclicus regularis est, in F: et ipsi ED aequalis et parallelos IH, ut ducta CI sit parallelos ipsi DF et CH ipsi EF. Translata enim E Terra seu visu in C centrum mundi, ut Ptolemaeo placet, transfertur et F Mars in H, sic propter translatum D in C, transfertur F in I. Ptolemaeus ergo existimans, F punctum, circa quod epicycli IH motus aequalis est, esse etiam centrum epicycli IH, omnino FI et FH ponit aequales: proptereaque in anomalia coaequata utraque tam HFC quam IFC, hoc est (secundum hoc schema) tam 90° quam 270° , unam et eandem statuit aequationem epicycli, nempe aequales angulos HCF et ICF. Quodsi observatio testetur, maiorem esse HCF quam ICF, tum centrum epicycli non erit in F puncto aequalis motus, sed in G versus H: et posito quod F nihilominus centrum epicycli esse putetur, omnino epicyclus auctus esse videbitur in anomalia 90° circa H, minutus in 270° circa I, Marte motu eccentrico (hoc est linea CF) in eodem loco fixarum versante utrinque.

In forma Tychonica maneat C Terra, DE circulus Solis, centro B, sed aequalitatis centro A: sintque lineae, quibus planeta videtur (scilicet CI et CH) eadem, quae in Ptolemaeo. Igitur ex H et I descendant ipsi FC paralleli HL, IK: ut K et L sint centrum systematis planetarii, cujus circuitus centrum sit M versus perigaeum Solis, ut quanto B verum centrum circuitus Solis praeter opinionem descendit infra A putativum centrum ejusdem circuitus Solis, tanto et M centrum circuitus KL (in quo circuitu punctum invenitur, a quo consurgit Martis eccentricitas) descendat sub C: sintque aequales AC et BM. Erit linea coaequati motus in eccentrico (scilicet KI, LH) post integras planetae restitutiones sibi parallelos. Existimans igitur Tycho, C Terram esse in medio circuitus KL, deferentis eccentricos planetarum, angulos CIK, CHL faciet aequales, quando CLH, CKI commutationis anguli sunt aequales. Qui si deprehendantur inaequales, et CHL major, erit et CL major quam CK: et KL orbis deferens centrum systematis videbitur in L crescere, in K imminui; eo quod non creditur, M centrum orbis, qui defert systemata planetarum, esse extra C Terram, circa cujus centrum motus illius orbis est aequalis.

Nam ad detegendam veram causam hujus diversitatis, nempe ad liberandam suspicionem eccentricitatem Solis, multum confert, quod hoc pacto *)

*) Nota mihi hoc ἀποδοχόν. Si vera est generalis Ptolemaica vel Braheana hypothesis de mundi systemate, et si simul medio motu Solis utamur; tunc illi epicyclus, huic circulus, deferens systemata planetaria, fit eccentricus, cujus apogaeum vergit in partes apogaeo Solis praecise contrarias: eccentricitas vero ejus, ut infra sequetur, praecise aequat eccentricitatem Solis veram seu dimidium hactenus creditae.

ibi brevis fit CK distantia centri systematis a Terra, ubi longa sit CE distantia Solis a Terra, et contra, illa CL longa, ubi haec CD brevis.

Causa conversarum in hunc modum apsidum haec est. Terra enim Copernico perambulat contrarias partes Soli Tychonico et epicyclo Ptolemaico: et vero DC, CE, distantiae Terrae a Sole, Solis a Terra, et Martis II vel I a centro F aequalitatis epicycli, subtendunt angulos per omnes tres formas ejusdem quantitatis: ergo et distantiae Solis et Terrae Copernicanae in contrarias plagas transferentur a Braheo et Ptolemaeo, nimirum CE in CL vel FH, et CD in CK vel FL.

Ut igitur hanc speculationem observationibus vel confirmarem vel convellerem, hanc viam insitebam. Cum apogaeum Solis sit in $5\frac{1}{2}^{\circ}$ ♊, quaesivi, an exstaret observatio, cum ♂ ratione primae inaequalitatis esset bis in $5\frac{1}{2}^{\circ}$ ♊ vel ♎: ☉ vero altrobique in $5\frac{1}{2}^{\circ}$ ♊, deinde in $5\frac{1}{2}^{\circ}$ ♎. Atqui hoc non est possibile, ut fiat intra tam breve (20 vel 30 annorum) spatium. Motus enim periodici Martis et Solis sunt incommensurabiles, nec unquam simul in suas quartas vel opposita incidunt post peractos alterutrius circuitus integros, eorumque dimidia et quartas. Oportuit igitur eligere, quod fuit quaesito proximum, et multos constituere dies per hos 20 annos, quibus planeta est observatus, in quibus anomalia commutationis coaequatae esset 90° vel 270° vel proxime tanta, Marte in 6° ♎ vel ♊ (vel circa) versante. Postmodum illos dies omnes oportuit in catalogum observationum Martis immittere, ut viderem, an etiam iis momentis fuisset observatus. Quod, nisi frequentissime fuisset Mars observatus a diligentissimo Tychone Brahe, tam exquisita fuit haec electio, ut voti compos fieri non potuissem. Cum autem Tycho posuisset apogaeum ♂ in $23\frac{1}{2}^{\circ}$ ♏, requireretur vero locus Martis per aequationem eccentrici correctus $5\frac{1}{2}^{\circ}$ ♊: ergo anomalia coaequata requirebatur 42° . Et cum ex ipsius tabula coaequatae 42° responderet aequatio $8^{\circ} 15\frac{3}{4}'$: ergo requirebatur anomalia media eccentrici $50^{\circ} 16'$: per quam ostendebantur mihi duodecim articuli temporum per annos viginti a 1579 in 1600.

An autem ex his temporibus alicui esset anomalia coaequata commutationis semel 90° , iterum 270° , vel quanto illa major minorve, tanto haec minor majorve, sic artificiose fuit indagatum. Una Martis revolutio dies habet 687, duae Solis habent $730\frac{1}{2}$; differentia dierum $43\frac{1}{2}$, quibus de motu medio Solis respondent $42^{\circ} 54' 23''$. Tanto igitur variatur anomalia commutationis ad finem cujuslibet revolutionis Martis. Quando igitur intra unum biennium quaeruntur duae commutationis anomaliae aequales invicem, Marte eodem utrinque eccentrici loco versante, oportet ut ille uterque commutationis angulus sit $21^{\circ} 27'$. Intra 4 annos requiritur $42^{\circ} 54'$: intra sex annos $64^{\circ} 22'$: intra octo annos $85^{\circ} 49'$. Et nos postulabamus, si fieri potuisset 90° . Ergo binas nostras observationes quaerere oportebat distantes annis octo. Talis vero observationum biga non reperiebatur in catalogo habitarum observationum.

Conversus igitur sum ad distantiam sex annorum invenique tandem, quod anno 1585. d. 18. Maji et anno 1591. d. 22. Jan. exstarent observationes idoneae. Nam correspondebant anno 1585. d. 30. Maji h. 5. et 1591. d. 20. Jan. h. 0. Utrique Martis longitudo media fuit $6^{\circ} 22' 43'$, aequatio Tychonica $9^{\circ} 14' 52''$ auferenda. Ergo ♂ ratione eccentrici in $13^{\circ} 28' 16''$ ♊. Commutatio coaequata anno 1585 erat $8^{\circ} 4' 23' 30''$, qua arguebatur more Ptolemaico, planetam esse ultra perigaeum epicycli $64^{\circ} 23' 30''$.

Sic commutatio coaequata anno 1591 erat $3^{\circ} 25' 36'' 30''$, qua arguebatur, planetam esse ante perigaeum epicycli $64^{\circ} 23' 30''$. Aequalis igitur utrinque commutationis angulus in schemate 74. FCD et FCE vel CFI, CFH. Erat autem anno 1585 Sol in $18^{\circ} \Pi$, 18° ante apogaeum, anno 1591 in 9°--- , 33° ultra perigaeum: quae inaequalitas caveri non potuit.

Jam ad observationes: anno 1585. d. 18. Maji h. $10\frac{1}{2}$, noctis visus est δ in $0^{\circ} 50' 45'' \text{---}$, cum lat. $1^{\circ} 19' 30''$ borea. Maginus refert illum in $1^{\circ} 5' \text{---}$, abundat igitur $14' 15''$. Ergo cum die 30. vesperi hora 5. referat illum in $6^{\circ} 48' \text{---}$, rursus auferemus, quod ante dies undecim peccabatur, retinebitque $6^{\circ} 34' \text{---}$, ubi paucula scrupula ponemus in errore, quod longa sit deductio per dies 12, nec diurnus idem vere sit, qui hic ex Magino adhibetur; ut 18. Aprilis praecedente h. 10. inventus est δ in $17^{\circ} 37\frac{1}{2}' \text{---}$, quem Maginus ponit in $18^{\circ} 0' \text{---}$, differentia $22\frac{1}{2}'$, quae differentia usque ad 18. Maji per dies 33 imminuta fuit ad modulum $14\frac{1}{4}'$. Si ergo agamus proportionaliter, ut quia de differentia per 33 dies evanuerant $8'$, in eadem ratione per dies sequentes 12 evanescent $3'$, differentia igitur die 30. Maji erit $11\frac{1}{4}'$. Quare Mars correctius in $6^{\circ} 37' \text{---}$.

Sic anno 1591. d. 22. Jan. mane h. 7 distabat δ a Spica --- $34^{\circ} 32' 45''$ cum declinatione $17^{\circ} 25'$ austrina, in altitudine 16° . Ergo post cautas variationes horizontales declinatio $17^{\circ} 30'$. Hinc ascensio recta $230^{\circ} 23' 12''$, longitudo $22^{\circ} 33' \text{---}$, latitudo $1^{\circ} 0' 30''$ borea. Distat vero tempus a nostro 1 die 19 horis, et diurnus ex Magino est $33'$. Ergo tempori interjecto debentur $59'$. Relinquitur ergo locus Martis ad 20. Jan. h. 0 (quod momentum priori respondere dixeramus) $21^{\circ} 34' \text{---}$.

Et quia ex Tychonis restitutione CF est $13^{\circ} 28' \text{---}$ sat certo,
DF vero vel CI anno 1585 . . . 6. 37 ---

Ergo DFC vel FCI erit . . . $36^{\circ} 51'$.

Sic quia rursus CF est anno 1591 . . $13^{\circ} 28' \text{---}$ *)

EF vero vel CH . . . 21. 34 ---

Ergo EFC vel FCH erit . . . $38^{\circ} 5\frac{1}{4}'$.

Ecce magnam differentiam prosthaphaereseon orbis annui, cum tamen anomalia commutationis utrinque eandem polliceatur. Causam indicat nobis hypothesis Copernicana. Terra in D et E putabatur aequaliter distare a C puncto aequalis motus: invenitur vero distare inaequaliter, ut centrum ejus circuitus sit in B versus A Solem. Per aequipollentiam igitur epicyclus HI in forma Ptolemaica non aequaliter circumjectus est puncto F, cujus viam eccentricam nobis acronychiae observationes describebant, et circa quod motus epicycli regularis est. Et vergit G centrum epicycli ad E in partes perigaei Solaris. In Tychonica similiter KL deferens systemata planetaria non aequabiliter ambit C Terram, circa quam motus illius orbis regularis est, sed vergit M centrum ejus circuitus in partes perigaei Solis.


*) Praecessio temporis intermedii non efficit $5'$. Hic igitur est neglecta.

Caput XXIII.

Cognitis duabus distantis Solis a Terra et locis sub zodiaco et apogaeo Solis, inquirere eccentricitatem viae Solis (vel Terrae Copernico).

Hinc nobis non est difficile et mensuram tentare lineae BC (Fig. 74). Sit enim FC 100000, et quia DFC est $36^{\circ} 51'$, et FCD $64^{\circ} 23' 30''$: ergo residuus FDC est $78^{\circ} 45' 30''$. Et ut sinus hujus anguli ad FC 100000, sic sinus DFC ad DC 61148. Eodem modo, quia EFC $38^{\circ} 5\frac{1}{2}'$ minus, et FCE $64^{\circ} 23' 30''$: erit FEC $77^{\circ} 31' 0''$ plus. Ergo EC 63186 minus. Exponatur orbis Terrae NED (Fig. 75), in eo CBN linea

Fig. 75.



apsidum, et N perihelium, R aphelium, B centrum, C punctum aequalitatis motus, E, D, loca duarum observationum, quae connectantur cum C et cum B. Est igitur EC et CD in iisdem numeris cognita, et notus angulus ECD, nempe $128^{\circ} 47' 19''$. Continuetur EC et in eam ex D perpendicularis descendat DO, ut et in DE duas perpendiculares ex C, B, quae sint CP, BQ. Est igitur DCO $51^{\circ} 12' 41''$ et CDO $38^{\circ} 47' 19''$. Quare qualium DC 61148, erit DO 47660 et CO 38305; quae apposita ad CE efficit EO 101491. Ex datis autem DO, OE circa rectum, habetur DEO

$25^{\circ} 9' 20''$. Quare DE 112125, cujus dimidium est DQ, scilicet 56062 $\frac{1}{2}$, quia DB, BE aequales. Et quia DEC fuit $25^{\circ} 9' 20''$, erit EDC vel PDC $26^{\circ} 3' 21''$. Quare qualium DC 61148, talium CP fiet 26858, et PD 54932: quae aufer a QD, relinquitur PQ 1130 $\frac{1}{2}$. Hinc jam ex cognita inclinatione linearum ED et NC facile habetur longitudo CB. Nam quia CR est linea aphelii in $5^{\circ} 30'$ δ ; CD vero $17^{\circ} 52'$ γ , quia Sol in $17^{\circ} 52'$ Π : erit DCR $17^{\circ} 38'$; sed EDC fuit $26^{\circ} 3' 21''$, ergo facta subtractione, relinquitur dictarum linearum inclinatio $8^{\circ} 25' 21''$. Agatur ex P ipsi CB parallelos PS, quae aequabit CB, et CP aequabit BS. In triangulo igitur PQS rectangulo, ut sinus totus ad tangentem et secantem anguli QPS $8^{\circ} 25' 21''$, sic PQ cognita ad QS 167, et SP 1143, quae est CB. Et quia aequales PC et SB, scilicet 26858: appone igitur QS, prodibit QB 27025. In rectangulo igitur DQB datis lateribus circa rectum, dabitur et DB 62237. Ergo proportio DB ad BC (radii ad eccentricitatem quaesitam) est eadem quae 62237 ad 1143. Ut autem 62237 ad 100000, sic 1143 ad 1837. Haec tandem est eccentricitas quaesita. ¹⁾ Fieret autem minor, si praecessionem aequinoctiorum curaremus, quia tunc CE minor.

Ex his itaque duabus observationibus et assumpto vero loco aphelii Solis exstruitur distantia puncti nostri aequatorii C vel F (quod centrum putabamus) a vero centro orbitae B vel C vel M, (Fig. 74) scilicet 1837, qualium radius ejus orbitae est 100000. Tycho Brahe vero eccentricitatem Solis, hoc est distantiam C puncti aequatorii ab A centro corporis Solaris (in Copernico) vel distantiam A puncti aequatorii motus Solaris a C centro Terrae (in Tychonico-Ptolemaica suppositione) invenit 3584, cujus dimidium 1792 parum admodum ab 1837 dissidet. Consentaneum igitur

est, dimidiationem eccentricitatis in theoria Solis valere, quae prius etiam capite XIX. et XX. in eccentrico Martis valuerat. Nam observationes a me adhibitae non sunt adeo scrupulosae (propter longas deductiones et usurpationem diurni controversi), ut de 45 particulis centies millesimis certi quid definire possint: ut taceam praecessionem temporis intermedii, neglectam in motu eccentrico Martis et Solis.

Quae hic de circuitu Telluris demonstrata sunt, simili plane ratione et de epicyclo Ptolemaico et de Tychonico deferente systematis demonstrari possunt; tantummodo ut in schemate apsides in contrarias partes convertantur. Supposui autem hic et apogaeum Solis a Tycho loco justo constitutum et orbitam Solis (seu Terrae), quam corpore peragrat, ordinari in circulo. De quo etsi analogia ad planetas ceteros diversum testabitur infra cap. XLIV, exilitas tamen deflexus plane nihil nostrae demonstrationi incommodat.

Caput XXIV.

Evidentior probatio, epicyclum seu orbem annuum esse a puncto aequalitatis eccentricum.

Haec igitur initia fuerunt hujus inquisitionis, timida illa et tam multis cautionibus operosa, ut aequalis haberetur ex utroque latere anomalia commutationis.

Jam postquam semel hujus rei periculum fecimus, audacia subvecti porro liberiores esse in hoc campo incipiemus. Nam conquiram tria vel quotcunque loca visa Martis, planeta semper eodem eccentrici loco versante: et ex iis lege triangulorum inquiram totidem punctorum epicycli vel orbis anni distantias a puncto aequalitatis motus. Ac cum ex tribus punctis circulus describatur, ex trinis igitur hujusmodi observationibus situm circuli ejusque angium, quod prius ex praesupposito usurpaveram, et eccentricitatem a puncto aequalitatis inquiram. Quodsi quarta observatio accedet, ea erit loco probationis.

Primum tempus esto anno 1590. d. 5. Martii vesperi h. 7. 10', eo quod tunc Mars latitudine pene caruit, ne quis impertinenti suspicione ob hujus implicationem in percipienda demonstratione impediatur. Respondent momenta haec, quibus Mars ad idem fixarum punctum redit: A. 1592. d. 21. Jan. h. 6. 41'; a. 1593. d. 8. Dec. h. 6. 12'; a. 1595. d. 26. Oct. h. 5. 44'. Estque longitudo Martis primo tempore ex Tychonis restitutione $1^{\circ} 4' 38' 50''$: sequentibus temporibus toties per $1' 36''$ auctior. Hic enim est motus praecessionis congruens tempori periodico unius restitutionis Martis. Cumque Tycho apogaeum ponat in $23\frac{1}{2}^{\circ} \Omega$, aequatio ejus erit $11^{\circ} 14' 55''$: propterea longitudo coaequata anno 1590. $1^{\circ} 15' 53' 45''$.

Eodem vero tempore et commutatio seu differentia medii motus Solis a medio Martis colligitur $10^{\circ} 18' 19' 56''$: coaequata seu differentia inter medium Solis et Martis coaequatum eccentricum $10^{\circ} 7' 5' 1''$.

Primum haec in forma Copernicana ut simpliciori ad sensum proponemus.

Sit α (Fig. 76) punctum aequalitatis circuitus Terrae, qui putetur esse


Solis medio loco in	22° 59'	☿	$\alpha\theta$	66774
	10. 6	☿	$\alpha\eta$	67467
	27. 13	☿	$\alpha\epsilon$	67794
	14. 20	☿	$\alpha\zeta$	67478.

Est ergo longissima $\alpha\epsilon$, quae et proxima perigaeo Solis; brevissima $\alpha\theta$, quae etiam remotissima a perigaeo Solis; et fere aequales $\alpha\zeta$ et $\alpha\eta$, quia etiam pene aequaliter absunt a perigaeo.

Etsi vero $\alpha\zeta$ longior est paulo quam $\alpha\eta$, quae propior perigaeo: id tamen exilitati angulorum in ζ tribuendum est, per quam facile tam parvum aliquid peccatur. Ergo circulus $\delta\gamma$, qui descriptus est a Copernico ex α puncto aequalitatis motus Terrae, non est iter Terrae: sed est alius quispiam circulus $\theta\eta\epsilon\zeta$, in quo Terra versatur; cujus centrum vergit in easdem partes, in quibus Sol est, scilicet in β .

In forma Ptolemaica sit Tellus in A , Solis sphaera ΞOIT , K centrum epicycli putativum, id

Fig. 77.




nempe, circa quod epicyclus ipse putativus ΔI , aequalis theoriae Solis (quod ad omnimodam aequipollentiam inter hypotheses Copernici et Brahei est necessarium factu, etsi ad praesentem demonstrationem nihil refert, in quacunque proportionem sint orbis Solis et epicyclus planetae; dummodo aequales habeant restitutiones). Sitque AA linea apsidum Martis.

Sint AK , AA , paralleli prioribus $\alpha\kappa$, $\alpha\lambda$ (Fig. 76) in Copernicana forma. Educantur ex A centro Terrae lineae $A\theta$, AH , AE , AZ paralleli prioribus $\alpha\theta$, $\alpha\eta$, $\alpha\epsilon$, $\alpha\zeta$ et aequales; ut sit Mars anno 1590. in θ , 1592. in H , 1593. in E , 1595. in Z : et simul medius Solis motus iis temporibus ordine sit AT , AI , AO , $A\Xi$, ut sint $K\theta$ et AT paralleli, et sic reliquae, prout notum est de Ptolemaica hypothesis. Connexis igitur θ , H , E , Z cum K , demonstrabitur (ut prius) iisdem plane numeris, lineis et angulis, has lineas praeter opinionem esse inaequales, ac propterea Martem non in circulo $\Gamma\Delta$ versari, cujus sit centrum in K puncto aequalitatis motus, sed in $ZEH\theta$ circulo, cujus centrum a K versus B vergat, propemodum in linea KB , quae sit parallelus lineae ex A Terra per perigaeum Solis ductae.

Vergit igitur apogaeum epicycli in perigaeum Solis. Et quia epicyclus propter omnimodam aequipollentiam, ut jam dictum, ponendus est aequalis circuitui Solis, et ZK parallelus ipsi ΞA , et EK ipsi OA , et HK ipsi IA , et θK ipsi TA : igitur etiam ipsas ΞA , OA , IA , TA inaequales esse verisimile est, et punctum medii loci Solis (Braheana notione centrum epicycli Solis) per circuitum a puncto aequalitatis distare inaequaliter. Quod obiter interjeci: nihil n. facit ad praesentem demonstrationem, nisi quod eam extendit amplius.

In forma Tychonica sit A (Fig. 78) Terra, et ex ea scribatur Solis concentricus CD , qui putetur esse deferens systema planetarum, cum sit A punctum aequalitatis motus concentrici Solis. Erit itaque Sol ipse in alio

Fig. 78.



eccentrico circulo. Sit ejus centrum ab A versus partes B. Sit autem AL regula lineae apsidum Martis, ut linea apsidum circulatione et transpositione sui eccentrici semper maneat parallelus ipsi AL. Sint autem lineae medii motus Solis ad nostra quatuor momenta AH, AT, AE, AS: et ex A ejiciantur lineae visionum Martis, prout supra descriptae sunt, in hunc vel illum zodiaci gradum vergere. Et quia ponitur Mars omnibus quatuor vicibus eodem loco eccentrici: quare distantiae ejus a punctis medii loci Solis aequales erant omnes et paralleli. Sint GH, FT, IE, KS omnes aequales,

et anguli LHG, LTF, LEI, LSK aequales priori $\angle AAK$ (Fig. 77.) vel $\angle \alpha\alpha$ (Fig. 76), sic ut Mars ad nostra momenta sit in G, F, I, K. Et ut obiter moneam, haec quatuor puncta G, F, I, K facient in rei veritate arcum plane aequalem et aequaliter situm cum priori arcu θHEZ in forma Ptolemaica: quia nulla amplius est differentia, quam quod Ptolemaeus epicyclum theoriae Solis aequalem in eccentrico circumfert, Tycho eccentricum in theoria Solis, seu in aequali circulo ipsi epicyclo Ptolemaico.

Rursum igitur manentibus iisdem angulis et numeris demonstrabitur, quod lineae AH, AT, AE, AS praeter opinionem sint inaequales. Itaque punctum illud eccentrici, unde consurgit Martis et omnium planetarum eccentricitas (quod jam ponitur in linea medii motus Solis secundum mentem artificum priorum), non circumit in illo circulo DC, circa cujus centrum A aequales facit angulos aequalibus temporibus; sed in circulo HTES, cujus centrum a B centro eccentrici Solis vergit in partes contrarias, ut hactenus crassa Minerva ex ipsis lineis apparuit.

Caput XXV.

Ex tribus distantiiis Solis a centro mundi, cognitis locis sub zodiaco, inquirere apogacum et eccentricitatem Solis vel Terrae.

Quantitatem autem eccentricitatis et situm apogaei probabo jam porro in unico circulo omnibus tribus formis apto. Facile enim apparet, rationes esse tantummodo oppositas: ut in forma Copernicana linea longissima vergit in Geminos, in reliquis formis vergit in Sagittarium: propterea quod Copernicus visum versus centrum dirigit, reliqui a centro. Quare etiam Copernicus trans centrum in partes zodiaci easdem visum dirigit cum ceteris.

Exponatur circulus $\theta\eta\epsilon\zeta$ (Fig. 79) centro β , in quo a suscepto puncto α

sint datae lineae $\alpha\theta$, $\alpha\eta$, αs , $\alpha\zeta$ ut prius; et anguli insuper circa α dati; est enim quilibet eorum $42^\circ 52' 47''$. Quaeritur et quantitas $\alpha\beta$, et casus ejus lineae inter fixas, seu respectu ceterarum linearum. Sumantur θ , η , s et connectantur invicem. Nam tria puncta sufficiunt ad hoc investigandum.

Primum in triangulo $\theta\alpha\eta$ dantur latera et angulus comprehensus, quaeritur $\theta\eta$ ostenditurque lege triangularem 49169 in priori dimensione laterum $\alpha\theta$ et $\alpha\eta$.


Secundo, in triangulo $\alpha s\eta$ quaeritur angulus $\alpha s\eta$, inveniturque $68^\circ 12' 26''$.

Tertio, in triangulo $\theta\alpha s$ quaeritur angulus $\alpha s\theta$, inveniturque $46^\circ 39' 10''$, qui ablatus ab $\alpha s\eta$ relinquit $21^\circ 33' 16''$. Estque hic angulus $\theta s\eta$ ad circumferentiam. Duplum igitur ejus $43^\circ 6' 32''$ erit $\theta\beta\eta$ angulus ad centrum, quia β ponitur esse circuli centrum. In $\theta\beta\eta$ igitur isoscele anguli dantur cum latere $\theta\eta$ prius invento, quaeritur $\theta\beta$ amplitudo radii circuli inveniturque 66923. Et quia $\beta\theta\eta$ est $68^\circ 26' 44''$: prius vero, cum $\theta\eta$ quaereretur, fuit $\alpha\theta\eta$ $69^\circ 18' 46''$: ergo $\beta\theta\alpha$ est $0^\circ 52' 2''$. Igitur in triangulo $\beta\theta\alpha$ ex lateribus et comprehenso quaeritur $\theta\alpha\beta$ et $\alpha\beta$. Invenitur autem angulus $\theta\alpha\beta$ $97^\circ 50' 30''$, ut vergat $\alpha\beta$ in $15^\circ 8' 30''$ II: quia $\alpha\theta$ vergit in $22^\circ 59'$ III. Tycho vero ponit apogaeum Solis in $5\frac{1}{2}^\circ$ ☉. Vides igitur hac ipsa liberrima inquisitione ad veritatem Tyconicam nos accedere intra 20° . Invenitur autem $\alpha\beta$ 1023. Quodsi $\theta\beta$ accipiat dimensionem 100000, $\alpha\beta$ fiet 1530. ⁷³⁾ Eccentricitas vero tota Solis est 3592, dimidium 1796 vel 1800. Hic igitur paulo minus dimidio eccentricitatis Solaris eccentricitati circuli nostri vindicatur. Sed memineris, observationes circa minima peccare aliquid posse, et usurpatam ex Tychone longitudinem mediam aequationemque controversam. Quod facile patebit, si eandem operationem et per $\theta\eta\zeta$ et per $\eta s\zeta$ et per $\theta s\zeta$ fueris exsecutus. Nam tot vicibus prodit $\alpha\beta$ paulo alia quantitate, caditque in locum sub fixis ultra citraque $5\frac{1}{2}^\circ$ ☉, ☿.

Infra igitur majorem circa hoc adhibebimus diligentiam. Nam saepius luculenta demonstratione dimidium eccentricitatis Solaris invenietur et apogaeum proxime Tyconicum.

Demonstratum est igitur in forma Copernicana, centrum circuitus Terrae esse medio loco inter corpus Solis et punctum aequalitatis illius circuitus, hoc est Terram in sua orbita inaequaliter incedere; tardam fieri, ubi longe a Sole recedit, velocem, ubi appropinquat, quod est physicis rationibus et analogiae planetarum ceterorum consentaneum. Eodem modo demonstratum est in Ptolemaica forma, epicyclum a puncto, circa quod ejus motus aequalis est, esse eccentricum, et eccentricitatem dimidiam de eccentricitate Solari vulgariter inventa et in partes contrarias. Denique in forma Tyconica demonstratum est, punctum, a quo consurgunt eccentricitates planetarum, non moveri in concentrico Solis, sed a Terra, circa quam regulariter et aequabiliter volvitur, inaequaliter per ambitum abesse: et versus perigaeum quidem Solis longius distare, versus apogaeum brevius; iterum dimidia eccentricitate Solis. Cum itaque hic epicyclus Ptolemaicus et hic deferens Braheanus tantam habeat analogiam cum theoria Solis, veri-

Fig. 79.



simile est, majorem etiam habere: hoc est, Solis quoque eccentricitas ver-
tantum dimidia erit ejus, quae computatur ex aequatione maxima; seu quod
idem est, Sol utetur aequante, cujus eccentricitas est dupla ad eccentrici-
tatem eccentrici.

Fateor, argumentationem hanc de forma Ptolemaica et Tychonica pauk
imbecilliolem esse, quoad cum auctoribus motu Solis medio utimur. Fie-
itaque illustrior, ubi jam rationibus iis permotus, quas supra cap. VI. recen-
sui, motum planetae ad Solis apparentem motum expendero.

Caput XXVI.

*Demonstratio ex iisdem observationibus, epicyclum a puncto affixionis seu
axe, et orbem annuum (et sic etiam viam Terrae circa Solem, vel Solis
circa Terram) a centro corporis Solaris vel Terrae esse eccentricum,
dimidio saltem ejus, quod Tycho Brahe per aequationes motus Solis
invenit.*

Repetemus autem ipsas observationes diligenter: Anno 1590. d. 4. Martii
h. 7. 10' inventus est diligenti observatione et calculo in $24^{\circ} 22' 56'' \gamma$,
cum lat. $0^{\circ} 3' 20''$ mer. Ea hora occidit $8^{\circ} \gamma$. Itaque δ humilis admo-
dum. Quare per refractionem sublevabatur in consequentia, ut consentaneum
sit, sine refractione appariturum fuisse in $24^{\circ} 20' \gamma$. Parallaxis vero ejus
nonnisi exigua esse potest, praecipue in longum: nam Mars Soli vicinus
ideoque a Terrae centro longissime recessit.

Anno 1592. d. 23. Jan. h. 7. 20' ex unius saltem stellae remotione
a Marte sine alterius testimonio repertus est δ in $11^{\circ} 32' 44'' \gamma$, cum
lat. $0^{\circ} 1' 36''$ merid. Itaque per varietates horizontales nihil mutabimus,
suspicientes tamen unius vel alterius scrupuli incertitudinem.

Anno 1593. d. 7. Dec. h. 8. 0' inventus est δ in $3^{\circ} 6' 50'' \gamma$
sine periculo variationum horizontalium, cum lat. $7' 9''$ mer. Ascensio
recta tamen a tribus stellis exstructa discrepabat 4': et sumtum pro vero,
quod fuit medium inter extrema.

Anno 1595. d. 25. Oct. h. 8. 10' observata est planetae distantia a
tribus fixis, et unanimi consensu inventus est planeta in $19^{\circ} 39' 25'' \gamma$,
cum lat. $0^{\circ} 12' 41''$ mer.

Reducemus autem tria sequentia tempora ad primum. Quare quo

loco eccentrici fuit Mars anno .	1590 d. 4. Mart.	h. 7. 10'
eodem redibit sub fixis annis .	1592 20. Jan.	6. 45
	1593 7. Dec.	6. 15
	1595 25. Oct.	5. 45.

Motus tridui et 35' unius horae anno 1592. est apud Maginum $2^{\circ} 9' 4''$.
Ergo visus est δ ad nostrum tempus in $9^{\circ} 23' 40'' \gamma$. Anno 1593. motus
h. 1. 45' ex diurno 33' est $2' 25''$. Itaque ad nostrum tempus locus
Martis prodit $3^{\circ} 4' 25'' \gamma$. Sic anno 1595. motus horarum 2. 25' ex
diurno $22' 11''$ est $2' 14''$. Ergo ad nostrum tempus locus Martis pro-
dit $19^{\circ} 41' 39'' \gamma$.


Sequitur ergo tabella locorum

	Martis ex observatione;	Solis ex calculo Tychoonis.
1590	24° 20' γ	24° 0' 25" \times
1592	9. 24 γ	10. 17. 8 \approx
1593	3. 4½ γ	25. 53. 24 \times
1595	19. 42 δ	11. 41. 34 η .

Jam quia propositum nobis est explorare, quantum Terra ab ipso centro Solis distiterit, prius oportebit nos uti hypothesi ex oppositionibus cum Solis apparenti loco, supra cap. XVI. exstructa, ad investigandum situm lineae, quae ex centro Solis per corpus Martis in zodiacum educitur. Invenitur autem illa linea anno 1595. d. 25. Oct. h. 5. 45' in 14° 19' 52" δ . Ergo temporibus tribus reliquis toties per 1' 36" est loco anteriori: nempe anno 1593. in 14° 18' 16" δ : anno 1592. in 14° 16' 40" δ : anno 1590. in 14° 15' 4" δ .

Fiat schema primum in forma Copernici.

Fig. 80.



Et sit α Solis centrum: β centrum eccentrici Martis per o traducti: γ centrum aequalitatis motui eccentrico Martis: η centrum eccentrici Terrae: $\delta, \epsilon, \zeta, \eta$ quatuor loca Terrae, opposita locis Solis apparentibus: δ locus Martis in eccentrico suo. Connectantur puncta omnia cum omnibus.

Igitur in $\delta\alpha\beta$ triangulo

quia $\delta\alpha$ est	24° 0' 25" \times
et $\delta\beta$	24. 20. 0 γ
Angulus ergo $\alpha\delta\beta$	30. 19. 35
Et quia $\delta\beta$ est	24. 20. 0 γ
et $\alpha\beta$	14. 15. 4 δ

Ergo angulus $\delta\beta\alpha$ 19. 55. 4

Assumatur $\alpha\beta$ 100000, quaeritur $\alpha\delta$, quae per doctrinam triangulorum prodit 67467.

In triangulo $\zeta\alpha\beta$

quia $\zeta\alpha$	25° 53' 24" \times
et $\zeta\beta$	3. 4. 30 γ
Ergo $\alpha\zeta\beta$ compl.	82. 48. 54
Et quia $\zeta\beta$	3. 4. 30 γ
et $\alpha\beta$	14. 18. 16 δ

Ergo $\zeta\beta\alpha$ 41. 13. 46

Produt igitur $\zeta\alpha$ 66429.

Ecce tibi distantias centri Solis a Terra in fasciculo: $\delta\alpha$ 67467

$\epsilon\alpha$ 66632

$\zeta\alpha$ 66429

$\eta\alpha$ 67220. ¹⁶⁾

Eodem modo in triangulo $\epsilon\alpha\beta$

quia $\epsilon\alpha$	10° 17' 8" \approx
et $\epsilon\beta$	9. 24. 0 γ
Ergo $\alpha\epsilon\beta$	59. 6. 52
Et quia $\epsilon\beta$	9. 24. 0 γ
et $\alpha\beta$	14. 16. 40 δ

Ergo $\epsilon\beta\alpha$ 34. 52. 40

Produt igitur $\epsilon\alpha$ 66632.

Denique in triangulo $\eta\beta\alpha$

quia $\eta\alpha$	11° 41' 34" η
et $\eta\beta$	19. 42. 0 δ
Ergo $\alpha\eta\beta$ compl.	8. 0. 26
Et quia $\eta\beta$	19. 42. 0 δ
et $\alpha\beta$	14. 19. 52 δ

Ergo $\eta\beta\alpha$ 5. 22. 8

Produt igitur $\eta\alpha$ 67220.

Tentabimus, quanta ex hisce distantii exstruatur eccentricitas. Nam si Solis theoria caret aequante, eccentricitas hujus circuli prodibit 3600 proxime, propterea quia usi sumus veris seu apparentibus locis Solis, quorum aequalitatis punctum tanto spatio (nempe 3600) a centro mundi distare necesse est, ut Braheus ex observationibus Solaribus probavit. Sin autem minor prodibit eccentricitas et quam proxime dimidia Braheanae, vicimus et evicimus, aequalitatis illud punctum, quod Braheus invenit, non esse centrum eccentrici Solis.

Vides autem (ut obiter admoneam) primo intuitu, $\alpha\zeta$ esse brevissimam, utpote circa perigaeum Solis: post αs longiorem, utpote in ∞ , 34° a perigaeo: tum $\alpha\eta$, utpote 54° a perigaeo: denique longissimam $\alpha\delta$, quia 80° abest a perigaeo. Ac cum $\alpha\zeta$ sit pene in perigaeo, erit igitur exiguo longior brevissima. Sic cum $\alpha\delta$ sit prope longitudinem mediam, erit paulo minor mediocri distantia. Quare eccentricitas prodibit paulo major quam 1038, quae differentia est inter $\delta\alpha$ et $\zeta\alpha$. Et si $\delta\alpha$ suscipiat dimensionem 100000, tunc 1038 valebit 1539: et tanta fere, nempe exiguo major, evadet eccentricitas. Id autem multo propius est dimidia Tychonicae 1800, quam integrae 3600.

Eadem de apogaeo Solis dicenda. Nam quia $\zeta\alpha$ est brevissima, ergo perigaeum est circa $25^\circ 53'$ \times . Et quia $s\alpha$ brevior quam $\eta\alpha$, igitur perigaeum est propius apud $10^\circ 17'$ ∞ quam apud $11^\circ 42'$ η . Medium autem est $25^\circ 57'$ \times . Ergo perigaeum est ultra $25^\circ 57'$ \times , ante $10^\circ 17'$ ∞ , scilicet in ζ .

Haec in solatium sequuntur laboris praelibare volui. Jam enim via geometrica locum apogaei et eccentricitatem investigabo. Et quia tria puncta ponunt circulum, utar initio punctis δ , ζ , η .

Igitur argumentor ut supra cap. XXV. Cum puncta δ , ζ , η ponantur in eadem circumferentia, cuius γ centrum, erit igitur angulus $\delta\eta\zeta$ dimidium de angulo $\delta\gamma\zeta$, huiusque mensura arcus $\delta\zeta$. Quare proportio dabitur $\delta\zeta$ ad $\delta\gamma$ radium et ad $\gamma\alpha$ eccentricitatem, cum $\delta\alpha\gamma$ angulo: quia $\alpha\gamma$ in apsidam dirigitur. Ad cognitionem vero anguli $\delta\eta\zeta$ et lineae $\delta\zeta$ opus nobis est solutione trium triangulorum.

Primum in $\delta\alpha\zeta$, quia $\alpha\delta$ in $24^\circ 0' 25''$ \times et $\alpha\zeta$ 25. 53. 24 \times			
Quare $\delta\alpha\zeta$	88. 7. 1	Hinc et ex $\alpha\delta$	67467
Addo $3' 12''$ ob praecess.	88. 10. 13	et $\alpha\zeta$	66429
Duo residui δ , ζ	91. 49. 47	invenitur angulus $\alpha\delta\zeta$	$45^\circ 27' 22''$
Dimidium	45. 54. 54	ejusque sinus	71271
Ejus tangens	103246	Ex quo et latere $\alpha\zeta$ invenitur $\delta\zeta$	93159.
Secundo in $\delta\alpha\eta$, quia $\alpha\delta$ $24^\circ 0' 25''$ \times et $\alpha\eta$ 11. 41. 34 η			
Quare $\delta\alpha\eta$	132. 18. 51		
Addo ob praecessionem	4. 48		
	132. 23. 39	Hinc et ex $\alpha\delta$	67467
Duo residui δ , η	47. 36. 21	et $\alpha\eta$	67220
Dimidium	23. 48. 11	invenitur angulus $\alpha\eta\delta$	$23^\circ 51' 0''$
Tangens	44110		
Tertio in $\zeta\alpha\eta$, quia $\alpha\zeta$ $25^\circ 53' 24''$ \times et $\alpha\eta$ 11. 41. 34 η			
Ergo $\zeta\alpha\eta$	44. 11. 50	Hinc et ex $\alpha\zeta$	66429
Ob praecessionem addo	1. 36	et $\alpha\eta$	67220
	44. 13. 26	invenitur $\alpha\eta\zeta$	$67^\circ 3' 12''$
Duo residui ζ , η	135. 46. 34		
Dimidium	67. 53. 17, tangens 246120		


<i>Quia ergo</i> . . . $\alpha\eta\delta$	23° 51' 0"	<i>Et quia</i> $\alpha\delta\zeta$	45° 27' 22"
<i>et</i> $\alpha\eta\zeta$	67. 3. 12	<i>et</i> $\gamma\delta\zeta$	46. 47. 48
<i>ergo</i> . . . $\delta\eta\zeta$	43. 12. 12	<i>ergo</i> $\gamma\delta\alpha$	1. 20. 26
<i>Quare</i> . . . $\delta\gamma\zeta$	86. 24. 24	<i>Residui duo</i> γ, α	178. 39. 34
<i>Residui duo</i> δ, ζ	93. 35. 36	<i>Dimidium</i>	89. 19. 47
<i>Dimidium</i> . . . $\gamma\delta\zeta$	46. 47. 48	<i>Tangens</i>	8540000
<i>Cujus sinus</i>	72893	<i>Sumatur</i> $\gamma\delta$ <i>esse partium</i> .	100000
<i>Hinc et per</i> $\delta\zeta$ <i>invenitur</i> $\delta\gamma$	68141	<i>erit eorum partium</i> $\alpha\delta$.	99011
		<i>Hinc invenitur</i> $\delta\gamma\alpha$	68. 26. 7
		<i>ut sit</i> $\alpha\gamma$ <i>in</i>	15. 34. 18 ζ
		<i>Sinus vero</i> $\delta\alpha\gamma$	93000
		<i>et sinus</i> $\gamma\delta\alpha$	2340
		<i>ostendunt</i> $\alpha\gamma$ <i>eccentricitatem</i>	2516. ¹¹)

Atqui prius dictum, eccentricitatem ex δ et ζ prodire paulo majorem quam 1539, posito quod ζ sit proximum perigaeo. Cum autem hic (pro ζ in collegium ascito η) prodeat eccentricitas longe major, innuitur igitur (quanquam per errorem), esse aliquam in perigaeo, quae sit ipsa $\alpha\zeta$ adhuc brevior. Propterea ut haec in perigaeo brevior esse posset quam $\alpha\zeta$, perigaeum in 16° ζ transpositum, hoc est longius ab $\alpha\zeta$ per hanc argumentationem remotum est.

At quia praescimus, Solis perigaeum non esse in 16° ζ sed in 6° ζ , oportet ut sit causa errorculi in η puncto, et linea $\alpha\eta$ nimis longa; ex qua factum, ut circulus $\delta\alpha\eta$ prodiret nimis amplius, et $\delta\gamma$ radius ejus nimis longus, propterea $\gamma\alpha$ nimis longa, et γ recta a linea $\delta\eta$ discederet, oblique autem a puncto ζ : itaque jam $\gamma\alpha$ linea vergat nimis in consequentia. Manentibus itaque $\delta\zeta$, ponatur $\alpha\eta$ abbreviari: tunc γ centrum ad lineam $\delta\eta$ recta accedet, et sic $\delta\gamma$ fiet brevior. Et quia γ accedit ad $\delta\eta$ perpendiculariter, discedit igitur a $\gamma\alpha$ praesente oblique. Quare recta ex α per novum positum ipsius γ ejecta, inclinabitur in anteriora versus δ .

Vides igitur, per abbreviationem ipsius $\alpha\eta$ nos utrinque juvari. Abbreviatur autem $\alpha\eta$ levissima mutatiuncula, propter angulorum parvitatem: nempe si planeta dicatur visus esse loco paulo priori per lineam ex δ infra η demissam. *Ut si sit visus locus* δ 19° 40' ζ , *et complementum* $\alpha\eta\delta$ 7° 58' 26", *et* $\eta\theta\alpha$ 5° 20' 8"; *erit* $\alpha\eta$ 67030. *Mutantur igitur secundum et tertium triangula, et fit* $\alpha\eta\delta$ 23° 53' 6", *et* $\alpha\eta\zeta$ 67° 15' 32".

Fig. 80.



Quare $\delta\eta\zeta$ $43^\circ 22' 26''$ et $\delta\gamma\zeta$ $86^\circ 44' 52''$. Residui $93^\circ 15' 8''$ dimidium $\gamma\delta\zeta$ $46^\circ 37' 34''$, et $\gamma\delta\alpha$ $1^\circ 10' 12''$; hinc $\delta\gamma$ 67892. Et quoniam haec est 100000, talium erit $\alpha\delta$ 99416 et $\delta\gamma\alpha$ $73^\circ 24' 39''$. Itaque perigaeum in $10^\circ 36' \zeta$, et eccentricitas adhuc 2100 circiter.

Sicut igitur cum accessione ad verum perigaeum decrevit eccentricitas: ita ubi plane ad justum perigaeum accesserimus, plane etiam ad dimidiationem eccentricitatis accedemus. Sed juvat tamen et hoc inquirere, quantum proficiamus mutatione lineae $\alpha\theta$, nempe unius scrupuli additione ad locum Martis eccentricum computatum, manente visione anni 1595 (hoc est puncti η) immutabili. Promota igitur $\alpha\theta$, si manerent hae ipsae lineae visionum $\eta\theta$, $\zeta\theta$ et reliquae, fieret ut $\alpha\theta$ secaretur ab $\eta\theta$ loco superiori quam est θ : vicissim a $\zeta\theta$ et sociis secaretur loco inferiori quam est θ . Ita $\alpha\theta$ non retineret eandem longitudinem. At quia ponimus, Martem esse omnibus quatuor vicibus in eodem loco eccentrici, erit etiam omnibus quatuor vicibus ipsius $\alpha\theta$ eadem longitudo. Quare, ut idem sit punctum sectionis θ et tamen lineae visionis in pristina vergant loca zodiaci, oportebit ipsi $\eta\theta$ parallelum ducere paulo inferiorem, qua minuatur $\alpha\eta$: vicissim ipsi $\zeta\theta$ exteriorem et parallelum, qua augeatur $\alpha\zeta$: et sic reliquae. Igitur totus labor est repetendus a principio. Erit enim $\delta\theta\alpha$ $19^\circ 56' 4''$, $\epsilon\theta\alpha$ $34^\circ 53' 40''$, $\zeta\theta\alpha$ $41^\circ 14' 46''$, $\eta\theta\alpha$ $5^\circ 21' 8''$. Quare $\delta\alpha$ 67522, $\epsilon\alpha$ 66660, $\zeta\alpha$ 66251, $\eta\alpha$ 66963. Hinc $\alpha\delta\zeta$ $45^\circ 26' 37''$, $\alpha\eta\delta$ $23^\circ 54' 30''$, $\alpha\eta\zeta$ $67^\circ 20' 48''$. Et $\delta\eta\zeta$ $43^\circ 26' 18''$ et $\delta\gamma\zeta$ $86^\circ 52' 36''$, $\gamma\delta\zeta$ $46^\circ 33' 42''$ et $\gamma\delta\alpha$ $1^\circ 7' 5''$: alius angulus ex aliis principiis. Divisa vero $\alpha\zeta$ per sinum $\alpha\delta\zeta$, quotiente multiplicato in sinum $\delta\alpha\zeta$, prodit $\delta\zeta$ 93252. Quo rursum diviso in sinum $\delta\gamma\zeta$ et quotiente multiplicato per sinum $\delta\zeta\gamma$, prodibit $\delta\gamma$ 67823. Hinc angulus $\delta\gamma\alpha$ $76^\circ 37' 30''$ et perigaeum in $7^\circ 23' \zeta$, eccentricitas vero 1880 circiter, ut plane futura sit 1800, si perigaeum in $5\frac{1}{2}^\circ \zeta$ referatur, idque per utriusque causae commixtionem.

Nam si jam saltem dimidium scrupulum adimas visioni anno 1595, scopum tenebimus. Unum autem scrupulum in aequationibus eccentri per hypothesin capitis XVI. inventis abesse facile potest.

Quia vero facile per annum 1595 peccatur, hoc jam misso operemur per tria reliqua δ , ϵ , ζ , puncta, manente ultima correctione loci eccentrici, ubi nova fiunt triangula $\delta\alpha\epsilon$, $\epsilon\alpha\zeta$.

Nam quia $\alpha\delta$ $24^\circ 0' 25'' \times$	Hinc et ex $\alpha\delta$ 67522
et $\alpha\epsilon$ $10. 17. 8 \approx$	et $\alpha\epsilon$ 66660
Angulus ergo $\delta\alpha\epsilon$ $43. 43. 17$	invenitur $\alpha\delta\epsilon$ $67^\circ 12' 35''$
Ob process. aequin. adde 1. 36	Erat vero et manet $\alpha\delta\zeta$ $45. 26. 37$
43. 44. 53	ergo $\epsilon\delta\zeta$ $21. 45. 58$
	et $\epsilon\gamma\zeta$ $43. 31. 56$
Sic quia $\alpha\epsilon$ $10. 17. 8 \approx$	Hinc et ex $\alpha\epsilon$ 66660
et $\alpha\zeta$ $25. 53. 24 \times$	et $\alpha\zeta$ 66251
Angulus ergo $\epsilon\alpha\zeta$ $44. 23. 44$	invenitur $\alpha\zeta\epsilon$ $68^\circ 0' 34''$
Aequin. processio 1. 36	Addo ad $\alpha\delta\zeta$ $45. 26. 37$
44. 25. 20	angulum $\delta\alpha\zeta$ $88. 10. 13$
	133. 36. 50
Et quia $\delta\zeta$ manet ut prius 93252; diviso	Erit $\alpha\zeta\delta$ $46. 23. 10$
ergo sinu $\gamma\delta\zeta$ per sinum $\delta\gamma\zeta$, et quo-	Ergo $\epsilon\zeta\delta$ $21. 37. 24$
otiente in $\delta\zeta$ multiplicato, prodit $\gamma\delta$	et $\epsilon\gamma\delta$ $43. 14. 48$
67873. Sed $\alpha\delta$ 67522.	Proinde $\delta\gamma\zeta$ $86. 46. 44$
Hinc et ex $\gamma\delta$ invenitur $\delta\gamma\alpha$ $75^\circ 8' 40''$:	et $\gamma\delta\zeta$ $46. 36. 38$
et perigaeum in $8. 51. 45 \approx$	Manet vero $\alpha\delta\zeta$ $45. 26. 37$
quam proxime ut prius: eccentricitas	Ergo $\gamma\delta\alpha$ $1. 10. 1$

paulo plus 2000 attenuanda (ut prius) usque ad 1800, si perigaeum referatur in $5\frac{1}{2}^{\circ}$ ζ , quod fit per prolongationem ipsius $\alpha\epsilon$. Prolongatur autem $\alpha\epsilon$, si dicamus, planetam visum esse scrupulo uno atque altero ante $9^{\circ} 24'$ γ : tunc enim ex δ puncto, per ceteras observationum lineas constituto, duceretur aliqua exterior ipsa $\delta\epsilon$ versus $\delta\zeta$.

Si vero quis hanc libertatem mutandi minima in datis suspectam habet, existimans, eadem libertate mutandi ea, quae nobis in observationibus non placent, etiam totalem Tychonis eccentricitatem tandem obtineri posse: hujusmodi igitur aliquis periculum faciat, et ubi suas mutationes cum nostris comparaverit, iudicium ferat, utra mutatio intra sensuum defectum consistat: quin etiam id caveat, ne fiducia unius hujuscemodi processus elatus, in ceteris postea sese tanto turpiorem det, diversissimis Solis apogaeis inventis.

Ego certe omnia mea praejudicia et affectationes hic in aperto posui, ut magis metuam, ne importunus, quam ne parum fidus lectori videar.

Porro et hoc obiter dicendum in futurum usum, si $\gamma\delta$ fiat 100000, proditurum $\alpha\theta$ 147443, et majorem etiam, ubi, quae adhuc desiderantur, recte habuerint.

Denique ne sim multus, si $\alpha\theta$ sit 147700, et eccentricus locus Martis anno 1595. in $14^{\circ} 21' 7''$ ζ , et eccentricitas Terrae 1800, et iter Terrae ovale, ut dicetur capite XXX. et XLIV: prodibunt visiones

	24° 21' 13''	γ	Deb. 24. 20
	9. 23. 20	γ	9. 24
Concludo hac vice, $\alpha\theta$ esse circiter 147750.	3. 2. 30	γ	3. 4½
	19. 42. 40	ζ	19. 42

Et sic demonstratum est, $\alpha\gamma$ esse circiter 1800, cum debuerit esse 3600, si Tychonis inventa formae Copernicanae et apparentibus Solis motibus accommodentur. Itaque π punctum aequalitatis motus Terrae in linea $\alpha\pi$ quaerendum, ut $\gamma\pi$, $\gamma\alpha$, sint aequales. Mota enim Terra circa π aequaliter, hoc est, $\delta\pi\epsilon$, $\epsilon\pi\zeta$, $\zeta\pi\eta$ existentibus aequalibus, stabunt observata Tychonis circa Solem, eritque $\pi\alpha$ 3600: distante vero Terra in punctis δ , ϵ , ζ , η a puncto γ aequaliter, stabunt etiam observata in Marte.

In forma Ptolemaica duplex esse potest delineatio. Primum enim Terra succedat in locum α corporis Solaris: et tunc ex α ejectae lineae visionum, paralleli ipsis $\delta\theta$, $\epsilon\theta$, $\zeta\theta$, $\eta\theta$: sic ut δ , ϵ , ζ , η loca Terrae Copernicana concedant in unum locum Terrae Ptolemaicum: Martis vero stella, quae apud Copernicum in uno θ constiterat, jam circa θ in quatuor loca ι , κ , λ , μ circumponatur. Cujus circuli descriptio haec: per θ ducatur sursum parallelos ipsi $\gamma\alpha$ et aequalis, $\theta\upsilon$, et centro υ , spatio $\gamma\epsilon$ scribatur circulus $\iota\kappa\lambda\mu$. Itaque in eccentrico, quem prius planeta corpore peragraverat apud Copernicum, jam circumit θ , quod punctum affixionis dicere possumus. Sic epicyclo circumlato υ centrum circumagetur circa θ , ut jam sit intra $\theta\alpha$, jam extra: sed $\theta\upsilon$ semper sibi ipsi et lineae $\alpha\gamma$ parallelos: et epicyclus neque circa θ , ubi affigitur, neque circa υ centrum aequaliter movebitur, sed circa o superius, ut θo sit dupla ad $\theta\upsilon$; quia sic et Terra circa π aequaliter movebatur, non circa γ centrum orbis, nec circa Solem in α .

Haec sic in epicyclum Ptolemaicum redundare recte demonstrantur, ut ex epicyclo in theoriam Solis sequuntur non nisi per verisimilitudinem ex Ptolemaicis placitis concinnatam. Etenim his ita habentibus, ipsi $\alpha\pi$ aequalis constituitur $\alpha\tau$, in ejusdem lineae partes oppositas; ut τ sit centrum aequalitatis motus Solis, quod artifices crediderunt esse centrum orbitae

Solis. Ergo $\theta\gamma o$ linea semper parallelus erit lineae apogaei Solis $\alpha\tau$. Quodsi parallaxes diurnas Martis in ea proportionem ad parallaxes Solis, in qua sunt a Tychoe proditae, retinendas arbitraris, erit $\kappa\lambda\mu$ etiam aequalis theoriae Solis: propterea et θo aequalis eccentricitati puncti τ , circa quod Sol movetur aequaliter. Sed et in partes easdem movetur $\kappa\lambda\mu$, in quas ipse Sol in suo circulo secundum Ptolemaeum: et iisdem temporibus, iisdem vel respondentibus in locis uterque reperiuntur, Sol in suo eccentrico et planeta in suo epicyclo; sic ut lineae ex τ per Solem et ex o per planetam perpetuo sint paralleli, docente itidem Ptolemaeo. Ceteris ergo omnibus consentientibus, cur non et hoc consentiat? ut, quia $\kappa\lambda\mu$ non circa γ centrum, sed circa o punctum superius aequaliter movetur, quod hoc loco demonstratum est transposito eccentrici terrestri in epicyclum, in quo pro α puncto nacti sumus θ , pro γ , γ , et pro π , o , sic etiam in Sole ipso haec sint divisa, ita ut $\alpha\tau$ eccentricitas, quae ex Solaribus observationibus invenitur, bisecanda sit in ξ , et sit ξ centrum eccentrici Solis $\lambda\rho\sigma\upsilon$? nam tali processu Ptolemaeus utitur, ut appareat, si apparentibus Solis locis usus esset, omnino etiam eadem eccentricitate usurum fuisse in epicyclo planetae, quam in Sole deprehenderat. Testantibus igitur observationibus de duplici epicycli Ptolemaici eccentricitate (quia propter linearum parallelitatem, ut dictum, eadem triangula manent, quae erant in forma Copernicana), jubet nos Ptolemaei genius, etiam Solis eccentricitatem bisecare, ut sic lineae $\lambda\iota$, $\rho\kappa$, $\sigma\lambda$, $\upsilon\mu$ paralleli maneant.

Hac itaque ratione etiam Ptolemaeo persuadebitur, $\alpha\tau$ eccentricitatem motus Solis a Tychoe inventam bisecandam esse in ξ , ut Solis orbitae centrum sit in ξ , aequalitas motus in τ .

Haec igitur argumentatio in forma Ptolemaica (uti modo dici coeptum) non est firmior, quam compages ipsa mundi Ptolemaica. Nam qui hoc Ptolemaeo credit, in tribus superioribus inesse totidem theorias epicyclorum, ad amussim aequalium theoriae Solis, in quantitate et qualitate cum linearum tum motuum omnino omnium, idem unam hanc dissonantiam non admittet, sed ex epicyclo lubens in theoriam Solis, tanquam a speculari imagine in ipsam faciem, derivabit hanc quoque bisectionem.

Tandem vero, ubi hypothesium comparatio instituta fuerit apparueritque, quatuor (imo sex, ut alibi dicetur) theorias Solis ex una theoria Terrae, tanquam plures imagines ab una facie substantiali, descendere posse: Sol ipse veritatis clarissimus omnem hunc apparatus Ptolemaicum ceu butyrum colliquabit, et Ptolemaei asseclas partim in Copernici, partim in Brahei castra dissipabit.

Quaerat hic aliquis, cum epicyclus Ptolemaicus tria habeat puncta notabilia, γ centrum, θ punctum quod diximus affixionis, et o punctum circa quod motus ejus aequalis est; dictum vero sit, lineam θo manere ipsi $\alpha\tau$ parallelum per omnem circuitum: quales ergo circuitus describantur a reliquis duobus punctis γ et o ? Ad hoc declarandum ducantur ex ξ et τ ipsi $\alpha\beta$, item ex β , χ ipsi $\alpha\tau$ paralleli, eousque donec se mutuo secuerint: et linearum ex ξ et β sectio sit ϕ , ex ξ et χ sit ψ , ex τ et β sit ς , ex τ et χ sit ω . Quemadmodum igitur punctum θ decurrit in eccentrico, qui descriptus ex β regulariter movetur circa χ , sic γ decurrit in eccentrico, qui descriptus ex ϕ regulariter movetur circa ψ , et o decurrit in eccentrico tertio prioribus similiter aequali, qui descriptus ex ς regulariter movetur circa ω . Omnium vero trium horum eccentricorum idem sub zodiaco est

apogaeum, eo quod lineae $\alpha\chi$, $\xi\psi$, $\tau\omega$ paralleli sunt. At de nullo proprie usurpari potest vox apogaei praeterquam de primo, puncti θ , quia ejus linea apsidum $\alpha\beta\chi$ per ipsam Terram ducitur, quae in α posita fuit, non vero in ξ vel τ .

Verum quidem est, ex α Terra ejici posse per centra duorum reliquorum eccentricorum ϕ et ς rectas, quae dicantur lineae apogaei proprie; quae in antecedentia cadent apogaei $\alpha\chi$; puta $\alpha\phi$ in 24° \mathcal{Q} , $\alpha\varsigma$ in 19° \mathcal{Q} circiter. At tunc hae lineae non transibunt per cujusque eccentrici punctum aequalitatis proprium. Itaque si quis ex Ptolemaei sectatoribus non vult epicyclum affigere eccentrico in puncto θ , sed mavult eum alligare in centro τ , is cogetur uti duabus lineis apsidum, altera $\alpha\phi$ eccentrici, reliqua $\alpha\psi$ aequantis, et eccentricitatibus $\alpha\phi$ et $\alpha\psi$; quod quam sit intricatum et incommodum (de absurditate enim sat dictum est capite VI.), judicet hujusmodi aliquis.

Idem erit, si quis velit figere epicyclum eccentrico in puncto o , circa quod epicyclus aequaliter volvitur. Nam tunc eccentricus, deferens punctum o , habebit duo apogaea et eccentricitates; alterum centri in linea $\alpha\varsigma$, alteram puncti aequalitatis in linea $\alpha\omega$. Restat igitur vel epicyclum in θ figere, vel eccentricorum, qui puncta τ et o deferunt, apogaea improprie sumere, et eccentricitates computare a punctis ξ , τ , non ab α , Terrae indice.

Atque hactenus prima delineatio fuit in forma Ptolemaica. Altera potest institui sic, ut loca Terrae Copernicana δ , ϵ , ζ , η , concedant non in α , sed in γ , sic ut in hoc schemate non α , sed γ denotet Terram mundi centrum: ubi epicyclus etiam, et ipsius punctorum θ , τ , o tres eccentrici situ suo emovebuntur spatiolo $\alpha\gamma$, eritque mera aequipollentia, quam supersedeo ulterius explicare, ne nimium lector confundatur; nam haec quidem mentio tantum fit propter sciolos aut curiosos.

In forma Tychonica nulla nova delineatione opus est. Brevissima indicatio sufficit. Ponitur punctum affixionis eccentrici quatuor sitibus diversis in λ , ρ , σ , ν , ut planeta sit in ι , κ , λ , μ , et paralleli $\iota\lambda$, $\kappa\rho$, $\lambda\sigma$, $\mu\nu$, et $\theta\alpha$. Tycho igitur cum dixisset, centrum circuli Martii, quem ipse facit deferre duplicem epicyclum, circumire in concentrico Solis aequaliter circa α , idque in Ptolemaei gratiam, fuit una cum Ptolemaeo et Copernico a me per motus parte prima cap. VI, ut illud seu concentrici centrum seu eccentrici punctum affixionis potius in ipsissimo centro corporis Solaris quaereret; idque rationibus physicis et ostensa possibilitate geometrica, quibus accessit cap. XXII. et XXIII. validum argumentum: quod nisi hoc fiat, etsi observationes ad medium Solis motum referantur, epicyclus Ptolemaicus et deferens Braheanus fiant eccentrici in plagas eccentricitati Solis praecise contrarias. Fortiora autem et ex propriis Brahei observationibus deducta argumenta deserendi concentrici Solis pollicitus sum, et in sequentibus cap. LII, LXVII. producam. Atqui jam est probatum hoc capite XXVI, hoc centrum concentrici Martis (seu punctum, a quo surgit eccentricitas Martis) non inveniri in eccentrico aequali, ex τ puncto aequalitatis Solis descripto, quod Braheus cum auctoribus putaverat, sed in eccentrico ex ξ , quod est medio loco inter α et τ . Ergo si centrum concentrici \mathcal{C} circumit cum Sole, circumit vero in eccentrico ex ξ descripto, Sol igitur ipse circumibit in eccentrico ex ξ descripto. At motus ejus est regularis circa τ . Eccentricitas igitur Solis $\alpha\tau$ bisecanda est in ξ . Non est enim verisimile, centro concentrici Martis et Solis pariter circumeuntibus, pariter in apo-

gaeum incidentibus, pariter apogaeum transponentibus, pariter tardis vel velocibus, pares ambitus describentibus, fieri posse, ut circuli eorum diversas a Terra egressiones in plagam eandem faciant.

Atque hactenus hanc demonstrationis formam in tribus hypothesibus proposuisse sufficiat. In posterum, quoties eadem demonstratione opus fuerit, utar solius Copernici ut simplici forma, ne nimium prolixus sim. Jam autem vidit lector industrius, quomodo quodcunque horum schematum in formam vel Ptolemaicam vel Copernicanam per lineas parallelos transformari possit.

Caput XXVII.

Ex aliis quatuor observationibus stellae Martis extra situm acronychium, in eodem tamen eccentrici loco, demonstrare eccentricitatem orbis Terrae cum ejus aphelio, et proportionem orbium ejus loci, una cum loco Martis eccentrico sub zodiaco.

Hactenus fere usi sumus aphelio Martis, una cum correctione motus medii et hypothesi aequationum supra inventa: quae si unicum scrupulum in definienda longitudine planetae sub zodiaco peccent, ut fieri facile potest, multum nobis in hoc negotio incommodant. Itaque jam hic nihil assumemus omnino, nisi periodicum tempus Martis, in quo nullum potest esse dubium, et loca Solis sub zodiaco ex calculo Tychonis. Eccentricum quidem locum ponemus, ut in demonstratione ad impossibile ducente fieri solet: sed eum ipsum repetita positione demonstrabimus.

Observationes hae sunt.

A. 1585.	7. Maji	h. 11. 26'	in 25° 55'	Q	Lat. 1° 33'	b.
	12. Maji	h. 10. 8	in 28. 3 1/2	Q	Lat. 1. 24 1/2	b.
A. 1587.	27. Martii	h. 9. 40	in 18. 21 1/2	mp	Lat. 2. 55 1/2	b.
	1. Aprilis	h. 9. 30	in 17. 11	mp	Lat. 2. 43 1/2	b.
A. 1589.	12. Febr.	mane h. 5. 13	in 8. 48	mp	Lat. 2. 9	b.
A. 1590.	28. Dec.	mane h. 7. 8	in 8. 6	mp	Lat. 1. 14	b.
A. 1591.	5. Jan.	mane h. 6. 50	in 12. 44 1/2	mp	Lat. 1. 23 1/2	b.

Cum anno 1589 unicus tantummodo dies sit, qui ad ceteros applicari possit, ante et post diu nihil observatum: cetera tempora ad hoc reducuntur: eritque catalogus eorum, una cum apparentibus locis Solis et Martis et cum loco eccentrico Martis, iste:

Tempus	mane	Sol	Mars	Sit in eccentrico per positionem primam.
1585. 10. Maji	h. 6. 11'	28° 55 1/2' ♂	26° 54 1/2' ♀	5° 22' 2"
1587. 28. Mart.	h. 5. 42	16. 50 1/2' γ	18. 12 mp	5. 23. 38
1589. 12. Febr.	h. 5. 13	3. 41 1/2' ♂	8. 48 1/2' mp	5. 25. 14
1590. 31. Dec.	h. 4. 44	19. 6 1/2' ♂	9. 47 1/2' mp	5. 26. 50

Fiat schema ut prius (Fig. 81), in quo α Sol, β centrum eccentrici Terrae, ζ , δ , ϵ , γ quatuor loca Terrae, η locus Martis in suo eccentrico et connectantur puncta omnia cum omnibus. Ex datis igitur

Erunt anguli cogniti				Hinc dantur	
$\alpha\zeta\eta$	87° 58' 45"	$\alpha\eta\zeta$	38° 27' 32"	$\alpha\zeta$	62227 $\frac{1}{2}$
$\alpha\epsilon\eta$	151. 21. 36	$\alpha\eta\epsilon$	17. 11. 38	$\alpha\epsilon$	61675
$\alpha\delta\eta$	114. 53. 25	$\alpha\eta\delta$	33. 23. 1	$\alpha\delta$	60658
$\alpha\gamma\eta$	69. 19. 38	$\alpha\eta\gamma$	34. 20. 20	$\alpha\gamma$	60291

Methodo capitis praecedentis XXVL.¹⁰)

Jam quia super $\zeta\epsilon$ arcu stant duo anguli ad circumferentiam circuli, scilicet $\zeta\delta\epsilon$, $\zeta\gamma\epsilon$, oportet hos aequales esse (Eucl. III, 21), et ut aequales evadant, tantisper $\alpha\eta$ super α sub zodiaco ante retroque motanda est. Et quia in hac prima positione ipsi $\alpha\eta$ locus sub zodiaco datus est, ergo probetur, an $\zeta\delta\epsilon$, $\zeta\gamma\epsilon$ possint aequales esse: tunc constabit, positionem ipsius $\alpha\eta$ recte habere.

Quatuor igitur triangulorum $\zeta\alpha\delta$, $\delta\alpha\epsilon$, $\epsilon\alpha\gamma$, $\zeta\alpha\gamma$, totidem anguli quaeruntur, nempe . . . $\zeta\delta\alpha$, $\epsilon\delta\alpha$, $\epsilon\gamma\alpha$, $\zeta\gamma\alpha$, ut habeantur . . . $\epsilon\delta\zeta$, $\epsilon\gamma\zeta$.

Atqui in quolibet horum triangulorum dantur anguli ad α per loca Solis ex Tychoe et correctionem per praecessionem aequinoctiorum. Latera vero illum angulum comprehendentia jam modo sunt inventa. Ergo et anguli dabuntur.


Etque $\zeta\alpha\delta$	85° 17' 17"	$\zeta\delta\alpha$	48° 8' 59"	Hinc $\epsilon\delta\zeta$	21° 28' 1"
$\epsilon\alpha\delta$	43. 10. 20	Et inve- nitur $\epsilon\delta\alpha$	69. 37. 0	Hinc $\epsilon\gamma\zeta$	21. 19. 6
$\epsilon\alpha\gamma$	87. 46. 48	$\epsilon\gamma\alpha$	46. 47. 36	} differunt per 9'. 11)	
$\zeta\alpha\gamma$	129. 53. 45	$\zeta\gamma\alpha$	25. 28. 30		

Cum ergo non penitus prodierint aequales hi anguli, secunda positione usus sum, promotam $\alpha\eta$ sub fixis per 2', et inveni $\epsilon\delta\zeta$ 21° 40' 9", $\epsilon\gamma\zeta$ 21° 22' 14", differentes 18', quod est duplum prioris discordantiae: unde intellectum, non promovendam, sed retroagendam $\alpha\eta$ in antecedentia.

Tertio igitur posito Martis eccentrico anno 1585. in 5° 20' 2" \approx prodiiit $\epsilon\delta\zeta$ 21° 15' 54", $\epsilon\gamma\zeta$ 21° 13' 54". Differentia adhuc 2', quam tuto neglexerimus. Proportione tamen usi intelligimus, anticipandum hoc loco Martis eccentricum per 2 $\frac{1}{2}$ ', uti prius capite XXII. in opposito semicirculo per 1' fuit promotus: quorum utrumque fit per auctionem eccentricitatis et nonnullam retractionem aphelii.

Jam pergamus ad inquisitionem reliquorum. Et quia uterque angulorum quaesitorum decrevit, decrescent igitur amplius per retractionem ipsius $\alpha\eta$. Sit ergo uterque 21° 13' et $\zeta\beta\epsilon$ 42° 26' duplus ad centrum. Quare $\zeta\epsilon\beta$ 68° 47'. In $\zeta\alpha\epsilon$ triangulo est angulus $\zeta\alpha\epsilon$ 42° 6' 57" et latera dantur ex nova correctione, ut sit $\alpha\zeta$ 62177, $\alpha\epsilon$ 61525 circiter. Hinc $\zeta\alpha\epsilon$ datur 69° 43' 31" et $\zeta\epsilon$ 44518. Eadem vero $\zeta\epsilon$ ex angulo $\zeta\beta\epsilon$ (cujus $\zeta\epsilon$ subtensa) est 72379, qualium $\epsilon\beta$ 100000. Ergo qualium $\epsilon\beta$ 100000, talium $\alpha\eta$ est 162818, et ideo $\alpha\epsilon$ 100174. Subtracto vero $\zeta\epsilon\beta$ a $\zeta\alpha\epsilon$, relinquitur $\beta\alpha\epsilon$ 0° 56' 31" et $\beta\alpha\epsilon$ 83° 30'. Quare aphelium in 10° 19' ζ , eccentricitas vero $\alpha\beta$ 1653.

Fig. 81.



Rursum admodum propinque dimidium ipsius 3600 attigimus; quod procul dubio plene assequemur, ubi et ipsissimum apogaeum attigerimus.

Sciendum tamen est, si ponamus, viam Terrae non esse plane circulum, sed angustiore ad latera, prodire hic $\alpha\eta$ paulo minorem quam 163100. Et tunc $1\frac{1}{2}'$ ablati a loco eccentrici, et usurpata eccentricitate Terrae 1800, et aphelio $5\frac{1}{2}^\circ$ \mathcal{L} , prodeunt hae visiones:

	$26^\circ 55'$	\mathcal{Q}	$ $	$8^\circ 11\frac{1}{2}'$	\mathcal{M}	$ $	$8^\circ 49'$	\mathcal{M}	$ $	$9^\circ 44\frac{1}{2}'$	\mathcal{M}
Debut	$26. 54\frac{1}{2}'$			$8. 12$			$8. 48$			$9. 46\frac{1}{2}'$	

Consentit haec positio etiam meis observatis anno 1604. d. 29. Febr. vel 10. Martii; quem diem sequente nocte culminantem Martem inveni meis instrumentis in $26^\circ 18\frac{1}{2}'$ \mathcal{M} , et his assumtis calculus ipsum refert in $26^\circ 17\frac{1}{2}'$ \mathcal{M} . Fuit autem h. $8\frac{1}{2}$, paucis horis ante observationem rursum in eodem loco eccentrici.

Ceterum, quia hic Mars obtinet latitudinem, igitur $\alpha\eta$ modo inventa est distantia η puncti in plano eclipticae a centro Solis, in quod punctum perpendicularis ex corpore Martis demittitur, ut supra monitum capite XX. Vera autem ipsius corporis planetae a centro Solis distantia paulo fiet longior per 37 particulas.

Caput XXVIII.

Assumtis non tantum locis Solis sub zodiaco, sed etiam distantis Solis a Terra, per eccentricitatem 1800 exstructis, per aliquam multas observationes Martis in eodem loco eccentrici versantis videre, an unanimi consensu eadem distantia Martis a Sole, idemque locus ejus eccentricus ubique eliciatur; quo argumento comprobatum erit, eccentricitatem Solis 1800 justam esse et recte assumtam.

Ne mirere lector, quod jam tertia vice eccentricum locum Martis non praesuppono, ut is ex hypothesi acronychiarum observationum supra inventa exstruitur. Nam dixi, hypothesin illam esse vicariam tantum, non naturalem; itaque tantam ejus esse fidem, quantum ab observationibus cogitur, et posse locis inter observationes intermediis nonnihil exorbitare. Praeterea expedit nobis, varias habere demonstrationum methodos ad manus, quibus distantias Martis a Sole undique per totum circulum tuto exploremus. Et hic quoque nova forma sequitur.

Observationes hae sunt.

Anno 1583.	22. April.	h. $9\frac{3}{4}$	fuit in	$1^\circ 17'$	\mathcal{Q}	Lat. $1^\circ 50\frac{3}{4}'$ b.
Anno 1585.	9. Mart.	h. $9\frac{1}{6}$	in	$11. 49\frac{1}{10}$	\mathcal{Q}	Lat. $3. 00\frac{1}{10}'$ b.
	11. Mart.	h. 5	in	$11. 45\frac{1}{2}$	\mathcal{Q}	Lat. $3. 24\frac{1}{6}'$ b.
	12. Mart.	h. 5	in	$11. 45\frac{3}{4}$	\mathcal{Q}	Lat. $3. 21\frac{3}{4}'$ b.
Anno 1587.	26. Jan.	h. 5	mane in	$4. 41\frac{1}{4}$	\mathcal{H}	Lat. $3. 26'$ b.
	28. Jan.	h. 5	mane in	$4. 41$	\mathcal{H}	Lat. $3. 27'$ b.
Anno 1588.	5. Dec.	h. $6\frac{1}{3}$	mane in	$9. 23$	\mathcal{H}	Lat. $1. 44\frac{2}{3}'$ b.
	15. Dec.	h. $6\frac{1}{6}$	mane in	$14. 35\frac{1}{6}$	\mathcal{H}	Lat. $1. 54'$ b.
Anno 1590.	31. Oct.	h. $6\frac{1}{4}$	mane in	$2. 57\frac{1}{4}$	\mathcal{H}	Lat. $1. 15\frac{1}{4}'$ b.

Accommodatis reliquarum observationum temporibus, ut restituant Martem in eum locum eccentrici, qui fuit tempore ultimo, prodeunt nobis

haec momenta, quibus adscripta loca Solis requisita, et distantiae Solis et Terrae ex hypothese hactenus stabilita computatae. Sunt autem eae ipsae, ob quas probandas hunc laborem suscipimus. Porro artificium computandi hasce distantias paulo post sequetur cap. XXX.


Distantiae Solis et Terrae.

1583.	23. Apr.	h. 8 $\frac{1}{2}$	a. m.;	♂ in 1° 29 $\frac{1}{2}$	♂	☉ in 12° 10' 3"	♂	101049
1585.	10. Mart.	h. 7 $\frac{1}{2}$	" "	" 11. 48 $\frac{1}{2}$	♂	" 29. 41. 4	♂	99770
1587.	26. Jan.	h. 7 $\frac{1}{2}$	" "	" 4. 41 $\frac{1}{2}$	♂	" 16. 5. 55	♂	98613
1588.	13. Dec.	h. 6 $\frac{1}{2}$	" "	" 13. 35 $\frac{1}{2}$	♂	" 1. 44. 53	♂	98203
1590.	31. Oct.	h. 6 $\frac{1}{2}$	" "	" 2. 57 $\frac{1}{2}$	♂	" 17. 28. 33	♂	98770

Quod observationum deductionem attinet ex diebus observationum ad nostra momenta, primo tempore diurnus ex Magino fuit transsumtus, cum in spatio paucarum horarum non sit periculum erroris. Cetera tempora observationibus ante et post sunt munita. Tempore tamen penultimo inspexi etiam seriem diurnorum in Magino: nam versus 15. Dec. diurnus fuit 30', circa 5. Dec. 32'. Ultimo tempore etsi Mars in altitudine 23° refractionibus est obnoxius, ita ut facile 2' in latitudine desiderari possint (nam Tycho contendit, refractiones fixarum, planetis etiam adhibendas, desinere quidem in hac altitudine, Solares vero altius pertingere esseque in hac altitudine circiter 4', quae distinctio ventilata et conquassata est in Astronomia mea Optica fol. 137 (214) et amplius etiam redderetur dubia, si quid esset in parallaxibus Solis mutandum): tamen haec refractionis parum nocet longitudini Martis.

Sit α corpus Solis, $\alpha\beta$ eccentricitas orbis Terrae 1800, et linea augium in 5 $\frac{1}{2}$ °, loca Terrae ζ , ϵ , δ , γ , θ , et corpus planetae quinquies in η , eodem loco eccentrici, utpote post integras Martis periodos. Et connectantur puncta omnia. Lubet inquirere $\alpha\eta$, ejusque locum sub zodiaco, hoc est angulum $\eta\alpha\theta$, $\eta\alpha\gamma$, vel aliquem alium ad α . Id faciemus ex binis Terrae locis in hunc modum. Sint primum ϵ , δ . Et in triangulo $\epsilon\alpha\delta$ datis lateribus, $\epsilon\alpha$ 99770, $\alpha\delta$ 98613, et angulo $\epsilon\alpha\delta$, quaerantur reliqua, anguli scilicet δ , ϵ , et latus $\delta\epsilon$.

Fig. 82.



	29° 41' 4"	♂
	16. 5. 55	♂
	43. 35. 9	
Præcessio	1. 36	
	43. 36. 45	
Prodeunt $\alpha\delta\epsilon$	69° 1' 41"	$\alpha\epsilon\delta$ 67° 21' 35" et $\delta\epsilon$ 73700.
His investigatis ad triangulum $\epsilon\eta\delta$ ascenditur.		
Cum enim sit	$\epsilon\alpha$ 29° 41' 4" ♂	$\delta\alpha$ 16° 5' 55" ♂
et $\epsilon\eta$	11. 48. 20 ♂	$\delta\eta$ 4. 41. 45 ♂
Erit $\alpha\epsilon\eta$	132. 7. 16	$\alpha\delta\eta$ 131. 24. 10
Sed jam	$\alpha\epsilon$ 67. 21. 35	$\alpha\delta\epsilon$ 69. 1. 41
Ergo restat	$\eta\alpha$ 64. 45. 41	$\eta\delta\epsilon$ 62. 22. 29

Horum residuum ad duos rectos $\epsilon\eta\delta$ 52° 51' 49" (50°).
 Datis ergo angulis ϵ , η , δ , et uno latere $\epsilon\delta$, dabitur et latus $\epsilon\eta$ = 81915.
 Denique et triangulum $\eta\epsilon\alpha$ solvatur, in quo datur $\eta\epsilon$ 81915, $\epsilon\alpha$ 99770 et
 $\epsilon\eta$ ut prius 132° 7' 16". Ergo $\epsilon\alpha\eta$ 21° 26' 32" et $\alpha\eta$ quaerita 166208.

$\varepsilon\alpha\eta$ $21^{\circ} 28' 32''$

Sed $\alpha\varepsilon$ anno 1585 est in $29^{\circ} 41' 4''$ $\overline{\text{mp}}$

Ergo $\alpha\eta$ anno 1585 est in $8. 14. 32$ $\overline{\text{mp}}$.

Quodsi reliquas tres observationes ad ζ, γ, δ hunc eundem locum et longitudinem ipsius $\alpha\eta$ passas fuerint, erimus de iis confirmatissimi.

Quemadmodum igitur hactenus per ε, δ , sic jam operabimur per ζ, γ , quærentes eandem $\alpha\eta$.

Pro ζ, γ angulis et linea $\zeta\gamma$: $\alpha\zeta$ 101049, $\alpha\gamma$ 98203; $12^{\circ} 10' 3''$ $\overline{\delta}$

1. 44. 53 $\overline{\delta}$

130. 25. 10

Præcessio 4. 48

130. 29. 58

Prodit $\alpha\gamma\zeta$ $25^{\circ} 7' 49''$, $\alpha\zeta\gamma$ $24^{\circ} 22' 13''$ et $\zeta\gamma$ 180933.

Et jam in $\zeta\gamma\eta$.

Quia est $\zeta\eta$	$1^{\circ} 29\frac{1}{2}'$	$\overline{\delta}$	$\gamma\eta$ $13^{\circ} 35' 40''$	$\overline{\text{mp}}$
et $\zeta\alpha$	12. 10. 3	$\overline{\delta}$	$\gamma\alpha$ 1. 44. 53	$\overline{\delta}$
Ergo $\eta\zeta\alpha$	79. 19. 27		$\eta\gamma\alpha$ 78. 9. 13	
Sed $\gamma\zeta\alpha$	24. 22. 13		$\zeta\gamma\alpha$ 25. 7. 49	
Ergo $\eta\zeta\gamma$	54. 57. 14		$\eta\gamma\zeta$ 53. 1. 24 et horum residuum	
ad duos rectos $\gamma\eta\zeta$	$72^{\circ} 1' 22''$			

Idem etiam hinc elicitur: est $\zeta\eta$ in $1^{\circ} 29\frac{1}{2}'$ $\overline{\delta}$
et $\gamma\eta$ in 13. 35. 40 $\overline{\text{mp}}$

Et subtracta præcessione temporis intermedii in 13. 30. 52 $\overline{\text{mp}}$

Ergo $\gamma\eta\zeta$ 72. 1. 22.

Datis igitur angulis trianguli $\zeta\eta\gamma$ et latere $\zeta\gamma$, quaeritur latus $\zeta\eta$; prodit 151960.

Denique in triangulo $\eta\zeta\alpha$ dantur latera et angulus comprehensus:

$\zeta\eta$ 151960, $\zeta\alpha$ 101049 $\eta\zeta\alpha$ $79^{\circ} 19' 27''$

Prodit $\zeta\alpha\eta$. . . $63^{\circ} 58'$

Sed est $\alpha\zeta$ in . . . 12. 10. 3'' $\overline{\delta}$ anno 83

Ergo $\alpha\eta$ in . . . 8. 11. 31 anno 83

Præcessio . . . 1. 36

Quod esset in . . . 8. 13. 8 anno 85

Prius in . . . 8. 14. 32 anno 85

Differentia . . . 1. 24.

$\alpha\eta$ prodit . . . 166179

Prius . . . 166208

Differentia . . . 29.

Apparet itaque, nos per duas alias observationes in ζ et γ eodem venire intra sensus subtilitatem. Nam sesquiscrupuli error in observando, aut deducendo loco observato ad diem non observatum, committi potest.

Sed videamus etiam testimonium loci δ quinti, hoc est observationis in δ .

Scimus $\delta\alpha$ esse in $17^{\circ} 28' 33''$ $\overline{\text{mp}}$ et $\delta\alpha$ ponimus 98770.

Et $\delta\eta$ in . . . 2. 57. 20 $\overline{\text{mp}}$ observata est,

ergo angulus $\alpha\delta\eta$ $44^{\circ} 31' 13''$. Huic angulo quo longiorem $\alpha\eta$ subtendero, hoc longius ipsam $\alpha\eta$ in consequentia promovebo et contra.

Sit igitur $\alpha\eta$ 166208, ut initio est inventa.

Ut igitur $\alpha\eta$ ad $\alpha\delta\eta$, sic $\alpha\delta$ ad $\alpha\eta\delta$.

Prodit $\alpha\eta\delta$. . . $24^{\circ} 37' 28''$

Sed $\delta\eta$ vergit in 2. 57. 20 $\overline{\text{mp}}$ anno 90

Ergo $\alpha\eta$ in . . . 8. 19. 52 $\overline{\text{mp}}$ anno 90

Præcessio . . . 4. 48

Ita est in . . . 8. 15. 4 $\overline{\text{mp}}$ anno 85

Quod fuit primo . . . 8. 14. 32

Differentia . . . $0^{\circ} 32'$

Itaque per tenuissimam curtationem ipsius $\alpha\eta$ cadet $\alpha\eta$ plane eodem cum primis duabus observationibus.¹⁹⁾

Itaque hinc apparet, distantias $\alpha\zeta, \alpha\varepsilon, \alpha\delta, \alpha\gamma, \alpha\theta$, et proinde eccentricitatem $\alpha\beta$ a nobis recte susceptam et positam. Impossibile est enim, aliis susceptis distantijs hinc (ut tamen etiam in circulum quam proxime quadrent, et in suis debitis locis sub zodiaco fuerint) ex omnibus quinque observationibus unam et eandem dari $\alpha\eta$ ejusque locum sub zodiaco. Cre-

demus autem de longitudine ipsius $\alpha\eta$ potissimum observationibus ζ, γ, θ , nam etiam in vulgari ratione mensurandi distantias rerum in Terra, quo longius distiterint a se mutuo stationes, hoc certius habetur signi remotio. In loco vero sub zodiaco credemus potius observatis in ϵ, δ , quia si quis est errorculus in longitudine $\alpha\eta$, is visui in ϵ, δ admodum oblique objicitur nec angulum evidenter mutat.

Nec illud obliviscendum, ipsam $\alpha\eta$ intra spatium annorum 7, ab anno scilicet 1583 in 1590, nihil prolongari sensibilibiter ob aphelii progressum tardissimum.

Summa. Anno 1590 d. 31. Oct. h. $6\frac{1}{4}$ mane Mars motu eccentrico fuit in $8^{\circ} 19' 20''$ η , cum reponatur per hypothesin ex acronychiis constitutam in $8^{\circ} 19' 29''$ η . Distantia ejus 166180, quae prolonganda est ob latitudinem, ut fiat ex ea ipsius corporis Martis a centro Solis distantia 166228 circiter.

Caput XXIX.


Methodus exstruendi distantias Solis et Terrae ex cognitione eccentricitatis.

Satis opinor confirmatum est, distantias Solis et Terrae exstruendas ex dimidiatione eccentricitatis a Tychone repertae, quod etiam ex diametri Solis aestiva et hiberna observatione crebro confirmatur, ut in Optica Astronomiae parte ostendi capite XI. Sed et Mystero Cosmographico mirifice confirmatur cap. XV. fol. 53 (L. 157) in laterculo, ubi prosthaphaereses Martis, Veneris, Mercurii interposito Lunaris orbis deficiebant, omissione ejus excedebant. Jam igitur retento orbe Lunae, bisecta vero eccentricitate Solis, quam proxime justae provenient.

Atque idem porro saepius multoque clarissime confirmabitur, ubi usurpatione harum distantiarum ex bisectione prodeuntium (ut jam proximo capite coeptum) viderimus phaenomena sequi. Quare ut hae distantiae ad futuros usus nobis in promptu sint, docebo, quomodo facile computari possint, geometrica demonstratione usus.

In linea $\alpha\delta$ (Fig. 83) sit α corpus Solis (vel Terrae Tychoni, vel centrum affixionis epicycli Ptolemaeo): β centrum $\zeta\delta\eta$ eccentrici Terrae (vel Solis et orbis annui Tychoni, vel epicycli Ptolemaeo): et continuata $\alpha\beta$ secet eccentricum in δ, ϵ , sic ut δ sit aphelium vel apogaenum, ϵ perihelium seu perigaeum: et fiat ipsi $\alpha\beta$ aequalis $\beta\gamma$, sitque γ centrum motus seu aequalitatis, apud quod Terra (in Ptolemaeo centrum epicycli, in Tychone Sol et punctum affixionis eccentricorum omnium) aequalibus temporibus aequales angulos constituit. Sitque $\alpha\gamma$ ex observatis Tychonis et Landgravi 3600: $\alpha\beta$ vero secundum meam mutationem hactenus demonstratam sit 1800. Agatur autem per α ipsi $\delta\epsilon$ perpendicularis $\zeta\eta$, secans circulum in ζ, η ; per idem vero α ducatur recta $\theta\iota$, quomodocunque inclinata, secans circumferentiam in θ, ι ; et connectantur quatuor puncta $\theta, \iota, \zeta, \eta$ cum centro β . Sit autem et hoc initio positum, etsi Terra (vel planeta) aequaliter movetur circa γ ideoque inaequaliter circa β , tamen manere illam in circuli ex β descripti circumferentia. Per aequipollentiam autem capite II.

Fig. 83.



demonstratam (quod ad vitandam confusionem Ptolemaicae hypothesi generali non applicabo) hoc idem est ac si dicas: Terram (vel Solem) moveri inaequaliter in $\delta\mu\kappa\epsilon\tau\epsilon\rho\epsilon\mu\chi\upsilon\lambda\phi$, centro α , epicycli semidiametro aequali ipsi $\alpha\beta$; et arcus concentrici a centro epicycli descriptos similes esse arcibus epicycli a Terra (vel Sole) descriptis, ut et Terra (vel Sol) et centrum epicycli moveantur inaequaliter aequalibus temporibus, et sic simul fiant tardi, simul iterum veloces. Physicam autem hujus hypotheseos explicationem paulo differam.

Nunc his positis ad distantiarum opus accedam. Et quia $\beta\delta$ 100000,

et $\beta\alpha$ 1800, et $\alpha\beta\delta$ recta, per additionem igitur utriusque habetur $\alpha\delta$ distantia aphelia: et quia etiam $\beta\epsilon$ 100000, subtracta igitur $\alpha\beta$, restat $\alpha\epsilon$ perihelia.

Et quia $\beta\alpha\zeta$ rectus et $\zeta\beta$ 100000, hoc est sinus totus, ergo $\alpha\beta$ est sinus anguli $\alpha\zeta\beta$, igitur $\alpha\zeta\beta$ est $1^\circ 1' 53''$ nempe pars aequationis Solis vel Terrae optica. Nam aequatio quidem maxima mediarum longitudinum, quae ex parte optica et physica componitur, eccentricitatem totam 3600 (seu 3592) pro sinu habet: ita ut Sol vel Terra ex δ in ζ veniens, duos quidem dies adjecerit quartae parti temporis periodici, sed tamen unius solius diei iter supra quartam partem totius circuitus confecerit, atque ita hoc spatio, vel quadrante temporis periodici, ex debilitatione physica unum diem diutius debito insumserit.

Sed ad distantiam $\alpha\zeta$. In triangulo igitur $\zeta\alpha\beta$ rectangulo, altero acutorum dato, alter $\zeta\beta\alpha$ erit residuum ad quantitatem unius recti, nempe $88^\circ 58' 7''$. Et propterea $\alpha\zeta$ erit sinus hujus anguli, scilicet 99984: et tanta etiam est $\alpha\eta$ opposita.

Pro intermediis distantiiis duorum oppositorum graduum anomaliae coaequatae inveniendis inspicatur $\theta\iota$, transiens per corpus α , unde computatur eccentricitas. Nam $\delta\alpha\theta$ et $\delta\alpha\iota$ sunt anomaliae coaequatae et oppositae, utpote α interposito in eadem recta. Cadat autem ex β perpendicularis in $\theta\iota$, quae sit $\beta\kappa$, ita ut sint aequales $\theta\kappa$, $\kappa\iota$. In triangulo igitur $\beta\kappa\epsilon$ rectangulo datur basis $\beta\alpha$, et angulus $\kappa\alpha\beta$ ex numero graduum integrorum, anomaliae coaequatae suscepto, et $\kappa\beta\alpha$ complementum ejus ad quadrantem: non erunt igitur incognita latera $\kappa\alpha$, $\kappa\beta$. Est autem $\kappa\beta$ sinus anguli $\kappa\theta\beta$ vel $\kappa\iota\beta$, quo dato noscetur etiam $\theta\beta\kappa$ vel $\iota\beta\kappa$ complementum illius ad quadrantem, ejusque sinus, nempe linea $\theta\kappa$ vel $\kappa\iota$. Apposita igitur $\kappa\epsilon$ ad $\kappa\theta$, habetur $\alpha\theta$; eadem ablata a $\iota\kappa$, habetur $\alpha\iota$, illa distantia ad anomaliam coaequatam $\delta\alpha\theta$, haec ad coaequatam $\delta\alpha\iota$, quae habet sibi aequalem etiam in priori semicirculo; sic ut illa tantum distet ab aphelio in semicirculo $\delta\theta$, quantum haec in semicirculo $\delta\eta$.

Jam per α agatur recta $\mu\tau$, secans circulum in μ , τ , et faciens angulum $\mu\alpha\delta$ aequalem angulo $\kappa\beta\alpha$, et ex β in $\mu\tau$ descendat perpendicularis $\beta\lambda$,

bisecans $\mu\tau$ in λ ; et connectantur μ, τ cum β . Cum ergo $\kappa\alpha\beta$ sit graduum integrorum angulus, erit et residuus $\kappa\beta\alpha$, eique aequalis $\mu\alpha\delta$ integrorum graduum, et in triangulis $\beta\kappa\alpha$, $\beta\lambda\alpha$ similibus aequale erit latus $\kappa\alpha$ lateri $\lambda\beta$, et $\kappa\beta$ ipsi $\lambda\alpha$. Est autem $\lambda\beta$ sinus anguli $\lambda\mu\beta$, $\lambda\tau\beta$; et ipsius $\lambda\mu\beta$ complementum est $\lambda\beta\mu$, $\lambda\beta\tau$; ejusque sinus linea $\lambda\mu$, $\lambda\tau$; et ipsarum $\alpha\mu$, $\alpha\tau$ differentia $\lambda\alpha$. Atqui quantitates $\lambda\alpha$, $\lambda\beta$ jam inventae sunt in triangulo $\alpha\beta\kappa$. Ergo unius trianguli ope quatuor inveniri possunt distantiae aequalibus angulis ad α , remota a linea apsidum ejusque perpendiculari $\zeta\eta$ per α ducta: est enim $\mu\alpha\zeta$ aequalis ipsi $\theta\alpha\delta$ et $\tau\alpha\eta$ ipsi $\iota\alpha\epsilon$. Est itaque longissima distantia in δ , brevissima in ϵ , mediocris vero et aequalis ipsi $\beta\zeta$, non in $\zeta\eta$; sed neque in linea per β , ipsi $\zeta\alpha$ parallelo, quae sit $\xi\alpha$. Nam $\alpha\zeta$ minor est quam $\beta\zeta$, eo quod minori $\zeta\beta\alpha$ subtendatur quam est $\zeta\alpha\beta$, utpote rectus; et $\alpha\xi$ ducta longior est quam $\beta\xi$, eo quod majori $\xi\beta\alpha$ (utpote recto) subtendatur, $\xi\beta$ vero minori $\xi\alpha\beta$.

Ut autem distantiae mediae locus geometricae designetur, bisecetur $\alpha\beta$ signo σ , perque hoc perpendicularis ipsi $\alpha\beta$ agatur $\pi\rho$, secans circulum in π, ρ . Dico haec esse signa aequaliter ab α et a β distantia. Connectatur enim alterum signorum π cum α et cum β , erunt $\pi\alpha$, $\pi\beta$ aequalibus (utpote rectis) angulis $\pi\sigma\alpha$, $\pi\sigma\beta$ subtensae, et $\alpha\sigma$, $\sigma\beta$ aequales, et $\pi\sigma$ communis. Ergo $\pi\alpha$, $\pi\beta$ aequales. Et sic Reinholdo usurpata demonstratio de tota $\alpha\gamma$ et ejus medio puncto β , vera manet de puncto σ et dimidia $\alpha\beta$.

Possit igitur aliquis cogitare, cum in π distantia $\alpha\pi$ fiat aequalis ipsi $\beta\pi$ semidiametro, angulum etiam $\beta\pi\alpha$ majorem esse ipso $\beta\zeta\alpha$, et sic maximam aequationem in π contingere: argumento usus, quod recta $\beta\alpha$ ipsi π directius objiciatur quam ipsi ζ . Atqui verum non est, quod erat propositum. Nam quanto obliquius $\beta\alpha$ respicit ζ , tanto longius vicissim distat π quam ζ , cum $\pi\sigma$ sit longior quam $\zeta\alpha$, major enim $\pi\beta\sigma$ quam $\zeta\beta\alpha$, cui $\zeta\alpha$ subtenditur.

Demonstravit igitur recte Ptolemaeus et ex eo Reinholdus in Theoricis, maximam aequationem (eccentri quidem solitariam seu opticam) contingere in ζ . Eam tamen demonstrationem in forma alia faciliori hic proponam. Sit signum quaecunque supra ζ , utpote θ , et quaecunque infra η vel ζ , utpote ι , et connectantur cum α ; et ex β perpendiculares cadant in $\theta\alpha$ vel $\iota\alpha$ continuatam, quae sint $\beta\kappa$. Quia igitur aequales sunt $\delta\alpha\zeta$ et $\beta\kappa\alpha$ utpote recti, et $\kappa\beta\alpha$, $\kappa\alpha\beta$ juncti aequales uni recto, eodem igitur $\delta\alpha\theta$ vel $\beta\alpha\kappa$ ab aequalibus ablato, relinquentur $\theta\alpha\zeta$, $\kappa\beta\alpha$ aequales. Et primum atque supra punctum ζ ducitur aliqua per α , ut jam $\theta\alpha$, seu proximum sit θ ipsi ζ seu remotum, simul etiam a $\beta\alpha$ declinat illius perpendicularis $\beta\kappa$. Major autem est $\beta\alpha$ quam ulla perpendicularium $\beta\kappa$, cum $\beta\alpha$ subtendatur $\beta\kappa\alpha$ recto, $\beta\kappa$ vero acuto $\beta\alpha\kappa$ et minori. Cum autem $\beta\zeta$, $\beta\theta$, $\beta\iota$ sint aequales, et $\beta\alpha\zeta$, $\beta\alpha\theta$, $\beta\alpha\iota$ recti; quadrant igitur in eundem semicirculum, cujus diameter est aequalis ipsis $\beta\zeta$, $\beta\theta$, $\beta\iota$. Itaque $\beta\alpha$ (ut longior) majorem circumferentiam hujuscemodi alicujus semicirculi subtendit quam $\beta\kappa$ aut quaecunque perpendicularium; et proinde major erit ejus angulus $\beta\zeta\alpha$ quam $\beta\theta\alpha$ aut cujuscunque puncti alterius supra ζ , utpote π vel ξ , angulus prosthaphaereseos. Quod erat demonstrandum.

Quae hoc capite de computandis distantibus Solis et Terrae sunt dicta, valebunt etiam in Marte, quantisper erit in suppositis, planetarum orbitas esse circulos perfectos. Quo falso deprehenso, alia methodus tradetur eas computandi.

Caput XXX.

Tabula distantiae Solis a Terra ejusque usus.

In hunc modum exstructas distantias Solis tanquam ad integros gradus anomaliae coaequatae totius semicirculi (nam quae in altero semicirculo sunt, aequaliter ab apogaeo distantes cum his, aequales quoque sunt his) coniecimus hic in tabellam, cujus columnae tres sunt. In prima, quam diximus anomaliam mediam, sunt anguli $\delta\beta\mu$, $\delta\beta\theta$, $\delta\beta\xi$, $\delta\beta\iota$, $\delta\beta\gamma$, compositi ex $\delta\alpha\mu$, $\delta\alpha\theta$, $\delta\alpha\xi$, $\delta\alpha\iota$, $\delta\alpha\gamma$ integrorum graduum angulis, et ex eorum aequationibus opticis seu eccentrici, puta $\beta\mu\alpha$, $\beta\theta\alpha$, $\beta\xi\alpha$, $\beta\iota\alpha$, $\beta\gamma\alpha$. In secunda distantiae ipsae $\alpha\mu$, $\alpha\theta$, $\alpha\xi$, $\alpha\iota$, $\alpha\gamma$ collocantur e regione. In tertia sub titulo anomaliae coaequatae collocantur anguli hic non depicti, sed quorum originis ratio partim jam statim, partim capitibus XXXI. XL. detegitur. Existunt autem per subtractionem aequationum opticarum $\alpha\mu\beta$ etc. a $\delta\alpha\mu$ etc. Itaque ipsis $\delta\alpha\mu$ angulis integrorum graduum nullam dedimus columnam, quia sunt medium arithmeticum inter columnarum lateralium angulos et sic se ipsis facile intelliguntur, nec usui sunt, ut audiemus.

Ingressus ergo cum anomalia media vel coaequata, prout usus feret, utralibet in sua propria columna quaesita, vel cum alterutrius complemento ad integrum circulum, ubi semicirculum ipsa excesserit, invenies distantiam Solis a Terra quaesitam, in partibus qualium radius orbis est 100000 et eccentricitas 1800.

Verum est, quod hoc pacto (dum distantiam $\alpha\zeta$ anguli $\delta\alpha\zeta$ tribuimus angulo, qui tanto est minor ipso $\delta\alpha\zeta$, quanto $\delta\alpha\zeta$ minor est quam $\delta\beta\zeta$) affingitur circuitui Terrae (vel Solis) circa α via non plane circularis sed ovalis. Nam quia (exempli gratia) distantia $\alpha\zeta$ exstructa est per angulum $\delta\alpha\zeta$ 90° integrorum, et positum fuit in operatione, hunc $\delta\alpha\zeta$ esse anomaliam coaequatam, jam vero juberis distantias excerpere per angulos anomaliae, quae in nostra tabula coaequata dicitur, diminutos prosthaphaeresi $\beta\alpha\zeta$, ideoque accidit, ut per 90 non excerpas 99984, cum tamen prius per 90 extruxeris 99984: nam hic jam e regione 99984 invenis coaequatam $88^\circ 58' 7''$, quae non est tua: proposita est namque tibi 90° , quae inferius quaesita exhibet 99953, cum ex lege circuli $\alpha\zeta$ vel $\alpha\eta$ debuerit esse 99984. Itaque omnes distantiae minuuntur ad latera, maxime circa ζ , η , nihil in δ , ϵ . Quo pacto plane ovalis pro circulari via substituitur. Idem tibi eveniet, si per anomaliam mediam tibi aliunde oblatam fueris ingressus. Nam anomalia media notavit supra, cum schema describeretur, angulos apud γ . Jam autem ingrederis per angulos apud β , minores illis ad γ prosthaphaeresi optica. Et $91^\circ 1' 53''$ anomaliae mediae exhibet tibi 99984. Supra vero tantus erat $\delta\beta\zeta$, neque tamen ibi erat anomalia media, nam illa fuerat $\delta\gamma\zeta$ adhuc major: itaque $91^\circ 1' 53''$ anomalia illa media construxerat illic longiorem distantiam, quam ejusdem hic magnitudinis anomalia media $91^\circ 1' 53''$ hic exhibet. Totum, inquam, hoc verum est. Sed nihil est, cur te impediri patiaris. Etenim, quia de unius gradus differentia agitur, vides distantias intra unum gradum non plus 31 particulis de centum millibus variari: itaque nihil sensibile erraretur, etsi hoc praepostere fieret. Causam autem hujus rei, analogia ceterorum planetarum etiam in theoriam Solis deducendam, infra cap. XLIV. et seq. invenies. Non itaque praepostere, sed rectissime hoc fit, quod qualitatem attinet figurae quam planeta describit suppositae.

Quod vero quantitatem attinet, excedit medicina modum. Nam anomalia coaequata $88^{\circ} 58' 7''$, cui media respondet $91^{\circ} 1' 53''$, non debuit exhibere 99984, sed 100000, quod est medium inter schematis et inter tabulae distantias. Causa hujus affirmati differenda est in cap. LV. et sequentia.

Dictum autem jam est, nos nihil sensibile aberraturos, si 31 particulis aberremus; multo minus igitur nocebit nobis ad sensum, si solum dimidio, nempe particulis 16 erremus. Itaque interim hunc errorculum tuto admitimus, ut nos ad captum ejus, qui hucusque legendo provectus est, accomodemus, neque praesupponere videamur, quod erat demonstrandum.

Anomalia media.	Distantia.	Anomalia coaequata.	Anomalia media.	Distantia.	Anomalia coaequata.
$0^{\circ} 0' 0''$	101800	$0^{\circ} 0' 0''$	$45^{\circ} 43' 45''$	101265	$44^{\circ} 16' 15''$
1. 1. 5	101800	0. 58. 55	46. 44. 30	101242	45. 15. 30
2. 2. 10	101799	1. 57. 50	47. 45. 15	101219	46. 14. 45
3. 3. 14	101797	2. 56. 46	48. 45. 59	101195	47. 14. 1
4. 4. 8	101795	3. 55. 42	49. 46. 42	101172	48. 13. 18
5. 5. 23	101793	4. 54. 37	50. 47. 24	101147	49. 12. 36
6. 6. 27	101790	5. 53. 33	51. 48. 5	101123	50. 11. 55
7. 7. 31	101786	6. 52. 29	52. 48. 46	101098	51. 11. 14
8. 8. 36	101782	7. 51. 24	53. 49. 25	101073	52. 10. 35
9. 9. 40	101777	8. 50. 20	54. 50. 3	101047	53. 9. 56
10. 10. 44	101772	9. 49. 16	55. 50. 41	101022	54. 9. 19
11. 11. 48	101768	10. 48. 12	56. 51. 18	100995	55. 8. 42
12. 12. 52	101760	11. 47. 8	57. 51. 54	100969	56. 8. 6
13. 13. 55	101753	12. 46. 5	58. 52. 29	100942	57. 7. 31
14. 14. 58	101746	13. 45. 2	59. 53. 3	100925	58. 6. 57
15. 16. 1	101738	14. 43. 59	60. 53. 35	100888	59. 6. 25
16. 17. 3	101729	15. 42. 57	61. 54. 7	100860	60. 5. 53
17. 18. 6	101720	16. 41. 54	62. 54. 38	100832	61. 5. 22
18. 19. 8	101710	17. 40. 52	63. 55. 8	100804	62. 4. 52
19. 20. 9	101700	18. 39. 51	64. 55. 37	100776	63. 4. 23
20. 21. 10	101689	19. 38. 50	65. 56. 5	100747	64. 3. 55
21. 22. 11	101678	20. 37. 49	66. 56. 32	100719	65. 3. 28
22. 23. 11	101666	21. 36. 49	67. 56. 58	100690	66. 3. 2
23. 24. 11	101654	22. 35. 49	68. 57. 22	100660	67. 2. 38
24. 25. 10	101642	23. 34. 50	69. 57. 46	100631	68. 2. 14
25. 26. 9	101628	24. 33. 51	70. 58. 9	100601	69. 1. 51
26. 27. 8	101615	25. 32. 52	71. 58. 30	100571	70. 1. 30
27. 28. 6	101600	26. 31. 54	72. 58. 51	100542	71. 1. 9
28. 29. 3	101586	27. 30. 57	73. 59. 11	100511	72. 0. 49
29. 30. 0	101570	28. 30. 0	74. 59. 19	100481	73. 0. 31
30. 30. 56	101555	29. 29. 4	75. 59. 46	100451	74. 0. 14
31. 31. 52	101539	30. 28. 8	77. 0. 2	100420	74. 59. 58
32. 32. 47	101522	31. 27. 13	78. 0. 18	100389	75. 59. 42
33. 33. 42	101505	32. 26. 18	79. 0. 37	100359	76. 59. 28
34. 34. 36	101487	33. 25. 24	80. 0. 45	100328	77. 59. 15
35. 35. 29	101469	34. 24. 31	81. 0. 57	100297	78. 59. 3
36. 36. 22	101451	35. 23. 43	82. 1. 7	100266	79. 58. 53
37. 37. 14	101432	36. 22. 46	83. 1. 16	100235	80. 58. 44
38. 38. 6	101412	37. 21. 54	84. 1. 25	100203	81. 58. 36
39. 38. 57	101392	38. 21. 3	85. 1. 32	100172	82. 58. 28
40. 39. 47	101372	39. 20. 13	86. 1. 38	100141	83. 58. 22
41. 40. 36	101351	40. 19. 24	87. 1. 43	100109	84. 58. 17
42. 41. 24	101330	41. 18. 36	88. 1. 46	100078	85. 58. 14
43. 42. 12	101308	42. 17. 48	89. 1. 49	100047	86. 58. 11
44. 42. 59	101287	43. 17. 1	90. 1. 51	100015	87. 58. 9

Anomalia media.	Distantia.	Anomalia coaequata.	Anomalia media.	Distantia.	Anomalia coaequata.
91° 1' 53"	99984	88° 58' 7"	136° 42' 59"	98698	135° 17' 1"
92. 1. 51	99952	89. 58. 9	137. 42. 12	98676	136. 17. 48
93. 1. 49	99921	90. 58. 11	138. 41. 24	98655	137. 18. 36
94. 1. 46	99890	91. 58. 14	139. 40. 36	98634	138. 19. 24
95. 1. 43	99858	92. 58. 17	140. 39. 47	98614	139. 20. 24
96. 1. 38	99827	93. 58. 22	141. 38. 57	98595	140. 21. 3
97. 1. 32	99796	94. 58. 28	142. 38. 6	98575	141. 21. 54
98. 1. 25	99765	95. 58. 35	143. 37. 14	98557	142. 22. 46
99. 1. 16	99734	96. 58. 44	144. 36. 22	98538	143. 23. 38
100. 1. 7	99703	97. 58. 53	145. 35. 30	98520	144. 24. 30
101. 0. 57	99672	98. 59. 3	146. 34. 36	98503	145. 25. 24
102. 0. 45	99641	99. 59. 15	147. 33. 42	98486	146. 26. 18
103. 0. 31	99610	100. 59. 29	148. 32. 47	98469	147. 27. 13
104. 0. 18	99580	101. 59. 42	149. 31. 52	98453	148. 28. 8
105. 0. 2	99549	102. 59. 58	150. 30. 56	98437	149. 29. 4
105. 59. 46	99519	104. 0. 14	151. 30. 0	98422	150. 30. 0
106. 59. 29	99489	105. 0. 31	152. 29. 3	98407	151. 30. 57
107. 59. 11	99459	106. 1. 29	153. 28. 6	98393	152. 31. 54
108. 58. 51	99429	107. 1. 9	154. 27. 8	98379	153. 32. 52
109. 58. 31	99399	108. 1. 29	155. 26. 9	98366	154. 33. 51
110. 58. 9	99370	109. 1. 51	156. 25. 10	98353	155. 34. 50
111. 57. 46	99341	110. 2. 14	157. 24. 11	98341	156. 35. 49
112. 57. 23	99312	111. 2. 37	158. 23. 11	98329	157. 36. 49
113. 56. 18	99283	112. 3. 2	159. 22. 11	98317	158. 37. 49
114. 56. 32	99254	113. 3. 25	160. 21. 10	98307	159. 38. 50
115. 56. 5	99226	114. 3. 55	161. 20. 9	98296	160. 39. 51
116. 55. 37	99198	115. 4. 23	162. 19. 8	98286	161. 40. 52
117. 55. 8	99170	116. 4. 52	163. 18. 6	98277	162. 41. 54
118. 54. 38	99142	117. 5. 22	164. 17. 3	98268	163. 42. 57
119. 54. 7	99115	118. 5. 53	165. 16. 1	98260	164. 43. 59
120. 53. 35	99088	119. 6. 25	166. 14. 58	98252	165. 45. 2
121. 53. 3	99061	120. 6. 57	167. 13. 55	98245	166. 46. 5
122. 52. 29	99035	121. 7. 31	168. 12. 52	98239	167. 47. 8
123. 51. 54	99008	122. 8. 6	169. 11. 48	98232	168. 48. 12
124. 51. 18	98982	123. 8. 42	170. 10. 44	98227	169. 49. 16
125. 50. 41	98957	124. 9. 19	171. 9. 40	98222	170. 50. 20
126. 50. 4	98931	125. 9. 56	172. 8. 36	98217	171. 51. 24
127. 49. 25	98906	126. 10. 35	173. 7. 31	98213	172. 52. 29
128. 48. 46	98882	127. 11. 14	174. 6. 27	98210	173. 53. 33
129. 48. 5	98857	128. 11. 55	175. 5. 23	98207	174. 54. 37
130. 47. 25	98833	129. 12. 35	176. 4. 18	98204	175. 55. 42
131. 46. 42	98810	130. 13. 18	177. 3. 14	98202	176. 56. 46
132. 45. 59	98787	131. 14. 1	178. 2. 10	98201	177. 57. 50
133. 45. 15	98764	132. 14. 45	179. 1. 5	98200	178. 58. 55
134. 44. 31	98741	133. 15. 29	180. 0. 0	98200	180. 0. 0
135. 43. 45	98719	134. 16. 15			

Caput XXXI.


Per bisectionem eccentricitatis Solis non turbari sensibilibus aequationes Solis a Tychoe expositas: et de quatuor modis eas computandi.

Sed ne qua nobis obstat suspicio ad sequentia pergentibus, in usitata et Ptolemaica forma primae*) inaequalitatis explorabimus, an aliqua in Sole diversitas aequationum contingat bisecta jam eccentricitate.

*) In sequentibus capitibus orietur confusio apud lectorem incautum; motus Solis (Braheo) vel Terrae (Copernico) vel epicycli (Ptolemaeo), qui planetis ceteris causa est inaequalitatis secundae, ipse etiam participat inaequalitate prima.

Sit primum integra eccentricitas 3600 in AF linea apsidum, et propterea CE, CD radii orbis: et sit FAE anomalia 45° et FAD 135° . Perspicuum autem est, quantacunque sit discrepantia, fore circa haec anomaliae loca maximam. Nam in longitudinibus mediis plane eadem proveniunt aequationes, cum 3600 tam in sinibus quam in tangentibus quaesita eundem arcum exhibeat. Ut ergo CE radius ad anguli CAE vel CAD sinum, sic CA eccentricitas ad CEA vel CDA aequationem, quae est utrinque $1^\circ 27' 31''$. Atque hoc primo modo computavit Ptolemaeus aequationes Solis, et ex Ptolemaeo Copernicus, ex iis Braheus; quilibet usus eccentricitate AC tanta, quantam inveniebat ex suis observationibus.

Fig. 84.



Sequitur jam secundus modus computandi easdem aequationes, quo Ptolemaeus est usus in planetis ceteris, et quo utendum est mihi, qui hac parte tertia demonstravi, centrum eccentrici non esse in C puncto aequalitatis motus, sed in B loco inter A centrum mundi et C aequalitatis punctum intermedio.

Bisecetur igitur CA in B, et sit EB, BD radius orbis, eritque eadem methodo pars aequationis BEA, BDA $0^\circ 43' 46''$, qui additus ad EAB, DAB, constituet BEC $45^\circ 43' 46''$, DBC $135^\circ 43' 46''$. Quare ex lateribus et comprehenso prodit BEC $43' 38''$, BDC $43' 42''$, et sic totus CEA $1^\circ 27' 24''$, CDA $1^\circ 27' 28''$ ad unguem idem cum priori. Itaque in Progymnasmatum Tychonis Braheii appendice pag. 821, ubi calculi utriusque differentia proditur $1\frac{1}{6}''$ lege $0\frac{1}{6}''$). Atque haec secundum doctrinam cap. IV. ex hypothesis vicariae forma.

Cumque videas, quam pene sint aequales aequationis partes in hac Ptolemaica hypotheseos particularis forma (pars enim optica fuit $43' 46''$, pars physica in E $43' 38''$, in D $43' 42''$): hinc tibi causa patet, cur praecedenti capite in constructione tabulae nihil aliud quam prosthaphaeresin duplicaverim pro tota prosthaphaeresi constituenda, qui tertius modus est computandi prosthaphaereses Solis. Nam in apogaeo et perigaeo utraque pars aequationis evanescit: in mediis longitudinibus iterum aequales sunt partes, ut jam modo dictum. Ergo cum in locis octo per totum circulum dispositis plane coincidunt tres hae rationes computandi aequationes, ubique ad sensum incident. Hoc praestat eccentricitatis exilitas: quae si major esset, locum sane ista non haberent per omnia.

Nunc ad quartum etiam modum aequationis, non per fictam hypothesin, sed ex ipsa rerum natura computandae, me praeparabo capitibus octo, ut quadragesimo tandem modus hic quartus sequi possit.

Caput XXXII.

Virtutem, quae planetam movet in circulum, attenuari cum discessu a fonte.

Dixi supra, Ptolemaeum observationibus edoctum bisecuisse trium superiorum eccentricitates, idque Copernicum imitatum; idem etiam suadere Tychonis observationes in Marte, quod capitibus XIX, XX. apparuit

Atqui ego dico, $v\chi$ sic delineatum arcum temporis, ut voluit Ptolemaeus, esse quam proxime ad $\delta\psi$ arcum itineris, ut est $\alpha\delta$ distantia arcus $\delta\psi$ a centro mundi, ad $\delta\beta$ distantiam mediocrem punctorum π, ρ ab α , et similiter arcum temporis $\phi\tau$ esse ad arcum itineris $\epsilon\omega$ quam proxime, ut est $\alpha\epsilon$ distantia arcus $\epsilon\omega$ a centro mundi α ad $\epsilon\beta$ distantiam a centro mundi mediocrem, quae potest contingere in π, ρ signis. Est enim ut prius, ut $\gamma\nu$ ad $\gamma\delta$ sic $v\chi$ ad $\delta\psi$; et ut $\gamma\phi$ ad $\gamma\epsilon$ sic $\phi\tau$ ad $\epsilon\omega$; sed $\gamma\nu$ est ad $\gamma\delta$ fere ut $\beta\delta$ (vel $\gamma\nu$) ad $\alpha\delta$: patet inde quia $\beta\delta$ est medium arithmeticum inter $\gamma\delta$ et $\alpha\delta$. Ptolemaeus enim facit $\alpha\beta, \beta\gamma$ aequales. Medium autem arithmeticum inter terminos, inter quos parva est proportio, insensibili aliquo majus est medio geometrico. Verbi gratia inter 10 et 12 medium arithmeticum est 11: medium geometricum est $10^{19}/_{20}$ fere: ubi minus una vicesima unius particulae inter utrumque medium interest. Et tamen hi numeri sunt familiares theoriae Martis, qui habet eccentricitatem omnium maximam apud Ptolemaeum.

Cum igitur proportio $\gamma\nu$ ad $\gamma\delta$ sit insensibili major proportionem $\alpha\delta$ ad $\delta\beta$, erit et proportio $\chi\nu$ ad $\psi\delta$ insensibili major quam proportio $\alpha\delta$ ad $\delta\beta$. Similiter ut $\gamma\epsilon$ ad $\gamma\phi$ sic $\epsilon\omega$ ad $\phi\tau$. Sed $\gamma\epsilon$ ad $\gamma\phi$ est fere ut $\epsilon\beta$ ad $\alpha\epsilon$: nimirum proportio illa insensibili aliquo minor est ista. Ergo et proportio $\epsilon\omega$ ad $\phi\tau$ insensibili aliquo minor est proportionem $\epsilon\beta$ ad $\alpha\epsilon$.

Jam permutemus. Est enim proportio $\alpha\delta$ ad $\delta\beta$ insensibili minor proportionem $\delta\beta$ vel $\beta\epsilon$ ad $\epsilon\alpha$, eo quod $\beta\delta$ vel $\beta\epsilon$ est medium arithmeticum inter $\alpha\delta$ et $\alpha\epsilon$, ut prius. Probatum autem fuit, proportionem $v\chi$ ad $\delta\psi$ esse majorem proportionem $\alpha\delta$ ad $\delta\beta$, ex duabus minori: et proportionem $\epsilon\omega$ ad $\phi\tau$ minorem esse proportionem $\epsilon\beta$ ad $\alpha\epsilon$, ex duabus majori: ut quanto ex duabus $\alpha\delta$ ad $\delta\beta$, et $\epsilon\beta$ ad $\alpha\epsilon$, illa minor et haec major, tanto ex duabus $v\chi$ ad $\delta\psi$ et $\epsilon\omega$ ad $\phi\tau$, illa major, haec minor. Itaque etiam illius insensibilis differentiae fit aliqua compensatio, ut multo propius vero sit, proportionem $v\chi$ ad $\delta\psi$ ad unguem esse aequalem proportioni $\epsilon\omega$ ad $\phi\tau$. Aequalibus igitur sumtis arcibus $\delta\psi$ et $\epsilon\omega$, qui hactenus fuerunt inaequales, erit uterque $\delta\psi$ vel $\epsilon\omega$ medium proportionale inter $v\chi$, moram in aphelio et $\phi\tau$, moram in perihelio, et proportio igitur $v\chi$ ad $\phi\tau$ (aequalibus existentibus $\delta\psi$ et $\epsilon\omega$) dupla erit proportionis $\alpha\delta$ ad $\delta\beta$ vel $\beta\epsilon$ ad $\epsilon\alpha$, illius minoris, hujus majoris, insensibili aliquo. Ac cum etiam proportio $\alpha\delta$ ad $\alpha\epsilon$ dupla sit alterutrius harum (componitur enim ex utrisque, pene aequalibus existentibus, exempto medio arithmetico $\delta\beta$ vel $\beta\epsilon$), ergo aequalibus existentibus arcibus eccentrici $\delta\psi$ et $\epsilon\omega$, proportio morae $v\chi$ ad moram $\phi\tau$ aequalis erit proportioni $\alpha\delta$ ad $\alpha\epsilon$; et clarius: quanto longior est $\alpha\delta$ quam $\alpha\epsilon$, tanto diutius moratur planeta in certo aliquo arcu eccentrici apud δ , quam in aequali arcu eccentrici apud ϵ . Atque hoc sequitur ex ordinatione formae (intellige particularis et inaequalitatis primae servientis) Ptolemaicae ejusque puncto aequatorio, certa et legitima demonstratione, quantum ad loca apogaeo et perigaeo vicina attinet. In ceteris tenuissima apparet diversitas, eaque quanto evidentior in demonstratione, tanto minor in effectu: quia verbi gratia proportio $\alpha\mu$ ad $\alpha\nu$ minor est, et $\alpha\theta$ ad $\alpha\epsilon$ multo minor, quam $\alpha\delta$ ad $\alpha\epsilon$ omnium maxima maximique effectus.

Caput XXXIII.

Virtutem, quae planetas movet, residere in corpore Solis.

Cum ergo demonstratum sit capite superiori, moras planetae in aequalibus partibus circuli eccentrici (sive in aequalibus spatiis aerae aetherae) esse in proportionem ea, in qua sunt ad invicem eorundem spatiorum abscessus a puncto, unde computatur eccentricitas; seu simplicius: quo longius abest planeta a puncto illo, quod pro centro mundi assumitur, hoc debilius illum incitari circa illud punctum: necessarium est igitur, ut causa hujus debilitationis insit aut in ipso planetae corpore eique insita vi motrice, aut in ipso suscepto mundi centro.

Est siquidem usitatissimum axioma per universam philosophiam naturalem: eorum, quae simul et eodem modo fiunt et easdem ubique dimensiones accipiunt, alterum alterius causam aut utrumque ejusdem causae effectum esse; ut hic intentio et remissio motus cum accessu et recessu a centro mundi in proportionem perpetuo coincidit. Quare vel debilitatio ista erit causa discessionis sideris a centro mundi, vel discessio debilitationis, vel utriusque erit aliqua causa communis. At neque opinari quisquam potest, tertium aliquid concurrere, quod duobus hisce communis causa sit; et in sequentibus capitibus patebit, non esse nobis necesse tale quippiam confingere, cum sufficiant duo ista sibi ipsis.

Porro neque est naturae consentaneum, fortitudinem vel debilitatem in motu longitudinis esse causam distantiae a centro. Distantia enim a centro prior est cogitatione et natura quam motus in longum. Equidem motus in longum nunquam est citra distantiam a centro, cum requirat spatium, in quo conficiatur: distantia vero a centro citra motum fingi potest. Ergo distantia erit causa vigoris in motu, et major minorque distantia majoris minorisque morae. Et cum distantia sit ex relatorum genere, cujus esse recidit in terminos, relationis vero per sese (citra terminorum respectum) nequeat esse ulla efficientia: sequitur igitur, quod dictum est, in alterutro terminorum haerere causam variantis vigoris in motu.

Corpus vero planetae se ipso neque gravius discessu neque levius appropinquando efficitur. Animalem quoque vim, quae motum sideri inferat, sedentem in mobili planetae corpore, toties intendi et remitti citra fatigationem et senium, id forsitan erit absurdum dictum. Adde, quod intelligi nequit, quomodo vis haec animalis corpus suum per spatia mundi transvectet, cum nulli sint orbes solidi, ut Tycho Brahe demonstravit: sed neque alarum aut pedum adminicula adsint rotundo corpori, quorum motatione anima hoc suum corpus per aeraem aetheraem, ceu aves per aërem, nisu quodam et contranisu illius aerae transportet.

Relinquitur igitur, ut causa hujus debilitationis et intensionis resideat in termino altero, scilicet in ipso suscepto mundi centro, a quo distantiae computantur.

Quodsi itaque elongatio centri mundi a corpore planetae praestat planetae tarditatem, appropinquatio velocitatem; fons itaque virtutis motricis in illo suscepto mundi centro insit necesse est. Hoc enim posito et modus causae patebit. Intelligimus enim hinc, quod planetae pene ratione statera seu vectis moveantur. Nam si planeta, quo longior a centro, hoc difficilius (utique tardius) a centri virtute movetur: equidem perinde est ac si dicerem,

pondus quo longius exeat ab hypomochlio, hoc reddi ponderosius; non se ipso sed propter virtutem brachii sustentantis in hac distantia. Utrinque namque, et hic in statera seu vecte et illic in motu planetarum, haec debilitas sequitur proportionem distantiarum.

Quodnam autem corpus in centro sit, nullumne, ut apud Copernicum, quando computat, et apud Tychonem ex parte; an Terra, ut apud Ptolemaeum et Tychonem ex parte; an denique Sol ipse, quod mihi, quod et Copernico, dum speculatur, placet: id parte prima rationibus physicis coepi discutere. Ibi enim in principiorum numero posui, quod jam cap. XXXII. ex professo et geometricè demonstratum est: planetam moveri debiliter, cum discedit a puncto, unde ejus computatur eccentricitas.

Ex hoc principio argumentatus sum probabiliter, Solem potius in illo puncto et centro mundi esse, vel Ptolemaeo Terram, quam aliud aliquod punctum corpore vacuum. Liceat ergo etiam hoc capite, demonstrato jam nostro principio, idem argumentum probabile repetere. Deinde memineris, me demonstrasse parte secunda, phaenomena sub noctium extrema pulchre sequi, si oppositiones Martis cum apparenti Solis in consilium adhibeamus: quo facto simul eccentricitatem et distantias ex ipso corporis Solaris centro extruimus; ut ita rursum Sol ipse in centrum mundi (Copernico) vel saltem in centrum systematis planetarii (Tychoni) veniat. Sed horum duorum argumentorum alterum nititur probabilitate physica, alterum procedit a posse ad esse. Itaque tertio in caput LII. distuli, ob captus difficultatem, demonstrare ex observatis, quod fieri aliter non possit, quin planetam Martem ad apparentia Solis loca referamus, et diametrum apsidum, quae bisecat eccentricum, talem admittere velimus, quae nullo pacto a parallaxibus orbis annui toleretur. Legat hac de re, si quis moram fert impatientius, caput LII; eoque lecto sic tandem hic legendo progrediatur. Nihil enim ibi assumitur nisi merae observationes. Similem demonstrationem invenies parte quinta ex latitudinum rationibus.

Sole igitur in centrum systematis competente, fons virtutis motricis ex jam demonstratis in Solem competet, cum et ipse in centro mundi jam modo repertus sit. Sane si hoc ipsum, quod jam a posteriori (ex observationibus) per longiusculam deductionem demonstravi, si hoc, inquam, a priori (ex dignitate et praestantia Solis) demonstrandum suscepissem, ut idem sit fons vitae mundi (quae vita in motu siderum spectatur), qui est et lucis, quo totius machinae constat ornatus, qui itidem et caloris, quo omnia vegetantur; puto me aequis auribus audiri meruisse. Videat autem ipse Tycho Braheus, seu quis est qui illius generalem hypothesin secundum inaequalitatis sequi malit, qua veri specie hanc physicam concinnitatem ex potissima parte receptam (nam et ipsi per usurpationem loci apparentis Solis Sol recidit in centrum systematis planetarii) parte una iterum a sua hypothesi repellat.

Etenim ex dictis apparet, alterum omnino sequi: aut ut virtus in Sole residens, quae planetas omnes movet, eadem et Terram moveat: aut ut Sol, illique per vim suam motricem concatenati planetae, a virtute aliqua, quae in Tellure sedeat, circa Terram vehantur.

Nam realitatem orbium Tycho ipse destruxit; vicissim ego aequantem in Solis seu Terrae theoria esse invicte demonstravi hac parte tertia: ex quo sequitur, ipsius quoque Solis, si movetur, intendi et remitti motum,

prout propior vel remotior a Terra fuerit, et sic Solem a Terra moveri sequeretur. Sin autem Terra movetur, a Sole et ipsa quoque movebitur, et id celerius vel tardius, prout ei propior aut ab eo remotior fuerit: manente in corpore Solis virtute perpetuo constante. Itaque inter duo jam proposita medium nullum est.

Ego in Copernico acquiesco, et Tellurem unam ex planetis esse patior. Ac etsi de Luna idem potest objici Copernico, quod de quinque planetis ego objeci Tychoni, quod scilicet absurdum videatur, Lunam a Tellure moveri, praetereaque illi concatenari et copulari, sic ut secundario et ipsa circa Solem a Sole rapiatur: malo tamen unam Lunam, Telluri cognatam, dispositione corporis (ut in Opticis demonstravi) movendam permittere virtuti in Terra sedenti, extensae vero versus Solem, ut paulo post dicetur capite XXXVII, quam eidem Terrae etiam Solis eique copulatorum omnium planetarum motus transscribere.

Sed pergamus in contemplatione hujus in Sole residentis motricis virtutis, et jam porro videamus arctissimam ejus cum luce cognitionem. Nam quia figurarum regularium similium adeoque et circulorum perimetri sunt ad invicem, uti earum semidiametri; ergo ut $\alpha\delta$ ad $\alpha\epsilon$ (Fig. 85), sic ambitus circuli per δ ex α descriptus ad ambitum circuli per ϵ ex eodem α scripti. Ut autem $\alpha\delta$ ad $\alpha\epsilon$, sic fortitudo virtutis in δ ad fortitudinem virtutis in ϵ conversim per demonstrata capitis XXXII. Ergo ut circulus δ ad circulum ϵ angustiores, ita virtus δ ad virtutem ϵ conversim: hoc est, quanto sparsior virtus, tanto imbecillior: et contra quanto collectior, tanto fortior. Hinc intelligimus, tantundem virtutis esse in universo ambitu circuli per δ , quantum in ambitu angustioris circuli per ϵ ; quod in Optica Astronomiae parte capite primo plane in eundem modum et de luce demonstratum est. Ergo undiquaque conspirant omnibus attributis lux et virtus motrix ex Sole.

Et quamvis haec Solis lux virtus ipsa movens esse nequeat, videant tamen alii, utrum sese habeat lux instar instrumenti aut vehiculi fortasse cujusdam, quo virtus movens utatur.

Contradicere quidem haec videntur: primum lux opacis impeditur; quare si lucem virtus movens haberet pro vehiculo, tenebras insequeretur quies mobilium: rursum lux rectis effluit orbiculariter, virtus movens rectis quidem, sed circulariter, hoc est in unam tantum plagam mundi ab occasu in ortum nititur; non contra, non ad polos etc. Sed respondere fortasse poterimus ad has objectiones proxime sequentibus capitibus.

Denique cum tantundem virtutis sit in amplo et remotiori circulo, quantum in angustiori et propinquo, nihil igitur periit de hac virtute in itinere ex fonte suo, nihil inter fontem et mobile dispersum est. Effluxus igitur, quemadmodum et lucis, immateriatus est; non qualis odorum cum diminutione substantiae, non qualis calor ab aestuante fornace, et si quid est simile, quibus media implentur. Relinquitur igitur, ut quemadmodum lux omnia terrena illustrans species est immateriata ignis illius, qui est in corpore Solis: ita virtus haec, planetarum corpora complexa et vehens, sit species immateriata ejus virtutis, quae in ipso Sole residet, inaestimabilis vigoris, adeoque actus primus omnis motus mundani. Cum ergo species haec virtutis plane ut species lucis (de quo in Astronomiae parte Optica cap. I.) non possit considerari ut per spatium intermedium dispersa, fontem inter et corpus mobile, sed ut collecta in mobili, quantum de ambitu a mobili occupatur: non erit igitur virtus haec (seu species) aliquod corpus

geometricum, sed veluti superficies quaedam, plane ut lux: ut hoc universale sit, species rerum immateriate descendentium descensu ipso non extendi per corporis dimensiones, quamvis a corpore (ut haec a corpore Solis) oriantur: hoc sane ex lege ipsa defluxus, se ipso non terminati, sed tamen ut superficies rerum illustrandarum efficiunt, ut lux consideretur quasi quaedam superficies, quia recipiunt et terminant ejus defluxum: ita corpora rerum movendarum efficere videntur, ut virtus haec motrix consideretur quasi quoddam corpus geometricum, quia corpulentia tota sua terminant seu recipiunt hunc speciei motricis defluxum: ut illa nusquam in toto mundo esse aut subsistere possit, nisi in ipsis corporibus mobilium: nec sit, sed quasi fuerit in intermedio inter fontem et mobile, plane ut lux.

Atque hic simul objectioni alicui responderi potest. Dictum enim est in superioribus, virtutem hanc motricem extensam esse spatiis mundi, et alicubi sparsiolem, alicubi collectiolem, quas affectiones simul intensio et remissio motus planetarum sequatur. Jam vero dictum, virtutem hanc esse speciem immateriatam sui fontis, nec recipi usquam nisi in subjecto mobili, ut in corpore planetae. Videntur autem pugnantia, materia carere et tamen dimensionibus geometricis subjacere, diffundi per mundi amplitudinem et tamen nusquam esse nisi ubi est mobile. Respondetur autem sic: quamvis virtus motrix non sit materiale quippiam, quia tamen materiae, hoc est corpori planetae vehendo, destinatur, non liberam esse a legibus geometricis, saltem ob hanc materialem actionem transvectionis. Nec opus est multis. Videmus enim motus istos perfici in loco et tempore, et emanare atque diffundi virtutem hanc a fonte per spatia mundi; quae sunt omnia res geometricae. Quin igitur et ceteris geometricis necessitatibus obnoxia sit haec virtus.

Ac ne nimium insolenter philosophari videar, proponam lectori exemplum lucis plane genuinum, cum in Solis corpore et ipsa niduletur indeque comes huic virtuti motrici in totum mundum emicet. Quis quaeso dixerit, lucem esse materiale quippiam? Illa tamen operationes suas exercet ratione loci, et mutuum patitur, repercutitur et refringitur et quantitates induit; adeo ut densa vel rara esse, et pro superficie haberi possit, ibi ubi ab illustrabili aliquo recipitur. Nam ut in Opticis dictum, lux quoque, aequae atque haec virtus motrix, in spatio inter fontem et illustrabile intermedio, non est, etsi hoc transiit, sed ibi quasi fuit. Ac etsi lux ipsa sine tempore quidem effluat, virtus vero haec moveat in tempore: tamen si recte expendas, utriusque ratio est plane eadem. Lux, quae sua sunt, in momento praestat; qua materia concurrat, ipsa quoque tempore proficit. Illustratio superficies in momento, quia nihil hic materiam pati opus est, cum illustrationis omnis ratione superficierum perficiatur vel quasi superficierum, non ratione corpulentiae quatenus corpulentia. Contra lux, dealbat colores in tempore; quia hic in materiam agit quatenus materia, eamque calfacit, expellens contrarium frigus in corporis materia fixum, non in superficie. Ita plane et haec virtus movens perpetuo et sine temporis intervallo illic ex Sole adest, ubi est idoneum mobile, quia nihil accipit a mobili ad hoc ut adsit. Movet autem in tempore, quia mobile materiatur est. Vel si videtur, comparisonem in hunc modum institue: quod sicut se habet lux ad illustrationem, sic certum est sese habere virtutem ad motum. Lux omnia facit, quae fieri possunt ad summam illustrationem, neque tamen obtinet, ut color summe illustretur: nam color diversam suam speciem cum

lucis illustratione confundit et tertium quippiam efficit. Ita virtus movens in mora non est, quin planetae tanta celeritas existat, quantam ipsa habet: at non ideo tanta est planetae celeritas, repugnante vel intermedio, nempe aerae aetherae materia qualicunque, vel dispositione mobilis ipsius ad quietem (alii dicerent, pondere, me non simpliciter probante, ne quidem cum de Terra agitur); quarum rerum contemperatione cum motricis virtutis molitionibus efficitur periodicum planetae tempus.

Caput XXXIV.

Corpus Solis esse magneticum, et in suo spatio converti.

De illa itaque virtute diximus, quae corpora planetarum proxime attingit et trahit, quomodo comparata, quomodo luci cognata sit, et quid sit in suo esse metaphysico. Sequitur, ut indice hac defluente specie (ceu archetypo, imagine) ipsam etiam penitiorem fontis naturam contemplemur. Videri namque possit, in corpore Solis latitare divinum quippiam et comparandum animae nostrae, ex quo effluat species ista planetas circumagens, uti ex anima jaculantis lapillos species motus in lapillis adhaerescit, qua provehuntur illi, etiam cum qui jaculatus est manum ab illis reduxit. Atqui sobrie progredientibus paulo aliae cogitationes suppeditabuntur. Nam quia virtus illa ex Sole ad planetas exporrecta in gyrum illos movet circa Solis corpus intransportabile, fieri id aut cogitatione comprehendere nullo alio modo potest, quam hoc, ut virtus eandem viam eat, quam alios planetas omnes abripit: quod et in ballistis et omnibus motibus violentis ex parte cernere est. Quo pacto Fracastorius alique ex relatu Aegyptiorum vetustissimorum verisimilia haud dixerint, fore ut planetarum aliqui, orbitis paulatim ultra polos mundi deflexis, viam postea eant ceteris et moderno ipsorum cursui contrariam. Quin potius illam in plagam feruntur corpora planetarum perpetuo, in quam virtus ista ex Sole emanans contendit.

Cum autem species haec immateriata sit, sine temporis mora ex corpore suo in hanc distantiam egressa, et luci per omnia reliqua similis, non tantum necesse est ex natura speciei, sed etiam per se probabile ob hanc cognationem cum luce, ut cum corporis seu fontis sui particulis et ipsa dividatur, et quam in plagam mundi vergit una aliqua particula corporis Solaris, in eandem plagam perpetuo vergat etiam particula speciei immateriatae, quae illi particulae corporis ab initio creationis respondebat. Nisi hoc esset, species non esset, nec rectis sed curvis lineis a corpore delaberetur. Specie ergo mota in gyrum, ut eo motu motum planetis inferat, corpus Solis seu fontem una moveri necesse est; non quidem de spatio in spatium mundi: dixi enim, me id corpus Solis cum Copernico in centro mundi relinquere: sed super suo centro seu axe immobilibus, partibus ejus de loco in locum (in eodem tamen spatio toto corpore manente) transeuntibus.

Ut vis argumenti a simili tanto sit evidentior, meminisse te velim lector, quod in Opticis sit demonstratum, visionem fieri per emanationem lucularum a superficiebus rei visae in oculum. Finge ergo oratorem aliquem in agno coetu hominum sese in orbem cingentium, faciem suam seu unum corpus convertere semel. Quibus ergo auditorum oculos suos offert obvia, illi et

oculos ejus vident; qui vero post illum stant, oculorum ejus aspectu tunc carent. At sese convertens circumfert oculos ad universos in orbem, omnes igitur successu brevissimi temporis ejus oculorum aspectu potiuntur. At potiuntur per accessum luculae seu speciei coloris ab oculis oratoris in oculos spectantium delapsae. Ergo circumferens oculos in angusto illo spatio, in quo caput ejus collocatum est, una circumfert luculae illius radios in amplissimo illo orbe, in quem spectatorum oculi circumcirca dispositi sunt. Nisi n. una circumiret lucula illa, spectatores ejus oculorum aspectus non fierent participes. Hic vides manifeste, speciem immateriatam lucis vel circumferri vel stare, una cum circumlata vel stante re sua, cujus est species.

Cum itaque species fontis, seu virtus planetas movens, gyretur circa centrum mundi, rem ipsam quoque, cujus est species, Solem nempe gyrari, hoc jam dicto exemplo non absurde concludo.

Quamvis et hoc argumento idem evincitur, quod motus localis et temporis subditus nequit competere in speciem immateriatam nudam, ut quae motus illati passionem recipere nequit, nisi simul, ut virtus haec materia ipsa caret, sic motus quoque receptus tempore careat. Cum ergo virtus ista movens circumire probata sit, neque tamen infinitae possit concedi celeritatis (infinitam enim tunc celeritatem etiam corporibus inditura videtur) et ideo in tempore aliquo circumeat: se ipsa igitur hunc motum nequit perficere, sed ideo solum moveri illam necesse est, quia corpus ejus a quo dependet movetur. Atque eodem etiam argumento recte concludi videtur, non esse immateriatum quippiam intra corporis Solaris terminos, cujus conversione simul convertatur species ista ab illo immateriato descendens. Rursum enim immateriato cuipiam localis motus cum tempore non recte tribuitur. Relinquitur igitur, ut corpus ipsum Solis modo supra dicto gyretur, et polis suae conversionis (linea ex centro corporis per illos inter fixaseducta) monstret polos zodiaci, circulo vero corporis sui maximo eclipticam, harumque rerum astronomicarum hoc pacto causa naturalis fiat.

Amplius cum videamus, nec singulos planetas in omni sua a Sole distantia, nec omnes in diversis suis distantis aequali corripere celeritate; sed Saturnum annorum 30 moras nectere, Jovem annorum 12, Martem 23 mensium, Terram 12, Venerem sesquiocto, Mercurium 3; et tamen omnis orbis virtutis emanantis ex Sole (tam quo loco Mercurium amplectitur humillimum, quam quo loco Saturnum altissimum) ex antedictis aequali cum corpore Solari vertigine et eodem tempore torqueatur (quo loco nihil absurdi statuitur, cum virtus emanans immateriata sit suaque natura infinitae celeritatis esse posset, si possibile esset, motum ipsi alicunde inferri; tunc enim nec pondere, quo caret, nec corporei medii occursum impediri posset): ex eo itaque patet, planetas inhabiles esse, ut assequantur celeritatem motricis virtutis. Saturnus enim inhabilior est quam Jupiter, quia tardius restituitur, cum orbis virtutis apud Saturni iter aequae celeriter restituatur ac orbis virtutis apud iter Jovis, et sic consequenter usque ad Mercurium, qui procul dubio ad exemplum superiorum etiam ipse tardior erit virtute, quae ipsum vehit. Necesse est igitur, ut planetariorum globorum natura sit materiata, ex adhaerente proprietate inde a rerum principio prona ad quietem seu ad privationem motus. Quarum rerum contentione cum nascatur pugna, superat igitur plus ille planeta, qui in virtute imbecilliore consistit eaque tardius movetur; minus ille, qui Soli propior.

Docet hinc analogia statuere, omnibus planetis, ipsi etiam Mercurio

humillimo, inesse vim materialem sese explicandi nonnihil ex orbe virtutis Solaris. Unde evincitur, Solaris corporis gyrationem multo antevertere omnium planetarum periodica tempora; ideoque ad minimum citius quam trimestri spatio Solem semel in suo spatio gyron.

Ac cum in meo Mystero Cosmographico monuerim, eandem fere proportionem esse inter semidiametros corporis Solis et orbis Mercurii, quae est inter semidiametros corporis Terrae et orbis Lunae: hinc non absurde concluderis, sic esse periodum orbis Mercurii ad periodum corporis Solis, ut est periodus orbis Lunae ad periodum corporis Terrae. Ac cum semidiameter orbis Lunae sit sexagecuplus semidiametri corporis Terrae, periodus vero orbis Lunae (seu mensis) trigecuplus paulo minus periodi corporis Terrae (seu diei) et sic proportio amplitudinum dupla ad proportionem temporum periodicorum: si igitur etiam in Sole et Mercurio regnet proportio dupla, cum Solis corporis diameter sit sexagesima circiter diametri orbis Mercurii, erit tempus conversionis globi Solaris tricesima de diebus 88, quanta est conversio orbis Mercurii: adeo ut verisimile sit, Solem triduo circiter gyron.⁶⁹

Sin autem mavis diurnum Soli tempus praescribere, ut diurna Telluris conversio vi quadam magnetica dispensetur a diurna globi Solaris conversione, haud equidem repugnaverim. Sane rapida ista gyratio ab eo corpore, in quo primus actus omnis motus inest, non aliena esse videtur.

Confirmatur autem haec opinio (de conversione corporis Solaris, quod illa sit causa motus planetis ceteris) hoc ipso exemplo Telluris et Lunae pulcherrime. Nam quia Lunae motus capitalis et menstruus, vi demonstrationum cap. XXXII. XXXIII. usurpatum, omnino ex Tellure seu fonte est (nam quod est hic Sol planetis ceteris, hoc est Terra Lunae in illa demonstratione). Considera igitur, quomodo Tellus nostra Lunae motum inferat: dum nempe Tellus haec nostra et cum ea species ejus immateriata vicies novies semis convolvitur circa suum axem, species haec emissae tantum potest in Lunam, ut illam interim semel in orbem agat, in plagam quidem eandem, in quam Tellus ipsa praeit.

Sed hoc interim mirum, centrum Lunae duplo longiorem lineam circa centrum Terrae emetiri quolibet tempore, quam aliquem locum in superficie Telluris aequatori circulo maximo subjacentem. Si enim aequalibus temporibus aequalia spatia emetirentur, Lunam sexagesimo die restitui oportuit, cum amplitudo ejus orbis sit sexagecupla ad Telluris globi amplitudinem.

Nimirum tanta vis est speciei immateriatae Telluris, Lunarum vero corporis procul dubio magna raritas et imbecillis repugnantia. Itaque ut admiratio tollatur perpende, quod his positis principiis omnino consequens esset, Lunam, si materiae vi plane nihil repugnaret motui a Terra extrinsecus illato, rapi eadem plane celeritate cum ipsa specie Telluris immateriata, hoc est cum ipsa Tellure et circumire spatio 24 horarum, quo et Terra circumit. Nam etsi magna est tenuitas illius speciei Telluris in distantia 60 semidiametrorum: unius tamen ad nihil eadem est proportio, quae sexaginta ad nihil. Itaque species Telluris immateriata vinceret totum assem, si nihil resisteret Luna.

Quodsi quis ex me quaerat, quale igitur corpus esse Solis putem, a quo haec species motrix descendit? eum in hunc modum ego jubeo progredi ulterius analogia duce, et suadeo, ut inspiciat exemplum paulo ante memorati magnetis accuratius, cujus virtus residet in universo corpore magnetis, cum ejusdem mole crescit, cum comminatione illius diminuitur et ipsa. Ita

in Sole virtus movens tanto videtur fortior, quod verisimile sit, corpus ejus esse totius mundi densissimum.

Et ut e magnete virtus attractiva ferri orbiculariter spargitur, ita ut certum obtineat orbem, intra quem constitutum ferrum allicitur, fortius tamen, si ferrum propius intra complexum illius orbis veniat: ad eundem plane modum virtus planetas movens ex Sole propagatur in orbem, et partibus remotioribus illius orbis est imbecillior. Ut vero magnes non omni parte trahit, sed filamenta (ut ita dicam) seu fibras (motoriae virtutis sedem) rectas habet per longum extensas, ita ut ferri lingulam, si medio loco inter capita magnetis a latere consistat, non attrahat, sed tantummodo parallelon suis fibris dirigat: ita credibile est, in Sole non esse ullam vim planetarum attractoriam, ut in magnete (accederent enim ad Solem tantisper, donec cum ipso conjungerentur penitus), sed tantum directoriam, ideoque fibras habere circulares in eam plagam circumporrectas, quae monstratur a circulo zodiaco. Sole itaque sese vertente perenniter, convertitur et in orbem vis motrix seu defluxus ille speciei a fibris Solis magneticis, per omnia planetarum diastemata diffusus, et convertitur eodem tempore cum Sole: non secus atque ad translationem magnetis ipsa quoque virtus magnetica transfertur et una ferrum ipsam vim magneticam insequens.

Perbellum equidem attigi exemplum magnetis et omnino rei conveniens, ac parum abest quin res ipsa dici possit. Nam quid ego de magnete, tanquam de exemplo? cum ipsa Tellus, Gulielmo Gilberto Anglo demonstrante, magnus quidam sit magnes, eademque eodem auctore, Copernici assertore, convolvatur in dies singulos, uti ego Solem volvi conjicio: et ob id ipsum, quia fibras habet magneticas, lineam motionis suae rectis angulis intersecantes, ideo illae fibrae variis circulis motioni parallelis polos Telluris circumstant: ut jam jure optimo Lunam ab hac Terrae convolutione ejusdemque virtutis magneticæ translatione rapi statuerim, triginta tamen vicibus tardiore.

Scio, Terrae filamenta ejusdemque motus aequatorem signare, Lunae vero circuitus zodiaco sese familiariter applicare: qua de re in sequentibus cap. XXXVII. et parte V. Hoc uno excepto cetera conveniunt: Terra in intimo complexu est Lunaris periodi, ut Sol in ceterorum planetarum. Et ut planetae a Sole fiunt eccentrici, sic Luna a Terra: ut certum sit, a Lunae motore Terram ceu quandam cynosuram spectari, uti Sol spectatur a motoribus planetarum ceterorum propriis; de quibus capite XXXVIII. Itaque plausibile est, cum Terra Lunam cieat per speciem, sitque corpus magneticum, et Sol planetas cieat similiter per emissam speciem: Solem itaque similiter corpus esse magneticum.

Caput XXXV.

*An ut luminis sic et motus ex Sole contingat privatio in planetis,
ex ἀνύπαρκτοι.*

Jam opportune resumam et objectiones capite XXXIII. allatas; ubi cognationi lucis et virtutis motricis opponebatur primo offuscatio siderum mutua, deinde dispar specierum utriusque emanatio.

Et primum quod attinet, consideratione dignum est, an sicut opacum alterum alteri lumen Solis intercipit, sic etiam mobilia se invicem in motu impedian, ubi easdem cum Sole lineas inciderint: ut ita lux plane sit vehiculum vel instrumentum virtutis motricis. Videri enim possit, ut hoc quantum fieri posset caveretur, inclinationes mutuas eccentricorum omnium, deviationesque ab ecliptica et transpositiones nodorum, adeoque et proportionales corporum umbrarumque in conum attenuationes a Deo adhibitas esse: cumque non plane evitari potuerit, quin sidera interdum in easdem cum Sole lineas inciderent, proclive est suspicari, inde tardissimos illos motus apogaeorum et nodorum (qui sunt quasi quaedam aberrationes epicyclorum a temporibus restitutoriis) originem suam traxisse.

Sed respondetur, primo non turbendam esse analogiam inter lucem et virtutem motricem, temere confusis proprietatibus. Lux opaco impeditur, corpore non impeditur, propter hoc ipsum, quia lux est, nec in corpus agit sed in superficiem vel quasi. Virtus in corpus agit sine opaci respectu: opaci igitur correlatum cum non sit, neque ab opaco impediatur. Quo nomine lucem a virtute movente pene separarem, nisi invenirem in natura exempla, quae lucis radiis etiam impeditis efficaciam tamen relinquunt ibi, quorsum pervenire prohibentur. Sed de lucis cum virtute motrice sociatione non praecipue hic satago.

Accipiamus autem ad suspicionem hanc impeditorum motuum diluendam exemplum alterum magnetis. Ejus virtus nihil impeditur objectu materiae (sane quia immateriata est) sed transit laminas argenteas, cupreas, aureas, vitreas, osseas, ligneas, trahitque ferrum post illas latitans nihilominus ac si nullae interessent laminae. Impeditur quidem interjectu magneticae tabellae, sed causa in promptu est; tabella cum ipso magnete paria facit. Superat igitur fortitudine remotiorem post se latitantem. Ac etsi etiam ferreae tabellae interjectu impeditur, tamen et haec est naturae magneticae et combibit virtutem magnetis illico, eaque quasi propria utitur.

Ut igitur negare possimus, motus siderum impediri centralibus duorum conjunctionibus, necesse est dicere, Solis naturam plus differre a naturis siderum ceterorum, quam differt natura magnetis a natura ferri: nec ut a magnete ferrum eandem subito virtutem combibit, sic a Sole planetas. Utrum autem aliquam qualemcunque combibant, differo in caput LVII. explicare.

Quod autem verisimilitudinem attinet causae motus apogaeorum, ea nihil probat de virtute hac communi Solari per ἀντιρροαξίν impedita. Potest enim motus apogaeorum aliam utpote animalem habere causam. Vide de hac re obscuram aliquam opinionem infra cap. LVII.

Adde quod si hinc oriretur apogaeorum motus, quod motus planetae circa Solem in ἀντιρροαξίσι speciei motricis ex Sole emanantis impediretur: retardaretur igitur motus longitudinis, aut progrediente motu latitudinis (quo pacto retrocederent apogaea) aut aequae retardato: ita consistent apogaea, cum observationes testentur, ipsa progredi.

Sed et hoc cap. LVII. dicetur, utrum salvo motu ex Sole impediuntur motus siderum proprii τῇ ἀντιρροαξίσι.

Caput XXXVI.

Qua mensura virtus ex Sole motrix per mundi amplitudinem attenuetur.

Sequitur altera objectio paulo difficilior, orta ex eo, quod supra cap. XXXIII. loco secundo fuit oppositum cognationi lucis et virtutis motricis, sed quae cum nostra speciei immateriatæ contemplatione pugnare videtur infensus, quaeque me diu fatigavit improvidum.

Demonstratum est cap. XXXII, planetarum motus intensionem et remissionem sequi proportionem distantiarum simplicem. At videtur virtus ex Sole emanans intendi et remitti debere in proportionem duplicata vel triplicata distantiarum seu linearum effluxus. Ergo intensio et remissio motus planetarum non erit ex attenuatione virtutis ex Sole emanantis. Probari videtur consequens in hunc modum, tam de luce quam de virtute movente; sed de luce sermones sunt clariores. Lector virtutem motricem subintelligat. Sit initio punctum aliquod α (Fig. 86.) de corpore Solis: id ergo sparget radios in orbem omnem: et per demonstrata in Opticis ut sese habet amplitudo sphaericae superficiei γ amplioris, radios hosce per imaginationem terminantis, ad β angustiore, sic se habebit densitas lucis in orbe β angustiore ad densitatem ejusdem in γ ampliore.

Sit deinde circulus aliquis maximus $\delta\epsilon$ in corpore Solis lucidus. Fig. 86. Ejus ergo singula puncta, quorum sunt infinita, spargent hac ipsa proportionem radios in singula hemisphaeria β et γ . Ac ut se habet distantia ab hujusmodi linea circulari (quae eminus apparet recta) longior $\alpha\gamma$ ad brevior $\alpha\beta$, conversim habet se apparentia diametri circuli in distantia breviori, seu $\delta\beta\epsilon$ angulus, ad apparentiam in distantia longiori, seu $\delta\gamma\epsilon$ angulum. Cum ergo longior appareat haec diameter e propinquo β quam e longinquo γ in eadem proportionem; densior autem etiam cujuslibet puncti radiatio e propinquo β quam e longinquo γ : in dupla igitur proportionem ipsius $\alpha\beta$ ad $\alpha\gamma$ densior videtur futura radiatio circuli de propinquo β quam de longinquo γ .

Sit tertio discus ipse apparens corporis Solis $\delta\alpha\epsilon$, et cum superficies similes (ut hic circulares disci apparentes) sint in dupla proportionem diametrorum, diametri vero Solis apparentes in simpla proportionem distantiarum $\alpha\gamma$, $\alpha\beta$ eversa: disci igitur circulares apparebunt in dupla proportionem distantiarum $\alpha\gamma$, $\alpha\beta$. Cum autem radiatio circuli $\delta\epsilon$ in γ et β jam probata sit dupla uti proportionem distantiarum $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$, causa alius atque alius suae densitatis, videtur hinc radiatio disci, causa densitatis vel fortitudinis, tripla uti proportionem distantiarum $\alpha\gamma$, $\alpha\beta$. Ut si distantiae essent $\alpha\gamma$ ut 2, $\alpha\beta$ ut 1: essent radiationes puncti $\alpha\gamma$ ut 1, $\alpha\beta$ ut 2, causa densitatis lucis, et diametri circuli apparentes in γ , 1, in β , 2. Ergo radiationes $\delta\epsilon$ diametri circuli in γ , 1, in β , 4. Sed disci sunt in proportionem dupla diametrorum. Ergo disci apparentia in γ esset 1, in β esset 4: quasi dicas, discum $\delta\alpha\epsilon$ ex β videri quadruplo plura puncta continere quam ex γ , quorum punctorum quodlibet in β duplo densius lucet quam in γ . Compositis igitur proportionibus radiationis totius disci $\delta\alpha\epsilon$ densitas in γ ad densitatem radiationis totius disci $\delta\alpha\epsilon$ in β esset ut 1 ad 8.

Nihil hic nos turbat, quod apparentem discum Solis computamus, cum



sit superficies hemisphaerica; nam aequae multiplicium eadem est ad se mutuo proportio. Sphaerica vero superficies ab Archimede demonstrata est quadrupla esse ad planum circuli maximi in sphaera scripti. Omnino itaque corpus duplo distans longius in γ quam in β , videtur octuplo obscurius lucere debuisse in γ quam in β , non tantummodo duplo. Etenim ex eo ipso videtur intendi debere claritas radiorum, quod corpora ex appropinquatione videntur amplificari, ut Venus in perigaeo epicycli evidentior corporibus umbram circumscrit quam in apogaeo. Eadem igitur, vi comparationis a nobis institutae inter lucem et vim motricem, videntur et de vi motrice concipi debere.

Ad hanc objectionem solide respondeo, in prima puncti positione falsum assumi. Nam etsi sic ego in Opticis quoque locutus sum, at cum opticis me locutum memineris, quorum puncta et lineae non sunt plane indivisibiles. Etenim quod punctum attinet, cum id nullam obtineat quantitatem, amplificentur vero radiationes cum quantitibus corporum: sequitur, puncti radiationem per se nullam esse, quare nullius radiationis nulla etiam major vel minor densitas. Itaque usurpatio prima proportionis distantiarum $\alpha\beta$ ad $\alpha\gamma$ hoc pacto intercidit. Quin potius ob id ipsum dicimus, punctum aliquod fortius vel imbecillius lucere, quia illud punctum nobis majorem vel minorem quantitatem designat.

In secunda circuli et tertia disci positione duo falsa insunt. Primo quod circulus mathematicus, carens latitudine, fingitur lucere: cum is tam non luceat se ipso, quam non potest lucere punctum, ex cuius ductu circulus gigni intelligitur. Sane nihilo magis promoveris ad superficiem, assumpta linea trium stadiorum quam trium pedum.

Secundo fingitur amplificatio optica diametri vel disci addere fortitudini radiorum, cum sit tantum deceptio visoriae facultatis et ex genere rationalium entium, quibus nulla est efficientia. Itaque idem re ipsa circulus $\delta\epsilon$, eadem superficies $\delta\alpha\epsilon$ (in negotio lucis), idem corpus $\delta\epsilon$ (in negotio virtutis) manens, sive ex γ adspiciatur, sive ex β , idem etiam perpetuo praestabit et efficiet, et tantundem sparget virtutis vel lucis in orbem γ laxiorem quantum in β angustiorum: nihil enim perit in itinere; pervenit species integra quam lubet remotissime, tantummodo sphaerarum extensionibus attenuatur, ut in punctis sphaerarum singulis, puta in γ et β , sit illic rarior, hic densior in proportionem conversa distantiarum $\alpha\beta$ ad $\alpha\gamma$. Et haec sola causa est debilitationis, non evanescencia fontis $\delta\epsilon$, quae re vera non accidit, sed per visus deceptionem. Imo si hic liberet ex Euclidis Opticis argu-
tari, minus lucis ad propinqua β venit quam ad remota, eo nomine, quod in β minor circulus terminat visum hemisphaericum lucentis $\delta\epsilon$ quam in γ . Itaque non tanta particula de Sole $\delta\epsilon$ videri potest ex β quanta ex γ . Sed hoc insensibile est plane et vix numeris immanibus expressibile.

Ego sane postquam hic mihi ipsi respondi, rideo miseras meas trepidationes ex hac caligine ortas.

Sed revibrari potest objectio in partem contrariam, sic nempe. Si tantundem lucis est in ampla sphaera sparsim, quantum in angusta collectum, non erit tantundem virtutis utrobique, eo quod virtus consideratur non in sphaera orbiculariter, ut lux, sed in illo circulo in quo incedit planeta. Nam et filamenta magnetica Solis supra ponebantur in longum tantummodo porrigi, non etiam versus polos aut aliorum.


Respondetur, causam lucis et virtutis motricis esse plane eandem, et

deceptionem inesse in ratiocinatione. Nam sicut in luce non effluunt radii a solis punctis et circulis corporis ad respondentia sphaerae puncta et circulos; ut in γ non a solo α (quo pacto nulla posset adscribi luci densitas in sphaeris, cum in ipsa origine nullam haberet quantitatem, utpote a puncto descendens), sed effluunt a toto lucentis hemisphaerio radii ad singula imaginatae sphaericae superficiei puncta; ut in γ effluit radius tam ex δ quam ex α : sic etiam in negotio virtutis idem hoc locum habet. Nam etsi filamenta corporis Solaris magnetica ordinantur secundum longitudinem zodiaci; etsi etiam unicus tantummodo circulus maximus corporis Solis subest zodiaco sive eclipticae, et quam proxime orbitae planetae; denique etsi alteri circelli minores (tandem sub polis in puncti angustiam attenuati) subordinantur respondentibus suis circulis in sphaera planetae: tamen ab omnibus Solaris corporis filamentis (ab uno hemisphaerio corporis stantibus) radii defluunt et confluunt tam ad puncta singula itineris alicujus planetae, quam ad ipsos polos polis corporis Solis imminentes; et planetae corpus vehitur ad modulum densitatis hujus integrae speciei, ex filamentis omnibus compositae.

At non ideo sequitur, ut sicut Sol quaquaversum luget aequaliter, sic etiam planeta, quod metuere possis, quaquaversum moveatur sine discrimine. Neque enim filamenta Solis magnetica movent solitarie considerata, sed quatenus Sol rapidissime conversus in suo spatio ipsa quoque filamenta, et cum iis speciem moventem ab iis dimanantem circumfert. Non igitur ibit planeta in adversum, quia Sol perpetuo volvitur in directum. Non ibit planeta ad polos (etsi in iis punctis etiam aliqua de corpore Solis species adsit): quia neque filamenta corporis Solaris versus polos extenduntur, neque Sol eam in plagam volvitur, sed in eam, quorsum ipsum filamenta sua invitant.

Quibus positis, tantum abest ut planetae versus polos rapiantur, ut potius unica zodiaci regio sit media inter polos, per quam omnes planetas, si a suis propriis motibus cessarent (de quibus infra cap. XXXVIII.) sine ulla deflexione in longitudinem ire sit necesse. Nam quae species hemisphaerii Solaris adsistit alicui puncto zodiaci, puta in praesenti schemate puncto ζ , tota est filamentorum semicircularium eodem una tendentium; ut ex θ in γ , ex λ in μ etc. Ubi vero versus polos mundi concesseris, ut in η , tunc et altero polo corporis Solis γ , et filamentorum integris circellis $\lambda\mu$, quae polum γ circumstant, sub aspectum $\eta\mu$ vindicatis, species componetur ex filamentis in contraria tendentibus: circulorum enim partes oppositae λ et μ in partes eunt contrarias. Minus igitur apta est species ista $\theta\eta\mu$ versus polos delapsa ad motum planetis inferendum.

Fig. 87.




Caput XXXVII.

Virtus Lunam movens quomodo comparata sit.

Et quia cap. XXXIV. obiter in motus Lunae mentionem incidi, lubet totum negotium delineare paulo clarius, ne scrupulus aliquis a Luna injectus lectorem in toto hoc tractatu torqueat, quo minus expedite mihi suum praebeat assensum: quin potius ut mirifice confirmetur evidentissima motus Lunaris contemplatione: denique ut astronomiae pars physica hoc libro sit integra. Nam etsi in theoriam Lunae paucula quaedam differenda sunt seu aliter tradenda seu particularius explicanda: illa tamen hinc orientur.

Animadvertit Tycho Braheus per diutinas et creberrimas observationes Lunae in omni situ cum Sole, quod in Luna praeter anomaliam epicycli et praeter illam anomaliam menstruam, quae etiam Ptolemaeo nota fuit, ipse etiam medius motus (respectu harum duarum inaequalitatum sic dictus) nondum sit plane medius, sed intendatur sub conjunctiones et oppositiones cum Sole, remittatur in quadraturis; ut, etiamsi nullis turbaretur epicyclis, tamen Luna ipsa, etiam in concentrico Terram circumiens, inaequaliter circumiret.

Fig. 88.



Sit S corpus Solis, M orbis Mercurii, V Veneris, T Telluris, P Martis etc.: et moveantur omnes superius a dextris ad sinistras perpetim. Sit autem CLOF orbis Lunae, O Luna in oppositione, C in conjunctione, L, F in quadraturis: et maneat jam CLOF concentricus ex Terra in T descriptus, moveaturque in plagam OFCL. Quaeritur igitur, quae causa, cur Luna in C, O sit celerior circa T, quam in F, L, cum jam animo removerimus eccentricitatem et epicyclos? Hic exspectat lector (scio) ut dicam, ideo celeriores esse in O, quia motus ejus eo loci sit in easdem partes cum omnium planetarum motu. At haec vera causa non est. Sic enim in C fieret, ut fit qui-

dem, Luna tardissima, motu composito; cum proprius ejus motus FCL non-nihil renitatur illi communi, ad sinistras partes. Sciendum enim, quod Luna in suo orbe ex C feratur minus ad partes dexteris L, quam Terra ad sinistras in suo orbe: ideoque Luna, motu composito [ex proprio et ex Telluris communi, semper etiam ad dexteris superius, Terra in δ versante, hic vero, Terra inferius in T versante, ad sinistras fertur; tarde tamen circa C, velociter circa O, cujusmodi motum spirales lineae hic delineatae proxime exprimunt.

Sed forsitan aliud exspectas, ut dicam, provenire hoc phaenomenon ex eo, quod virtus motrix Solis in O sit remissior, in C incitatio? Multo minus hoc dixero. Sic enim efficiam, ut utrinque in O et C fiat tarda, in F, L velox, quod est contrarium quaesito. Nam si in O remisse promovetur, tarda igitur: et si in C fortius impeditur, quo minus ex C in L

contrarium tendat, rursum igitur tarde movebitur ex C in L. Nempe non recte fit, ut Lunam Soli permittamus a Terra liberam. Aberraret enim denique a Terra, ut apogaea a locis suis aberrant. Quin potius tribuenda Telluri vis retentiva Lunae, ceu catena quaedam, quae esset, etsi Luna Terram plane non circumiret; et qua posita Luna cum Terra quasi in eadem navi fertur, nempe in eadem virtute Solis, jamque, quasi hoc motu ex Sole libera esset, privatim a Terra rotatur. Itaque celeritatis in O, C causam non aliam esse puto, quam eam, quod T Terra virtutem movendi Lunam ex S Sole hausit, eamque continuatione lineae TS conservat. Itaque SCTO merito diameter virtuosa appellari potest, cum hi duo fontes sint omnis motus, nempe T et S.

Hoc enim posito sequetur etiam illa inaequalitas menstrua Ptolemaeo nota. Nam si virtus in C, O fortior est quam in F, L, lapsa ex eodem fonte T: ergo si apogaeum in C, O versatur, majus damnum celeritatis est, quam si sit apogaeum in F, L. Majores ergo aequationes ex apogaeo O vel C redundant in F, L, quam ex apogaeo F vel L in C, O, conjunctiones et oppositiones.

Vides igitur, speculationes hasce physicas ita comparatas esse, ut etiam Lunae phaenomenis sufficere possint; neque incitari Lunam a Sole primario, ut Terram circumveniat, sed a virtute aliqua in Terra ipsa delitescente, indeque speciem sui immateriatam ad Lunae corpus ejaculante, fortiore tamen in linea, quae centra Solis (primarii fontis) et Terrae connectit. Quomodo vero diameter ista virtuosior evadat, difficile est explicare clarius. Nam neque Solis neque Terrae virtus emanans in Lunam tunc celerior est, cum Luna in hanc diametrum incidit. Aequabiles enim et perpetuo constantes esse horum corporum (quare et specierum) conversiones, summa ratio est. Relinquitur ergo solum hoc, quod dictum est, ut non quidem celerior, sed tamen robustior sit virtus ex Terra delapsa, in partibus lineae ST propioribus: eo quod originaliter per ipsam illam lineam ex Sole in Terram est derivata.

Esse autem Solem seu immediate seu per id, quod Telluri motum annum conciliat, praecipuum directorem ejus motus, quem Tellus Lunae infert, id maxime demonstrat, quod circuitus Lunae sub zodiaco conficitur, ut et circuitus centri Telluris annuus, cum tamen motus Telluris diurnus, qui Lunae suum motum menstruum infert, sub aequatore incedat.

Caput XXXVIII.

Planetas praeter communem Solis vim motricem praeditos esse vi insita: et motus eorum singulorum componi ex duabus causis.

Dixi de illius motus origine, qui planetas circa Solem, vel Lunam circa Terram rotat; hoc est de causis naturalibus illius circuli, qui in theoriis planetarum pro diversa auctorum intentione vel eccentricus vel concentricus appellatur. Jam etiam dicendum de naturali causa ipsius eccentricitatis, seu in particulari Copernici hypotesi, ipsius epicycli in concentrico. Nam virtus movens ex Sole hactenus aequabilis fuit, tantummodo per alias et alias circulorum amplitudines gradus diversos habens: ingenium vero ejus

tale, ut planeta, si in eadem a Sole remotione maneret, aequabilissime circumferretur, nullam sensurus intentionem, nullam remissionem motus Solaris. Quod autem inaequalitas aliqua in opere hujus virtutis est deprehensa, id accidit ex eo, quod planeta ex alia a Sole distantia in aliam fuit transpositus; quo pacto in alium atque alium gradum fortitudinis hujus ex Sole virtutis incidit. Quaeritur ergo, si orbes solidi nulli sunt, quod demonstravit Braheus, unde eveniat, ut planeta a Sole ascendat et descendat? num etiam hoc ex Sole? Est, inquam, quomodo ex Sole; est, quomodo non ex Sole.

Clamant rerum naturalium exempla et haec hactenus delibata coelestium cum his terrestribus cognatio, simplicis corporis quo communiores sunt operationes, hoc esse simpliciores; varietates vero, si quae sunt ejus (ut in motu planetarum diversa a Sole distantia seu eccentricitas), ab extraneis causis existere concurrentibus.

Sic in flumine simplex aquae proprietas est, ad centrum Terrae descendere. Quia vero iter ejus directum non est, declinat illac, qua depressum invenit alveum; stagnat, ubi in soli aequabilitatem incidit; rapitur cum strepitu, qua libramentis incitatur pronioribus; est ubi rotetur in gurgites, si perniciosi lapsu in procurrentes scopulos impegerit. Ubi aqua ipsa vi insita nihil nisi descensum molitur ad Terrae centrum simplici proprietate, simplex opus; declinatio vero et stagnatio et aestus et vortices et omnis varietas a causis assignatis seu extraneis et adventitiis oritur. Inprimis jucunda et nostro negotio accommodatiora exhibentur spectacula in navigiorum impulsione. Si funis seu rudens super flumen transversus in sublimi pendeat ex utraque ripa nexus, et trochlea per rudentem discurrens alio fune cymbam in flumine versantem retineat, portitor vero cymbae gubernaculum seu remum decenti modo religaverit, cetera quietus: cymba vi simplici fluminis deorsum euntis ipsa transversim rapta, a ripa una in alteram transponitur, trochlea per funem sublimem decurrente. In latioribus vero fluminibus cymbas in gyros agunt, huc illuc trajiciunt, mille lusus exercent, nullo fundi aut litorum tactu, sed sola remi ope decursum fluminis unicum et simplicissimum in sua vota convertentes.

Ad eundem fere modum virtus ex Sole in mundum per speciem egressa rapidus quidam torrens est, qui planetas omnes adeoque totam forsan auram aetheream ab occasu in ortum rapit, se ipso non aptus corpora ad Solem adducere vel ab eo longius propellere; quod esset infinitae sollicitudinis opus. Necesse ergo est, ut planetae ipsi ceu quaedam cymbae peculiares virtutes motrices quasi quosdam vectores seu portitores habeant, quorum providentia non tantum accessus ad Solem et recessus a Sole, sed etiam (quod secundum argumentum esse queat) declinationes latitudinum administrant, et quasi ab una ripa in aliam, a septentrione inquam in austrum et contra, flumen hoc (se ipso solum eclipticae tractum sequens) trajiciunt. Certum enim est ex antedictis, virtutem, quae ex Sole, simplicem esse. Jam vero eccentrici planetarum non tantum declinant ab ecliptica, sed etiam in varias plagas eunt, sese mutuo et eclipticam intersecantes. Igitur aliae causae virtuti motrici ex Sole conjunguntur.

Caput XXXIX.

Qua via et quibus mediis movere debeant virtutes planetis insitae, ut circularis planetae orbita, qualem vulgo credunt, per auram aetheream efficiatur.

Sint itaque nobis in demonstratis verissima ista axiomata: Primum, quod planetae corpus natura inclinatum sit ad quietem in omni loco, in quo solitarium ponitur. Secundo, quod ea virtute, quae ex Sole, de loco in locum secundum longitudinem zodiaci transponatur. Tertio, si non mutaretur distantia planetae a Sole, futurum ex hac transpositione iter circulare. Quarto, ejusdem planetae in duabus per vices distantibus a Sole toto ambitu permanentis, tempora periodica futura in dupla proportionem distantiarum sive circulorum amplitudinis. Quinto, virtutem nudam et solitariam in ipso planetae corpore residentem non esse sufficientem transportando de loco in locum suo corpori, quod pedibus, alis et pinnis caret, quibus in aura aetherea nitatur. Sexto, et tamen accessus planetae ad Solem et ab eo recessus oriri ex virtute, quae est propria planetae. Haec omnia et naturae sunt consentanea se ipsis et demonstrata hactenus.

I. Jam in figuris geometricis exerceamur, ut appareat, ad quamlibet orbitam planetae repraesentandam quibus legibus opus sit. Esto ut planetae orbita sit circulus, ut hactenus creditum, isque a Sole fonte virtutis eccentricus. Sit ille eccentricus CD,





Fig. 89.

Fig. 90.



centro B diastemate BC descriptus: in eo BC linea apsidum, et A Sol et BA eccentricitas. Dividatur eccentricus in partes quotcunque aequales, initio a linea apsidum facto in C: quarum termini connectantur cum A. Erunt igitur CA, DA, EA, FA, GA, HA terminorum partium aequalium distantiae a fonte virtutis. Jam centro β , diastemate $\beta\gamma$, quod sit aequale ipsi AB, scri-

batur epicyclus $\gamma\delta$, divisus in totidem cum eccentrico partes invicem aequales, a γ initio facto: et linea $\gamma\beta$ continuetur, ut $\beta\alpha$ aequet BC: et punctum α connectatur cum terminis partium epicycli aequalium, lineis $\gamma\alpha$, $\delta\alpha$, $\epsilon\alpha$, $\zeta\alpha$, $\eta\alpha$, $\theta\alpha$; eruntque lineae hae aequales ordine distantibus ab A in eccentrico exstructis: id enim supra capite secundo demonstratum est. Centro igitur α diastemate $\delta\alpha$ scribatur arcus $\delta\iota\theta$, secans diametrum $\gamma\zeta$ in ι ; eodem vero centro α diastemate $\alpha\epsilon$ scribatur arcus $\epsilon\lambda\eta$, secans diametrum $\gamma\zeta$ in λ , et connectantur termini partium aequaliter distantium a γ aphelio epicycli lineis $\delta\theta$, $\epsilon\eta$, quae secant eandem diametrum in κ , μ signis, sic ut $\alpha\delta$ vel $\alpha\iota$ sit longior quam $\alpha\kappa$, et $\alpha\epsilon$ vel $\alpha\lambda$ longior quam $\alpha\mu$.⁶¹)

Quodsi possibile esset, planetam ire perfectum epicyclum vi insita, et simul orbitam ejus esse perfectum circulum, tunc similes arcus simul perfici cogitandi essent, cum in eccentrico tum in epicyclo. Itaque jam statim pateceret, quibus mediis, qua mensura efficeretur distantia $\alpha\iota$ aequalis ipsi AD. Nam quia $\alpha\iota$, $\alpha\theta$ aequales, planeta ex γ in θ iens, distan-

tiam $\alpha\theta$ necessario et sine speciali consilio efficeret justam et aequalem ipsi A D.

At praeterquam quod is cum axioma quinto pugnare videtur, qui dicit, planetam vi insita progredi de loco in locum ex γ in θ , multa etiam alia absurda involvuntur. Ducatur enim ipsi B D parallelos A N, et sit A N aequalis ipsi B D, et centro N scribatur epicyclus, qui per D ibit. Cum igitur, existente C D perfecto circulo, iidem perficiantur anguli a planeta D apud B centrum eccentrici et ab N centro epicycli apud centrum Solis A (per aequipollentiam demonstratam capite II.), diametro epicycli N D, qui planetam in D habet, manente ipsi A B parallelo respectu situs in mundo: ideo hic poneretur eadem celeritas N centri epicycli circa a Solem et D planetae circa B centrum epicycli, ita ut simul intenderentur isti motus et simul remitterentur: et quia intensio et remissio est a majori vel minori distantia corporis planetae a Sole, ideo centrum epicycli, manens in eadem distantia, fingeretur tarde vel celeriter moveri propter planetam distantem longius vel brevius a Sole.

Et quamvis virtus planetas vehens celerior est omnibus omnino planetis, ut ostensum cap. XXXIV, hic tamen esset nobis supponendus imaginatione unus virtutis ex Sole radius A N, seu linea, in qua N centrum epicycli perpetuo maneret: quae linea cum ipso centro N interdum esset tarda, interdum volox; iterum contra ea, quae supra dicta, quod virtus in eadem distantia eandem perpetuo praestet celeritatem: planetam vero deberemus ponere sese evolventem ex hoc imaginario radio A N in partes contrarias temporibus aequalibus inaequaliter, prout ipse hic radius vel celer vel tardus fieret. (Hoc ultimum declinatur infra cap. XLIX. ceteris absurdis manentibus.) Quo pacto geometricis quidem veterum suppositionibus propiores fieremus, sed a physicis speculationibus aberraremus quam longissime, ut ostensum cap. II. Neque sufficiunt cogitationes meae ad eruendum modum, quo ista contingere possent naturaliter.

Simplicius igitur cogitarentur ista, si inspiceremus N D diametrum epicycli sibi ipsi perpetuo parallelum manentem. Tunc igitur planeta hunc motum conficeret, imaginatione non epicycli sed centri eccentrici B, et tuendo sese in eadem perpetuo distantia ab illo centro. At sub principium operis cap. II. dictum est, absurdissimum esse, ut planeta (quamvis eum mente instruas) imaginetur sibi centrum et ab eo distantiam, in quo centro nullum peculiare corpus pro nota insit. Et quamvis dixeris, planetam respicere ad Solem A, et jam antea scire memoriter, quales ordine distantiae a Sole perfecti eccentrici contingere debeant: primum hoc remotius est et indiget mediis, quae effectum perfecti circularis itineris cum signo crescentis et decrescentis diametri Solis connectant, etiam in aliqua mente. Id autem medium non est aliud, nisi positio centri eccentrici B in certa a Sole distantia; quod jam modo dictum, a nuda mente fieri non posse.

Non nego, cogitari posse centrum, et circa id circulum. Sed hoc dico, si centrum cogitatione sola consistat, nullo tempore, nullo signo externo, non posse circa id ordinari realiter corporis alicujus mobilis iter perfecte circulare.

Praeterea si planeta suas justas distantias a Sole lege circuli ordinatas depromeret ex memoria, depromeret indidem etiam tanquam ex tabulis Prutenicis aut Alphonsinis aequales arcus eccentrici, decurrendos inaequalibus temporibus, et decurrendos vi extranea ex Sole; et sic praesciret memo-

riter id, quod extranea et bruta ex Sole virtus esset effectura. Quae omnia sunt absurda. Praesertim cum, Aristotele teste, infiniti nulla sit scientia; infinitum autem misceatur huic intensionis et remissioni.

Sed bene habet, quod ipsae etiam observationes perfectum circulum CD infra cap. XLIV. non sunt passurae: nec imbecilles istae (ut putantur) speculationes solitariae consistunt, tantoque minus calumniis sunt obnoxiae. Est itaque magis consentaneum, planetae ipsi nihil esse curae neque epicyclum neque eccentricum, sed opus, quod ipse perficit aut ad quod efficiendum concurrit, esse iter librationum in diametro $\gamma\zeta$ ad α Solem tendente.

Quaeritur jam mensura, qua planeta justas quolibet tempore distantias metiatur? Nobis quidem mensura patet ex geometria et schemate. Quoties enim planeta a Solari virtute promotus est in lineam DA, nos tunc inquirimus angulum CBD, eique aequalem facimus $\gamma\beta\delta$; et sic $\alpha\delta$ vel ei aequalem α dicimus esse justam planetae in D versantis distantiam ab A. Sed hanc propositam mensuram hominibus jam eripimus planetae, dum ipsum ex epicycli amplitudine intra diametri $\gamma\zeta$ angustias redeamus.


Equidem in hac inquisitione facilius dicitur quid non sit, quam quid sit. Nam quia planeta momentis iis, quibus a Sole fuit collocatus in lineas ex A per C, D, E, F, G, H. ductas, ipse ponitur effecisse distantias ordine has: $\gamma\alpha$, $\iota\alpha$, $\lambda\alpha$, $\zeta\alpha$, $\lambda\alpha$, $\iota\alpha$. Quodsi igitur via planetae est perfectus circulus, tunc aequalibus partibus eccentrici CD, DE, EF respondent inaequales descensus planetae in diametro, nempe $\gamma\iota$, $\iota\lambda$, $\lambda\zeta$, et quidem turbato ordine, sic ut non supremi sint minimi, imi maximi, sed ut medii sint maximi $\iota\lambda$, extremi $\gamma\iota$, $\lambda\zeta$ minores, et summi $\gamma\iota$ paulo minores imis $\lambda\zeta$ respondentibus. Sunt enim aequales $\gamma\kappa$ et $\mu\zeta$, et $\gamma\iota$ minor quam $\gamma\kappa$, $\lambda\zeta$ vero major quam $\mu\zeta$.

Atque haec eadem causa impedit, quo minus $\gamma\iota$, $\iota\lambda$, $\lambda\zeta$ proportionentur vel temporibus confectorum aequalium arcuum CD, DE, EF, vel angulis ad Solem CAD, DAE, EAF. Tempus enim seu mora planetae in partibus eccentrici aequalibus, CD, DE, EF, a summo ad imum continue minuitur; anguli ad Solem continue augentur; librationes vero $\gamma\iota$ augentur in medio, ut $\iota\lambda$.

Igitur si iter planetae est perfectus circulus, mensura descensus planetae in diametro $\gamma\zeta$ neque tempus est, neque spatium eccentrici confectum, neque angulus ad Solem. Et has quidem mensuras etiam physicae speculationes repudiant.

Quidsi igitur hoc dicamus: etsi motus planetae in epicyclo non contingat, sic tamen dispensari hanc librationem, ut distantiae a Sole efficiantur similes iis, quae existunt epicyclo vere decurso?

Primum tribuitur virtuti, quae planetae propria est, cognitio epicycli imaginarii ejusque effectuum in ordinandis distantis a Sole: tribuitur et cognitio futurae celeritatis et tarditatis, quam causaturus sit motus com-



munis ex Sole; quia hic necessario ponitur eadem intensio et remissio imaginaria motus epicycli imaginarii, quae motus veri eccentrici; quae sunt incredibilia quam priora, ubi motus corporis cum epicycli vel eccentrici cognitione conjunctus fuit. Itaque, quae ibi disputata sunt contra, hic intelliguntur repetita; pene n. coincidunt sententiae.

Et tamen in penuria melioris sententiae in praesens nobis est acquiescendum in hac. Quae quo plura absurda involvit, hoc libentius infra cap. LII. physicus aliquis admittet, quod observationes testabuntur, iter planetae non esse circulum.

II. Dictum est hactenus de mensura, quae formam hujus librationis respicit: restat ut et mensuram hujus mensurae, scilicet quantitatis seu motus per locum inquiramus. Nec enim satis est, scire planetam, quantum absistere debeat a Sole: quin et hoc requiritur, ut sciat, quid faciens justo intervallo absistat.

Quem igitur ista suppositio itineris perfecte circularis eo adegit, ut mentem in planeta collocaret, quae huic librationi praesideret, is aliud dicere non poterit, quam hoc, respicere mentem planetae ad diametri Solis amplitudinem crescentem et decrescentem, et hoc usam signo intelligere, quantas a Sole effecerit quolibet tempore corporis sui distantias. Quia ut nautae non possunt intelligere ex ipso mari, quantum undarum spatium confecerint, eo quod iter illud nullis sit distinctum limitibus, sed vel ex diuturnitate navigationis, si ventus et unda constantes manserint, et navis nunquam quieverit, vel ex venti plaga et altitudinibus poli diversis, vel ex omnium horum aut aliquorum saltem juncta consideratione; vel si diis placet, ex rotularum nonnullarum coagmentatione, pinnarum ope in undas demissarum, agitanda; cujusmodi instrumentum vani quidam mechanici profitentur, qui oceani fluctibus continentis quietem transscribunt: eundem plane ad modum planetae mens locum seu spatium versus Solem confectum metiri se ipsa non potest, cum pura intersit aura aetherea, nullis distincta signis; sed aut tempore utitur, et per tempus illud aequali contentione virium, quod jam est in superioribus negatum; aut machina corporea, quod est ridiculum (ponimus enim sidera rotunda exemplo Solis et Lunae: quin et verisimile est, universum campum aerae aetherae una ire cum planetis); aut denique signis aliquibus idoneis cum mutata planetae a Sole distantia variabilibus, cujusmodi praeter unicam Solis diametrum apparentem nullum aliud suppetit. *) Sic nos homines scimus, Solem a nobis abesse 229 suis diametris, quando ejus diameter habet 30', et 222 diametris, quando habet 31'.

Et sane, si certum esset, motum hunc in epicycli diametro proprium non posse perfici a virtute aliqua planetae materiali et corporali sive magnetica, non etiam a nuda animali, sed gubernari a planetae mente, nihil absurdi statueretur. Quod enim Sol alias etiam observetur a planetis, testantur et latitudines. Cum enim planetae causa harum a media et regia via hujus virtutis ex Sole, ceu ab ipso torrente fluminis ad latera secedant, ut dictum capite XXXVIII, nisi Solem respicerent interim, accessusque et recessus in linea per centrum Solis tendente perficerent, tunc circulos describerent, qui ex Terra vel ex centro mundi apparerent minores, paralleli cum aliquo maximo. At describunt omnes planetae maximos circulos, qui

*) Ita planetae fierent *γεωμετραι*, distantiam metientes sui a Sole per unam stationem, sc. ex apparenti quantitate corporis Solis.

eclipticam in locis ex Sole oppositis secant, quod supra cap. XII. XIII. XIV. de Marte ex observationibus est demonstratum. Ergo et diameter libratoria $\gamma\zeta$ versus Solem ipsum tendit, et latitudines Solem omnino respiciunt. Etsi hoc quoque de latitudine infra parte V. a mentis partibus ad naturae partes et magneticas facultates sum traducturns. Nec mihi hoc dixeris, oppido parvam esse hanc Solis diametrum ejusque variationem, ut pro regula esse non possit. Certum enim est, in nullo planetarum penitus evanescere. Cum enim in Terra sit 30', in Marte obtinebit 20, in Jove 7, in Saturno 3, at in Venere 40, in Mercurio plane 80, et usque ad 120. Neque de parvitate hujus corporis, sed de sensuum humanorum inepta crassitie querare, qui ad tam parva percipienda non sequuntur.

Ecce hoc quantulumcunque corpus aptum tamen est, quod in superioribus demonstravi, ad movenda in circulum tam remota corpora. De illuminatione mundi a tantillo corpusculo sciunt omnes. Credibile est itaque, si qua facultate praediti sunt motores illi observandae hujus diametri, eam tanto esse argutiorem quam sunt oculi nostri, quanto opus ejus et perennis motio nostris turbulentis et confusis negotiis est constantior.

An ergo binos singulis planetis tribues oculos, Keplere? Nequaquam. Neque est necesse. Neque enim ut moveri possint, pedes ipsis atque alae sunt tribuendae. Orbis vero solidos Braheus jam eliminavit. Neque exhaust nostra speculatio omnes naturae thesauros, ut per nostram scientiam stet, quot sensus esse debeant. At etiam exempla nobis admirabilia sunt in promptu. Dic enim physice, quibus oculis astrorum loca in zodiaco speculantur facultates animales corporum sublunarium, ut harmonica dispositione (quem aspectum dicimus) inter ea deprehensa subsultent et in opus suum exardescant? An etiam oculis suis signavit mater mea loca siderum, ut sciret, se natam in configuratione Saturni, Jovis, Martis, Veneris, Mercurii, per sextiles et trinos; eoque iis potissimum diebus liberos suos, praesertim me primogenitum eniteretur, quibus quam plurimi eorundem aspectum, praesertim Saturni et Jovis recurrerent, aut quam plurima loca pristina quadratis, oppositis, et ipsis corporibus possiderentur? Quae sane in omnibus exemplis deprehendi, quotquot ad hunc diem obtigerunt. Sed quid ego haec aequae absurda atque illa, nisi illis, qui in natura sese diligentius exercerunt, quam hodie usitatum est? (Comp. Vol. II, p. 646.)

Idem igitur ille, quem hic ponimus dicere, planetae iter esse perfectum circulum, hoc dicet, planetam affectare sua libratione, ut in qua proportionem sunt lineae $\delta\alpha$, $\epsilon\alpha$, $\zeta\alpha$ vel aequales illis $\iota\alpha$, $\lambda\alpha$, $\xi\alpha$ ad longissimam $\gamma\alpha$, in eadem fere (nam cap. LVII. erit proportio paulo alia.) proportionem eversa videantur ipsi diametri Solis post aequales eccentrici arcus confectos; et hac diametrorum Solis consideratione venire dictis temporum articulis ex γ in ι , λ , ξ propinquitates.

Sciendum tamen, non bene quadrare invicem augmentum diametri Solis et arcus epicycli; itaque memoriam huic menti motrici valde bonam esse oportet, ad aequalia augmenta diametri Solis accommodanti inaequales sinus versos arcuum epicycli: quo de infra cap. LVI, LVII.

III. Atque haec de signo confecti spatii dicta sunt. Restat, ut tertio et de animali facultate transvectandi corporis planetarii tribus verbis moneam: eum, qui dicat, vi insita transportari corpus planetae, nullo modo verisimilia dicere; hoc enim negavimus in principio. At neque Soli simpliciter transscribi potest vis haec. Idem enim, qui planetam attrahit, vicissim

etiam repelleret: quod pugnat cum simplicitate Solaris corporis. Qui vero peculiari quadam ratione hanc translationem in consensum mutuum corpori Solis et planetae refert, is totam hujus capitis materiam aliter informat: eoque nomine deputatum est infra huic rei peculiare caput LVII.

Vides lector considerate et ingeniose, quod haec opinio de perfecto circulo eccentrico itineris planetarii multa incredibilia in speculationibus physicis involvat; non quidem quod Solis diametrum menti planetariae pro signo ponit: faciet enim id forsitan ipsa etiam verissima sententia; sed quod incredibilia transscribat et menti et animae motrici.

At nos, qui vero propinqui sumus, jam porro speculationes istas, nondum licet undique perfectas, idoneas tamen motibus Solis, in numeros conjicere discemus. Proderit tandem ad exactiorem veri inventionem, quae reservatur in caput LVII, nos hic fuisse prius exercitatos.

Caput XL.

Methodus imperfecta, aequationes ex physica hypothesis computandi, quae tamen sufficit theoriae Solis vel Terrae.

Tam prolixa disputatione opus fuit, ut via strueretur ad naturalem aequationum formam, de qua parte quarta plura sum acturus. Nunc redeundum ad aequationes eccentrici Solis in specie, quae potissima est hujus partis tertiae materia, et cujus gratia praemissa sunt generalia illa per capita 8 praecedentia.

Primus meus error fuit, viam planetae perfectum esse circulum, tanto nocentior temporis fur, quanto erat ab auctoritate omnium philosophorum instructior et metaphysicae in specie convenientior. Sit ergo via planetae perfectus eccentricus: nam insensile est in theoria Solis, quantum ei ovalis forma detrahit. Quae vero propter hanc deviationem sunt necessaria futura in planetis ceteris, infra sequentur cap. LIX et LX. Cum ergo sint morae planetae in aequalibus eccentrici partibus ad invicem in ea proportionem, in qua sunt ipsae partium illarum distantiae, at puncta singula in toto semicirculo eccentrici distantiam mutant, non levem operam mihi sumsi, ut inquirerem, quomodo singularum distantiarum summae haberi possent. Nam nisi summam omnium, quae sunt tamen infinitae, habuerimus, non poterimus dicere, quanta sit cujusque mora: quare aequatio ignorabitur. Ut enim tota summa distantiarum est ad tempus totum periodicum, sic pars summae distantiarum quotolibet ad suum tempus. Igitur initio eccentricum secui in partes 360, quasi hae essent minimae particulae, et posui, quod intra unam hujusmodi partem distantia nihil mutetur. Distantias igitur ad initia partium sex graduum methodo capitis XXIX. investigavi, easque in unam summam conjeci. Postea tempori revolutorio, quamvis definitum esset 365 diebus et 6 horis, aliud et rotundum nomen posui, dixique illud valere gradus 360 seu integrum circulum, qui est apud astronomos anomalia media. Ut ergo summa distantiarum ad summam temporis, sic habere feci quamlibet distantiam ad suum tempus. Denique tempora per singulos gradus accumulavi, collatisque his temporibus, seu gradibus anomaliae mediae cum gradibus anomaliae eccentrici, seu cum numero partium, ad quas usque quaerebatur distantia,

eccentri, cujus aequatio optica est angulus BGA. Ergo residua area, trianguli scilicet BGA, est excessus (hoc loco) anomaliae mediae supra anomaliam eccentrici; et ejusdem trianguli angulus BGA est excessus anomaliae eccentrici CBG supra coaequatam CAG. Ejusdem itaque trianguli cognitio utramque partem aequationis prodit; respondentem anomaliae coaequatae GAC.

Atque hinc etiam causa patet, cur supra capite XXX. XXXI. partes aequationis dixerim in theoria Solis quam proxime aequales. Nam quia quemlibet arcum eique superstantem angulum ad centrum (ut prius CG et CBG) metitur area sua, qui sector dicitur, ut area CBG, collocato ergo pede circini in G et diastemate GB arcus circumferentiae scribatur, secans GA in O. Igitur ut area GBC ad angulum GBC, sic area BGO ad angulum BGO. Sed angulus BGO est pars aequationis optica, itaque area GOB per duplicationem aequationis partis metietur partem opticam aequationis, cum in nostro calculo prius explicato ipsa area tota GBA sit propter partem aequationis physicam consulenda. Etsi igitur AGB, genuina mensura partis aequationis physicae, excedit OGB, oblatam mensuram partis opticae, spatiolo seu area OAB (et versus perigaeum hujusmodi aliquo spatiolo vicissim ab eo superatur): in parva tamen eccentricitate, cujusmodi est Solis vel Terrae, in qua versamur hac tertia parte, hoc non est sensibile. Nam quo propius lineam apsidum venit, hoc exilius fit totum triangulum AGB, quare et particula ejus AOB, quantumvis crescente tunc ejus altitudine AO. In longitudinibus vero mediis BEA angulus cum sectore suo alicubi plane mensuratur ab area BEA, et excessus cum defectibus incipiunt permutari.

Itaque summa differentia, quae contingere potest, in octantes seu loca inter apsides et quadrantes intermedia accumulatur: quae quanta sit, jam patefiet. Cum enim in theoria Martis aliquamdiu eadem usus fuerim computandi forma per areas, non potuit haec differentia negligi propter magnam planetae eccentricitatem. Nec duplicatio partis aequationis opticae citra sensibilem errorem fuit. Quare exploranda fuit planities trianguli aequatorii. Potest id fieri variis mediis, sed compendiosissimum adscribam.

Notum est: aequaealta triangula esse in proportionem basium, dico et aequaebasia esse in proportionem altitudinum.

Sint AGB, AHB super eadem basi AB, continuata in C. Agatur ex G recta GN parallelus communi basi AB, secans HB in N, et connectatur N cum A, et ex trium triangulorum verticibus G, H, N agantur perpendiculares in basin GM, HL, NP, determinantes triangulorum altitudines. Cum ergo GN et MP sint paralleli, et GM, NP perpendiculares, erunt igitur GM, NP aequales. Sed GM est altitudo trianguli AGB, et NP est altitudo trianguli ANB. Triangula igitur ANB, AGB sunt aequaealta; et quia simul super eadem basi AB, sunt igitur aequalia. Et cum ANB sit pars de AHB, et communis linea basium HB et communis vertex A, triangula igitur NAB, HAB sunt aequaealta. Quare ut basis NB ad BH sic NAB ad HAB. Sed NAB et GAB probata sunt aequalia. Ergo ut NB ad BH sic GAB ad HAB. Ut vero BN ad BH sic NP ad HL, eo quod NBP et HBL similia triangula. Ergo etiam ut NP ad HL sic GAB ad HAB. Sed NP et GM aequales. Ergo ut GM ad HL, altitudo ad altitudinem, sic GAB area ad HAB aream. Quod erat demonstrandum.

Sit jam BE perpendicularis ad CD, et triangulum BEA rectangulum in B: erit BE altitudo et BA basis. Ducta ergo 900 (sc. dimidia basis BA, quae est in Sole 1800) in altitudinem BE, scilicet 100000, qui est circuli radius, creatur area trianguli BEA (Eucl. I, 41) sc. 90000000. At area circuli, cujus radius est 100000 (ex recentissima recognitione Adriani Romani solertissimi geometrae²³) est 31415926536, ne unius quidem harum particularum errore. Et ut haec circuli area se habet ad 360° anomaliae mediae seu temporis, hoc est ad 21600' vel 1296000": sic in eadem proportionem area trianguli 90000000 se habet ad 3713", hoc est 1° 1' 53". Itaque area BEA valet 1° 1' 53". Sed et angulus BEA capitibus XXXIX. XXX. fuit 1° 1' 53". Aequationis igitur utraque pars aequalis est hoc loco, circa gradum scilicet 90.

In ceteris gradibus anomaliae eccentrici sic agendum. Cum BEA sit 3713", ut ergo EB altitudo ejus ad HL vel GM altitudines ceterorum, hoc est sinus totus ad sinus HBC, GBC anomaliae eccentrici: ita 3713" ad areas reliquorum triangulorum. Ita multiplicabitur 3713" in sinus angulorum ad B, et abjectis quinque ultimis cyphris erunt residua scrupula secunda partis aequationis physicae, illi angulo ad B respondentia. Exempli causa sit HBC 45° 43' 46", quantus supra cap. XXXI. fuit. Sinus igitur 71605 in 3713" ductus abjectis 5 ultimis constituit 2659", hoc est 44' 19", quam partem aequationis supra in tabula assumimus esse 43' 46" aequalem parti opticae. Itaque hic areola ABO ubi maxima, 33" non excedit.

Atque haec est quarta illa ratio aequationes eccentrici computandi, qua de supra sub finem capituli XXXI. coepi dicere, quae naturam ipsam rerum et speculationes capitibus XXXII. XXXIII. praemissas proxime exprimit.

Sed tamen paralogismus inest in argumentatione mea, non magni quidem momenti, ortus inde, quod Archimedes circulum secuit quidem in infinita triangula, sed rectis angulis circumferentiae insistentia, ut quorum vertex in B circuli centro. At triangulorum cum A vertice in circumferentia insistentium ratio non est eadem, quia circumferentia a rectis ex A eductis ubique, praeterquam in C, D punctis oblique secatur. Et posset errorem experientia deprehendere, quod ipse quoque feci, assumtis omnibus distantibus AC, AG, AH ad singulos gradus integros anguli CBG, GBH (quae distantiae, etsi in tabula capite XXX. praemissa situ respondent singulis gradibus integris anguli ad A, itaque minutim sectis angulis ad B: [angulos minutim sectos dico, cum gradibus adhaerent minuta.] facile tamen cuilibet gradui integro anguli ad B sua distantia ab A proportionaliter attribui potest) iisque in unam summam coniectis. Nam conficitur summa major quam 36000000, cum tamen distantiae a B 360 efficiant summam non aliam, quam 36000000. Atqui si utraque summa eadem area circuli mensuraretur, debuerunt hae summae esse aequales.


Demonstratur autem in hunc modum error. Trajiciatur per B recta quaecunque praeter CD, secans circumferentiam, sitque EF: et connectantur puncta sectionum E, F cum A. Cum igitur A signum non comprehendatur linea EF, fiet EAF figura seu triangulum; quare EA, AF junctae longiores sunt quam EF. Sed area circuli continet summam omnium EF, ergo continet summam, quae minor sit quam omnes EA, AF, cum inter quaecunque puncta eccentrici opposita et A tale constituatur triangulum, praeterquam inter C, D et A, ubi pro triangulo fit linea recta.

Porro eadem ratione demonstratur, etiam (ut hoc obiter addam) distantias ab A, respondentes omnibus 360 gradibus integris anguli ad A (quae sunt in superiori capitis XXX. tabula), collectas in unam summam esse minores quam 36000000. Trajiciatur enim per A punctum recta quaecunque, praeter DC, quae sit EV, et connectantur E, V cum B. Erunt in triangulo EBV rectae EB, BV junctae longiores quam EA, AV duae distantiae oppositae. Sed EB, BV omnes 360 collectae faciunt 36000000, ergo EA, AV omnes 360 collectae facient minus quam 36000000.

Ut igitur repetam, quae jam sunt dicta, haec aequationum methodus compendiosissima quidem est, et naturalibus motuum causis hactenus explicatis innititur, sed et in theoria Solis vel Terrae scrupulosissime satisfacit observatis, sed tamen in duobus peccat: primo, quod ponit orbitam planetae esse perfectum circulum, quod verum non esse infra demonstrabitur cap. XLIV; (Posita elliptica orbita planetae nihil peccat haec methodus. Nota ergo illam.) secundo, quod plano utitur non exacte metiente distantias omnium punctorum a Sole: quarum tamen causarum altera alteram, quod miraculi loco sit, exactissime tollit, ut infra demonstrabitur capite LIX.

Et quia haec aetas praestantissimos habet geometras, qui interdum in rebus non ita manifesti usus desudant diutissime, appello omnes et singulos, ut hic me juvent in plano aliquo inquirendo, quod aequipolleat collectis universis distantis. Geometrice quidem (late accepta voce) id ipse inveni: sed doceant me numerare, quod ego geometrice delineavi; imo doceant figuram inventam quadrare. Explicetur igitur semicircumferentia CED (Fig. 91)

Fig. 92.



in lineam rectam, et dividatur in partes totidem quot prius, punctis G, H, E, I, K: et ex punctis divisionum erigantur perpendiculares aequales radio CB: et claudatur parallelogrammum. Erit id duplum ad triangulum Archimedeum, quo semicirculi aream is metitur. Quodsi ex sectoribus singulis in hunc modum singula feceris parallelogramma, tunc totum parallelogrammum divisum in partes aequipollebit toti areae semicirculi: ubique scilicet regnabit ratio dupla.

Extendantur autem in hunc eundem modum et distantiae CA, GA &c. et puncta A connectantur conchoide*) AAAA per singula puncta ducta (quorum sunt infinita potentia), figura AACD aequipollebit distantis omnibus ex A. Nam similiter ex singulis lineis AG, AH factum est unum parallelogrammum quam proxime, nisi quod conchois ipsi CD parallelos non est, sed sic inclinata ad radios GA, HA, EA, ut in ipso etiam circulo inclinantur distantiae ad circumferentiam: ut ita nihil impediat, quod conchois AA longior est facta quam semicirculus CD. Est autem EA longior quam EB; quodsi sumerentur CA, GQ, HR, EB, IS, KL, DA, quantas determinant perpendiculares demissae ex A in distantias punctorum a B (ut si in schemate circulari in HB continuatam descenderet perpendicularis AB, determinans HR breviorum quam HA) tunc figura inter

*) Conchoidea dico non illam Nicostrati (Nicomedia), quae infinita est, sic illi dicta, quod similis conchae: sed illam, quae similis est conchoide Nicostrati: ut rhomboides dicimus id quod est simile rhombo. (Comp. p. 93.)

conchoidea AQRBSLA et CD plane esset aequalis figurae CBBB. Nam conchois secaret BB in linea EA; et quia BA suprema et infima sunt aequales, et BQ aequalis ipsi LB, et BR ipsi SB &c.: ergo figurae BBRQA et BBALS essent congruae, quarum altera defectus, altera excessus est figurarum CBBE et EBBB aequalium: tota igitur figura inter AQRBSLA et CD toti inter BB et CD aequalis est. Itaque spatiolum inter duas conchoides AQRBSLA et AAAAAAA metitur excessum distantiarum ex A super distantias ex B, in ea quidem mensura, in qua parallelogrammum ponitur aequale omnibus distantis ex B.

Et nota, quod spatium hoc non est ejusdem latitudinis in locis a linea EA aequaliter remotis, sed infra latius. Nam in schemate circulari continuetur HBR in V, ut AH, AV respondeant angulis HBE superiori et FBV inferiori aequalibus et aequaliter a mediis punctis E, F remotis. Et centro A diastemate AV per AH et BH arcus circuli ducatur XY. Si ergo AY connexueris, erit AYR plane congruum triangulo AVR: nam AV et AY et AX sunt aequales ex constructione, et longiores; sed et VR, RY sunt aequales et minores. Ex puncto vero H extra circumferentiam XY ductae sunt duae HX per centrum A et HY praeter centrum, ergo HY est longior quam HX; major ergo AV vel AX augetur breviori XH, et minor VR vel RY augetur longiori YH: et tamen tota RH manet brevior quam tota AH. Ergo differentia RH et AH minor est differentia RY et AX, hoc est differentia VR et VA. Itaque in conchoide SA major est, RA minor, etsi IE, EH aequales. Non ergo bisecatur ab EA spatium inter duas conchoides: videtur autem bisecari a BB, quod exploret geometra aliquis, et simul doceat quadrare spatium inter conchoides, ut numerationibus aptum fiat. Infra cap. XLIII. invenies aestimationem crassam hujus spatii.

Haec itaque de physicae aequationis computatione generaliter praemittere volui, ut, quamvis ea nondum a necessariis geometriae adminiculis satis est instructa, sed neque dum omnes inaequalitates planetarum patefactae (cum praesertim praesupposuerimus, viam Solis vel Terrae esse perfectum eccentricum, quod tamen infra de Marte negabitur cap. XLIV. et LIII.), non tamen nimium haec operatio a sua speculatione praemissa divideretur. Nam quod theoriam Solis attinet, in qua fuimus hactenus versati, nihil nobis incommodat neque conchoidis spatii neglectio, qua minus justo sumimus, neque perfecti eccentrici assumptio, qua ratione abundare videmur: in quantum jam judicari potest nondum omnibus explicatis. Imo haec hoc capite sub paralogismi nota rejecta, infra, cum ad verissimum modum aequationum venerimus, resumentur, eliminato illo ex hypothesis ista, quod paralogismo dedit occasionem.

Cum ergo causam et mensuram inaequalitatis secundae, quae planetas visui stationarios, directos et retrogrados exhibet, per certissimas observationes et demonstrationes ad unguem descripserim, ostenso, quod et ipsa haec secunda inaequalitas communicet de inaequalitate prima, et quod theoria Solis vel Terrae (Copernico) vel epicycli (Ptolemaeo) similis sit theoriae ceterorum planetarum, et causis physicis hujus inaequalitatis primae inventis adque calculum pro theoria Solis accommodatis: jure merito hic tertiam partem, quasi quoddam antemeridianum pensum, interposito prandio, finio: succinente mihi remissionum animi magistro:

Pars superat coepti, pars est exhausta laboris:

Hic teneat nostras anchora jacta rates.

COMMENTARIORUM
DE MOTIBUS STELLAE MARTIS
PARS QUARTA.
INVESTIGATIO VERAЕ MENSURAE
PRIMAE INAEQUALITATIS
EX CAUSIS PHYSICIS ET PROPRIA SENTENTIA.

Quae tertia parte demonstrata sunt, ad omnes planetas pertinent: unde non injuria clavis astronomiae penitioris dici possunt. Quam tanto magis gaudere debemus inventam, quanto certius est, nulla alia ratione investigari potuisse, praeterquam per stellae Martis observationes. Nam etsi quidem Ptolemaeus bisectionem hanc eccentricitatis Solis in Venere quoque et Mercurio deprehendit; eoque nomine eccentros eccentricorum, seu quod idem est, gyrationes centri epicycli introduxit, quae demonstratio reservatur in proprios de his planetis tractatus: observationum tamen ipsarum conditio, et breves Veneris a Sole digressiones, quae non nisi humilem observari de nocte patiuntur, methodicae inquisitioni hujus rei plurimum impedimenti fuit allatura, si citra Martem stetisset. In Mercurio multo absurdius adhuc ista tentabantur: quod is rarissime a Solis radiis emergat, et longius Marte et Venere a Terra distet, cum hi citimi videntur. Fuisset itaque veritas nobis cum Ptolemaeo patentissimis indaganda campis, et per crassas umbras manibus quasi palpanda.

Quantum autem de prima inaequalitate, quae occasione eccentrici accidit et cuique planetae propria est, huic communi, parte tertia inventae, secundae inaequalitati debeamus, jam exemplo stellae Martis declarabitur.

Caput XLI.

Apsidum et eccentricitatis et proportionis orbium inquisitio tentata, ex jam usurpatis observatis extra oppositionem cum Sole, cum falsa tamen conditione.

Supra parte secunda imitatione veterum ex observationibus acronychiis conatus sum invenire aphelium et eccentricitatem, unaque et distantias stellae Martis a Sole in toto circuito. Et aequationes quidem eccentrici fere aliis quoque observatis extra situm acronychium respondebant. Eccentricitas vero et distantiae a Sole repudiabantur a parallaxibus annuis longitudinis et latitudinis. Itaque, ut distantiae stellae a centro Solis per omnem eccentrici ambitum inquiri possent, prius secunda inaequalitas (epicyclica Ptolemaeo, seu orbis annui Tycho et Copernico) parte tertia expedienda fuit. Imo vero, si via planetae perfectus esset circulus, vel jam statim prima planetae inaequalitas, quae est ratione eccentrici, indagari posset. Nam supra capite XXV. methodum tradidimus, ex tribus distantis trium circumferentiae punctorum ab aliquo puncto intra circumferentiam et angulis ad illud punctum inquirere situm et magnitudinem circuli respectu illius puncti, centrum et eccentricitatem cum apsidibus.

Jam capite XXVI. inventa est distantia Martis a centro Solis 147750 in $14^{\circ} 21' 7''$ γ apud nodum, idque anno 1595. d. 25. Oct. Capite vero XXVII. rursum distantia Martis inventa est 163100 paulo minor in $5^{\circ} 25' 20''$ \simeq , et id anno 1590. d. 31. Dec. Et quia Mars 41° abest a nodo, multiplicato sinu 41° in sinum inclinationis maximae cap. XIII. inventae, prodit inclinatio loci $1^{\circ} 12' 40''$. Cujus secans radium superat in centies millenis particulis per 22, quae sunt in dimensione nostra particulae 34. Itaque correctae distantia hujus loci esset 163134 paulo minor. Maneat 163100: secans vero hujus inclinationis in secantem 41° ductus, producit secantem arcus per $50''$ longioris; itaque auferenda $50''$ loco Martis, ut sit $5^{\circ} 24' 30''$ \simeq .

Tertio, capite XXVIII. distantia Martis inventa est 166180 in $8^{\circ} 19' 20''$ η , anno 1590. d. 31. Oct., distans 68° a nodo; itaque inclinatio loci $1^{\circ} 42' 40''$, cujus secans abundat particulis 45, quae sunt in nostra dimensione 75. Itaque correctae distantia 166255. Auferuntur $16''$ loco Martis pro reductione ad eclipticam. Haec tria loca per praecessionem aequinoctiorum ad eundem annum 1590 et mensem Octobrem reducta sic habent.


147750	$14^{\circ} 16' 52''$	γ
163100	5. 24. 21	\simeq
166255	8. 19. 4	η

Apparet, aphelium esse 8° η propius, quam ceteris, quia ejus distantia est longior. Itaque secundum demonstrata capitis XXV. sit (Fig. 93) α centrum corporis Solaris, ex eo educantur $\alpha\theta$, $\alpha\eta$, $\alpha\pi$ in ea proportionem, ut distantiae hic producantur in numeris: et connectantur puncta omnia, et sit angulus $\pi\alpha\theta$ $114^{\circ} 2' 12''$ quantum est a $14^{\circ} \gamma$ in $8^{\circ} \eta$; sic $\pi\alpha\eta$ sit $27^{\circ} 5' 17''$, quantum est ab $8^{\circ} \eta$ in $5^{\circ} \simeq$, et $\eta\alpha\theta$ compositus ex utroque. Sol enim assumitur centrum zodiaci.

Oportet jam investigari circulum, qui per η , π , θ transit: sic ut η , π , θ sint tria loca planetae.

In forma Ptolemaica α erit Terra, centrum zodiaci: η , π , θ tria loca puncti affixionis epicycli. Cetera manent.

Fig. 93.



Igitur in triangulo $\eta\alpha\theta$, dato angulo cum cruribus, invenitur angulus $\alpha\theta\eta$ $20^\circ 26' 13''$. Similiter in $\kappa\alpha\theta$ datur $\alpha\theta\kappa$ $35^\circ 10' 17''$. Unde ablatus $\alpha\theta\eta$ relinquit $\eta\theta\kappa$ $14^\circ 44' 4''$. Sit γ centrum quaesiti circuli. Ducatur $\alpha\gamma$, et linea continuetur in ϵ aphelium et δ perihelium: et connectantur η , κ cum γ . Cum igitur $\eta\theta\kappa$ stet ad circumferentiam et $\eta\gamma\kappa$ apud centrum super eodem arcu $\eta\kappa$, erit igitur $\eta\gamma\kappa$ duplus anguli $\eta\theta\kappa$, scilicet $29^\circ 28' 8''$, et qualium $\eta\gamma$ est 100000, erit $\kappa\gamma$ 50868, duplum scilicet sinus dimidii $\eta\gamma\kappa$. Jam in triangulo $\eta\alpha\kappa$, dato denuo angulo cum cruribus, invenitur $\kappa\eta\alpha$ $78^\circ 44' 1''$, et per hunc $\kappa\eta$ 77187, qualium $\eta\alpha$ 163100. Qualium ergo $\kappa\eta$ prius erat 50868 et $\eta\gamma$ 100000, talium $\eta\alpha$ fit 107486. Et quia $\eta\gamma\kappa$ est $29^\circ 28' 8''$, erit igitur $\kappa\eta\gamma$ dimidium residui ad duos rectos, quia $\eta\gamma$, $\kappa\gamma$ aequales. Itaque $\kappa\eta\gamma$ est $75^\circ 15' 56''$. Hunc aufer a $\kappa\eta\alpha$, restat $\gamma\eta\alpha$ ($3^\circ 28' 5''$). In triangulo igitur $\gamma\eta\alpha$ datur angulus cum cruribus. Quare innotescit $\eta\alpha\gamma$ $38^\circ 15' 45''$. Ac propterea (cum $\alpha\eta$ sit in $5^\circ 24' 21'' \approx$) erit linea apsidum $\alpha\gamma$ in $27^\circ 8' 36'' \approx$. Per angulum vero $\eta\alpha\gamma$ invenitur et $\alpha\gamma$ eccentricitas 9768, qualium $\eta\gamma$ est 100000. Denique in dimensione qualium $\alpha\eta$ est 163100, erit $\eta\gamma$ 151740. Erat autem earundem partium etiam semidiameter orbis annui 100000. Ergo proportio orbium esset ea, quae 100000 ad 151740.

Quae omnia quam sint vitiosa, ex eo colliges, quod, quotiescunque pro una vel pluribus usurpatarum distantiarum $\alpha\theta$, $\alpha\eta$, $\alpha\kappa$ aliam adhibueris competentem alii loco eccentrici, et inventam aequae certa irrefutabilique argumentatione, toties omnia ista prodeunt aliter. Et sequenti capite invenietur certissime ea, quae est 100000 ad 152640 circiter. Eccentricitas 9264, qualium radius 100000. Aphelium vero anno 1590 d. 31. Oct. supra cap. XVI. inventum est in $28^\circ 53' \approx$ quod capite sequenti confirmabitur intra 11'.

Caput XLII.

Per aliquot observationes extra situm acronychium, Marte circa aphelium, itemque alias aliquot, Marte circa perihelium versante, inquirere certissimum locum aphelii, correctionem motus medii, eccentricitatem genuinam, et proportionem orbium.

Jam vidisti lector, de novo nobis incipiendum esse: cum tres Martis locos eccentricos totidemque a Sole distantias ad legem circuli revocatas, aphelium (supra non incertissime constitutum) negare cerneret; unde nobis suspicio orta, viam planetae non esse circulum. Quare ex tribus distantiiis reliquae disci non poterunt. Itaque cujuslibet loci distantia ex suis propriis observationibus exstruenda; omnium maxime aphelia et perihelia, ex quarum comparatione de genuina eccentricitate discimus.

Sit α (Fig. 94) centrum mundi, $\alpha\beta$ linea apsidum, et centro β eccentricus ϵ , et ϵ aphelium, θ perihelium. Ex capite XLI. meliusque ex

capite XVI. intelligimus, observationes, Marte circa α versante, proximas esse has.

I. Anno 1585. d. 17. Febr. hora 10. visus fuit planeta in $15^{\circ} 12\frac{1}{2}'$ ♍, cum lat. borea $4^{\circ} 16'$.

II. Anno 1586. 27. Dec. mane h. 4. in $29^{\circ} 42\frac{3}{4}'$ ♍, lat. $2^{\circ} 46\frac{1}{2}'$ b.

III. Et anno 1587. d. 1. Jan. mane h. 7. 8' in $1^{\circ} 4' 36''$ ♍, lat. $2^{\circ} 54'$ b. et 9. Jan. mane in $2^{\circ} 51\frac{1}{2}'$ ♍, lat. $3^{\circ} 6'$ bor.

IV. Anno 1588. d. 10. Nov. mane h. 6. 30' inter ♂ et Cor ♍ $31^{\circ} 27'$. Declinatio ♂ borea $3^{\circ} 16\frac{1}{4}'$. Quare ♂ in $25^{\circ} 31'$ ♍, lat. $1^{\circ} 46' 43''$ b., d. 5. Dec. mane h. 6. inter ♂ et cor ♍ $45^{\circ} 17'$, declinatio austrina $2^{\circ} 5'$, ergo ♂ in $9^{\circ} 19\frac{3}{4}'$ ♍, lat. $1^{\circ} 53\frac{1}{2}'$ b. Non sunt autem hae observationes confirmatae per fixas sequentes.

V. Anno 1590. d. 6. Oct. cujus diei mane h. 4. 45' observatus est ♂ in altitudine $12\frac{1}{2}^{\circ}$ a cauda Leonis et corde Hydrae, cum declinatione sua: sed quod neutra fixarum a Marte in longitudinem recta porrigeretur, accidit ut ascensiones rectae utrinque et per declinationem exstructae, 6' discreparent: quod facile fieri potest, si minimum aliquid declinationi desit: cui quidem videntur non satis fisci, quod Martem a cauda ♍ mense sunt, quae in eadem longitudine est, distantia omni in latum abeunte, ut scilicet de latitudine Martis hinc certius scirent, quam ex declinatione⁸⁴). Sed retenta declinatione $6^{\circ} 14'$ et distantia a corde Hydrae $34^{\circ} 33\frac{1}{2}'$, fuerit ejus ascensio recta $168^{\circ} 56\frac{1}{4}'$. Itaque locus $17^{\circ} 16\frac{3}{4}'$ ♍, lat. $1^{\circ} 16\frac{3}{4}'$ b. Fixarum tabella refractionis exhibet in hac altitudine 4'; Solis refractionem majorem exhibet; et Virgo ardua surgit: itaque circiter 3' aut (per Solares refractiones) plusculis ultra in consequentia est projiciendus, unde per refractionem erat sublatus. Parallaxis exigua admodum fuit, parum igitur detraxit refractionibus. Fuerit in $17^{\circ} 20'$ ♍.

VI. Anno 1600. 5/15. Martii h. 8 $\frac{1}{2}$, post merid. in $29^{\circ} 12\frac{1}{2}'$ ♍. Lat. $3^{\circ} 23'$ b. Et 6/16. Martii h. 8 $\frac{1}{2}$ in $29^{\circ} 18'$ ♍, lat. $3^{\circ} 19\frac{3}{4}'$ b.

Respondent autem tempora Martem in eundem eccentrici locum restituentia sic invicem:

					Cum locis visis		Et distantia Solis a Terra ex cap. XXX.		
					Martis	Et Solis			
1585.	17. Febr.	h. p. m.	10. 0		$15^{\circ} 12' 30''$ ♍	$9^{\circ} 22' 37''$ ♍	♂	99170	(αδ)
1587.	5. Jan.	" " "	9. 31		2. 8. 30 ♍	25. 21. 16 ♍	♂	98300	(αε)
1588.	22. Nov.	" " "	9. 2 $\frac{1}{2}$		2. 35. 40 ♍	10. 55. 8 ♍	♂	98355	(αζ)
1590.	10. Oct.	" " "	8. 35		20. 13. 30 ♍	26. 58. 46 ♍	♍	99300	(αλ)
1600.	6. Mart.	" " "	6. 17 $\frac{1}{2}$		29. 18. 30 ♍	26. 31. 36 ♍	♍	99667	(αγ)

Reductionis observationum ad tempora debita ratio haec est. Cum anno 1587 diurni Martis sint in decremento, ut et in Magino et in observatione ipsa trium dierum apparet, usurpavi diurnos sic: 17. 16. 16. 15. 15. 14. 14. 13. 13. 13. 12. 12.

Anno 1588. d. 10. Nov. observatio minus habet meridiano Magini loco 39', d. 5. Dec. minus 33'. Et nostrum momentum est intermedium; ergo usurpabimus etiam intermediam differentiam 36'.

Anno 1590. deserta est observatio et per se male habita, ut apparuit, sed tamen diurnus in Magino per plures dies constans est 37'.

Jam ad rem: ac etsi multos hactenus modos docui vel inquirendi vel comprobandi loci eccentrici et distantiae, sequar tamen hic rursum alium, eo quod sit commodissimus. Sint autem loca Terrae δ, ε, ζ, λ, γ nempe

δ , γ ad sinistras, ϵ , κ , λ ad dexteris eccentrici loci partes. Et cum datae sint lineae $\alpha\delta$, $\alpha\epsilon$, $\alpha\kappa$, $\alpha\lambda$, $\alpha\gamma$, et anguli $\alpha\delta\epsilon$, $\alpha\epsilon\kappa$, $\alpha\kappa\lambda$, $\alpha\lambda\epsilon$, $\alpha\gamma\epsilon$, assumam tertium commune in omnibus triangulis, nempe latus $\alpha\epsilon$, unum nempe quaesitorum, et per hoc latus inquiram angulos ad ϵ , qui si lineam $\alpha\epsilon$ in eundem zodiaci locum statuent (nisi quatenus ob praecessionem aequinoctiorum is in sequentibus temporibus est promotior), ex eo intellecturus sum, assumtum $\alpha\epsilon$ bene habere.

Methodi ratio haec, quod ut $\alpha\epsilon$ ad angulos δ , ϵ , κ , λ , γ , sic $\alpha\delta$, $\alpha\epsilon$, $\alpha\kappa$, $\alpha\lambda$, $\alpha\gamma$ ad angulos ϵ .

$\gamma\alpha$ 26° 31' 38"	$\delta\alpha$ 9° 22' 37"	$\epsilon\alpha$ 25° 21' 16"	$\delta\epsilon$ 10° 55' 8"	$\lambda\alpha$ 26° 58' 46"
$\gamma\epsilon$ 29. 18. 30	$\delta\epsilon$ 15. 12. 30	$\epsilon\kappa$ 2. 8. 30	$\kappa\epsilon$ 2. 35. 40	$\lambda\epsilon$ 20. 13. 30
$\alpha\gamma$ 122. 46. 54	$\alpha\delta$ 155. 49. 53	$\alpha\epsilon$ 113. 12. 46	$\alpha\kappa$ 68. 19. 28	$\alpha\lambda$ 36. 45. 16

Horum sinus in distantias Solis et Terrae multiplicati et per assumptam distantiam $\alpha\epsilon$ 166700 divisi, produnt sinus angulorum, qui additi ad visiones Martis in γ , δ , ablati visionibus in ϵ , κ , λ , restituant lineam $\alpha\epsilon$ in haec loca

γ	δ	ϵ	κ	λ
29° 28' 44" Q	29° 18' 19" Q	29° 19' 21" Q	29° 20' 40" Q	29° 20' 30" Q
		Debut in		
29. 30. 51	29. 18. 0	29. 19. 36	29. 21. 12	29. 22. 48
		vel in		
29. 29. 51	29. 17. 0	29. 18. 36	29. 20. 12	29. 21. 48

Nimirum non aliter differre debuerunt loca quinque, quam quanta est differentia praecessionis aequinoctiorum.

Vides autem ex schemate, si ceteris manentibus breviorum assumseris $\alpha\epsilon$, venturam in γ , δ in consequentia, in ϵ , κ , λ in antecedentia, non tamen ubique aequali spatio. At simul hoc feceris, nocueris in δ , κ , λ , profueris in γ , ϵ . Contrarium, si prolongaveris. At consonum est, errorculos hosce distributos haberi per omnia loca. Ergo nihil in distantia $\alpha\epsilon$ mutandum, et planeta praescriptis temporibus est in locis ultimo recensitis.




Fig. 94.

Si lubet ad consensum explorandum uti methodo cap. XXVIII, connexis δ , ϵ punctis invenies $\delta\epsilon$ 74058, $\delta\epsilon\alpha$ 68° 36' 0", $\epsilon\delta\alpha$ 67° 21' 3", quare $\epsilon\delta\epsilon$ 88° 28' 50" et $\delta\epsilon\epsilon$ 44° 36' 46" et $\epsilon\delta\delta$ 46° 54' 24", quare $\epsilon\delta$ 101380 et $\epsilon\alpha\epsilon$ 33° 58' 33", quare $\alpha\epsilon$ anno

1587. in 29° 19' 49" Q (nos jam elegimus 29° 18' 36" differentia scrupuli unius, ob retinendos etiam ceteros locos); denique $\alpha\epsilon$ 166725, et locus κ consentit. Ac cum 166666 $\frac{2}{3}$, sit radii 100000 sesquialtera, credibile est, hanc esse proportionem distantiae mediocris Terrae a Sole et longissimae Martis a Sole: sed nihil conjecturis tribuam in praesens.

Cum autem eccentrici planum hic inclinetur ad eclipticam angulo 1° 48', cujus secans 49 particulis abundat, quae valent 83 in dimensione nostra: verissima igitur distantia δ et \odot erit 166780, quantum quidem ex his observationibus colligendum: quas memineris longiuscule deductas nec in ipsis suis diebus optime comparatas.

Jam etiam ad perigaeum accedamus, ubi catalogus observationum et mediocris cognitio motus medii ostendunt proximas observationes has:

- I. A. 1589. d. 1. Nov. h. 6 $\frac{1}{2}$. vesperi fuit δ in 20° 59 $\frac{1}{2}$ ' δ , cum lat. 1° 36' mer.
 II. A. 1591. d. 26. Sept. h. 7. 10' in 18° 36' δ . Lat. 2° 49 $\frac{1}{2}$ ' mer.
 III. A. 1593. d. 31. Julii mane h. 1 $\frac{1}{2}$. in 17° 39 $\frac{1}{2}$ ' δ . Lat. 6° 6 $\frac{1}{2}$ ' mer. et 11. Aug. mane h. 1 $\frac{1}{2}$. in 16° 7 $\frac{1}{2}$ ' δ . Lat. 6° 18 $\frac{1}{2}$ ' mer.

Respondent autem tempora in hunc modum:

							Dist. Solis et Terrae.
1589.	1. Nov.	h. 6 $\frac{1}{2}$.	p. m.	20° 59 $\frac{1}{2}$ ' δ	19° 13' 56" η		98730
1591.	19. Sept.	" 5. 42'	" "	14. 18 $\frac{1}{2}$ ' δ	5. 47. 3 "	\approx	99946
1593.	6. Aug.	" 5. 14.	" "	16. 56' δ	23. 26. 13 "	\approx	101183

Anno 1591 oportet nos uti confidentia, diurnos eosdem esse cum diurnis Magini: nam observatio solitaria est. Ac cum in Magino moveatur diebus 7 per 4° 16', fuerit ergo Mars 19. Sept. h. 7 $\frac{1}{2}$ in 14° 20' δ , et h. 6 $\frac{1}{2}$ in 14° 18 $\frac{1}{2}$ ' δ . Circa stationem in 16. vel 17. Julii promotior fuit in calculo per 1° 16' circiter quam apud Maginum. Jam 26. Sept. adhuc per 0° 53' est promotior. Diebus itaque 70 deminuta est differentia circiter 23'. Si etiam proportionaliter argumentemur, grandior erit 19. Sept. haec differentia circiter 2'. Credemus igitur, Martem ad nostram horam esse in 14° 20' δ .

Anno 1593. δ a statione abit. Et cum 30. Julii locus Martis media nocte sequente discrepet a meridiano Magini per 3° 25 $\frac{1}{2}$ ', die vero 10. Augusti per 3° 59 $\frac{1}{2}$ ', ita ut augeatur differentia, paulatim tamen minus atque minus: assumsi differentiam die 6. Augusti 3° 46', ut sit hora 1 $\frac{1}{2}$ mediae noctis sequentis in 16° 52' δ et diurnus 10'. Superatur nostrum tempus horis 8. 30', quibus debentur circiter 4' de retrogrado motu δ . Igitur nostro tempore fuit in 16° 56' δ . Certum est, nos (hoc quidem nomine) nihil ultra unum scrupulum ultro citrove aberrare.

Saepius in perigaeo non est observatus. Nam anno 1595. incidit ejus in perigaeum adventus in mediam aetatem, crepusculis in Dania pernoctantibus. Anno 1597 Tycho Brahe in itinere fuit. Prope Solem vero in hiemali semicirculo diu latet, ob celeritatem Solari non multo minorem.

Sit in schemate locus Martis eccentricus θ ; loca Terrae ζ , μ , η et sit $\zeta\alpha$ 19° 13' 56" η $\mu\alpha$ 5° 47' 3" \approx $\eta\alpha$ 23° 26' 13" δ
 $\zeta\theta$ 20. 59. 15 δ $\mu\theta$ 14. 18. 30 δ $\eta\theta$ 16. 56. 0 δ
 vel 20.

Ergo $\alpha\zeta\theta$ 61. 45. 19 $\alpha\mu\theta$ 98. 31. 27 $\alpha\eta\theta$ 156. 30. 13
 vel 32. 57.

Assumpta igitur communi $\alpha\theta$ in longitudine 138400, prodit ejus locus sic:
 Per ζ 29° 55' 20" \approx , μ 29° 53' 6" \approx , η 29° 59' 10" \approx
 vel 54. 36.

At si apud ζ fuit 55' 20", debuit apud μ esse 56' 56", apud η 58' 32", tanta enim est praecessio aequinoctiorum. Apparet igitur ex schemate, lineam $\alpha\theta$ per η nimis in consequentia abire; per μ , ζ respectu ipsius η nimis in antecedentia, quod fit ceteris manentibus, quia $\alpha\theta$ nimis brevem assumsi. Itaque si uno centenario longiorem faciam, scilicet 138500, jam prodeunt haec loca: ex ζ 29° 57' 10" \approx , ex μ 29° 55' 36" vel 29° 57' 6" \approx , ex η 29° 58' 17" \approx .

Jam itaque nimis propinqua invicem facta sunt loca ipsius $\alpha\theta$, et

plus hic peccatur in propinquitate quam illic in remotione. Quare verissima longitudo ipsius $\alpha\theta$ erit 138430 circiter.

Inclinatur hic planum (ut et prius loco opposito) $1^{\circ} 48'$, et secans abundat supra radium particulis 49. Ut vero 100000 ad 138430, sic haec 49 ad 68. Ergo correcta longitudo radii est quam proxime 138500: ex his quidem observationibus longe deductis.

Ex his inquisitio apsidum.

Assumatur respectu omnium trium observationum locus lineae $\alpha\theta$ anno 1589. d. 1. Nov. h. $6\frac{1}{6}$ post merid. in $29^{\circ} 54' 53''$ ∞ , ut sit 1591. in $29^{\circ} 56' 30''$, et anno 1593. in $29^{\circ} 58' 6''$ ∞ . Vicaria hypothesis capitis XVI. exhibet illam primo tempore in $29^{\circ} 52' 55''$ ∞ .

Prius autem assumimus similiter α : anno 1588. d. 22. Nov. h. $9. 2\frac{1}{2}'$ in $29^{\circ} 20' 12'' \Omega$.

Cum ergo ab anno 1588. d. 22. Nov. h. $9. 2\frac{1}{2}'$ usque in annum 1589. d. 1. Nov. h. $6. 10'$ sint dies 344 minus h. $2. 52\frac{1}{2}'$, integra vero revolutio ad eandem fixam habeat dies 687 minus h. 0. 28': apparet nostrum intervallum paucis horis exuere medietatem temporis restitutorii. Ecce

Dies 343. h. 11. 46' dimidia periodus

343. „ 21. $52\frac{1}{2}'$ nostrum intervallum

Excessus „ 10. $6\frac{1}{2}'$.

Et cum prioris temporis loco $29^{\circ} 20' 12'' \Omega$ usque ad locum quem tenuit δ tempore posteriori $29^{\circ} 54' 53'' \infty$, sint $180^{\circ} 34' 41''$, et subtracta praecessione $48''$, residui $180^{\circ} 33' 53''$: quare si horis $10. 6\frac{1}{2}'$ competere in perigaeo de diurno Martis in eccentrico illa residua supra semicirculum $33' 53''$, tunc hinc intelligeretur, aphelium esse in $29^{\circ} 20' 12'' \Omega$. Scimus autem diurnos Martis in eccentrico circa apogaeum et perigaeum, ex jam inventis distantis et ex demonstratis capitis XXXII. Sunt enim diurni quam proxime in dupla proportionem distantiarum. Nam in apogaeo diurnus est circiter $26' 13''$, in perigaeo $38' 2''$, cum mediocritas diurni sit $31' 27''$. Perpende itaque, quod si Mars a puncto apogaei eundo dimidium temporis restitutorii insumat, fine hujus temporis omnino confectis 180° sit futurus in puncto perigaei. At si jam hoc spatium temporis auspicetur uno die postquam in apogaeo fuit, incipiet igitur cursum a $26' 13''$ ab apogaeo finietque in $180^{\circ} 38' 2''$. Itaque dimidio temporis plus dimidio itineris curret per $11' 49''$. Contrarium, si die uno ante apogaeum inciperet.

Cum itaque etiam nostrum tempus arcum exhibuerit majorem, nostrum etiam aphelium promoveri oportet. Primum horas nostras dimidia parte ante aphelium, dimidia post perihelium referemus. Tunc inceperit planeta a $5' 16''$ ante aphelium, quod sic refertur in $29^{\circ} 25' 28'' \Omega$, et venerit in $8' 1''$ post perihelium, quantitate itineris $13' 17''$ ultra 180° . At deprehensum est, iter fuisse $33' 53''$ supra 180° . Ergo per $20' 36''$ est adhuc celerior. Quia ergo, ut iter augeatur per $11' 49''$, requiritur dies unus, sive promotio planetae ab aphelio per $26' 13''$, quantum ab aphelio promovebitur planeta donec augeatur iter per $20' 36''$?

Ostendit itaque proportionum regula diem 1. h. 17. 54' sive distantiam ab aphelio $45' 42''$. Ergo aphelium a loco, quem ei jam dederamus in $29^{\circ} 25' 28'' \Omega$, removendum in antecedentia per $45' 42''$. Cadetque in $28^{\circ} 39' 46'' \Omega$

Anno 1588. d. 22. Nov. supra 28. 50. 44 Ω

Differentia 10' 58''.

Utri aphelii inquisitioni plus fidei tribuendum, incertum. Nam fieri facile potest, ut in positione et assumptione linearum α ϵ , α θ propter observationum incommoda, peccaverimus 4', duobus hinc, duobus inde, quantum quidem ex erroribus conspirantibus accumulari oportet, ut aphelium 2' alterari posset. Hic tamen par est, nos fidere operationi praesenti.

Correctio motus medii.

Mutato loco aphelii mutatur et motus medius. Nam si quo tempore per superiorem aphelii inquisitionem δ existimatur incidere in aphelium, exutus aequatione, eodem tempore jam superavit aphelium minutis 2: habet igitur aequationem 4 minutorum subtractoriam Itaque medio motu superavit illum pristinum locum medium per 4.

Eccentricitatis inquisitio.

Primum corrigantur distantiae prius inventae si opus est eo nomine, quod parumper ab apsidibus jam inventis distent; aphelia per 40', perihelia per 75'. Atqui nihil sensibile mutatur in tanta propinquitate ad apsidas.

Ergo Aphelia . . . 166780 scilicet α

Perihelia . . . 138500 scilicet α θ

Summa . . . 305280 ϵ θ

Dimidium . . . 152640 semidiameter ϵ β

Eccentricitas . . . 14140 α β .

Ut autem 152640 ad 100000, sic 14140 ad 9264 eccentricitatem. Dimidium autem eccentricitatis aequatoriae fuit 9282. Differentia 18, nullius plane momenti. Vides, quam praecise bisecanda sit in Marte eccentricitas aequatorii puncti, ad constituendam centrorum eccentrici et mundi distantiam. Atque hoc supra capite XXXII. pro fundamento usurpavi et in sequentia demonstrandum rejeci; id vero jam est praestitum.

Caput XLIII.

De defectu aequationum, quae bisectione eccentricitatis et arcis triangularibus extruuntur, posita orbita planetae perfecte circulari.

His de bisectione eccentricitatis Martiae certissime demonstratis, quae parte tertia itidem et de theoria Solis evicimus, jam demum tempus esset, ut plena hujus rei fide muniti ad speculationes physicas capitis XXXII. et sequentium, utpote communes omnibus planetis futuras, accederemus: nisi certo consilio mihi visum esset illas praemittere, eo quod illic ratio aequationum ex causis physicis computandarum absolvenda fuit pro theoriae Solis vel Terrae omnimoda perfectione; et quod scirem, ubi illa condendarum aequationum methodus etiam theoriae Martis applicanda fuerit, multo difficiliore speculationes secuturas.

Etenim verissima orbium conformatione inventa, necesse est, indidem etiam aequationes eccentrici sequi, quibus solis hactenus servivit hypothesis illa vicaria capite XVI. inquisita. Id ergo hac vice explorabimus.

Quare secundum demonstrata capitis XL, quae hic omnia et singula repetita intelligantur, sit orbita planetae ex opinione trita circulus; etsi

jam cap. XLI. nos de eo jussit dubitare. Quare in anomalia eccentrici 90° eccentricitas, capite XLII. inventa 9264 , erit tangens, quae ostendet partem aequationis opticam $5^\circ 17' 34''$. Et quia in anomalia eccentrici 90° area trianguli est rectangula, ducto igitur radio in dimidium eccentricitatis, scilicet 4632 , provenit area trianguli 463200000 . Ut autem area circuli 31415926536 ad 360° sive $1296000''$, sic haec jam inventa area 463200000 ad $19108''$ seu $5^\circ 18' 28''$ partem aequationis physicam. Itaque tota aequatio $10^\circ 36' 2''$, ut ita anomaliae mediae $95^\circ 18' 28''$ respondeat coaequata $84^\circ 42' 26''$. At secundum methodum capitis XVIII. vicaria hypothesis, sat fida in longitudine, ostendit nobis, quod eidem anomaliae mediae $95^\circ 18' 28''$ respondere debeat coaequata $84^\circ 42' 2''$. Differentia $24''$.

Sumatur jam anomalia eccentrici nostri 45° et 135° . Et ut totus ad sinus horum angulorum, ita area $19108''$ maximi trianguli aequatorii ad aream hujus loci $13512''$ sive $3^\circ 45' 12''$, ut additione hujus partis aequationis physicae ad anomaliam eccentrici constituentur anomaliae mediae $48^\circ 45' 12''$ et $138^\circ 45' 12''$. Datis vero cruribus angulorum datorum, prodeunt anguli anomaliae coaequatae his mediis anomaliis respondentes $41^\circ 28' 54''$, $130^\circ 59' 25''$ ⁸⁵). At per vicariam hypothesin, ut capite XVIII. operis, assumtis iisdem anomaliis simplicibus $48^\circ 45' 12''$ et $138^\circ 45' 12''$, prodeunt coaequatae illic $41^\circ 20' 33''$, minus quam per aream trianguli, excessus $8' 21''$, hic $131^\circ 7' 26''$, plus quam per aream trianguli, defectus $8'$. Itaque cum certum sit, vicariae nostrae tantum errorem tribui non posse, necesse mihi fuit credere, hanc rationem aequandi etiamnum esse imperfectam. Et capite quidem XIX. cum bisectionem in Marte tentarem, et per immobile punctum aequantis more Ptolemaico aequationes computarem, inventa est differentia circa 45° anomaliam eccentrici pene tanta, in partes tamen contrarias. Nam in superiori quadrante planeta appropinquabat aphelio, in inferiori perihelio, plus quam par erat; hic in superiori quadrante discedit longius ab aphelio, in inferiori a perihelio, quam par est. Itaque supra ab aphelio est nimis velox, infra a perihelio itidem. Quare tardior justo erit in longitudinibus mediis.


Credo jam lectori incidisse, an forte errorum causa inde sit, quod capite XL. dictum est, vitium subesse huic operationi per areas, eo quod areae non aequipolleant distantis, celeritatis et morarum moderatricibus. Atqui non hinc esse potest praesens error. Primum enim ~~excessus~~ ~~summae~~ distantiarum supra aream circuli parvus est, spatiolum nempe ~~inter conchoides~~, parvum admodum: deinde area exhibet distantias omnes quidem justo breviores, maxime vero eas, quae sunt in longitudinibus mediis. Ergo, si quis error hinc manat, is in hoc est, quod non satis longas moras planetae facimus in longitudinibus mediis. At errores, quos jam deprehendimus, in contrarium abeunt: nimis enim longas moras fecimus planetae in longitudinibus mediis. Idem illi quoque potest objici, qui suspicionem inde ~~concupere~~ voluerit, quod, misso Copernici et Tychois duplici epicyclo, qui orbitam planetae facit ovalem, nos Ptolemaicum perfectum circulum in praesens susceperimus. Nam dictum est in fine capitis quarti, illam Copernicanam orbitam non incurrere ad centrum, quod hic nobis esset usui, sed excurrere a centro particulis 246 , quod hic potius augeret errorem, qui hoc jam sequimur, moras esse ut distantias.

Ut autem ad oculum pateat, parvum admodum effici spatium conchoidis cap. XL, perpendes quod secans anguli $5^\circ 19'$ (maximae aequationis

opticae) est 100432, linea videlicet EA. Ex hoc igitur excessu 432, qui est lineola BA, pars lineae EA, propèmodum discere poterimus accumulationem omnium horum excessuum; puta QA, RA, BA, SA, LA, in hunc modum: secans 89° ejusdemque tangens compositi tantundem faciunt, quantum sinus omnium graduum totius semicirculi, manu ducente nos Cardano in libris de Subtilitate, quo loco circuli proprietates explicat. Ejus rei demonstrationem profitetur Justus Byrgius. ⁸⁶)

Ergo si excessus nostris omnes residui a maximo 432 essent ut sinus utrinque in semicirculo ad semidiametrum, tunc ut 100000 ad summam secantis et tangentis 89° , scilicet ad 11458869, sic esset 432 ad 49934, summam omnium excessuum ad singulos gradus semicirculi fere. Nam quanto distantiarum excessus in superiori quadrante sunt longiores his secantum excessibus, tanto in inferiore quadrante fere sunt breviores. Atqui nondum ita sunt excessus QA, RA, SA &c. ad invicem, uti sinus aliquotorum graduum, sed fere utuntur sinuum proportionem dupla. Ut sinus 90° est duplus sinus 30° . Jam aequatio optica 90° est $5^\circ 19'$, ejusque sinus dimidium exhibet arcum itidem fere dimidium prioris, scilicet $2^\circ 39' 15''$ pro aequatione optica anomaliae eccentrici 30° , cujus secans est 100107. Et hic 107 excessus secantis supra sinum rectum est fere quarta pars prioris 432; cum sinus 30° esset dimidia pars de sinu 90° . Videat geometra aliquis, an thema sit demonstrabile. Mihi sufficit in praesens, minima, in quibus occupor, respondere. Igitur ad 432 accumuluntur partes non proportionales sinus, sed semper minores, et in 45° vel circiter tantummodo semisses; ante illum minus semissi; ita ut circa 30° sint tantum quadrantes, et denique insensibiles. Itaque (quod experientia testatur, sigillatim computatis omnibus distantibus et in unam summam coniectis), de summa 49934 retinemus tantum partem septimam et 7000 circiter. Et quia distantia una 100000 valet $60'$, summulae huic debebuntur non plus $4\frac{1}{4}'$, de quibus tamen aliquid spargitur in omnem ambitum; ut hic errorculus circa 45° et 135° , ubi maximus, etiam in Marte insensibilis evadat. Quapropter alia nobis hujus dissonantiae occasio quaerenda erit.

Fig. 95.



Caput XLIV.

Viam planetæ per auram ætheream non esse circulum, ne quidem respectu primæ inæqualitatis solitariae, si etiam mente removeas Braheanas et Ptolemaicas spirarum implicationes ex inæqualitate secunda duobus his auctoribus resultantibus.

Eccentricitate et proportione orbium certissime constitutis mirum astronomo videri possit, superesse adhuc aliud impedimentum, quo minus de astronomia triumphare liceat. Et me Christe biennium integrum triumphaveram.

Ceterum comparatione eorum, quae capitibus XLI, XLII, XLIII praecedentibus constituta sunt, facile apparet, quid nobis adhuc desit. Differabant plurimum loca aphelii, eccentricitas et proportio orbium utrinque constituta. Nec aequationes physicae computatae observatis (quas vicaria hypothesis repraesentat) consentiebant. Repetatur schema cap. XLI. *Et quia in eo qualium $\gamma\eta$ 100000, talium $\gamma\alpha$ fuisset 14822; quare addita $\alpha\gamma$ ad $\gamma\eta$ vel $\gamma\epsilon$, esset $\alpha\delta$ 166562, quae cap. XLII. inventa est 166780. Sic ablata $\gamma\alpha$ a $\gamma\delta$ restaret $\alpha\delta$, 136918, quae omnino fuit capite XLII. inventa 138500. Rursum quia cap. XLII. inventa est vera longitudo linearum $\gamma\epsilon$, $\gamma\alpha$, $\alpha\epsilon$, $\alpha\delta$, si ergo, quod cap. XLI. positum usurpatumque fuit, planetae via est circulus, non est difficile dictu, quanta esse debeat $\alpha\kappa$, $\alpha\eta$, $\alpha\theta$. Nam quia $\alpha\epsilon$ est anno 1590. Octob. in $28^{\circ} 41' 40''$ Ω et κ , η , θ ut cap. XLI: erunt dati anguli $\kappa\alpha\gamma$, $\eta\alpha\gamma$ $\theta\alpha\gamma$, quare et aequatio optica $\alpha\kappa\gamma$ $0^{\circ} 53' 13''$, $\alpha\eta\gamma$ $3^{\circ} 10' 24''$, $\alpha\theta\gamma$ $5^{\circ} 8' 47''$. Et ut sinus horum angulorum ad verissimam eccentricitatem $\alpha\gamma$ 14140: sic sinus $\kappa\gamma\epsilon$, $\eta\gamma\epsilon$, $\theta\gamma\alpha$ ad $\alpha\kappa$, $\alpha\eta$, $\alpha\theta$.*

Prodeunt igitur $\alpha\kappa$. . . 166605 $\alpha\eta$ 163883 $\alpha\theta$ 148539

At observando sunt inventae 166255 163100 147750

Differentia 350 783 789⁸⁷)

Quodsi quis hanc differentiam lubricae observandi fortunae tribuere velit: nae is vim demonstrationum hactenus usurpatarum non attenderit neque perceperit oportet, et nequissimam mihi fraudem imputabit crassissime corruptarum Brahei observationum. Itaque ad observationes annorum sequentium provoco, quas tamen periti observatores instituant: nam si quid ex uno latere indulsi meo voto, id ex altero latere tanto maiorem in errorem excrescet. Sed nihil his opus. Vobiscum mihi sermo est, periti rerum astronomicarum, qui sophistica effugia ceteris disciplinis creberrima in astronomia nulli patere scitis. Vos appello. Videtis in κ defectum a circulo parvum; in η , θ ex utroque quidem latere magnum admodum, quantum per observandi incertitudinem (ob quam 200 fortassis aut summum 300 particulas capite quidem XLII. in dubio pono) excusare non possumus.

Quid ergo dicendum? Num hoc illud est, quod supra cap. VI. dictum, per translationem suppositionum a medio ad apparentem Solis motum aliam constitui eccentricum, qui ad latus apogaei Solis excedat? Nequaquam. Nam quantum is hinc excedit, tantum inde appropinquat. Hic autem videtis utrinque planetam a circuli orbita ad centrum appropinquare: quod multae aliae observationes partim secuturæ cap. LI, LIII attestantur.

Itaque plane hoc est: orbita planetae non est circulus, sed ingrediens ad latera utraque paulatim, iterumque ad circuli amplitudinem in perigaeo exiens: cuiusmodi figuram itineris ovalem appellant.

Atque hoc idem etiam ex capite praecedente XLIII. probatur. In eo positum fuit, planum perfecti eccentrici aequipollere quam proxime distantis omnibus aequalium quotcumque partium circumferentiae illius eccentricae a fonte virtutis motricis; itaque partes plani metiri moras, quas planeta in partibus respondentis circumferentiae eccentricae trahat. Quodsi igitur planum illud, circa quod planeta limitem agit, non est perfectus circulus, sed diminutus a lateribus ab ea latitudine, quam habet in linea apsidum; et tamen hoc planum, orbita irregulari circumscriptum, adhuc metitur moras, quas planeta in toto ambitu et in partibus ejus aequalibus facit; planum igitur diminutum metitur aequale tempus cum priore plano non diminuto. Partes igitur

plani diminuti aphelio et perihelio proximae metientur tempus majus, quia apud illas tenuis est diminutio; sed partes in longitudinibus mediis metientur minus tempus quam antea, quia in illis accidit potissima totius plani diminutio. Jam igitur, si utamur hoc diminuto plano ad moderandas aequationes, fiet planeta circa aphelium et perihelium tardior, quam in priori vitiosa aequationum forma, circa longitudes medias velocior, quia distantiae hic diminuuntur. Morae igitur hinc abstractae in aphelium et perihelium sursum deorsumque compensatione facta accumulabuntur, non secus ac si quis botellum ventricosum in medio comprimat, eaque compressione minutal infarctum e ventre magis in utrasque extremitates infra supraque manum eminentes exprimat et elidat.

Atqui si contraria contrariis medentur, haec plane aptissima est medicina expurgandis vitiis, quibus supra cap. XLIII. physica nostra hypothesis laborare deprehendebatur. Velocior enim futurus est planeta in longitudinibus mediis, cum prius ibi deprehenderetur justo tardior, retardabiturque supra et infra circa apsidas, ubi prius pernecitate nimia nocebat aequationibus in octavas temporum redundantibus.

Hoc igitur alterum argumentum est, quo demonstratur, orbitam planetae verissime a circulo instituto deflectere et ad latera centrumque eccentrici ingredi. Ceterum hoc argumentum penes me non tanti fuit, ut ex eo de planetae exorbitatione cogitare possem. Diutissime enim in conciliandis hujus formae aequationibus cum desudassem, tandem absurditate mensurae deteritus totum negotium deserui, quoad distantis de exorbitatione edoctus, eo modo, quo cap. XLI. factum, postea hoc etiam aequationum negotium resumsi.

Atque ex hoc quoque demonstratum, quod supra cap. XX. XXXII. promisi me facturum: orbitam planetae non esse circulum, sed figurae ovalis.

Caput XLV.


De causis naturalibus hujus deflectionis planetae a circulo: prima opinio examinata.

Cum primum in hunc modum certissimis Brahei observationibus edoctus essem, orbitam planetae non esse circularem exacte, sed deficere a lateribus, e vestigio et causam naturalem hujus deflectionis me scire sum arbitratus. Eram enim in materia cap. XXXIX. vehementer exercitus. Et admoneo lectorem, ut prinsquam hic progrediatur, caput illud integrum diligenter relegat. Cum enim illo capite causam eccentricitatis transscripsissem alicui virtuti, quae esset in corpore planetae, sequebatur, ut et hujus deflectionis ab eccentrico circulo causa eidem planetae corpori transscriberetur. Accidit autem mihi, quod proverbio jactant, canem festinum caecos parere catulos. Cum enim cap. XXXIX. laborassem vehementer in ea re, quod non possem satis probabilem dicere causam, cur ex orbita planetae perfectus fieret circulus (semper enim quaedam tribuenda erant absurda illi virtuti, quae sedem habet corpus planetae), jam deprehendo ex observationibus, orbitam planetae non esse

circularem perfecte, statim magno persuasionis impetu huc concessi, ut crederem, quae cap. XXXIX. absurda dicebantur ad fabricandum circulum, ex iis in probabiliorem formam transmutatis iustam et observatis consentaneam planetae orbitam effectum iri. Quodsi paulo consideratius hanc viam incessissem, potuissem statim ad veritatem rei pervenire. At cum essem caecus prae cupiditate, nec ad omnia et singula membra cap. XXXIX. respicerem, inhaerens illi cogitationi, quae se primam offerebat, probabilis mirum in modum ob aequabilitatem motus epicycli, in novos incidi labyrinthos, ex quibus capite hoc XLV. et sequentibus usque ad L. eluctandum nobis erit.

Repetatur itaque schema cap. XXXIX. Deterior in illo capite opinio fuit, planetam, ut perfectum circulum describat, vi insita moliri epicyclum et sic explicare corpus suum a radio virtutis ex Sole: ut si radius virtutis

Fig. 96.



ex Sole sit AC, progrediaturque inaequali passu ex AC in A γ , planeta vero initio sit in C, ex eo tempore vi insita sese explicet ex AC vel A γ ; ut quo tempore AC venit in A γ , planeta ex C vel γ veniat in D, et hoc faciat etiam inaequali passu, remissus vel incitatus eadem in proportione, in qua ipsa AC. Hoc enim pacto ND linea per centrum epicycli et planetam semper parallelus manet, lineae AB. Dixi autem cap. XXXIX, absurdum mihi videri, planetam ex γ in D inaequali passu sese explicare ex radio virtutis Solaris, et sic sese accommodare sua vi propria ad vim

extraneam ex Sole, ejusque celeritatem et remissiones praescire. Esto igitur, ut hoc absurdum vitetur, eat sane AC inaequaliter, planeta vero ex γ in D eat aequaliter. Videamus, an aliquid sequatur simile illis, quae capite antecedente ex observationibus probavimus.

Cum igitur centrum epicycli N ejusque aphelium a linea AC in A γ tardum fuerit ex C in γ , utpote circa eccentrici aphelium C, planeta igitur ex γ in D ponatur non tardus, sed motu mediocri incessisse. Quare angulus γ ND major erit angulo γ AC, itaque ND non erit parallelus ipsi AB, sed inclinabitur versus AC. Itaque planeta D non manebit in eo circulo quem ex C coeperat describere, qui scilicet per CF transit, sed ingredietur a circumferentia D et parallelo ND versus CA. Atque hoc idem capite precedente testabantur distantiae AD computatae ex observationibus, eas scilicet non pertingere usque ad circumferentiam circuli CF. Hoc idem testabantur etiam aequationes physicae per accumulationem distantiarum AC, A exstructae; scilicet planetam apud latera eccentrici debere fieri velociorem ejus nempe distantias a Sole minores postulari. Cum itaque conspiraret ista vim admirabilem afferret ad persuadendum, statim conclusi, hunc ingressum planetae ad latera ex eo contingere, quod virtus planetam movens et distantias ex lege circuli administrans praeveniat virtutem Solis: eo quod illa aequalibus temporibus aequales processus faceret, et sic planeta aequaliter lege epicycli ad Solem dmitteret; haec vero diversis gradibus per diversa diastemata exceptum planetam inaequaliter, et alium tardius promoveret; quo fieret, ut distantiae aequalium arcuum epicycli accumularentur versus C aphelium et F perihelium, et rarius sererentur circa medias longitudes, atque sic omnes a justa perihelii propinquitate retra-

Quia igitur planum $\delta\alpha\epsilon$, $\delta\alpha\zeta$ &c. habet in se summam distantiarum omnium punctorum in arcu epicycli, qui similis est ipsi arcui $\delta\epsilon$ per cap. XL, et vero planeta aequalibus temporibus (quae jam per $\delta\epsilon$, $\epsilon\zeta$ mensurantur) inaequales arcus describit genuini sui itineris; breves quidem, quando ab α Sole longe abest, longas vero, quando ad Solem prope accedit, sic ut arcus itineris planetarii, qui decurruntur temporibus aequalibus, sint in proportionem distantiarum conversa per cap. XXXII: igitur fere fit, ut quanto $\epsilon\alpha\delta$ spatium excedit sectorem $\epsilon\beta\delta$, cujus mensura est angulus $\epsilon\beta\delta$ vel arcus $\epsilon\delta$, tanto arcus $\epsilon\delta$ (hoc loco mensura temporis) excedat arcum itineris confecti, qui sit $\mu\delta$.

Quodsi planum totum efferas numero 360, eodem nempe, quo circumferentiam circuli, quo et tempus periodicum, tunc numerus temporis seu $\delta\epsilon$ (hoc loco) quam proxime est medium seu arithmeticum seu geometricum (parum enim differunt) inter numerum summae distantiarum seu spatium $\epsilon\alpha\delta$, et inter numerum itineris planetarii seu $\mu\delta$. Multiplex hic occurrit *aproximatio*. Primum, quod planum circuli non perfectissime aequivalet summae distantiarum, ut demonstratum est capite XL, etsi fine capitis XLIII dictum est, parvum admodum esse defectum. (In tollendis incommodis versatur caput XLVIII.)

Secundo, quod proportio jam dicta non est exquisita geometrica. Nam etsi singulae distantiae sunt ad singulas mediocres in proportionem conversa arcuum singulorum itineris planetarii ad arcus mediocres: summae tamen distantiarum aliquot ad summam totidem mediocrium proportio non manet eadem, quae est summae arcuum totidem ad summam mediocrium conversa. Ut in exemplo deprehendes: *sint distantiae duae 12 et 11, mediocris 10, et tantus etiam sit arcus mediocris. Et sit ut distantia 12 ad distantiam mediocrem 10, sic mediocris arcus 10 ad distantiae 12 arcum $8\frac{1}{2}$. Sit etiam, ut distantia 11 ad 10, sic 10 ad $9\frac{1}{11}$ arcum. Compose distantias 12 et 11 in unam summam, quae erit 23: summa duarum mediocrium 20: summa arcuum duorum $17\frac{11}{11}$. Hic erat quidem 10 medium proportionale inter 12 et $8\frac{1}{2}$, sic inter 11 et $9\frac{1}{11}$: sed jam summa 20 non est medium proportionale inter 23 et $17\frac{11}{11}$, sed inter 23 et $17\frac{11}{11}$ qui est major. Valet tamen haec ratio in medietate arithmetica. Verbi gratia, sit 10 medium arithmeticum inter 12 et 8: sic inter 11 et 9. Compose 12, 11, fiunt 23; compone et 8, 9, fiunt 17. Igitur 20 rursus est medium arithmeticum inter 17, 23. Ac cum cap. XXXII. demonstratum sit, parvum esse discrimen inter medium arithmeticum et geometricum in hoc negotio, parum igitur etiam aberit, quin verum sit, quod hic negatur verum esse per omnia.*

Tertio, etsi esset area $\epsilon\beta\delta$ praecise geometricum medium inter $\epsilon\alpha\delta$ et $\mu\beta\delta$, tamen constitui non posset geometricum. Triangulo enim $\alpha\epsilon\beta$ sector $\epsilon\beta\mu$ debet esse aequalis. At desideratur adhuc a geometris ratio, angulum $\epsilon\beta\mu$ in data proportionem secandi.

superiora omnia nihil impediunt, nondum tamen idem circuli et $\mu\beta\delta$ sector (ut ita dicam) plani ovalis*). Itaque $\mu\delta$ tanquam in circumferentia circuli, nihil tamen $\mu\delta$ tanquam arcum itineris planetae, qui non est circu-

$\mu\delta$ tanquam pars plani circularis duabus rectis ex centro rescissus.
 $\mu\delta$ tanquam de plano aliq. quam perfecte circulari.

los, et sectionum punctis intelligere determinata loca et situs distantiarum. Respondetur, quod non. Peccabimus enim hoc pacto nonnihil, distantias nimis alte sursum transferentes, ut facile apparet ex schemate posteriore. Semper enim in eo linea AH, veras distantias AF excipiens, est inferior linea DH, ex puncto aequatorio D parallela ipsi BF.

Quocunque dictorum modorum delineetur linea corpus planetae possidens, sequitur jam, viam hanc, punctis $\delta, \mu, \nu, \sigma, \pi, \varrho, \lambda$ signatam, vere esse ovalem non ellipticam, cui mechanici nomen ab ovo ex abusu collocant (Durerus). Ovum enim duobus turbinatum verticibus, altero tamen obtusiori, altero acutiori, et lateribus inclinatis cernitur. Talem figuram dico nos creasse. Nam quia planeta in λ celer est, in δ tardus, et minus celer illic quam hic tardus, eo quod longarum distantiarum semidiametrum excedentium plures sint quam brevium (nam usque ad $92\frac{2}{3}^\circ$ longiores sunt; inde per $87\frac{1}{3}^\circ$ breviores, quod secundum doctrinam cap. XXIX. demonstrari potest); atque insuper illae plures longae in angustiore eccentrici arcum translatione facta sursum stipatae, hae pauciores in ampliorem distractae, ita ut anomaliae mediae $92\frac{2}{3}^\circ$ (*), qua distantiae $92\frac{2}{3}^\circ$ conficiuntur, respondeat anomalia eccentrici $87\frac{1}{3}^\circ$ circiter: residuum anomaliae mediae $87\frac{1}{3}^\circ$ cum totidem distantis brevioribus radio disseminetur per angulum ad centrum eccentrici residuum $92\frac{2}{3}^\circ$. Longius itaque distant ab invicem breves distantiae circa perihelium, quam longae circa aphelium. Itaque, si eadem etiam esset proportio inter binas vicinas perihelias, tamen attenuaretur resegmentum circuli circa ϵ, μ, δ partes magis, quam circa partes ϱ, π, λ ; quia in δ breviori spatio breves in longiorum locum transponuntur quam in λ . At jam etiam ipsae distantiae aequalium partium epicycli perihelio propinquarum in majori sunt proportione ad invicem, quam distantiae partium aphelio propinquarum. Demonstratum enim est supra cap. XL, conchoides spatium inferiori parte latius esse, quam superiori. Majoribus igitur intervallis per spatium brevius in macronem attenuari conchoides necesse est infra, quam supra: et illa intervalla majora comparantur insuper ad breviores lineas: proportio igitur ampliatur utroque nomine. Tot causis concurrentibus apparet, resegmentum nostri circuli eccentrici infra multo esse latius, quam supra, in aequali ab apsidibus recessu. Quod cuilibet vel numeris explorato facile est, vel mechanica delineatione, assumpta evidenti aliqua eccentricitate.**))

Caput XLVII.

Quadratura tentata plani oviformis, quod peperit caput XLV, et quod describere satagebamus cap. XLVI: et per eam methodus aequationum.

Nihil profecimus, si non ex suscepta hypothesi et causis physicis cap. XLV, quas hic pro veris sequimur, justas extruxerimus aequationes non minus quam distantias. Cum autem aequatio componatur ex parallaxi

*) Valet tantum in opinione hac erronea capitis XLV, cui hic feriamur.

**) Figuram hujusmodi habent libelli sphaerici et commentaria Reinholdi in theorias Purbachii, in theoria Mercurii.

punctorum eccentrici et mora, quarum illam partem aequationis opticam, hanc physicam appellare soleo; moram vero, si quicquam aliud, planum certe circumscriptum itinere planetae compendiosissime (licet non perfectissime) metiatur: revolvimur igitur ad dimensionem eccentrici ooidis plani, cujus delineandi leges sunt praemissae. Nam etsi parum aliquid nobis deest, quo minus genuinam hanc temporis mensuram statuamus (illud nempe, quod ad ooidis circumferentiam magis etiam quam ad circularem inclines sunt lineae, quae partes circumferentiae illius cum fonte virtutis connectunt; adeoque etiam illae lineae, quae ex centro eccentrici ad easdem illas partes ooidis ducuntur; cum alias radii ex centro ad perfecti circuli circumferentiam omnino recti sint), unde sequitur, ut nec summa distantiarum exacte mensuretur a plano, nec arcus ooidis sint exacte proportionales distantis: quae omnia patebunt ex relectione cap. XL. et XXXII; quam parvum tamen illud sit futurum, ex cap. XLIII. conjecturam capere licet.

Quomodo autem planum hoc aliter metiri, ad planum circuli comparare, et in imperatas partes dividere possimus, nisi quadratum inveniamus aequale resegmento sive lunulae resectae? Hic igitur accersendus nobis e tragoedia $\theta\epsilon\omicron\varsigma$, imo vero $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma \tau\iota\varsigma$, $\acute{\alpha}\pi\omicron \mu\eta\chi\alpha\tau\eta\varsigma$, qui nos doceat machinari quadraturam ooidis aut limbi in schemate 98, seu lunulae $\delta\omicron\lambda\theta$, cujus abscissione ex $\delta\lambda\theta$ circuli plano ooides $\delta\omicron\lambda$ generetur. Ut igitur prius cap. XL. in conchoide spatio, sic nunc iterum in ooides (aut si forte mavis, metopoide) appello geometras eorumque opem imploro.

Si figura nostra esset perfecta ellipsis*), peractum esset ab Archimede negotium, qui libro de Sphaeroidibus prop. VI. VII. VIII. demonstrat, sic esse planum ellipsis ad planum circuli, communi majori diametro cum ellipsi utentis, ut est rectangulum diametrorum (seu figura sectionis) ad quadratum diametri circuli. Sit autem haec figura perfecta ellipsis: parum enim differt. Videamus quid inde sequatur. Dico igitur, lunulam $\delta\omicron\lambda\theta$ a semicirculo resectam insensibili majorem futuram semicircello, cujus semidiameter est eccentricitas ipsa 9264 seu $\alpha\beta$. Bisecetur enim $\alpha\beta$ in σ (ut cap. XXIX.) et ex σ ipsi $\alpha\beta$ perpendicularis exeat $\sigma\tau$; et connectantur puncta α, β cum τ ; ipsi vero $\beta\tau$ parallelos incedat $\gamma\phi$; et connectantur puncta β, ϕ et α, ϕ ; et centro α , diastemate $\alpha\tau$, scribatur arcus $\tau\psi$, secans $\alpha\phi$ in ψ , et $\beta\phi$ in ξ . Cum ergo punctum τ sit aequaliter remotum ab α, β , sumus igitur (propriissime cum Arabibus loquendo) in longitudine media, hoc est in distantia mediocri planetae τ a Sole α .**). Ac quia $\gamma\phi$ est parallelos ipsi $\beta\tau$, ergo per capitis praecedentis delineationem ipsum punctum ψ lineae $\alpha\phi$ est genuinus et verissimus locus translationis $\alpha\tau$ in $\alpha\psi$; itaque et ψ est punctum distantiae planetae mediocris. Quare particula lineae $\beta\psi$, quae interest inter ψ et circumferentiam, metitur latitudinem lunulae circa longitudinem mediam; lineola vero $\xi\phi$ insensibili aliquo major est hac latitudine. Demittatur perpendicularis ex β in $\alpha\tau$, quae sit $\beta\nu$. Dico $\xi\phi$, partem lineae $\beta\phi$, esse duplam ipsius $\alpha\nu$. Connectantur enim τ, ϕ ; et ex τ in $\beta\phi$ veniat per-

*) Ellipsis est figura ordinata, resultans ex sectione conici per axem. Alii dicunt circulum oblongum.

**) Hodie abusive dicimus longitudinem mediam punctum circumferentiae, quod habet longitudinem mediam, hoc est quod elongatur mediocritatis modulo a centro mundi.

pendicularis $\tau\chi$; sic ex ξ in $\alpha\tau$ perpendicularis $\xi\omega$. Cum igitur in parallelos $\gamma\phi$, $\beta\tau$ recta $\alpha\gamma$ incidat, aequales erunt $\beta\gamma\phi$, $\alpha\beta\tau$. Aequalis autem et $\gamma\beta$ ipsi $\alpha\beta$ ex constructione; sed et $\beta\phi$ ipsi $\alpha\tau$ aequalis, utraque enim eidem $\beta\tau$ aequalis est ex constructione. Triangulum igitur $\gamma\phi\beta$ triangulo $\beta\tau\alpha$ congruit, quare $\gamma\phi$ ipsi etiam $\beta\tau$ aequalis erit; sunt autem paralleli ex constructione, quare et $\beta\gamma$, $\tau\phi$, quae parallelos aequales extremis connectunt ab eadem plaga, paralleli et aequales erunt. Sed $\beta\gamma$ aequalis est ipsi $\alpha\beta$, ergo aequales sunt et paralleli $\alpha\beta$, $\tau\phi$. Igitur et $\beta\phi$, $\alpha\tau$, erunt paralleli. Et quia anguli ad χ , v recti, et basis $\tau\phi$ basi $\beta\alpha$ aequalis, et angulus $\beta\alpha\tau$ vel $\beta\alpha v$ angulo $\tau\phi\beta$ vel $\tau\phi\chi$, erunt igitur aequales αv , $\chi\phi$; sic et perpendiculares βv , $\tau\chi$.

Rursum, quia aequales $\tau\chi$ et $\xi\omega$ paralleli inter parallelos, aequales autem et $\beta\tau$, $\alpha\xi$, et anguli ad χ , ω recti: erunt igitur aequalia et reliqua triangulorum latera $\beta\chi$, $\alpha\omega$; aequales vero et $\beta\xi$, $v\omega$, paralleli inter parallelos βv , $\xi\omega$. Aequalibus igitur $\beta\xi$, $v\omega$ ablatis, residuae $\xi\chi$, αv erunt aequales. Prius autem et $\chi\phi$, αv , erant aequales: et igitur $\xi\phi$ est dupla ad αv .

His demonstratis, ad propositionem nostram veniemus propius. Et quia in $\phi\beta$ diametrum circuli (quae continuata intelligatur usque ad alteram circumferentiam) recta ex puncto circumferentiae τ perpendiculariter incidit, scilicet $\tau\chi$: ut igitur $\phi\chi$ ad $\chi\tau$, sic $\chi\tau$ ad residuum diametri. Rectangulum igitur sub $\phi\chi$ et residua parte diametri est aequale quadrato $\tau\chi$. Et quia quadratum $\tau\phi$, hoc est $\alpha\beta$ aequal quadrato $\tau\chi$, $\chi\phi$, aequalibus igitur additis, rectangulum sub $\chi\phi$ et integra diametro est aequale quadrato $\alpha\beta$. Et quia $\phi\xi$ dupla ad $\phi\chi$, rectangulum igitur sub $\phi\xi$ (quae insensibili longior latitudine lunulae $\psi\phi$) et sub $\phi\beta$ semidiametro aequat quadratum $\alpha\beta$. At quod sub $\xi\phi$, $\phi\beta$, est differentia ejus, quod sub $\xi\beta$, $\beta\phi$, et quadrati $\beta\phi$, et lunulae sunt etiam differentia inter ellipsis et circuli plana. Et ut quod sub $\xi\beta$, $\beta\phi$, ad quadratum $\beta\phi$, sic fere *) planum ellipsis ad planum circuli. Ergo etiam, ut quadratum $\beta\phi$ ad rectangulum $\xi\phi$, $\phi\beta$, hoc est ad quadratum $\alpha\beta$, sic fere circuli planum ad planum duarum lunularum; et permutatim: ut quadratum $\beta\phi$ ad planum circuli, sic quadratum $\alpha\beta$ ad planum lunularum fere.

Sed et ut quadratum $\beta\phi$ ad planum circuli, cujus $\beta\phi$ radius, ita quadratum $\alpha\beta$ ad planum circuli, cujus $\alpha\beta$ radius. Ergo planum circuli, cujus $\alpha\beta$ radius, insensibili superat utramque resectam lunulam, $\psi\phi$; aequat quippe lunulas $\xi\phi$ paulo latiores justo, quia $\xi\phi$ insensibili est longior ipsa $\psi\phi$, ut initio dictum. (Habet haec demonstratio suum usum etiam in verissima hypothesis physica.) **)

Concessis itaque quae posuimus, quod planum ellipsis a plano nostri ooidis insensibiliter differat, eo quod compensatio sit inter supernos excessus ooidis supra ellipsin et infernos defectus, his, inquam, concessis, quadravimus nostras menoides figuras, et sic etiam ooidea; sive proprie loquendo circulavimus. Nam circuli et quadrati proportionem docet Archimedes.

Jam haec ad usum sic transferemus. Quia planum ooidis minus est plano circuli plano circelli ab eccentricitate descripti, computetur igitur

*) Fere inquam. Si enim $\beta\xi$ esset brevior semidiameter ellipsis, et $\xi\phi$ excessus longioris: tunc plane eadem esset proportio inter plana circuli et ellipsis. At $\beta\xi$ non est omnino ipsissima brevior semidiameter.

hoc esse constiterit, methodum deinde docebitis, qua non tantum totius areolae inter rectam CED et curvam CoD quantitas, quam hactenus aequalem dixi circello eccentricitatis (duae enim lunulae aequantur circello, et haec areola jam ponitur dupla ad unam lunulam), sed etiam quaelibet ejus pars, ad quamcunque datam longitudinem partium CG, CH cognoscatur et ad planum inter CD et BB comparetur.

Rursum autem, ut prius cap. XLVI, quia nobis per geometriam non patet liber exitus, paciscemur cum ἀπεργία: et quid mirum? cum ipsa cap. XLV. nata opinio, quae nos in has difficultates conjecit, falsa sit.

Resumatur itaque schema 98. Quodsi planum $\delta\sigma\lambda$, quod est ooides, perfecta esset ellipsis, descripta ellipsi $\delta\sigma\lambda$ et plano circuli $\delta\theta\lambda$ super communi longiori diametro $\delta\lambda$, et planis utriusque figurae ex altero latere longioris diametri divisae per BC ordinatim applicatas (hoc est perpendiculares ad longiorem diametrum $\delta\lambda$), semper portiones ellipsis $\nu\delta C$ ad portiones circuli B δ C in eadem manerent proportionem, quod demonstrant conici auctores, et Archimedes de Sphaeroidibus prop. V. usurpat. Tunc igitur ne quidem opus esset cognitione plani oviformis. Pro plano enim ellipsis planum circuli, et pro partibus ellipsis similes partes circuli adhiberemus.

Esto $\delta\sigma\lambda$ ellipsis perfecta: parum enim ab ea differt; et ex aliquo punctorum ellipsis, puta ν , descendat perpendicularis in $\delta\lambda$, quae sit νC , et continuetur, donec secet circulum in B, et connectantur B, ν cum α . Quia ergo, ut $\beta\phi$ ad $\beta\xi$ sic CB ad C ν , ex suppositione perfectae ellipsos et prop. V. Sphaeroideon: et vero ut BC ad C ν , sic area B δ C ad aream $\nu\delta C$: at etiam ut BC ad C ν sic B α C area ad $\nu\alpha C$ aream: ut igitur $\beta\phi$ ad $\beta\xi$ sic $\alpha B\delta$ area ad $\alpha\nu\delta$ aream. Quare proposito tempore discessus planetae ab ipso δ , fiat primo, ut tempus periodicum ad 4 rectos, sic propositum tempus ad angulum circa β , puta $\delta\beta\zeta$, et computetur distantia $\alpha\zeta$, cui aequalis est $\alpha\nu$.

Rursum fiat, ut dimidium tempus periodicum ad aream semicirculi $\delta\theta\lambda$ notam, sic tempus propositum (cujus mensuram jam modo diximus esse aliam, $\delta\zeta$, cum distantia $\alpha\zeta$ computaretur), ad aream $\alpha B\delta$. Sic datur area. Inveniendus jam est angulus B $\beta\delta$ tantus, ut sinus ejus BC multiplicatus in dimidiam $\alpha\beta$, hoc est ut area trianguli $\alpha B\beta$ juncta sectori B $\beta\delta$ faciat summam areae, jam prius ex tempore oblatam. Ubi conjectatione et regula falsi opus est.*) Ubi B $\beta\delta$ angulum fueris assecutus, postea in triangulo B $\beta\alpha$ ex angulo β et lateribus notis $\alpha\beta$, βB , innotescet angulus B $\alpha\delta$. Et quia scitur proportio B ν ad BC, quare etiam B $\alpha\nu$ scibitur; eoque subtracto restabit $\nu\alpha\delta$ justus angulus coaequatus ad susceptum tempus.

Exempli causa, sit ut prius cap. XLIII. anomalia media, hoc est artificiosa seu astronomica numeratio temporis $95^{\circ} 18' 28''$. Et quia 360° valet aream perfecti circuli 31415926536, valebunt igitur $95^{\circ} 18' 28''$ aream 8317172671. Sit $\theta\alpha\delta$. Quodsi anomalia eccentrici esset $\delta\theta 90^{\circ}$, quod conjectando suppono, sector ejus $\theta\beta\delta$ esset 7853981670, et anguli 90° sinus $\theta\beta$ est 100000, qui ductus in dimidiam eccentricitatem $\alpha\beta$,

*) Notetur hic modus aequandi. Eum enim ultimo tandem secuturi sumus; ubi constiterit, iter planetae esse perfectam ellipsin, dimidio tamen propiorem circulo. Sola distantia alia methodo quaerenda erit.

scilicet in 4632, dat 463200000 aream $\theta\beta\alpha$. Summa areae 8317181670, scilicet $\theta\alpha\delta$, quae admodum exiguo superat debitum.⁹⁰) Bene ergo coniecimus, $\delta\beta\theta$ angulum seu anomaliam eccentrici esse 90° . Et quia sinus est 100000, ressegmentum lunulae apud θ scilicet θD erit 858: quare brevior semidiameter $D\beta$ erit 99142, quae sic se habet ad 100000, ut 9264 ad 9344, quae tangit $5^\circ 20' 18''$ angulum $\alpha D\beta$, ut sit anomalia coaequata $Da\delta$ $84^\circ 39' 42''$, quam exhibet vicaria hypothesis $84^\circ 42' 2''$, differentia $2' 20''$.

Notandum autem obiter, quia eccentricitatis inquisitio cap. XLII. niti-
tur distantis apheliis et periheliis, et in his minimum aliquid errari potest,
quod in eccentricitatis constitutione excrescit in decuplum; ideoque, si in-
veniretur tandem absolutissima ratio aequandi per causas physicas, posset
postmodum constitui verissima eccentricitas et per eam corrigi omnimode
possent distantiae aphelii et perihelii. Ut quia hic nimis magna fit ae-
quatio per $2' 20''$ (si modo et vicariae credimus de planetae longitudinis
loco sub zodiaco, et omnia hic et cap. XLV. assumpta vera ponimus), paria
vero faciunt et optica et physica aequationis causa in longitudinibus mediis,
ut hic: bisecto igitur errore, dimidium $1' 10''$ subtraheretur angulo ultimo
invento $5^\circ 20' 18''$, ut sit $5^\circ 19' 8''$, quo ostenditur 9310 tangens; prius
9344; differentia 34 ablata a 9264 eccentricitate, relinqueret 9230 cor-
rectam eccentricitatem. Sed hanc nos jam non sequemur, quia assumpta in
minimis peccant. Sufficiat monuisse in futuros usus capitum proxime se-
quentium.

Exploremus vero etiam, quid in octavis temporum polliceatur haec
forma aequationes computandi. Sit, ut cap. XLIII, anomalia media
 $48^\circ 45' 12''$. Et quia perinde est, utra numerorum mensura areae expri-
mantur, retinebimus numerum areae circuli 360° et maximi trianguli 19108''
(jam modo in alia numerandi ratione erat 463200000). Conjiciamus
anomaliam eccentrici, seu in schemate $B\beta\delta$ esse 45° . Sinus ergo 70711
scilicet BC. Hic multiplicatus in maximum triangulum 19108'', rejectis
cyphris dat hujus loci triangulum $Ba\beta$ 13512'' sive $3^\circ 45' 12''$, quod
additum sectori $B\beta\delta$ 45° dat $48^\circ 45' 12''$ aream $Ba\delta$, quantam et assum-
simus anomaliam mediam. Bene ergo coniecimus angulum ad β . Jam
ut radius $\beta\phi$ ad $\beta\xi$ 99142, sic BC 70711 ad Cr 70104. Et quia BC
70711, erit C β sinus complementi ejus anguli, nempe hoc loco etiam
70711, quare Ca 79975. Ut autem haec habet ad 100000, sic Cr ad
tangente[m] quaesiti anguli αC $41^\circ 14' 9''$. Vicaria hypothesis ostendit
 $41^\circ 20' 33''$.

Eadem facile explorantur in octava inferiore. Sit anomalia media
 $138^\circ 45' 12''$, et idem nomen areae, cujus quaeritur angulus ad α .
Inveniemus, quod sinus anguli ad β 135° , scilicet 70711, ex sectore et
area trianguli hanc summam efficiat. Et quia sinus 70711 ut prius
decurtatur ad constituendam ordinatim applicatam ellipseos, fitque 70104,
haec jam est comparanda cum sinu complementi anguli 135° , scilicet cum
70711, non jam aucto eccentricitate $\alpha\beta$ ut prius, sed diminuto ea, scilicet
cum 61447. Quae sicut se habet ad 100000, sic 70104 ad tangentem
anguli quaesiti $48^\circ 45' 55''$, vel complementum $131^\circ 14' 5''$. Vicaria
hypothesis ostendit $131^\circ 7' 26''$. Confer haec cum cap. XLIII. et cum
modis aliis per hanc tabellam.

Anomaliae mediae communes.	Per simplicem eccentricitatem.	Per bisectionem eccentricitatis et duplicationem aequationis partis superioris.	Per bisectionem eccentricitatis et stabile punctum aequatorium, more Ptolemaico.	Vicaria per liberam sectionem cum veritate proxime in effectu consentiens.	Per suppositionem perfecti circuli, physica.	Per suppositionem opinionis capitis XLV. et perfectae ellipsos, physica.
respondent coaequatae anomaliae diversae						
48°45' 12"	41°40' 14"	40°45' 52"	41°15' 31"	41°20' 33"	41°28' 54"	41°14' 9"
95. 18. 28	84. 40. 44	84. 37. 48	84. 41. 22	84. 42. 2	84. 42. 26	84. 39. 42
138. 45. 12	130. 40. 46	131. 45. 0	131. 15. 31	131. 7. 26	130. 59. 25	131. 14. 5
		Excessus et defectus in contrarium vergunt, si duplicetur pars inferior.				
	Cap. XX. et XXIX.	Cap. XXIX.	Cap. XIX.	Cap. XVI. et XXIX.	Cap. XLIII. et XXIX.	Cap. XLVII. praesente.
Notabis, veritatem esse exacte in harum medio.						

Duarum igitur* physicarum hypotheseon aequationes eccentrici computandi illa exhibet aequationes veritati propiores, quae prius cap. XLV. et distantias veriores dederat, posterior nempe. Et quod mirum videri possit, levi augmentatione eccentricitatis aequipollet modo Ptolemaico, per stabile punctum aequatorium, bisecta eccentricitate.*)

Et cum hanc Ptolemaicam supra coarguerimus erroris, necesse est et illam physicam, quae cum hac in effectu paria facit, adhuc a vero nonnihil deflectere. Tardus quippe fit planeta circa apsidas, et nimis velox circa longitudes medias. Quod primum est argumentum, quo probatur, aut vitiosam esse opinionem cap. XLV, aut eam vitiosa methodo in numeros esse coniectam. At quia neque planum circuli aequipollet collectis universis distantiiis, neque ovalis figura, quam Mars ex opinione cap. XLV. describit, perfecta est ellipsis, ut usurpaveramus: quare a vero discrepandi causae adhuc quidem caecae sunt. Potest enim praeter has duas calculi etiamnum tertia, ipsius fundamenti seu opinionis cap. XLV. error concurrere. Nondum igitur ex lege opinionis cap. XLV. aequationes constituimus, nondum susceptae illic hypothesei satisfacimus, quia a geometria destituimur. Itaque nequimus adhuc illam erroris arguere. Hoc enim facturus calculus legem sibi ipsi indicit innocentiae.

Caput XLVIII.

Modus aequationes eccentrici computandi per mensuram et sectionem numeralem ooidis circumferentiae Cap. XL. descriptae.

Cum itaque calculus superiori capite usurpatus tot nominibus a geometria destitueretur, itaque de culpa excessuum et defectuum, quas in illius capituli aequationibus eccentrici deprehendimus, esset suspectus: tandem confugi ad numerationes arithmeticas, quibus conatus sum declinare incommoda illa, quae cap. XLVI. nobis iter planetae descripturis obstabant. Primo

*) His indiciis certi reddimur, nos in via esse, quae tandem nos perducet ad naturales et verissimas aequationum adeoque motuum coelestium causas.

enim, quia planum non erat exquisita mensura summae distantiarum, misso igitur plano distantias ipsas computavi singularum circumferentiae partium aequaliter divisae. Secundo, quia proportio non manebat eadem, additis geometricarum aliquot proportionum terminis, igitur singulas singularum distantiarum proportionem ad suos arcus minimos consului seorsim. Tertio, quia summa aliquot distantiarum cap. XLVI. non potuit constitui geometricae, constitui ego hic arithmetice, nihil enim impendebat. Quarto, hoc mihi facienti nullum erat negotium cum sectoribus sive circuli sive ovalis: itaque ne hoc quidem mihi obstare potuit, quod illi sectores inter se differrent. Atque ita nova molitione in id incubui, ut scirem vel tandem, an ex suscepta justarum distantiarum hypothesi (nimirum ex opinione cap. XLV.) sequerentur etiam aequationes per vicariam nobis manifestatae.

Rem ita sum aggressus. Centro B, diastemate BD, scribatur circulus DGR, in quo sit linea apsidum DR, et A fons virtutis, seu centrum Solis. Sumatur in circulo DG punctum G, quod connectatur cum B et A, et sit initio GBD angulus mensura temporis computandae distantiae. Erit propterea GA distantia vera planetae ab A, quamvis planeta ex D in G usque non pervenerit. Nam haec ratio computandi seu demonstrandi distantias hactenus ex cap. XLV. in praesupposito est. Sit autem DG pars circuli exilis, ut 1° de 360° . Ac cum huiusmodi distantiae AG omnes ad omnium graduum DG terminos D et G hoc modo computari possint per demonstrata cap. XXIX, collegi igitur omnes 360 distantias AG longissima additione in unam summam, quae inventa est 36075562 (eccentricitate 9165) respondens integrae semitae ovali Martis. Jam centro A, diastemate AG, scribatur arcus versus D, qui sit GC. Et quia, quo longior distantia, brevius iter planetae, data ergo distantia arcus circuli DG (qui arcus jam, dum GA distantiam computamus, nihil aliud metitur quam tempus), dabitur et longitudo itineris ovalis DC, quod planeta in suscepto tempore DG (seu anomalia simplici 1°) conficit. Nam ut longitudo totius ovalis circumferentiae ad summam distantiarum omnium, ita se habet distantia arcus DC (inventae per arcum DG) ad longitudinem sui arcus ovalis DC. Probatum enim est supra cap. XXXIII. et usurpatum cap. XLVI. (ubi huius operationis jacta sunt fundamenta) arcuum confectorum ad distantias proportionem esse permutatam. Fuit autem haec ratio a me adhibita, ut jungerentur AD, AC, scilicet terminorum C et D distantiae ab A, et medium summae usurparetur pro genuina distantia arcus totius DC. Dividatur enim circulus aliquis eccentricus DK, centro B descriptus, in partes quotcumque in D, G, L, K, M, N, et a principiis partium, centro mundi A, ducantur arcus usque ad lineas ex A per fines arcuum ejectas, ut DO, GP, LQ, KR, MS, NT; erunt plana in sinistro semicirculo ADO, AGP, ALQ, ALQ majora justo; plana in dextro ANT, AMS, AKR minora justo. In minimis igitur alterum ab altero compensatur, ut TNA, ODA quam proxime aequant GDNA planum.

Fig. 101.





Fig. 102.



Sic igitur data longitudine DC prioris schematis, quae respondeat dato tempori DG et distantiae GA, hoc est CA, oportet jam etiam invenire angulum CAD anomaliae coaequatae. Connectatur C cum B, et continue-
tur AC in E, ubi secet circulum, BC vero in F sectionem. Non sufficit igitur scire longitudinem DC, oportuit etiam investigari angulum CBD. Nam quia CD brevior est quam FD, non metitur igitur CD angulum FBD, hoc est CBD. Et vicissim, etsi CD brevior est quam FD, tanta tamen ex B apparet, si fingas oculum in B, quanta FD metiens angulum CBD. Et quia (secundum demonstrata cap. XXXII.) verum est ad omnem sensuum subtilitatem, quod quanto a B remotior est FD quam CD, tanto et longior sit FD quam CD; quia etiam verum est, ad eandem sensuum huiusque negotii quantumvis acutissimam subtilitatem, quod CE et CF sint aequales (longior quidem in rei veritate est CE quam CF ex centro veniens per Eucl. III, 7): ergo posui primo, quod CD et FD sint aequales, et utraque sit mensura anguli CBD, hoc est FBD vel etiam EBD, quasi arcus EF insensibilis esset. Dabatur igitur angulus EBD ex cognitione CD. In triangulo igitur EBA ex angulo EBA et lateribus EB, BA quaesivi longitudinem AE, unde subtraxi AC vel AG ante computatam, relinquebaturque CE vel CF appropinquo alterius termini de CD ad centrum B. Bisecto igitur CE (nam hoc ad sensum licet) nota fuit appropinquo ipsius CD ad B, si aequabiliter omnibus punctis appropinquasset. Ex appropinquatione vero et parallaxi optica seu visibilis quantitas ipsius CD dabatur, hoc est angulus CBD jam correctus, qui prius assumebatur paulo minor, nullo in numeris nostris errore. Dato igitur jam correcto angulo CBD, hoc est complemento ipsius CBA, et latere CA et eccentricitate BA, dabatur quaesita anomalia coaequata CAD.

Hoc pacto non poterat ulla aequatio seorsim constitui, praeter primam et anomaliam mediam 1° . Reliquae omnes usque ad 180^{am} praesupponebant semper aequationem, quae proxime antecederet, cognitam. Non puto quemquam fore, cui haec legenti taedium ex ipsa lectione non obrepit. Atqui vel hinc iudicet lector, quantum molestiarum hauserimus (ego et calculator meus) qui hanc methodum per 180° anomalias ter absolvimus, toties scilicet mutata eccentricitate.

At nondum principium huius calculi expeditum est. Dixi enim, praesupponi cognitam longitudinem ovalis totius. Unde igitur haec cognoscitur? Ego quidem, qui semel in hanc inartificialem numerandi rationem descenderam, non subterfugi illam inartificialiter praesupponere, totoque negotio absoluto videre, an in 180° operatione mihi plus exiret, quam apparentis graduum 180, an vero minus. Nam si plane 180° exivisset, bonam intellegebam assumptionem ipsius longitudinis ovalis; sin autem minus, minorem justo; sin plus, maiorem.


Sed tamen non destituimur manuductione quadam geometrica ad hoc conjiciendum de ovalis longitudine. Sit enim ut BD ad BA, sic BA ad DH, quae a D versus B extendatur. Ergo quia (cap. XLVI.) quod sub latitudine lunulae et semidiametro circuli, fere aequale est quadrato eccentricitatis: quare (Eucl. VI, 17) eccentricitas est medium proportionale inter latitudinem lunulae et semidiametrum. At hic idem fit ex delineationis lege. Ergo DH est latitudo lunulae. Sumatur etiam dimidium de HD, et extendatur a B versus D, sitque BI: et centro I, diastemate ID, circulus DE scribatur, tangens eccentricum in D. Scribatur autem et centro B, diaste-

mate BH, circulus HK, tangens priorem in K. Manifestum est, circulum HK minorem esse quam DK, et circulum DGR majorem esse quam DK. Et quia circulares circumferentiae sunt ad invicem ut earum semidiametri: ut igitur BD ad DI et BH, sic circulus major DG ad minores DK et KH. Sed DI est medium arithmeticum inter DB et HB, quia BI est dimidium ipsius HD. Ergo etiam circulus DK, tangens minorem et majorem ex eodem B centro descriptos, est medium arithmeticum inter illos circulos, quos tangit. Quodsi via ovalis continuetur, ex supposito tanget et ipsa majorem circulum in aphelio D et perihelio R, minorem vero HK in longitudinibus mediis, ut ita sit major minori HK, minor majori circulo DR. Consentaneum igitur est, non longe abesse ovalem circumferentiam a longitudine, circularis circumferentiae DK.

Paulo tamen majorem credere facit haec demonstratio, Sumatur medium proportionale inter BH et BD, quod sit BO, et centro B, spatio BO scribatur OP circulus. Itaque per V. Sphaeroideon Archimedis planities hujus circuli OP erit aequalis planities ellipsoe, cujus est longior semidiameter BD, brevior BH. At quia figurarum isoperimetron capacissima est circulus, conversim igitur (per communem notitiam) aequae capacium figurarum brevissima perimetros erit circuli. Cum ergo ellipsis, quae habet semidiametros DB, BH, et circulus OP propositi sint aequae capaces ex jam allegatis, circumferentia ellipsoe erit longior, quam circumferentia circuli OP. Est autem BO insensibili minor quam ID, eo quod BO inter eosdem terminos ponitur esse geometricum medium, ID medium arithmeticum. Per doctrinam enim quinti Euclidis, quia BO est medium proportionale inter HB, BD, ut igitur HB ad BD, minor ad majorem, sic HO excessus mediae ad OD defectum. Itaque cum HB sit minor quam BD, erit et HO minor quam OD. At BI est aequalis dimidia HD, major igitur est BI quam HO, minor quam OD. Ad communem ergo minimi circuli HK semidiametrum HB apponuntur inaequalia, nempe minus dimidio ipsius DH in BO, et dimidium ipsius DH in BI; ergo major DI quam BO. Major igitur DK circulus quam OP. Id tamen insensibiliter, cum DH minor sit quam centesima ipsius DB. Itaque positus his circulis ex abundanti aequalibus, et posito, quod ovalis sit perfecta ellipsis: erit ovalis circumferentia paulo longior quam circulus DK, certe longior quam circulus OP. Et quia supra cap. XLVII. DH fuit 858, qualium DB 100000, dimidium igitur de DH, 429, auferatur a DB, 100000, restabit 99571. Ut igitur 100000 ad 99571, sic erit quam proximae circumferentia circuli ad circumferentiam ovalis quaesitam. Et quia circuli circumferentia habet 360° , vel $21600'$ vel $1296000''$, decedet partem quae habet $5560''$ vel $92' 40''$: et semicircumferentiae ovalis adimenda erunt $45' 20''$, aut etiam minus, si ovalis circulum DK, loco mensurae consideratum, superet. Omnino quidem ego non per demonstrationem, sed per calculum laboriosissimum et pertinacissimum inveni defectum semicirculi ovalis $45' 45''$: ut qualium semicirculus perfectus est 180° , talium ovalis esset $179^\circ 14' 15''$.

Et quia decurtatio haec ovalis circumferentiae necessario aequalis est contrariae amplificationi opticae (videtur enim haec ovalis, licet brevior, sub amplitudine tamen 2 rectorum sive 180° praecise, et tam longa esse

Fig. 101.



censetur), hinc non injuria dubitare possit lector, an etiam in hoc processu opus sit primum totam ovalem decurtare, postea per partes iterum optice augere? Nam ex schemate videtur apparere, abbreviationem ibi fere maximam contingere, ubi et appropinquatio maxima ad B centrum et vicissim.

Quòd si pariter incederent hae variationes, methodus nobis ista nasceretur computandi aequationes:

Anomalia media primum esset GBD, unde computaretur distantia GA, quae addita ad AD distantiam termini alterius antecedentis de GD (qui semper est 1°) et summa dimidiata, constitueret arcus CD distantiam aequabilem (omnium scilicet ejus punctorum): et tunc diceremus, ut est longitudo semicirculi ad summam distantiarum omnium in semicirculo, sic esse hanc distantiam arcus GD ad longitudinem FD, hoc est ad apparentiam ex B ipsius CD. Jam ex FD, tanquam ex mensura anguli CBD et ex AC, AB quaereremus CAD coaequatam anomaliam breviori via quam prius.

At sciat lector, has duas varietates non ambulare pari passu. Nam amplificatio optica, quae oritur ex appropinquatione itineris DC ad centrum B, potissima accidit circa longitudes medias; nulla fere in aphelio et perihelio: at contra, decurtatio viae ovalis, quae oritur ex ingressu planetae ad centrum, circumcirca pene aequalis est. Cum enim duae distantiae oppositae in longitudinibus mediis eccentrici aequent duas junctas prope lineam apsidum, alteram aphelio vicinam, alteram perihelio: arcus vero circumferentiae ovalis sint in permutata distantiarum proportionem: quare et duo arcus hujusmodi in longitudinibus mediis, duobus arcubus, alteri prope aphelium alteri prope perihelium, aequales erunt. Si ipsi arcus ovalis aequales, ipsa etiam diminutio horum arcuum omnibus quatuor locis erit fere aequalis. Experimento res est comprobata. Si namque defectus semicirculi ovalis est $45' 15''$, erit defectus partis centesimae-octagesimae de ovali circa aphelium circiter $14''$. At amplificatio ex appropinquatione ovalis non aequat unum secundum circa aphelium. Itaque quod allegatam ocularem schematis aestimationem attinet, non est simpliciter ita, ut prius haec objectio dicebat, ut decurtatio ovalis et ejus amplificatio optica se mutuo compensent. Esset quidem ita, si omnes arcus viae ovalis objicerentur centro B directe. At hoc fit tantum in longitudinibus mediis. Versus apsidas vero hi arcus terminis suis inaequaliter appropinquant. Quare non fiunt tanto majores per appropinquationem et apparentiam, quanto sunt facti breviores per decurtationem.


Itaque hanc methodum secutus aequationes Martis ad omnes gradus eccentrici exstruxi, idque ter. Nam primo eccentricitatem non satis magnam assumseram, 9165, existimans, me hanc sic per planorum tractationes optimam fecisse. Deinde etiam plus quam 180° in regula posueram, cum minus ponere debuissim. Itaque cum hic ultima operatio plus quam 180° ostenderet, quod absurdum, secundo assumsi semiovali $179^\circ 14' 15''$. Prodibat igitur ad anomaliam mediam 45° — coaequata . $38^\circ 5' 33''$
cum vicaria cap. XVI. diceret hanc $38. 4. 54$

	Differentia	39
Ad anomaliam 90° — coaequata		$79^\circ 31' 31''$
Veritatis index vicaria		$79. 27. 41$
	Differentia	3. 50

Ad anomaliam 135° coaequata	127° 0' 1"
Verax vicaria	126. 51. 9
Differentia	8. 52

Atque hinc intellexi, praesertim ex anomalia 90°, eccentricitatem 9165 parvam esse nimis. Quam correxi secundum methodum capite praecedente obiter traditam: ut quia in longitudinibus mediis plus indigemus per 3' 50" in aequatione maxima, dimidium igitur 1' 55" datur parti opticae, residuum physicae. Ac cum 9165 subtendat 5° 15' 30", tu sume 5° 17' 25", qui monstrat 9227. Itaque nova eccentricitate 9230 (quae parum abest a 9264, quam cap. XLII. inveni, nec multo longius a 9282, quod est dimidium eccentricitatis aequantis cap. XVI.) universum hunc laborem reiteravi. Nam primo distantiae GA vel CA fuerunt exstructae ad singulos gradus integros anomaliae distantiarum coaequatae GAD. Post traductae ad mediae anomaliae distantiarum gradus integros GD vel GBD. Tertio binae proximae fuerunt conjunctae ut GA, AD. Quarto iis divisoribus divisa est 180^{tes} summa 358° 28' 30", longitudo scilicet viae ovalis. Quinto sigillatim invicem fuerunt additi arcus singuli viae ovalis. Sexto ex priori frustranea operatione mutatae fuerunt amplificationes opticae, quod viderem illas jam bis computatas parum admodum discrepare. Itaque et hae sigillatim sunt additae ad superiorum summam. Septimo summae arcuum auctae summis amplificationum opticarum. Octavo ex hoc sic invento angulo CBD ad centrum eccentrici B et ex distantia CA seu latere opposito et eccentricitate AB cen latere tertio, inquisivi angulos 180° aequationis opticae ACB, unde totae aequationes et anomaliae coaequatae prodierunt. Prodiit autem ad anomaliam

Fig. 101.



mediam	coaequata	quae in vicaria	Differentia
45°	38° 2' 24"	38° 4' 54"	2' 30"
90	79. 26. 49	79. 27. 41	0. 52
135	126. 56. 25	126. 52. 0	4. 25.

Itaque eccentricitas etiamnum potest augeri, et planeta superius ab aphelio exiguo fit tardior justo, versus perihelium itidem; quare circa longitudes medias velocior justo, ut et prius cap. XLVII. Nimium igitur distantiarum videtur conferri circa apsidas; non satis multas aut non satis longas circa medias longitudes. Sed hujus rei consideratio suo loco sequitur.

Cum igitur viderem, semper tanto propius accedi ad aequationes veras hypothesi vicaria cap. XVI. proditas, quanto dexterius et quanto convenientius ad calculi rationes moderandas advocantur causae physicae, cap. XLV. introductae: multum mihi ipsi sum gratulatus et in opinione cap. XLV. confirmatus. Contra cum pigeret *ἀρετῆς* multiplicis, qua cum hoc capite sum luctatus: non quievi, quin certiolem et expeditiorem aliquam viam insisterem, simulque suspicari coepi, ne sic quidem omnino effectum esse calculo, quod opinio cap. XLV. jusserat.

quadratura, capitum XLVI. XLVII. XLVIII. materia,
ad ipsa ovalis viae principia, cap. XLV. assumpta, cal-
culum converteremus. Relegatur caput XLV, et centro
A corpore Solis, diastemate AD, circulus DG centri
epicycli scribatur; et alius centro A, diastemate AB,
circulus aphelii, in quo sit AGB linea apsidum; et
planeta, quando est *ἀφῆλιος*, sit in B. Sit autem
tempus aliquod elapsum ab eo, quo planeta fuit in B,
cujus mensura sit CDE angulus in epicyclo, ut B,
aphelio epicycli, in C translato, et G centro epicycli
in D, planeta in epicyclo a C in E iverit. Ergo ad
cognoscendum DAB angulum^r sub CDE. tempus, per-
pende, planetam a B in E pervenisse duobus virtu-
tibus; altera, quae ipsum fecit Soli propiorem, quae
simul etiam eduxit eum e linea AC vel AD, in qua
prius fuerat, cum AC esset in AB; altera, quae ipsum

cum epicyclo promovit, ut centrum epicycli D esset in AC linea, cum prius in AB esset. Illa vero virtus, quae centrum epicycli circumagit, tempore per 360° signato movet per 360° seu quatuor rectos circa A, propter distantiarum 360 summam. Ergo data summa aliquot distantiarum ex CDE tempore ut hactenus, dabitur etiam angulus DAB. Quam enim impressionem facit Sol in corpus planetae per medianas distantias AB, AE, eandem ponitur etiam facere impressionem in centrum epicycli GD: propterea quod planeta, si se ipse non extricasset interea versus B ex radio virtuoso AB vel AC, sed tantum descendisset ad Solem, tunc adhuc esset in AC ejusque puncto F, in qua linea et ipsum D centrum epicycli inest. *) Extricavit autem sese lege epicyclica et diastemate DE, angulo CDE (hoc enim vult opinio cap. XLV, cui hic operamur): Ergo ipse sibi fictione quadam centrum epicycli in D reponit. Diximus enim cap. XXXIX; quomodo imaginandum sit, virtutem seu fictitios radios virtuosos AB, AC &c. servire planetae pro loco. Jam etsi non plane eadem est proportio BE arcuum viae ovalis ad totam ovalem, quae est arcuum GD respondentium perfecti circuli ad totum circulum, sed neque ut BC ad totum ambitum circuli BC, sic arcus ovalis BF ad totam ovalem. At nihil hoc debet nos impedire, quia BE vel etiam BF componitur ex duabus virtutibus; et quia, si quid in proportionem turbatur, id facit planeta (secundum hanc cap. XLV. opinionem) suo descensu proprio in circumferentia epicycli. Si enim mansisset planeta supremo loco epicycli, et perpessus esset eandem vim motus ex Sole per AB, AE adumbratam, puta inaequabilem (quod quidem fieri simul non potest: nam manente eadem distantia planetae a Sole, manet idem vigor motus ex Sole), tunc scripsisset perfectum arcum circuli majoris BC, cuius eadem est proportio ad totum BC, quae GD arcus ad totum GD.

Scio equidem, si planeta in angustiiori ambitu, centri scilicet epicycli DG, supponatur, longe fore celerior. At non ideo et centro epicycli assignandus est motus celerior. Nam centrum epicycli moveri supponitur non propter se, cum id non sit corpus, sed propter planetam. Itaque posito, quod planeta suum corpus ipse transportet ex radiis Solis lege epicyclica, et radiis quibusdam virtuosis ex Sole pro loco utatur (quae cap. XXXIX. rejecta quidem sunt, sed cap. XLV. resumta et nonnihil mutata, hic vero retinentur ad explicandos conatus meos), sana postea est ratio calculi, quicunque sequatur ejus effectus. Existit enim et hic ovalis non minus quam prius, eo quod DE et AB non manent paralleli. Quanto enim superant distantiae AB, AE longae mediocres AG, AD, tanto brevior est factus arcus DG seu angulus DAG angulo CDE mensura temporis. Itaque DE ad B annuit, E igitur a circumferentia circuli ad BA ingreditur. Nam per cap. II, si DE parallelos ipsi AB mansisset, tunc E in ipsa circumferentia esset.


Nascitur ergo methodus ista. Distantiae quaeruntur ad omnes integros gradus anomaliae mediae. Methodum supra habes cap. XXXIX, qua et superioribus cap. XLVII et XLVIII. sum usus. Primum enim inveniuntur di-

*) Haec sub certa conditione sunt vera, si nempe radii virtuosus ex Sole sint planetae pro loco seu instar currus, in quo planeta vehatur, quod hic ponimus: per se autem verum non est. Vide de hoc cap. XXXIX. modum primum. Nam inter quinque absurda illic rejecta hic tantum unum, nempe ultimum, omittimus, reliqua quatuor retinemus.

stantiae graduum non integrorum anomaliae mediae, vel CE. Postea proportionaliter referuntur ad gradus integros ipsius CE. Cujus ambagis si te piget et si delectat labor longior per directam viam, denique si omnia in uno schemate cupis cernere ob oculos, sic ages.

Tempus seu nomen artificiale temporis, quod est astronomis anomalia media, numera in epicyclo CE ab ejus aphelio C contra seriem signorum.

Fig. 103.



Datur igitur angulus ADE vel complementum CDE in aliquot gradibus integris anomaliae mediae. Datur et AD radius 100000 et DE radius epicycli 9264. Quare dabitur et DAE pars aequationis et AE distantia: quorum utrumque refer in catalogum, adscripta sua anomalia media CE, in futuros usus. Hoc pacto colligantur omnes distantiae AE et addantur; invenieturque summa circiter 36075562. Haec enim summa inventa est ex aliqua eccentricitate parum admodum differente a nostra praesenti, quae est 9264. Hujus pars trecentesima sexagesima valet 100210, et pars totupla de quatuor rectis est gradus unus. Ut igitur distantiae omnes ordine ad distantiam 100210, sic hujus distantiae 100210 arcus (60') ad arcus ceteris distantis competentes: quia proportio conversa est, ut cap. XXIX. XLVII.

XLVIII. saepius monitum. Multiplicatis igitur 60' vel 3600'' in 100210, et facto centies octuagies diviso per omnes semicirculi distantias, imo per dimidium summae binarum contiguarum distantiarum (per cautionem cap. XLVIII.), prodeunt anguli DAG centri epicycli. Incipe igitur a 2 minimis angulis DAG, eos addendo, et summae adice tertium; iterum adde summae trium praecedentium et quartum; ita semper, quoad omnes 180 accumulaveris: atque si ultima summa praecise efficit 180°, id argumento tibi erit, te ubique recte operatum esse, nusquam a praescripto aberrasse. Atque hae tibi summae seu anguli DAG rursum scribantur in catalogo, cum adjunctis in margine suis anomalis mediis, ut in promptu sint. Cum igitur computanda est aequatio aliqua integra, seu anomalia coaequata ad susceptam anomaliā mediam, primum cum anomalia media CDE in epicyclo numerata ex catalogo posteriore summae angulorum excerpas angulum DAG vel CAB. Cum eadem vero anomalia media ex priori catalogo excerpas etiam CAE partem aequationis. Atque hac subtracta ab angulo DAB, relinquitur coaequata anomalia EAB. In altero semicirculo quid variandum sit, notum est.

Sit anomalia media 45°, cujus distantiarum summa dat DAG 41° 26' 50"
Eadem anomalia datur CAE pars aequationis 3. 30. 17
Ergo coaequata EAB 37. 56. 43
Dixerat nostra vicaria 38. 4. 54

Differentia 8'

Hoc pacto ad

anomalias medias	collegimus coaequatas	At in veriori vicaria	Differentia
45°	37° 56' 43''	38° 5'	8 —
90	79. 26. 35	79. 27	0
120	110. 28. 8	110. 18½	9½ +
150	114. 16. 49	114. 8	9 +

Planeta circa apsidas fit tardior justo, circa medias longitudes velocior justo.

Dices, proficere nos in pejus, cum cap. XLVIII. propius veritatem venerimus cum effectū. Atqui o bone, si de effectū sollicitus essem, poteram toto hoc labore supersedere, contentus hypothēsi vicaria. Scito itaque, quod hi errores via nobis futuri sint ad veritatem. Interim hoc certum nobis esto, nos tandem aliquando physicas causas, quae nobis sunt in supposito cap. XLV, citra errorem omnem ad calculos vocasse. Simul autem confirmatur et superior cap. XLVII. calculus, cui iste aequipollet: certumque est, quae illic ut *ἀνεωμετρητα* suspecta habuimus, nihil nobis sensibile incommodasse. Itaque, si quid superest discrepantiae harum aequalitatum a veritate, id non methodo numerandi tribuendum, sed opinioni cap. XLV, unde fluunt hi numeri: non quod statim opinio ipsa tota falsa sit, sed quod nimium fuerimus praecipites, qui non expectata observationum decisione plenaria, statim atque intelleximus, iter planetae ovale esse, certam ovalis quantitatem (propter solam causarum physicarum concinnitatem et gratiosam illam aequabilitatem motus epicyclici, falso tamen creditam) arripimus.

Quomodo autem verissima denique sententia sit ad calculos revocanda, et cum hisce capitibus conformanda quam proxime, suo loco dicetur (cap. LVI. LVIII. LIX. LX). Jam pertexam explicationem reliquorum meorum conatuum.

Caput L.

De aliis sex modis aequationes eccentrici exstruendi tentatis.

Ex hac tritura quantulum frumenti acervum collegimus? At vide nunc etiam ingentem siliquarum cumulum. Debuerunt ista referri sub principium cap. XLVIII, eo quod, antequam arcus viae ovalis investigarem, ista tractaverim. Sed lubuit discernere lucis causa. Quin etiam utilia aliqua grana inventuri sumus.

Primi et secundi modi processus fuit iste.


Primo eccentricitate 9165, quae est paulo minor justo, quaevis omnes distantias secundum doctrinam cap. XXIX, quae respondebant gradibus integris anomaliae, inter mediam et vere coaequatam medio loco versantis: quam etsi interdum coaequatam appello, conditionem tamen addo, quod sit tantum distantis destinata: itaque distantiarum*) appello. In schemate altero cap. XLVI. (99.) est angulus FAB; in schemate sequenti CAD. Secundo quaevis tertias proportionales lineas, quae sic essent quaelibet ad suam distantiam, ut haec distantia ad radium 100000. Tertio et quarto addidi lineas inventas sigillatim, fuitque summa distantiarum 35924252, minus quam 36000000; causam habes capite XL. Summa vero proportionalium inventa est 36000000, quod mirum me habet. Et quia delectat, cupio ut hoc ita necesse esse geometra quispiam demonstret. Centris A, B scri-

*) Etsi quantitatem obtinet mediam inter reliquas, cave tamen mediam appelles. Media enim proprie est nomen temporis.

bantur duo circuli aequales IH et DC, et connectantur centra A, B, producaturque AB, donec secet circulum ex A in I, K, circulum ex B in D, L. *) Tunc circulus ex A dividatur in partes aequales quotcunque, puta in 360, initio facto ab I. Et ex A per puncta divisionum, I, H, K et reliqua rectae ducantur AI, AH, AK et reliquae, secantes circulum ex B, in D, C, L punctis. Tunc fiat ut AI ad AD, sic AD ad AG; sic ut AH ad AC, sic AC ad AF; denique ut AK ad AL, sic AL ad AM: et sic de omnibus reliquis. Demonstret, inquam, geometra, ultimas 360 junctas, puta AG, AF, AM aequales esse primis 360 junctis, puta AI, AH, AK.

Itaque primo modo per summas distantiarum aliud institueram (licet erronee et impertinenter, colligere sc. arcus CD vel angulos CBD, cum tamen ii darentur initio), aliud praestiti, rursum errans. Nam collegi non arcus, non angulos, non itinera, sed moras in arcubus inaequalibus itineris planetae, quasi essent aequales; et in regula proportionum dixi: ut summa mediarum AD, AE, AL, scilicet 35924252 ad moram 360°, ita quaelibet summa distantiarum ad moram suam, in spatio, quod distantias has complectebatur. Sit A Sol, B centrum eccentrici CD, BC

Fig. 104.



semidiameter. Connectantur B, A cum C. Hic distantiae CA fuerunt accommodatae ad gradus integros anguli CAD, et propterea ad arcus inaequales circuli CD, quod me fefellerat. Sit igitur CAD 45°. Datur ex CB, BA angulus CBD 48° 42' 59". Itaque, si nulla esset causa physica aequationis et CBD mensura temporis seu anomaliam media, tunc ei responderet haec ipsa CAD vere coaequata. Sed quia planeta in CD tardior est, ob longam ab A distantiam, et quia distantiae sunt hujus morae mensurae: collegi igitur ad anomaliam CAD 45° distantias 45 ad initia arcuum sive longiores; summa erat 4869307: collegi etiam 45 breviores seu ad fines arcuum, subtracta longissima AD 109165 a summa 46 distantiarum sc. 4975577, restabant 4866412, et quod erat inter utramque summam intermedium, sc. 4867852, id redegi in gradus, qualium 35924252 valent 360°, vel qualium 99790 valent 1°. Prodiit hoc pacto 48° 46' 51". Atque hoc debuit esse tempus, respondens angulo CAD. Sed et arcus CD vel angulus CBD inventus erat proxime tantus, scilicet 48° 42' 51", quod absurdum et contra hypothesin, quae vult, planetam esse tardiozem in CD. Statim igitur causa hujus absurdi patuit; quod nempe ad sciendam moram in CD decuisset distantias consulere, respondentes aequalibus arcubus ipsius CD, cum hae jam usurpatae distantiae respondeant inaequalibus ipsius CD, et tanto majoribus, quanto sunt ipsae distantiae longiores per cap. XXXII. Itaque nimis paucae numero erant hae distantiae. Sed tamen, ut non frustra hunc laborem perderem, excessum numeri morae hujus supra CAD anguli numerum subtraxi a CAD, ut restaret EAD 41° 13' 9", et AC, AE aequales essent: ubi ponebatur, tempore CBD conficere planetam circa centrum eccentrici B

*) Cum alias tres sint anomaliae, quarum 1. dicitur media, 2. eo centri, 3. coaequata: nos in hoc schemate et hoc particulariter conatu ad confusionem vitandam intelligamus, primam in arcu CD, vel angulo CBD, secundam in angulo CAD, vel arcu ED, tertiam in angulo EAD.

angulum EBD aequalem ipsi CAD: et ideo ad ejus eccentrici ED arcus aequales colligi tot distantias ab A, quot nos hic invenimus in gradibus aequalibus ipsius CAD; ut quantum earum esset dispersum per CD inaequales et hoc loco magnas partes, in hoc nostro calculo, tantum intelligatur congestum intra angustias ED, et partes ejus aequales. Hic ergo CBD angulus esset anomalia media distantiaria *), dans angulum CAD, pro quaerendis distantis CA, ex quibus distantis angulus CAE, retardatio et translatio physica ipsius CA in EA, elicitur.

Haec ratio etsi non multum discrepare potest a priori cap. XLIX: illud tamen indemonstratum assumit, CAD et EBD esse aequales, ac propterea CA et EB parallelos, quod supra cap. XLVI. per schema alterum est refutatum. At vide nunc et propinquitatem hujus operationis in effectu. Nam

ad anomaliam mediam	inveniebatur coaequata	quae est in vicaria	Differentia	
48° 42' 59"	41° 13' 9"	41° 21' 0"	8' —	} Paulo distat ab illa cap. XLIX. et dua- bus cap. XLIII.
95. 15. 31	84. 44. 18	84. 39. 18	5 +	
138. 42. 59	131. 20. 24	131. 4. 7	16 +	

Arguebatur eccentricitas parvitas, ut quidem vere est major, scilicet non 9165 sed 9264. Et fiebat planeta nimis tardus circa apsidas, velox nimis circa medias longitudes. Sed misso hoc primo modo, quem fortuito arripueramus ex animadversione erroris initio commissi, convertamur ad praxin modi secundi, natam ex ejusdem erroris animadversione. Cum enim distantiae per CAD sparsae aequarent fere sectorem CBD numeris, et rem in absurdum deducerent (planum enim CAD, metiens distantias proxime, majus utique est plano sectoris CBD; itaque et distantias CD majores [in numero suo] esse oportuit sectore CBD), tunc succurrit, an igitur ipsarum AC, AD proportionales AF, AG justas exprimerent moras planetae in CD, ut ita CAD maneret anomalia vere coaequata? *) At contra, si hoc, ergo AC distantia manebit suo loco, quo loco et computata est. Erit igitur orbita perfectus circulus quod cap. XLIV. est refutatum. Distantiae igitur, in longitudes medias longiores justo incidentes, facient planetam justo tardiorum ibi; quare in apsidibus velociorem. En autem effectum operationis, ipsum hoc testantem. Nam

ad anomaliam coaequatam	sequebatur media	At in vicaria	Differentia	
45°	52° 39' 40"	52° 53'	13' —	} Pene coincidit cum physica perfecti circuli cap. XLIII.
90	100. 29. 12	100. 34 1/2	5 —	
135	142. 10. 47	142. 9	2 +	

Primum eccentricitas arguitur parvitas, quia aequatio maxima prodit 10° 29 1/2', quae in vicaria est 10° 34 1/2'. Deinde planeta tempore 52° 39 1/2' invenitur tantum itineris ab apside confecisse, quantum in vicaria tempore longiore 52° 53'. Quodsi emendetur eccentricitas, fient omnes coaequatae hujus anomaliae auctiores; quare etiam infra planeta tempore 37° 44'

*) Mediam dico, non a quantitate inter tres, sed a motu aequabili et medio temporis, quod hic mensurat: quatenus quidem distantiae quaeruntur.

**) In secundo conatu anomalia tertia est CAD, secunda CD vel CBD, prima summa linearum AG, AF paucarum, cujus mensura ponitur esse planum CAD, fore ut cap. XLIII.

(quod est complementum ad $142^{\circ} 16'$ emendatam, per auctam eccentricitatem) tantundem itineris absolvat, quantum in vicaria tempore longiore $37^{\circ} 51'$, quod est complementum ad $142^{\circ} 9'$, scilicet utrinque conficiet 45° , complementum nempe ad 135° .

Interim parum abest, quin haec falsa hypothesis verum nobis effectum prodat: differentia utrinque post correctionem non majore quam $8'$ et $7'$. Itaque vides, non esse fidendum effectui. Et notabis rursum, quod et cap. XLVII, veritatem inter hos duos modos (quorum hic perfectum circulum, ille ovalem ex opinione cap. XLV. describit) esse loco medio: unde vel jam ut et supra cap. XLVII. colligere potes, lunulas dimidia tantum modo latitudinis ejus, quae sequitur ex opinione cap. XLV, a perfecto circulo resecandas.

Modus tertius et quartus.

Cum itaque nec haec cum ratione staret methodus, et in illa altera didicissem, exquirendas distantias respondentes integris gradibus CBD anguli seu aequalibus arcibus eccentrici CD: accessi et ad illas.

Quinto igitur (adnumero tibi tantum illas operationes, quae singulae 180 vicibus perficiuntur) distantias prius inventas ab anomaliis mediis scrupulariis*) seu inaequalibus CBD, ad anomalias medias aequales seu integrorum graduum reduxi proportionaliter. Sed jam non amplius, ut prius modo primo, CBD mansit anomalia; sed facta est per hanc distantiarum reductionem anomalia eccentrici: ut et modo secundo.

Sexto iisdem distantias ut prius quaesivi suas proportionales, quae scilicet sic se haberent ad distantias, ut distantiae ad radium 100000. Sed non erat necesse. Volui tamen in eventum omnem esse instructus.

Septimo et octavo rursum addidi singulas, tam distantias AD, AC, quam earum proportionales AG, AF, prodibatque summa distantiarum ipsarum, 36075562. Causam habes cap. XL, cur plus prodierit quam 36000000. Proportionalium vero summa prodiit 36384621.

Jam igitur in schemate priore demonstrative quidem progrediemur, per coaequatam CAD elicientes anomaliam eccentrici CBD, per hanc vero anomaliam eccentrici CBD distantiarum summam in CD arcu inventarum; et per hanc summam distantiarum addiscemus moram in arcu CD, seu anomaliam mediam:**) vel conversa ratione commoditatis causa, si angulo CBD integrorum graduum (ut 45°) quaeratur CAB et excerptantur 45 distantiae justae; haec, inquam, demonstrative quidem fiunt, at rursum, ut prius modo secundo, hoc pacto CAD fit anomalia vere aequata: quare CA manet suo loco et DC orbita erit perfectus circulus; quod cum falsum sit, ut ostensum cap. XLIV, necesse est ergo, distantias in longitudinibus mediis hic usurpari nimis longas, moras itaque fieri prolixiores justo et in apsidibus breviores.

Et omnino quam proxime aequipollebit modus iste priori per proportionales. Quantum enim illic proportionales totidem, quot erant di-

*) Anomaliam dico scrupulariam, quae non integrorum graduum numero exprimitur, sed adjuncta habet scrupula.

**) In tertio conatu rursum est, ut in secundo. CAD est anomalia tertia, CBD vel CD secunda, et AD, AC lineae confertiores, seu planum metiens earum summam, scilicet planum CAD, est anomalia prima, quae dici solet media.

stantiae, longiores erant quam ipsae distantiae, tanto fere jam plures distantias collegimus quam ante. Vide autem et effectum hujus calculi securitatis causa. Nam

ad anomaliam simplicem	proditur coaequata	In vicaria vero	Differentia	} Pene coincidit cum praecedente.
48° 38' 31"	41° 31' 0"	41° 17' 6"	14' +	
95. 13. 58	84. 45. 50	84. 37. 45	8 +	
138. 45. 41	131. 1. 52	131. 7. 13	5 —	

Eccentricitas rursum justo minor arguitur. De cetero errores iidem qui in proxime praecedenti. Nam quod signa excessuum signis defectuum permutantur, fit quia hic differentia ostendit errores anomaliae coaequatae, illic anomaliae mediae. Atque hic est modus tertius.

Proportionalium AG, AF pro distantis AD, AC substitutione, qui quartus est modus, facturi sumus pro duabus tres partes aequationis. Nam planum CAD metitur distantiarum CA, DA summam. Longe igitur minus est quam FA, GA linearum summa. Ac etsi medicinam afferamus similem illius, quae primo modo fuit adhibita: tamen duplicaturi sumus errores.*) Cum enim ipsae distantiae tolerari nequeant, ob nimiam suam in medio longitudinem, minus erunt tolerabiles proportionales, utpote longiores. Et si libet illas probare effectum calculi, invenies, anomaliae mediae 53° 23' 56" respondere coaequatam 46° 0', quae in vicaria proditur tantum 45° 27' circiter, differentia 33', plane absurda.


Modus quintus et sextus.

Cum igitur quatuor his modis nihil effecissem, tunc cum anomalia media et distantis illi assignatis (operatione quinta) transivi in tabulam hypotheseos vicariae cap. XVI, et anomaliae vere coaequatae. Resumatur schema 99. Tunc quia distantiae AF in gradus integros anomaliae mediae IBF vel IDH competentes competeabant etiam in gradus et minutias anomaliae coaequatae IAH, quae in tabula dicta respondebat ipsi mediae anomaliae IDH; igitur nono reduxi has distantias a coaequatis anomalis scrupulariis hypotheseos vicariae cap. XVI, nempe ab ipsis HAI inaequalibus ad coaequatae HAI gradus singulos absolutos, hoc est partes aequales. Decimo iisdem sic constitutis distantis quaesivi proportionales, ut in operatione secunda et sexta. Undecimo et duodecimo addidi singulas in suis classibus fuitque summa distantiarum 35770014, summa proportionalium 35692048. Cum enim jam brevium distantiarum plures sint quam longarum (quia per hanc translationem distantiarum longas omnes sursum traximus et paucas effecimus, constituentes arcus IG viae ovalis supra apud aphelium magnos, et sic tribuentes singulis gradibus anomaliae non FAB ut in primo modo, sed HAB, hoc est vere coaequatae, singulas distantias, quorum graduum in superiori semicirculo non sunt plures quam in inferiore): hinc adeo fit, ut non tantum 360 distantiarum summa minor evadat quam 360 semidiametrorum, sed etiam proportionalium summa minor evadat, quam erat summa ipsarum distantiarum.

*) In quarto conatu si ei medicina afferretur, fieret monstrum, CBD anomalia tertia: planum CAD anomalia secunda. Summa vero FA, GA linearum confortiorum, anomalia prima.

Quod igitur attinet quintum modum et distantiarum ipsarum summas, ratio rursum reclamatur methodo aequationum huic innixae. Repetatur schema hujus capitis proprium, et revocentur in memoriam, quae dicta sunt de modo

Fig. 104.



primo. In illo enim CAD anomalia distantiaria coaequata dividebatur in gradus aequales, ex quo fiebat, ut CD secaretur in partes inaequales et magnas, et haberet distantias paucas, unde accidentaria quadam medicina erroris arrepta, ex summa distantiarum in CD collegimus distantias illis competere breviorum arcum ED, ut in AE transferretur, et sic ED in partes aequales et quolibet gradu sui una distantia instructus habere posset. Hic vero non ex summa distantiarum in CD inventarum, sed ex commixtione hypotheseos vicariae cum hypothese distantiarum capite XLVI. instituta, jam facta et perfecta est translatio ipsius AC in AE, et anomaliae mediae *) (quam ad CA vel EA distantiam inveniendam in CD arcu numeravimus) tributus est arcus ED; sic tamen, ut BE et AC non sint jam praecise paralleli ut modo primo. Hoc, inquam, jam factum per

commixtionem hypotheseon, nihil opus est rursum fieri per operationem, ut modo primo. Sed hoc solum quaeritur, an distantiae AC, AE paucas, hoc quinto modo collectae in unam summam, efficiant eandem aequationem physice, quam commixtis duabus hypotheseibus sortitae sunt artificialiter?

Ubi perpende, quomodo se habeant distantiae hac ultima vice accommodatae. Angulus igitur EAD, cujus terminus E distat a Sole distantia AC, hic angulus in aequales gradus hac ultima vice divisus est et cuilibet tributa una distantia. Qua ratione jam ED arcus ovalis viae, superstant illi angulo EAD, abit in partes inaequales et nimis paucas nanciscitur distantias. Itaque ex summa distantiarum in EAD nequit haberi anomalia media jam praeconcepta ex hypothese vicaria.

Quemadmodum vero supra modo primo, cum CD nancisceretur justo pauciores distantias, diviso angulo CAD in gradus aequales, pro CD substituiamus ED idoneum arcum illis distantias, ita hoc quinto modo, **) cum ED nanciscatur justo pauciores distantias, diviso angulo EAD in gradus aequales, si rursum inartificialem medicinam luberet accipere, pro ED substitueremus ND, cui competant illae distantiae. Sit pro quaerenda distantia CA media anomalia CBD $48^{\circ} 44'$. Dato angulo B et CBEBA, datur CA 105784 et CAB 45° . Illam vero AC jubet vicaria hypothesis transferre in AE. Et nos jam ED, quam indicat vicaria esse $41^{\circ} 22'$, dididimus in gradus aequales, perque illas collegimus non plures quam 41 distantias et partem de 42. Illae vero in summam conjectae confluent anomaliae mediae minime sane aequalem primo susceptae DC, sed aliam DO, quae distantiam AO exhibet transferendam in AN. Am-

*) Nota quo respectu hic media. Vide margines superiores. —

**) In hoc quinto modo est quidem anomalia tertia EAD, et ejus anomalia media (prima ordine) CD vel CBD, atque eadem etiam distantiaria ipsius CA vel EA distantiae. Sed planum EAD metitur aliquam summam distantiarum EA, DA, alienam ab hac coaequata EAD, competentem scilicet temporis mensuram ipsi DN arcui, et DAN coaequatae. Rursum ergo monstrum.

phora coepit institui, currente rota cur urceus exit? Hoc enim quaerebatur, an omnes distantiae, quae sunt in gradibus aequalibus ED, conjectae in summam ostenderent anomaliam mediam DC. At operatio respondit mihi de ND et anomalia DO.

Denique ad modum sextum *) et proportionales convertamur, quae sunt aptae ad demonstrationem cap. XXXII. Etenim arcuum, qui ex centro Solis apparent aequales, quantitates verae in orbita sunt in proportionem distantiarum: ut quanto AE longior, tanto et ED. At vere aequalium in orbita arcuum morae sunt eadem in proportionem distantiarum. Quanto enim ED longius distat ab A, tanto et diutius versatur planeta in arcu ED. Morae igitur, quas nectit planeta in illis arcibus, qui ex centro Solis apparent aequales, sunt in dupla proportionem distantiarum. At sic etiam AF ad AH radium in dupla est proportione ipsius AC vel AE distantiae ad AH mediocrem. Itaque morarum, quas nectit planeta in gradibus anguli EAD aequalibus, mensurae sunt lineae AG, AF proportionales competentes ejusdem EAD anguli anomaliae vere coaequatae gradibus integris seu partibus aequalibus.

Probentur ergo sic proportionales distantiarum ad aequales gradus coaequatae anomaliae, ut supra hoc capite probatae sunt aliae etiam distantiae. Ut quia 35692048, summa distantiarum omnium 360 ad omnes 360 partes anguli ad Solem aequales, valet moram 360°, quid valet summa justa et correcta ad quoslibet gradus anomaliae coaequatae?

Hoc pacto invenitur:

ad anomalias coaequatas	mediae anomaliae	quas vicaria prodit	Differentia	} Coincidit cum illis capitis XLIX.
41°	48° 24' 3"	48° 19' 2"	5' +	
81	91. 30. 39	91. 34. 8	3 1/2 —	
91	101. 28. 10	101. 34. 7	6 —	
131	138. 28. 5	138. 39. 28	11 —	

Arguitur iterum eccentricitas minor justo: qua emendata, differentia supra ad 41° erit circiter 8' +, infra circiter 7 1/2' —, ut hic quoque apud apsidas planeta non satis velox fiat, itaque plus justo distantiarum sit circa apsidas; minus igitur justo in longitudinibus mediis. Sed propinque ad modum ad verum accedit, et cum methodo cap. XLIX. plane coincidit. Nam si bene perpendas, idem hic actum quod cap. XLIX. Illic partem aequationis opticae seorsim computavimus, partem physicam itidem seorsim: hic vero utramque computamus junctim. Illic fictitios radios virtuosos introduxeramus, ut possemus epicyclo suum etiam opus adscribere extricandi sese ex illis fictitiis radiis (nulli enim in rei veritate radii in tanta tarditate circumferunt, in qua incedit centrum epicycli planetarii, ut cap. XXXIX. dictum). Et tamen omnem vim physicam circumferendi planetae, quod effectum attingit, Soli reliquimus, ut epicyclus tantummodo moderaretur distantias: hic eadem virtute Solis sumus usi ad translationem physicam; distantias vero itidem ex epicyclo computavimus ejusque partes aequales temporibus dedimus aequalibus, hoc est anomaliae mediae gradibus aequalibus, ut vult

*) Hic modus sextus levissima correctione eorum, quae opinio cap. XLY. adhuc peccat, adhiberi potest etiam in verissima hypothese physica, estque succinctus et dilucidus.

opinio cap. XLV, etsi tandem sumsimus distantias totidem in qualibet parte temporis, quot sunt gradus anomaliae coaequatae, illae tamen derivatae sunt ex distantibus anomaliae mediae, suntque longitudine eadem. *) Et tantò commodior est haec forma, quod alteram persuasionem de motu planetae epicyclico hic possemus deponere, et uno gradu ad veritatem causae physicae propius accedere, relinquentes epicyclico nil nisi librationem in diametro, sed quae etiamnum vitiosa est, ut vel ex aequationibus his apparuit. Nam ut paulo ante ad modum secundum fuit adnotatum, haec praeoccupatio motus epicyclici nimis est, distantias exhibens nimis breves in longitudinibus mediis; ex quo fit, ut planeta ibi loci modum excedat velocitatis, et in apsidibus a modo deficiat. Sed sufficit nos calculo exprimere opinionem cap. XLV. Quare etiamsi quis objiciat hic ex cap. XXXII, non posse constantem esse hanc proportionem diurnorum, eo quod partes eccentrici, vicinae apsidibus, directe objiciantur Soli, intermediae ex obliquo, ut ita aliter appareant, quam si directe objicerentur, hoc, inquam, si quis objiciat, respondebo sic, ut cap. XLIX. respondi: hanc intermediarum partium obliquitatem addi a planeta de suo effricque per descensum; non igitur imputandum causae motrici ex Sole nec eo turbari illam.

Habes igitur studiosè lector ex tanto numero capitum et methodorum methodos aequandi cum opinione cap. XLV. consentientes tantum duas: alteram hypothesi physica cum epicyclo commixta in longitudinem ordinato, eamque cap. XLIX; alteram hoc capite ejusque modo sexto, pro hypothesi physica sinceriori; ubi epicyclus nihil nisi descensum ad Solem praestat; aut si quis illum vellet in latitudinem ordinare, rectum ad planum eclipticae. Et harum utraque diversis viis consentit in unum effectum. Quo tutius illis fidere poteris in examinanda opinione capitis XLV.

Et hactenus inani fiducia inventarum verarum causarum physicarum de Marte denuo triumphatum esto. Nunc me nescio quis rumor ad novos tumultus novosque labores excitat.

Caput LI.

Explorantur et comparantur distantiae Martis a Sole in aequali utriusque semicirculi distantia ab aphelio: simul etiam exploratur fides hypothesos vicariae.

Dum in hunc modum de Martis motibus triumpho, eique ut plane devicto tabularum carceres et aequationum eccentrici compedes necto, diversis nunciatur locis, futilem victoriam et bellum tota mole recrudescente. Nam domi quidem hostis, ut captivus contemptus, rupit omnia aequationum vincula carceresque tabularum effregit. Nulla enim methodus ex praescripto opinionis cap. XLV. administrata geometricè, vicariam hypothesin capitis XVI. (quae veras habet aequationes ex falsa causa manantes) propinquitate nu-

*) In hoc sexto modo anomalia tertia est EAD, secunda ED, prima vero est summa linearum AG, AF, ubi AF vel AC in AE translata intelligatur. Nihilominus in computanda distantia AE, hoc est AC (ex qua fuit AF) DC vel DBC est etiam prima. Ut ita hic bis pingatur, quia duo investigantur, tempus et distantia.

merorum potuit aemulari. Foris vero speculatores per totum eccentrici circuitum dispositi, distantiae inquam genuinae, profigarunt meas causarum physicarum ex cap. XLV. accersitas copias, earumque jugum excusserunt, resumta libertate. Jamque parum abfuit, quin hostis fugitivus sese cum rebellibus suis conjungeret meque in desperationem adigeret: nisi raptim nova rationum physicarum subsidia, fusis et palantibus veteribus, submissem; et aqua sese captivus proripuisset, omni diligentia edoctus, vestigiis ipsis nulla mora interposita inhaesissem. Utramque rem, ut gesta est ordine, nar-
abo sequentibus aliquot capitibus.

Atque ut de primo dicam initio, prius plurium eccentrici locorum distantias inquiram, quo sit plenior fides rei. Sit igitur nobis animus explorare distantias circa anomaliam mediam 90° et 270° .


Anno 1589. d. 6. Maji h. $11\frac{1}{3}$, δ observatus fuit (in anomalia media 87°) in $27^\circ 7\frac{1}{3}'$ \approx , cum lat. $0^\circ 6\frac{2}{3}'$ bor., quo tempore colligitur locus \odot verus $25^\circ 48\frac{3}{4}'$ γ , ejusque distantia a Terra 101361, longitudo media Martis $7^\circ 26' 0'' 36''$, ac propterea locus eccentricus $15^\circ 32' 13''$ η . Sed hypothesis nostra vicaria cap. XVI. non assequeretur verum seu observatum Martis locum in situ acronychio intra $2\frac{1}{3}'$, ut ita in hoc subtili negotio non liceat fidere computationi anomaliae coaequatae. Quare methodo cap. XXVII, XXVIII, vel XXXI. adjungam aliam observationem, liberiore tamen methodo. Verum ut supra quoque cap. XII. monui, non saepius bis hoc loco est observatus. Duabus igitur observationibus oportet nos esse contentos. Associatur enim huic jam positae altera ex anno 1594 d. 28. Dec. cujus diei mane h. $7\frac{1}{4}$ colligitur longitudo media δ $7^\circ 26' 13' 39''$, paucis minutis priorem superans. Tunc itaque Mars in altitudine 8° vel 9° observatus est a Spica Virginis $50^\circ 34'$ distare. Cum igitur steterit proxime eclipticam, in rectangulo igitur inter Spicam, ejus locum eclipticum et Martem, datur basis $50^\circ 34'$, et latus inter Spicam et eclipticam $1^\circ 59'$, nempe latitudo Spicae. Ergo latus reliquum est $50^\circ 32' 18''$. Quare cum fuerit Spica in $18^\circ 11'$ \approx , δ inciderit in $8^\circ 43' 18''$ γ , qui locus declinat ab aequatore $21^\circ 50' 20''$.

Inventus autem est δ declinare $21^\circ 41'$. Ergo prae se tulit aliquantulam septentrionalem latitudinem, scilicet $9' 20''$. Habuit autem et sequenti 4. Jan. 1595 adhuc borealem latitudinem $3'$. Quo confirmatur nostra observatio. Etsi vero assumseris hanc justam latitudinem Martis, non alterabitur ejus locus eclipticus sensibiliter; ut tuto pronuncies ejus locum $8^\circ 43'$ γ . Et quia fuit Mars prope Solem, valde igitur altus a Terra, et in parallaxi multo minori quam Sol, quam negligemus. At non itidem et refractionem possumus negligere: quam jam removebo. Fuit enim locus \odot $16^\circ 47' 10''$ γ , distantia a Terra 98232, cujus A. R. $288^\circ 12'$, quare oriebatur $306^\circ 37'$ aequatoris, et cum eo 29° γ , cujus angulus inter eclipticam et horizontem 26° , complementum 64° . Et quia refractionis altitudinis ex tabella fixarum refractionis exhibetur $6' 30''$, ex Solaribus $11'$ in altitudine sideris $8\frac{1}{2}^\circ$, latitudini igitur debentur $5' 51''$, vel $9' 53''$. Latitudo illic $3' 29''$ sept: hic $0' 33''$ aust. Et refractionis longitudo $2' 39''$ vel $4' 34''$.

Sequar autem ex duobus hisce refractionum modulis illum, qui per latitudines comprobatur, in hunc modum. In priore observatione fuit latitudo $6\frac{3}{4}'$ borealis visa. Et quia Mars Terrae propinquus, et angulus ad \odot $10^\circ 17'$, ad Terram $28^\circ 41'$, haec igitur latitudo requirit inclinationem

2' 30". Erit igitur et in posteriore nostra observatione inclinatio 2' 30" pauloque minor, quod 8' simus nodo propiores. Assumpta vero inclinatione 2' 30", cum hic angulus ad ☉ sit 61°, ad Terram 38°, necesse est sequi latitudinem 1' 50" sept. circiter; indice nostra tabula parallactica. Sed usurpatione refractionis fixarum latitudo nobis relinquebatur 3' 29" sept.: Solaris vero usurpatione redigebamur per 0' 33" in austrum. Itaque hinc justo plus fuit in nostra refractione suscepta, inde minus. Intermedia itaque refractionis justa fuerit, scilicet 3' 36". Scilicet Mars nobis reponetur

Fig. 105.



in 8° 46' 1/3'. Sit O Sol, B, A puncta orbitae Telluris, A locus Terrae in priori observatione, B in posteriore, M Mars. Connectantur lineae. Et quoniam Mars non praecise redierit in eundem locum, in utroque tamen situ repraesentetur a linea OM. Est igitur AMO 28° 41' 14" et AO 101365. Assumatur MO distantia Martis a Sole (quae hic quaeritur) quasi cognita, sitque 154200. Cadet igitur OM in 15° 31' 3" m. Quod si OM in priori observatione est 154200 assumpta, in posteriori debet assumi brevior. Unus quidem gradus hoc eccentrici loco

mutat distantiam 240 particulis, qualicunque forma distantias extruendi utaris. Ergo cum hic differant longitudines mediae 13', et subtracto modulo praecessionis tantum 8; pars proportionalis de 240 est 32. Quare in secunda observatione assumimus OM 154168. Sed et OBM scitur, scilicet 38° 0' 40", et OB est 98232. Ergo datur OMB 23° 6' 11", quare OM secunda vice in 15° 40' 9" m, differens a priori loco eccentrico per 9'. Debit differre paulo amplius. Nam anomaliae mediae differebant per 8' 3", quibus in eccentrici coaequata anomalia hoc loco respondent 7' 49". His adde praecessionem aequinoctiorum intermediam 4' 48", accumulatur igitur 12' 37", debuit igitur in 15° 43' 40" m cadere. Paulo igitur aliae sunt nobis suscipiendae distantiae OM, et quidem sic alterandae, ut 2 1/2' circiter plus ab invicem discedant lineae ab OM repraesentatae. Terra enim in A versante debet OM in antecedentia moveri; et in consequentia, Terra in B. Id autem fit, si OM auxeris: ut primo loco sit 154400, secunda vice 154368. Tunc enim cadit OM primum in 15° 29' 34" m, secundo in 15° 42' 18" m.

Est autem anomalia media primo tempore 87° 9' 24", sequenti 87° 16' 30". Atque haec in longitudine media priore.

Pro longitudine media altera serviet nobis observatio anni 1595. mense Decembri, bene munita consensu aliquot dierum continuatorum; et ibi loci etiam vicaria hypothesis ad unguem repraesentavit locum Martis acronychium Octobri praecedente. Adjungemus consensus causa et Octobrem anni 1597. Reliquis annis observatus non est hoc eccentrici loco. Nam cadit locus eccentricus in 10° II, itaque Mars hoc loco versans anno 1580. Nov. fuit observatus ultimo. Anno 1582 in Octobrem incidit ejus in hunc locum adventus, cum nondum ferveret observandi studium; anno 1584 in Septembrem, 1586 in Julium, 1588 in Junium, 1590 in Aprilem, 1592 in Martium, quibus temporibus, Soli vicinus ob brevitatem et claritatem noctium in Dania, neglectus fuit, cum stellis fixis, Lunae planetisque reli-

quis, quoties opportunitas aliqua fuit, essent intenti. Anni vero 1593 fine et 1594 initio, cum esset in quadrato Solis, observatio non ultra hunc aspectum est continuata, quia ad hanc quadraturam praecipue solent respicere astronomi. Ergo anni 1595. d. 17. Dec. vesperi h. 7. 6' visus est planeta in $11^{\circ} 31' 27''$ γ , cum lat. $1^{\circ} 40' 44''$ bor. Locus Solis fuit $5^{\circ} 39' 3''$ ζ . Distantia ejus a Terra 98200. Colligitur autem longitudo media Martis $2^{\circ} 2' 4' 22''$. Et quia aphelium $4^{\circ} 28' 58' 10''$, ideo distantia loci ab aphelio retro $86^{\circ} 53' 48''$. Prius pene erat eadem porro, nempe $87^{\circ} 9' 24''$. Ergo haec duo loca pene absunt aequaliter ab aphelio. Respondet autem huic anomaliae simplici ex vicaria nostra hypothese anomalia coaequata $76^{\circ} 25' 48''$, quae ablata a loco aphelii relinquit $12^{\circ} 32' 22''$ Π , locum Martis eccentricum. Sit A (Fig. 105) Terra, O Sol, M Mars. Datur AO 98200. Et quia OM in $12^{\circ} 32' 22''$ Π , AM vero in $11^{\circ} 31' 27''$ γ , ergo AMO $31^{\circ} 0' 55''$. Et quia AO in $5^{\circ} 39' 3''$ ζ , sed AM in $11^{\circ} 31' 27''$ γ , ergo complementum OAM $54^{\circ} 7' 36''$. Hinc, quia ut sinus AMO ad AO, sic sinus OAM ad OM, prodit OM 154432. Et quia locus hic 15' est apogaeo propior, quam ille anno 1589: et hoc eccentrici loco 1° efficit 240 particulas: itaque 60 particulae pro 15' adimendae sunt, quia distantiae ab aphelio in locis remotioribus sunt breviores, ut ita prodeat 154372. Vicissim, quia nodus est circa $16^{\circ} 20'$ γ , locus eccentricus in $12^{\circ} 32'$ Π , distat igitur a nodo $26^{\circ} 12'$ et inclinatio maxima planorum est $1^{\circ} 50'$. Ergo inclinatio hujus loci est $48' 32''$, cujus secans superat radium particulis 10, quae sunt in nostra dimensione $15\frac{1}{2}$. Itaque distantia ipsius puncti in orbita Martis a Sole est 154387. Prius autem in hac ipsa distantia ab aphelio inveniebatur distare a Sole 154400 proxime. Ergo ad unguem aequales sunt horum punctorum eccentrici distantiae a Sole. Nam quae in posteriori desiderantur 13 particulae, sunt impraestabiles. Gaudebo, si intra 100 particularum incertitudinem ubique consistere potero.

Jam et annum 1597 adjungam non tam ad confirmanda priora, quae sunt per sese certissima, quam ut lectori occasionem praebeam, observationes Tychonis cum aliorum observationibus comparandi; quo medio tandem intelligat, quanto nos beneficio vir ille affecerit. Exstant quidem ejusdem auctoris observata ad ultimos dies Octobris anni 1597, sed radio capta in loco peregrino, nec ad calculum revocata per ipsum auctorem, qui noverat distantias radio exceptas tabella quadam parallaxeos oculi adhibita corrigere, ut in Progymnasmatibus monuit. Cum itaque diversissimae eodem momento distantiae sint adscriptae (forte quod correctae juxta observatas sunt positae), mittendae sunt. Observavi autem ego eodem momento absens in Styria, idque mirabile dictu Tychonis Brahei oculis, ad litus maris Balthici versantis. Observationis series ista. Risum teneatis amici.

Anno 1597 die Saturni 8. Nov. vel 29. Oct. mane Mars nondum erat in linea ex duodecima Π in quartam: Die sequenti jam erat egressus illam, vicinior nonae quam duodecimae, et in linea ex 11. in 9, item in linea ex 1. in 5. praecise aut paulo admodum orientior. Et quinta fuit media inter primam et Martem.

Ex hisce locus Martis elici potest, assumtis certissimis stellarum locis ex catalogo Tychonis Brahei, quos meos oculos jam profitebar. Sed quia opera non est relictum in catalogum Brahei (nam pro ea loco nono est alia, distans a Ptolemaea ultra 3° , et minor omnibus), ideo latitudinem Martis

advocabimus in consilium: sufficit enim nobis mediocris ejus cognitio. *Invenitur autem longitudo medii Martis ad mane diei 29. Oct. h. 5. (probabilem, cum horam non adscripserim) $1^{\circ} 29' 10'' 43''$. Quare locus eccentricus in $9^{\circ} 43' \text{ II}$, distans a nodo per $23^{\circ} 20'$. Inclinatione igitur $43' 52''$. Sol vero in $15^{\circ} 40' \text{ III}$, et Martis locus visus ex anticipato circiter $12\frac{1}{2}^{\circ} \odot$. Quare latitudo $1^{\circ} 36' 24''$. Computetur, quatenam sit longitudo puncti in linea ex duodecima in quartam, habentis latitudinem $1^{\circ} 30\frac{1}{2}'$ bor. Cum igitur sit quarta in $9^{\circ} 54' \odot$, lat. $7^{\circ} 43'$ bor., duodecima in $12^{\circ} 56' \odot$, lat. $0^{\circ} 13\frac{1}{2}'$ austr., erit puncti nostri longitudo proportionaliter $12^{\circ} 16' 17'' \odot$. Mars vero nondum hic fuit die 29. Oct., et die 30. jam transierat. Diurnus non fuit major $5'$, cujus dimidium $2\frac{1}{2}'$, ut die 30. mane fuerit in $12^{\circ} 18\frac{1}{2}' \odot$, et quidem anno 1600 completo; sed ut anno 1597 in $12^{\circ} 16' \odot$. Tria minuta erroris in latitudine vix unum queunt efficere in longitudine. Quare sat certus est locus. Si etiam per primam et quintam explores, in ea linea punctum, cujus latitudo sit $1^{\circ} 30\frac{1}{2}'$, cadit in $12^{\circ} 9' \odot$. Et Mars erat orientior, hoc est magis in consequentia, scilicet in $12^{\circ} 16'$ proxime aut paulo ante, intermedius etiam. Quare latitudo comprobatur a nobis computata: debet enim et ipsa proxime esse intermedia, et est quidem. Nam inter $1^{\circ} 30\frac{1}{2}'$ Martiam et quintae $5^{\circ} 42\frac{1}{2}'$ interest $4^{\circ} 12'$, inter hanc et primae $10^{\circ} 2'$ interest $4^{\circ} 20'$ media.*

Sit igitur Mars in $12^{\circ} 16' \odot$. Anno 1597. d. 30. Oct. mane h. 5. invenitur locus Solis $16^{\circ} 38' 8'' \text{ III}$. Distantia 98820. Longitudo media $1^{\circ} 29' 42' 10''$. Aphelium $4^{\circ} 28' 57' 10''$. Anomaliae mediae complementum $89^{\circ} 15'$: coaequatae $78^{\circ} 43' 23''$, locus eccentricus $10^{\circ} 13' 47'' \text{ II}$. Quare hinc elicitur distantia 153753. At quia per $2^{\circ} 6'$ profundius absumus ab aphelio quam prius, addemus bis 240, particularum summam, uni gradui debitam; $240 + 240$ et decimam partem 24. Item et alias 15 particulas, ut pro linea in plano eclipticae efficiatur linea in plano orbitae Martis. Prodit 154272, prius 154400, differentia 128.

Quodsi $3'$ adimas loco Martis, et fuerit in $12^{\circ} 13' \odot$, quod stante nostra observatione fieri potest, praesertim si et hora alia fuerit, jam conciliata erit haec differentia.

Secundo idem probabo in partibus aphelio propioribus. Anno 1589 d. 5. Apr. h. 11. 33' visus est \odot in $7^{\circ} 31' 10'' \text{ III}$, lat. $1^{\circ} 28' 13''$ bor. meridiano proximus, itaque in nulla variatione horizontali. Colligitur longitudo media $7^{\circ} 9' 46' 8''$, et est aphelium in $4^{\circ} 28' 51' 8''$. Ergo anomalia media $70^{\circ} 55' 0''$, cui respondet per vicariam anomalia coaequata $61^{\circ} 17' 35''$. Itaque locus eccentricus in $0^{\circ} 8' 43'' \text{ III}$. Locus Solis $25^{\circ} 52' 43'' \text{ V}$. Distantia ejus a Terra 100560. Angulus ad Terram $11^{\circ} 38' 27''$, ad planetam $7^{\circ} 22' 27''$, ergo distantia Martis a Sole 158090. Rursus autem, ne sic fidamus loco eccentrico propter errorem 2 vel $3'$, quem vicaria committit hoc eccentrici loco, adsciscemus sociam ex anno 1591 d. 19. Feb. cum mane h. $5\frac{1}{2}$ \odot videretur distare ab australi Lano $28^{\circ} 11'$ (quae eo anno fuit in $9^{\circ} 23\frac{1}{2}' \text{ III}$;) cum lat. bor. $0^{\circ} 26'$. Itaque \odot cadit in $7^{\circ} 24\frac{1}{2}'$ circiter. Cum autem is locus eccentricus declinet ab aequatore per $21^{\circ} 39' 10''$, Martis declinatio visa est $20^{\circ} 50' 30''$. Itaque latitudo $48' 40''$. Unde corrigitur longitudo, quae fit $7^{\circ} 34\frac{1}{2}'$. Est vero longitudo media $7^{\circ} 8' 21' 47''$, cui respondet coaequata $59^{\circ} 57' 38''$ et locus eccentricus $28^{\circ} 51' \approx$. Ergo angulus ad planetam $38^{\circ} 43' 20''$.

Locus Solis $10^{\circ} 14' 25'' \propto$, ergo angulus ad Terram $87^{\circ} 20' 0''$, et distantia Solis a Terra 99210. Quare hic prodit distantia δ a \odot 158428, longior quam prius, quia hic etiam propiores sumus aphelio per $1^{\circ} 26' 30''$. Debentur autem de distantia uni gradui particulae circiter 220 hoc loco eccentrici, toti differentiae graduum particulae 317: sic ut hic locus, si ad consimilem anomaliam cum superiori referatur, habeat distantiam 158111 admodum praecise. Unde arguitur, junctas has binas observationes methodoque in superioribus tradita tractatas locum eccentricum ostensuras plane eundem cum nostra vicaria, cum tamen ob vicinitatem 17° m in periculo versemur erroris unius atque alterius scrupuli. Adde, quod in posteriori harum distantia ab Aquila prodatur $54^{\circ} 12'$, quod cum ceteris observationis circumstantiis intra $12'$ non consentit, itaque haec observatio non sit plane certissima. Addendum autem etiam exiguum aliquid ob latitudinem.

In longitudine simili alterius semicirculi occurrit apta observatio anno 1582. d. 12. Nov. mane h. $6\frac{1}{4}$, cum esset locus \odot $29^{\circ} 35' 17'' \text{ m}$, distantia 98503, longitudo media δ $2^{\circ} 15' 10' 20''$, aphelium $4^{\circ} 28' 44' 20''$. Quare complementum anomaliae mediae $73^{\circ} 34'$ et coaequatae $63^{\circ} 45' 18''$. Quare locus eccentricus $24^{\circ} 59' 2'' \text{ II}$. Tunc, inquam, observatus est planeta in $26^{\circ} 35' 30'' \odot$, ut fuerit angulus visionis seu ad Terram $57^{\circ} 0' 13''$, ad planetam vero $31^{\circ} 36' 28''$. Quibus elementis conficitur, distitisse planetam a Sole 157631. Et quia prius anomalia fuit $70^{\circ} 55'$, jam $73^{\circ} 34'$, humiliores igitur sumus per $2^{\circ} 39'$, quibus in proportionem prius indicata debentur particulae 586. Itaque ex analogia hujus observationis competit in consimilem anomaliam cum superiori 158217, ubi rursum ob latitudinem pene tantundem aut paulo plus est addendum quam prius. Differentia 127 circiter, quae excusatur incertitudine observationum priorum. Est enim perexigua et in nostro negotio contemnenda, ubi de 1800 aut 3600 aut ampliori aliquo disputamus.

Sed ascendamus adhuc superius versus aphelium, et exploremus etiam illa loca, ubi ex demonstratis cap. VI. luxatio eccentrici per medii motus Solis cum vero permutationem omnium contingere potest evidentissima; nempe in apogaeo Solis et Cancris dodecatemorio.

Anno 1596. d. 9. Martii vesperi h. 7. 40', cum esset locus Solis $29^{\circ} 31' 24'' \propto$, distantia a Terra 99764, longitudo media δ $3^{\circ} 15' 35' 0''$, aphelium $4^{\circ} 28' 58' 31''$, anomaliae mediae complementum ad circulum integrum $43^{\circ} 23' 31''$, coaequatae $36^{\circ} 40' 2''$, locus eccentricus ex vicaria $22^{\circ} 18' 29'' \odot$: visus est planeta in $15^{\circ} 49' 12'' \text{ II}$. Lat. $1^{\circ} 47' 40''$ bor. Fuit igitur angulus ad Terram $76^{\circ} 17' 48''$, ad planetam $36^{\circ} 29' 17''$. Ergo distantia δ a \odot 162994, seu verius puncti in plano eclipticae, quod ~~est~~ Martis perpendiculariter subest. Sed et huic securitatis causa addenda observatio alia. Fuit autem Mars praecise eodem in loco sub anno 1584. d. 25. Nov. h. 10. 20', cum esset \odot in $14^{\circ} 0' 3'' \propto$, distantia a Terra 98318; anomalia media nihil sensibilibiter differens a priori, aphelii motus est paulo admodum velocior motu fixarum. Ergo locus eccentricus idem, si praecessionem $9' 45''$ subtrahas, scilicet $22^{\circ} 8' 44'' \odot$. Fuit autem fuit planeta die 11. Nov. h. 13. 26' in $23^{\circ} 14' 5'' \odot$, cum $2^{\circ} 12' 24''$ bor: sequenti 20. Nov. h. 18. 30' astronomice, apparuit in $26^{\circ} 0' 30'' \odot$. Itaque diebus 8 horis 5 promotus est per $2^{\circ} 46' 25''$, Magino per $2^{\circ} 48'$. Cum ergo nostrum tempus aliis 4 diebus et sequatur, quibus ex Magino motus $1^{\circ} 28'$ competit, addemus

nos $1^{\circ} 27'$ ad analogiam priorum. Itaque Mars videri potuit in $27^{\circ} 27' 30''$ Ω proxime. Quare angulus ad Terram $73^{\circ} 27' 27''$, ad planetam $35^{\circ} 18' 46''$. Quare hic distantia Martis a Sole 163051, excedens priorem particulis 57, quae levissima mutatione loci eccentrici absorbentur, ut quidem vicaria hic non est usque ad $1'$ fidelis. Sed et in applicatione observationis peccari levissimum aliquid facile potuit.

Pro longitudine consimili in semicirculo altero resumemus observata cap. XXVII, ubi extruxi distantiam paulo minorem quam 163100 ex prosthaphaeresi observationum, ex puris observationibus vero 162818, similiter ut prius in plano eclipticae. Est autem in uno temporum illo loco allegatorum, scilicet anno 1589. d. 11. Feb. mane h. 5. $13'$ longitududo media $6^{\circ} 12' 38' 44''$, aphelium $4^{\circ} 28' 50' 57''$, anomalia media igitur $43^{\circ} 47' 48''$, humilior quam prior nostra per $24'$, quibus illo eccentrici loco competunt 64 particulae circiter. Itaque distantia, quae in anomalia $43^{\circ} 48'$ fuit minor quam 163137, ex hac analogia in anomalia $43^{\circ} 24'$ rursum augebitur, ut sit quam proxime 163100 in hoc semicirculo, in priori erat 163051 vel 162996, rursum impraestabili propinquitate.

Notandum autem, quod cap. XXVII, quod hic allego, observationes coegerunt adimere loco eccentrici ex vicaria nostra computato $1' 30''$ in $5\frac{1}{2}^{\circ}$ \approx , idque per observationes annorum 1585, 1587, 1589, 1590. Secundo idem testabatur supra cap. XVIII. observatio acronychia anni 1589 in $5^{\circ} \mathfrak{M}$, adimenda scilicet esse vicariae nostrae $2\frac{1}{2}'$. Et anno 1591 in $26^{\circ} \times$ adhuc adimendum erat unum. Tertio, hoc ipso capite circa $16^{\circ} \mathfrak{M}$ voluerunt observationes annorum 1589 et 1594, adimi loco eccentrico ex vicaria nostra computata scrupula $3\frac{1}{2}$. Itaque hoc sic constans est circa longitudinem mediam hujus semicirculi.

Similiter et proxime aphelium resumemus observata cap. XXVIII, ubi in anomalia media $11^{\circ} 37'$ inventa est distantia (sine correctione ob latitudinem) 166180 vel 166228. Hoc in semicirculo descendente. At in consimili anomalia semicirculi ascendentis fuit circa sequentia tempora.

Anno 1585. d. 24. Jan. h. 9. cum esset locus Solis $15^{\circ} 9' 5''$ \approx , distantia ejus a Terra 98590; longitududo media \odot $4^{\circ} 16' 50' 10''$, aphelium $4^{\circ} 28' 46' 41''$; anomaliae mediae residuum ad circulum complendum $11^{\circ} 56' 31''$, quare locus eccentricus ex vicaria $18^{\circ} 49' 0''$ Ω : visus est planeta in $24^{\circ} 9' 30''$ Ω , latitudine $4^{\circ} 31' 0''$ bor. Fuit igitur angulus ad Terram $9^{\circ} 0' 25''$, ad planetam $5^{\circ} 20' 30''$. Ergo distantia Martis a Sole 165792. Sed si vicariae hypothese hic adimas $1' 30''$, quod supra cap. XVIII. in computatione oppositionis acronychiae apparuit necesse esse, angulus ad planetam fiet $5^{\circ} 19'$, et distantia Martis a Sole 166580. Usque adeo facile hic mutatur distantia, ob Martis et Terrae propinquitatem. Adhibebimus igitur securitatis causa loca alia.

Anno 1586. d. 16. Dec. mane h. $6\frac{1}{2}$, cum esset Sol in $4^{\circ} 16' 51''$ ζ , distans a Terra 98200; longitududo media \odot $4^{\circ} 18' 39' 9''$, residuum anomaliae mediae $10^{\circ} 9' 41''$; locus eccentricus ex vicaria $20^{\circ} 20' 30''$ Ω : inventa est declinatio Martis $3^{\circ} 54'$, ascensio recta ex Arcturo et Spica $177^{\circ} 27'$; quare longitududo $26^{\circ} 6' 24''$ \mathfrak{M} , latitudo $2^{\circ} 35'$; hinc angulus ad Terram $81^{\circ} 49' 33''$, ad planetam $35^{\circ} 45' 54''$, et distantia 166311, sed subtractione $1' 30''$ de loco eccentrico 166208. Et minus distantia ab aphelio $11^{\circ} 37'$ circiter 70 particulis, itaque 1 vel 166138.

Anno 1588. d. 6. Nov. mane h. 6. 50', cum esset locus Solis $24^{\circ} 3' 43''$ \mathfrak{M} , distans a Terra 98630; Martis longitudo media $4^{\circ} 20' 47' 35''$; residuum anomaliae $8^{\circ} 2' 51''$; locus eccentricus ex vicaria $22^{\circ} 7' 48''$ \mathfrak{Q} : visus est \mathfrak{J} in $23^{\circ} 16'$ \mathfrak{M} , lat. $1^{\circ} 37'$. Quare angulus ad Solem $60^{\circ} 47' 43''$, ad planetam $31^{\circ} 8' 12''$. Et distantia igitur planetae a Sole 166511, sed per subtractionem $1' 30''$ de loco vicariae, 166396, et ex hac analogia in majori distantia ab aphelio, scilicet $11^{\circ} 37'$, diminuitur circiter 110, quare vel 166401 vel 166286, ubi discrepamus a priore per 150; et, si stante correctione loci eccentrici medium harum assumserimus, 166230: ut parum aliquid in observando peccatum esse dicamus, in partes contrarias utriusque observationis annorum 1586 et 1588, a distantia semicirculi descendens, differemus parum. Poterit hoc ipsum quoque discrimen aboleri per retractionem nonnullam aphelii, de qua postea. Itaque etiam proxime aphelium, quantum sensus judicare potest, easdem invenimus distantias a Sole, in eadem utriusque semicirculi habitudine ad aphelium.

Sunt quidem omnes tres observationes factae Marte orientali; nulla Marte occidentali: deficiunt enim observata reliqua. Itaque tutius fortasse stabimus a distantia semicirculi descendens.

Tertio sit idem quod supra nobis explorandum infra longitudes medias, versus perihelium.

Anno 1591 nocte post diem 13. Maji h. 1. 40' post mediam noctem, cum esset \odot in $2^{\circ} 8' 43''$ Π , distans a Terra 101487; Martis vero longitudo media $8^{\circ} 22' 18' 4''$; anomalia $113^{\circ} 24' 4''$; coaequata $103^{\circ} 15' 48''$; quare locus eccentricus ex vicaria $12^{\circ} 9' 48''$ \mathfrak{X} (vel per analogiam vicini 26° \mathfrak{X} jam modo memorati, $12^{\circ} 8\frac{3}{4}'$ \mathfrak{X}): visus est Mars in $2^{\circ} 24\frac{1}{2}'$ \mathfrak{S} , latitudine $2^{\circ} 15'$ merid., angulus igitur ad Terram $30^{\circ} 15' 44''$, ad planetam vero vel $20^{\circ} 14' 39''$ vel $20^{\circ} 15' 42''$. Quare distantia Martis (vel puncti eclipticae) a Sole 147802 vel verius 147683, ubi vides unius scrupuli errore in loco eccentrico perire nobis 120 particulas nostrae dimensionis, in tanta Martis et Terrae propinquitate, tantaque vicinitate oppositi Solis loci. Itaque minima hic non sunt persequenda. Porro bene munita est haec observatio, circumstantibus aliis frequentium dierum, usque in diem oppositionis cum Sole. Cum autem distet $12^{\circ} 10'$ \mathfrak{X} a nodo $26\frac{1}{2}'$, circiter partes: igitur hujus loci secans inclinationis superat radium particulis 11 circiter, quae sunt in nostra dimensione circiter 15 aut 16, ut ita ipsius Martis a Sole distantia hic fiat quam proxime 147820 vel 147700.

Pro consimili distantia ab aphelio, semicirculi alterius, resumemus observata cap. XXVI, ubi exstruxi distantiam \mathfrak{J} a \odot circiter 147443 vel 147700 vel 147750. Est autem in uno temporum illic notatorum, scilicet anno 1590. d. 4. Martii h. $7\frac{1}{6}$, longitudo \mathfrak{J} $1^{\circ} 4^{\circ} 11' 20''$. Quare anomaliam complementum ad circulum $114^{\circ} 41'$. Itaque hic humiliores sumus, non quam prius $1^{\circ} 17'$. Et 1° competunt 230 particulae hoc eccentrico loco. Ergo distantia $113^{\circ} 24'$ in semicirculo ascendente esset (ex p. XXVI observationum) 147743 vel 148000 vel 148050. Pro hic in descendente 147820 vel 147700. Differentia circiter 180 particularum, vel nullius; paulo incertiuscula. Nam etiam habent observationes, Marte in perigaeo versante, ob humilitatem loci. Et vides cap. XXVI, illic veram distantiam dubio

assensu fluctuare inter 147443 et 147750, differentia 300 particularum, quae sunt in praesenti negotio non magni momenti, Marte tam humili et Soli seu centro mundi vicino.

Sed et hic profundius versus perihelium descendamus, et rem eandem exploremus 22° circiter ante et post perihelium.

Anno 1589. d. 3. Dec. h. 5. 39', cum esset locus \odot $21^\circ 44' 56''$ \times , distaretque is a Terra 98248, et longitudo media Martis $11^\circ 16' 27' 53''$, anomaliae complementum $162^\circ 24' 11''$, et locus eccentricus coaequatus $20^\circ 4' 32''$ \times : visus est Mars in $15^\circ 25' 33''$ \approx , lat. $1^\circ 11' 47''$ mer. Sed quia supra cap. XLII. inventa est vicaria nostra nonnihil peccare circa perihelium: adsciscemus igitur loca alia, quotcunque nancisci poterimus, atque ex iis methodo capitis XLII. quaeremus simul distantiam Martis a Sole, simul etiam locum eccentricum veriore.


Anno igitur 1591. d. 16. Oct. h. 6. 28', cum esset \odot in $2^\circ 39' 15''$ η , distans a Terra 99142, longitudo media \odot $11^\circ 13' 53' 57''$, anomaliae complementum $165^\circ 0' 9''$, locus eccentricus ex vicaria $16^\circ 59' 14''$ \times : visus est in $1^\circ 27' 18''$ \approx , lat. $2^\circ 10' 52''$ merid.

Sic anno 1593. d. 8. Sept. h. 10. 38', cum esset \odot in $25^\circ 41' 0''$ η , distans a Terra 100266, longitudo \odot media $11^\circ 17' 10' 17''$, anomaliae complementum $161^\circ 45' 28''$, et locus eccentricus ex vicaria $20^\circ 53' 54''$ \times : inventus est planeta in $8^\circ 53' 51''$ \times , lat. $5^\circ 14' 30''$ merid.

Denique anno 1595. d. 22. Julii mane h. 2. 40', cum esset \odot in $7^\circ 59' 52''$ Ω , distans a Terra 101487, longitudo media \odot $11^\circ 14' 9' 5''$, et anomalia $164^\circ 48' 55''$, quare per vicariam nostram locus eccentricus $17^\circ 16' 36''$ \times : inventus est visibilis locus \odot ex lectissimis observationibus in $4^\circ 11' 10''$ \odot , lat. $2^\circ 30'$ merid. Bis igitur habemus Martem loco opportunissimo, scilicet in quadrato Solis, cum et loca Terrae et Martis quadrato distent.

Itaque secundum methodum cap. XLII. loca sideris in eccentrico probanda sumam; et ponam initio distantiam Martis

Fig. 106.



primò tempore fuisse 139212. Quare sequentes fuerunt 139033, 139258, 139045. In tanta enim propinquitate anomaliarum facile scitur connecti ut hactenus. Sit A Sol: D, G, F, E loca Terrae annis 1589, 1591, 1593, 1595, K locus Martis quater idem (etsi in observationibus non sit pluri idem). Connectantur puncta. Dantur AD, AG, AF, AE quoad situm et longitudines. Et accipitur longitudo AK quater. Sunt autem et DG, GK, FK, EK lineae visoriae notae situ suo. Erant autem ADK, AGK, AFK, AEK. Per opposita nem igitur laterum cum angulis dantur et DKA, GKA, FKA, EKA, quare situs ipsius KA quater.

DA $21^\circ 44' 56''$ \times	98248	DK $15^\circ 25' 33''$ \approx	$162^\circ 24' 11''$	
GA 2. 39. 15 η	99142	GK 1. 27. 18 \approx	165. 0. 9	AK: 12.
FA 25. 41. 0 η	100266	FK 8. 53. 51 \times	161. 45. 28	12.
EA 7. 59. 52 Ω	101487	EK 4. 11. 10 \odot	164. 48. 55	1.
Anomalia: 165. 0. 9				
161. 45. 28				
164. 48. 55				
Quare AK				
ADK $53^\circ 40' 57''$		DKA $34^\circ 39' 23''$	$20^\circ 5' 16''$ \times	$20^\circ 4' 1''$
AGK 88. 48. 3		GKA 45. 28. 27	18. 55. 45 \times	18. 53. 1
Compl. AFK 16. 47. 9	Prodit	FKA 12. 0. 4	20. 53. 55 \times	20
AEK 86. 11. 18		EKA 46. 44. 30	17. 26. 40	

Cum igitur hic primus et tertius locus admodum prope consentiant, putabit inconsideratior aliquis, standum ab illis, ceteros utcunque conciliandos, quod ipse quoque diu admodum tentavi. Sed cum conciliari non possent secundus et quartus, esset vero magna vis harum observationum, propterea quod in quadrato Solis utriusque visus sit planeta, et in quadrilatero AEKG omnia prope latera angulique aequales sint, ideo sic transegi. Vides ex vicaria, distare debere AK secundae observationis ab AK quartae, 17' 22". At per hanc assumptionem longitudinis AK distant per 30' 55", nimium igitur per 13' 33". Cumque omnes anguli quadrilateri sint prope modum aequales, bipartitus sum excessum hunc, et 6' 46" addidi ad angulos EKA, GKA. Nam in E observatione linea AK nimium processerat, in G non satis processerat. Retractis ergo AK versus E, G, et EK, GK manentibus (ponimus enim observationes esse certissimas) omnino anguli apud K angebuntur. Jam igitur datis angulis GKA 45° 35' 13" et EKA 46° 51' 16", et manentibus angulis G, E et lineis GA, EA, prodiit AK 138765, 138787, differens 258 particulis a nostra assumptione. Totidem igitur si demamus et de reliquis duabus AK, ut sint 138954, 139000, prodeunt anguli DKA 34° 43' 47" et AK 20° 9' 40"; FKA vero 12° 1' 24" et AK 20° 55' 15". Sed quia prius in G addidi 6' 46", et in E tantundem subtraxi; reposui ergo locos eccentricos in G 17° 2' 31" X, E 17° 19' 54" X, augens locum vicariae per 3' 17". Tantundem ergo debebat prodire et apud D: scilicet 20° 7' 49" X

Apud F 20° 57' 11" X	Hic vero inveni	20. 9. 40
20. 55. 15	Differentia	1. 51 plus.

1. 56 minus.

Itaque et reliquos duos locos sat propinque adduxi. Nam peccatis suis ultro citroque veritatem stant, quod facit ad securitatem. Et duorum scrupulorum errorem his locis ob zodiaci humilitatem et variationes horizontales observationi tribuere nihil est insolens.

In descendente semicirculi consimili anomalia non suppetunt plures una observationes, sed quae satis sit certa. Anno enim 1593 nocte quae sequebatur 29. Junii h. 1. 30' post med. noctem, cum ☉ esset in 17° 25' 42" ☉, distans a Terra 101760, longitudo ♂ 10° 10' 1' 29", anomalia 161° 5' 29", et ideo ♂ locus 6° 10' 5" ☉: visus est in 13° 37' 22" X, lat. 4° 37' merid. Hinc complementum anguli ad Terram fuit 56° 11' 46", ad planetam seu parallaxis orbis annui 37° 27' 23". Unde prodit distantia ♂ a ☉ 139036. Supra vero, in anomalia 161° 45' 28", ubi distat ♂ ab aphelio 40' longius quam hic, inventa et constituta est distantia 139000. Et haec 40' hoc eccentrici loco efficiunt particulas 52. Igitur hic quoque ex analogia nostrae anomaliae evaderet in anomalia 161° 45' 1/2, distantia 138984 admirabili et certe suspecto consensu. Nam omnia adeo certa et exquisita esse vix possunt. Utrunque autem nonnihil augendae sunt distantiae ob inclinationem maximam hoc loco eccentrici.

Ex hac igitur longissima inductione per plurima loca eccentrici apparet, distantias Martis a Sole illas invicem aequales esse, quarum puncta orbitae aequaliter remota sunt ab aphelio, quod cap. XVI. et XLII. investigavimus: quod est evidens argumentum, aphelium illud recte habere [7]. Comprobantur una et distantiae Solis a Terra, quae supra XIX. exstructae, hic jam varie usurpatae officium faciunt, nec ulla una discrepantia numerorum exstitit, quae de illarum vitio testari posset.

igitur mirum, et longiorem BD esse? Respondeo: qualescunque lineae ejiciantur, semper manent AE, AD, quia sunt ex observationibus demonstratae in triplici forma hypothesis: et ad demonstrationem hanc, quod contraverti possit, assumptum plane nihil. Manentibus igitur AE, AD, ejiciatur sane BC, ut oppositum mihi est: illa tamen BC, ut demonstravi cap. VI, nequaquam gignit hypothesis aptam observatis ἀκρονυχίαις; sed pro BC oportet, ut salvemus acronychias, ejicere per F ipsi CB parallelon FH, per F, H centra aequalitatis Martis et Solis. Hoc autem facto, una centrum eccentrici ex C in I transfertur, et plus quam semicirculus vergit versus E, minus versus D: nec relinquuntur AE, AD, sed prolongatur AE, abbreviatur AD: quibus lineis mutatis nunquam salvabuntur observationes extra situm acronychium: quia hae testantur de aequalitate linearum AE, AD. Nec opus esse puto computatione. Si quis tamen hoc labore delectatur (quamvis nefas est astronomum numeris aliquid tentare, cujus fundamenta non prius vidit in geometria, quae jam laboris hujus fundamenta nobis evertit), is habet exemplum supra cap. XXIV, ubi distantias Telluris ab H, puncto aequalitatis motus Telluris, et distantiam Martis ab eodem H puncto in eadem operatione simul, iisdem observationibus computavi, quibus postea cap. XXVI. distantias ejusdem Telluris et Martis computavi ab A centro Solis. Methodi enim, qua sum usus, ingenium hoc est, ut doceat, quocunque puncto in plano circuli Telluris assumpto, quod habeat descriptum et determinatum situm ad corpus Solis, tam in longitudine zodiaci, quam in remotione a Sole, per aliquot observationes docere et Telluris et Martis ab illo suscepto puncto distantiam; citra etiam cognitionem anomaliae eccentrici coaequatae ad id punctum accommodatae: qua quidem ego cap. XXVI. tantummodo compendii causa usus sum.

Sed alia insuper ratione argumentari licet. Demonstratum est supra cap. XLIV, orbitam planetae non esse circulum, sed ovalem, ut cujus diameter, quae apsidum dicitur, sit longissima. Jam cap. LI. demonstratur, partes a G puncto aphelii remotas aequaliter ingredi etiam aequaliter ad latera. Ovalis ergo genuinus situs est circa lineam AC, non igitur circa lineam FH. Et qui varias Martis distantias computaverit a puncto H methodo jam commendata, deprehendet is magnam distantiarum irregularitatem, quae nullo pacto poterit includi neque circulo neque probabili alicui figurae, circa FH ordinatae.

Rursum itaque fidem cap. VI. et passim hoc opere oppigneratam citra ullam principii petitionem liberavi, et docui, eccentricum Martis non posse nisi ad Solem referri ipsum: ac proinde non solam rationem, sed ipsa etiam observata pro me stare, dum observationes Martis a medio motu Solis abductas ad ipsum apparentem Solis motum expendi.

Caput LIII.

Alia methodus explorandi distantias Martis a Sole per aliquot continuas observationes ante et post situm acronychium: ubi simul etiam explorantur loca eccentrica.

Quia hic novas hypotheses condimus, inquirentes scilicet naturalem jam aequationum eccentrici, decet omnia nobis esse quam exploratissima,

ut 161 ad 61, sic 100000 ad 37887. Qui sinus ostendit angulum $\alpha\theta$ $22^\circ 15'$, et majorem, si pro $\xi\theta$ sumas jam $o\theta$.

Itaque donec anomalia commutationis varietur $22\frac{1}{4}^\circ$, multi dies, pene scilicet 45 abeunt, post quos vel ante quos $\alpha\theta$ longe est alia. In aphelio igitur hic angulus commutationis est 28° circiter, in perihelio $18\frac{1}{2}^\circ$ circiter.

His limitibus evidentissimi erroris, si quis oritur ex vitiosa distantia Martis a Sole, inventis, jam facile nobis est, idoneas seligere observationes, ubi copiosae in promptu sunt.

Incipiemus ab oppositione anni 1582, ex quo anno seligemus observationes istas.

Anno 1582		Anno 1583	
d. 24. Nov. mane h. 4.	26. Dec. h. 8. 30'	30. Dec. h. 8. 10'	26. Jan. h. 6. 15'.
Visus in . . . $26^\circ 38' 30''$ ☉	$17^\circ 40' 30''$ ☉	$16^\circ 0' 30''$ ☉	$8^\circ 20' 30''$ ☉
Visa latitudo 2. 49. 10 b.	4. 7. 0 b.	4. 8. 0 b.	2. 52. 12 b.
☉ in . . . 11. 40. 40 x	15. 4. 12 ☾	19. 8. 31 ☾	16. 33. 20 ☾
$\alpha\beta$ dist. ☉ a ☽ 98345	$\alpha\beta$ 98226	$\alpha\gamma$ 98252	$\alpha\gamma$ 98624
Anom. med. 67. 28. 13	49. 39. 10	47. 51. 35	34. 8. 15
Locus eccent. 0. 43. 34 ☉	16. 7. 10 ☉	17. 57. 32 ☉	0. 9. 40 ☾
In ecliptic. $\alpha\theta$ 0. 42. 42 ☉	16. 6. 23 ☉	$\alpha\eta$ 17. 56. 45 ☉	$\alpha\eta$ 0. 9. 30 ☾
Hinc prodit $\alpha\theta$. 158920	163082	$\alpha\eta$ 158842	$\alpha\eta$ 164116 *)
Per latitudinem . 158960	163147	158907	164196.

Differunt duae mediae per 4240. Et quidem brevior est posterior $\alpha\eta$, cum debuerit esse longior per 336. Summa igitur utriusque 322054. Unde aufero 336 iterumque addo. Constitutorum dimidia sunt 160859, nimirum $\alpha\theta$, et 161363, scilicet $\alpha\eta$. Eritque $\alpha\theta$ in $16^\circ 5'$ ☉, et $\alpha\eta$ in $17^\circ 55'$ ☉. Itaque hic vicaria amitteret $1\frac{1}{2}'$.

Ipsae vero distantiae ob angulum istum tam parvum sunt infidae. Nam si angulus δ varietur uno minuto vitio observandi, quod facile contingit, mille particulis in qualibet distantia aberrabimus. Sumantur igitur duae remotiores, quae inveniuntur differre per 5236. At praecognoscimus, debere differre circiter 5570. Itaque operatione peracta ut prius, prodeunt veriores $\theta\alpha$ 158792 et $\alpha\eta$ 164364: ut sit $\alpha\theta$ in $0^\circ 41' 0''$ ☉, $\alpha\eta$ in $0^\circ 8' 30''$ ☾. Et fit certum, per 4 dierum observationes hoc loco adimendum esse locis eccentricis, ex vicaria nostra depromptis, circiter $1\frac{1}{2}'$. Confirmantur etiam mediocriter distantiae prius inventae, cis et ultra oppositionem, quae prodierunt mensura media inter has; nisi quod analogia indicat, paulo longiores esse debere. Patet autem simul, si angulus $\theta\delta\eta$ uno minuto vitiatus sit, vitari utramque distantiam particulis circiter 50, non plus. In distantis igitur his vix centesima pars peccari potest incertitudinis prioris.

Quodsi qua suscepta longitudo distantiarum satisfacit observatis horum 4 dierum, ea dierum interjectorum observata itidem exprimet: nempe 25—27. Nov., 3. 17. 27—29. Dec. a. 1582, 16—19. 21. 22. Jan. 1583.

Transeamus ad oppositionem anni 1585. Dum enim ejus anni die 31. Jan. esset oppositio ☉ et ☽, observatus est planeta creberrime per duos menses praecedentes totidemque sequentes. Inde sumemus has 4 observationes.

Anno 1584		Anno 1585	
21. Dec. h. 14.	24. Jan. h. 9.	4. Febr. h. 6. 40'	12. Mart. h. 10. 30'
n . . . $1^\circ 13' 30''$ mp	$24^\circ 7' 30''$ ☾	$19^\circ 47' 30''$ ☾	$11^\circ 46' 0''$ ☾
. . . 3. 31. b.	4. 31. b.	4. 28. b.	3. 22. b.

Tempus	Locus ☉	☉ a Terra distantia	☿ eccentricus in ecliptica	Locus computatus	Locus observatus	Differentia	Latitudo
1582. 23. Nov. h. 16. 0'	11° 41' x	98345	0° 42' 11" ☉	26° 40' 0" ☉	26° 38' 30" ☉	1' 30"	2' 49" bor.
26. Dec. " 8. 30	15. 4 x	98226	16. 7. 18 ☉	17. 44. 19 ☉	17. 40. 30 ☉	3. 49	4. 7
30. Dec. " 8. 10	19. 9 x	98252	17. 56. 32 ☉	16. 6. 20 ☉	16. 0. 30 ☉	5. 50	4. 8
1583. 26. Jan. " 6. 15	16. 33 ☿	98624	0. 6. 24 ☿	8. 17. 57 ☉	8. 20. 30 ☉	2. 33	2. 52
1584. 21. Dec. " 14. 0'	10. 16 ☿	98207	3. 51. 45 ☿	1. 14. 34 ☿	1. 13. 30 ☿	1. 4	3. 31
1585. 24. Jan. " 9. 0	14. 53 ☿	98595	18. 47. 8 ☿	24. 3. 58 ☿	24. 7. 30 ☿	3. 32	4. 31
4. Febr. " 6. 40	26. 10 ☿	98830	23. 33. 41 ☿	19. 43. 52 ☿	19. 47. 0 ☿	3. 8	4. 28
12. Mart. " 10. 30	2. 16 ☿	98858	9. 23. 14 ☿	11. 43. 31 ☿	11. 46. 0 ☿	2. 29	3. 22
1587. 25. Jan. " 17. 0	16. 1 ☿	98611	8. 13. 40 ☿	4. 41. 50 ☿	4. 42. 0 ☿	0. 10	3. 26
4. Mart. " 13. 24	24. 0 ☿	99595	24. 56. 50 ☿	26. 24. 41 ☿	26. 25. 40 ☿	0. 59	3. 38
10. Mart. " 11. 30	29. 52 ☿	99780	27. 35. 54 ☿	24. 5. 15 ☿	24. 5. 15 ☿	0. 0	3. 29
21. April. " 9. 30	10. 48 ☿	101010	16. 44. 51 ☿	15. 49. 50 ☿	15. 48. 20 ☿	1. 30	1. 48
1589. 8. Mart. " 16. 24	28. 36 ☿	99736	16. 55. 14 ☿	12. 14. 7 ☿	12. 16. 50 ☿	2. 43	2. 4
13. April. " 11. 15	3. 38 ☿	100810	4. 1. 50 ☿	4. 45. 0 ☿	4. 43. 20 ☿	1. 40	1. 10
15. April. " 12. 5	5. 36 ☿	100866	5. 1. 41 ☿	3. 58. 57 ☿	3. 58. 20 ☿	0. 37	1. 4
6. Maji " 11. 20	25. 49 ☿	101366	15. 30. 36 ☿	27. 8. 17 ☿	27. 7. 20 ☿	0. 57	0. 7
1591. 13. Maji " 14. 0	2. 10 ☿	101467	12. 7. 38 ☿	2. 15. 36 ☿	2. 20. 0 ☿	4. 24	2. 25 aust.
6. Jun. " 12. 20	24. 59 ☿	101769	25. 38. 48 ☿	27. 11. 45 ☿	27. 15. 0 ☿	3. 15	3. 55
10. Jun. " 11. 50	28. 47 ☿	101789	27. 56. 49 ☿	25. 57. 57 ☿	26. 2. 36 ☿	4. 39	4. 8
28. Jun. " 10. 24	15. 51 ☿	101770	8. 29. 32 ☿	21. 4. 21 ☿	21. 10. 0 ☿	5. 39	4. 45
1593. 21. Julii " 14. 0	8. 26 ☿	101498	20. 1. 38 ☿	17. 43. 14 ☿	17. 45. 45 ☿	2. 31	5. 46
22. Aug. " 12. 20	9. 11 ☿	100761	10. 15. 25 ☿	13. 9. 39 ☿	13. 10. 15 ☿	0. 36	6. 7
29. Aug. " 10. 20	11. 54 ☿	100562	14. 37. 15 ☿	11. 11. 41 ☿	11. 14. 0 ☿	2. 19	5. 52
3. Oct. " 8. 0	20. 15 ☿	99500	6. 19. 39 ☿	7. 49. 54 ☿	7. 50. 10 ☿	0. 16	3. 17
1595. 17. Sept. " 16. 45	4. 18 ☿	99990	22. 49. 19 ☿	26. 5. 45 ☿	26. 7. 12 ☿	1. 27	1. 42
27. Oct. " 12. 20	13. 59 ☿	98851	15. 35. 38 ☿	18. 50. 46 ☿	18. 51. 15 ☿	0. 29	0. 6
3. Nov. " 12. 0	21. 2 ☿	98694	19. 26. 33 ☿	16. 18. 33 ☿	16. 18. 30 ☿	0. 3	0. 17 bor.
18. Dec. " 8. 0	6. 43 ☿	98200	13. 2. 29 ☿	11. 39. 1 ☿	11. 40. 0 ☿	0. 59	1. 40

Distantiae igitur, methodo capitis hujus inquisitae ex observatis hic positae, prodibunt hae ipsae. Loca vero apparentia, quando Mars motu eccentrico in Cancro versatur, prodibunt circiter 4' anteriora, in γ et δ per totidem promotiora. Neque veniunt hi errorculi ex distantis vitiosis: non enim essent in contrariis plagis ejusdem, sed contrariae qualitatis. Existimo, illos conciliari posse mutatione apogaei \odot per 1°, quod per observata Brahei facile licet. Nihil tamen definitio in praesens. Reservatur enim et hujus apogaei et totius hypotheseos correctio in opus Tabularum⁹⁴).

Caput LIV.

Accuratius examen proportionis orbium.

Capite XLII. constituimus sane proportionem orbium ex observationibus extra situm acronychium, sed iis non undique ad *πληροφοριαν* nostram sibi mutuo consentientibus. Atque etiam per se, si vel exactissimae dentur observationes, negotium hoc ipsum ad 100 particularum certitudinem adduci nequit. Agendum igitur suffragiis et votorum numero. Ac cum cap. XXVIII. in anomalia media 11° 37', hoc est post correctionem cap. LIII. praecedentis in anomalia 11° 52', inventa sit distantia puncti ecliptici, in quod perpendicularis a corpore Martis descendit, 166180 vel 166208; cumque locus hic absit a limite boreo 23°, inclinatio erit 1° 43' circiter; excessus secantis 45 particulae, quae sunt in nostra dimensione 70 circiter. Martis igitur a Sole distantia 166250 vel 166278.

Jam comparabimus etiam observata cap. LI, ut consensu mediocri fulciamur. Anno 1586 in anomaliae mediae residuo 10° 9' 41'', hoc est post correctionem 9° 54' 41'', invenimus 166311, sed subtractione facta 1½' de loco, quem vicaria exhibuit, invenimus 166208. Duobus igitur gradibus minus 3' inferius, demendae circiter 95, sic ut sint 166113. Rursum addendae 80 ob latitudinem, ut sint 166193. Sic anno 1588, cum esset residuum anomaliae 8° 2' 51'', hoc est correcte 7° 47' 51'', per subtractionem 1½' a loco ex vicaria hypothese, invenimus distantiam 166396. Itaque 4° et 4' inferius erit brevior circiter 102, scilicet 166294, et propter latitudinem 166284, prius 166193 ex anno 1586, quorum medium 166238. In descendente vero, ex 5 observationibus inveneramus 166250 vel 166278. Quamvis igitur insensibile sit discrimen, sumamus tamen mediam 166260; ita ut plus fidamus descendenti semicirculo ut ab observationibus confirmatori.

Sit igitur hoc certum, in anomalia media 11° 52' distantiam esse 166260. Quare si quantumlibet crasso modo praeconciplas hypothesin, quae paulo post confirmanda est, sequitur, qualium radius est 100000, talium particularum non ultra 164 posse accrescere distantiae apheliae, minus etiam, si utaris hypothese perfecti circuli. Illae vero particulae, per praeconceptam proportionem orbium, ut illa cap. XLII. est constituta, redactae, efficiunt circiter 250; et hae additae ad 166260 efficiunt 166510. Supra vero cap. XLII. invenimus ex infirmioribus observationibus 166780, differentia 270 particularum.

Agemus sic etiam cum distantia perihelia, quae cap. XLII. fuit inventa 138500, ex observationibus non sat firmis.

Jam cap. LI. ad anomaliae residuum $161^{\circ} 45\frac{1}{2}'$, hoc est post correctionem $161^{\circ} 30\frac{1}{2}'$, invenimus distantiam citra correctionem latitudinis 139000 vel 138984. Sit autem 139000 in $21^{\circ} \times$. Qui locus cum 35° absit a limite, ideoque inclinatio $1^{\circ} 31\frac{1}{2}'$, erit excessus secantis $35\frac{1}{2}'$, quae valent 49 in nostra dimensione. Itaque distantia vera Martis a Sole 139049. At si radius est 100000, distantia perihelia est 575 particulis brevior, quam illa in anomalia $161\frac{1}{2}^{\circ}$, quae faciunt in nostra dimensione 876 particulas, minus, si perfecto circulo uteris. Atque hae sublatae ab 139049, relinquunt pro perihelia distantia 138173. Differentia 327 ab 138500 cap. XLII. inventa.

Secundum hanc igitur methodum invenitur	Aphelia . .	166510
	Perihelia . .	138173
	Diameter . .	304683
	Semidiameter	152342
	Eccentricitas	14169

Qualium autem 152342 fit 100000, talium 14169 fit 9301.

Sed tamen quia observata nostra, praesertim in perigaeo, tantam differentiam non ferunt; et quia fieri potest, ut vicaria, utpote falsa, aliquid etiam vitii admittat in eccentricitatem: priusquam certo concludatur, omnia vota colligantur. Apheliam itaque distantiam hic inventam, puta 166510, aptemus ad eccentricitatem cap. XLII, quae fuit 9265. Ut igitur 109265 ad 90735, sic 166510 ad 138274, ubi radius est quam proxime 152400. Docuit vero etiam multiplex experientia, verissimam eccentricitatem et quae physicis aequationibus sit convenientissima, esse inter 9230 et 9300, hoc est, hanc ipsam cap. XLII, scilicet 9265. Ut igitur neque nimium deseramus periheliam inventam hoc capite, scilicet 138173, neque nimium fidamus apheliae 166510, concludamus, apheliam verissimam esse 166465, periheliam 138234, ubi radius 152350.

Caput LV.

Demonstratur ex observationibus capitum LI. LIII. et proportionem orbium capitis LIV, peccare hypothesin capite XLV. arreptam, et distantias in mediis longitudinibus justo breviores efficere.

Id quidem capite LI. coepi dicere. Sed quia observationes plures et magis idoneae per cap. LIII. fuerunt instruendae ad dicendum testimonium, ex quibus simul etiam cap. LII. aliud aliquid inferebatur: ideo differenda fuit hucusque plena rei demonstratio.

Nihil opus est verbis. Ad anomalias medias exemplorum omnium, occurrunt per cap. LI. et LIII, computentur distantiae ex hypothesi XLV. et proportionem orbium capitis LIV, methodo illa, quam inde a XLVI. capite usque ad cap. L: atque illae comparentur tantis cap. LI. et LIII, inventas ex observationibus infallibilibus: utque, quo magis ab apsidibus descenderimus, deficere computatas ab observatis distantis, ita ut contrarium ejus fiat, quod supra cap. XLV. deprehendimus. Ibi enim distantiae ex lege circuli computatae

longiores erant in mediis longitudinibus, quam observatae: hic distantiae, quas hypothesis illa efficit, quae ovalem planetae orbitam efficit, breviores fiunt. Ergo patet, viam planetae neque circulum esse, neque tantum a circulo ingredi ad latera, quantum ovalis illa, ex cap. XLV. opinione orta et cap. XLVI. descripta, ingreditur, sed media incedere via. Et vicissim, usurpatis distantibus cap. XLV, si computaveris loca visa Martis, praesertim illa, quae cap. LIII. eminus oppositionem circumstant, cadet tibi ante oppositionem planeta nimis in consequentia, post oppositionem nimis in antecedentia. Atque id anno 1589 et 1591 in descendente semicirculo, et anno 1582, 1595 in ascendente, est evidentissimum. Nam ibi loci peccat ovalis ista cap. XLV. 660 particulis in defectu, ut circulus perfectus totidem peccat in excessu: quae possunt in apparentia efficere 20' et amplius. Itaque et David Fabricius ex suis observatis hypothesin meam capitis XLV, quam ipsi pro vera communicaveram, erroris hujus, nimis curtarum distantiarum in mediis longitudinibus, coarguere potuit, eo ipso tempore scriptis literis, quo ego in inquirenda vera hypothesi, repetita cura, laboravi. Adeo parum abfuit, quin ille me in deprehendenda veritate praeverteret. (Comp. p. 95). Cumque perfectus circulus tantundem peccet in contrarium, hinc argumentamur recte, veritatem esse in utriusque medio.

Atque idem etiam capitibus XLIX. L. testabantur aequationes ex causis physicis computatae; lunulam nempe, quae a perfecto semicirculo resecatur, debere saltem dimidiam habere latitudinem ejus, quam opinio cap. XLV. resecat. Itaque nihil nos impedit, quin rem certissime demonstratam esse dicamus: opinionem scilicet cap. XLV, dum excessui perfecti circuli medetur, in contrarium defectum incidere. Itaque causae physicae cap. XLV. in fumos abeunt.

Caput LVI.

Demonstratio ex observationibus ante positis, distantias Martis a Sole desumendas esse quasi ex diametro epicycli.

Inventa est supra cap. XLVI. latitudo lunulae, quam peperit nobis opinio cap. XLV, docuitque resecandam a semicirculo; haec, inquam, inventa est partium 858, qualium circuli semidiameter est 10000. Cum igitur duobus argumentis, quae cap. XLIX. L. et LV. praemisi, non obscure colligerem, lunulae illius latitudinem dimidiam tantum assumendam, scilicet 429, correctius 432, et in dimensione, qualium semidiameter Martis est 152350, fere 660: coepi de causis et modo cogitare, quibus tantae latitudinis lunula rescinderetur.

Qua in cogitatione dum versor anxie, dum reputo cap. XLV. plus nihil dictum esse, itaque futilem fuisse meum de Marte triumphum, forte fortuito incido in secantem anguli $5^{\circ} 18'$, quae est mensura aequanti opticae maximae. Quem cum viderem esse 100429, hic quasi e somno pergefactus, et novam lucem intuitus, sic coepi ratiocinari. In longitudinibus mediis aequationis pars optica fit maxima. In longitudinibus mediis lunula seu curtatio distantiarum est maxima, estque tanta, quantus est excessus secantis aequationis opticae maximae 100429 supra radium 10000.

Ergo si pro secante usurpetur radius in longitudine media, efficitur id, quod suadent observationes. Et in schemate cap. XL. conclusi generaliter, si pro HA usurpes HR, pro VA vero VR, et pro EA substituas EB et sic in omnibus, fiet idem in locis ceteris eccentrici, quod hic factum in longitudinibus mediis. Et per aequipollentiam in schemate parvo cap. XXXIX. pro lineis $\alpha\delta$ vel $\alpha\epsilon$ sumetur $\alpha\kappa$, pro αs vel $\alpha\lambda$ sumetur $\alpha\mu$.

Rursum itaque lector percurrat caput XXXIX. Inveniet ibi, jam antea ex naturalibus causis disputatum esse, quod hic observationes ultro testantur, consentaneum scilicet videri, planetam in diametro quasi epicycli, quae perpetuo ad Solem tendat, librationem aliquam perficere. Inveniet etiam, nihil magis cum hac sententia pugnasse quam hoc, quod tunc, cum sumeremus repraesentandum perfectum circulum, coacti sumus librationis partes $\gamma\epsilon$ et $\lambda\zeta$, summas imis (quae aequalibus eccentrici arcubus respondent) facere inaequales, et breves summas, longas imas. Jam igitur, negato circulari planetae itinere et usurpatis $\kappa\alpha$, $\mu\alpha$ pro $\delta\alpha$, $s\alpha$, hoc est pro $\epsilon\alpha$, $\lambda\alpha$ ut dictum est, sequitur ultro, partes librationis illas, puta $\gamma\kappa$, $\mu\zeta$ esse aequales. Ita quod cap. XXXIX. diu nos torserat, jam cedit nobis in argumentum deprehensae veritatis.

De eo vero, quod partes mediae $\kappa\mu$ adhuc sunt majores extremis $\gamma\kappa$, $\mu\zeta$, dicitur sequenti cap. LVII, quod sit naturae consentaneum, contra quam cap. XXXIX. intelligere poteramus. Sed et illa difficultas, quae cap. XXXIX. oriebatur, si diametri Solis augmentum planetae pro signo accessus et recessus poneretur, jam penitus evanescit, ut apparebit capite LVII. Igitur de anomalia eccentrici 90° facile mihi fuit praedicto modo deprehendere, pro EA distantia perfecti circuli sumendam esse EB, respondentem coaequatae EAB. Quod vero unius exemplo anomaliae generaliter conclusi de omnibus, id ex una nondum sequebatur, sed opus erat crebris observationibus stabiliri.

Jam igitur intelligis, quorsum praecipue nobis servire jubeantur observata capitum LI. LIII, nimirum ad testimonium hic dicendum.

Quare age ad anomalias coaequatas illis capitibus expositas, scilicet ad angulos CAG, CAH et ceteros, computentur anomaliae eccentrici CBG, CBH. Nec opus est, ut scrupulos consectoris, aut metuas ab imperfectione aequationum eccentrici, quae restant adhuc cap. XIX. XXX. XLIII. XLVII—L. Utere quacunque ex his methodis, praesertim cap. XLIII, non errabis in aequationibus ultra $8'$. Constitutis angulis inquire lineas, HR respondentem angulo coaequatae HAC, et RV respondentem coaequatae VAC et sic ceteras: et transfer illas in dimensionem orbium cap. LIV, invenies, ut sequitur in tabula.

Fig. 110.





Fig. 111.



Ex observationibus
cap. LI.

In descendente semicirculo.	In ascendente semicirculo.	Computata ex libratione.
166180	166401	166228
166208	166296	
162994	163100	163160
163051		
158091	158217	158074
158111		
154400	154278	154338
147820	147743	147918
147700	148000	
	148050	
139000	138984	139093

In observationibus cap. LIII. non opus est idem praestari. Quas enim adhibui distantias Martis a Sole ad computanda loca Martis apparentia, illas prius hac ipsa librationis methodo inquisivi. Cumque per illas observationes repraesentatae sint, erunt igitur justae. Vides igitur per omnem eccentrici ambitum observationibus creberrimis et certissimis confirmari distantias diametrales, cap. XXXIX. a priori inventas.

Caput LVII.

Quibus naturae principiis efficiatur, ut planeta libretur quasi in diametro epicycli.

Apparet igitur ex certissimis observationibus, quod via planetae in aera aetherea non sit circulus, sed figurae ovalis, et quod libretur in diametro parvi circelli, hoc modo: si post aequales arcus eccentrici planeta pro distantiiis circumferentialibus $\gamma\alpha$, $\delta\alpha$, $\epsilon\alpha$, $\zeta\alpha$, hoc est $\gamma\alpha$, $\epsilon\alpha$, $\lambda\alpha$, $\zeta\alpha$, quibus circuli perfectio innititur, distantias diametrales $\gamma\alpha$, $\mu\alpha$, $\zeta\alpha$ conficiat; ubi ad oculum patet, de semicirculi eccentrici perfectione rescindi tantae latitudinis lunulam, quanta est quolibet loco differentia distantiarum diversarum, puta $\epsilon\alpha$, $\lambda\mu$. Hoc jam obtento, non rationibus a priori, sed observationibus, uti jam dixi, jam speculationes physicae procedent rectius quam hactenus. Etenim libratio haec sese accommodat ad spatium in eccentrico confectum; non quidem rationabili seu mentali aliquo modo, ut mens planetae aequalis arcus eccentrici imperfecti CD, DE, EF ad-

Fig. 111.





Fig. 112.



numeret aequalibus partibus librationis $\gamma\alpha$, $\mu\alpha$, $\zeta\alpha$, sunt enim hae inaequales; sed modo naturali, qui nititur non aequalitate angularum DBC, EBD, FBE, sed fortitudine angulorum DBC, EBC, FBC, perpetuo crescentia; quae fortitudo fere sequitur sinum geometris dictum, ubi ascensus continuus imminutione sensim in descensum mutatur, probabilius, quam si-

petat Solem; retineatur autem contra suam magneticam naturam Solis appetentem in translatione globi perpetuo sibi ipsi parallelos: nisi quatenus successu seculorum ab aliis ad alias fixas nutum suum transfert et aphelii progressum hoc modo causatur: quorum utrumque nihilominus mentis opus esse posse fateor, ut quae ad hunc motum ab animali facultate sat est instructa, cum sit motus non totius corporis de loco in locum (qui motus supra cap. XXXIX. causae motrici planetis insitae recte ademptus fuit), sed partium circa centrum totius quasi quiescentis. Ecce iterum in globo Telluris directionis huiusmodi axis exemplum ex Copernico. Nam dum axis Telluris annuo centri circumactu sibi ipsi suisque sitibus omnibus manet propemodum aequidistans, aestas et hiems efficitur: quatenus vero longissima secula illum inclinant, fixae progredi putantur, aequinoctia retrocedere.

Quid igitur dubitamus, attribuere planetis omnibus ad salvandam eccentricitatis phantasiam, quod uni illorum (Telluri scilicet) ex phantasia praecessionis aequinoctiorum Solisque surgentis et cadentis annuo circumactu animadversum est inesse? Ubi quemadmodum deceptus est Copernicus, existimans, peculiari principio opus esse, quod Terram annuatim a septentrione in austrum et vicissim libret, sic ut aestas et hiems eveniat, et cujus molitione circumitioni commensurata resultet aequalitas reditus anni tropici et siderii (quatenus fere aequales sunt); cum tamen unica constanti directione axis Telluris, super quo fit diurnus motus, illa omnia obtineantur nihilque extraneis causis opus sit, nisi ad unicam tardissimam praecessionem aequinoctiorum: ita hic quoque nullo consilio opus erit motoribus planetae, ut ejus corpus simul circa Solem vehatur manens in situ parallelo simulque librationem absolvat. Alterum enim ab altero naturaliter pendebit. Tantummodo de progressu apheliorum tardissimo cogitandum restat.

Etenim lingula in C versante et in F, nulla causa est, cur planeta accedat vel recedat, cum capita Soli objiciat aequalibus intervallis, conversurus utique mucronem ad Solem, si sineretur ab illa vi, quae ejus directum et parallelum tenet axem. Planeta a puncto C abeunte, sensim cuspidis Soli appropinquat, cauda abit; sensim igitur incipit globus ad Solem adnavigare. Post F sensim cauda appropinquat, caput abit a Sole. Sensim igitur et totus globus naturali odio fugit a Sole. E regione autem ipsius A, cum longitudo axis directe in Solem porrigitur, illic accessus, hic fuga est fortissima. Id vero supra postulabant nostra praesupposita ex observationibus derivata, ubi ex $\gamma\kappa$, $\kappa\mu$, $\mu\zeta$ partibus librationis, quae respondent aequalibus arcibus eccentrici, mediae partes κ , μ erant longissimae, exiles versus γ , ζ . Sed et illud consentit, quod observationes volunt $\gamma\kappa$, $\mu\zeta$ aequales, cum tamen arcus ipsorum $\gamma\delta$, $\epsilon\zeta$, vel potius in eccentrico CD, EF aequales inaequalibus conficiantur temporibus et CD longiori; sic ut $\gamma\kappa$ librationis pars tardius absolvatur quam $\mu\zeta$ ipsi aequalis. Nam sic et magnetes ex intervallo majori lentius ad se mutuo accedunt, celerius et citatius a breviori.

Imo vero ipsam etiam vim, quae retinet axem magneticum in situ parallelo, derogans directioni axis in Solem, ab occupatione mentis, cui illam paulo ante permiseramus, ad naturae munia traducere possumus. Nam etsi ob stare videtur, quod natura uno et eodem modo agat, haec vero vis re-tentrix videatur aliis temporibus aliter contendere, utpote annutu axis ad Solem, cui impediendo comparata est, in longitudinibus mediis evanescente, in aphelio vero et perihelio fortissimo existente: at quid vetat, vim hanc

retentionis esse multis partibus fortiolem quam annutum axis ad Solem, atque ita illam ab adversario tam imbecilli vel nihil vel parum admodum fatigari? Exemplum rursum capiamus ex magnete. In eo manifestissime permixtae sunt duae virtutes, altera directionis ad polum, altera ferri appetens. Itaque si lingula seu acus nautica dirigatur versus polum, accedat vero ferrum a latere, acus a polo declinat parumper et ad ferrum inclinatur, atque ita nonnihil indulget familiaritati ferri, sic tamen, ut plurimum polo tribuat. Hinc adeo fieri putat Gilbertus, ut lingula a polo ad praecipuae magnitudinis continentes declinet, atque ita causa declinationis hujus insit in Terrarum tractibus, prout a dextris vel a sinistris altiores, majores et virtute pollentiores in propinquo sint.

Adeoque eadem opera et aequabilem utrique facultati naturali operationem permittere possumus, et contemperatione utriusque non obscuram neque mehercule vanam ostendere causam translationis apheliorum. Esto enim, ut haec vis dirigendi axis in Solem deroget nonnihil virtuti retentrici pro modulo suae ad illam proportionis. In semicirculo igitur aphelii, ut in C (Fig. 113), mucro versus H annuet parumper, hoc est in antecedentia, cauda vero abnuet a Sole, vincens parumper vim retentricem. Itaque aphelium fiet retrogradum. At in semicirculo perihelii, ut in F, annuet idem mucro versus G, hoc est in consequentia, rursus vincens vim retentricem in contrarium. Tunc igitur aphelium fiet directum et velox. Quia vero brevior est AF quam AC, et Sol propior ipsi F quam ipsi C, ideo et vis conversionis axis magnetici ad Solem fortior in F quam in C. Plus igitur derogabitur retentrici in F quam in C. Non tantum igitur compensat nutus perihelii in consequentia nutum aphelium in antecedentia, sed etiam superat eum. Atque ita causa patet, cur apsides progrediantur, non retrocedant. Itaque aphelium a nobis inventum valebit tantum in anomalia coaequata 90° et 270° , quando axis virtuosus in Solem ipsum porrigitur, qui est justus ejus situs, eritque motus aphelii spiralis, ut infra cap. LXVIII. etiam de motu praecessionis aequinoctiorum ob causam aliam existentis patebit. Directio igitur axis magnetici in situm parallelum, seu vis, illius custos, non respiciet fixas has vel illas, sed tantum situm sui corporis, ut is est quolibet tempore. Et re simpliciter perpensa, quia directio haec quieti similior est quam motui, in materia inque corporis dispositione potiori jure quaeritur, quam in aliqua mente.

Age vero, arctioribus vestigiis persequamur hanc similitudinem librationis planetariae cum motu magnetis, idque demonstratione pulcherrima geometrica: ut appareat, magnetes talem habere motum, qualem in planeta deprehendimus. Sit DFA (Fig. 114) vel magnes rotundus vel ipsum corpus Martis: DA linea, secundum quam porrigitur virtus magnetica: D polus Solis appetens, A polus a Sole fugiens. Primum notabis, idem esse in hac speculatione, sive consideremus integrum globum corporis magnetici, sive unam solam ejus lineam physicam virtutis ipsi DA parallelon.

Cum enim virtus haec magnetica sit corporalis et cum corpore divisa, ut probavit Gilbertus Anglicus, B. Porta⁹⁹) et alii; certe quia globus constat ex infinitis quasi lineis physicis ipsi DA parallelis, quarum virtus in rectum et unam mundi plagam extenditur, de singulis seorsim idem erit judicium circa qualitatem motus, quod est de universis conjunctim et vicissim. Sit ergo loco totius corporis omniumque ejus filamentorum medius axis DA ad speculandum propositus. Bisecetur DA in B et ipsi DA per-

Hoc pacto accessus ille libratorius citra mentis operam a vi magnetica, insita quidem et solitaria, perficitur, sed cujus tamen definitio a forinseco corpore Solis dependet. Definitur enim vis Solis appetens vel ab eo fugiens. Ac etsi vis haec inter magnetes, quae illos conjungit, debet esse mutua, ego vero supra cap. XXXIX. de Sole negavi vim planetarum attractricem: intelligebatur tamen tantummodo mere attractrix, ut ex usurpato argumento patet. Hic autem ponitur simul attractrix, simul alio situ repultrix. Vel etiam hoc ponatur, ut Sol instar ferri nondum imbuti tantummodo petatur, non vicissim petat: cum ipsius filamenta supra fuerint circularia, planetarum vero hic ponantur recta.

Sufficit mihi ex hoc exemplo magnetis demonstrasse possibilitatem rei in genere. Ceterum de re ipsa in specie ambigo. Nam quod Tellurem attinet, certum est, axem ejus, cujus aequabili et aequidistanti directione anni tempora efficiuntur in punctis cardinalibus, ineptum esse ad hanc librationem et ad aphelium, cum Solis apogaenum vel Terrae aphelium hodie pene coincidat cum punctis solstitialibus, non vero cum aequinoctialibus, quod nobis esset opportunum; nec manserit in eadem remotione a punctis cardinalibus. Quodsi hic axis non est idoneus, nullus in toto Telluris corpore idoneus esse videtur, cum nullus ejus tractus sit, qui quiescat in eodem situ, toto globi corpore circa priorem illum axem diurna et irrequieta gyratione circumvoluto. At vero, si nulla plane materialis et magnetica facultas absolvere potest munia illa planetis privatim commissa, ob defectum mediorum, idoneae scilicet diametri corporis, sibi ipsi in circumlacione perpetuo aequidistantis, qui defectus jam in uno planetarum, in globo scilicet Telluris apparuit: accersatur ergo mens,*) quae ut cap. XXXIX. dictum, ex contemplatione diametri Solis crescentis in cognitionem veniat distantiarum, quas conficit; et praesideat facultati seu animali seu naturali sic accommodandi sui globi in situ parallelo, ut debito modo a Solari virtute impellatur et respectu Solis libretur (mens enim nuda et facultate inferioris gradus destituta eo ipso non posset quicquam in corpus) simulque consilio utatur ad librationis tempora restitutioni periodicae non plane aequanda et sic ad transferendas apsidas. Quarum rerum verisimilitudines supra cap. XXXIX. sunt explicatae.

Restat, ut quia ex observationibus jam tenemus leges et quantitatem hujus librationis, qua diametri Solis aspectus variatur, quas cap. XXXIX. adhuc ignoraveramus, jam videamus, an illae leges tales sint, ut verisimile sit, eas innotescere planetae. Leges librationis erant istae, ut anomaliae eccentrici sinus versus metiretur partem librationis confectam. Dico ergo initio: dato et concesso illo, de quo testantur observationes, planetam scilicet post aequales arcus eccentrici inveniri in signis γ , α , μ , ζ (Fig. 111) non vero in signis γ , ι , λ , ζ , tunc diametri Solis incrementum exhibere legitimam mensuram sinus versi anomaliae coaequatae, non minus atque scimus, anomaliae eccentrici sinus versos esse mensuram librationis.**)

*) Vereor dicere rationali, ne discursus rationis subintelligatur.

**) Mensurat anomaliae $\left\{ \begin{array}{l} \text{eccentrici} \\ \text{coaequatae} \end{array} \right\}$ sinus versus Librationem Planetae. Augmentum diametri Solis, ut ea apparitas fuit spectatori in corpore planetae supposito et vicissim.

Quia ergo planetae mens, siquidem ei aliqua adjuncta est, spatia, quae libratione trajecit, non aliter percipit, nisi argumento auctae diametri Solis, ut cap. XXXIX. dictum, oportebit ei innotescere sinum versus anomaliae coaequatae, ut ad ejus praescriptum diametrum Solis angeat accedendo.

Demonstratio hujus rei haec est. *Sit enim planeta post aequales arcus imperfecti eccentrici CD, DE, EF, in γ , κ , μ , ζ ; et connectantur puncta D, H, secante DH diametrum CF in I. Quia ergo rectae $\delta\kappa\theta$, $\mu\eta$ secant epicyclum in similes arcus cum eccentrico ex constructione, erit ut CF ad CI, sic $\gamma\zeta$ ad $\gamma\kappa$, altera sectio alterius mensura.*

His ita habentibus dico etiam secuturum, ut eadem mensura accumulentur incrementa diametri Solis in α , ex γ , κ , μ , ζ inspecti, qua mensura crescit sinus versus anomaliae coaequatae. Id in solidum demonstrare hic importanum esset. Intelligi vero facile poterit, in solidum ita habere, si media et extrema simul contingere demonstramus. *Igitur in C anomalia coaequata est nihil, sinus versus nihil, et Sol ex γ inspectus apparet minimus, ita ut incrementi ejus portio sit itidem nihil. Sic in F anomalia coaequata est 180° , sinus versus aequalis integrae diametro 200000 et Sol ex ζ inspectus apparet maximus, ita ut incrementum ejus totum accesserit.*

Pro anomalia igitur coaequata 90° erigatur ex A perpendicularis AM ipsi CF, et connectatur MB. Educatur etiam ex α tangens epicyclum in γ et punctum γ contactus cum β centro connectatur. Cum ergo $\alpha\gamma\beta$ sit rectus (Eucl. III, 18) et MAB rectus ex constructione, et $\beta\gamma$, BA aequales ex constructione, ut et $\beta\alpha$, BM: triangula igitur sunt aequalia et congruentia: quare $\gamma\beta\alpha$, ABM aequales. Ex γ in $\gamma\zeta$ perpendicularis cadat γo . Quare cum $\gamma o\beta$ sit rectus, aequatur igitur ipsi MAB, et $\gamma\beta o$ aequabatur ipsi MBA, triangula igitur sunt similia; et ut $\gamma\beta$ ad βo sic MB ad BA et vicissim. Cumque aequentur $\gamma\beta$, $\beta\gamma$, $\beta\zeta$ et MB, BC, BF; sunt igitur $\gamma\beta$, βo junctae, hoc est γo ad $o\zeta$ sicut MB, BA junctae, hoc est CA ad AF. Cum igitur CA sit sinus versus anomaliae eccentrici CBM, et ponatur metiri partem librationis respondentem, erit γo illa pars. Ergo in hac anomalia eccentrici CBM vel coaequata CAM 90° planeta erit in o. Sed anomaliae coaequatae 90° , scilicet CAM sinus versus est dimidium totius diametri, scil. 100000. Dico etiam diametri Solis in A, α quantitatem visibilem ex o fore medio loco inter quantitatem visi ex γ et ex ζ , sic ut dimidium augmenti accesserit, planeta in o versante infra β . Sit enim diameter corporis Solis $\alpha\zeta$; anguli visionis $\xi\zeta\alpha$, $\xi o\alpha$, $\xi\gamma\alpha$, connexo signo ξ cum signis ζ , o, γ . Et quia sunt aequales AF, $\zeta\alpha$, sic AC, $\alpha\gamma$; et ut CA ad AF sic γo ad $o\zeta$: ergo ut $\gamma\alpha$ ad $\alpha\zeta$ sic γo ad $o\zeta$. Sed insensibiliter differunt $\gamma\zeta$ a $\gamma\alpha$ et $\zeta\alpha$ a $\zeta\alpha$. Ergo ut $\gamma\zeta$ ad $\zeta\alpha$ ad sensum sic γo ad $o\zeta$. In triangulo igitur $\gamma\zeta\alpha$ angulus ξ divisus est linea ξo sic, ut basis $\gamma\zeta$ secaretur in proportionem laterum $\gamma\xi$, $\zeta\alpha$. Ergo (Eucl. VI, 3. conv.) angulus $\gamma\zeta\alpha$ linea ξo in duo aequalia sectus est; et $\gamma\xi o$ dimidium est ipsius $\gamma\zeta\alpha$, totius augmenti diametri Solis. Quod erat demonstrandum. Certum est

Fig. 115.




Fig. 116.



itaque de extremis et medio, quod hoc pacto, si librationis diameter dividitur a planeta in proportionem sinuum versorum anomaliae eccentrici, diameter Solis augeatur in proportionem sinuum versorum anomaliae coaequatae.

Id majoris evidentiae causa etiam hinc ex parte patet. *Erigatur recta BL (Fig. 116) ex B ipsi CF ad perpendicularum: et centro A, diastemate aequali ipsi BC scribatur arcus, secans BL in L: et connectatur AL. Cum ergo sit anomalia eccentrici CBL 90° , erit sinus versus CB 100000, dimidium totius diametri; quare et libratio $\gamma\beta$ (Fig. 116) dimidium totius $\gamma\zeta$, et proinde distantia erit $\beta\alpha$. Ei vero aequalis est ex constructione AL, quare planeta erit in L. Et quia ipsi BC vel BM aequalis est AL, et BA commune latus et LBA rectus, ut et MAB: triangula igitur BMA, ALB congruunt. Itaque ipsi AM aequalis est BL. Sed AM aequatur ipsi $\alpha\gamma$ ut supra, ergo et BL. Sed $\alpha\gamma$, scilicet praetensa recto $\alpha\sigma$, longior est quam $\alpha\sigma$, subtensa acuto $\alpha\gamma\sigma$, ergo et BL longior est quam $\alpha\sigma$, et AL longior est quam BL, multo igitur longior AL quam $\alpha\sigma$. Minor ergo videtur Sol in distantia AL, quam in distantia $\alpha\sigma$. Distantia vero $\alpha\sigma$ jam modo videbatur medius inter maximum et minimum: quare in distantia AL apparet Sol minor medio. In L igitur, etsi dimidium de semicirculo eccentrici est absolutum, tamen minus dimidio incrementi accessit diametro Solis. Sane quia et anomalia coaequata LAC minor est dimidia 90° . Atque hoc illud est, quod cap. XXXIX. nos torserat, ut praecedenti cap. LVI. dictum. Si enim orbita planetae perfectus fuisset circulus, augmentum diametri Solis mensurasset augmenta sinuum versorum anomaliae eccentrici; cujus observatio alienior est a mente planetae, quam observatio coaequatae, ut jam audiemus. Vide igitur a contrariis, quam commode ista mensura planetae tribuatur quamque plausibiliter.*

Si librationis ipsius mensuram a mente comprehendendam ponemus anomaliae eccentrici sinum versum, quem observationes commendant, tunc destitueretur mens planetae ab hoc medio diametri Solis variabilis: quia se non accommodat ad sinus versos anomaliae hujus eccentrici. Planetae enim iter non est circulus. Et mens planetae intelligeret librationis partes seu spatia conficienda se ipsis sine signo: quod pridem inter absurda retulimus; intelligeret et anomaliam eccentrici, quae est angulus inter duas rectas ex centro eccentrici ejectas, alteram per punctum aphelii, alteram per centrum planetarii globi; in schemate est DBC (vel ejecta ex D parallela ipsi BC linea DK, tunc KDB est ejusdem anomaliae eccentrici complementum). Si ergo mens percipit angulum KDB, necesse est ut percipiat trina puncta K, D, B. De puncto D non est dubium, quia hoc est centrum sui globi. De K non multo dubito. Nam BC et DK ob infinitam fixarum distantiam tandem coincidunt in eundem fixarum locum: et fixae sunt corpora realia. Itaque nihil est absurdi, planetae mentem sensu quodam occulto in conspectu habere fixam illam, quae quovis tempore praebet aphelio hospitium.*) De solo B negatur, ejus sensum competere in mentem planetae, quia B nullo corpore vestitur. Praeterea et causa sublata, cur B inspiceretur, effectus quoque tollitur. At B inspicere debet, si circulus CD est conficiendus. Orbitae vero planetarum non sunt circulares perfecte, quod cap. XLII. ex observationibus probatum est. Ergo

*) Et tamen ne hoc quidem dogmate opus fuit in modo naturali penale superius.

neque collimant planetae ad B. Et sic ipsum B quasi centrum posterius est ipso itinere CD. Si vero inspiceretur a planeta, prius esset ipso itinere.

His itaque de causis nego sinum versum anomaliae eccentrici mensuram subministrare planetae librationis suae, non quod haec mensura non sit, sed quia, etsi sit, a planetae tamen mente non respicitur. At si augendam et minuendam Solis diametrum planetae ponimus pro medio seu adminiculo, per quod ad justas et se ipsis imperceptibiles distantias ipse librationibus suis pervenit, huicque diametro Solis variandae ex demonstratione proxime expedita regulam demus et mensuram a planetae mente percipiendam anomaliam eccentrici coaequatam, in schemate DAC vel potius KDA: jam igitur stamus rectius. Nam utraque signa sunt perceptibilia: ex parte librationis, crescens et decrescens magnitudo diametri Solis; ex parte mensurae seu anguli, tria puncta corporibus vestita. Nam in A ipse Sol est, in D planeta, in K fixa, index aphelii.

Fortassis itaque dicendum erit, (quod quidem et jam supra cap. XXXIX, posito casu, quod naturae vires non sufficiant motibus coelestibus administrandis, sumus amplexi) planetae tributum esse sensum lucis fixarum Solisque, cujus radiationum concursu apud centrum planetarii corporis angulum hunc anomaliae coaequatae aestimet.

Una sola difficultas est expedienda: quam ob rem non hic ipse angulus fiat mensura operi planetario, quod est hic augere diametrum Solis accessu ad Solem, sed pro angulo ejus sinus versus?*) Et quibus mediis planetae sinum anomaliae coaequatae percipiat? Utrum ipse quoque more hominum ratiocinando in geometricis proficiat? cum tamen nullum hactenus munus motus coelestes administrandi in planetae mentem competierit, quod non instinctu divino, inde a primaevo rerum conditu huc usque pertingente, citra ratiocinationem ullam obiri posset.

Repetendum itaque ex paulo supradictis, quod sinus anomaliae coaequatae sit index fortitudinis angulorum KDA, de quibus Aristoteles in Mechanicis, et hoc eodem capite paulo supra. Nam duo brachia commissa angulo obtuso facilius diriguntur, quam angulo recto, idque in proportionem sinuum. Et vicissim duo brachia angulo acuto coagmentata facilius in unam rectam coguntur capitibus conjunctis, quam si angulo recto coagmentarentur. Repete demonstrationem ipsam ex paulo praemissis.

Itaque uno modo, si constet, planetam habere sensum fortitudinis angulorum, nihil erit absurdi si dicamus (nostro hominum conceptu), innotescere illi sinus angulorum. At cur ille sentisceret naturalem fortitudinem angulorum? Nimirum ad naturalia revolvimur principia. Sint enim ut prius tractus certi corporis planetarii, quibus insit vis magnetica directionis in lineam, quae tendit in Solem. Sit autem jam non, ut prius, naturae corporis, sed animali facultati, seu quae regit corpus planetae intrinsece, hoc tributum, ut, dum a Sole rapitur, axem illum magneticum ad easdem per-

*) Planetae mens, siquidem intenta est ad anomaliae coaequatae angulum, non aestimat ejus magnitudinem, sed sinum. — Quemadmodum paulo ante sinus rectus anomaliae eccentrici (vel ei respondentis coaequatae) fuit index fortitudinis librationis, sinus vero versus anomaliae eccentrici fuit index confectae librationis, ita hic sinus ipsius anomaliae coaequatae est index celeritatis, qua crescit Solis diameter, sinus vero versus anomaliae coaequatae est index augmenti jam comparati per omnes celeritates antecedentes.

perpetuo fixas dirigat: nisi quatenus successu seculorum eum parum inclinat. Orietur itaque pugna facultatis animalis cum facultate magnetica, et victoria animalis: non aliter atque cap. XXXIV. dixeramus, corpora planetarum naturaliter quietem appetere, sed moveri a vi extranea Solis. Vel cape accommodatius exemplum. Brachii humani naturale pondus deorsum vergit ad Terrae centrum; animalis vero facultas hoc praestat vexillifero, ut illud supra caput extendat et in gyrum agat: ubi vincit animalis facultas naturale pondus, vinceretque perpetuo, nisi corpus vexilliferi cum omnibus facultatibus mortale conditum esset.

His itaque positis planetae mens ex lucta facultatis animalis, ad retinendum axem magneticum comparatae, cum magnetica virtute directionis in Solem, intelligere et percipere poterit fortitudinem angulorum. Et hic modus confirmari videtur etiam per exemplum Lunae, quam certum est in diametrali linea Solis et Terrae fortius incitari, ob hanc ipsam forsitan angulorum fortitudinem.

Tandem igitur summa haec erit: planeta constitutus in aphelio nihil ad Solem nititur, sed provehitur pro ratione distantiae AC (Fig. 115); ad hanc promotionem sequitur angulus KDA; ad anguli hujus proportionem fortitudinis ipse planeta Solis diametrum auget accedendo ad Solem, accessu minuit distantiam, ut sit AD; minuta distantia celerius provehitur, celerius igitur mutatur KDA angulus, celerius igitur planeta (ceteris paribus) auget Solis diametrum. Ita efficitur perennis circulatio, non per intervalla, qualia nos in nostris cogitationibus et calculo statuimus, insensibilia errata non considerantes, sed plane continua.

Dixi haec hactenus cum conditione, si libratio, qua de testantur observationes, nequeat perfici a virtute aliqua magnetica planetarum corporibus insita, et si omnino necesse fuerit, nos ad mentem confugere. Ceterum si comparare libeat illam naturalem et hanc mentalem motionem: illa quidem per se stat, nihil indigens; haec vero mentalis, quomodocunque illam animali facultate movendi corporis instruas, testimonium illi magneticae perhibere ejusque subsidia accersere videtur. Primum enim mens ipsa nihil potest in corpus. Oportet igitur menti adjungere facultatem exsequendi sua munia in corpore planetae librando. Facultas illa aut animalis erit, aut naturalis et magnetica. Animalis esse non potest: nequit enim facultas animalis transportare corpus suum de loco in locum (ut requiritur in hac libratione) sine potestate alterius corporis adminiculantis. Erit igitur magnetica facultas, hoc est naturalis consensus inter corpora planetae et Solis. Itaque mens naturam et magnetes in subsidium vocat.

Deinde mens haec ad dimidium decursum regulae suae seu anomaliae coaequatae, dum dimidium perficit operis sui, quod consistit in augenda vel minuenda diametro Solis, supra quidem $\gamma\theta$ (Fig. 116) librationis partem absolvit majorem, infra vero $\theta\zeta$ minorem. Neque $\gamma\theta$, $\theta\zeta$ respondent partibus temporis. Nam plus morae consumitur in $\gamma\theta$, quam ejus supra $\theta\zeta$ excessus requirebat. Neque continue augentur partes a ζ versus γ , sed apud γ , κ (Fig. 111) sunt minores, ut et apud μ , ζ . At mentis opera solent esse constantia. Propterea nobis fuit opus, illam instruere facultate animali atque magnetica, et pugnam utriusque comminisci, qua mens admoneretur de officio suo, de quo nec temporis nec spatiorum confectorum aequalitate admoneri potuit. Itaque rursum menti subsidium a natura petivimus. Contra haec modificationes omnes insunt re vera operi virtutis magneticae extraneae

Solis eique conjunctae magneticae, insitae ipsi planetae, ut supra explicatum. Si ergo per sese officium faciunt virtutes magneticae, quid opus illis est mentis directorio? Ac etsi de magnetica vi, ipsis corporibus planetariis insita, incerti mansimus contemplatione axis Telluris, qui diversus est a linea apsidum Solis: at haec difficultas utrinque communis est. Nam et mente posita tamen coacti sumus admittere talem axem, qualem in Tellure desideramus, quo mediante mens apprehendat fortitudinem anguli seu ejus sinum versum. Contra vehementer urget nos verisimilitudo, ut librationem hanc planetarum, quae citra controversiam leges naturae sequitur, naturae adscribamus in solidum, quomodocunque ea insit corporibus planetarum. Adeoque et ipsam hanc comprehensionem sensitivam Solis et fixarum, quam molliter ego accipio mentique planetae indulgeo, nescio an sufficienter lectori philosopho comprobaverim.

Accedit et hoc, quod in ipsis etiam modis, quos menti praescripsimus, omnium, qui possunt esse, probatissimos, implicari videtur quaedam incertitudo geometrica; quae nescio an non a Deo ipso repudietur, qui hactenus semper demonstrativa via progressus esse deprehenditur. Nam si planeta, prout ad Solem partim insita vi appropinquaverit, in alium et alium gradum virtutis ex Sole adventitiae venit (ut quidem venit), et si diversi gradus reciproce ipsius etiam planetae viam appropinquandi intendunt, dum angulum augment, qui regula ponitur appropinquationis seu auctionis diametri Solis: nisus planetae proprius denique sibi ipsi fiet ex parte mensura, et in intentione planetae simul prius et posterius; cum sit per partes inaequalis et ob hoc ipsum mensura indiguerit. Quo pacto non demonstrative, sed quasi per regulam falsi dabitur exploratio temperandarum virium utriusque virtutis, ut eodem tempore sese expediant eodem corporis circumactu.

Nisi forte quis ex hac ipsa mensura ἀνωμερῶς progressum apheliorum occasionem invenire suspicari velit. Sed nos supra cap. XXXV. in suspensio reliquimus, an non hoc genus motuum ab alia causa, scilicet ab ἀνωμαλίᾳ, possit existere; ut, sicut ferrea tabella vim magnetis lingulae ferreae intercipit, sic planetarum corpora sibi mutuo etiam suas virtutes magneticas proprias, quibus ad Solem annunt, intercipient. Nam ne cum Solari virtute hoc fieret, ne inquam Solaris virtus, communis omnibus, interciperetur uni interjectu alterius, distinximus inter essentiam corporis Solaris et planetariorum. Cum igitur non distinxerimus inter corpora ipsorum planetarum, videtur hoc in causa relinqui. Neque sane expediri potuit, nisi deprehensa verissima dispositione magnetici corporis planetae, qua libratio administraretur.

Sed ut ratiocinationis sit exemplum: sit dispositio magnetica planetae, qualem paulo ante cum introduxissemus, postea de Tellure negavimus. In ea non habet locum impedimentum ab ἀνωμαλίᾳ. Nam quia virtutis magneticae effectus fuit, ad Solem tendere et a Sole fugere, interimque directas tenere fibras sedis magneticae; si ergo alius planeta, Solem inter et planetam interveniens, impedit hanc adnavigationem ad Solem vel fugam, non impedito communi motu ex Sole: minus igitur justo adnavigabit vel fugiet, et sic mutabitur circuitus amplitudo cum periodico tempore successu seculorum iterumque corrigetur contrariis eclipsationibus; at non transferetur aphelium ex hac quidem ἀνωμαλίᾳ. Igitur causa motus apheliorum a nobis prius allata adhuc sola regnat, sine socia vel aemula. At neque si mensurationi modo dicto praesideat, quicquam nocebit ἀνωμαλίᾳ. Uteretur enim

mens pro regula, ut dictum est, augendae Solis diametri angulo anomaliae coaequatae; et ejus sensu exiguum ad tempus privata, quippe tecto Sole, posset, si diis placet, compensare quod neglexisset, Sole rursum emergente et anomaliam coaequatam reducente in conspectum. Dominatur enim mens, si qua est, animali facultati, eaque alias etiam inaequaliter utitur pro re nata. Cur non igitur et hic ea extra ordinem uteretur ad tollendam hanc discrepantiam mensurae (anomaliae coaequatae) et mensurati (diametri Solis), quae per Solis eclipsin irrepserat? Quid quod etiam alii hujusmodi sunt tardi motus, ut aequinoctiorum praecessio, orta ex axis Telluris directione ad alias atque alias fixas, non ad Solem? ubi nihil efficere potest Solaris luminis aversio, cum nec ejusdem praesentia illam efficiat.

Itaque ut ἀντιπαρῶν magneticarum effugiamus incommoda etiam in propriis planetarum librationibus, non minus quam cap. XXXV. in communi raptu ex Sole, dicendum est, similia quidem esse posse planetarum corpora causa magneticae dispositionis, sed aut longius ab invicem remota, quam ut orbes virtutum planetarum coeant mutuo, aut fortiolem virtutem ex Sole emanantem (non minus illam, quae proprias planetarum virtutes in actum elicit, quam illam, quae illos in orbem rapit), quam ut objectu imbecillioris corpusculi impediri omnino possit, sed transire, ut lux per globum aqueum transit; aut tantae exilitatis esse corpora planetarum, ut nihil efficiant; nec Solem unquam ulli planetarum, qui a Sole movetur, ab alio planeta in solidum intercipi, quemadmodum Telluri Sol a Luna nunquam in solidum intercipitur. Nam etsi Lunae quidem totus Sol aliquot horis tegi potest, at Luna non libratur versus Solem, sed versus Terram, cujus aspectu ipsa privari nunquam potest, cum Lunam inter et Tellurem corpus nallum intersit.

Quodsi tamen alicui videtur plausibile, transpositum apogaeorum esse momentaneum, et ex hac causa eclipsati Solis oriri: dicat is, si placet, ne libratio sub eclipsin interrupta (dum planeta interim a Sole translatus est in alium angulum aliamque ejus fortitudinem) eclipsi finita subitum celeritatis intervallum admittat, ideo compensari hunc anguli saltum a planeta ipso, inclinatione axis tali facta ad Solem post eclipsin, qualis erat in principio eclipsis. Sic enim obtinebitur transpositus apheliorum, sed saltu factus, et durans plurimis annis eodem loco sub fixis, donec alia contingat planetae offuscatio. Illa vero prior causa transpositionis apheliorum, orta ex aberratione librationis a circuitu sub fixis, propter ἀντιπαρῶν alterius ab altero nexum, magis esset pro aequabili apogaeorum transpositione.

Denique neutra harum causarum valente, habeat mens animali instructa facultate, quae praeest constanti directioni axis magnetici, hoc etiam munus, inclinandi ejus successu seculorum. At nec ulla harum causarum nec adeo mente in universum stante acquiescamus in natura: quae cum alia omnia expedita dedit, tum etiam motus apheliorum luculentam occasionem ostendit.

Caput LVIII.

Quomodo stante libratione, capite LVI. demonstrata et inventa, possit tamen error admitti in praepostera librationis applicatione, qua iter planetae buccosum efficiatur.


Malo me Galatea petit, lasciva puella,
Et fugit ad salices, et se cupit ante videri.

Profecto verum hoc de natura cano ex ore Vergilii. Quo propius enim ad illam venit, hoc petulantiores ludos facit, hoc pluribus anfractibus sese ipsa comprehensuro jam jamque tenenti surripit: nec tamen invitare cessat ad se comprehendendam, quasi delectetur meis erroribus.

Quod toto hoc opere spectavi, ut physicam invenirem hypothesin, quae non tantum distantias efficeret observatis consentaneas, sed etiam aequationes itidem probas, quas hactenus ex vicaria capitis XVI. coacti sumus mutuari: idem per hanc etiam verissimam hypothesin tentans falsa methodo, rursus de rerum summa trepidare coepi. In linea

apsidum centris A, B scribantur aequales circuli GD, HK. Sitque AB eccentricitas circuli GD. Sit autem anomalia eccentrici, seu numerus graduum ejus, arcus GD vel HK, per aequipollentiam cap. III. Centro igitur K, diastemate KD, quod ipsi AB sit aequale, scribatur LDF epicyclus, qui secabit circulum GD in D per aequipollentiam cap. III. Ducatur AK et continuetur donec secet epicyclum in L, ut sit LD arcus similis anomaliae eccentrici GD vel HK. Et connectatur B cum D. Ex puncto vero D demittantur perpendiculares in GA, LA, quae sint DC, DE. Quare per hactenus cap. LVI. demonstrata, AE citra contraversiam erit justa distantia ad hanc anomaliā eccentrici, de qua quaeritur, quantum temporis in ea sit consumptum. Cumque ejus arcus sinus versus GC, sive post multiplicationem LE ablata a GA prodiderit distantiam AE justam: ex his indiciis persuadebar, terminum ipsius AE alterum quaerendum esse non in DC linea, quod verissimum tamen erat, sed in DB lineae puncto I: ut si centro A, diastemate AE, ducerem arcum EIF, qui secet DB in I. Esset igitur AI secundum hanc persuasionem justa distantia situ et longitudine; et IAG anomalia vere coaequata. Manifestum est autem, quod EIF arcus secet DC lineam loco superiori, scilicet in F, itaque anguli IAG et FAG differant quantitate IAF. Erravi igitur, usurpata linea AI pro AF. Errorem primum experientia deprehendi. Nam cum explorassem quantitatem areae DAG tam per distantias omnes, quam per areolam DAB, postea huic areae DAG in tempus conversae accommodassem angulum IAG non FAG: tunc in superiori semicirculi parte collegi per $5\frac{1}{2}'$ plus, in inferiori per $4'$ minus, quam dabat vicaria satis certa. Itaque dissentientibus aequationibus a vero, coepi rursus accusare verissimas has distantias AE et librationem planetae LE de crimine, cujus falsa mea methodus, quae I pro F spectabat, erat rea. Quid multis? Ipsa veritas et rerum natura repudiata et exulare jussa per posticum se furtim rursus recepit intro et sub habitu alieno a me recepta fuit. Missis inquam librationibus diametri LE, coepi revocare

Fig. 117.



ellipses, omnino existimans, me sic longe diversissimam a librationibus sequi hypothesin, cum plane coincident, ut capite sequente demonstrabitur: nisi quod, quae peccaveram prius in methodo, hac ratione fuerunt emendata, et F pro I, ita ut debuit, usurpatum. Argumentatio mea talis fuit, qualis cap. XLIX. L. et LVI. Circulus cap. XLIII. peccat excessu, ellipsis cap. XLV. peccat defectu. Et sunt excessus ille et hic defectus aequales. Inter circulum vero et ellipsin nihil mediat, nisi ellipsis alia. Ergo ellipsis est planetae iter; et lunula a semicirculo resecta habet dimidiam prioris latitudinem, scilicet 429.

Quodsi iter planetae esset ellipsis, satis patuit, non posse I pro F usurpari: quia, si hoc fit, iter planetae buccosum efficitur. *Sint enim angulis GBD, HAK aequales infra QBP, SAR: et centro R scribatur rursus epicyclus PT priori aequalis: et ex P, sectione epicycli cum eccentrico, perpendiculares in BQ, AR cadant PV, PM: et connectatur P cum B, et centro A, diastemate AM, arcus scribatur MN, secans PV in O, PB in N. Est igitur analogum superioribus, ut si pro F usurpemus I, jam pro O usurpemus N, putemusque AN, ut est justa distantia longitudine, sic et situ justam esse. Atqui puncta I, N et similia efficiunt iter planetae buccosum. Nam aequales sunt arcus GD et QP, et BD, BP ex communi centro ejectae secant resectam lunulam. Atqui DI et PN, latitudines lunulae, versus centrum extensae, sunt inaequales, et minor DI, major PN. Cum enim ED et MP sint aequales, et EDI, MPN recti, EI vero circulus major, utpote longiore radio AE, et MN circulus minor, utpote brevior radio AM: omnino major erit PN, minor DI. Exilior est igitur resecta lunula superius apud D, latior inferius apud P. At in ellipsi lunula haec aequalis est latitudinis in punctis aequaliter a G et Q apsidibus remotis. Patet igitur, viam buccosam esse; non igitur ellipsin, ac cum ellipsis praebeat justas aequationes, hanc igitur buccosam jure injustas praebere. Nec erat opus, aequationes ex ellipsi de novo computare. Sciebam ultro facturam officium. De distantibus tantummodo sollicitus eram, ne forte ex ellipsi desumptae negotium mihi facerent. At quamvis hoc accideret, paratum erat mihi latibulum, incertitudo 200 particularum in distantibus. Itaque ne hic quidem valde haesi. Multo vero maximus erat scrupulus, quod pene usque ad insaniam considerans et circumspiciens invenire non poteram, cur planeta, cui tanta cum probabilitate, tanto consensu observatarum distantiarum, libratio LE in diametro LK tribueretur, potius ire vellet ellipticam viam, aequationibus indicibus. O me ridiculum! perinde quasi libratio in diametro non possit esse via ad ellipsin. Itaque non parvo mihi constitit ista notitia, juxta librationem consistere ellipsin, ut sequenti capite patescet: ubi simul etiam demonstrabitur, nullam planetae relinqui figuram orbitae praeterquam perfecte ellipticam; conspirantibus rationibus a principiis physicis derivatis cum experientia observationum et hypotheseos vicariae hoc capite allegata.⁹⁷⁾*

Caput LIX.

Demonstratio, quod orbita Martis, librati in diametro epicycli, fiat perfecta ellipsis et quod area circuli metiatur summam distantiarum ellipticae circumferentiae punctorum.

Protheoremata.

I. Si intra circulum describatur ellipsis, tangens verticibus circulum in punctis oppositis, et per centrum et puncta contactuum ducatur diameter, deinde ex punctis circumferentiae circuli ducantur perpendiculares in hanc diametrum: eae omnes a circumferentia ellipseos secabuntur in eandem proportionem.

Ex libro I. Apollonii Conicorum pag. 21. demonstrat Commandinus in commentario super V. Sphaeroideon Archimedis.

Sit enim circulus AEC, in eo ellipsis ABC tangens circulum in A, C, et ducatur diameter per A, C puncta contactuum et per H centrum. Deinde ex punctis circumferentiae K, E descendant perpendiculares KL, EH, sectae in M, B a circumferentia ellipseos. Erit ut BH ad HE sic ML ad LK, et sic omnes aliae perpendiculares.

II. Area ellipsis sic inscriptae circulo et aream circuli habet proportionem eandem, quam dictae lineae.

Ut enim BH ad HE, sic area ellipseos ABC ad aream circuli AEC. Est quinta Sphaeroideon Archimedis.

III. Si a certo puncto diametri educantur lineae in sectiones ejusdem perpendicularis cum circuli et ellipseos circumferentia, spatia ab iis rescissa rursus erunt in proportionem sectae perpendicularis.


Sit N punctum diametri, et KML perpendicularis; connectantur signa K, M cum N. Dico, ut ML ad LK seu (per I.) ut BH ad HE semidiameter brevior ad longiorem, sic esse aream AMN ad AKN. Est enim AML area ad AKL aream ut ML ad LK, per assumpta Archimedis ad pr. V. Sphaeroideon, quas Commandinus in commentariis ad hanc propositionem literis C, D demonstrat. Triangulorum vero rectangulorum NLM, NLK altitudo NL est eadem, et bases LM, LK; igitur et MLN ad KLN est ut ML ad LK. Per compositionem igitur tota area AMN ad totam AKN est ut ML ad LK. Quod erat demonstrandum.

IV. Circulo per huiusmodi perpendiculares quotcunque in aequales arcus diviso, ellipsis in arcus inaequales dividitur; et qui sunt apud vertices, maxima utuntur proportionem; qui locis mediis, minima.

Nam circa vertices arcuum proportio proxima est proportioni sectarum perpendicularium, quibus sese proxime accommodant secundum longitudinem, minor tamen. Circa locos medios proxime fiunt aequales; minor tamen arcus ellipticus, quia minus curvatus quam circularis. Per se patet.

V. Tota elliptica circumferentia est proxime medium arithmeticum inter circulum diametri longioris et circulum diametri brevioris.

Fig. 118.



Probatum enim est supra cap. XLVIII, longiorem esse circumferentia ea, cujus diameter est medium proportionale inter diametros ellipseos, ut cujus circuli area (Arch. Sphaer. VII) aequat aream ellipseos. Sed et medium arithmeticum est longius medio proportionali. Proxime ergo aequalia sunt ista.

VI. Quadratorum proportionaliter divisorum gnomones sunt ad invicem ut quadrata.

Sint duo quadrata PL et SH. Horum latera KL, EH divisa sint proportionaliter in punctis M, B. Scribantur gnomones KOQ et CRE. Ergo quia ML ad LK sic est ut BH ad HE; erit etiam OL ad LP ut RH ad HS. Sed gnomones sunt quadratorum differentiae. Ergo etiam ut LP ad suum gnomonem, sic HS ad suum: et permutatim, ut PL ad HS sic gnomon KOQ ad gnomonem CRE.

VII. Si a termino semidiametri brevioris in circumferentia ellipsis extendatur linea aequalis semidiametro longiori, sic ut terminetur in ipsa semidiametro longiore: quae inter punctum hoc et inter centrum interjacet, potest gnomonem, quem quadratum semidiametri longioris circumponit quadrato semidiametri brevioris.

A brevioris semidiametri HB termino B extendatur recta BN, aequalis semidiametro longiori AH. Dico HN posse gnomonem ERC, hoc est, esse medium proportionale inter EB et residuum diametri circuli. Demonstratum est supra cap. XLVI. Sed hic facilius et expeditius demonstratur in puro casu. Gnomon enim est differentia quadratorum BH et HE vel HA, per VI. horum. Sed et potentia ipsius HN est differentia quadratorum BH et BN, hoc est HE sive AH (Eucl. I, 46). Ergo aequale est quadratum HN gnomoni ERC. Quod erat demonstrandum.

VIII. Si circulus dividatur in quocunque seu infinitas partes, et puncta divisionum connectantur cum puncto aliquo praeter centrum, intra complexum circuli, connectantur item cum centro: summa earum, quae ex centro, minor erit summa earum, quae ex alio puncto.

Et binae lineae, proximae lineae apsidum, ductae in opposita ex puncto eccentrico, proxime erunt aequales duabus ex centro in opposita ductis; binae vero in locis intermediis multo majores erunt iis, quae ex centro educuntur eodem.

Demonstratum est cap. XL. Itaque excessus iste non crescit aequaliter cum numero linearum, multo minus cum sinus. Horum enim differentiae in fine evanescunt; excessuum vero dictorum differentiae in fine sunt maximae. Ac cum area circuli KNA crescat aequaliter, parte quidem KHA cum numero linearum, ex constructione, parte vero KNH cum sinus arcuum, ad quos sunt lineae, in HN multiplicatis, per cap. XL: area igitur circuli non est apta ad mensuram summae distantiarum suae circumferentiae.

IX. Si autem pro lineis ex puncto eccentrico sumantur lineae illae, quae determinantur a perpendicularibus ex illo puncto in eas quae per centrum eunt demissis; hoc est, si sumantur distantiae diametrales pro circumferentialibus, ut cap. XXXIX. et LVII. denominatae sunt: tunc summa aequat summam earum, quae ex centro ducuntur.

Eligatur enim quodcunque punctum circumferentiae circuli, quod jam sit K, et ex K per H recta ducatur in partem circumferentiae oppositam I, ex N vero cadat perpendicularis in KI, quae sit NT. Tunc KH, HI

junctas aequant KT, TI junctas. Et aliqua summa copularum KH, HI aequat aequalem summam copularum KT, TI. Cum autem summa linearum AN, KN, quotquot inveniuntur in AK ad partes ejus aequales, crescat partim cum numero linearum HA, HK, partim cum sinubus in HN multiplicatis, crescit igitur aequaliter cum area KNA, per praemissam. Igitur area circuli et partes KNA metiuntur summas distantiarum diametralium.

Distantiarum ex puncto eccentrico ellipsis in aequales arcus ellipsis eductarum non minus quam circuli in protheoremate VIII. ratio est contrarietati mutuae arcuum circuli et ellipsis, protheoremate IV. explicatae. Nam binae ex puncto eccentrico in contraria eductae excedunt binas ex centro in contraria eductas in minima proportionem, et plane nihil circa apsidas: at in longitudinibus mediis excedunt illas maxima proportionem.

Apparet cap. XL. Rursum igitur, ut protheoremate VIII, area ellipsis non est apta ad mensuram summam distantiarum aequalium arcuum suae ellipticae circumferentiae.

XI. His sic praestatis jam demonstrationem expediam. Si in ellipsi, perpendicularibus ab aequalibus circuli arcubus demissis divisa, ut supra protheoremate IV. connectantur puncta divisionum circuli et ellipsis cum puncto, non inventum est protheoremate VII: dico, eas, quae ducuntur in circuli circumferentiam, esse circumferentiales; quae vero in ellipsis circumferentiam, esse diametrales: quae constituuntur ad aequalem graduum ab apside epicycli numerum.

Ex I puncto, ipsi K ex centro H opposito, in AC perpendicularis cadat IV, secans ellipticam circumferentiam in Y. Et ex puncto N, protheoremate VII. invento, ducantur in K, M, et in I, Y sectiones, ab eadem utrinque perpendiculari factae, lineae NK, NM, sic NI, NY. Reputatur etiam schema cap. XXXIX. et LVII. sitque semidiameter epicycli $\beta\gamma$ aequalis eccentricitati HN; et $\gamma\delta$ arcus, a γ apside inceptus, sit similis ipsi AK ab apside incepto: et $\alpha\beta$ aequet semidiametrum HA. Dico NK esse circumferentialem $\alpha\delta$ (demonstratum est cap. II.) et NM esse diametralem $\alpha\alpha$.

Primum KN potest KL et LN; sic MN potest ML et LN. Sit LP potentia ipsius LK, et LO potentia ipsius LM. Ablata igitur potentia LN et potentia LM, hoc est quadrato LO, utrinque communibus, relinquitur gnomon KOQ, quo excedit potentia KN potentiam seu quadratum ipsius MN. Jam ut KL ad EH, sic KM ad EB, per primum horum. Ergo etiam ut KQ, potentia ipsius KL, ad EC, potentiam ipsius EH, sic gnomon KOQ ad gnomonem ERC, per VI. horum. Atqui ut hic in circulo eccentrico KL, sinus arcus AK, ad EH vel AH, sinum totum, sic etiam in epicyclo, perpendicularis $\delta\alpha$ (ex δ puncto arcus $\gamma\delta$, qui est ipsi AK similis, in diametrum apsidum γ) est ad semidiametrum epicycli $\beta\gamma$. Quare etiam ut gnomon KOQ ad gnomonem ERC, sic quadratum $\delta\alpha$ ad quadratum $\beta\gamma$. Sed ipsi $\beta\gamma$ aequalis est HN, et potentia HN

Fig. 118.





Fig. 119.



aequat gnomonem ERC, per VII. Ergo et potentia $\beta\gamma$ aequat gnomonem ERC: ac proinde potentia $\delta\alpha$, perpendicularis ex modo dicto apicycli puncto, aequabit gnomonem KOQ. Sed illius perpendicularis $\delta\alpha$ potentia est excessus ipsius $\delta\alpha$ circumferentialis super $\alpha\alpha$ diametralem, ergo et gnomon KOQ, aequalis illi, est excessus quadrati $\delta\alpha$ super quadratum $\alpha\alpha$. Sed KN est aequalis ipsi $\delta\alpha$. Ergo KN excedit ipsam $\alpha\alpha$ gnomone KOQ. Eodem vero gnomone excedit et quadratum MN. Ergo MN et $\alpha\alpha$ diametrales sunt aequales. Quod erat demonstrandum. Similiter etiam KN demonstrabitur, quod aequet ipsam $\alpha\mu$, siquidem $\zeta\eta$ similis sit $\alpha\mu$. Et sic de omnibus.⁹⁸⁾

XII. Porro indidem etiam hoc patet, quod area circuli, et focaliter et per partes singulas, sit mensura genuina summae linearum, quibus distant arcus elliptici itineris planetarii a centro Solis.

Nam per IX. horum, si totius circuli area aequiparatur diametralibus distantibus omnibus omnium arcuum susceptae divisionis: partes areae illius ut KNA, terminatae ad N punctum, unde consurgit eccentricitas, aequiparantur illis distantibus diametralibus, quae competunt arcui KA aream illam complexo. Per XI. vero his praemissam diametrales distantiae KT, TI, hoc est $\alpha\alpha$, $\mu\alpha$ per cap. XL, sunt eadem cum distantibus MN, NY, punctorum ellipsis M, Y. Ergo ut area circuli ad summam distantiarum ellipsis, sic pars areae circuli KNA, terminata ad N punctum, unde consurgit eccentricitas, ad summam illarum ellipsis distantiarum, quae competunt arcui elliptico AM, totidem graduum, quot habet arcus circuli AK aream complexus.

XIII. Oritur vero hic dubitatio: Si area AKN aequivalet distantibus omnibus ab N arcus elliptici AM punctorum totidem, quot ponimus inesse AK: quinam ergo sit ille arcus ellipticus, hoc est ubi terminetur? Nam videtur ille non terminari debere per lineam KL perpendicularem. Causa haec est, quia hoc pacto per IV. horum elliptici arcus inaequales respondent aequalibus circuli; itaque minores arcus sunt circa A, C vertices, majores circa B. Atqui videtur necesse esse, ut aequales orbitae ellipticae arcus sumantur, siquidem moras planetae in illis aestimare et comparare velimus. Et nominatim, quia certum est, finem hujus arcus debere distare ab N longitudine MN, igitur ut cap. LVIII. centro N, spatio NM, arcus MZ ductus, ostendit alicubi punctum, terminans illum arcum ellipsis, et videtur id punctum futurum non M, sed Z, quo secatur arcus lineam KH, ut sit arcus ille orbitae AZ.

Respondetur, omnino arcum ellipseos, cujus moras metitur area AKN, debere in partes inaequales dividi, et minores esse eas, quae sunt vicinae apsidibus.

Esto enim, ut ipsum planetae iter ABC dividatur in arcus aequales. Quia igitur planeta in arcu A tanto versatur longius quam in C, quanto NA longior est quam NC; utraque vero NA et NC aequant junctae diametrum ellipsis longiorem, et HB est semidiameter ellipsis brevior: brevior etiam erit⁹⁹⁾ mora planetae in arcu ad B et opposito arcu junctim, quam in arcubus aequalibus A et C junctim. Ut ergo mora circa A et C fiat brevior, circa B et oppositum longior, et sic semper binorum oppositorum arcuum junctae morae fiant aequales: oportet arcus apud A et C fieri minores, apud B et oppositum majores. Id autem fit per KML perpendiculares, ut patet ex ipsa objectione.

Sed hac solutione id tantum obtinuimus, ut certum esset, circa A, C breviculos arcus esse debere. Utrum autem hi ipsi arcus, per KML perpendiculares determinati, sint justissimi illi arcus, nondum constat. Jam autem patebit in hunc modum.

XIV. Si quis ellipsin AMC in arcus quocunque aequales divideret, iisque singulis suas ab N distantias assignaret, pro summis vero distantiarum in AM, AB, ABC usurparet areas AMN, ABN, ABCNA: ei per X. protheorema accideret error idem, qui supra cap. XL. accidit, cum hoc ipsum tentaremus in circulo perfecto, quod hic tentari ponitur in ellipsi: ut scilicet duae MN, NY, duorum punctorum Y, M ex centro H oppositorum, censerentur pro MHY breviori.

Si vero idem ille divideret ellipsin AMC in arcus totidem inaequales, contra quam protheoremate X, hac lege, ut diviso primum circulo AKC in arcus aequales, postea a singulorum arcuum terminis ducerentur in AC perpendiculares KL, secantes ellipsin AM etiam in arcus, atque pro horum arcuum distantis ab N usurparetur area elliptica: tunc errori commisso medicina afferetur et compensatio perfectissima.

Id probabo de iniis quadrantum A et C; de finibus eorum B; et progressu intermedio.

In principiis quadrantum A, C, si usurpentur duae lineae NA, NC pro linea AHC, error nullus est; in fine vero, si pro BN, hoc est pro EH, usurpem BH, error seu defectus contingit maximus, quantitate BE: per X. protheorema. Et per VII. protheorema hujus capitis, ut HE ad EB, sic debita longitudo ad errorem, qui hoc loco committitur. Si ergo tota summa omnium distantiarum accipit mensuram, peccantem in defectu, aream scilicet ellipseos: tunc distributo defectu in distantias singulas, per vim operationis seu computationis nostrae, fiet, ut NA, NC nimis breves accipiantur respectu hujus mensurae omnium, quae nobis mentitur, omnes lineas aequaliter in defectu peccare; cum tamen NA, NC non peccent. Justum quidem modulum in summam hanc contulerunt: at summae distributione vicissim facta non justum receperunt, quia summam aliae lineae circa B defraudaverunt.

Vide nunc, quomodo huic errori eadem in proportionem medeamur.

Nam per IV. protheorema hujus capitis arcus minimi AK, AM circa apsidas A vel C sunt in proportionem ipsius KL ad LM, hoc est ipsius EH ad HB; qua eadem in proportionem peccabant prius in defectu lineae rectae circa B. Et vicissim circa B arcus minimi circuli et ellipsis, puta KE et MB aequantur; quemadmodum prius lineae rectae AN, NC junctae aequabantur lineae AHC. Itaque ut prius in negotio rectorum, sic jam in negotio arcuum, cogitata media et aequabili arcuum mensura, erit illius respectu parvus arcus apud A vel C apsidas, longus apud B medias longitudines. Atque sic, ubi nimis breves distantiae respectu suae vitiosae summae, in peccante area ellipsis propositae, ibi parvi arcus respectu suae mediocritatis, ut in A, C, et ubi nimis longae distantiae, ibi nimis longi arcus, ut in B. Itaque quanto minus morae nobis in calculo accumulatur per breviculam distantiam circa apsidas, tanto plures distantiae adhibentur tali arcui, utpote in parvas partes secto, et cuilibet tali parti distantia sua assignata; et vicissim quanto plus morae per singulas distantias nobis in calculo supra debitum accumulatur circa longitudo medias B, dum partem defectus, qui huic loco inest, transscripsimus.

apsidibus A, C innocentibus: tanto pauciores calculus colligit distantias, utpote a magnis arcus partibus emendicatas. Illic in A, C, quod singulae non possunt distantiae, ob brevitatem in calculo, id crebritate praestant, ut justas moras accumularent: hic, quod longitudine, quam in calculo sunt nactae, peccarent, id latius et laxius dispersis rursum eripitur.

Dixi de initio et fine, quod eadem proportione, quae est AE ad HB , incipiant differre et arcus circuli ab ellipse in A et C, et distantiae justae, ab iis, quas area ellipsis colligit, et opposito, eadem etiam proportione desinant differre, nimirum proportionem aequalitatis, arcus eodem in B, E, distantiae vero in A, C.

Dicendum nunc est idem etiam de progressu intermedio.

Etenim lineae NA, NC a parvis initiis per celeria incrementa superant aliquo notabili lineas AHC; et vicinam, ubi maxime superant, ut BN ipsam HB, ibi incrementa sensim emoriuntur: in medio sunt maxima, circa anomaliam eccentrici 45° . Patet id quadamtenus ex aequationis angulo et secantibus. Quantum enim secans anguli aequationis optice differt a sinu toto, tantumdem fere differt BN a BH, oppositis aequationum se mutuo ad hanc proportionem adjuvantibus. Atqui incrementa secantium aequationis opticae circa 45° sunt fere maxima; initio et fine quadrantis tarta. Vide de his finem cap. XLIII. Atque eadem in proportione progrediuntur etiam incrementa arcuum ellipticorum perpendicularibus KL distinctorum. Nam in principiis A, C arcus AK, semper ab A inceptus, ad incrementum suum est, ut AE ad KM . Sed ipse arcus totus parvus, igitur parvum et incrementum. In fine, circa B, proportio AE ad AB fere ad aequalitatem redigitur, etsi magnus est arcus AB, utpote vicinus quadranti: ut ita rursum parvum sit incrementum. In medio igitur circa 45° evidentissimum est incrementum arcuum.

Patet igitur, etiam in progressu aequales esse rationes, quantum subtili consideratione liceat inquirere.

Demonstratio ut certissima ita $\acute{\alpha}\nu\epsilon\tau\epsilon\gamma\sigma$ est et $\acute{\alpha}\nu\epsilon\omega\mu\epsilon\tau\epsilon\gamma\sigma$, quantum quidem attinet hanc partem, de progressu intermediorum augmentorum. Cuperem, ut cetera, sic hanc quoque particulam geometricae et $\acute{\alpha}\nu\epsilon\tau\epsilon\gamma\sigma$ expediri; sic ut etiam Apolloniis satisfaciat. Interim dum alius quispiam hanc invenerit et adornaverit, oportet nos hac esse contentos.

XV. Sed pertexamus demonstrationem, arcum ellipseos, cujus moras metitur area AKN, debere terminari in LK, ut sit AM.

Hactenus enim versamur in hac fictione, si quis tantum abundaret otio, ut aream ellipseos vellet computare, futurum esse, ut area ellipseos AMN usus loco distantiarum ipsius AM totidem, quot sunt in AK arcus aequales, non sit a scopo aberraturus. Haec sit nobis instar propositionis majoris hactenus demonstratae.

Minorem jam subjungam ex protheoremate III, in quo ostensum est, uti area AKC se habet ad aream AMC, sic etiam esse aream AKN ad aream AMN. Concluditur igitur, cum aequemultiplicium proportio sit eadem, ipsam etiam aream circuli AKN metiri summam distantiarum diametralium (ut KT, TI) seu ellipticarum ipsius AM totidem, quot sunt partes in AK. Unde patet, recte partibus ellipseos circa A, C confertiores tribui distantias, totidem nempe, quot constituuntur in ea sectiones per perpendiculares KL, ab aequalibus arcibus ipsius AK venientes.

Ne quis de veritate rei dubitet, diffusus subtilitati et perplexitati argu-

mentationis, res ipsa prius innotuit per experientiam in hunc modum. Constitui ad singulos gradus anomaliae eccentrici pro distantis ab N lineas KT, TI diametrales. Singulas etiam ordine ad summam priorum adjeci. Collectis omnibus summa fuit 36000000, ut par est. Comparatis igitur singulis summis cum totali, ut (in regula proportionum) summa 36000000 sic esset ad 360° (nomen artificiale temporis totius restitutorii) ut summae singulae ad suas significatas moras: praecisissime prodiit idem, in secundis etiam scrupulis, quod prodibat, si dimidiam eccentricitatem in sinum anomaliae eccentrici multiplicassem, et cum area circuli, quae valeret itidem 360° (nomen artificiale temporis restitutorii), comparassem. Deinde, cum essem in ea opinione, justam distantiam NM applicandam esse lineae KH, ut esset ZN, itaque anomaliam coaequatam ZNA inquisivissem, attribuens eam anomaliae mediae AKN: manifeste dissenserunt aequationes a mea hypothesei vicaria cap. XVI. eratque circa 45° coaequatae excessus a vero, per experientiam observationum invento, $5\frac{1}{2}'$ defectus; circa 135° circiter $4'$. At AM sic applicata, ut in KL terminaretur, tunc MNA coaequata applicata mediae anomaliae AKN, exquisitissime cum vicaria, hoc est cum observationibus consensit. Cum igitur constaret de re ipsa, postea impulsus sum ad inquirendam ex principiis semel susceptis ipsam etiam causam rei, quam hoc capite, quam potuit fieri artificiosissime et clarissime, lectori detexi. Quod, nisi causae physicae, initio a me susceptae loco principiorum, probae essent, nunquam in tanta subtilitate inquisitionis consistere potuissent.

Si quis putat, obscuritatem hujus disputationis ex mei ingenii perplexitate oriri: ei ego culpam hanc hactenus fatebor, quod haec intacta relinquere noluerim, quantumvis obscurissima nec valde necessaria ad astrologiae exercitium, quem unicum finem plerique statuunt hujus philosophiae coelestis. Ceterum quod materiam attinet, rogo hujusmodi aliquem, ut Apollonii Conica legat. Videbit, esse quasdam materias, quae nulla ingenii felicitate ita tradi possint, ut cursoria lectione comprehendantur. Meditatione opus est et creberrima ruminatione dictorum.

Caput LX.

Methodus, ex hac physica, hoc est genuina et verissima hypothesei extruendi utramque partem aequationis et distantias genuinas; quorum utrumque simul per vicariam fieri hactenus non potuit: argumentum falsae hypotheseos.

Quia capitibus LVI. LVIII. LIX. planeta in diametro, versus Solem extensa, ponitur ad Solem accedere et ab eo recedere, et per hoc facere orbitam ellipticam; in singulis vero punctis orbitae tantas facere moras, quanta est distantia illius puncti a Sole: opportunissimum nobis accidit compendium cap. LIX. praemissi, ad summam aliquot morarum subito colligendam. Ostensum enim est, demissa ex circulo perpendiculari in diametrum longiorem ellipsis in circulo descriptae (sit in priori schemate KL demissa in AC), sic ut secet ellipsin in M, et posito Sole in N, summam omnium distantiarum a Sole N punctorum in arcu AM inesse in area AKN.

Posito igitur arcu ellipseos AM, qui denominationem habet ab arcu

circuli AK, datur area AHK, sector arcus AK, a quo arcu et mensuratur sector iste in ea mensura, in qua tota circuli area est 360° . Et quia datur arcus AK, datur et sinus KL. Ut vero KL ad EH sinum totum, sic HKN area ad HEN aream, ut demonstratum cap. XL. Cum igitur detur HN eccentricitas, dimidium ejus in HE ductum describet aream HEN, cujus valor semel statim initio inquiritur, ut sciatur, si tota area circuli valeat tempus 360° , quid haec valeat areola. Semel itaque cognita area HEN, facillimum est inquirere per regulam proportionum aream HKN. Ut enim EH ad KL, sic NEH ad NKH aream, sive ejus valorem in gradibus, minutis et secundis; quae addita ad valorem KHA constituunt KNA mensuram temporis, quod planeta conficit in AM.⁽¹⁰⁰⁾ Haec igitur est una pars aequationis, quam dico (a) physicam, sc. area AKN; etsi tabulas sic adorno, ut aequationis mentione non sit opus, nec separata columna sit, quae partem aequationis (b) opticam, id est, angulum NKH exhibet. Mihi magis familiares erunt termini anomaliae mediae, anomaliae eccentrici, anomaliae coaequatae. (c) Anomalia media est tempus artificiose denominatum ejusque mensura area AKN. (d) Anomalia eccentrici est iter planetae ab apogaeo, arcus sc. AM ellipseos, ejusque denominator, arcus AK. (e) Anomalia coaequata est apparentia arcus AK quasi ex N, scilicet angulus ANK (v. s. pag. 122).

Igitur angulus anomaliae coaequatae sic habetur. *Dato arcu AK, datur sinus complementi LH. Ut autem totus ad LH, sic tota eccentricitas ad portionem addendam ad 100000 (vel infra 90° subtrahendam), ut habeatur genuina distantia Martis a Sole, scilicet NM. In triangulo igitur MLN angulus ad L rectus est, et MN data, et LN quoque data. Componitur enim ex LH sinu complementi AK distantiae ab apogaeo seu anomaliae eccentrici, et ex HN eccentricitate. Infra 90° pro summa LH, HN sumenda est earum differentia, et pro complemento anomaliae eccentrici, excessus ejus. Non latebit igitur angulus LNM anomaliae coaequatae.⁽¹⁰¹⁾ Hic facile quivis colligit, quid in altero semicirculo sit mutandum. Vicissim, data eccentricitate et coaequata, datur anomalia eccentrici: paulo quidem laboriosius, sive demonstrative procedamus sive per analysin. Demonstrative hac methodo investigari potest, scilicet per mensuram anguli, quo angulo KM, ingressus planetae a K quolibet puncto circuli, quasi ex centro Solis N spectatur. Constat ea methodus ex aliquot protheorematibus.*

I. Lineolae ingressus planetae ad diametrum apsidum crescunt in proportionem sinuum anomaliae eccentrici.

Ut enim EH ad KL, sic EB ad KM. Receptum est cap. LIX. et demonstratum in Conicis.

II. Connexis terminis lineolae unius cum centro, et posito, quod lineola maneat eadem quantitate apud omnia puncta eccentrici, tangens anguli ad centrum decrescit fere in proportionem sinuum complementi anomaliae eccentrici.

Sit (Fig. 120) DF lineola pars DV sinus recti anomaliae eccentrici AD. Connectantur termini D, F cum H, et HF continuetur, et tangat recta ED circum in D, secans HF in E. Cum ergo DVH sit rectus, erit VDH complementum ipsius VHD anomaliae eccentrici ad rectum. Ac cum et EDH sit rectus, erit HED minor quam rectus quantitate EHD, quae pen nullius est momenti, cum ubi maxima non superet $8'$. Ac eadem de

planetae justus, et I cum N connectatur. Quia ergo ut VD ad DF, sic XG ad GI (per I.); ut vero VD ad DH, sic XG ad GN, propter similitudinem triangulorum: ut igitur FD ad DH, sic IG ad GN, et sunt aequales FDH et IGN. Aequales igitur etiam FHD et ING. Et H est centrum eccentrici, N vero centrum Solis. Angulus igitur &c. q. e. d.

V. Anguli, quo coaequata fictitia, quae circulo nititur, differt a coaequata vera, quae ellipsi innititur, mensura genuina et verissima est rectangulum sub sinu anomaliae coaequatae fictitiae et sinu complementi anomaliae coaequatae verae.

In schemate eodem, multiplicato sinu anguli AHD in sinum anguli VFH, proditura erat genuina mensura anguli FHD per III. At per IV. angulorum VHD et XNG aequatum sinus est idem, itemque et VFH, XIN sinus idem. Ergo multiplicato sinu anguli XNG, anomaliae coaequatae fictitiae, in sinum anguli XIN complementi ipsius XNI, qui est coaequata vera, prodit mensura genuina anguli FHD; hoc est per IV. anguli ING, differentiae inter XNG et XNI.

Corollarium. Quia parva est differentia ING, et nusquam major 8', adhuc minor in futura est differentia inter rectangula per XIN per XGN sinum constituta.

Hinc praxis fiet ista. Dato angulo anomaliae coaequatae verae, multiplicetur ejus sinus in sinum complementi. Facti duplum, abjectis 5 ultimis, multiplicetur in maximum ingressus angulum ad anomaliam 45°. Prodit angulus ingressus ad datam anomaliam. Qui additus ad coaequatam veram XNI, dat fictitiam XNG. Per quem angulum et latera NH, HG nota invenitur AHG anomalia eccentrici, et HGN valor trianguli, ut hactenus.

Maximum vero angulum ad anomaliam 45° inquirere non est difficile. Sit VHD 45°. Ergo ut totus sinus ad 70711, sic 429 vel correctus 432 maximus ingressus, videlicet maxima latitudo lunulae, ad FD 315. Cumque jam in 45° sint aequales HV, VD; aufer FD 315 ab VD 70711, remanet VF, 70396, quae cum HV dat angulum VHF 44° 52' 19", qui differt a 45° 0' 0" tantum per 7' 41". Atque hic est maximus angulus ING. ⁽¹⁰²⁾

Sequitur alter modus per analysin, cujus haec fundamenta sunt. In schemate 118. dato angulo MNL, datur proportio linearum MN, NL: et scio, quod MN et LN sint compositae ex partibus notae et permutatae proportionis. Nam in MN inest sinus totus, notus; in LN inest HN, eccentricitas nota. Residuum de MN ad residuum de LN, hoc est ad LH, eam habet proportionem, quam habet eccentricitas HN ad sinum totum. (Vide, si mavis, etiam schema 117.) Ergo sit MN 100000 + 1 R, LN ex angulo MNL 30° sit $\frac{8640300000 + 86603}{100000}$ R, et NH 9265 vel $\frac{926500000}{100000}$, ut sit HL $\frac{7733800000 + 86603}{100000}$ R. Ut vero HN 9265 ad 1 R, sic 100000 ad LH. Igitur HL secunda vice est $\frac{100000}{9265}$ R id est $\frac{1079320}{10000}$ R; prius $\frac{7733800000 + 86603}{100000}$ R. Ablatis denominatoribus, et quae possunt utrinque aequaliter auferri, restant 992717 R, aequales numero 7733800000. Itaque una radix valet 7744, estque MN 107744. Et quia ut HN ad hanc radicem, sic totus ad LH, erit igitur LH 83583, sinus ipsius KE 56° 42' complementi anomaliae eccentrici AK 33° 46'. ⁽¹⁰¹⁾ Quae inuenta, jam ut paulo prius invenitur et area AKN, mensura temporis seu anomalia

media. In schemate 117 sunt ista clarissima. Sit GQ eccentricus, GD vel LD, anomalia eccentrici, FAC coaequata, FA vel distantia. Ut igitur AK ad AB, sic BC ad KE: et in CAO coaequata, ut AR ad AB, sic BV ad RM. Igitur EK vel RM ponitur esse una radix. Cetera ut supra.

At data anomalia media, nulla geometrica methodus est, perveniendi ad coaequatam, videlicet ad anomalam eccentrici. Nam anomalia media est composita ex duabus areae partibus, sectore et triangulo: quorum ille quidem numeratur ab area eccentrici, hoc ab ejus arcus sinu, in valorem trianguli maximi multiplicato resectis ultimis. At proportionales inter arcus et eorum sinus infinitae sunt numero. Itaque summa utriusque proposita, dici non potest, quantus sit arcus, quantus ejus sinus respondeat huic summae, nisi prius exploremus, dato arcu quanta evadat area: hoc est nisi tabulas construxeris et ex iis postea opereris.

Haec est mea sententia. Quae quo minus habere videbitur geometricae pulchritudinis, hoc magis adhortor geometras, ut mihi solvant hoc problema:

Data area partis semicirculi, datoque puncto diametri, invenire arcum et angulum ad illud punctum, cujus anguli conribus et quo arcu data area comprehenditur. Vel: Aream semicirculi ex quocunque puncto diametri in data ratione secare.

Mihi sufficit credere, solvi a priori non posse, propter arcus et sinus *incomparabiles*. Erranti mihi quicumque viam monstraverit, is erit mihi magnus Apollonius. ¹⁰⁴)

COMMENTARIORUM
DE MOTIBUS STELLAE MARTIS

PARS QUINTA.

DE LATITUDINE.

Caput LXI.

Examen loci nodorum.

Proportione orbium Martis et Terrae, eccentricitate utriusque, et figurarum in superioribus certissime inventis, jam facile est nobis illa, quae supra cap. XI. XII. XIII. XIV. crassiori Minerva indagavimus, hic perficere.

Incipiamus a nodis. Anno 1593. d. 10. Dec., vesperi h. 7. 0' visus fuit Mars in $4^{\circ} 44'$ γ , cum lat. $0^{\circ} 1' 15''$ mer., sine consideratione parallaxis; altitudo vero $35^{\circ} 2'$, immunis ab refractionibus. Post dies 687 integrae revolutionis Martis, die 28. Oct. anni 1595. h. 11. 30' post mer. inventus est Mars in altitudine 51° in $18^{\circ} 35'$ γ , cum lat. $4\frac{1}{2}'$ meridiana, sine parallaxis consideratione. Et rursum 687 diebus ante, sc. 1592. d. 23. Jan. vesperi, h. 10. habuit rursum latitudinem meridianam $2'$, altus 25° . Denique subtractis aliis 687 diebus, ut perveniamus in 7. Martii anni 1590, Mars die 4. Martii h. 7. in alt. 14° visus est habere latitudinem $3' 20''$ merid., quae major erat apparitura, nisi Mars in hac humilitate refracte nimisque alte apparuisset. Nam refractionis hujus altitudinis est $3\frac{1}{2}'$, de quibus circiter $2'$ cedunt latitudini, ut fuerit visa mer. lat. $5'$. Cum autem triduo anticipemus diem correspondentem ceteris, hoc quidem spatio temporis accessu ad nodum per $1\frac{1}{2}^{\circ}$, deteruntur $3'$ de inclinatione, sed quae in latitudinem conversa paulo quid minus efficiunt, ut ita restent die 7. Martii $2\frac{1}{2}'$ latitudinis et forte minus aliquid, si refractionis minor fuerit; nec enim constantissima est ejus quantitas.

Esto latitudo anno 1590. $1'$, anno 1592. $1\frac{1}{2}'$, anno 1593. $2\frac{1}{2}'$, anno 1595. ad h. 11: $4\frac{1}{2}'$, ut hinc inde unius minuti peccatum fateamur in partes contrarias. Ostendetur hisce latitudinibus nobis inclinatio $1\frac{1}{2}'$, quae poscunt sibi circiter $40'$ distantiae a nodo. Haec solummodo consensus causa. Sed accuratius efficiemus quod volumus, per annum 1595. Nam cum 28. Oct. h. 12. fuisset lat. $4\frac{1}{2}'$ merid., sequenti 3. Nov. hora eadem post dies 6; fuit latitudo $19' 45''$ bor. Igitur diebus 6 mutata est lati-

tudo per 24', dietim igitur per 4'. Cumque 28. Ost. h. 12. fuerit eccentricus locus $16^{\circ} 8\frac{1}{2}' \text{ } \gamma$, et $4\frac{1}{2}'$ residua latitudinis conficiantur die uno et octava parte, post quod tempus accedunt Marti 37': erit igitur nodus in $16^{\circ} 45\frac{2}{3}' \text{ } \gamma$, anno 1595. Novembris initio.

Circa nōdum alterum non ita crebrae fuerunt observationes. Sustinebit igitur solus annus 1589. fidem hujus operationis. Cum enim anno 1589. d. 6. Maji Mars habuerit boream latitudinem $6\frac{2}{3}'$, confecit illa, ex analogia motus latitudinis ad dies praecedentes, diebus $2\frac{1}{3}$, Maji 8. hora 20: quando invenitur locus ejus eccentricus $16^{\circ} 42' \text{ } \eta$, qui esset anno 1595. $16^{\circ} 47' \text{ } \eta$, nodi descendentis, eum prius invenimus ascendentem in $16^{\circ} 45\frac{2}{3}' \text{ } \gamma$. Nodi igitur anno 1595 complete sunt in $16^{\circ} 46\frac{1}{3}' \text{ } \gamma \text{ } \eta$.

Caput LXII.

Examen inclinationis planorum.

Anno 1593. d. 25. Aug. h. 17. 27', visus est Mars Soli oppositus in $12^{\circ} 16' \text{ } \chi$. Die 28. fuit latitudo $6^{\circ} 7' 30''$. Die 24. fuit $6^{\circ} 5' 30''$. Die 29. fuit $5^{\circ} 52' 15''$. Igitur diebus 5 decrevit latitudo per $13' 15''$. Sed die uno ante oppositionem per 2'. Ad hanc igitur analogiam, si die et hora oppositionis ponatur latitudo $6^{\circ} 2' 30''$ non dimidii scrupuli error erit.

Observatae sunt hae latitudines in altitudine Martis 22° , quae Fig. 121. jam liberare censetur fixas a refractione. Cum ergo fuerit anomalia coaequata $166^{\circ} 36'$, distantia Martis et Solis fuit 138556, Terrae et Solis 100666. Hinc si A Sol, B Terra, C Mars, et AB 100666, AC 138556, et EBC $6^{\circ} 2' 30''$: arguitur BAC declinatio orbitae ab ecliptica hoc loco $1^{\circ} 39' 22''$. Ac cum sit nodus in $16^{\circ} 43' \text{ } \gamma$, hinc aufero $12^{\circ} 16' \text{ } \chi$, restat arcus $64^{\circ} 27'$. Et ut sinus istius ad hanc inclinationem $1^{\circ} 39' 22''$, sic sinus totus ad $1^{\circ} 50' 8''$ inclinationem limitis austrini. ⁽¹⁰⁵⁾


Sed quia locus paulo longius abest a limite, ut omnis suspicandi ansa praecidatur, age consulantur observationes extra situm acronychium, ubi Mars propior est limiti. Qua opera una tradam etiam demonstrationem proportionis, quae est inter inclinationem et visam latitudinem, universalis. Anno 1593.

d. 21. Julii h. 14. astronomice, visus est planeta in $17^{\circ} 45\frac{3}{4}' \text{ } \chi$, cum lat. mer. $5^{\circ} 46\frac{1}{4}'$. Ad hanc vero horam invenitur locus eccentricus Martis $20^{\circ} 1\frac{1}{2}' \text{ } \omega$, Solis vero locus $8^{\circ} 26' \text{ } \Omega$.

In schemate praesenti sit EA in $8^{\circ} 26' \text{ } \Omega$, KA in $20^{\circ} 1\frac{1}{2}' \text{ } \omega$. Erit EAK commutationis verae angulus $11^{\circ} 35\frac{1}{2}'$. Sit etiam EK in $17^{\circ} 45\frac{3}{4}' \text{ } \chi$. Dico, ut est sinus AEK ad sinum EAK, sic esse sinum inclinationis ipsius K ad sinum latitudinis ejus visae. Intelligatur enim inclinatio ipsius K linea recta ex corpore planetae perpendiculariter in eclipticam demissa.




Fig. 122.



Erit igitur ut distantia EK ad distantiam AK, sic sinus apparentiae ipsius lineae K ex A, ad sinum apparentiae ejusdem ex E. At ut sinus EAK ad sinum AEK, sic distantia EK ad distantiam AK. Ergo ut sinus EAK ad sinum AEK, sic sinus apparentiae lineae K ex A ad sinum apparentiae ejusdem ex E.

Minor nota est ex doctrina triangulorum, et nominatim ex N. 14. libri III. Triangulorum Landspargii. Major indiget probatione. Sit

Fig. 123.



ergo recta VO, ex cujus duobus punctis P et M erigantur duae perpendiculares et aequales PQ et ML, et connectantur Q et E termini cum puncto lineae VO, quod sit O. Centro vero O, spatio OL, describatur arcus, secans QO in N, et ex N demittatur perpendicularis NR in VO. Erit igitur ut PQ ad QO, sic RN ad NO. Sed ipsi PQ aequalis est ML. Ut igitur ML ad QO, sic RN ad LO. Est vero ML sinus anguli LOM, quo spectatur quantitas PQ vel LM de propinquo, ut sit LQ, quae est distantia brevior termini L, sinus totus; QO vero est distantia longior quantitatis ML vel PQ, termini scilicet Q. Et RN est sinus anguli NOR, quo spectatur LM vel PQ remotior, ut sit rursus NO, hoc est LO sinus totus. Ut ergo sinus apparentiae de propinquo ad distantiam longiorem, sic sinus apparentiae de longinquo ad distantiam brevior. Et permutatim atque conversim, ut distantia brevior ad longiorem, sic sinus apparentiae de longinquo ad sinum apparentiae de propinquo. Et in praesenti negotio, adeoque universaliter, ut distantia Martis a Terra ad distantiam ejusdem a Sole, sic sinus latitudinis ad sinum inclinationis planorum. Et vicissim, ut distantia a Sole ad distantiam a Terra, sic inclinatio ad latitudinem. Q. e. d.

Haec cum sint certa, et cum linea per K signata (Fig. 122) apparuerit ex E $5^{\circ} 16' \frac{1}{4}$, facta multiplicatione hujus sinus per sinum EAK, et facti divisione per sinum AEK, prodit sinus 3188, cujus arcus est $1^{\circ} 49' 37''$; atque haec est inclinatio ipsius puncti K, quanta appareret ex A. Cum autem sit Mars in $20^{\circ} 1' \frac{1}{2}$, nodus in $16^{\circ} 43' 8''$, et sic elongatio Martis a nodo $86^{\circ} 46'$: ut igitur sinus hujus elongationis ad totum, sic sinus $1^{\circ} 49' 37''$ ad sinum inclinationis maximae 3200. Igitur haec rursus ut prius prodit $1^{\circ} 50' 8''$ in austrum.

Pro inclinatione boreali. Anno 1585. d. 31. Jan. sequente media nocte in altitudine Martis 53° fuit decrescens jam latitudo Martis $4^{\circ} 31'$ bor. Fuit autem oppositio vera ante horas 16. 46' in $21^{\circ} 36' \frac{1}{6}$ Q. Tunc consentaneum est fuisse latitudinem $4^{\circ} 31' 10''$. Cum igitur complementum anomaliae coaequatae Martis fuerit $7^{\circ} 6' 23''$, fuit ergo ejus distantia a Sole 166334, Solis a Terra distantia 98724. Rursum igitur in schemate 121 si AC 166334, AB 98723, et EBC $4^{\circ} 31' 10''$: prodit BCA $2^{\circ} 40' 50''$. Qui ablatas ab EBC relinquit BAC $1^{\circ} 50' 20''$. At quia 5° absumus a limite, limitis igitur inclinatio circiter $25''$ major erit, scilicet $1^{\circ} 50' 45''$. Prius austrina inclinatio erat $1^{\circ} 50' 8''$; differentia $37''$, nullius momenti. Medium horum est $1^{\circ} 50' 25''$, inclinatio justissima, quanta etiam supra cap. XIII. variis modis et operationibus inventa fuit; quos hic repetitos volo.

Hac jam inclinatione limitum usus, si computem latitudines Martis sub situm ejus in opposito Solis, invenio sic:

	Anno	Distantia Martis.	Distantia Solis.	Inclinatio.	Visa latitudo.	Nostra tabula cap. XV.
1	1580	152978	98223	0° 37' 42"	1° 45 1/2' bor.	1° 40'
2	1582	162255	98233	1. 36. 6	4. 3 1/2' "	4. 6 vel 4° 3'
3	1585	166335	98724	1. 50. 3	4. 30 1/2' "	4. 31 1/2'
4	1587	164635	98641	1. 25. 42	3. 37' "	3. 37 vel 3. 41
5	1589	167045	100860	0. 23. 20	1. 5 1/2' "	1. 7 1/2 vel 1. 12 1/2
6	1591	144774	101777	1. 11. 9	3. 59 1/2' anat.	4. 1 1/2 vel 3. 56
7	1593	138556	100666	1. 89. 42	6. 3 1/2' "	6. 2 1/2 vel 5. 58
8	1595	148817	98756	0. 1. 38	0. 5 1/2' bor.	0. 8 circiter
9	1597	159200	98203	1. 19. 17	3. 20' "	3. 33
10	1600	165495	98478	1. 49. 24	4. 30 1/2' "	4. 31
11	1602	166004	98205	1. 39. 35	4. 7 1/2' "	4. 8 vel 4. 10
12	1604	160905	98859	0. 52. 9	2. 18 1/2' "	2. 21 1/2 vel 2. 26.

In prima defuit observatio ad diem, ut vidisti cap. XV. In secunda trium scrupulorum incertitudo erat in observando, quia interrum usi sunt altitudine poli 34° 7', quae fuit 34° 5 1/2'. Tertia est nobis fundamenti loco. Quarta ad unguem consentit, si parallaxin negligas, per quam observata latitudo perperam corrigitur, ut sit 3° 41', ut vidisti cap. XV. In quinta desunt nobis 2 scrupula, quae potius abundant in observatione ob refractionem, quia Mars non fuit altior 22 1/2°, ut habes cap. XV. In sexta agnoscas aliquantulum defectum 2' c. Sed refractionis quantitati non est tanta fides. Quid si namque illa 2' fuerit auctior? Septima rursum fuit nobis fundamenti loco. Octava procul dubio vitiosam habuit declinationem, quia tunc hora 8. Mars in meridiano non fuit. Armillae vero, quibus observatur declinatio extra meridianum, facilius fallunt quam quadrantes. Docet autem analogia circumstantium dierum, ut est cap. XV, latitudines fuisse 0° 5' b. quantam computavimus. Nona observatio non est fide digna. Fabricianam tamen latitudinem 3° 23' (v. s. p. 236) calculus ad diem 10. Dec. accurate examinatus fere assequitur. Dat enim 3° 21 1/2' b. Decima proxime calculum venit. Undecima exclusa refractione ad unguem respondet. Duodecima vix 2' major est calculo, credo, quia in instrumentis meis tantum est vitii. Nam in quadrante sescubitali meo 2' non facile discernuntur. Satis igitur praecise tenemus acronychias latitudines per omnem circuli ambitum per hanc inclinationem 1° 50' 30". Examen vero reliquarum latitudinum in observationibus extra situm acronychium, quae crebrae inveniuntur hoc libro, relinquo diligentioribus.

Caput LXIII.

Hypothesis physica latitudinis.

Dictum est cap. LVII, si diameter corporis seu globi Martii ponatur magneticam vim obtinere, et porrigi in longitudes medias atque in illo situ teneri sibi ipsi parallelos in omni ambitu, absolutam esse hypothesin physicam eccentricitatis. Haec suppositio tanto est verisimilior, quod nunc

cap. LXII. Itaque cum planum sit, quod circumitur ab orbita Martis, ejus inclinatio ad planum eclipticae regularis erit. Scriptis enim duobus circulis aequalibus, altero DC in plano eclipticae, altero FE in plano orbitae Martis, ex communi centro A Solis, hoc est in una et eadem sphaera fixarum Soli concentrica, erit ut sinus BD arcus inter sectionem circulorum et quolibet punctum circuli Martii, puta D, ad sinum totum, sic sinus inclinationis DF puncti F ad sinum CE, inclinationis maximae E limitis. Ordinari vero eadem mensura declinationes omnium circuitus punctorum a plano eclipticae, supra cap. XIII. probatum est observationum ingeniosa tractatione. Itaque nulla potest afferri instantia nostrae hypothesei.

Porro duae quaestiones difficiles expediendae sunt. Altera de conditione hujus declinationis axis, altera de axe ipso. Quaeritur enim, naturalis sit haec axis inclinatio an rationalis, naturae corporeae opus an angeli? Quaeritur secundo, an idem numero sit axis inclinationis cum axe magnetico, Solis appetente? et si diversi, quomodo in eodem corpore planetas globoso? Estque altera alteri implexa quaestio.

Naturalem pene credidissem, ob similitudinem ejus virtutis, quae in magnete naturalis et ipsa est: nisi accessisset et transpositio nodorum successanea, quae omnino videtur opus esse rationis, si non discurrentis at certe instinctae. Nam aequidistantem situm manere minus est mirum et propius naturae, quam prius in negotio eccentricitatis. Illic enim ab axe virtuoso Solem peti diximus, hic locum sub fixis longissime distantibus. Illic vi hujus magneticae virtutis axis, circumlato corpore, convertendus fuisset nec sibi ipsi mansurus aequidistans, nisi retineretur a vi directionis fortiori aut a vi animali, seu nuda seu rationis quomodocunque capaci; hic vi nostrae virtutis directoriae ipsius, nulla necessitate virtutis animalis aut ratiocinantiae, sequitur ista aequidistantia axis. Nisi forte quis et hoc menti tribuet, quod diameter ista latitudines efficiens, planeta in limitibus collocato, directe in centrum Solis tendit, atque hoc pacto ex orbita planetae circulus magnus efficitur, et nodi in loca ex Sole opposita rediguntur. Quo argumento supra quoque cap. XXXIX. planetae asserti respectum Solis. Atqui non omnis respectus Solis arguit rationem comitantem. Illud sane verum, eum, qui primum ordinavit motus coelestes, hunc axem sic direxisse, ut Solem (in dicto situ) respiceret; et proinde consilio summaque ratione usum esse. At iste respectus Solis retineri jam porro potest citra mentem, sola constantia magneticae facultatis. Quietis enim similior est quam motui; materialis igitur, non mentalis. Sola igitur variatio hujus inclinationis, quam dicimus translationem nodorum successu seculorum, adhuc in causa manet, evincens vim motricem plus quam naturalem seu corpoream seu quales sunt virtutes magneticae. Et tamen utramque potius censuerim conjungendam, quam solam rationalem ponendam. Pareat vis magnetica; praesit ratio illam gubernans, ut prius etiam cap. LVII. de virtute Solis appetente diximus.

Hac quaestione sic expedita sequitur altera. Nam si virtus ista directoria est ex magneticis, corporeis, naturalibus: subjectum ejus erit corpus. An igitur fieri possit, ut eadem illa diameter, Solis appetens vel ab eo fugiens, inclinatione sui ad eclipticam etiam administret hanc declinationem planetae ab ecliptica? Si nodi jungerentur apsidibus, limites longitudo medius, utrumque eadem esset diameter et eccentricitatis et latitudinis administra. Dictum enim cap. LVIII, diametrum, quae eccentricitatem

causatur, porrigi in longitudines medias: dictum vero jam, diametrum, quae latitudinem causatur, porrigi in limites. Igitur si limites jungerentur mediis longitudinibus, utraque diameter eodem porrigeretur; itaque loco convenirent, nihilque prohiberet quin tunc et eadem esse possent *). At non conveniunt nodi seu sectiones eclipticae verae in apsidas. In Marte limes boreus 12° est ante aphelium; in Jove praecise coincidunt limes boreus et aphelium; in Saturno 24° nodus sequitur aphelium; in Luna brevitatem circuli num omnia omnibus permutantur. Nodus enim nunc in apogaeo est, nunc in longitudine media, nunc in perihelio. Cum igitur tempore et loco differant hae duae virtutes, sequitur, ut una non sint.


In uno tamen et eodem corpore planetario residere utramque ceu in toto, nihil impedit nisi motus seu convolutio globi. Itaque si planetae moventur ut Luna, quae non convolvitur sed eandem nobis undequaque ostendit faciem, nihil impedit asserere, intextas esse mutuo virtutes utraque, ut subtegmina sunt intexta staminibus. Tunc enim toto corpore planetae situm eundem respectu fixarum retinente, cum circa Solem vehitur, omnes omnino tractus in eo rectilinei, e quorum numero sunt duae istae diametri, situm retinebunt eundem ad fixas. Sin autem de Telluris globo agitur, qui, praeterquam quod circumfertur annuo spatio, etiam circumvolvitur in dies singulos, tum in magna dubitatione non minus quam supra cap. LVII. relinquimur. Nam si corpus convolvitur, unica sola diameter virtuosa, quae est parallelus axi motus convolutorii, manet constans et sibi ipsi aequidistans. Quodsi maxime aliam insuper priori intertextam dicas, quae latitudines causetur, alterius speciei virtutem: illa easdem plagas observabit cum axe volutionis; utpote circa quem illa conum circumscribit, cujus plagas singulas peragrat; itaque jam ad dexteram jam ad sinistram nuens, corpus tandem in mediam plagam inducit, quam spectat axis conversionis.

Igitur si globus volvitur, tunc hujus virtutis declinatoriae subjectum aut non est corpus, sed spiritale quippiam, aut non est idem corpus. Si spiritale quippiam, quomodo plagas tuetur mundi, rem corpoream? et quomodo motus hanc speciem (declinationem a via regia) infert corpori? An fortasse facilius inclinatur corpus et e via excedit regia (translationis suae causam interim habens extraneam, ex Sole), quam de loco in locum vi proprii motoris transfertur? Sin malumus subjectum corporale, nascetur nobis mechanicum quippiam, cujusmodi sunt lucernae quaedam sphaericae, quae projectae et convolutae non tamen effundunt oleum. Intus enim inclusa est ampulla, quae ventricoso pondere deorsum tracta et sic retenta non sequitur motum convolutum sphaerae se circumdantis. An igitur et in hoc Telluris globo sit interior aliquis globus, ad quem diurnus Telluris exterioris motus non penetret, sed qui fortissima inclinatione ad certa fixarum loca retineatur, quo minus exterius corpus revolutum sequatur? Nam attinere hanc quaestionem et Terram, cap. LXVIII. audiemus ubi et hoc videbimus, an, proposita sex planetis ecliptica aliqua media, fieri possit,

*) Aliud est diameter quae eccentricitatem causatur, aliud diameter libratoria. Illa reale quippiam est, haec imaginaria, ad imaginandum illius effectum. Illa ubicunque consistat porrigitur in perpendicularum lineae apsidum seu in locum longitudinum mediarum sub fixis; haec, ut cap. XXXIX. dictum, semper in ipsum corpus Solis porrigitur.

quod paulo ante requirebamus, ut nodi singulorum competant in suas apsidas; an potius credendum, posse esse modos aliquos coelestium motionum, qui licet et ipsi corporales sint magneticorum instar, a nemine tamen in Terris comprehendi possint ob defectum exemplorum? quemadmodum, si nobis defuisset magnetis exemplum, ut olim quidem incognitum erat, plurima de causis coelestium motuum ignoraturi fuissetus. Qui orbis tumentur solidos, ii facile omnia expediunt, secundum ea, quae cap. XIII. dicta sunt. Plano enim eccentrici Martis FE (Fig. 125) ad planum eclipticae DC tribuent inclinationem non libratilem, sed certam et constantem super diametro sectionis BA, per centrum mundi A ducta (Braheus per centrum Solis); quam dicent successu seculorum circa centrum illud A sub ecliptica DC converti.

Fig. 126.



Ac cum duorum circularum maximorum in schemate praesenti ML et KH poli F, G et B, C tantundem distent, quanta est declinatio eorum maxima MK, LH: ergo poli Martis B, C circa polos eclipticae F, G describent circellos spatio FB, GC, $1^{\circ} 50' 25''$, sub quibus dicent polos sphaerae Martiae B, C circumire in antecedentia, motus ea quantitate, quae supra cap. XVI. est expressa infraque cap. LXIX. corrigetur.

Caput LXIV.

Examen parallaxium Martis per latitudines.

Est igitur cap. LXI. inventus uterque nodus in locis praecise oppositis, mirabili consensu et qui omnem parallaxin excludat. Esto enim, ut sit Martis parallaxis saltem $2'$ et $1'$, cum utrinque in opposito Solis fuerit propior Terrae quam Sol, et distiterit prima vice anno 1595 a vertice circiter 38° ; secunda vice anno 1589 circiter 66° . Igitur anno 1589 cum existimaretur in nodo, fuisset adhuc fere $2'$ in septentrione; ergo adhuc uno gradu fuisset ante nodum. Nodus igitur esset non $16^{\circ} 46' \text{ m}$, die $17^{\circ} 46' \text{ m}$. Contra anno 1595 habuerit $1'$ parallaxeos. Ergo quo des existimabatur esse in nodo ascendente, jam vere habuisset latitudinem $1'$; quare jam ultra nodum $30'$ circ. Nodus igitur ascendens esset non in $16^{\circ} 46' \text{ s}$, sed in $16^{\circ} 16' \text{ s}$. En nodum descendentem in $17^{\circ} \frac{1}{4} \text{ m}$, ascendentem in $16^{\circ} \frac{1}{4} \text{ s}$, si vel minima parallaxi utaris. Concludamus igitur cum cap. XI., parallaxin Martis diurnam esse plane insensibilem, siquidem vera sit observatio utraque latitudinis intra $2'$.

Non dissimile argumentum parallaxeos nullius nascetur nobis etiam ex cap. LXII. praemissa investigatione verissimae planorum inclinationis, nisi quid refractionis turbabit. Esto enim, ut Mars habuerit parallaxin anno 1593 in altitudine 22° saltem $2'$, anno vero 1585 in altitudine 53° minuti unius. Minor ergo esset visa latitudo australis, minor igitur et inclinatio quam borea. At jam ante paulo minor apparet vel sine parallaxi, quantum observationis vitiolo aut refractioni nonnulli in altitudine 23° tribui potest. Ergo parallaxi adhibita observatio de majore errore incusaretur: et vicis-

sim observatione stante perimitur parallaxis: siquidem verum est, orbitam Martis ordinari in perfecto plano, quod planum eclipticae secet in ipso centro Solis.

Sed multo certius idem evincitur ex latitudinibus observatis in reliquis sitibus acronychiis, iis praesertim, quas observationis conditio aut refraction dubias non reddidit. Hoc cap. XV. dici coeptum hucusque perfici non potuit. Anno enim 1587, cum Mars distaret a vertice 55° , si parallaxin habuisset $4'$, latitudo ex $3^\circ 37'$ fuisset effecta $3^\circ 41'$. At cap. LXII. nihil ultra $3^\circ 37'$ inventum fuit. Anno vero 1589, in distantia nonagesimi a vertice 64° , si Martis parallaxis ex Solis parallaxi horizontali $3'$ fuisset $5\frac{1}{2}'$, tunc borea latitudo pro observata $1^\circ 7'$ fuisset $1^\circ 12\frac{1}{2}'$, liberata parallaxi. At nos computavimus nihil supra $1^\circ 5\frac{1}{2}'$; etsi vitiolum $2'$ observationi obvenire potuit: ut si Mars in altitudine 22° adhuc refractionem passus per $2'$ altius justo in borea apparuisset, quemadmodum et cap. LXII. et cap. XV. dictum. Anno vero 1602 cum usurpata parallaxi inveniretur observata latitudo $4^\circ 10'$, neglecta $4^\circ 7\frac{1}{2}'$: nos computavimus $4^\circ 7\frac{3}{4}'$, praecise admodum. Sic anno 1604 non assecuti sumus penitus quantitatem latitudinis borealis observatae. Igitur multo minus esse queremur eam, abstractione parallaxeos auctam.

Hisce tribus modis incertitudinem parallaxeos Martis evicimus, insensibilitatem autem omnimodam non omnino demonstravimus, eludente nos refractionis negotio et interdum observationibus intra $2'$ vel $3'$ non descendentibus. Itaque si quis Marti parallaxin latitudinis maximam $2'$ vel $2\frac{1}{2}'$ tribuere velit, eum observata haec Braheana non magnopere coarguent. Accommodabitur enim et inclinatio, fietque $1^\circ 51' 0''$.

Caput LXV.

Inquisitio latitudinis maximae utriusque plagae, tam in conjunctione quam in oppositione cum Sole.


Inclinatione constituta facile est et maximam latitudinem definire, idque gemina via. Nam aut quaeritur maxima omnium seculorum, aut quanta hoc seculo fieri possit. Etsi parum differunt hodie utraeque, cum limites sint medii inter apsidas Martis et Solis seu Telluris, nec illi ultra 54° ab invicem distent, nec sit Solis seu Telluris insignis eccentricitas. Este tamen, ut olim: conjungantur apsides Martis et Solis, et una limites latitudinum Martis, et retineat ecliptica situm suum inter fixas. Cum igitur in schemate 121 maxima Martis distantia AC sit 166465, minima Solis AB 98200, et BAC $1^\circ 50\frac{1}{2}'$: hinc computatur borea latitudo maxima in oppositione cum Sole $4^\circ 29' 10''$, quae in conjunctione cum Sole, quando Sol a Terra distat 101800, attenuatur ad $1^\circ 8' 34''$. Sed austrina latitudo ex distantia Martis 138234, Solis 101800 computatur in oppositione $6^\circ 58' 24''$, paulo minor 7° , quae in conjunctione cum Sole, quando Sol distat 98200, ad $1^\circ 4' 36''$ extenuatur. Sin autem contraria ratione jungatur apogaeum Solis perihelio Martis, prodit maxima borea latitudo in oppositione $4^\circ 44' 12''$, in conjunctione $1^\circ 9' 32''$, austrina in oppositione $6^\circ 20' 50''$, in conjunctione $1^\circ 3' 32''$.

Et haec ita haberent, si olim apsides et limites conjungerentur; quod an futurum sit ante occasum totius machinae, incertum. Certe Ptolemaeus apsidibus et nodis aequales motus tribuit; quod si esset, nunquam fieret ista conjunctio. Ac etsi hodie diversis motibus uti videntur, non sunt tamen veterum observata adeo certa, nec est differentia horum motuum ne in hodierna quidem astronomia adeo magna, ut certissime concludere possimus, quot annorum Myriadibus distent hujusmodi conjunctiones apsidum et limitum.

Ad nostrum igitur aevum revertamur, quod nos inter et Ptolemaeum extenditur. Atqui hic geometricas determinaciones quaerentem multiplex ἀμυγχανα excipit.

Primum apsides Solis et Martis non sunt conjunctae, deinde orbitae planetarum non sunt perfecti circuli. Itaque etsi trajiciamus novam lineam apsidum per centra circulorum Martis et Telluris, in schemate per B, C: poterit tamen fieri, ut alibi quam in hac linea contingat maxima propinquatio siderum. Denique etsi constet de loco maximae appropinquationis, locus limitis borei et austrini est alius. Ut limes est in $16^{\circ} 50'$ ♈, at recta BC per centra circulorum ejecta porrigitur in $24\frac{1}{2}^{\circ}$ ♈ et \approx circiter; eodem nempe, quo Braheo porrigitur linea HF suarum apsidum, cui haec nostra BC parallelus incedit, quippe bisecta utraque eccentricitate, AF in C et AH in I.

Fig. 127.



Jamque eram electurus medium inter 17° ♈ et 25° ♈, scilicet 21° ♈: sed me retinuit annus 1585, quo anno in $21^{\circ} 36'$ ♈ observata fuit: latitudo non plane maxima. Cum enim in nocte quae sequitur diem 30. Jan. esset oppositio, die 24. antecedenti observata est latitudo $4^{\circ} 31'$, hactenus erescens; die vero 31. Jan. 16 horis post oppositionem rursum fuit visa latitudo $4^{\circ} 31'$, apparet igitur, quod die 24., si fuisset oppositio illo in loco eccentrici, major spectata fuisset latitudo quam $4^{\circ} 31'$ duabus de causis: primum quia sidus Terrae propius esset, quam extra situm acronychium, deinde quia remotior Mars ab apogaeo fuisset et humilior.

Contingat igitur maxima latitudo circa 19° ♈, \approx , ubi fuit Mars die 24. Jan. Cum igitur sit anomaliae coequatae complementum 10° : erit distantia Martis 166200, Solis 98670. Itaque latitudo maxima borea circiter $4^{\circ} 31\frac{1}{2}'$. Quae in conjunctione Solis, cum is distat per 101290, apparet $1^{\circ} 8' 30''$. Pro austrina maxima latitudine exhibet nobis anomalia Martis coequata 170° distantiam 138420 circiter: et Sol in 19° ♈ distat 101280. Hinc colligitur maxima latitudo austrina $6^{\circ} 52' 20''$ proxime; quae in conjunctione apparet $2^{\circ} 4' 20''$.

Caput LXVI.

Non semper in opposito Solis contingere maximos excursus ad latera.

De latitudine vero maxima, quae contingere potest in unaqualibet

periodo Martis, multo perplexius est negotium, certa loca ejus geometricè definire: et involvit magnum illud paradoxum, quod inter observationes anni 1593 Tychonis Brahe manu his verbis inculcatum reperi:

Consideratione dignum est, quod Mars circa decimam diem Augusti habuerit maximam latitudinem austrinam, et postea decreverit; ita ut die 24. in oppositione quasi quarta parte gradus propior eclipticae redditus sit, quod tamen canones, etiam correcto latitudinis maximae loco, in 18° Aquarii nequaquam exhibent, quomocunque assumatur illic maxima latitudo: cujus causa studiose inquirenda venit.

Postea cum ad ipsum in Bohemiam venissem et saepius de latitudinum ratione quaesivissem, illeque mihi, nodos in locis esse oppositis et sectionem transire per punctum medii loci Solis seu per centrum epicycli ejus (de quibus sequenti cap. LXVII.) aliaque multa recensuisset: hac mentione commonefactus de hoc negotio hoc inquit, est mirabile, latitudines fieri maximas ante vel post oppositiones cum Sole: cujus rei mentio facta est etiam supra capite XV.

Causam quidem rei continet vera hypothesis latitudinis hac parte quinta stabilita: terminos vero maximarum latitudinum haud facilius geometricè inquisiveris, quam Apollonius Pergaeus inquisivit terminos stationum. Quemadmodum enim in hoc negotio stationum nota quaedam potest describi, qua noscatur locus stationum (est autem ista, quando linea visionis Martis, Terra eunte, parallelos manet sibi ipsi); ex nota vero sine multiplici calculo locus stationis a priori demonstrari nequit, ob confusionem multarum causarum: sic etiam res habet in latitudine quavis vice maxima. Nam tunc quidem est latitudo maxima, quando distantia Martis a Terra crescit vel decrescit eadem proportionem, qua crescunt vel decrescunt lineae inclinationum Martis: et augetur latitudo, quando proportio distantiae plus decrescit, quam proportio linearum inclinationis, aut quando illa decrescente haec contra crescit. Vicissim minuitur latitudo, vel quando plus crescit distantia Martis a Terra quam lineae inclinationis, in sua quaelibet proportionem, vel quando distantia crescente illae minuuntur. Haec autem promiscue sunt jam in oppositione, jam ante jam post; prout oppositio vel in limitem incidit, vel ante aut post limitem. Haec ita sequi ex hypothesis hujus operis, probant meae Ephemerides. Anno 1604. circa 25. Feb. vel 6. Martii fuit maxima latitudo borea, cum integro mense sequeretur oppositio. Vicissim 27. Sept. vel 7. Oct. fuit maxima latitudo austrina, cum Mars inter quintilem et sextilem Solis versaretur. Rursum fine anni 1605 fuit maxima latitudo borea, Sole a quintili ad quadratum Martis eunte. Et vicissim anno 1606. Julii fine maxima fuit latitudo austrina, Sole in trino Martis versante. Anno vero 1607 maxima borea latitudo contingit paulo post conjunctionem Martis cum Sole.

Causa, cur haec in veteri astronomia mira videantur, potissima in hoc est, quod Ptolemaeus ceterique hunc imitati motus intricatissimos inclinationum, deviationum, reflexionum confinxerunt. Cum enim haereret Ptolemaeus in epicycli imaginatione, primum atque vidit, in oppositione cum Sole, quando planeta videtur, exire illum in plagam unam: statim conjecturae indulsit, asserens, in conjunctione cum Sole, quando non videtur, exire in plagam alteram; aut in universum contrarium ejus facere, quod vidit illum in oppositione facere: scilicet ut aliqua esset compensatio et restitutionis aequalitas cohaerentiaque cum Sole. Hoc vero non est observando verum


invenire, sed falsa concepta imaginatione observationes confingere; etsi con-
donandum est illi, qui paucas habuit observationes. Vide de hoc et
cap. XIV.

Sed age videamus, an calculus noster reddat latitudinem diei 10. Aug.
observatam. Nam de 21. Julii et 25. Aug. ejus anni jam certi sumus.
Quibus enim observationibus calculus nititur, easdem et praesentat. Igitur
d. 10. Aug. h. 13. 45' computatur eccentricus Martis locus in ecliptica
 $2^{\circ} 41' 18''$ \times ; Sol $27^{\circ} 37' 49''$ Ω ; angulus ad Solem $5^{\circ} 3' 29''$; angulus
ad Terram $18^{\circ} 25'$; et Mars ex calculo in $16^{\circ} 3'$ \times , cum observatus sit
in $16^{\circ} 7'$ \times ; et quia $2^{\circ} 40' 48''$ \times , locus orbitae, distat a $16^{\circ} 43'$ γ
per $74^{\circ} 2'$: inclinatio igitur erit $1^{\circ} 46' 10''$. Ex hac et duobus dictis
angulis methodo cap. LXII. tradita invenitur lati-
tudo visa $6^{\circ} 21' 14''$, duobus minutis etiam plus
quam habet observatio. Sed ne nobis insidietur
anguli exiguitas, utamur (quod vult methodus supra
tradita) distantis veris Martis a Terra et a Sole,
seu eorum loco veris angulis. In schemate vides
differre CB, BA a CL, LA. Et nostra methodus
non dixerat ut CB ad BA, sed ut CL ad LA, sic
esse sinum anguli LAB ad sinum anguli LCB. Sit
locus eclipticus $2^{\circ} 41' 18''$ \times Martis sub λ puncto
stantis; γ locus Soli oppositus $27^{\circ} 37' 49''$ \approx .
Ergo $\angle \beta$ $5^{\circ} 3' 29''$; $\angle \lambda$ $1^{\circ} 46' 10''$. Hinc et ex
 $\angle \beta \gamma$ recto datur $\angle \lambda$ vel CAL $5^{\circ} 21' 36''$, cui respondet
vera distantia L Martis ab A Sole. In triangulo
igitur CAL ex lateribus CA 101077 et AL 138261,
et ex angulo jam invento quaeratur LCA, qui invenitur
 $160^{\circ} 33'$. Complementum ejus est $19^{\circ} 27'$, cui
respondet vera distantia L Martis a C Terra.

Jam igitur per hos angulos operationis invenio
LCB visam latitudinem $6^{\circ} 19' 10''$, quam proxime
eamdem cum observata. ¹⁰⁰)

Praestat igitur hypothesis, hoc opere constituta,
hoc ipsum, cujus causam Braheus diligenter inquiren-
dam monuerat, quodque antiqua astronomia tanto
apparatu praestare non potest. Praestat, inquam, hoc
ipsa simplicitate, dum plano eccentrici datur
inclinatio seu obliquitas constans, eaque varie augetur
vel minuitur; non vere, sed ratione optica, prout
visus tantum ad illam, aut in Braheo et Ptolemaeo
illa ad visum nostrum, appropinquaverit vel ab ea
recesserit.

Fig. 128.




Caput LXVII.

Demonstratur ex locis nodorum et inclinatione planorum Martis et eclipticae, consurgere eccentricitatem Martis non ex puncto medii loci Solis (seu Braheo, ex centro epicycli Solis) sed ex ipso centro Solis.

Ultima primis respondent. Disputavi cap. VI. physice, negatis orbibus solidis, non posse eccentricitates planetarum ab alio puncto, quam ab ipso centro Solis consurgere. Demonstrationem rei geometricam ex observationibus deductam distuli partim in cap. XXII. XXIII. et LII, quibus locis me satisfecisse puto vel oculatissimis; partim vero jam expediam. Primum per loca nodorum. Demonstratum est cap. LXI, exstructa Martis eccentricitate ex ipso centro Solis, sive, quod idem est, observationibus acronychiis ex oppositione planetae cum loco Solis apparenti desumptis, nodos cadere in partes ex centro Solis oppositas praecise admodum, id est diametrum apsidum et diametrum sectionis planorum eclipticae et Martis concurrere, seu secare se mutuo in centro eodem, unde eccentricitas computatur, in centro Solis scilicet. Quaeritur, si pro Solis motu apparente utamur medio motu, num et hinc nodi futuri sint in locis, unde computatur eccentricitas, oppositis? Minime vero. Repetatur schema Coperni-

Fig. 129.



canum cap. VI. In eo sit jam $\alpha\delta$ linea limitum, in $16\frac{1}{4}^\circ \varrho$ et \approx (non vero, ut cap. VI. linea apsidum in $29^\circ \varrho$). Ergo ipsi $\alpha\delta$ perpendicularis ex α erit diameter nodorum. Atqui si pro apparenti Solis utamur medio, tunc pro α nobis offertur β , unde computatur eccentricitas. Igitur ex β ipsi $\alpha\delta$ perpendicularis, quae sit $\beta\epsilon$, cadet in loca ex β praecise opposita, at non cadet in loca nodorum; quia prior perpendicularis per α cadit in loca nodorum, quae superior est ipsa $\beta\epsilon$ spatio $\alpha\epsilon$. Labet inquirere, quanti futuri sint anguli. ~~et~~ circumferentiam eccentrici, conexo puncto α cum sectione ipsius $\beta\epsilon$ et eccen-

trici circumferentiae. Cum igitur sit $\alpha\epsilon$ in $16^\circ 45' \varrho$ ex supposito, et $\beta\alpha$ in $5^\circ 45' \varrho$ circiter: erit $\beta\alpha\epsilon$ angulus 41° ; cumque sit $\beta\epsilon\alpha$ rectus, erit $\alpha\beta\epsilon$ 49° . Et cum $\alpha\beta$ sit eccentricitas Solis 3600, quodlibet orbis

Terrae vel Solis est 100000: ut igitur sinus totus anguli ζ ad β 3600, ita sinus anguli β ad κ 2717. In eadem vero dimensione, qualium semidiameter orbis Telluris est 100000, semidiameter orbis Martii ex cap. LIV. est 152350. Qualium igitur semidiameter orbis Martii est 100000, erit κ 1790, ostendens in sinibus angulum $1^\circ 1' 33''$.


Totidem ergo gradibus et scrupulis debuisset nodus evehens esse loco anteriore, deprimens posteriore, si male a me factum esset, quod pro β puncto Ptolemaico, Copernicano, Braheano, elegi κ centrum Solis. Vicissim observationibus ad medium Solis motum expensis et sic assumpto puncto β , si male hoc fit et si κ eligendum esset, oportet nodum evehentem ex β inveniri loco posteriori, deprimentem priori, sic ut semicirculus septentrionalis arcu $2^\circ 3' 6''$ curtatus sit.

Videamus, an hoc ita accidat. Capite igitur XII. crasse expensis observationibus, Mars anno 1595. die 28. Oct. putabatur in nodo fuisse. Tunc inventus est locus eccentricus ex Braheanis aequationibus, quae nituntur puncto β , in $16^\circ 48' 8''$. Sic 1589. die 9. Maji mane ponebamus Martem in nodo altero descendente fuisse; tunc computavimus ex iisdem Braheanis aequationibus locum Martis eccentricum $15^\circ 44\frac{1}{2}'$ m. Fit igitur, quod dictum fieri debere. Uno gradu et $3\frac{1}{2}'$ minus est in semicirculo boreali. Quodsi accuratius, ut cap. LXI, inspiciantur observata, Mars d. 1. h. 15. serius in nodum ascendentem incidit. Itaque ad locum eccentricum accedunt $50'$ circiter, ut sic cadat planeta in $17^\circ 38' 8''$ eccentrico motu. Igitur curtatio superioris semicirculi est $1^\circ 53\frac{1}{2}'$, quam proxime aequalis computatae $2^\circ 3'$. Stat igitur omnino punctum κ , repudiatur β . Nam cur diameter sectionis planorum non secabit diametrum apsidum in centro, unde surgit eccentricitas, sicut supra? Quae hujus rei causa esset?

Eadem demonstrantur etiam per inclinationem planorum cap. LXII. demonstratam, et per schema 130. Inventa ibi est inclinatio, hoc est angulus LAB, quo borei limitis digressio ab ecliptica ex A Sole spectatur $1^\circ 50' 45''$. Angulus vero MAD, quo limitis austrini digressio ab ecliptica spectatur ex A Sole, inventus est illi proxime aequalis, scilicet $1^\circ 50' 8''$. Ex quo concludebatur, cum anguli ad A supra et infra sint aequales, et linea per A in B, D loca limitum eclipticae educta, sit una linea (quia in uno plano eclipticae), igitur et lineam alteram, ex A in L, M limites ipsos ejectam, esse lineam unam, et sic, quod sub Martis orbita comprehenditur, esse unum planum. At si non in κ prioris schematis (quod est ante posteriori) sed in β (hoc est infra A posteriori) esset communis sectio planorum: connexis L, M, quousque cum aliquo puncto lineae BD infra A, esset angulus, quo spectatur ex illo puncto LB, minor, angulus, quo MAD spectatur, major, duobus scilicet minutis.

Verum est; si nobis libertas relinquitur statuendi

Fig. 128.



parallaxin pro lubitu magnam, facile dilui hujus capitis argumentationes. At certum est ex documentis pluribus, non posse admitti parallaxin tam magnam, ut plane enervetur haec demonstratio. Cumque thema hujus capitis firmissime sit demonstratum cap. LII, possem convertere vela, sic ut non demonstraretur hoc thema ex negata parallaxi, sed ex positione hujus thematis, quod propriam habet cap. LII. demonstrationem, negaretur parallaxis, ut cap. LXIV.

Utrum facias, perinde est. Utrumque enim thema habet alias etiam demonstrationes. Mihi haec via primum occurrit et placuit, ut consensum rerum ostenderem.

Caput LXVIII.

An inclinationes planorum Martis et eclipticae eadem sint hoc nostro et Ptolemaei seculo. Ubi de eclipticae latitudinibus deque inaequali nodorum circuitione.

Dictum est cap. XIV, in unaqualibet periodo Martis obliquitatem seu inclinationem plani Martii ad planum eclipticae manere fixam. Oritur vero dubitatio, an omnibus seculis eadem sit et fixa haec obliquitas. Causa dubitationis haec est.

Demonstravit Braheus tomo primo Progymnasmatum fol. 233, stellarum fixarum latitudines hodie esse alias, quam tempore Ptolemaei: hoc discrimine, quod stellae boreales circa solstitium aestivum auxerint latitudines, australes eas diminuerint: et vicissim circa solstitium hibernum boreales stellae diminuerint, australes auxerint latitudines: ab his terminis quo magis versus aequinoctialia puncta itur, hoc minorem accidissee latitudinis variationem, adeoque proxime ipsa puncta aequinoctialia plane nullam. Hanc nostri temporis experientiam ad nostra principia cap. LXIII. constituta sic accommodabimus.

Sphaeram fixarum immenso intervallo supra planetas elevari constat: itaque eandem et liberam esse convenit ab iis motibus, qui planetis insunt. Id quidem Copernicus simpliciter ponit, fixas omni plane motu de loco in locum esse liberas et sic vere fixas iisdem perpetuo locis. Cum autem ecliptica sit circulus in sphaera fixarum maximus, sub quo Sol nobis ex Terra perpetuo apparet, quemque is annuatim percurrere videtur: sive Soli sive Terrae competat motus iste, utrinque uni ex planetis competit: ut ita fixae non ipsae in se habeant eclipticae causam, sed tantum propter motum annum sive Solis sive Terrae circa centrum mundi. Ac cum inveniatur ecliptica sedes suas sub fixis mutasse: non igitur fixae ab ecliptica, sed haec a fixis recessit. Causam translationis hujus exhibent procul dubio principia nostra cap. LXIII. siquidem sana sunt. Cum enim Sol gyratione rapidissima intra annu spatium, quod Copernico centrum mundi est, per circuitum cieat per spem emissam, erunt hujus gyrationis certi poli: in schemate 126. sit corpus Solis IO, poli conversionis A, E, quibus in sphaera fixarum supererminent puncta F, G. Circulus igitur maximus corporis Solaris convoluti IO ordinabitur sub aliquo chilo, maximo fixarum, si sit ML. Qui cum sit procul dubio unus, idem sub fixis, polis F, G constantibus,

sic exigente dignitate ejus corporis, quod motum primo ceteris infert: planetae tamen inveniuntur diversos et ad se mutuo inclinatos obire circulos, iis naturae principiis, quae sunt explicata cap. LXIII. Procul dubio igitur diversi planetarum omnium circuli respiciunt hunc circulum regium ML, a conversione corporis Solaris circa suum axem AE descriptum: et ad hunc quilibet tribitur inclinationem constantis quantitatis, translatitiam tamen, quia experimur nodos transferri. Cum igitur et ecliptica sit unus ex planetariis circulis, quippe Solis vel Terrae, consentaneum est, et hanc habere quandam inclinationem ad circulum regium ML, a circulo maximo corporis Solaris IO inter fixas descriptum. Quid enim causae sit, cur ceteri planetae alius alio declinet, sola ecliptica, Solari vel Terrestri itineri superstans, praecise cum hoc circulo regio ML coincidat?

Sit ergo concessum hoc, eclipticam proprie sic dictam inclinari ad regium illum circulum Solarem, eaque repraesentetur nobis per circulum KH inter fixas delineatum, sintque ejus poli B, C. His obtentis, facile occasionem invenimus, qua mutantur fixarum latitudines; quippe quae, ipsa vocis ratione, ab ipsa vera ecliptica computantur, non ab illo circulo regio Solari hactenus caeco. Nam eclipticae vere et proprie sic dictae (quod tantum sub illa linea contingant eclipses, sub qua Sol incedit) intersectiones seu nodi communes cum illo circulo ML, quem mediam eclipticam dicere possemus, transferentur non minus, quam nodi ceterorum planetarum: obliquitate tamen maxima MK vel LH, quam metitur distantia polorum FB, GC, constante et fixa manente, ut et in ceteris planetis. Nimirum, si centris F, G spatiis FB, GC constantibus, circelli scribantur, in quibus polos eclipticae B, C circumire ponamus: tunc omnino et circulus KH sedes pristinae in sphaera fixarum FMG deseret facietque successu seculorum, ut ubi olim limitem boreum egit, prope easdem fixas tandem limitem austrinum colloquet. In brevi vero seculorum numero sic erit. Limites K, H, non longe a fixis suis progressi, insensibili aliquo variabunt earum latitudines. Nodi vero aequali itinere progressi a suis fixis evidentius suarum fixarum mutabunt latitudines: quia sinus inclinationum in fine quadrantis circa limitem insensibili, in principio vero circa nodos valde sensibili differentia increscunt. Hinc quia circa aequinoctia nulla sentitur mutatio latitudinum fixarum, circa vero solstitia satis notabilis, colligimus recte, limites latitudinum eclipticae esse circa aequinoctia, nodos circa solstitia. Erunt igitur puncta K, H signa aequinoctii propinqua. Similiter colligitur et hoc: cum eclipticae verae pars borealis fugiat a borea, quippe crescentibus latitudinibus borealibus in Geminis et Cancro, boreum igitur limitem eclipticae aut in Libra aut progredientibus nodis, aut in Ariete, retrocedentibus iisdem, quod est, verisimilius. Nam et Lunae nodi retrocedunt, annis 19 zodiacum absolventes; cum apogaeum progrediatur, annis $8\frac{1}{2}$ eundem absolvens. Cumque apogaeum Solis seu perihelium Terrae sit in $5\frac{1}{2}^\circ$, quare per cap. LVII. diameter virtuosa, eccentricitatem causans, porrigitur in Solis corpus, Terra in $5\frac{1}{2}^\circ$ versante. At per cap. LXIII. etiam diameter illa virtuosa, quae latitudinem causatur, porrigitur in Solis corpus, Terra in limite versante, qui est per hoc cap. LXVIII. in Ariete. Ergo per idem cap. LXIII. utraque virtus potest effici ab eadem corporis Telluris diametro. Hinc licet ratiocinari probabiliter, in $5\frac{1}{2}^\circ$ et γ coincidere circulum hunc caecum seu eclipticam mediam cum vera nobis nota.

Quodsi omnium planetarum aphelia ordinarentur in uno circulo maximo,

possemus dicere, illum ipsum esse, quem hic quaerimus: quippe tunc de omnibus planetis verum esse posset, nodos (ut hic in Telluris circuitibus) competere in apsidis: itaque utramque varietatem, et eccentricitatis in altum et obliquitatis in latum, ab eadem diametro virtuosa effici; quo pacto magnis difficultatibus, quae nobis cap. LXIII. relictæ sunt, liberaremur. Et quidem apogaea Solis, Martis, Jovis, Saturni consentiunt mediocriter. Omnium enim trium superiorum aphelia sunt in eodem semicirculo et simul in eadem plaga septentrionis. Itaque in Libra esset verae eclipticae limes austrinus, et boreus in Ariete, quod congruit superioribus.

Sed differenda est plenaria hujus rei consideratio, usque dum omnium planetarum motus ad veram et nobis cognitam eclipticam examinati fuerint.


Porro huic opinioni de latente aliquo regio circulo, ex Sole inter fixas propagato, testimonium praebebat ipsa etiam vulgo usitata obliquitas eclipticae, quae ab aequatore computatur: quam rectius diceremus latitudinem aequatoris ab ecliptica. Est autem aequator circulus maximus corporis Telluris, medius inter polos conversionis diurnae Telluris circa axem suum. Et tribuitur idem aequatoris seu aequinoctialis nomen etiam illi tractui sphaerae fixarum, qui quolibet seculo aequatori Terrestri superstat. Idem polorum nomen punctis fixarum iis, quae polis Telluris quovis seculo superstant. Hic igitur axis et circulus maximus inclinatus est ad eclipticam aliis seculis aliter. Quanto enim hodie major est borea latitudo fixarum in Cancro, australis in Capricorno, tanto minor est hodie latitudo aequatoris ab ecliptica quam olim, quia in Cancro et Capricorno obliquitas haec est maxima. Olim quidem erat $23^{\circ} 51\frac{1}{2}'$: hodie est $23^{\circ} 31\frac{1}{2}'$, differentia $20'$, quanta est et mutatio latitudinis fixarum.

Est autem consentaneum, circulum aequatorium cum axe suo et polis perpetuo aequali et fixo spatio declinaturum fuisse a polis eclipticae hujus HK, si ecliptica vera praecipuus esset circulus mundi. Quia vero ecliptica mutata, hujus etiam axis (et unâ aequatoris, cujus est iste axis) inclinatio ad eclipticam variata est, ut quantum ecliptica a fixis in Cancro recessit, tantum ad aequatorem accesserit; igitur aequator ad alium aliquem circumulum videtur tueri inclinationem constantem. Magnam igitur causam, magnam dignitatem hujus caeci circuli esse oportet. Itaque omnibus verisimilitudinibus consurgit nobis circulus aliquis regius LOM medius inter planetarum circulos, ad quem omnes planetae et hic etiam Mars tueatur inclinationem constantem. Nec debet nos turbare Lunae exemplum, cujus est ad eclipticam, non vero ad alium aliquem circumulum maximum, et olim et hodie, transposita ecliptica, constans inclinatio 5° . Inter Lunam enim et planetas ceteros ingens est discrimen. Ceteri orbes centrum mundi ambiunt; Lunae orbis solus (ut crasse loquar) est extra centrum et transportatur de loco in locum. Illi communiter Solem circumeunt, Luna Tellurem. Illorum eccentricitates totaeque theoriae longitudinis et latitudinis a Sole consurgunt, Lunae a Tellure mobili. Illos Sol in circumulum rapit, Lunam Tellus. Quid mirum igitur, si Luna latitudinum suarum limites ad eclipticam luxatilem HK, sub qua Telluris est circulus, constantes tueretur, ceteris planetis hic ad alium aliquem circumulum invariabilem, ut LOIM, respicientibus? Itaque nihil nos Luna debet impedire, quo minus hoc credamus.

Hoc igitur recepto, Martis orbitam constanter inclinari ad circumulum aliquem sub iisdem semper fixis constantem, ut LOIM, sequitur, eandem Martis orbitam aliis seculis aliter inclinari ad eclipticam HK, ut quæ ali-

quibus sui partibus fixas pristinas deserit et ad alias transit. Hæc tamen sic sequitur, si recipiamus, nodos Martis et nodos Telluris, hoc est sectiones quas faciunt hæ orbitæ cum illo circulo caeco LOIM, non iisdem semper intervallis in coelo circumferri, sed alios aliis esse celeriores. Hujus rei genuinum exemplum jam positum est. Dum enim æquator constantem tuetur inclinationem ad caecum hunc circulum LOIM, ecliptica HK interim translata: denique mutabilis est deprehensa æquatoris ab ecliptica declinatio.

Sit A polus eclipticae mediae, seu punctum, in quod incidit recta e centro Solis per polum corporis Solaris ducta. Scribatur centro A, spatio AB $23^{\circ} 42'$, vel non multo alio, circulus minor, et sint B, C loca poli mundi borealis, sive puncta, in quae incidit linea ex centro corporis Telluris per polum motus diurni ejusdem Telluris ducta, B tempore Ptolemaei, C tempore nostro. Quodsi retrocedunt etiam eclipticae nodi, necesse est limitem boreum statui circa fixas in confinio Arietis et Piscium. Nam fixarum borealium in Geminis et Cancro crevit latitudo, ut prius dictum. Sumatur D punctum inter B, C intermedium, ostendens locum poli aequatoris tempore intermedio, et connectantur A, D. Circulus igitur AD continuatus transibit per solstitium temporis intermedii. Ducatur ei ex A ad rectos AE, qui continuatus transibit per aequinoctium vernum temporis intermedii. Ergo prope lineam AE fuerit polus oculi, sub quo orbita circuitusque Telluris ordinabatur olim. Et quia in Ariete limes boreus, producat igitur EA in partes A, et juxta illam productam eligatur punctum I infra. Polus igitur eclipticae Ptolemaicae fuerit in I. Centro A, spatio AI, scribatur circellus, in quo sumatur aliud punctum O, propius ipsi C, quam est P ipsi B. Sitque O eclipticae hodiernae polus, distans a C $23^{\circ} 31\frac{1}{2}'$, cum I polus eclipticae Ptolemaicae distet a B $23^{\circ} 51\frac{1}{2}'$. Erit haec theoria mutatae obliquitatis eclipticae et latitudinis fixarum; nisi quod de dimensione nobis non constat ipsius circelli OL. Nam illa quantitas $20'$ obliquitatis eclipticae mutatae varie effici potest. *) Et quia O est polus eclipticae hodiernae, et OC in principium Canori vergit: sit ergo CP pars octava circuli, et P medium Leonis, ubi hodie est limes Martis boreus. Continuetur PO ultra O, eique ducatur per I proxime parallelus



*) Polus Terrae non plano sub ipso BCE circello incedit, sed sub spiris apud E depictis, singulis annis unam talem spiram, et opposito polo oppositam consimilem describens, aliisque ex alia nectens, ex quo nexu est progressus aequinoctiorum et solstitiorum. Est autem quaelibet harum spirarum tanta, quantus Copernico orbis magnus, ceteris orbis Solis, hoc est proportio hujus spirae ad superficiem fixarum sphaerae insensibilis est. Itaque pro mera linea BCE haberi possunt. Notandum autem pro imaginatione recta hujus motus, quod axis aequatoris Terrestris continuatus utrinque ad fixas annis singulis describat cylindrum ea amplitudine, qua est una ex his spiris, qui corpus Solis habet in sui medio. At idem axis Telluris successu seculorum describit conos duos, verticibus in Sole aequalibus, imo vero confusis inde a circuitu Telluris circa Solem; quippe utriusque coni vertice in alterius corpus, addito, propter concursum omnium cylindrorum, basi vero BCE. Ita ex multis cylindris conus componitur.

GI, paulo tamen vergens in consequentia (quia olim limes Martis sub fixis erat paulo promotior quam hodie), et continuetur ultra I, et ex A circellus scribatur, secans PO in F, et GI in H. Sit autem circellus tantus, ut major sit OF quam IH. Et ponatur polus circuli, sub quo Martis circuitus ordinatur, hodie in F, olim in H. Erit hodierna obliquitas, seu inclinatio plani Martii ad eclipticam OF major, Ptolemaica IH minor; et tamen Martiae orbitae polus H, F circa A constanti intervallo AH, AF ivisset ex H in F. Cumque polus orbitae Martiae satis magno arcu ab H in F iverit, seu in consequentia seu in antecedentia: quia tamen una ivit polus eclipticae ab I in O circa idem punctum A, videretur polus Martis proxime quievisse, quia IH et OF fere paralleli.

Magnam quippe inaequalitatem motus nodorum consequi necesse est, si hoc verum est, polos singulorum planetarum polum aliquem communem tempore non eodem circumire. Nam et ipsius praecessionis aequinoctiorum hinc aliqua nascitur anomalia, cujus negotium huic plane simile est. Dixi quid sit consentaneum principiis hoc opere constitutis, et quibus hypothesibus possit hoc praestari, ut inclinationes planorum aliis seculis sint aliae. Videamus nunc observata Ptolemaei. Cum enim Martis latitudo borea sit cum corde Leonis, fixa boreali; austrina cum stellis Capricorni australibus: consentaneum est, idem accidisse latitudinibus maximis Martis, quod stellis illis, ut utraque creverit, quae illorum latitudines creverunt, nempe boreales circa solstitium aestivum, australes circa hibernum. Ptolemaeus igitur maximam Martis borealem latitudinem observatam ait $4^{\circ} 20'$, quae hodie est $4^{\circ} 32'$. Confirmat igitur hic nostram opinionem, quia latitudinem maximam $12'$ minorem exhibet hodierna, nodis in eadem cum hodierna proxime distantia ab aphelio permanentibus. At contra latitudinem austrinam facit 7° proxime, cum et hodie tanta esse possit, scilicet $6^{\circ} 52\frac{1}{2}'$. Igitur per ejus observationes in suspensio relinquimur. Nam quod haec $12'$ attinet in latitudine boreali, sciendum, ejus instrumenti partes minimas valere $10'$ et plerumque ab ipso unius hujusmodi quantitatem in errore poni. Et inter Graecas notas, quae $20'$ et quae $40'$ significant, exiguum et lubricum est discrimen, saepe neglectum ab interpretibus; etsi Arabs hic vertit $20'$.

Nihil praeterea exstat in Ptolemaeo, quod nos manu ducere possit ad judicandum de statu antiquo harum rerum. Nam observatio capite sequente LXIX. examinata erroris arguitur. Dum igitur destituamur idoneis observationibus antiquitatis, cogit nos ipsa rei conditio, hanc de motu nodorum disputationem, ut multa alia, relinquere posteritati; siquidem Deo placuerit justam humano generi spatium temporis in hoc mundo indulgere ad residua ista perdisenda⁽¹⁷⁾.

Caput LXIX.

Consideratio trium Ptolemaicarum observationum: et correctio motus medii motusque aphelii et nodorum.

Ex antiquitate omni observationes stellae Martis non plures quinque ex consignatis supersunt; et una antiquissima ab Aristotele conscripta, qui Martem a Lunae dimidiatae parte obscurae tegi vidit. At nec annus nec

hora diei addita. Inveni tamen longissima inductione per annos 50 ab anno 15. ad finem vitae Aristotelis, non potuisse esse alio die, quam in vespera diei 4. Aprilis anno ante Christi vulgarem epocham 357, cum Aristoteles 21 annorum audiret Eudoxum, ut ex Diogene Laërtio constat. Secundam observationem a Chaldaeis habitam Ptolemaeus nobis conservavit, quae facta est anno ante Christum 272 d. 18. Jan. mane, cum Mars borealem, in fronte Scorpii occultavit. Rursum hic nulla horae certitudo addita. Reliquas quatuor Ptolemaeus ipse habuit, dimensus astrolabio sidus Martis ad fixas; recenset tamen solum locum sub zodiaco, sub ipsum articulum oppositionis cum medio motu Solis.

Ex observationibus tam paucis rerum maximarum argumenta capienda sunt: aut si non possunt, imperfecta relinquenda astronomia. Primum enim per quatuor observationes Ptolemaicas epocha motus medii ad fixas relati Ptolemaei tempori competens inquirenda, et ex ejus cum hodiernis collatione ipse motus medius est limitandus. Deinde per observationem Chaldaicam videtur inquiri posse, an vere eccentricitas Solis olim major fuerit quam hodie. Denique et per hanc et per Aristotelicam, si tempus sciretur, de Martis latitudine ad illa tempora periculum fieri posset.

Quam vero viam insistemus per Deum immortalem! cum nihil pene habeamus a Ptolemaeo, quod non jure prius in controversiam vocare possimus, quam ad justam subtilitatem nobis utile fiat.

I. Primum ad exposita tempora prodit motum Solis medium ex calculo, qui nititur observatione aequinoctiorum et solstitiorum. Principium Arietis Sol detegit, non digito ad locum intenso, sed caeca conjectatione temporis. Nam id dicimus esse principium Arietis, quod Sol tenuit, quando visus est dies noctibus aequare. Quid si Ptolemaeus in tempore aberrasset? Conjecturis non caremus. Primum enim non prodit eadem observationis. Opto ut observaverit altitudines meridianas, ex quibus inductione facta momentum ingressus Solis in boreale hemisphaerium citra errorem habetur. At quid si ipse observaverit in armillis Alexandrinis, ubi ei potuit nocere refractione, cujus manifesta indicia ipse prodit, cum ait, in illis armillis observatum esse eodem die bis aequinoctium? Ipse vitio instrumenti transcribit; ego vitium ex refractione ortum suspicor. Esto tamen; observaverit per meridianas altitudines. Alia suspicio se summa vi invito ingerit, quod aequinoctiorum momenta a Ptolemaeo prodita intra sesquidiem non consentiunt analogiae praeteritarum Hipparchi et sequentium Albategnii et Brahei observationum, quae omnes in unam aequalitatem conspirant; sola Ptolemaica aequinoctia exorbitant. Quae res multis perplexissimis de coelo opinionibus occasionem dedit, motusque trepidationis et librationis peperit: qui omnes evertuntur, deprehenso, quod consecutae Ptolemaeum observationes cum vetustissima Hipparchi ad aequalitatem constanter consentiunt. Tuetur se tamen ipse Ptolemaeus consociatione vernalium aequinoctiorum cum autumnalibus. Nam si instrumenti vitio factum esset, ut postridie verum pronunciaverit aequinoctium, cum pridie fuisset; autumnale pridie pronuntiandum fuisset, cum postridie competeret. Ita erepto biduo ex longitudine aestatis, magna fuisset secuta mutatio eccentricitatis Solis, quam tamen relinquit per sua observata, quanta ab Hipparcho fuerat inventa. Itaque nihil restat, quam ut fidem Ptolemaei, secuti credamus juste observatum tempus, quo Sol stetit in Arietis initio.

II. Facto principio, et obliquitate eclipticae per observationem inventa,

nihil est negotii, per quotidianas Solis declinationes pronunciare de vera ejus elongatione a puncto, quod Sol tempore dicto aequinoctii tenuit, quodcunque illud aut in quacunque sphaera statuatur. Nam alii alias huic negotio sphaeras deputarunt, cum post octavam et nonam a Ptolemaeo constitutas sphaeras alii decimam, recentissimi undecimam et duodecimam vanissimis speculationibus constituerint; quam *πολυπραγμοσύνη* Braheus vehementer increpuit. At quid in earum locum substituere cogitarit, mihi nunquam dixit nec scriptum reliquit ullibi. Copernicus quidem (ut vulgus judicat) scite et festive, (ut ego) sapienter fecit, qui oculis a coelo deductis quaesivit id punctum in ipso globo Telluris, cui in fixarum sphaera punctum quolibet seculo certum supereminet, ut cap. LXVIII. dictum. Sed hujus loci non est prolixius ista discutere.

III. Sequitur demonstratio aequationis, quae nititur Solis ingressibus observatis in principia cardinalium signorum. Aequatione enim ab apparenti loco Solis subtracta vel addita, constituitur medius Solis motus ab illo puncto, quod Sol aequinoctii tempore obtinere visus est. Rursum hic de aequationis quantitate major est dubitatio, quam prius de aequinoctio vel principio zodiaci. Nam hodie illa aequatio minor apparet 20' quam quantam Hipparchus demonstrasse sibi visus est Ptolemaeusque retinuit. Nec est causa satis justa, cur dicamus, hodie aliam esse orbium proportionem quam olim. Affirmatum enim maximi momenti eget firmissimo testimonio, quo caremus. Nec enim observata illa tam possunt esse accurata, praesertim circa ingressum in ♉ et ♋. Quodsi substituamus Ptolemaeo aequationes hodiernas, non mutabimus ejus observationes tanto, quod observando se comprehendere Ptolemaeus ipse fateatur, et quo majus aliquid noceri potuit Ptolemaicis observationibus ab ipso refractionum negotio. Nam possumus diem observati aequinoctii Ptolemaici certam fateri, horas interim aliquot illius diei in incerto ponere: ubi vernalium et autumnalium aequinoctiorum societas sese non ita defendit contra parvum hunc errorem, de quo agimus, ut prius contra illum magnum. Sane fuisse aequationes aevo Ptolemaei aequales nostris, arguit constantia modernorum. Nam fere idem est, quod hodie Braheus, et quod Albategnius quodque Arzachel ante aliquot secula invenerunt.¹⁰⁶ Cum igitur suspicio sit, vitiosam esse Solis aequationem, qua Ptolemaeus utitur, ex vitiosis apparentibus locis Solis deductam, nec ad medii nec ad apparentis Solis oppositum Mars a Ptolemaeo citra erroris aleam deductus est. Consolatio tamen haec est, quod nobis apparenti Solis loco opus est, cujus comprehensio praecedit.

Possumus autem incedere via gemina: aut ut Ptolemaeo credamus de aequinoctiis, aut ut ex modernis aequationibus correctionem Ptolemaicis hanc adhibeamus, ut vernalium aequinoctium tribus horis fuerit serius, autumnale totidem maturius, quam est a Ptolemaeo annotatum; itaque utrinque in declinatione Solis fuerit erratum 8'. Sane instrumenta Ptolemaei subtiliora non fuere, quam quorum minimae particulae 10' valebant. Et collocat Hipparchus unam hujusmodi particularum in dubio. Qua de causa et tempora, quibus moratur Sol in quadrantibus zodiaci, non praecisius expressa fuere, quam quadrantibus dierum. Et haec de vera aestatis hiemisque longitudine.

IV. Quid vero nunc dicemus de ingressu Solis in Cancrum et Capricornum, unde apogaeum et ipsa aequationum dispositio dependet? quam facile unus diei quadrantis potuit vernali decedere zodiaci quadranti, accedere


autumnali? cum ingressus Solis in Cancrum insensibilis plane sit. Neque sane persuaderi possum, Hipparchum et Ptolemaeum in ipsum hujus ingressus momentum respexisse, neglectis punctis intermediis. Credo facilius, sedulos fuisse per totam aestatem in notandis Solis declinationibus, semperque duas aequales, ex utroque latere solstitii, comparasse invicem, et tempus inter aequalium declinationum momenta intermedium pro vero ingressu Solis in Cancrum sumsisse, quo pacto, si vicinis solstitio locis comparatio fuit instituta, parum quidem erroris, tantum tamen committi potuit, quantus est unius diei quadrans, in quo abeunt 15' de motu Solis. Igitur etsi certissima essent aequinoctia, potest tamen circa solstitia in partes alternas deesse vel abundare in loco Solis quarta pars gradus, et apogaeum tunc 8° antcrius vel posterius incidere. Hactenus de motu Solis.

V. Jam quod Martis ipsius observationes attinet, etsi demus, astrolabio certissime collimasse Ptolemaeum ad fixas: tamen adhuc non constat certius de loco Martis in zodiaco (ut in quo prius et locum Solis consideravimus) quam de ipsarum fixarum locis: et si commisit Ptolemaeus errorem in asserendo fixae gradu elongationis a puncto aequinoctii, idem error committitur in pronunciando Martis loco. Atqui ne fixarum quidem elongatio a Sole (et sic a puncto Arietis, a quo scitur Solis elongatio per declinationem) caret suspitione erroris. Ecce enim et modum inquirendi et argumentum erroris. Anno II. Antonini inquisivit illam Ptolemaeus per Lunam dichotomon. Lunae enim a Sole, cordis Leonis a Luna elongationem cepit astrolabio. Data igitur Solis elongatione a puncto aequinoctii, datur et fixae aequodem elongatio*). Jam in dimetienda elongatione Lunae a Sole error videtur commissus dimidii gradus. Nam Sole occidente fuit capta mensura. Sol vero occidens per refractionem videtur altior justo, dimidio circiter gradu. Minor ergo justo apparet elongatio Lunae, et sic etiam cordis Leonis a Sole aequinoctio. Videtur igitur addendus locis fixarum tempore Ptolemaei dimidius gradus. Ergo quando Ptolemaeus putavit Martem (cum fixis observando connexum) esse in opposito medii loci Solis, jam vere fuisset dimidio gradu ultra hunc oppositum. Cum igitur a Ptolemaeo quatuor observata loca Martis commemorantur ista: 21° 0' II, 28° 50' Q, 2° 34' x, 1° 36'' x, nobis assumenda essent ista: 21° 30' II, 29° 20' Q, 3° 4' x, 2° 6' x. Atqui contra hanc audaciam Ptolemaeus se munit affirmans, se saepius unam et eandem rem, fixarum sc. elongationem a Luna, Lunae a Sole, et sic fixarum a Sole et ab aequinoctio inquisivisse distantiam, inventamque esse perpetuo eandem. Igitur etsi unam solam prodit observationem, demonstrandae methodi causa: tamen credi potest, plures observationes respexisse, tam oriente quam occidente Sole vel Luna, et denique id secutus esse, quod vidit inter multas operationes, diversa loca prodentes, intermedium.

*) A punctum aequinoctii caecum; B Sol, C Luna, D fixa, visibilia; BE declinatio Solis. AB habetur per observationem ipsius BE tempore meridiano commodissime, BC habetur per instrumenta de die, CD per instrumenta et de nocte. Compositis igitur AB, BC, CD, tandem habetur AD elongatio fixae ab A, caeco prius puncto, quod jam tandem patescit, postquam ad D fixam est alligatum. Postea planetae observando ad fixas alligantur, et sic scitur eorum elongatio ab A principio zodiaci.

Kepleri Opera, III.

Fig. 132.



Etsi vero haec disputatio de 30' nihil attinere videtur motum Martis medium, siquidem his 4 vicibus Mars a fixis observatus ad illas referri possit neglecto puncto aequinoctii, incertae distantiae: qua methodo ego superius cap. XVII. inquisivi aphelii locum ad Ptolemaei tempora: tamen adhuc eo nomine tenemur, quod Martis loca visa ad oppositum apparentis loci Solis reducenda sunt: quod opus nunquam recte procedit, nisi remotio cum Martis tum Solis a communi puncto aequinoctii praesciatur; quia non aliter nisi per haec quasi elementa discitur justae elongationis Martis a Sole arcus. Quodsi ad momentum, quo vera putatur fuisse siderum oppositio, planeta videatur ultra vera Solis loca 30': planeta igitur involutus est inaequalitate secunda, nondum idoneus ad inquirendam primam inaequalitatem. At in apogaeo haec 30' prosthaphaereseos orbis occupant magnum arcum eccentrici, cui major adhuc portio de tempore seu motu medio respondet. In perigaeo fit contrarium. Occupat enim ista prosthaphaeresis parvum arcum eccentrici, cui minor adhuc portio de motu medio competit. Qui ergo dicit, Martem his 4 vicibus visum esse 30' in zodiaco ulterius, idem dicit, Martis motum medium ab aequinoctii puncto fuisse in apogaeo multis, in perigaeo paucis scrupulis anteriorem. Ac cum ~~id~~ sit arcus eccentrici arcu hoc vitiosae visionis, qui fuit 30', non igitur Mars in eccentrico eousque ne sub fixis quidem pervenerat, quousque pervenisse sub illis videbatur: quantitate illa, qua differt arcus eccentrici ab hoc arcu visionis 30'. Qui arcus cum magnus sit in aphelio, et parum differat ab arcu visionis 30', contra in perigaeo: denique igitur sequetur, in aphelio parum, in perihelio plus esse Martis motui medio a fixis adimendum, si recipiamus, fixas 30' promotiores esse in zodiaco. Ita non tantum motus medius fit minor (etsi multo minori quantitate, quam sunt haec 30', visionis vitium), sed etiam ipsa trium acronychiarum, quibus Ptolemaeus est usus, luxatur dispositio; unde aliud aphelium aliamque eccentricitatem prodire necesse est. Etsi hoc posterius nobis nihil facesset negotii. Contemnemus enim, etiamsi majus aliquid, vel sine suspitione erroris fixarum, insinuarent observationes: cum certum sit, non ferre illas tantam subtilitatem, quantam ferunt Braheanae. Itaque usurpabimus formam aequationum ex observatis Braheanis inventam, quasi maneant omnibus seculis eadem.

Tria igitur bivia cum nobis occurrerint, de Solis eccentricitate, de loco apogaei Solis, de loco fixarum et Martis in zodiaco: octo existent constitutiones motus medii et aphelii ad illa observationum momenta, etiamsi neglecto zodiaco tantum a fixis computemus.

Prima inquisitio retineat omnia Ptolemaica circa Solem et fixas.

Cum igitur loca motus Solis medii fuerint $21^{\circ} 0' \text{ ♊}$, $28^{\circ} 50' =$, $2^{\circ} 34' \text{ ♋}$, et Solis apogaeum $5^{\circ} 30' \text{ ♋}$; apparentia Solis loca fuerint $21^{\circ} 40' \text{ ♊}$, $1^{\circ} 13' \text{ ♋}$, $2^{\circ} 41' \text{ ♋}$, ultra oppositum omnia tria. Praecedit igitur vera oppositio. Et cum diurnus in 21° ♋ (hodie ☿) sit circiter 23', Solis 61', summa $1^{\circ} 24'$: illa igitur 41' requirent horas 8, quando Mars visus fuit in $21^{\circ} 8' \text{ ♋}$, oppositus loco Solis apparenti. Sic in 29° ♋ (hodie ♍) diurnus Martis solet esse 24', diurnus Solis 59', summa $1^{\circ} 23'$. Ergo $2^{\circ} 23'$ differentia postulat diem 1, horas 17. 21', quando Mars visus est in $29^{\circ} 31' \text{ ♋}$. Denique in 3° ♋ (hodie ☿) diurnus Martis

est 23', Solis 57', summa 1° 20', quibus indicatur, 7' deberi horas 2. 6', quando Mars visus in 2° 36' ♄.

Tempora igitur correcta ista :				Loca
Adriani XV.	Tybi . XXVI.	Hora	5. 0'	21° 8' II
Adriani XIX.	Pharmuthi IV.	"	15. 39.	29. 31. ♄
Antonini II.	Epiphi XII.	"	7. 54.	2. 36. ♄
Intervalla	{ 4. dies 68.	Horae	10. 39'	68° 23'
Anni Aegyptii	{ 4. dies 97.	"	16. 15.	93. 5. 109)

Respondet autem intervallo primo motus medius a fixis ultra integras periodos 80° 57' 14'', secundo 96° 16' 24''. Illic vero apparens motus Martis fuit ultra integras periodos 68° 21' 20'', ablata praecessione temporis intermedi, quanta fuit illo seculo. Hic vero fuit 93° 2' 20''.

Jam igitur adhibeatur hypothesis hactenus investigata et constituta ex recentissimis observationibus, et quaeratur, quo loco anomaliae respondeant mediis motibus tantis apparentes in eccentrico tanti, quantos jam dixi. Periclitatis aliquot casibus deprehenditur: si tempore ultimo ponatur aphelium Martis in 0° 41' ♄, et reliquis temporibus ob praecessionem aequinoctiorum paulo antierius, primo vero tempore anomalia media 46° 37', secundo 34° 21', tertio 130° 37½', et sic longitudo ab aequinoctio tempore medio 5° 4' 59' 20'': tunc stellam Martis referri per hypothesin aequationum modernam primo in 21° 7' II, secundo in 29° ♄, tertio in 2° 37½' ♄, fortuita praecisione. Non sunt enim fundamenta talia, ex quibus tanta praecisio sperari possit. Quodsi Ptolemaeus plures sui temporis oppositiones annotasset, procul dubio majorem experiremur difficultatem. Cum tribus enim solis facile transigitur. Compara hoc aphelium cum capite XVII.

Secundo, manente aequatione et apogaeo Solis Ptolemaico, fixis addantur 30'.

Paulo quid aliud prodibit. Nam quia Mars dimidio gradu ultra oppositum Solis est, sequetur igitur correcta oppositio. Aggregata diurnorum fuerunt 1° 24', 1° 23', 1° 20'. Igitur pro 30' residuis quam proxime eadem prodeunt tempora, ter addenda, horae sc. 8. 40' c.: quibus respondent 8½' de motu Martis apparenti, auferenda de illis 30'. Residua 21½' addentur ad loca planetae, ut sit in 21° 29½' II, 29° 52½' ♄, 2° 57½' ♄. Manebunt intervalla cum temporis, tum locorum zodiaci quam proxime eadem. Quare eadem etiam erit distributio anomaliae mediae inter has observationes, quae jam modo fuit inventa. Tantummodo aphelium transponetur totidem minutis, ut sit ultimo in 1° 2½' ♄. Inter fixas igitur 8½' retrahendum. Et motus medius ab aequinoctio auctior erit priori 21½' sed h. 8. 40' posterius. Competunt autem horis his 11' 24'', motus medii. Igitur eodem tempore supposito motus medius ab aequinoctio tantummodo 10' erit auctior quam prius. Sed loca fixarum 30' remotiora sunt ab aequinoctio. Ergo motus medius Martis a fixis 20' processit minus quam antea.

Tertio, apogaeo Solis transposito per 11° vel 12°, manente fixarum longitudine et aequatione.

Tunc primo tempore Sol erit per 20' loco priori: medio tempore nihil fere mutabitur: ultimo per 21' erit loco posteriori ob Solis aequationes alias. Ergo prima oppositio sequetur horis 4. et Mars erit totidem minutis

loco anteriori; ultima prius incidit horis $4\frac{1}{2}$, cum Mars totidem minutis loco posteriori.

Ecce: Tybi XXVI.	h. 9. 0'	Loca $21^{\circ} 4' \Pi$
Pharmuthi IV.	h. 15. 39.	" 29. 31. Ω
Epiphi XII.	h. 3. 37.	" 2. 40. \times
Intervalla { 4. dies 68.	h. 6. 39'	68° 27'
Aegyptii { 4. " 97.	h. 12. 0.	93. 9.

Primum temporis intervallum factum est minus; itaque et motus medius illi per $5' 15''$ minor respondet, ut sit $80^{\circ} 53'$. Secundum temporis intervallum rursum effectum est minus, quare et motus medius illi respondet minor per $5' 40''$, scilicet $96^{\circ} 10' 48''$. Quia igitur utrique anomaliae mediae minori respondet major motus apparens quam prius, et supposita eadem anomalia utrinque, motus apparens major est circiter $9'$; apparet igitur descendendum ab aphelio. Attamen primum intervallum non mutatur, nisi magno descensu facto, secundum autem descensu per $36'$ facto. Itaque si indulgeremus inquisitioni, et non propositam haberemus hypothesin modernam, gigneretur omnino nobis alia hypothesis aliaque eccentricitas. Et vicissim si certissimae essent hae tres observationes Ptolemaei, argumentum inde nasceretur, apogaeum Solis ab ipso recte constitutum.

Ademtis autem $36'$ ab aphelio Martis, ut sit ultimo tempore in $0^{\circ} 3' \Omega$, et sic accommodato motu ejus medio, ut sit anomalia temporis medii $34^{\circ} 58\frac{1}{2}'$, longitudo ab aequinoctio $5^{\circ} 5' 0' 50''$, prodit observatio:

Prima $21^{\circ} 7' \Pi$	debut {	$21^{\circ} 4' \Pi$	$3 +$	} differentia.
Secunda 29. 28. Ω		29. 31. Ω	$3 -$	
Tertia 2. 37. \times		2. 40. \times	$3 -$	

Rursum satis accurata propinquitate. Nec enim sperare possumus, tam certas fuisse observationes. Igitur sive recte habeat Solis apogaeum sive secus, certus est medius ab aequinoctio intra $1\frac{1}{2}'$.

Quarto, eadem mutabuntur in casus secundi computatis locis et constituenda longitudine media, transpositis scilicet apogaeo et fixis.

Quinto, manente apogaeo Solis et longitudine fixarum Ptolemaica, usurpatur eccentricitas Solis hodierna.

Manentibus igitur primo et ultimo loco Solis quam proxime, mutabitur apparens locus Solis mediae observationis $20'$. Nam illic cadunt circa apsidas Solis, ubi aequatio parva est; hic circa longitudinem mediam, ubi aequatio ab eccentricitate causata est maxima. Ac cum adjectoria sit in ∞ aequatio: ereptis $20'$ ab aequatione retroagetur Sol totidem minutis: eritque non in $29^{\circ} 31' \infty$, sed in $29^{\circ} 11' \infty$. Sequitur igitur correctio et verissima oppositio horis 4. Tunc planeta erit in $29^{\circ} 27' \Omega$. Intervallum temporis prius ejusque motus medius augetur, minuitur motus apparens; posterius temporis intervallum minuitur augeturque apparens motus. Rursum igitur haec adhibita correctio, evidentius quam prior vocat nos ad mutationem hypotheseos; nisi optimo consilio in verba et numeros hypotheseos hujus seculi jurassemus. Nam ut circa apogaeum majori tempore minus promoveatur planeta, circa perigaeum in minori tempore plus, fieri aliter non potest, quam aunctione eccentricitatis. Quodsi retinerentur omnia, ut casu primo, prodiret quidem primo et ultimo tempore rursum, quod tunc, sc. $21^{\circ} 7' \Pi$ et $2^{\circ} 37\frac{1}{2}' \times$, at loco medio prodiret $29^{\circ} 36\frac{1}{2}' \Omega$, cum

debuisset $29^{\circ} 27' \mathcal{Q}$, differentia $9\frac{1}{2}'$. Ut haec oblitteretur, manere debet aphelium fere, sed motus medius debet omittere $3\frac{1}{2}'$; tunc prodibit

Primo	21° 4' II	Debit	$\left\{ \begin{array}{l} 21^{\circ} 7' \Pi \\ 29. 31. \mathcal{Q} \\ 2. 36. \times \end{array} \right\}$	Differentia	$\left\{ \begin{array}{l} - 3 \\ + 2\frac{1}{2} \\ + 2\frac{1}{2} \end{array} \right\}$
Secundo	29. 33½. Q				
Tertio	2. 38½. x				

Sexto, eadem continget mutatio casus secundi, si eccentricitatem Solis et longitudinem fixarum simul mutaverimus.

Septimo, sin autem et eccentricitatem Solis et apogaeum simul mutemus, conjunctis casibus tertio et quinto, erunt fundamenta ista:

Tybi .	XXVI.	h. 9. 0'	Loca	$21^{\circ} 4' \Pi$
Pharmuthi	IV.	" 19. 39.	"	$29. 27. \mathcal{Q}$
Epiphi .	XII.	" 3. 37.	"	$2. 40. \times$
Intervalla				
d. 68.	h. 10. 39'	"	$68^{\circ} 23'$	
" 97.	" 8. 0.	"	$93. 13.$	

Manet igitur intervallum primum, ut casu primo; mutatur ultimum permultum. Et quia minori tempore plus itineris peractum, descendendum igitur versus perigaeum profundius. Horis quidem 8 de motu medio respondent $10' 30''$, quibus adde excessum itineris 8. Ita colliguntur $18\frac{1}{2}'$, quae conficiemus, si aphelium per $1^{\circ} 12'$ retroegerimus, ut sit ultimo tempore in $29^{\circ} 29' \mathcal{Q}$, et anomalia media $31^{\circ} 45'$. Motus igitur medius $11^{\circ} 4' \times$, qui primo casu fuit $11^{\circ} 18\frac{1}{2}' \times$. Hinc computamus:

Primo	21° 3½' II	Debit	{	21° 4' II
Secundo	29. 26½. Q			29. 29. Q
Tertio	2. 41 ↗			2. 40. ↗

Denique omnibus tribus, quae ex Ptolemaeo sumseramus mutatis, componetur effectus ex casibus septimo et secundo.

Apparet igitur, epocham motus medii ab aequinoctio et fixis non mutari multum, neque eccentricitate Solis neque apogaeo neque utroque simul mutato: sed tunc tantum, quando fixarum loca mutantur. Nam casus tertius addit $1' 30''$, quintus aufert $3' 30''$, septimus aufert $4' 30''$. Solum secundus casus aufert a motu medio ab aequinoctio $10'$, a fixis $20'$. Hinc igitur duplex constituitur epocha motus ad Ptolemaei tempora.

Quid si vero ex casu secundo et quinto comminiscamur aliquid idoneum, quo simpliciter tueamur longitudinem fixarum Ptolemaicam, neque nobis sit opus, duplicem suspicari hanc epocham motus medii Martis? Nam Ptolemaeus diserte affirmat, se in illa sua observatione distantiam Lunae a Sole invenisse $92^{\circ} 8'$, quantam etiam computaverit ex sua hypothesi motuum Lunae. Vera dixerit Ptolemaeus, satis dexter fuerit in observando; plane tantam deprehenderit hanc distantiam in instrumento suo, quantam voluit ejus hypothesis motuum Lunae, quae circa quadraturas non fefellit. Hinc ego sic argumentor. Si Sol fuisset in $3^{\circ} 5' \times$, quorsum illum Ptolemaeus reposuit per suam eccentricitatem, non potuisset Luna videri ab illo abesse justum et computatum ex hypothesi modulum $92^{\circ} 8'$: eo quod Sol occidens refracte ad visum pervenit, et altior justo (itaque $30'$ plus in consequentia) esse apparet, quam est. Quia vero a Luna ad Solem observatus est arcus $92^{\circ} 8'$, isque in rei veritate ob refractionem fuit $92^{\circ} 38'$: ergo Sol verissime non fuit in $3^{\circ} 3' \times$, sed in $2^{\circ} 33' \times$. Id autem con-

2° 30' Ω : Solis igitur medius praecedebat cor Leonis 5° 1° 47' 0". Sed anno 1599. d. 23. Februarii h. 3. 30'. Huennae fuit medius Solis 12° 47' 41" \times , cor Leonis 24° 15' 30" Ω ; Solis igitur medius praecedebat cor Ω 5° 11° 27' 49". Annis 1460 Aegyptiis desunt 9° 40' 49". Colligimus in tot annis per 2' 42" minus quam ex Prutenicis, eritque epocha in radice Christi 1. Januarii in meridie 5° 7° 14' 36" a corde Leonis. Similiter progressus apogaei Solis invenitur 8° 23' et in radice Christi 1° 27° 48' 0" ante cor Leonis.

Caput LXX.

Duarum reliquarum Ptolemaei observationum consideratio, pro exploranda latitudine et orbium proportionem tempore Ptolemaei.

Verum est, quod non semel monui, Ptolemaeum longe plures adhibuisse observationes, quam quae relatae sunt in ipsius opus. Ecce enim, ad tradendam doctrinam investigandae proportionis orbium utitur observatione unica, eaque intra triduum vicina ipsi oppositioni. Dictum autem est cap. LIII, observationes tam vicinas immane quippiam peccare, si vel unum scrupulum errent. Sequamur tamen ipsius vestigia, et hypothesi jam constituta casusque primi fundamentis inaedificata, computemus et hunc quartum locum.

		Epiphi 12.	h. 8.	— Anomalia	●.	130° 37' 30'
		15.	h. 9.			
		dies 3.	h. 1.	Motus medius	1.	35. 39
Coequata . .	123° 43' 34"			Anomalia . .	132.	13. 9
Aphelium . .	120. 41. 0					
Locus eccentrici	4° 24' 34" \times .			Distantia	143660.	

Locus Solis verus die 12. fuit 2° 36' II. Adde motum tridui et horae circa apogaeum ex hodierna experientia 2° 53' 40", ut sit 5° 29' 40" II, et usurpetur hodierna apogaea distantia 101800. Differunt igitur oppositus Solis et eccentricus Martis per 1° 5' 6". Qui arcus apparet esse 3° 43' 14", ut sit Mars visus in 1° 46' 26" \times . Sin autem utamur eccentricitate Solis Ptolemaica, motus Solis tridui erit 1' minor, et Sol in 5° 28' 40" II. Itaque differentia 1° 4' 6", quae apparebit (per distantiam Solis et Terrae 102100 Ptolemaicam) 3° 45' 45". Igitur planeta cadet in 1° 43' \times . Dixit autem Ptolemaeus, visum esse in 1° 36' \times . Plus igitur justo colligimus per 7' vel 10'. At pars minima instrumenti Ptolemaici, quam semper in errore ponere cogitur, valet 10'. Et nota, si in loco eccentrico erravimus 2', jam 7' errabimus in viso loco. Referatur enim Mars ratione eccentrici in 4° 22' \times : jam videbitur in 1° 36' \times . Supra die 12. Epiphi abundaverat etiam 1 1/2'. Igitur haec consentiunt.

Et quia in tanta oppositionis propinquitate nihil notabile efficit diversa eccentricitas: age consulamus etiam observationem antiquiorem. Inter mane 18. Jan. anni ante Christum 272 currentis, et meridiem 1. Jan. anno 1. Christi, anni sunt Aegyptii 272, dies 51 et horae aliquot. Cum enim Alexandriae Sol in 25° \times oriatur h. 7, observatio Martis matutini

facta fuerit una hora ante, nimirum aurora surgente, hora igitur sexta, quae est Huennae hora quarta, a qua ad meridiem sunt horae 8. Per hoc intervallum temporis ex fundamentis superioribus invenitur medius motus Solis superasse cor Leonis $5^{\circ} 25' 32'' 50''$ cum anomalia $234^{\circ} 54' 34''$, aequationem habens ex Ptolemaeo $2^{\circ} 0' 30''$, ex Braheo $1^{\circ} 42' 54''$ adjectitiam: distantia Solis a Terra illic 98790, hic 98976. Medius vero motus Martis tunc superavit cor Leonis $2^{\circ} 6' 7' 12''$. Cum autem aphelium $3^{\circ} 48' 20''$ sit ante cor, erit anomalia Martis $69^{\circ} 47' 32''$, coaequata $60^{\circ} 15' 27''$, distantia 158320.

Hinc gemina via pervenimus ad finem calculi. Primo per eccentricitatem et aequationem Ptolemaicam. Tunc longitudo Solis a corde Leonis est $5^{\circ} 27' 33' 20''$, differens a longitudine Martis eccentrica $1^{\circ} 26' 35' 7''$ per $4^{\circ} 0' 58' 13''$, qua distantia arcuali et distantia Terrae et Martis a Sole ostenditur apparens elongatio a Sole $82^{\circ} 43' 46''$, igitur et apparens elongatio Martis, a corde Leonis $3^{\circ} 4' 49' 34''$. At secundo per Braheanam eccentricitatem et aequationes, si eadem et tunc fuisset ponantur, Solis locus apparens per $17' 36''$ erit anterior, seu $5^{\circ} 27' 15' 44''$, quare et angulus commutationis est $4^{\circ} 0' 40' 37''$, per quem et distantiam Solis a Terra nostram, quasi et tunc eadem fuerit, ostenditur apparens elongatio Martis a corde Leonis $3^{\circ} 4' 51' 28''$. Differentia inter utrumque calculum perexigua et nullius momenti. An igitur Mars videbatur quasi appositus seu adaptatus boreali fronti Scorpium? ut sonat observationis descriptum. Videamus. Ptolemaeo est cor Leonis in $2^{\circ} 30' \text{ } \varrho$, borealis clara frontis Scorpium in $6^{\circ} 20' \text{ } \text{m}$, elongata per $3^{\circ} 3' 50' 0''$; Braheo cor Leonis in $24^{\circ} 17' \text{ } \varrho$, frons Scorpium in $27^{\circ} 36' \text{ } \text{m}$, elongatio $3^{\circ} 3' 20' 0''$. Elongatio vero Martis jam est computata $3^{\circ} 4' 51' 28''$. Differentia est sesquigradus.

Ptolemaeus huic observationi confusus, quod ex iis, quibus inniti posset, antiquissima esset, constituit procul dubio proportionem illam orbium, quam adhuc invenimus in ejus numeris, et quantam requirere videbatur haec observatio. Nam in motu medio ad hoc tempus computato non ultra 20' a me dissidet. Residuum igitur est ex proportionem orbium. Nam quod simulat, se hanc proportionem investigare per observationem triduo distantem ab oppositione, fecit, ut videretur diversa diversis evincere observatia. Quia igitur haec antiqua reservanda fuit inquirendis motibus mediis: illam igitur inquirendae proportioni orbium substituit, jam pridem per hanc inventae. Nam absurde tentari proportionem orbium per observationem tam vicinam oppositioni, quam fuit illa, qua Ptolemaeus se hanc proportionem demonstrasse simulat, id jam est dictum.

Ne quis igitur miretur, nos differre sesquigradu ab observatione, quam ex antiquitate Ptolemaeus arcessivit: quin potius inspiciat ejus proportionem orbium, valde diversam ab ea, quam hodiernae probant observationes, et perpendat, ut ille hanc observationem tueretur, ita vitiasse suorum orbium proportionem.

Quod ipsam observationem attinet, cujus haec verba sunt: *ὅπως ὁ τὸν Ἀνδρῶς ἰδοὺν προστεθεινῆται τῷ βορρῶν μετώπῳ τοῦ σκορπίου*, existimo, errorem esse commissum a Ptolemaeo, qui primam Scorpium intellexit, cum observator quintam innueret. Id ex ipsis verbis probatur. Nam frons Scorpium sex stellas claras habet. Ex his insignes tres, tertiae vel potius secundae magnitudinis: reliquae tres quartae, vel potius, me aestimatore, tertiae sunt magnitudinis, quarum una altior est tribus claris et septentrionalior. Jam

si observator claram frontis, quam Braheus recte secundae magnitudinis pronunciat, quamque Ptolemaeus subintellexit, borealem frontem nuncupavit, numquid ambigue locutus est, dum pro clarissima borealium simpliciter borealem dixit, quae borealissima non fuit? Multo igitur tutius ego borealissimam, quae quinta numero est, ab observatore dictam subsumsero. Deinde consentit mea computata longitudo Martis cum hac, non cum clara frontis, et hoc manente hypothese, quam hodiernae genuerunt observationes Braheanae. Nam Braheus illam borealissimam reponit in $29^{\circ} 3\frac{1}{2}'$ η . Aufer cor Leonis in $24^{\circ} 17'$ ζ , restabit illi elongatio a corde $94^{\circ} 46\frac{1}{2}'$. Noster calculus vero Martem refert in elongationem a corde Leonis $94^{\circ} 49\frac{1}{2}'$ vel $94^{\circ} 51\frac{1}{2}'$. Differentia $3'$ vel $5'$, non major.

Non diffiteor, negotium mihi exhibitum esse a latitudine, dum expendo verba: *ἰδόναι προστεθεῖσθαι*, quasi diceret: Videbatur ita prope accessisse, ut duae pro una quasi stella haberi possent, ut viderentur se mutuo tangere. Etsi Arabs vertit cooperuisse, quasi scripsisset Graecus *ἐπιπροστεθεῖσθαι*, itaque in Opticis fol. 321 usus sum voce „superpositum.“ Germani propriissime *drangeſetzt*. Ex hoc ratiocinabar ita: sive subtercurrerit centraliter, sive oram ejus boream austrinamve raserit, non potuisse ab ipsa distare in latitudine magna aliqua portione; minus namque incertas esse latitudines quam longitudes, quia constantior et simplicior est earum ratio, ut hoc libro demonstratum est. Jam scimus, nodum retrocedere a fixis spatio anni Cynici per $4^{\circ} 15'$, ut probatum cap. XVII. Ptolemaeo fuit existimatus limes boreus antecedere $3\frac{1}{2}^{\circ}$ cor Leonis. Nobis per intermedios 1310 annos unum gradum retrocesserit; ut tempore observationis fuerit $2\frac{1}{2}^{\circ}$ ante cor Leonis. Ergo nodus $87\frac{1}{2}^{\circ}$ post cor Leonis. Sed Mars per $56^{\circ} 35'$ est post cor Leonis, ergo abest 31° a nodo, inclinationem faciens $57\frac{1}{2}'$, quae per parallaxin orbis efficitur $1^{\circ} 7'$ justa latitudo. Jam vero constat ex Braheo, latitudinem clarae frontis esse $1^{\circ} 5'$, borealissimae vero frontis $1^{\circ} 42'$. Itaque latitudo videbatur me convincere de clara frontis, ut crederem, hanc a Marte tectam fuisse, non illam.

Sed fortuita est ista conspiratio numerorum. Nam in latitudine borealissimae frontis consentiunt Braheus et Ptolemaeus, eam pronunciantes: ille $1^{\circ} 46'$, hic $1^{\circ} 42'$. In splendidae latitudine differunt. Ptolemaeus habet $1^{\circ} 20'$, Braheus $1^{\circ} 5'$. Sed illa numerorum aequalitas est de errore; haec vero differentia consensus potius est. Stellarum enim in η \times ζ \approx borealium latitudines hodie sunt minores quam olim, circiter $16' 20''$; australium majores per tantundem; quippe ecliptica transposita, et declinationibus graduum eclipticae tantundem mutatis, ut Braheus demonstravit et nos cap. LXVIII. diximus. Itaque si verum est, ut est verissimum, hodie latitudinem clarae in fronte Scorpiae esse $1^{\circ} 5'$: igitur tempore Ptolemaei et Hipparchi fuit non minor $1^{\circ} 20'$, potius major. Cum igitur Mars minorem obtinuerit latitudinem borealem, quam utraque dictarum stellarum, et sub utraque transiverit (certum enim est, si in nodo vel integro gradu abundemus, non ultra tria scrupula latitudinem in calculo vitiatam esse. Et jam supra cap. LXIV. ostensum est, incertissimum esse, an olim Marti quoque borea latitudo in signis australibus major fuerit): frustra itaque in voce *προστεθεῖσθαι* fui argutus: nec aliter illa explicanda est, quam de appositione stellarum in eandem longitudinem; quo nomine illa, quam ego dico, nihil impediens latitudine majore, aequae esse potuit ac ista clara.

Vide num possit hic esse sensus, quod cum in boreali parte frontis

sint tres stellae in forma trianguli, Mars spectatus sit in medio earum, et sic *appositus fuerit boreali fronti* Scorpii; factus nimirum fuerit una ex numero earum, quae sunt in boreali parte frontis Scorpii. Ad hanc enim interpretationem facit et hoc, quod non dixit observator *boreali frontis sed boreali fronti*, quod non sonat de una singulari stella, sed de parte constellationis integrae.

Nihil igitur juvant nos hae duae antiquae observationes ad aestimandam vel latitudinem vel orbium proportionem illius temporis. Itaque cum nihil nos impediant observationes contrariae, confirmet vero nos summa rei verisimilitudo, concludamus, eandem esse et hodie proportionem orbium, quae fuit olim, latitudines vero maximas nonnihil hodie esse immutatas.

IN COMMENTARIA DE MOTIBUS MARTIS

NOTAE EDITORIS.

1) p. 30. Tabulas has eodem forte tempore adiit Keplerus, quo adjunxit Tychonis Progymnasmatum edito volumini primo (1602) folia, quae continent „Lunae motus restitutionem“ inspersam inter paginas illius operis 112 et 113, signata numeris 01—028. Insunt illae tabulae manuscriptorum Petropol. Vol. II. inscriptae: Transformatio hypotheseos et tabularum Lunarium Tychonis Brahe, plane ad typum informatas, praemissa dedicatione ad Herwartum d. d. X. Cal. Majas 1603. Legentur ea, quae imprimenda ex hoc scripto visa sunt, sub finem hujus voluminis.

2) p. 32. Longomontanus, Tychoni supra modum addictus, Tenguagelique contra studia Kepleri defensor non integer, Keplerum acerrime aggreditur in literis mense Majo 1604 datis, etsi exordium harum literarum talia non significat. ♦ Sic enim Longomontanus: Doctissime M. J. Keplere, amice veteri necessitudine conjunctus. Annus jam alter agitur, ex quo nobilissimus Fr. Tenguaglius, gener et successor incomparabilis astronomi D. Tychonis Brahe, Wiburgum ad me scribens inter alia tñam ut mihi videtur nimiam industriam circa refutationem recentis Tychonianae in Lunam hypothesis (veluti suis oculis vidisset) mihi retulit. Ego vero ejus literis responsurus nec in manes defuncti Tychonis nec etiam propriae conscientiae innocentiam tam me crudelem esse existimavi oportere, quin te ab hac superflua curiositate, quae in prioribus, biennio ante e Styria Pragam mihi missis, apparere coepit, ad tua ipsius incepta perficienda verbulo revocarem. Et certe, modo conditio mea tulisset, ita ex illius et mea simul opinione meritis fuisses, ut Pragam me denno conferens palam de hac injuria tecum expostularem, in quam inexpectata inconsiderataque opera tua laborem pariter et amicitiam nostram resolveres. De te autem... (v. s. p. 33). Huic equidem non retorsionem, sed modestam quae me decebit responsionem oppono, dum hic Rostochii amicorum causa maneo et epistolio tuo destitutor, quod huc trajiciens Hafniae imprudenter neglexi. Principio vero, mi Keplere, cur tibi tantopere applaudas? Quod hypotheses Lunae transformasti, fundamentis Tychonianis ne in minimis quidem convulsis?... Quaedam emendasti ad divinas tuas proportionem scilicet; verum quae calculo astronomico per te promptiora existimas, ea certe vix menti incluti D. Tychonis respondebunt.... Dic, quaeso, quid te tabularum omnium prosthaphaeresium tam foecundam fabricam docuit, ut tales tabulae ceteris similiter planetis essent communes ac sufficientes, latentibus adhuc te veris horum phaenomenis? Ignaris tu igitur persuade et intelligentibus desine amplius absurda narrare. Sed ulterius ad tuum Angiae stabulum pergamus. — Dein recensitis iis, quae ipse in Lunae theoria perfecit, addit: haec tu mi Keplere ceteraque forte omnia, quae a Tychone inventa ac elaborata sunt, sterquilinio in Angiae stabulo olim sepulto aequare non vereris (Keplerus in margine: haec per luculentissimam injuriam mihi tribuit), tuumque ad ea expurganda rursum laborem ac carrum promittere, si te Herculem redivivum agnosceremus. At id certe nemo facit teque tanto viro praefert, nisi ejus omnibus purgatis cognoscat, te coelo et coelestibus apparentis congruentiora substituisse. Nam hinc astronomo victoria spectanda, hinc triumphus. Id autem non metuo, quod ad praclaram censuram omnium bonorum et intelligentium de defuncto Tychone haec sordida tua insolentia magis sordescat et sordida fiat. (K.: Debacchare in larvam a te concinnatam.) —

Jam adit L. eclipses, semidiametros luminarium, refractionem, ubique Keplerum refu-

tare studens, cujus sensum non percepit, et sic concludit: quare demonstrationibus, ut te decet, in posterum agas peto, neque propter male affectatam in scribendo ad me festinationem tuam et mentis tuae obscuritatem, et veritatis in tanta causa occultationem et simul forte mei contemptum quaeras. Apologiis et retorsionibus minime opus erit: sed potius sincero et amico pectore, ad veritatem et justitiam, quarum virtutum D. Tycho dum vixit observantissimus semper fuit, ubique directo. . . . Sed quia Laconismum tuum prolixitate potius nimia quam ullo Attico splendore, quo mathematicus semper carui, a me pensari video et simul epistolae modum excedi, finem hic facio, teque per amicitiam nostram et nostrae professionis *κοινωνία* rogo et hortor, ne tibi occasionem ulterius calumniandi ex hac innocenti mea responsione arripias &c.

3) p. 35. Verba haec comparata cum iis, quae de dissidiis inter Keplerum et Tychonis haeredes ortis p. 12 s. diximus, his explicantur: Keplerus, Tychone mortuo, ejus in locum successit salario 500 florenorum (Tycho accepit 3000 „aureos“ annuos) promisso, saepius vero non soluto. Haeredes Tychonis item ex aerario publico acceperunt haud exiguum summam, majoremque efflagitabant. Aerarii tenuitas illorum precibus respondere non permisit, quare ad edenda patris opera confugerunt Keplerumque, ex parte quidem in hunc finem ab Imperatore constitutum, segnitatis accusarunt. Maturanda Tychonis operum editio Caesaris quoque consiliariis visa est, ut molestos sollicitatores ab aerario revocarent, et Tegnagelio, collegae, satisfacerent, qui rem parum perspicuens confectionem tabularum haud multi laboris ducebat. Keplerus contra pro eruditione sua et ingenii acumine difficultatem rei primo adspectu cognoscens simulque Rudolphi inserviens deliciis excusabat moram, alias, id quod res erat, occupationes memorans. Jam, Keplero forte non dissentiente, constitutus est Joh. Pistorius studiorum ipsius quasi magister, quod ipse Keplerus refert, Odontio (d. 5. Aug. 1605) scribens: „D. Pistorium quod attinet, is eo loco mihi a Caesare constitutus est, ut temporis rationem ipsi debeam: quo nomine celare ipsum nihil possum de meae professionis studiis, seu publicum id sit, seu privatum.“ — Munus sibi mandatum Pistorius (canonicus tum temporis Constantiae et Imperatoris Rudolphi sacerdos confessionis) dum Pragae versabatur respiciens Kepleri excusationes exegisse videtur, neque illud Praga relicta Friburgum transgressus plane omisit, testibus his verbis, quae desumimus ex epistola ad Keplerum data (14. Mart. 1607 Friburgo). „De mathematicis laboribus et D. Tuae et Domini a Tegnagel quid obsecro factum est hactenus? Ubi Commentarii in motum Martis? Ubi Ephemerides? Ubi Tabulae Rudolphinae? De quibus omnibus certior fieri cupio.“ — Ad has quaestiones respondit Keplerus: Tegnaglius ex Anglia ante 3 menses rediit. Caesar mihi dedit 400 florenos in Comm. Martis. In eo jam labore sum. Excuspuntur jam typi lignei. A Tegnaglio veniam publicandi opus nondum habeo, et Caesar inhibuit distractionem exemplarium ad suum arbitrium. Ephemeridum nulla in propinquo spes, quia Mars in meo cerebro manibusque tumultuatur. De Rudolphinis tandem Tegnaglius videtur spem abjecisse: non ego, si vixero. Si me pactis nostris impedit aliquid evulgare Tegnaglius, excipiam: deceptum me esse, cum promississet ipse intra 4 annos Rudolphinas edere; huic ego promissioni, quae facta est Caesari, inimicus promisi expectare donec prodeant illae Tabulae, postmodum libertate philosophica mihi reservata. Jam nullas ille tabulas unquam scribet: irrita ergo pacta nostra, etsi conditionem de 4 annis non continent; sufficit hos 4 annos Caesari nominatos. (E literis d. 12. Jun. 1607, quarum partem majorem libris chronologicis praemisimus.) Herwartus pluries cum Pistorio egit de Kepleri conditione illumque annis 1602 et 1603 accuratius inspexisse hujus studia testantur literae aliquot Herwarti ad Keplerum, in quibus adit quoque simultates cum Tychoniceis. Illa certe spectant ea quae legimus in literis d. d. 24. Feb. 1603: Tychonis instrumenta, wie mich bedunkt, in utramque aurem dormiunt. Ich hab cum D. Pistorio davon gesprochen, wann nit die ganze Disposition dem Herrn untergeben würt, halt ich für mein Theil nichts davon und wird ohne Zweifel der Effect den Expensis nit correspondieren und per consequens res ipsa labascieren. — Item etiam haec: Als D. Pistorius hier durchgereist, hab ich nit unterlassen, gebührende officia und Erklärungen zu thun, so seiner Zeit nit ohne Frucht abgehen werden. (Comp. Vol. I. p. 653.)

4) p. 37. Quae in Opticis Keplerus de Gilberti opere mirabundus affert, vide Vol. II, p. 221. — Haud ita multo post editum opus „De Magnete“ Keplerum illud adiisse, quis dubitet? Herwartus jam anno 1598 quasdam de magneticis moverat quaestiones, ad quas quae responderit Keplerus Vol. II, p. 812 leguntur. De Gilberti opere Herwartus (d. 21. Nov. 1602) haec dedit Keplero: Der Herr wird gelesen haben, was Gilbert de Magnete angehen lassen, desgleichen nie gesehen und gehört worden, obgleich er soviel zu


verstehen gibt, dass er in geometricis sonderbar nit versiert. Ich wollt des Herrn judicium, beverab indem er motum Terrae daran zu erzwingen vermaint, gern vernemmen.

Quibus respondit Keplerus (d. 12. Jan. 1603): In magneticis, uti novit M. Tua, multus fui. Portae experimenta pleraque examinavi vel ad rationes vel ad periclitationem propriam, quantum infirmi lapide potui. Aliquos etiam ejus errores hoc pacto deprehendi, quos nominatim alicubi taxat et Gilbertus. Verum ita fuso, distincte, sufficienter tractavit hanc rem Gilbertus, ita undique nobilissimis experimentis se munivit, omnium contradicentium ora obstruxit, ut plane evanescant meae speculationes de tarda illa migratione poli motus diurni ex locis Terrae, quae in creatione illi fuerint subjecta. Quam speculationem tanto libentius depono, quod invenio, hic Pragae ante 200 annos observatam altitudinem poli consentire quam proxime cum ea, quae est hodie. (Comp. Ep. ad Maestl. p. 54.) At poscebat analogia motus ab Antonio Maria (comp. Vol. II, p. 220) mihi monstrati, ut intra hoc tempus 10—12' variata fuerint.

Legam integrum opus ubi plus otii erit; jam maligne inhaerent memoriae, quae ante biennium in mea febris quartana ex eo animi gratia delibavi. Si qua mihi nascentur dubia, cum M. T. communicabo. In praesens ista: Variationis causae, quam affert (libro IV.), videtur obstare, quod montana regionum ad integrum globum nullam habent proportionem. In declinationibus (lib. V.) mihi expertu vel impossibilia vel sumtuosissima experimenta proponit, ubi fides est penes auctorem. At quia consentanea dicit et in ceteris fides ejus explorata est, nihil est cur suspectum habeam; nam ex stilo apparet, virum gravem esse nec vulgarium Itolorum similem. Ad haec tot et tanta et tam controversa supraedificat, ut non injuria censi debeat, declinaturum fuisse infamiam, quae ipsum secutura fuerit, si falsa alleget experimenta. Et passim taxat fabularum architectos, potuitque nemine suggerente illud cogitare, turpe esse doctori, cum culpa redarguit ipsum. Accedit peculiare argumentum, cur et in directionibus ipsi fidem habeam. Quantitatem declinationum proponit ille perplexis nescio quibus curvis lineis, *το ὄρι* afferens modumque metiendi qualemcunque, non dissimulans, se *το διῶρι* particularium dimensionum ignorare; quo minus suspectum est ipsum *το ὄρι*. Ego vero deprehendo causam illarum dimensionum geometricam, quae propemodum idem praestat, quod ipsius *ἀνακτιῶρι* curvae lineae: nec curo de discrepantiuncula minima; nam sensus in hisce tenerrimis experimentis ac praesertim in tam parvis globulis non descendit ad minima. Causa quam dixi geometrica haec est: in globo magnetico dimidia pars porrigitur in septentriones, dimidia in austrum: et si ferramentum seu versorium sit in aequinoctiali globuli, dirigitur parallelus axi globuli, non inclinatur; si inde fuerit digressa, inclinatur. Itaque dimidius globus in causa versatur. Ceterum omnis declinatio in uno et eodem circulo maximo per polos eunte numeratur, quod inde fit, quia declinatio omnis ad polos vergit. Etiam si enim a pristino loco moveatur versorium ad ortum sub eodem parallelo et sub eadem distantia a polo, itaque accadat, ut cum prius sub meridiano primi loci declinaverit, jam non sub illo, sed sub alio meridiano abnuens a vertice primi meridiani: tamen hoc non venit in censum declinationis, quia meridiani infiniti sunt, nullus alio potior, ut ad illum solum ceterorum declinationes comparentur; polus vero est unicus, et ad illum comparantur declinationes omnium a polo distantiarum. Ex quibus conficitur, dimidium globi ad mensurandam declinationem non adhiberi corpulentia sua, quia neque declinatio in longum et latum, uti dixi, sed tantum in latum mensuranda praestat. Ubi si etiam ad longum respicias, declinatio potius nulla est in longum, eo ipso, quod dixi declinationem in meridiano, qui globum bisecat. Relinquitur ergo, si dimidium globi mensurat declinationes, non mensurat autem corpulentia, mensurabit igitur circulo maximo seu plano meridiani per centrum eunte, plano inquam bisecto, quia et globi dimidium tantum assumitur.

Sit ACB (Fig. 133) semicirculus globi magnetici seu telluriculae, AB in aequinoctiali, C polus, CD dimidium axis. A, E, F, G, H, C diversi positus versorii. Ducantur ex E, F, G, H paralleli ipsi AB. Cum ergo versorium in A est parallelum ipsi DA, nec inclinatur, quia totam quantitatem ACB plani habet ante se,

Fig. 133.




versus partes poli C ab aequatore AB. At cum est in E, habet aream AEIB post se, quae jam operatur ad declinationem faciendam. Nam etsi quid possit ECI, et aequali spatio in globi australi parte impeditur et *avdeslaxat*. Non sic AEIB, nam et id et ei aequale in australi parte globi est post versorium. Ita fit, ut in tantum crescat declinatio in A, E, F, G, H, C, quantum crescit spatium semicirculi, quod post se relinquit.

Et quia declinatio ab A in C est 180° , ut ergo area AEIB ad aream ACB, ita declinatio in E ad declinationem in C. Videmus, ait Gilbertus Lib. V. cap. 6, cum versorium fuerit in 45° , dirigi in aequatorem. Sit in G, linea directionis GB, quia B in aequatore. Cum ergo sit AG 45° , erit ABG $22\frac{1}{2}^\circ$, igitur ab A in G per $112\frac{1}{2}^\circ$ conversum est. Connequantur G, L cum D. Et quia LDG rectus est, erit area trianguli LDG pars quarta quadrati. Jam sector GDL est pars $\frac{1}{4}$ circuli, ergo area 7853981634 ex Adriano Romano. Subtracto triangulo GLD a sectore GCLD, relinquitur segmentum GCL 2853981634. Est vero integer semicirculus 15707963268, est ergo GLBA area 12853981634. Videbo an eadem sit proportio hujus areae ad semicirculum, quae est inclinationis $112\frac{1}{2}^\circ$ ad 180° . $157 \dots \text{dat } 180^\circ$, quid $128\frac{1}{2} \dots$ &c.? Prodeunt 147° fere. Sed me fallit memoria. Sic agendum. Cum declinatio componatur ex transpositione versorii et deflexione virgulae ab ipsa perpendiculari versorii, transpositio quidem se ipsam metitur, ut linea, quae circum in A tangit, 45° , quia G est in 45° . Inclinatio vero super hanc tangentem censenda venit, et est 90° ab A usque in C, quia lingula in C perpendicularis est tangenti, in A parallelos illi. Haec inquam pars proportionatur areae, itaque si tota area semicirculi facit inclinationem 90° , quid facit area GLBA in 45° ? Sequitur $73\frac{1}{2}^\circ$. Supra vero invenimus $112\frac{1}{2}^\circ$ et sublata inclinatione topica 45° , residua $67\frac{1}{2}^\circ$, differentia 6° , quam puto insensibilem in hoc negotio. Ceterum accessisse me propius ad rem ipsam existimo, totam comprehendisse non puto. Simile enim hic fere accidit, quod in dimensione refractionum et librae; ubi cernimus quidem, subesse modum mensurandi ex genere quantitatum, quem tamen nemo ad hunc diem invenit, prope verum omnes accedunt. Nam dissimulandum non est: nudos sinus nobis propiorem mensurandi rationem monstrare. Quia enim in 45° sinus est 70711: ut sinus totus ad hunc sinum sic 90° ad $63\frac{1}{2}^\circ$, quae inclinatio composita cum topica 45° facit $108\frac{1}{2}^\circ$, debebat $112\frac{1}{2}^\circ$. Hic tamen causam non magis explicare possim, cur sinus metirentur inclinationem, atque Gilbertus dicere potest, cur quadrantes sui metiantur illam. Non est incredibile, Gilbertum id pro vero assumisse, quod proximum deprehendit; consentaneum enim videtur, ut loco medio inter polum et aequatorem declinet lingula ad aequatorem praecise, primum atque quis viderit illi alludere.

Paterisne, ut inter scribendum proficiam? Omnino puto non irascaris. Itaque causam jam modo desperatam, cur sinus metiantur has inclinationes, puto explicari posse in hunc modum, quo non ita pridem et librae mutamenta demonstrare videbar.

Sit ABC circulus seu in superficie terriculae seu in ipsius orbe virtutis, in quo B centrum lingulae convertendae. Et si A polus austrinus, C boreus. Cum ergo declinatio sit ob hanc solam causam, ut fiat uniti similium, et in lingula pars altera sit simili polo C, altera polo A, fit ut versorio in I aequatore versante, A et C singuli partes sub similes alliciant aequali virtute, unde fit, ut lingula in F sit parallelos AC, quia ab F perpendicularis demissa cadit in E centrum, dividens AC axem virtutis bifariam in E. At si in B longius abest ab A quam a C, minus ergo

Fig. 134.



allicit A quam C, idque in proportione ea, qua dividitur AC, axis virtutis, perpendiculari BD. Denique si versorium sit in C, totus axis stat ab una parte, nihil ab altera parte. Cum ergo nihil absit a polo C, totaliter a C dirigitur et unitur, nihil faciente polo A, quia nulla est proportio remotionis poli A a versorio in C ad plenarium contactum poli C. Ita causa patet, cur sinus distantiae ab aequatore, qui hic est BD, alludat ad mensuram. Simul etiam causa apparet, cur tam propinque coincidat uterque modus. Nam quia BD perpendicularis est, erit ergo ut CD ad BD sic BD ad DA, et cum sint triangula similia (aequalia) CDB et BDA, erit ut CD ad DA sic area CDB ad aream BDA. Jam parvo BCD parvum segmentum BCG accedit, et magno BAD magnum segmentum BFA, ut fere sit ADBF area ad CDBG, ut AD linea ad CD lineam. Prius autem per areas (earum dupla) operabar, hic per lineas sum operatus. Cumque quantitas, quam prodit Gilbertus, loco medio versetur, rursum est credibile, coincidere illam cum alterutro horum modorum. Quod autem ad motum Telluris attinet, facile poteris cogitare, magnopere me probaturum, quae ille (lib. VI.) ad Copernicanam rationem stabiliendam affert, cum Copernicanus et ipse sim. Velim tamen perpendas, ipsum probabilitatem saltem profiteri. Haec enim fere est ejus ratiocinatio: ferrum a magnete, magnes a Tellure movetur virtute aliqua quam proxime corporali, quia dimensiones accipit corporeas. Quidni ergo et Tellus ipsa moveri possit a virtute animali? Item, consentaneum est, id moveri quod naturalia habet motus circulatoria, non imaginaria. Terra habet polos naturales, axem naturalem, aequatorem naturalem et virtute naturali palpabili pollentem: et haec ad motum requiruntur. Ergo consentaneum est, Terram moveri. Jam de singulis Terrae motibus se dextre explicat. Si axis Terrae vergeret semper ad easdem fixas, credi possit, converti ad aliquid sibi simile, ut noster magnes ad septentriones vertitur sine anima, sola naturali unionis facultate. Sed quia paulatim relinquit fixas respectus ille axis Terrae moliturque sibi viam circa polos eclipticae in circulo minori, hinc apparet, non partes coeli dirigere axem Terrae, sed animam aliquam in ipsa Terra; alias semper eodem vergeret. Et hic respectus ejusdem puncti sub fixis continuus diem noctemque et per omnes anni partes (nisi quatenus tardissime nonnihil transponitur) dicitur a Copernico tertius motus Telluris, quem inclinationem appellat; superfluo nomine et quod rem ipsam occultet; ut nesciam an Copernicus ipse vim suae hypotheseos dextre intellexerit.

Ceterum diurnum Terrae motum omnibus machinis adstruit, de annuo suspendit sententiam: forte quia astronomus non est: alias, si bene novi ejus ingenium, mordicus fuisset arrepturus et hunc.


Praecessionem aequinoctiorum eamque inaequalem et obliquitatis eclipticae variationem, uti par est, ab axe Terrae suspendit nec male componit omnem hanc varietatem in lineis tortuosis.

Ad cap. 2. lib. VI. addo confutandi studii causa, Regiomontanum in Torqueto prodere alt. poli Romae $42^{\circ} 4'$, aliter $42^{\circ} 8'$. Exemplum Pragense contra Mariam prius attuli. Capite 6. lib. VI. ejusmodi verbis utitur, ut optem mihi alas, quibus in Angliam ad conferendum cum illo transporter. (Comp. Vol. II, p. 221.) Plane iisdem ego principiis omnes planetarum motus demonstrari posse puto. Dolet non mediocriter, non lectum illi esse meum libellum seu *Mysterium Cosmographicum*. Capitis 7. similia olim ad M. T. Graetio perscripsi. (Comp. vol. II, p. 812 ss.) Quae sequuntur Cap. 8. 9. de possibilitate sunt intelligenda, non de necessitate. Capite ultimo ostendit, qualem viam describere debeat axis Terrae directio, ut efficiatur talis anomalia praecessionis et obliquitatis, qualem ponit Copernicus. At nec ipsius nec Copernici tam operosis speculationibus opus esse videtur, quod exercitandi gratia, quia his delectaris, ex iis, quae de anni magnitudine et cohaerentibus concepi, in has chartas referam: si forte per te alii celebres mathematici ad considerationem hujus rei excitentur.

Certum est, inesse motui Solis non minus quam ceterorum planetarum defectionem in latum; quae de causa fit, ut fixarum latitudines hodie variantur, ut Tycho

et Rothmannus sufficienter demonstrarunt. Hic motus demonstratur et in hypothese conjicitur ad hunc modum. Sit in sphaera fixarum A polus eclipticae imaginariae seu mediae; polus autem eclipticae verae moveatur in circello BCDE in antecedentia, ut omnium planetarum nodi. Poli transpositionem sub fixis sequitur transpositio eclipticae verae, ut constat. Sit jam laxior circellus FGHI, centro A polo eclipticae, medio diastemate AF $23^{\circ} 42'$ (quanta est declinatio mediocris) descriptus. Sub hoc circello aequalibus temporibus praecepat directio axis Telluris aequaliter itidem in antecedentia. Constat, quod hoc pacto salvetur praecessio aequinoctiorum aequalis (siquidem esset verae et constantis eclipticae polus). Nam viam hanc esse circulum minorem patet inde,

Fig. 135.



quod ab Hipparcho per Albategnium ad nos non est facta major variatio obliquitatis, cum tamen 24° de hoc circello promoti sint. Nam sit exempli gratia KFL 24° . Respondet arcus circuli magni KML $9^{\circ} 36'$ circiter. Si quis ergo dixerit: viam

poli mundi seu axis Terrae esse non KFL in circulo minori, sed KML in circulo maximo, is AM declinationem multo facit minorem quam AK. In triangulo AKL sit latus unum AL $23^{\circ} 52'$, AK sit $23^{\circ} 32'$ et KL $9^{\circ} 36'$. Hinc angulus ALK $16^{\circ} 56'$. Et jam demissa perpendiculari AM, ex angulo MLA fiet $23^{\circ} 13'$. Tanta debuisset esse circa Alphonsi tempora declinatio eclipticae, si KL esset arcus circuli magni. Constat itaque, praecessionem aequinoctiorum fieri inflexione axis Telluris sub minori circulo KFL (quod quidem, ut obiter dicam, etiam motu coeli circa Terram fieri potest, si peculiaris huic motui orbis destinetur). Jam propius ad rem et compositionem utriusque circelli veniendum. Quia igitur constat, declinationem eclipticae verae tantum decrevisse, quantum latitudo stellarum, consentaneum videtur, utrumque esse ab eadem causa, sc. non a deflexione axis Terrae e sua via KFL, sed appropinquatione poli eclipticae verae in circello EBCE. Et jam quidem non ago de commensuratione motuum, tantummodo viam et primos quasi aditus rudiori Minerva tento. Sit igitur polus eclipticae tempore Hipparchi in D, nostro in B, declinatio illic DF $23^{\circ} 52'$, hic BF $23^{\circ} 32'$. Quaeritur, an hoc pacto et fixarum motus et anni magnitudo (quae ab invicem dependent) redantur inaequales? Omnino fient inaequales. Sit enim jam KF portio circelli, quem annuo motu conficit axis Terrae in praecedentia, seu fixae in consequentia, et connectatur K cum B et D. Triangulum igitur KBF majorem habet angulum B, quam KDF angulum D. Major igitur portio zodiaci ex B descripti subtendit angulum B, quam subtendit angulum D portio ex D descripti zodiaci. Velocior igitur in B est motus sub zodiaco aequinoctiorum in praecedentia, citius igitur Sol ad aequinoctium venit, et sic tropicus annus minor est. Tentabo dimensionem. Praecessio mediocris unius anni est ex Prutenicis $50''$ numerata in zodiaco seu etiam in circulo minori KL, estque angulus KAF. Sit KA $23^{\circ} 42'$, AB $12'$ et KAB $50''$. Qualium ergo sinus KAM est 2424, talium sinus KBM fiet 2443, sinus KDM 2405 circiter. Hoc pacto, quoties annus est brevissimus, ut inter Ptolemaeum et Alphonsum, requiritur obliquitas minima. Sane nemo eam tunc dimensus est. Et vicissim ab Alphonso ad nos ut annus sic obliquitas debet permanere aequalis, quod et verum quam proxime deprehensum est. Sed exercitii gratia dicta haec sunt; scio non ita leviter expediri posse. (Comp. p. 429.) —

Hucusque Keplerus; exordium harum literarum exhibuimus vol. I, p. 653; reliqua leguntur vol. II, p. 78, 755, 790. Concludit Keplerus: Mitto et hoc rejectamentum studiorum meorum (Prognosticum a. 1602) indignum Magn. Tuac, sed mittendum tamen, ne te tam sollicitum de meis studiis quidquam eorum lateat. Vale Vir Magnifice, meque promovere perge. M. T. devinctissimus M. Jo. Kepler.

Herwartus in responsione sua primum adit Kepleri Prognosticum, deinde petitionem,

ut Graetius pro Kepleri rebus haereditariis intercedat, denique sententiam suam de Copernici hypothese affert.

Edler &c. Als ich Ime geschrieben, hab ich sein Schreiben und Beilag nit bei der Hand gehabt; wie ich dieselb nochmalen ersihe, befind ich noch nit anderst, als dass Er in dem Prognostico (so ich gar gern gelesen, etlichen communiciert, und ob ich wohl, die Wahrheit zu melden, auf dergleichen wenig halte, hat es doch bishero stark zugetroffen, also dass ich es auch weiter communicirt) diese Wort setzt: „Dann zu Esale Zeiten ist der erste König zu Babylon Nabonassar (von dem die astronomische Jahrzahl heerrüret) gewest, deme man ingemein aber felschlich für den Salmanassar König zu Assyrien helt. Gleichwohl hernach die Assyrische oder Babylonische Monarchia under Nabuchodonosor daraus entstanden.“ Wie der Herr dies verstehet, kann ich nit assequiren.

Zu Grets weiss ich mich jert keiner mir sonderbar Bekannten, die Im in seinen negotia privata nutzen könnten, zu erinnern, ausser dass mir der Herr Bernardin von Herberstein, L. D. Stallmeister bekannt. Da ich dem Herrn durch diesen kann nützlich erscheinen, hat er mich willig und geneigt.

Des Herrn Optica noch viel mehr aber theoriā Martis ist man mit grossem Verlangen erwartend.

Ich höre gern, dass Gilberti Buch de Magnete dem Herrn auch wohlgefällig. Mich gedunkt es unzweyvenlich sein, dass in hac re noch keiner so weit penetriert. Wie wenig ich gleich jert Weyll hab, kann ich doch nit umgehen, einen Punkten anzuregen, indem nemlich der Herr meldet, „Gilbertus de annuo Terrae motu sententiam suspendit, forte quia astronomus non est.“ Nun gibt gleichwohl das Buch de Magnete, bevorab in den Figuren zu erkennen, dass der author ein astronomus. So ist nit ohne, dass per suppositionem annui motus Terrae die reliqui planetae des grossen epicycli entledigt werden, daher annuus motus Terrae nit eine geringe verisimilitudinem hat. Ich kann aber nit befinden, wann man gleich annum motum circuli magni Soli adscribierte, so dass reliqui planetae ihre alte epicyclos behielten, dass diese hypothesis so gar absona et absurda. Es wäre denn, dass darwider eine demonstratio geometrica fürgebracht werden könnte, deren man dann wohl müste weichen und Platz geben. Ich weiss mich keiner zu erinnern. Wenn aber auch annuus motus Telluri eingeräumt wird, muss aus Copernici demonstratione geschlossen werden, quod totus ille globus, cujus peripheria maxima est motus ille annuus Terrae (seu cujus radius est immensissima illa distantia Solis et Terrae) tanto et quidem adeo enormissimo intervallo a stellis fixis distet, ut respectu stellarum fixarum totus inquam ille globus immensissimae magnitudinis sit instar puncti.

Haec profecto suppositio apud multos viros cordatos et astronomiae hand expertes multis parasangis excedit omnem verisimilitudinem et credibilitatem; und vermeinen dieselben, es sey viel leichter zu glauben, quod reliquis planetis ex singulari sympathia, so sie cum Sole haben, die alten epicyclos zu adscribieren, als dass man eine solche hypothesin setze, so praeter et contra omnem verisimilitudinem militiere.

Ich hab gleichwohl gedacht, ob man praedictae demonstrationi Copernici per aliqualem motum Solis et reliquorum planetarum accessus et recessus, ultra eccentricitatem Solis admittendum, obviieren und hiedurch diese incredibilem immensitatem distantiae Solis, Veneris, Mercurii, Lunae et Terrae a fixis entfliehen möchte. Ich kann es aber meinstheils auch nit befinden. Ich wollte des Herrn resolution hierüber gern vernemen.

Tychonis Brahe instrumenta, wie mich bedunkt, in utramque aurem dormiunt. Ich hab cum D. Pistorio davon geredt, wann nit die ganz disposition dem Herrn untergeben wirt, halt ich für mein Theil nichts davon, und wird ohne Zweifel der effect den expensis nit correspondieren und per consequens algemach res ipsa labascieren.

Damit &c. Datum München d. 24. Febr. 1603.

P. S. Procopius p. 227 juncta p. 253 de anno Christi 535 ita scribit: Prodigium hoc anno gravissimum visum. ☉ sine radiis sicut ☾, splendorem toto anno omittere et quodammodo ex magna parte deficere visus est.

Quaeritur, ob nit ♀, ☿ vel etiam ♂ tunc intra orbem ☉ et Terram gewest und dieses hiedurch verursacht worden; weil Procopius damalen selbs gelebt und floriert, auch also de via proprio deponirt?

E Kepleri responsione (d. mense Majo 1603) haec huc pertinent: In meis negotiis domesticis res ita habet. Haeredes uxoris meae diem divisioni dixerunt S. Georgii. Mihi uxorem instructam, commendatam filiis Caesareis. Jam in eo res vertitur, ut ea commendatio si ab aliquo mihi favente suspiciatur, qui quicquid in meam gratiam fecit, id his imputare velit. Cum itaque modernus Cancellarius ex Bavaria eo

descenderet, spero tantam inter Vos futuram notitiam, ut abs M. T. profecta comminatione utilis esse possit.

Quod hypothesis Copernici attinet, ita est ut scribis, ingens bolus devorandus est: immensitas unius sphaerae fixarum. Solum hoc Tycho mihi solebat opponere. Negabat exempla similia in natura, ubi tam ingens et frustraneum vacuum, uti digitus instar montis ad reliquum corpus hominis. Ego contra proportionem ita requirerem: sicut diameter motoris (Solis) ad diametrum mobilem, ita haec ad diametrum loci in quo motus, sc. sphaerae fixarum. Cum enim parallaxis fixarum diversis anni temporibus existat non major $20''$, cum stellarum fixarum diametri aut ut plurimum 1 et 2', itaque evanescet haec parallaxis. Praeterea, si movetur inutile vacuum, moveatur etiamnum ingens inter planetas, maxime inter Jovem et Martem, sincerissimum vero vacuum a Terra usque ad polos etiam Saturni. Tum de exemplis naturae disquisitum: proponebam immanes serpentes, ipse affirmavit viam ab iis, qui Nordwagium oceanum navigant, bestiam trecentas circiter ungas longam; comparavi ego ad animalculum, quod ex putredine ortum cuniculas per cutem agit. Apparuit, proportionem intercedere majorem. Deinde negavi comparationis concinnitatem quaerendam inter mobilia et quiescentia. Non peccat, qui hominem comparat cum elephante, sed si quis hominem compareret cum motibus stellarum, genera transcendit et ineptit. His de causis verisimilior est mihi moles, quam illa sympathia. Interim vero dicis: demonstrata geometrica nulla impedire quominus quilibet planeta propter suum eccentricum talem describat epicyclum (cum omnibus requisitis, eccentricitate, puncto aequantis, motu apogaei, inclinatione ad suum orbem), qualem ipse Sol, et eodem tempore in easdem partes: idque vel eadem quantitate manente in quolibet epicyclo, quae est in eccentrico Solis, ut retineantur parallaxes Martis Tychonicae, vel neglecta parallaxi, ut tantum capiat quilibet epicyclum hunc, ne fiat intersectio, et eccentricus ejus in eadem proportionem augeatur. Illo modo plane id repraesentabitur, quod per Tychonis hypothesis, nisi quod Tycho compendiosius illos sex epicyclos in unum Solis eccentricum conflavit, et sic ipsis centris eccentricos juxta hunc communem motum adscripsit. Hoc altero modo fiet Ptolemaica hypothesis, et Martis epicyclus ingens, minor Jovis, minimus Saturni: nisi quod his ipsis epicyclis (insuper etiam Solaris eccentriculo) aequalis motus tribuatur, ut aliquali motu fixarum sphaera cum Terra circumeat, quod Ursus Apollonio mirabili audacia adscripsit. Tunc plane idem fit, quod apud Tychonem, nisi quod, quae hic stant, apud Tychonem moventur (hoc quidem motu) et contra.

Instrumenta, quod scribis, dormiunt equidem: sc. haeredum est rationem reddere. De expensis mihi plane nihil constat. Quiesco, et in meo salario acquiesco &c. (vid. Vol. II, p. 78). Procopii locum de anno 535. intelligo de sicca exhalatione non magnae altitudinis, in quam Sol mane et vesperi paulatim mersus, rubicundissimus et initio bisectus apparet; siccitatis comes, ut anno 1599. Aprili et hujus anni Martio (sane toto Martio, quod obiter addo, unus quadratus Saturni et Veneris tenuit): toto etiam Martio siccitas fuit — bene — sed illud erravit Prognosticum, quod tempus pluvium dixi, cum siccae existerent exhalationes. Id displicebit eis, qui definita in coelo quaerunt. Mihi hoc satis est, qui nil invenio in coelo nisi stimulum, in Terra vero materiam et ejus circuitum caecum. (Nil sequitur.)

5) p. 38. Vol. II. p. 568. exhibuimus literas Edmundi Brutii, d. 15. Aug. 1602. Florentia ad Keplerum datas, in quibus praeter ea, quae illic proposuimus, haec leguntur: Certum te facio, quod mea sors fuit, cum Magino concurrere in eodem curru a Patavio usque ad Bononiam, in cuius domo amice acceptus per diem noctemque mansi, quo temporis curriculo honorifice de te locuti sumus. Prodrum tuum ei ostendi dixique, te summo opere admirari, eum nunquam tuis literis respondisse: ast ipse mihi juravit, se nunquam antea tuum Prodrum vidisse, sed ejus adventum quotidie diligenter expectasse, mihi quoque fideliter promissit, se suas ad te literas brevi mittere velle, teque non solum amare sed etiam pro tuis inventis admirari, confessus est.

Causam, cur Maginus non responderit Keplero, ipsius Magini verbis exhibuimus in textu, pag. 5. verum aliam diximus causam verisimilem.

6) p. 39. Locus quem hic spectat Keplerus, legitur in Ptol. Almagesto IX. cap. 16.

Observatio posterior ab ipso Ptolemaeo facta est, ut refert, anno 886. a Nabonassaro; prior autem anno 484. Nabon.

7) p. 40. Numero hoc, quem dicit mysticum, in computandis planetarum aequationibus usus est Maginus. In „Supplemento Ephemeridum“ (Can. XII.) novam, inquit, aequationum tabulam olim supputavi, cum multoties expertus fuerim, fallacem esse calculi formam per scrupula proportionalia et excessum priorum; itaque ordinavi pro singulis planetis particulares tabulas, in quibus ordine primo habentur aequationes centri, in secunda columna aequationes orbis seu argumenti maximae. In tertio ordine reposui numerum mysticum, qui ex orbium commensurationibus dictis ingeniose colligitur pro dato situ eccentrici, ut per illum, neglecta aequatione maxima, absolvere possimus planetarum calculum &c.

Keplerus quaerenti Petro Crügero (Dantiscano professori math.) haec dat: Magini numerum mysticum deprehendi fortuito, postquam ipse eodem sub alia forma diu admodum essem usus. Est nihil aliud, quam ex divisione differentiae laterum per summam eorum quotiens in singulares et breves numeros translatus. Ut si sit $\odot \oslash 72500$, $\odot \oslash 101500$. Differentia 29000

Summa . 174000

Haec differentia 5 cyphris continuata si dividatur per summam, quotiens erit 166666 $\frac{2}{3}$, id est $\frac{2}{3}$ de 100000. Jam complementum anguli $\oslash \odot \oslash$ bisectum dat tangentem, qui si multiplicetur in hunc quotientem, absectis 5 producit tangentem arcus addendi ad semissem complementi $\oslash \odot \oslash$, ut prodeat $\odot \oslash \oslash$; subtrahendi, ut prodeat $\odot \oslash \oslash$. Si jam hunc quotientem 166667 liberet „mystice“ appellare 1, tunc ubi quotiens prodit 333333, is esset appellandus 2; vel si, ubi prodit 100000, is appellatur 1, tunc ubi prodit 200000, is appellaretur 2, et sic noster praesens appellaretur $\frac{2}{3}$. (E literis d. Lincii anno 1624.)

8) p. 45. His plura addit Keplerus, consilium suum de condendo canone explicans, et subiungit, si quis rem accuratius persequi velit, conderet librum foliorum (longa forma) 540 et in solidum ejiceret sinus, tangentes et secantes e doctrina sphaericorum triangulorum.

9) p. 54. Oratio haec (in mortem Tychoonis) habita est a D. Jessenio. Adjunxit eam Gassendus „Vitae Tychoonis Brahe“ cum carmine Kepleri (Gass. Op. V, 426), qui subscripsit: „Joannes Keplerus moestus posuit.“

10) p. 61. His jam dudum conscriptis, occurrit nobis liber inscriptus: Die Reformation der Sternkunde“ von E. F. Apelt, Jenae 1852, in quo eadem, quae sequentes exhibent paginae, haud exiguo doctrinae apparatu praemisso, deprehendimus, collectionem scilicet literarum Kepleri et Fabricii mutuarum, desumptam e codice Petropolitano, quem non alii cuidam conceditum putabamus, recordantes multa negotia et interpellationes per longam annorum seriem, quibus demum mota academia Petropolitana desideria nostris satisfecit. Quum autem editio nostra operum Kepleri omissis his literis non futura esset integra, illam ob causam institutam a nobis rationem operis non mutare decrevimus, praecipue cum Apeltus quaedam Kepleri et Fabricii literas vel plane omiserit vel non integras proposuerit, sed eodem quo prius ordine procedere. E Fabricii literis haec tantum desumsimus, quae ad illustranda Kepleri responsa necessaria visa sunt, haec vero integra, quantum licuit per amanuensis Kepleri negligentiam ignorantiamque, addidimus. Errorem Apelti hic non silentio praeterire possumus opinantis, literas has a Keplero ipso fuisse conscriptas. Contrarium testantur non tantum menda innumera, quae Keplerus haud quasquam commissurus fuit, sed praecipue manus ipsa a Kepleri manu longe diversa.

11) p. 74. Schema Kepleri his literis additum hoc tantum differt a schemate 69, ut punctum A infra lineam EG cadat, quare anguli non subtrahendi sed addendi sunt, sicut scribit Fabricio. Loco deinde literae D ponit literam K, loco C — B et viceversa. Adaptavimus Kepleri literas iis, quas schema 69. exhibet.

12) p. 77. Spectat his forte Keplerus idem schema, quod posthac Martis Commentaris addidit (Cap. XXIV), ordine vero alio quam hic innuit. Schema deest, quam ob rem nos verba Kepleri ad schema illud adaptavimus, quod facile fieri potuit, cum Keplerus vel potius imperitus amanuensis in manuscripto usus sit signis \odot , \oslash et T pro punctis in schemate per literas has signatis: $\odot = H, T, E, S$, $\oslash = G, F, I, K$; T per literam A, et ex parte quidem iisdem utatur verbis, quae cap. XXV. sub finem leguntur. Ceterum notandum, aegre quaedam a descriptore depravata quid valeant nos assecutos esse et quantum potuimus restituasse.

13) p. 90. Fabricii manus, ut alio loco diximus, adeo intricata et difficilis lectu, ut plurimum negotii exhibeat lectio singularum ejus epistolarum. Literarum autem, quas his verbis spectat Keplerus, deformitas omnem modum excedit, ut non mirum sit, non propius sum accessisse, praesertim cum schema, quod addidit Fabr., characteribus et lineis adeo im-

placitis et exilibus confertum sit, ut difficillime possit enucleari. Ceterum monemus, e sequentibus apparere, rem minime levem hic attigisse Fabricium, eamque ob causam nos verba ejus cum schemate (24) proposuisse p. 85, quantum fieri potuit.

14) p. 127. Filius hic Fabricii Joannes tum tempore literis operam dabat Wittebergae, unde adit Keplerum per litteras (d. d. 11. Mart. 1608), praedicans ejus inventa et quaedam tenus patris verbis repugnans: „Vidi apud parentem veram tuam motus Martis delineationem; sed vix aliquid extorqueo, quamvis descriptam habuerim. cujus tamen non potui fieri particeps. Hoc tamen vidi et ipsemet expertus sum, quod nihil pene a veris observationibus exorbitet, cujus rei periculum feci in observationibus 3 accuratioribus et ex officina Tycho-nis desumptis, cum in patria morarer. Scripsit parens ad me, quod Tua Praestantia libellum de motu Martis ovali editura sit brevi.“

Jam vero, ut vere natum tali patre agnoscas, astrologica tantum spectans pergît: „Nescio, an motus ratio una cum calculi processu addatur, quod equidem optarem maxime-
pere, ut et in astrologicis daretur facilis via ad internoscendos errores directionum et aliarum rerum, quae omnia mutila et manca sunt sine vera planetarum restitutione. Non possum autem meum inventum reticere de vera tempestatum praedictione, cujus veram rationem et modum ad parentem transmisi, qui illius veritatem experientia comprobavit. Hic modus adeo infallibilis est, ut si vel quaternae fierent uno die mutationes aëria, nunquam tamen in praedictione quis aberret. Ventorum noticia et conversio eorum perpetua infallibiliter cognoscitur, adeo ut non satis Deo gratiarum agere queamus“ &c.

Ad quae Keplerus „post d. 10. Nov. 1608“ respondit literis, quas integras hic adjungimus, cum ex parte quidem eadem referant, quae Keplerus in superioribus egit.

S. P. D. Quas ad me dedisti litteras 11. Mart. Fabrici doctissime, eas in turbulentissima tempora inciderunt. Furebat enim publice Mars, domi vero meae Venus; privignam enim elocabam et nuptiarum apparatu omnia perstrepebant. Noli itaque mirari, quod illarum sum oblitus. Abjeceram illas super fasciculum literarum, quas a tuo parente habeo creberrimas. Vix tandem ad me meaque studia reversus, cum etiam pater tuus pertinacissime instans rumperet tandem diuturnum silentium meum, tuae inter patrias mihi occurrerunt plane novae. Cum parente tuo hactenus egi ut cum aequali et tantum non cum discipulo. Qui postquam nunc prodiit stipatus filio acerrimi ingenii nec parva etiam inventionis cujusdam nobilissimae gloria, merebitur in posterum majorem a me venerationem. Et cuperem eradicatos ex meis ad ipsum literis pueriles nimis jocos: jam enim censorem filium expavescio.

Commentaria mea de Marte, de quibus quaeris, jam ultra annum haerent apud typographum Heidelbergae cum formis ligneis et pecunia: mira sane fortuna laborum rerumque mearum! — Recte censes, eandem per omnes planetas esse formam hypothesium, variantibus quantitativis. Itaque videre cupio tuas de Mercurii cogitationes multoque magis de Luna, quae sola quid peculiare habere hactenus creditur, nisi tu simplicem (ut refert) persuadeas. Rogo ut iis me impertias. Neminem enim hominum contemnendum duco nuper, postquam in literis patris tui diutissime neglectis etiamque contemptis ob schematum oculare vitium, ex insperato inveni hypothesin non parvi momenti: quae una omnes meas speculationes transfert in aliam formam, manente quidem ovali itinere tarditatis inaequalis.

De tempestatum praedictione exspecto inventum tuum, quod valde vereor ne plus habeat juvenilis fervoris quam veritatis: idque tanto magis, quanto tu specialiora ex eo te praedicere posse speras. Quod enim mihi super hoc negotio visum semper fuit, id jam multo maxime videtur, postquam idem ante 1800 annos et Gemino, in cujus lectionem nuper incidi, visum fuisse video. Itaque aut mihi tuis inventis praesta, ut aliter videatur, aut a me exspecta sanum consilium, quo inutili labore (quia impossibile) libereris. Nihil enim te celabo eorum, quae videbuntur cognito invento tuo.

Vale et si qua rescripseris cura, ut ad curiam ecclesiasticam Dresdam transmittantur.

Hic Kepleri adhortationibus motus Johannes abjecisse videtur „inventionem suam admirandam“ (nulla certe exstat ejusdem responsio ad litteras praemissas, neque nobis constat, num publici juris aliquid de his fecerit), et reversus ad patrem astronomicis studiis observationibus, patre in his duce praestantissimo. Detecto tum temporis tabo optico, maculas Solares primus conspexit Johannes — anno 1611 — quas detectas Vol. II. p. 773 n. pluribus retulimus. Mortuum refert filium pater in Prognostico in annum 1618.

15) p. 136. In editione „Scholarum mathematicarum“ quae nobis praesto est, curante Lazaro Schenero Frankofurti anno 1599 typis excusa, verba haec Rami deprehendimus pag. 47. Quae ut melius intelligantur haec addimus: Ramus in libro I. agit de „mathematicae primis inventoriis“, unde „artis dignitas intelligatur.“ Cum vero mathematicae a multis obijciatur inutilitas et obscuritas, Ramus libro II. has opiniones ex animis hominum evellere studet et hunc in finem veterum philosophorum placita congerit. Utilitatem mathematicae in astronomiis (voce utitur „astrologia“) demonstraturus, quid, inquit, astrologia tota aliud est, quam arithmetica numeratio motuum coelestium, quam geometrica globorum coelestium figuratio et dimensio? Astronomiam, queritur, plurimis esse involutam et impeditam hypothesebus, a quibus per mathematicam liberari possit. „Inde ab Aristotelis aetate vel potius mente“ astronomiam, non contentam observationibus, causas motuum &c. confinxisse. Eudoxum quidem hypotheses orbium revolvendum reperisse, quas Aristoteles et Calippus emendaverint; quibus se opposcentes Pythagoraeos epicyclos et eccentricos orbes induxisse. „Aetate nostra Copernicus, astrologus non antiquis solum comparandus sed in astrologia prorsus admirandus, tota antiquitate hypothesis rejecta hypotheses illas admirandas revocavit, quae astrologiam non ex astrorum sed ex Terrae motu demonstrarent. Veruntamen astrologi et veteres et novi centuriis tabularum ad hypotheses compositis astrologiam perinde oppresserunt. Enimvero satis constat, astrologiam veterem Babyloniorum, Aegyptiorum, Graecorum etiam ante Eudoxum sine hypothesis fuisse, et ab ea coelestium corporum motus numeratos ac praedictas eclipses esse, ut obijci non possit, hypotheses ideo necessitate ulla inventas esse.“ Commentum igitur &c. — Ultima Rami verba de cessione regiae professionis Keplerus jam pridem Maesthino jocans scripsit (comp. Vol. I, p. 34 s.).

De Oslandri praefatione ad Copernici opus dictum est Vol. I, p. 245 et 286.

16) p. 141. Concludit hoc poemate Tycho primam partem libri sui de stella nova, praemittens: „Hic prioris partis hujus libri, in qua de restitutione Solaris unaque Lunae curricula et affixarum stellarum accurata rectificatione affatim actum est, finem imponimus. Et sequenti exhortatorio ad artis hujus alumnos carmine, colophonis loco appposito, ad eam, quam de Nova Stella proposuimus pertractationem, jam tandem transibimus.“ Consuevit Tycho seriis suis speculationibus immiscere carmina, quae passim occurrunt in libris suis astronomicis, apud Gassendum et Weistritium (Vita Tychonis).

17) p. 144. In Tychonis opere inscripto: Astronomiae instauratae Progymnasmatum (tom. II. Pragae 1603), in folio, quod exhibet inscriptionem, depicti sunt vir et puer, quibus adscripta sunt haec verba, „Suspiciendo Despicio.“ Item in poematibus Tychonis quibusdam eadem deprehendimus verba, et Kepleri inscriptio poematis sui testatur, pro symbolo illa fuisse Tychoni, sicut Persii „o curas hominum“ &c. Kepleri fuit pro symbolo. In collectione epistolarum, quam Tycho publici juris fecit, quaerit Rothmannus (p. 89) quid haec verba significent. „Ab altera, inquit, paginae parte inveni binas imagines, alteram astronomiae, alteram ejus artis, quam spagyricam appellas. Quas cum diligenter intuebar, animadverti ab utroque earum latere literas quasdam, circa astronomiam quidem „suspiciendo despicio“ circa reliquam vero „despiciendo suspicio.“ Diu haec cum admiratione considerans cogitavi, hieroglyphica esse teque iis forte annuere, artem spagyricam continere totius naturae et mundi contemplationem et perinde ac astronomia suos habere planetas, ac quae natura agit per sidera coelestia, ea agere simili efficacia per sua sidera.“ &c.

Tycho respondit: hieroglyphica haec esse recte conjectasti. Nam non saltem utramque astronomiam coelestem illam superiorem et inferiorem terrestrem respiciunt, sed etiam ipsam diviniorem theologiam et totius ethices cognitionem. Prima vero fronte physicam rerum creaturarum considerationem prae se fert, in qua superiora inferioribus ita connexa sunt, ut neutrum sine altero recte percipi queat. Nam ars ea, quam spagyricam vocamus, totius naturae pervestigationem continet et astronomiae cujusdam terrestris exercitationem exhibet. Id sunt septem planetae in coelo, quod sunt septem metalla in Terra, in homine ad utrumque ideam fabricato septem principalia membra. Sic duo principalia lumina in coelo, Sol et Luna, duobus praestantioribus metallis auro et argento, in homine cordi et cerebro aequiparantur. Duo benefici planetae, Jupiter et Venus, inter metalla stannum et cuprum sibi locum adiscunt, in corporibus jecur et renes. Saturnus et Mars plumbo et ferro correspondent, in corporibus hominum duo minus necessaria et villa membra sortiuntur, splenem et fel. Mercurius coelestis ut est sua natura indifferens et Proteo mutabilior, sic etiam mercurium terrestrem sive argentum vivum sibi analogum habet, quod mirabiles induit metamorphoses; in corpore autem microcosmico huic recte assimilatur pulmo &c.

Epitaphium Tychonis, inscriptum monumento in primario templo Pragensi erecto, idem spectat symbolum: „Jam dudum sursum, nunc primo specto deorsum,
Despiciens Mundum suspiciensque Deum.“

18) p. 145. Diximus in praefatione, haeredes Tychonis interque hos praecipue Tengna-


gellum aegre tulisse Kepleri conatus, propriam ad astronomiam viam ingrediendi, et multa ipsi obstacula iniecisse, quo minus observationes Tychoonis suum verteret in usum. Epistola haec Tegnagelii ad lectorem, plane alias superflua, praemissa videtur a Keplero, ut illorum satisfaceret postulatis, qui alias „impedire minabantur“ typum (v. s. p. 114. 125). Quo tempore Tegnagelius haec conscripserit, non plane constat; verba „inter hos tumultus“ significant annum 1608, quo Archidux Matthias in Bohemiam contra fratrem Rudolphum Imperatorem minax ingressus est, et Tegnagelius, inserviens tum Leopoldo Archiepiscopo et Archiduci, res transigebat politicas. Comp. Vol. II, p. 811.

19) p. 151. De Lunae „virtute tractoria“ Keplerus quaedam monet in literis ad Herwartum datis, respondens ad quaestionem hanc Herwarti: De hypothesi Lunari Tychoonis kann Ich von niemand anderem als dem Herrn bessere resolution bekommen, also hab Ich zu Ihm tanquam lydium lapidem meine Zuflucht genommen.

Ferner bitt Ich Ihe, mich zu berichten, ob kein author vorhanden, so de arte navigandi tractirt habe. Dann obwohl P. Nonius multa ingeniosa tradiert, so hat er doch diese artem nit ab elementis atque fundamentis anfangend methodice et perspicue beschrieben.

Ueberdiess ist mir ratione hypothesium zu Gemüth gangen, das meins Erachtens dieselben auf eim Weg, den ich nit anderwärts meines Gedenkens gelesen, also zu disponieren, dass dieselbens etwas glaubwürdiger und den apparentis gleichförmiger werden. Darüber Ich gern des Herrn Meinung hören wollte.

Fig. 186.



Raptim zu melden, setzt Copernicus Solem in F fixum, Terram ab A in C moveri, und weil DFB und DCB für gleich erachtet und befunden wird, also schließt er daraus, dass die area ACL ob immensitatem distantiae insensibilis. (Spectat hic Herwartus Copernici operis librum III. cap. 15. ejusque priorem figuram, quam aliquantum immutavit neque vero literis suis addidit, ita ut Keplerus, ut infra patebit, aliquamdiu dubius haereret, quid responderet ad hanc quaestionem.) Pergit Herwartus: hierüber verstehe ich die Sachen dahin, dass allein der angulus differentiae inter DFB et DCB insensibilis seye, für eins. Zum andern gedunkt mich, es sollte der motus also angestellt werden, dass F seye centrum mundi, Sol in G, Terra in E, also dass der diameter GE die distantiam Solis a Terra mit sich bringe. Weil nun Terra ab E ad H movetur, ut interim dicamus, Solem eodem seu ejusdem quantitatis motu moveri ab G ad I et sic deinceps.

Dergestalt bliebe nit allein centrum mundi, sondern auch die distantiae planetarum, und wäre die Sachen noch viel glaublicher, weil allein die differentia inter angulum DFB et DHB insensibilis wäre.

Zu dem aber koennte es statthaben, dass circumvolutio Solis in se ipsum causam praerberet motui Terrae, qui diuque noctuque redintegraretur, und dass motus Solis circa centrum mundi causa saltem aliqualis wäre ipsius consimilis motus Terrae et motuum planetarum reliquorum praeter Lunam, pro ratione distantiarum et qualitatum. Nit swar ex virtute magnetica, sed ex consimili et affini.

Bitte, der Herr wolle mir über diese speculation, so ich weiter zu extendiren nit will habe, sein rätlich Ermessen eröffnen, und bleib Ihe angenehme Dienstwilligkeit zu erwelen allezeit willig. Datum München d. 16. Jan. 1607.

Keplerus (in literis datis 2. Jan. 1607) hanc posteriorem quaestionem prime intactam relinquens, haec respondit ad priorem: S. P. Nobilis et Magn. Vir, fautor observandissime, Binas abs te accepi epistolas diversis temporibus Pragae, me absente, allatas. In altera, 3. Cal. Dec. (1606) scripta, de quaestione imperiali luculentam spem

fecisti. Meorum igitur partium erit, occasiones bene collocandae hujus a Magn. Tua mihi impetratae benevolentiae circumspicere. (Spectat his K. consilium Herwarti de salario suo impetrando). Altera epistola d. 16. hujus jam scripta, Praga mihi Brandisium est transmissa. Quo minus mirari debes turpem amanuensis rusticani manum. Misissem meam manum, nisi confuse admodum esset disposita responsio. — De arte navigandi sollicitus hactenus non fui, quippe latissimae continentis alumnus; ac ne Nonium quidem legi, qui quidem exstabat in bibliotheca Tychonis. Incidit tamen, prodiisse non ita pridem H. Grotii „*Limenheuretica*.“ De magnetis vero natura Gilbertus doctissime scripsit. De longitudinibus locorum beneficio magnetis in mediis undis addiscendis G. Nautonnier Sieur de Castelfranci en Languedoc splendidissimas proponit speculationes. At ne irrita consilia sint gubernaculum manu versantibus, valde vereor. Vocem enim, e continentis meditullio longissime profectam, palinuri medios inter fluctus oceani non facile percipiunt, ut ad eam sese componere possint. Vidi et Germanum aliquem, qui in folio regali, chartis mere nauticis nautico more exornato, descriptionem exhibuit omnium litorum maris Baltici et oceani Germanici, Aquitanici, Cantabrigici, usque Gades. In eo fluxus et refluxus maris accurata continetur explicatio ceterorumque oceani motuum. Nomen auctoris excidit.

Aliquammulta de hac re in Fr. Patricio inveniuntur: quamvis is perperam Lunam (si bene memini) excludere conatur a consideratione causarum. Ex illo Germano auctore nata mihi est haec speculatio: a Luna maria sic attrahi, ut gravia omnia ipsaque maria attrahuntur a Terra. Terra quidem fortius attrahit, propterea maria non surgunt in aërem deserentia Terram, sed tantummodo feruntur Terrae incumbentia a lateribus omnibus versus torridam, ut ibi ejusque ea parte, quae Lunae subest perpendiculariter, eo momento superficies oceani fiat altior. Hoc facto nudantur Europaea litora, quia ad latus posita. Luna abeunte, cum maria ob tarditatem et objectum litorum Americae sequi non possint, suspensus tumor aquarum sidit sub torrida aequanturque superficies marium, teguntur et implentur iterum Europae litora. Implentur autem non ad aequilibrium cum oceano torridae, sed altius ob impetum ruentis undarum molis (wegen des Schwungs), ut in situla seu labro aqua semel mota, ubi impetum accepit diutissime reciprocatur fluctus, paulatim minores, donec denique quiescat. Itaque Luna occidente, cum oceani moles impetu subvecta nostris incumbat litoribus, etsi jam nulla nova causa coelestis revocat aquas sub torridam: ipsae tamen se ipsis et suo apte pondere, utpote ultra aequilibrium impetu subvectae recurrunt sub torridam ibique novum tumorem, apud nos vero litorum nuditatem absente Luna causantur, impetuque vanescente rursum recurrunt a fastigio illo implentque nostra litora, Luna interim oriente et novam attractionem horis 6, quibus in ascendendo versatur, causante. Jam vero litora nostra non omnia iisdem horis implentur, sed subinde serius illa, quae longius intra continentem sunt abdita et quo angustior est maribus aditus ad illa. Itaque Britanniae et Norwegiae contraria litora iisdem implentur horis. Ac cum alveus inter Gallias et Britannias sit angustus, oceanus vero circum Orcades latissimus, etsi longior hic circumductus, citius tamen hic sentitur aestus quam orientali parte alvei. Hinc etiam causa patet arenarum inter Belgium et Britannias, quicquid enim arenarum devehitur seu ex Germania et Galliis seu ex Britannia, id ibi accumulatur, ubi aestus sibi mutuo occurrunt, alter ab occidente altera septentrione.

Verum hoc non est catalogum scribere eorum, qui de re nautica scripserunt. — Quales lineae quibus ventis navigentur, hodie abunde docent omnes globi, globorum fragmenta et chartae, maxime Hondii, qui sic adornat suas chartas, ut quae sunt in globo spirales lineae, ipse rectis perfectissime possit exprimere.

Edita est anno 1584 Antwerpiae Cosmographia Apiani cum Gemmae patris et filii additionibus. Ibi plurima ad nauticam pertinentia: ut inventio quadrati nautici, ubi ex vento et altitudinibus poli duorum locorum habetur differentia longitudinis, item idem ex observatione Lunae. — Plura non memini, liber mihi furto surreptus est. Accommodabo et ego Deo volente „*Parallacticam*“ meam (sc. tabulam quam

Opticis addidit Keplerus) ad eundem usum. — Quid Merlini Cosmographia nuper edita contineat, nondum perspexi. Jam in eo sum, ut librum illum mihi comparem.

Huc usque Keplerus. Reliqua, quae insunt huic epistolae, ad Harmoniam pertinent. Keplerus in praemissis literis, intactam quaestionem Herwarti de Copernicana hypothesisi relinquens, ad eam rediit circa Aprilem mensem 1607, motus his Herwarti verbis: *Was Ich de hypothesi Solis et Terrae Copernicana für mich selbst, wie es mir aliud agenti zu Gemüth gegangen, geschrieben, darauf habe ich keine Antwort, vielleicht darum, dass es keiner Antwort würdig. Ich wollt aber doch gern die confutation dessen vernehmen* (ex epist. d. d. 6. Martii 1607).

Cum quaererem, scripsit Keplerus, qua ratione factum, ut quaestionem de motu Solis proximis literis praeteriverim, incidit, non fuisse ad manus Copernicum; ex quo cum schema, per quod mecum agis, diu anxie quaesivissem, denique incidit, vidisse me in Tuis literis prioribus adjectum schema Lunaribus quaestionibus, ejus usum tunc nullum videre potui. (Schema 136.) Atque ego in eadem scheda notas meas ad quaestiones Lunares perscripseram, itaque factum, ut et illud, nisi me fallit memoria, ab amanuensi inter Lunares nostras depingeretur. Jam respondebo, sed quia obscura est sententia, dicam aliqua, quae forte non pertinebunt ad rhombum.

Sic Tu: quia $DFB = DCB$, hinc colligit Copernicus, aream ACL esse insensibilem. Hic ego dico primo: si esset possibile, nos videre ex A Terra punctum B fixarum, cum quo F Sol videtur conjungi, sic ex C punctum D, tunc nihil ad rem faceret, sive sensibilis sive insensibilis esset area ACL. Numeraremus enim gradus a B in D, illi mensurarent mihi angulum DFB vel AFC, quia lineae CD, AB per centrum F transeunt.

Atqui, etsi propter Solis praesentiam non possumus videre punctum B vel D, nec si videremus agnosceremus, cum non sint appositae notae numerorum, ut in nostris circulis mechanicis, tamen comprehendimus illa ipsa puncta seorsim et numeramus illa. Nam comparata Solis altitudo cum aequatoris altitudine ostendit declinationem punctorum eclipticae B, D, quae quovis in gradu est alia. Vides ergo primo, etsi Terra non sit in centro mundi F, quod tamen innotescat nobis angulus ad F et arcus DB eclipticae, nec opus sit ad hoc positione aequalitatis angulorum DFB, DCB. Itaque ex Solaribus observationibus non invenitur insensibilitas areae ACL. Invenitur autem diameter CL insensibilis ad fixas ex observatione distantiae stellarum fixarum, quae est perpetuo eadem, sive ex C sive ex L mensuretur. Nam si CL in sensibili proportionem esset ad fixas, distantia DB minor ex C, major ex L appareret sensibilibiter.

Jam demonstrata insensibilitate aliunde, ut dictum, recte progredimur eo, ut quia semidiameter CF insensibilis, etiam angulus FBC sit insensibilis, itaque DFB et DCB ad sensum aequales. Quorsum haec utilia? Ad sciendam remotionem fixae in B a loco Solis in D ex C Terra inspectae, mediante Venere vel Luna. Nam si FC sensibilis esset, angulus DCB parvus appareret, et ut ipsi D certum in zodiaco locum definiamus, ipsum punctum B videretur ipsi D propius ex C quam ex F centro mundi. Haec memoranda fuerunt, si forte circa ea impedieris. Pergis: „sic intelligo, solam differentiam DFB, DCB, hoc est FBC, insensibilem esse.“ Quasi diceret solum CF insensibilem, non vero insensibilem CL duplum. At si simplum insensibile, duplum nondum sensibile, sed fortasse centuplum aut millecuplum demum incipiet esse sensibile.

„Videtur sic institui posse hypothesis, ut Sol sit in G, centrum mundi in F, Terra in E.“ Primum hic Tu EG facis aequalem ipsi CL, ex quo apparet, Te metuere, si mutes distantias Solis a Terra, ne in observata Solaria pecces. Deinde ratio astronomiae Copernicanae haec est, ut indicet distantias planetarum ab F centro mundi, mediante distantia Terrae E ab eodem F centro. Ergo si Terra jam saltem dimidio distet, non manebit amplius commensuratio distantiarum Terrae et reliquorum a Sole: non igitur manerent eadem. Aut enim Solis a Terra distantia duplicaretur aut reliquae dimidiarentur.

Tertio, his concessis verum quidem est, mansuram reliquam rationem doctrinae

Copernicanae, siquidem Sol in eodem concentrico cum Terra et in partibus ejusdem diametri oppositis volveretur. Nam etsi tunc centrum mundi F non esset vestitum aliquo corpore, tamen quodammodo fieret comprehensibile, eo nimirum, quod esset id punctum, in quo EG, HI lineae a Terra in Solem ductae se mutuo secarent. At quia Sol fit eccentricus, h. e. (ut accommodatius loquar Tuae speculationi) quia HI, EG non manent aequales (Sol enim ex appropinquatione sensibilibiter major apparet), hinc vides, duos esse debere circulos, alterum in quo Sol volvitur, reliquum in quo Terra, ejusdem utrumque restitutionis.

Habes itaque jam sententiam correctam. Non ita absurdum videtur physicis, stare Solem ac moveri Terram. Sententia de circuitu Solis peccat in regulam: quae possunt fieri per pauciora, non debent fieri per plura. Possunt autem salvari phaenomena stante Sole. Sed nec circuitu opus est ad circuitum ceteris conciliandum, cum sola volutione id possit. Denique naturali motui magis est consentaneum, volutione Solis conciliari et inferri ceteris circuituonis necessitatem, dum emanatione virtutis, *συνάσει* vel *ἐλπίσει* utatur ad circumvehendos ceteros. At quomodo circuitus Solis conciliet ceteris circuitum, id non ita facile est definire. Nam interdum Sol illis contarius curreret: quod non fit in volutione Solis et cum eo virtutis, quam intelligentiae et similitudinis causa dico magneticam, debui coelestem dicere. Illa enim virtus in omnibus planetis semper prolecat eodem, nunquam in contrarium.

Habes itaque quod petisti, examen propositae et prioribus literis praeteritae speculationis. —

Herwartus respondit (10. Oct. 1607): Ehrenvester, Hoch- und Wohlgelehrter, sonders lieber und guter Freund.

Dass Ich so lang nit geschrieben, ist daher erfolge, dass mich das leidig Podagra ergriffen und an Hand und Füssen starckh heimgesucht. Darauf ich dann etliche Reisen verrichten müssen, darunter auch nach Augsburg.

Thue mich bedanken für des Herrn Antwort über die Bewegung der Sonne. —

Praeter haec nil amplius exstat inter epistolas Herwarti ad Keplerum, quod hanc spectet quaestionem. —

Kepleri literis prioribus (p. 455) haec addenda sunt. H. Grotius non ipse concinnavit quod dicit Keplerus opus; prodiit anno 1586 Simonis Stevini liber ejusdem argumenti, quem e lingua Belgica in latinam translatus edidit Grotius inscriptum: *Διμενυπερεια*; postea (a. 1608), inscriptum: „De portuum investigandorum ratione“ collectioni operum Stevini adjunxit Wil. Snellius et (a. 1634) Alb. Girard gallice edidit. (Inest Vol. II. lib. V: du trouve port, ou la maniere de trouver les havres.) — Petri Nonii disquisitio „de arte atque ratione navigandi“ prodiit anno 1537 lingua Hisp. Lissabonae, postea a. 1573 Conimbricae, latine. (Bas. 1592.)

De Francisco Patricio diximus Vol. I. passim; item de Hondio et Apiani Cosmographia, quam ipse Apianus primum edidit a. 1524; editionum ejusdem per Rein. Gemmam Frisium princeps est illa, quae prodiit anno 1529. In editione anni 1550 depictum est quadratum nauticum“ fol. 24. „Merlini“ Cosmographia nulla exstat; dicit Keplerus sine dubio Cosmographiam Pauli Merulae, quae prodiit Amstelod. anno 1605.

Quem spectet Keplerus „Germanum“ non constat; de Nautonnier vero haec notamus: Casaubonus ad Jo. Scaligerum scripsit: est Parisiis minister quidam e provincia Narbonnensi, Guilielmus Nautonierius a Castello Franco, qui librum a se compositum editumque Regi ea lege obtulit, si praemium opera dignum vellet rependere. Liber inscribitur „Mecographie du Guide-Aimant“ (Ven. 1603). Autor mirabilia promittit de inveniendis nova arte locorum longitudinibus, non per eclipsis observationes, sed hujus inventi sui ope certa-que notione magnetici, uti loquitur, poli et a mundi polo distantia. Coeli et nauticae rei periti in consilium adhibiti et autorem et inventionem *μικρά φάρμα* dilandarunt; quam merito, Hollandi tui judicabunt.

Keplerus Nautonierium adiit transmittens „Epistolam de Solis deliquio Octobri 1606“, observationes addit eclipsis Lunae 18. Nov. 1603 a se observatae petitque ut Nautonnier idem faciat, suas observationes remittens.

Deinde pergit: Jubes, declinationes magneticae lingulae a meridiano passim observare et ad te perscribere. Equidem id ego agam diligentissime perlecto tuo libro et instrumentorum ratione cognita. In praesens quid observaverim olim accipe. Alt poli 47° 2' Graetii Styriae (quae urbs est ad Muram fluvium, qui 20 milliari-

bus Germ. infra Graetium Dravo se miscet. Ajunt Romanorum Valeriam, 4 infra Graetium milliariibus sepultam Attilae immanitate); hic igitur in plano horizontali omni diligentia meridiana descripta et superposita pyxide vulgari cum cuspidem sat longa, divisoque circulo in 360° , certissime inveni cuspidem non declinare 8° . Cum autem metuerem, ne stilo adhaereret pulvicula, rem alia via sum aggressus. Jam describit Keplerus rationem suam procedendi plane eandem, quam Maestlino scripserat anno 1599 (Comp. II, p. 816), quae ipsi exhibuerit „angulum regulae cum meridiano minorem 6° idque non semel.“ Pragae, pergit, Bohemorum, quae vix $2\frac{1}{2}^\circ$ est occidentalis Graetio, instrumento utor ex orichalco, quod est quadrans azimuthalis. Eo collocato ut meridiem spectet exquise, rectaque applicata regula cum instrumento seu pyxide magnetica, quae versatilis est super pede immobili, qui habet circuli sectiones incipientes a diametro, quae sit lineae applicationis et sic basi quadrantis parallelus, tam diu verso pyxidem super pede, donec cuspis cum subscripta linea, quae exit in indiculum, coincidat. Hoc facto inspicio, quem gradum notet indiculus. Quoties adhuc sic praestiti, semper inter $5''$ et 6° versor, quibus lingula declinat ad ortum. Plurimum sane temporis ante 7 annos consumsi, ut ex Belgarum observatis declinationibus ostenderem, magnetem dirigi ad punctum, quod quotidie semel sub fixum eclipticae polum venit. Hoc obtento exclamaturus fui de argumento creationis notabili invento. Nam accommodavi et Antonii Mariae traditionem de polorum transpositione, quae exciderunt mihi hactenus. Itaque certo tibi persuadeas, me nulla opinione fuisse seductum inter observandum. Potius enim ad $23\frac{1}{2}^\circ$, quam ad minus aliquid, invitarunt me vota mea.

Interim commendo Tibi negotium meum eclipticum quam possum diligentissime. &c. (Pragae d. IV. Non. Febr. 1606.)

20) p. 152. Veteres geographiae scriptores non plane consentiunt hanc insulam describentes. Ptolemaeus, comment. Ant. Magino (Ven. 1596) libro VII. Cap. 4: Cory Indiae promontorio opponitur insula Taprobanae, quae olim Symondi insula dicebatur, nunc autem Salice. Parte II. p. 264 Maginus haec affert: Zeilam insulam fuisse Taprobanam Ptolemaei Andreas Corsalus et Joann. Barrius cum plerisque aliis censent; Mercator vero, cui magis in hac re fidem praestamus, putat esse Ptolemaei Nanigerim. Deinde (pag. 265): Sumatram insulam antiquorum Taprobanam fuisse omnes pene auctores sentiunt, licet aliqui magnae eruditionis viri ipsam Auream fuisse Chersonesum putent.

R. Gemma (De principis astronomiae et cosmogr. Antw. 1530, 1548): sequitur Taprobana insula totius mundi maxima, quae nunc Samotra dicitur. Ptolemaeus eam antea Simondi dictam fuisse tradit.

Similia deprehendimus in Apiani Cosmographia (in Gemmae editione 1548 p. 47^b). Cluverus contra inscribit insulam Ceylon „olim Taprobana“, et in charta geographica addita „Jo. Honteri rudimentis geographicis“ (Tiguri 1548), signata est peninsula (Zellon forte repraesentans) inter ostia fluviorum Indi et Gangis voce Taprobana.

21) p. 152. D. Fabricius in epistola (d. d. 26. Jan. 1605) hanc movit questionem, spectans locum Tychonis in epistolarum collectione (p. 189), ubi Tycho refert, quibus rationibus innixus ipse Rothmannum refutaverit Copernicum defendentem. Fabricii verba haec sunt: Qua ratione tu Copernico addictus argumentum Tychonis de explosione tormenti solvere vis? Certe si versus ortum cartrana explodatur, fiet ut ob celeriores motum Terrae emissus globus versus occasum potius locum quietis inveniatur, tantum abest ut versus ortum proferatur. Herculeum certe est argumentum adversus motum Terrae diurnum, quo destructo cetera facile cadent.

Keplerus cum videret, ab aliis quoque magni fieri hoc Tychonis argumentum, refutandum illud censuit in opere suo, suppresso vero nomine Tychonis, ne ulterius offenderet illius haeredes. Fabricio autem haec respondit: De objectione Tychonis, quae tormento impugnat motum Terrae, rogas eadem, quae Cancellarius Bavariae nuperrime. Respondeo eadem. misceri motus, non impugnari aut aboleri alterum ab altero. Terra movetur ab occasu in ortum, cum ea omnis copia aeris circumfusi, omne grave, sive jacens sive pendens. Nam cur non et pendens quid impedit? Num gravitas? At ea tendit ad centrum Terrae, ad centrum faciei Telluris, quae lapidi est exposita, quod vi magnetica lapidem attrahit fortius quam si centum catenarum nervorum tenuissimorum vinculis quaquaversum esset annexus Telluri. Num igitur impedit ipsum aer, qui est trajiciendus? At Terram et ipse sequitur, saltem in

hac propinquitate. Quid igitur impedit? Nihil tu potes ostendere. Ego quid impedit ostendam, sed simul et respondebo. Quodcunque materiatum corpus se ipso aptum natum est quiescens, quocunque loco reponitur. Nam quies ut tenebrae privatio quaedam est, non indigens creatione, sed creatis adhaerens, ut nullitas aliqua: motus vicissim est positivum quippiam ut lux. Itaque si lapis loco movetur, id non facit ut materiatum quippiam, sed ut vel extrinsecus impulsus vel attractus vel intrinsecus facultate quadam praeditus ad aliquid respiciente. Hanc dicunt Aristotelici appetentem centri mundi. Nego, sic enim vere impediretur sequi Terrae motum. Pro bent, scio, fuit ipsorum probationes ab ignis natura contraria, quae est petitio principii. Nam ignis non petit coelum, sed fugit Terram. Non fugit centrum mundi, sed Terrae materiam fugit, ut ejus crassitie obruitur. Ergo aliter ego definio gravitatem, seu illam vim, quae intrinsece movet lapidem, vim magneticam coagmentantem similia, quae eadem numero est in magno et parvo corpore, et dividitur per moles corporum accipitque dimensiones easdem cum corpore. Itaque si lapis aliquis esset pone Terram positus in notabili aliqua proportionem magnitudinis ad molem Telluris, et casus daretur, utrumque liberum esse ab omni alio motu: tunc ego dico futurum, ut non tantum lapis ad Terram eat, sed etiam Terra ad lapidem, dividantque spatium interjectum in eversa proportionem ponderum, sitque ut A ad B causa molis, sic BC ad CA, et C locus ubi jungentur, plane ea proportionem, qua statera utitur. Sed contrahe vela. Dixi, si a lapide removeas animo facultatem illam jungendi similia, remansuram in lapide meram impotentiam ad mutandum locum. Ut igitur illa expugnetur, vi et contentione extranea opus est. Dum ergo fingimus lapidem in aëre pendentem, negamus ei vim conjungendi similia, hoc est gravitatem, et tamen eam vim Terrae in lapidem relinquimus. Esto hoc ita, quamvis re vera absurdum sit, tantummodo ut nobis casus constet. Habebit igitur pendulus iste lapis adhuc vim quiescendi in suo loco, ea repugnabit virtuti Telluris circumacturae. Ex pugna materialium et corporearum proprietatum fiet permixtio, ut quaelibet vincatur et vincat vim suam corporum proportionem. Itaque hinc evincitur, quod dixi me indicaturum, impedimentum nempe, quo minus pendulus hujusmodi lapis perfectissime sequi possit circularitatem Telluris. Atque hoc impedimentum est verissimum. Quare jam destruiamus casum nostrum fictitium et sint illae lineae a superficie Terrae in lapidem tendentes non tantum ut fulcra, sed vere id quod per naturam nobis indicatur, nempe instar nervorum tensissimorum, sic ut lapis iste sit in actu descensus ad superficiem et centrum Terrae: dico, propter hanc impotentiam ad motum omnino futurum, ut lapis hic in descensu nonnihil aberret a perpendiculari ex centro Terrae per superficiem in centrum lapidis ducto et sic Terra ab occasu in ortum eunte, lapidis perpendicularum paulatim in occidentales superficiei partes deveniet: nec Terram omnimode sequetur, sed ab ea relinquetur. Habes causam, cur lapis non debeat sequi Terram, qualem tu ad tuas sententiae confirmationem non potuisti dicere. Audi nunc solutionem. Verum est, si lapis notabili intervallo a Terra distaret, fore ut hoc accideret. At nunc sunt 860 miliaria a centro ad superficiem, et vero nulla avis tam alte volat, ut dimidium unius miliaris absit a solo; sane quia in aethere non magis apta est volare, quam nos in aëre, quam lapis in aqua aptus est natari. Confessum est autem, aëris altitudinem non excedere dimidium miliaris. Et vidisti tu unquam lapidem vel globum tanta altitudine decidentem, quantum aves assequuntur volando? Ergo esto lapis jam quantumvis altissimus, qui bis millesima parte simidiametri Telluris a superficie absit, atque is quota pars est corporis Telluris, ut ejus pertinacia quiescendi deroget virtuti Telluris ad movendum? Inito rationem calculi, tempus dinumera. Nempe in una hora de Tellure eunt 225 miliaria sub aequatore, sed sunt in aethere composito motu sub aequatore in media nocte millena miliaria trajicienda, et in uno secundo, quorum in hora sunt 3600, pars $\frac{1}{10}$, vel $\frac{1}{4}$, fere unius miliaris. Itaque quota pars est lapis de corpore Telluris, tanta particula de mille passibus deerit in qualibet verberatione pulsus (quae metitur unum secundum temporis), quo minus lapis recidat in perpendicularum, unde fuit perpendi-

Fig. 137.



culariter erectus, hoc est quo minus Terra illum inter decidendum perfecte secum in circulum rapiat. Tu jam, macte audacia, lapidem aliquem, immo montem, cum Tellure in libra appende, ut proportionem explores. Sit lapis in pedis semidiametro. Quinque pedes aequant passum et 5000 mille passus, et 20000 milliaria, et 17200000 semidiametrum Terrae aequant. Jam corporum proportio est tripla diametrorum. Invenies in summa 22 figuras. Ergo tibi mille passus dividendi sic sunt, ut particulae et numerus expleant 22 figuras, cum mille passus solas 4 aequent; tres deterantur utrinque, ergo unus passus in tot particulas abibit, quot nonnisi 19 cyphris possunt efferri. Age jam et hujusmodi minutias collige, sic ut lapis tibi non per unum pulsus intervallum, sed si lubet per horam eundo redeundo in aëre haereat, et vide quantam sis effecturus unius passus particulam, quae metiatur interstitia egressus et illapsus lapidis perpendicularis. Age, priusquam ad tormentum veniam, admirabilem tibi faciam hanc disputationem exemplo Lunae. Cum sit Lunae corpus terrestre, dico, si adimas utrique motum et vim animale, coitura corpora. Ac cum sit Luna $\frac{1}{10}$ de Terra circiter, ergo si 41 dant 60 semidiametros distantiae siderum, 1 dabit $1\frac{1}{2}$. Itaque $1\frac{1}{2}$ semidiametris supra centrum Terrae versus Lunam est locus coitus siderum. Nunc utraque autem sua anima retinetur (h. e. gravitate) ne coeant, ut ego caput in sublimi teneo vi animali, quod citra eam a Terrae magnete in pavementum pertraheretur. Quod autem ita sit apparet, quia, quae partes Terrae non fortiter sunt annexae Terrae, Lunam sequuntur, ut maria ad Lunam ex omnibus lateribus mundi sub perpendicularum Lunae contendunt, cum sint bene librata, ut magnes in aqua natans aut super acus cuspidem, nec a vi Telluris multum impediuntur. Accedunt igitur qua possunt sc. via circulari, ne Tellurem potiori vi trahentem deserant. Sed cum elusa maria celeritate Lunae praeveniantur, ipsa tenacitate sua et subtus asperitate fundi impediuntur, quo minus celeriter sub Lunae perpendicularum contendant, nempe intra tropica, ideo Luna abeunte a fastigio coeli relabuntur in antiquas sedes, et rediit suo nobis omnem oceanum Britannis circumfusus duobus a Gallis et a Norwegia aestuariis implent, unde ex occurso utriusque inter Britannias et Belgium plurima arena (Sant) accumulatur. Retinetur igitur Luna ab anima sua, ne coeat cum Terra, quamvis intra orbes virtutum tractricum constituentur. Sed cum Terra diurno motu circumagatur, et cum Terra una virtutis orbis ad Lunam extensus, sitque illic imbecillior quam apud Terram partibus 60, quia Luna a Terra tot semidiametris abest, ergo quam viam Luna ivisset prope Terram die uno, aequalem ibit viam (vel trahetur a Terra) diebus 60. Ivisset vero prope Terram de 5400 milliariibus partes 39 de 40, quia unam partem fuisset suffurata propterea, quia est pars $\frac{1}{10}$ de Terra, si credimus astronomis. Ergo et in suo orbe uno die 5265 milliaria iret, si aequalis virtus illo usque perveniret. At jam quia virtus Terrae illo loco imbecillior et sparsior, igitur diebus 60 ibit 5265 milliaria circa Terram. Habet vero in ambitu suo sexagies 5400 milliaria, hoc est 324000 milliaria, quae divisa in 5265, iter dierum 60, ostendunt $61\frac{1}{2}$, et haec summa in 60 multiplicata ostendit dies 3680, quibus Terra Lunam circumactura est, annis nempe 10 circiter, siquidem constaret Luna ex materia densitatis ejusdem cum Terra et siquidem Luna solum hoc iter circa Terram incederet. Sed quia interim accedunt 10 itinera circa Solem, Lunae cum Terra communia, et incertum, qua densitate sit materia corporis Lunaris, perturbantur nobis ista ratiocinia. Hoc quidem apud me certum est: si Terra tantummodo gyraretur et Lunae corpus in nulla esset proportionem densitatis vel magnitudinis ad Terram, fore ut, Tellure unaque ejus orbe Lunam contingente diurno motu circumeunte, Luna simpliciter sequatur, plane nullam partem decerpens: sed quia de partibus itineris 59 decerpit 57, cedit vero virtuti per partes tantum duas, sic ut post $29\frac{1}{2}$ revolutiones orbis virtuosae Telluris Luna semel restituatur: ergo ejus densitatis proportio ad illam fortitudinem orbis virtuosae est quae 2 ad 59, et sexagies major ad densitatem corporis Telluris, nempe densitas Lunae ad densitatem Terrae, quae 1 ad 1770; sed magnitudo Lunae ad magnitudinem Terrae, quae 1 ad 40, ergo subtracta hac proportionem erit aequalium particularum Lunae et Terrae proportio ea, quae 1 ad 44, pene aequalis proportionem

magnitudinum: siquidem nihil hic nos turbat circulatio utriusque sideris in aura aetherea circa Solem. (Quae sequuntur Keplerus ipse in margine annotavit, cetera scripsit amanuensis): Hic videor hallucinari, ut in primis tentaminibus fieri solet. Nam videtur consideranda virtus Telluris tractoria seu circumactoria eadem, quae et prope Tellurem et e longinquo. Causa haec, quia omnis orbis virtutis hujus in Luna movenda vires suas intra unius diei spatium experitur. Et vero ut lux in opticis sic virtus ista hoc loco spargitur per spatia, sic ut tantundem virtutis sit in orbe magno sparsim quantum in angusto collectim. Digo ergo: die uno vel paulo plus ituram 5265 miliaria circa Terram. Itaque totum ambitum 324000 (vel paulo minus) miliarium conficeret diebus $61\frac{1}{2}$, et totidem fere horis. (Nam Luna uno die et una fere hora sentit omnem orbem virtutis ex Terra, quia interim 12° sint progressae). Nempe diebus 63 et non ut in textu annis 10, manentibus conditionibus quae in textu.

Ad verba: „sed magnitudo Lunae &c.“ adscripsit Keplerus: Eadem hic quoque corrigenda. Nam Lunae densitatis proportio ad totum orbem virtuosum est ejus $\frac{1}{30}$, vel $\frac{1}{10}$ h. e. ad ipsam corporis Terrae densitatem est ut 2 ad 59. Non quae 1 ad 1770 sed ea, quae 2 ad 57 (de 59 detracta una tricesima) ut pag. priori in margine, hoc est quae 1 ad $28\frac{1}{2}$; et quia magnitudinum ratio est ea quae 1 ad 40 circiter, ergo subtracta hac proportionem relinquitur proportio 1 ad $\frac{1}{30}$, hoc est 80: 57. Atque sic Lunaris materia paulo esset densior materia Terrestri, proportionem ea, quae 80 ad 57, paulo majore quam 4: 3, ut si Terra esset argentea, Luna aurea. Posita vero aequalitate densitatis, tunc extrahitur magnitudinum proportio 1 ad $20\frac{1}{2}$, et diametrorum ratio paulo major quam 1 ad 3, nempe ea, quae 1000 ad 3056. Et quia Luna in apogaeo habet semidiametrum $15'$, ergo abest a nobis 226 diametris Lunae, quae divisae in 3056 et multiplicatae in 1000 dant 74 fere, alt. Lunae a Terra in semidiametris Terrae. Ecce propinquitatem. Malo autem diversam densitatem statuere, quam astronomiae suas paralaxes reformare.

Jamne tu in margine sentis Fabrici? Sentio inquires. At ego te in textum redire jubeo. Non n. textus sed margo hallucinatur. Quare? Quia etsi unius diei spatio omnis orbis virtutis terrestris Lunam permeat, in singulis tamen momentis adsistit illi virtus haec tenuior in majori remotione. Quod ut verissimum, ita magno commodo meorum Martis Commentariorum statuitur. Nam idem plane juxta trahens causa densitatis tardius incitatur ubi remotior est. Estque plane eadem ratio. Quilibet orbis habet omnem virtutem, sed in partibus sparsiore. Et quilibet dies habet omnem virtutem, sed in momento sparsiore, quia tempus consistit in fluxu instantis.

Nunc tandem ad tormentum Tychonicum. Cum demonstratum sit, lapidem in perpendicularo cadentem non debere illam lineam egredi in casu, jam facile expeditur et globus tormenti (lapis in obliquum jactus; nubes vento impulsus; avis in aëre volans). Nempe illud verum est, quod statim initio coepi dicere, misceri motum utrumque, et eum qui a Tellure est in globo, et eum qui a tormento. Itaque et miscentur spatia. Nam respectu totius universi plane plus spatii conficitur eodem tempore, cum globum in ortum ejaculamur, quam cum in occasum; quia illic et Terra in ortum tendit, hic Tellus derogat motui in occasum, volvens globum in ortum. Imo vero plane nunquam ullus globus respectu totius universi in partem tendit contrariam viae Telluris, quia Tellus multo est celerior quam ullius globi jactus. Quod vero spatium in ipsa Telluris superficie attinet, cum quiescens lapis, quamvis in aëre pendens, demonstratus sit plane sequi debere Terram, omnino etiam eadem vis per idem Telluris spatium tam in ortum quam in occasum abripiet globum. Nam quacunque globum impellat, invenit eandem vim lapidis attractricem, eundem etiam effectum promotionis lapidis. Si autem supra casus lapidis in perpendicularo aberrasset sensibilibiter a suo perpendicularo, sane etiam hoc fieret, ut brevius esset spatium jactus in occasum quam in ortum; non quidem ob causam a Tychone allegatam, sed ob hanc ipsam, quam ego diligenter hic explicui. — Desumimus haec e literis Kepleri d. d. 11. Oct. 1605, quarum partem majorem praemisimus p. 39 st.

Fabriceus redit ad hanc quaestionem aliquot annis post, plane oblitus haec priora. D. 12. Oct. 1606 scribit: Copernicum hactenus parce legi, quod obscurus et concisus esset, et exemplar meum Basiliense (ed. anni 1566) mendosum esset. At nunc magis mihi incipit arridere et solus motus Terrae me prohibet quo minus ex toto manus ipsi nondum porrigam. Hoc verum, per hypothesin Copernici simplicissime et commodissime motus demonstrari posse. — Deinde addit: Quomodo tu argumentum Tyconis contra motum diurnum ex tormenti globo refutare vis? Hoc totam Copernici hypothesin explodit. Inquire igitur tales hypotheses, quas omnis absurditatis et implicitae contradictionis expertes sint, sic tibi et arti magis consules.

Aliud argumentum contra Copernicum: si Terra tali motu movetur, necesse est omnes in eodem parallelo habitantes saepius unum habere ventum, nubilosum aut clarum coelum, cum haec loca diurna revolutione sub iisdem nubibus et ventorum flatu decurrant. At hoc minime fit. Ergo &c.

Keplerus haec (d. 10. Nov. 1608) respondit: Cupis tibi declarari solutionem argumenti Tyconici contra motum Terrae. Non est ita horribile, ut illius machinae ictus. Plane coincidit cum illa objectione, cur globus sursum missus ad perpendicularum recadat in locum eundem, si Terra interim abiat. Respondendum enim, non tantum Terram interim abire, sed una cum Terra etiam catenas illas magneticas infinitas et invisibiles, quibus lapis alligatus est ad partes Terrae subjectas et circumstantes undique, quibusque retrahitur proxima id est perpendiculari via ad Terram. Quemadmodum igitur hic vis inferitur catenis illis a motu violento sursum, quo fit ut omnes illae aequaliter quasi extendantur, ita quoque vis inferitur catenis occidentalibus, cum globus vi tormenti in orientem truditur, et vis inferitur orientalibus, cum vapor globum protrudit in occidentem. Nihil nec impedit hic nec illic promovet motus universalis Telluris et catenarum omnium. Nam haec motus violentia, quae globum projicit, versatur intus in complexu catenarum omnium, quae tam sunt fortes, ut parum contra illas possit etiam ventus validissimus contrarius, nedum aura quieta et cum Tellure circumiens.

Si vero nullae tales essent catenae, remaneret sane lapis in aethere pendulus abeunte Terra, nec recideret ulla ratione. Facit ad hanc considerationem et hoc, quod nullus jactus, neque quoad lineae longitudinem sensibilis est ad Telluris diametrum, neque quoad motus pernecitatem Telluris catenarumque seu virtutis magneticae. Sic igitur cum habeat hoc negotium et animi mei sententia, noli a me petere, ut veritatem prodam ad comparandum vulgi favorem. Si consuli arti non potest nisi per fraudes, pereat sane: reviviscet nempe; nec procul oculis pene exempla seculorum superiorum, cum Aristarchus hanc doctrinam tradidit oppressaque est multitudo contra sentientium, qui doctrinae opinionem sibi apud vulgum comparaverant. Seculum erat crudissimum. Occubuit quidem tunc Sol iste veritatis delituitque pene duo millia annorum: at id non soli huic doctrinae accidit. Communis literarum calamitas per interitum primo Graeciae, post etiam Italiae, tanto magis pressit Aristarchum, quanto is erat absurdiora professus. At simul literae renatae sunt nobis in Germania, simul Aristarchus revixit, non quidem ex hac arida stipula nominis huius, sed ex ipso immortalis semine veritatis, quae Copernico sic aperuit mentis oculum, ut olim Aristarcho, utrique sine exempla. Itaque consilium tuum sequar quidem sed emendatum. Arti consulam, sed non per commendationem *ἀρετῆς* perque captationem aurae popularis. Si nihil est tradendum nisi quod vulgo placet, cur astronomiam universam, cur geometriam tradimus, remotissimas a vulgi captu laudisque ideo egenas? Quin potius hoc agam, ita Copernicum in emendatam astronomiam intexam penitus et implectam adeoque et in physicam, ut vel utrique simul pereundum sit vel supervivendum. Quamquam, si locus est vaticinio, prius ingentem illam molem librorum polemicorum cum anecdotibus, cum ingeniis criticis perituram existimo, quam Aristarchus et Copernicus deserantur.

Objectio tua a ventis plane ventorum naturam imitatur, nihil efficit nisi strepitum. Quidquid n. de ventis tute ipse judicas et ego judico: si Tellus per vapidum aërem moveretur, jure objiceret ventorum experientiam. At nunc vapor, materia ventorum, consistit intra complexum virtutis magneticae Telluris; cumque sit substantiae tenuis, uti non valde attrahitur ad Terram, sic facile transferitur

et abripitur a qualicunque virtute magnetica Telluris. Nam vis magnetica fortissima quidem est ratione suae propriae sedis, nempe Telluris, corporis densissimi: illa tamen languescit in objectu materiae rarioris. Exemplo sit vis illa motus violenti auctor. Puer manu projiciens lapillum propellit illum quam longissime. Idem totis viribus connixus, ut pumicem ejusdem molis eodem projiciat, scopum nunquam assequetur. Sed ad vapores redeo. Illi igitur asportantur cum locis Terrarum sibi subjectis a virtute magnetica Telluris, et sic quiescunt incumbentes iisdem Terrarum locis, quantisper non a causis aliquibus impelluntur, quae causae ex eodem cum ipsis origine nascuntur. Impulsi vero ab iis causis, quae ventum faciunt, facillime a catenis illis magneticis avelluntur in plagam quamcunque, idque aequali spatio, si causa aequalis. Quippe in eorum motu non consideratur longitudo tractus per aetherem, sed multitudo catenarum seu longitudo tractus Terrarum. Nam ad trajiciendum per aetherem non indigent sua opera, contentae virtute Telluris seu navi. Adeoque genuinum est exemplum navis et vectorum in ea discursantium, nisi quod vectores navis non attrahit magnetica virtute, sed solo contactu rapit, eosdem vero Tellus adhuc attrahit per gravitatis virtutem, quam Tellus non communicat motu navis, vapores vero et projectilia non attrahit aether, itaque a sola sua navi (id est a Tellure) attrahuntur. Non itaque ut in navi ex motu navis contingunt corporum jactationes, dum abripiuntur corpora a locis iis Terrarum, ad quae tendunt, gravitatis momentis, non, inquam, sic etiam jactari necesse est corpora nostra, dum a Terra abripiuntur, neque n. tendunt ea ad ullam partem aetheris, sed ad solius Terrae subjectum planum per catenas magneticas attrahuntur: quo fit demonstratione geometrica, ut ad centrum tendant gravia; etsi non tendunt ad centrum tanquam ad rem geometricam, sed tanquam ad medium corporis rotundi. Nisi n. Terra rotunda esset, ad idem ejus commune punctum omnia gravia non tenderent.

Hic tu puto objicies, vapores non trahi a Terra, cum potius fugiant a Terra. Respondeo, in vapore, cum exit ex Terrae visceribus, inesse duas res, materiam et calorem, qui extenuat materiam. Cum igitur partes aliquae vaporis a calore extenuatae sint loco humili, iisdemque superfusa aura gelida crassior, fit igitur ut sicut vesica aëre sufflata exsultat ex undis, eadem in aëre constituta deorsum cadit, sic tenuis substantia vaporis sursum expellatur a circumfuso crasso aëre et graviori. Itaque supernatatus rarus aut calidus vapor (seu quaecunque exhalatio) aëri, quantisper est tenuior. Ubi gelidus redditus condensatus fuerit, iterum decedit. Adeoque ne fumus quidem ulterius a Terris abit, quam urgeatur et expellatur a graviori aëre. Postquam n. aliquam attigit altitudinem, restitat ibi pendulus. Argumentum, ipsum ratione suae materiae adhuc peti et trahi a Terra, minus tamen quam subjectum aërem. Si non credis, vapores et fumos in altum tendere non ratione alia quam tenuitatis, adsta ad ignes succensos sub dio, claro die, ut sit e regione ignis paries aliquis seu murus cum coloribus, fenestris aliisque rebus, quae distinctionem faciunt. Ventus etiam perflet. Videbis fluxum quendam clare (si ventus interflet) non directe in altum tendentem, trans quem parietis partes tibi tremere videbuntur ob refractiones diversorum mediorum.

22) p. 176. Propositio haec exstat in Ptol. Almag. III, 3. Georg. Purbachius eam explicat in „Theoricis novis planetarum“, quas Erasmi Reinholdus Commentariis illustravit (Viteb. 1542), orbem assumens solidum, „epicyclum deferentem.“ Quae Aristoteles (De Coelo II, 13. Metaph. XII, 8.) de Eudoxi et Calippi hypothesebus senserit, pluribus proposuit Keplerus in Apologia Tychonis contra R. Ursam (Vol. I, p. 249 ss.)

23) p. 177. Jul. Caesaris Scaligeri Exotericarum Exercitationum lib. XV. de Subtilitate ad Cardanum. Lutet. 1557. In Exercit. CCCLIX. 8. legimus: officia intelligentiarum tria sunt. Primum: assistere; alterum: mitti ad certa mysteria et ministeria; tertium: movere orbis. Primi orbis motrix intelligentia sola sui ipsius intellectione id praestat, intelligit enim, se a Deo creatam, ut molem coeli gyro agitet. Inferior intelligentia intelligendo primam vult orbem suum cum primi orbis motu simul versari &c.

Comp. Vol. I, p. 173 ss. 250 ss. Epitome Astr. Cop. IV. pars 2. Nro. 2.

24) p. 178. Avicenna (Abūhālī Elhusein Ibn Abdallā) celeberrimus medicus et philosophus Bocharensis (c. finem sec. X.) librum conscripsit „De Stellis fixis“ quem Rabbi Juda

Ben Joseph Toledanus ex Arabico in linguam Hispanicam vertit (c. 1250). Comp. Ch. Melanchthonis Orat. a J. Milichio recitatam. Witeb. 1550. (Jösch.)

Redit ad eundem Keplerus in Epit. Astr. Cop. IV. Part. II Nro. 2.

25) p. 182. Copernici verba haec sunt: Accidet, ut cum epicyclium in summa apside fuerit eccentrici, et planeta in perigaeo epicyclii ex opposito, permutantur ad invicem in contrarias partes, cum uterque suum peregerit hemicyclium. At in quadrantibus utrisque mediis utrumque apsidem suam mediam habebit. Ceterum annuens semper et abnuens, quae omnia ex ipsorum motuum consequentia facile intelliguntur. Hinc etiam demonstrabitur, quod sidus hoc motu composito non describit circulum perfectum, differentia insensibili. — Hic et paulo superius Keplerus affirmans, Copernicum solidos assumptasse orbes (comp. Vol. I, p. 282), Tychonem secutus esse videtur, qui (Prog. I, p. 439) dicit: quodsi juxta Copernicanam motus annui Terrae assumptionem eam (stellam novam) in altissimam Saturni sphaeram reposuerimus, sitque haec solida atque realis, ut et Copernicus secundum dia receptam opinionem sensisse videtur &c. — Ceterum Copernicus ipse in opere suo nullibi realitatem sphaerarum aut expresse ponit aut expresse negat.

26) p. 183. Ut probemus Kepleri calculum, sic quaesita computamus:

$$\text{In } \triangle ECB : \sin. CEB = \frac{\sin. ECB. CB.}{EB.} \quad \text{Dantur } CB = 0,0756, BE = 1, ECB = 135^\circ, \\ \text{quare } \sin. CEB = \sin. 45^\circ \times 0,0756. \quad \begin{array}{r} 0,8785218 - 2 \\ 9,8494850 \\ \hline 8,7280068 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \angle CEB = 3^\circ 3' 52'' \\ \angle ECD = 45. \\ \hline \angle EBC = ECD - CEB = 41^\circ 56' 8'' \\ \frac{1}{2} EBC = 20^\circ 58' 4'' \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Jam in } \triangle EAB \text{ dantur } EB, BA (0,126) \text{ et } \angle EBA \text{ (comp. anguli } EBC); \text{ quaeritur } BEA. \\ EB - AB = 0,874 \quad \lg. (EB - AB) = 0,9415114 - 1 \\ EB + AB + 1,126 \quad \lg. \text{tg. } 20^\circ 58' 4'' = 9,5834469 \\ \frac{1}{2} (A + E) = 20^\circ 58' 4'' \quad \lg. (EB + AB) = 0,0515384 \\ \frac{1}{2} (A - E) = 16. 33. 55'' \quad \hline 9,4734199 = \lg. \text{tg. } \frac{1}{2} (A - E). \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \angle BEA = 4^\circ 24' 9'' \\ 3. 3. 52. \end{array}$$

$$\angle CEA = 7^\circ 28' 1'' \quad (\text{Keplero prodeunt } 7^\circ 28' 56'', \text{ quia falsum angulum } CEB = 3^\circ 4' 52'' \text{ ex tabulis excerpit.})$$

27) p. 183: E constructione Fig. 53. patet, radium af aequalem esse radio BD Fig. 54. et radium epicycli $\beta\gamma = AI$, sic $\gamma\epsilon = IB$. Jam posita $BD = 1$, $AB = 0,126$, $BC = 0,0756$. erit BI vel $\gamma\epsilon (= \frac{1}{2} BC) = 0,0378$ et AI vel $\beta\gamma = 0,1638$. His positis per se patet quantitas lineae $\mu\nu = o\xi = 0,70711 + 0,1638 = 0,87091$; item $\alpha\xi = 0,70711 - 0,0378 = 0,66931$.

$$\begin{array}{r} \text{Datis in } \triangle o\xi\alpha \text{ ad } \xi \text{ rectangulo lateribus } \alpha\xi \text{ et } o\xi, \text{ prodit } \text{tg. } \alpha o\xi = \frac{\alpha\xi}{o\xi} = \frac{0,8256273 - 1}{0,8399733 - 1} \\ \angle \beta\alpha o = \angle \alpha o\xi = 37^\circ 32' 35'' - 45. \end{array}$$

$$\text{Diff.} = 7^\circ 27' 25''$$

$$\text{Aequatio Ptol.} = 7. 28. 1.$$

$$\text{Diff.} = 36'', \text{ sive assumpta Kepleri}$$

quantitate anguli CEA (not. 26): $7^\circ 28' 56'' - 7^\circ 27' 25'' = 1' 31''$ differentia.

28) p. 188. Dantur in $\triangle \delta\gamma\alpha$, $\delta\alpha = 0,03584$ (eccentricitas \odot secundum Tychonem). $\delta\gamma = 0,30138$, $\angle \alpha\delta\gamma = 47^\circ 59' 16''$ (apogaeum \odot in $5^\circ 33' \odot$, idem \odot in $23^\circ 32' 16'' Q$; differentia apogaeorum = $143^\circ 32' 16'' - 95^\circ 33' = 47^\circ 59' 16''$.)

$$\delta\gamma - \delta\alpha = 0,26554. \quad - 0,4241300 - 1$$

$$\frac{1}{2} (\alpha + \gamma) = 66^\circ 0' 22''. \quad - 10,3515415$$

$$\delta\gamma + \delta\alpha = 0,33722. \quad - 0,5279133 - 1$$

$$\frac{1}{2} (\alpha - \gamma) = 60^\circ 31' 22''. \quad - 10,2477582$$

$$\frac{1}{2} (\alpha + \gamma) = 66. 0. 22.$$

$$\angle \delta\gamma\alpha = 5^\circ 28' (K. 5^\circ 27' 47'').$$

Jam, cum vergat $\delta\gamma$ in $23^\circ 32' 16'' Q$

$$\text{et sit } \angle \delta\gamma\alpha = 5. 29.$$

$$\alpha\gamma \text{ cadet in } 29^\circ 1' 16'' Q (K. 29^\circ 0' 3'').$$

Denique eccentricitatem $\alpha\gamma$ prodit calculus trigonometricus = $0,2786$ (K. $0,27871$) usque

ut supra datis. Sin autem assumserimus $\delta\gamma = 0,30242$ et inde computaverimus angulum $\delta\gamma\alpha$ et eccentricitatem, prodibit quantitas hujus anguli a Keplero prodita $5^\circ 27' 47''$, eccentricitas 0,27971,

29) p. 189. Assumpta linea $\alpha\gamma = 0,18034$, proportionaliter prodit linea

$$\delta\gamma = \frac{0,18034 \cdot 0,30138}{0,27971} = 0,19432 \text{ (K. } 0,19763)$$

$$\alpha\beta = \frac{0,18034 \cdot 0,0126}{0,02016} = 0,11271$$

$$\beta\gamma = 0,18034 - 0,11271 = 0,06763$$

$$\delta\beta = \frac{0,19432 \cdot 0,0126}{0,02016} = 0,12145 \text{ (K. } 0,12352)$$

$$\beta\gamma = 0,19432 - 0,12145 = 0,07287 \text{ (K. } 0,07411).$$

Numeri hi discrepantes a Keplerianis ut prius, prodeunt adhibito numero 0,30138; propius accedimus ad Kepleri numeros usurpantes pro 0,30138 numerum 0,30242, etsi nondum plane scopum attingunt, quantitatesque a Keplero hic proditae pro 0,30138 alium numerum (0,30652) indicant.

Denique, cum sit $\beta\beta \mp \delta\alpha$, erit $\beta\beta = -\frac{\delta\alpha \cdot \beta\gamma}{\alpha\gamma}$; $\beta\gamma$ „in dimensione $\delta\alpha$ “ est 0,10489, et hinc $\beta\beta = 0,01344$.

30) p. 189. Assumptis iisdem numeris, qui supra Keplero prodierunt, in $\triangle \beta\gamma\nu$ ad γ rectangulo prodit $\gamma\nu = \sqrt{1 - 0,07411^2} = 0,99725$.

In $\triangle \beta\gamma\chi$, ad χ rectangulo, dantur $\beta\gamma = 0,06763$ et angulus $\gamma\beta\chi = \beta\gamma\beta = 5^\circ 27' 47''$, quare $\gamma\chi = \sin. \beta \cdot \gamma\beta = 0,006438$
et $\beta\chi = \cos. \beta \cdot \gamma\beta = 0,06732$.

Denique in $\triangle \beta\chi\varphi$ datis duobus lateribus ($\beta\varphi = 1$) prodit tertium

$$\chi\varphi = \sqrt{1 - \beta\chi^2} = 0,99773$$

$$\gamma\chi = 0,00644$$

$$\gamma\varphi = 1,00417$$

$$\gamma\nu = 0,99725$$

$$\nu\varphi = 0,00692.$$

31) p. 193. Gassendus in „Tychonis Brahei Vita“, ut ipsissima Tychonis verba haec refert: „Quaeso te, mi Joannes, ut quando, quod tu Soli pellicienti, ego ipsis planetis ultro affectantibus et quasi adulantibus tribuo, velis eadem omnia in mea demonstrare hypothesi, quae in Copernicana declarare tibi est cordi.“ (Gass. Opera V. p. 404.)

32) p. 198. Triangulum $\lambda\delta\mu$ figurae 59. idem est quod $\beta\gamma\beta$ figurae 56, ergo $\lambda\delta$ linea figurae 59. eadem, quae $\beta\gamma$ figurae 56, angulus $\rho\lambda\beta (= \delta\lambda\mu)$ idem, qui $\beta\beta\gamma (= \alpha\delta\gamma)$; et $\lambda\delta\mu$ idem qui $\beta\gamma\beta$, $\delta\mu$ linea eadem quae $\beta\gamma$, $\lambda\mu$ eadem quae $\beta\beta$; sic $\beta\delta$ eadem quae $\delta\gamma$.

Jam datis in $\triangle \rho\delta\lambda$ lateribus $\delta\lambda = 0,07411$, $\rho\lambda$ (radio) = 1, et angulo comprehenso $\rho\lambda\delta$ (compl. anguli $\rho\lambda\beta$), quaeruntur reliqua:

$$\rho\lambda - \delta\lambda = 0,92589 \quad - 0,9665594 \quad - 1; \quad \rho\lambda = 1 \quad 0,$$

$$\frac{1}{2}(\delta + \rho) = 23^\circ 59' 38'' - 9,6484586 \quad - 10 \quad \delta\lambda\rho = 132^\circ 0' 44'' - 9,8709900 \quad - 10$$

$$\rho\lambda + \delta\lambda = 1,07411 \quad - 0,0310488 \quad \delta = 44. 59. 5. - 9,8493691 \quad - 10$$

$$\frac{1}{2}(\delta - \rho) = 20^\circ 59' 27'' - 9,5839691 \quad - 10; \quad \delta\rho = 1,05105 \quad - 0,0216209$$

$$\frac{1}{2}(\delta + \rho) = 23. 59. 38.$$

$$\angle \lambda\delta\rho = 44^\circ 59' 5'' \text{ (K. } 10'').$$

In triangulo $\epsilon\delta\mu$ dantur latera $\delta\mu = 0,06763$, $\mu\epsilon = \rho\lambda = 1$, et

$$\angle \epsilon\delta\mu = \rho\delta\lambda + \lambda\delta\mu = 44^\circ 59' 5'' + 5^\circ 27' 47'' = 50^\circ 26' 52''; \text{ ergo}$$

$$\sin. \delta\epsilon\mu = \frac{\sin. \epsilon\delta\mu \cdot \delta\mu}{\epsilon\mu}; \quad \log. \sin. \epsilon\delta\mu = 9,8870794 \quad - 10$$

$$\log. \delta\mu = 0,8301394 \quad - 2$$

$$\angle \delta\epsilon\mu = 2^\circ 59' 20'' \quad - 8,7172188 \quad - 10$$

$$\angle \epsilon\delta\mu = 50. 26. 52.$$

$$\angle \epsilon\mu\pi = 53^\circ 26' 12''$$

$$\delta\epsilon = \frac{\mu\epsilon \cdot \sin. \delta\mu\epsilon}{\sin. \mu\delta\epsilon}; \quad \log. \sin. \delta\mu\epsilon = 9,9048230$$

$$\log. \sin. \mu\delta\epsilon = 9,8870794$$

$$= 1,0417 \quad - 0,0177436$$

$$\delta\rho = 1,05105$$

$$\epsilon\rho = 0,00935$$

$$\text{Keplero prodit } \epsilon\rho = 0,00953, \text{ cum } \delta\rho = 1,05123 \text{ computaverit.}$$

$$\text{Kepleri Opera. III,}$$

$$\begin{aligned} \text{In } \triangle \beta \delta \text{ ad } \delta \text{ rectangulo prodit } \beta \delta &= \delta \beta \cdot \sin. \delta \beta = 0,13971 \\ \delta \delta &= \delta \beta \cdot \cos. \delta \beta = 0,13978 \\ \delta \rho &= \delta \rho - \delta \delta = 1,05105 - 0,13978 \\ &= 0,91127 \text{ (K. 0,91145).} \end{aligned}$$

Jam $\triangle \beta x \delta$ fig. 59. respondet $\triangle \gamma \delta \alpha$ fig. 56, quare $\beta x (= \delta \alpha) = 0,03584$ ad radium $\beta \nu = 1$; et cum pag. 189. demonstratum sit, ad radium $\beta \nu = 1$ esse $\lambda \mu (\delta \beta) = 0,0088$ eandemque $\lambda \mu = 0,01344$ ad radium $\lambda \rho = 1$, quare $\lambda \rho : \beta \nu = 1344 : 880 = 61 : 40$ „fere“; hinc $\beta \nu = \frac{40}{61} = 0,65573$ (K. 0,65656), ad radium $\lambda \rho = 1$.

33) p. 199. Ad deprehendendam quantitatem lineae $\psi \rho$ novam ingreditur viam Keplerus ipsique minus usitatam; calculo utitur algebraico, qui tum temporis minus excultus fuit quam ratio geometrica.

Keplerum secuti rem explicavimus assumtis Kepleri numeris. Ex constructione patet, esse $\delta \beta = \alpha \rho$, $\alpha \rho = \beta \alpha$; deinde quod $\epsilon \rho$ in o bisecata est, erit $\alpha o = \epsilon \rho - \frac{1}{2} \epsilon \rho$. $\epsilon \rho$ per superiora $= 0,91145$, $\epsilon \rho = 0,00953$, ergo $\alpha o = 0,91145 - 0,004765$.

$$\begin{aligned} \alpha o &= \beta \alpha = 0,906885; \text{ signetur } \beta \alpha \text{ litera d. Deinde } \alpha \alpha = 0,13971 \text{ (a)} \\ \beta \nu &= \beta \nu = 0,656565 \text{ (a)} \\ \alpha \epsilon &= \frac{1}{2} \epsilon \rho = 0,004765 \text{ (b)} \end{aligned}$$

Signetur linea $\nu \psi = \epsilon \psi$ per literam x , erit $\beta \psi = a + x$, et quia $\triangle \beta \alpha \psi$ ad α rectangulum:

$$\begin{aligned} \alpha \psi &= \sqrt{(a+x)^2 - d^2} = \sqrt{a^2 - d^2 + 2ax + x^2} \\ \text{Sic, quia } \triangle \alpha \psi \rho \text{ ad } o \text{ rectangulum} \\ \epsilon \psi^2 &= b^2 + (c + \alpha \psi)^2 \text{ h. e.} \\ x^2 &= b^2 + (c + \sqrt{a^2 - d^2 + 2ax + x^2})^2 \\ &= b^2 + c^2 + a^2 - d^2 + 2ax + x^2 + 2c \sqrt{a^2 - d^2 + 2ax + x^2} \\ \frac{4c^2(a^2 - d^2 + 2ax + x^2)}{4c^2(a^2 - d^2 + 2ax + x^2)} &= \frac{(d^2 - b^2 - c^2 - a^2 - 2ax)^2}{d^4 - 2d^2b^2 - 2d^2c^2 - 2d^2a^2 - 4d^2ax + b^4 + 2b^2c^2 + 2b^2a^2} \\ &\quad + 4b^2ax + c^4 + 2c^2a^2 + 4c^2ax + a^4 + 4a^2x + 4a^2x^2 \\ x^2(4c^2 - 4a^2) + x(4ac^2 + 4ad^2 - 4ab^2 - 4a^3) &= a^4 + 2a^2b^2 - 2a^2c^2 - 2a^2d^2 + b^4 + 2b^2c^2 - 2b^2d^2 + c^4 + 2c^2d^2 + d^4 \\ x &= \frac{a(a^2 + b^2 - c^2 - d^2) + c \sqrt{(a^2 + b^2 - c^2 - d^2)^2 + 4b^2(c^2 - a^2)}}{2(c^2 - a^2)} \end{aligned}$$

$$x = \epsilon \psi = 0,2571$$

$$\alpha \psi = \sqrt{\epsilon \psi^2 - \alpha \epsilon^2} = 0,2570 \text{ (K. 0,25772).}$$

Haec computavimus more hodie usitato, quem ad Keplerianum hand difficile reduces observans, signis β et δ significari voces „census et radix“, quae eodem ab algebraistis illorum temporum sensu sumebantur, quem nunc exprimunt literae x^2 et x .

Jam inventa quantitate lineae $\alpha \psi$ prodit $\alpha \psi - \alpha \alpha = 0,11792$ (K. 0,11801)

et datis in $\triangle \beta \alpha \psi$ ad α rectangulo lateribus $\beta \alpha$ et $\psi \alpha$, prodit $\epsilon \rho = \frac{\alpha \psi}{\beta \alpha}$; hinc $\alpha \beta \psi = 7^\circ 24' 56''$ (K. $30' 10''$); deinde cum sit $\rho \lambda \beta = 47^\circ 59' 16''$ et $\rho \delta \lambda = 44^\circ 59' 10''$, erit $\delta \rho \lambda = 3^\circ 0' 8''$, et quia $\rho \lambda$ vergit in $5\frac{1}{2}^\circ \odot$, $\rho \epsilon$ h. e. $\alpha \beta$ verget in $8\frac{1}{2}^\circ \odot$, quare $\psi \beta$ in $15^\circ 55' (18^\circ) \odot$.

34) p. 210. Ch. Severini, cognomine Longomontanus, cujus literae ad Keplerum leguntur in praefatione et ann. 2, quemque alias saepius diximus, natus est Longomonti pago Danico anno 1562; ab anno 1588 usque ad annum 1600 apud Tychonem studiis incubuit astronomicis. Paulo ante mortem Tychonis in patriam rediit, Viborgiensis scholae munus suscipiens rectoris, hinc anno 1605. Havniam vocatus mathesein et astronomiam docuit in academia Havniensi; mortuus est anno 1647. Inclavit scriptis mathematicis se praecipue libro, qui plane insistit Tychonis hypothesibus, quem inscripsit: Astronomia Danica (Amstelod. 1622. 1630).

35) p. 211. De Sascride vide Vol. I. p. 190. Observationes locorum Martis ab anno 1582—1600, excepto anno 1593, invenies in Tych. Historia Coelesti ad tempora singulis adscripta. Tabulam hanc immutatam imprimendam censuimus, quaque in columna, quae inscribitur „Differentia“ in minimis quaedam mutanda fuerunt. Ut autem prodeat quadamtenus ratio, qua usus est Keplerus opus suum primum aggressus, e mss. Petrop. Vol. XIV, quod continet adversaria Commentariorum Martis, calculum desumimus locorum, quos exhibent hae et sequentes tabulae, hunc:

Reducatur in tabella oppositionum Martis et Solis locus eclipticus per inclinationis angulum ad circulum Martis.

Anno 80. in $6^{\circ} 46' 10''$ Π			
17. 30. \oslash			
19. 16. 10. Incl. $37' 20''$. 17. Nov. h. 9. 40.			
Compl. 70. 43. 50. compl. $89^{\circ} 22' 40''$.			
Sin. $70^{\circ} 43' 50'' \times \sin. 89^{\circ} 22' 40''$			
$94397 \times 99994 = 94391 - 70. 43. 4.$			
differentia 46.			
Locus in circulo $6^{\circ} 46' 56''$ Π			
Anno 82. in $16^{\circ} 46' 10''$ \oslash incl. $1^{\circ} 38' 30''$			
17. 30. \oslash compl. 88. 21. 30.			
dist. 59. 16. 10.			
compl. 30. 43. 50.			
80. 43. 0. $99959 \times 51100 = 51079.$			
differentia 50''			
16. 46. 10.			
Locus $16^{\circ} 47' \oslash$			
Anno 85. in $21^{\circ} 10' 26''$ \oslash incl. $1^{\circ} 54' 22''$			
17. 30. \oslash compl. 88. 5. 38.			
88. 19. 34.			
3. 40. 26.			
3. 40. 19. (diff. 7') $99945 \times 6408 = 6404\frac{1}{2}$			
Locus $21^{\circ} 10' 19'' \oslash$			
Anno 87. in $25^{\circ} 10' 20''$ \oslash incl. $1^{\circ} 30' 43''$			
17. 30. \oslash compl. 88. 29. 17.			
52. 19. 40.			
37. 40. 20.			
37. 39. 17. $99965 \times 61111 = 61090$			
differentia 1. 3.			
Locus $25^{\circ} 9' 17'' \oslash$			
Anno 89. in $9^{\circ} 58' 10''$ \oslash incl. $0^{\circ} 26' 49''$			
17. 30. \oslash compl. 89. 33. 11.			
13. 32. 10.			
76. 27. 50.			
76. 27. 44. $99997 \times 97222 = 97220$			
differentia 6''			
Locus $9^{\circ} 58' 4'' \oslash$			
Anno 91. in $12^{\circ} 43' 45''$ \oslash incl. $1^{\circ} 43' 40''$			
17. 30. \oslash compl. 88. 16. 20.			
64. 46. 15.			
25. 13. 45.			
25. 12. 58. $99954\frac{1}{2} \times 42622 = 42603$			
differentia 47''			
Locus $12^{\circ} 42' 58'' \oslash$			
Anno 95. in $17^{\circ} 56' 6''$ \oslash sine mutatione.			
„ 97. in 2. 29. 0. \oslash computatur alibi.			
„ 1600. in 8. 18. 9. \oslash ad analogiam ceterarum.			
Hisce sic constitutis cum insensibiliter differat locus orbitae a loco ecliptico			
maneantque idem locus eclipticus et eadem oppositionis hora: age per visam lati-			
tudinem inquiramus distantias per totum ambitum. Et videtur, etsi paulo major			
justo sit assumpta, tamen mansura eadem proportio radii ad eccentricitatem, etsi			
mutatur proportio orbium Terrae et Martis.			
Anno 1580. Incl. $37' 20''$ CAB (fig. 1.) 1. 2. 40. 6. 46. 16. Π			
Lat. 1. 40. 0. 37. 20.			
BCA 1. 2. 40. 1. 40. 0.			
Ut sinus CBA ad CA, sic sinus BCA ad BA. BA sic quaeritur: distat			
locus ab apogaeo 30° , est ergo $\frac{101554 \cdot 2908}{1623} = 162539.$			

Anno 1582. Incl. 1. 38. 30. Lat. 4. 6. 0. 2. 27. 30.	$\frac{101788 \cdot 7150}{4294} = 169455$	16. 46. 10. ☉
Anno 85. Incl. 1. 54. 22. Lat. 4. 32. 10. 2. 37. 48.	$\frac{101280 \cdot 7909}{4589} = 174553$	21. 10. 26. ♀
Anno 87. Incl. 1. 30. 43. Lat. 3. 38. 12. 2. 7. 29.	$\frac{100350 \cdot 6343}{3708} = 171661$	25. 10. 20. ♀
Anno 89. Incl. 0. 26. 49. Lat. 1. 6. 45. 0. 39. 56.	$\frac{99200 \cdot 1942}{1161} = 165931$	3. 58. 10. ♀
Anno 91. Incl. 1. 29. 5. Lat. 3. 59. 0. 2. 29. 55.	$\frac{98232 \cdot 6947}{436} = 156518$	26. 32. 0. ♂
Anno 93. Incl. 1. 43. 40. Lat. 6. 3. 0. 4. 19. 20.	$\frac{99340 \cdot 10540}{7366} = 138939$	12. 43. 45. ✕
Anno 95. Incl. 1. 21. 0. Lat. 3. 33. 2. 12.	$\frac{101790 \cdot 6192}{3639} = 164179$	2. 28. ☉
Ao. 1600. Incl. 1. 53. 10. Lat. 4. 30. 50. 2. 37. 40.	$\frac{101510 \cdot 7870}{4584} = 174277$	8. 18 ♀

Pro eruendo apogaeo

$21\frac{1}{2}^\circ$ ♀ 174553.	$16\frac{1}{2}^\circ$ ☉ 169455.
$8\frac{1}{2}^\circ$ ♀ 174277.	$2\frac{1}{2}^\circ$ ☉ 164179.
$25\frac{1}{2}^\circ$ ♀ 171661.	$6\frac{1}{2}^\circ$ ♀ 162539.
4° ♀ 165931.	$12\frac{1}{2}^\circ$ ✕ 138939.
$26\frac{1}{2}^\circ$ ♂ 156518.	
$16\frac{3}{4}^\circ$ ☉	$16\frac{3}{4}^\circ$ ☉
$25\frac{1}{2}^\circ$ ♀	4° ♀
$68^\circ 25'$	$107\frac{1}{2}^\circ$
dim. 34. 12	$53\frac{1}{2}^\circ$
Inter 26° ♀ et $10\frac{1}{2}^\circ$ ♀, sed propius illi, nempe circa 1° ♀.	

$2\frac{1}{2}^\circ$ ☉. Hic medium est 3° ♀, sed $2\frac{1}{2}^\circ$ ☉ est ab apogaeo remotius, quia distantia brevior, 4° ♀ est propius. Ergo 3° ♀ est ante apogaeum. Est igitur apogaeum (aphelium dico) post 3° ♀, et tamen ante 11° ♀, sed 3° ♀ est aphelio valde propinquus. Puto id esse in 5° ♀. Haec a superioribus paulum dissentiant.

Sequitur resolutio tabulae oppositionum Martis.

Colligantur primo motus Solis.

Compl. medii.	Martis medius.	Præcessio æquinocetii.
1579. 9. 20. 1. 8.	8. 7. 2. 28.	Ad annum 1588 completum est præcessio æquinocetii $28^\circ 3' 5''$. Hinc ad 79. completum demuntur 4. 15.
Oct. 10. 0. 37. 21.	5. 9. 50. 30.	
d. 16. 15. 46. 13.	8. 23. 6.	
h. 9. 22. 11.	11. 48.	
m. 40. 1. 39.	52.	
8. 6. 48. 32.	1. 25. 28. 44.	27. 58. 50.
At ponitur longitudo Martis observata resp. eclipt. 6. 46. 10.	27. 59. 35.	45. pro anni 80. parte
	27. 29. 9.	
	Long. simplex 27. 29. 46.	Præc. 58. 50.
Diff. 2. 22.	37.	45.
Et orbitae, ut ajust 6. 58. 10.		

Fuit nodus in $1^{\circ} 16' 48'' 35''$ secundum numerationem tabulae Tychois.

1. 16. 46. 85.

2. 6. 46. 10.

19. 59. 35. latus unum,

20. 3. 45. latus alterum seu basis.

Basis posterior 27387, perpendic. posterior 36383 (36520)

27387 . 36520 = 100376 = sec. $4^{\circ} 57' 40''$

Ex tab. Tychois.

Apog. 4. 23. 19. 45.

1. 25. 28. 44. long. simpl.

9. 2. 8. 59.

11. 20. 36.

2. 6. 49. 37. Computatus.

Profitetur 2. 6. 50. 40.

	☉ med.	♂ med.	Apog. ♂	Præcessio.	Nodus.
1581. Nov. 27.					
	9. 16. 50. 58	3. 9. 35. 48	4. 23. 21. 1	27. 58. 50	1. 16. 48.
		2. 11. 35. 26	1. 6	1. 42	3. 16. 51. 27
Locus obs. resp. eclipt. Et orbitae ut ajunt.	9. 16. 46. 10	Ponitur 34. 56	4. 23. 22. 7	50	28
	16. 51. 30		3. 9. 35. 48	28. 0. 22	2. 0. 3. dist. a nodo.
			10. 16. 13. 41	28. 0. 38	60. 3. 0 basis.
			8. 28	ponitur	59. 57. 43 latus.
			7. 17. 11		Tg. basis, tg. compl. lateris.
			3. 16. 52. 59	comput.	173555 . 57823 = 100355
			3. 16. 51. 26	ponitur.	sec. $4^{\circ} 49' 20''$
					ang. assumtus.
1584. d. 30.	10. 21. 10. 13	4. 20. 40. 13	4. 23. 24. 24	27. 58. 50	1. 16. 50. 18
	9. 21. 10. 26	28. 3. 9	4. 20. 40. 13	4. 15	4. 21. 10. 26
	21. 9. 50	3. 22. 37. 4	11. 27. 15. 49	4	3. 4. 20. 8
		3. 22. 37. 46	10. 44	28. 3. 9	85. 39. 52
			Prosth. 29. 24	28. 2. 25	85. 40. 28
			4. 21. 9. 37	1322070 . 75824 = 100244	
			4. 21. 9. 41		$4^{\circ} 0' 15''$
1586. Feb.	11. 25. 5. 57	6. 1. 32. 12	4. 23. 26. 50	27. 58. 50	1. 16. 52. 12
	25. 10. 20	28. 4. 56	6. 1. 32. 12	5. 57	25. 10. 20
	25. 5. 10	5. 3. 27. 16	1. 8. 5. 22	9	41. 41. 52
		5. 3. 27. 46	9. 0	28. 4. 56	41. 47. 2
			5. 6. 27. 19	28. 4. 10	
			5. 25. 4. 49	112261 . 89359 = 100315	
			5. 25. 4. 50		$4^{\circ} 32' 30''$
1588. Mart.	1. 3. 53. 32	7. 14. 59. 17	4. 23. 29. 10	27. 58. 50	1. 16. 54. 5
	1. 3. 58. 10	28. 6. 44	7. 14. 59. 17	7. 39	3. 54. 35
	1. 3. 54. 35	6. 16. 52. 33	2. 21. 30. 7	15	13. 59. 30
		6. 16. 53. 7	3. 6	28. 6. 44	13. 55. 55
			11. 4. 31	28. 5. 55	
			3. 54. 46	403176 . 24917 = 100459	
			3. 54. 53		$5^{\circ} 29'$
1590. Maj.	2. 26. 45. 24	9. 5. 55. 19	4. 23. 31. 40	27. 58. 50	16. 56. 0 m
	2. 26. 32. 0	28. 8. 34	9. 5. 55. 19	9. 21	26. 32. 0 x
	2. 26. 42. 30	8. 7. 46. 45	4. 12. 23. 39	23	39. 36. 0
		8. 7. 47. 30	7. 46	28. 8. 34	10. 20
			9. 20. 36	28. 7. 47	39. 46. 20
			8. 26. 34. 43	120679 . 83235 = 100614	
			8. 26. 40. 23		$6^{\circ} 20'$

1592.	☉ med.	♂ med.	Apog. ♂	Praecessio.	Nodus.
Jul.	5. 12. 24. 26	11. 9. 3. 39	4. 23. 34. 7	27. 58. 50	16. 57. 50 ♂
	5. 12. 43. 45	28. 10. 21	11. 9. 3. 39	11. 3	12. 43. 45 .
	5. 12. 35. 0	10. 10. 53. 18	6. 15. 29. 32	28	64. 14. 5
		10. 10. 53. 50	3. 30. 20	28. 10. 21	8. 45
			11. 12. 33. 59	28. 9. 40	64. 22. 50
			11. 12. 34. 36	206534 . 48267 = 100	6° 28' !

1594.	7. 17. 56. 17	1. 6. 38. 22	4. 23. 36. 2	27. 58. 50	
Sept.	7. 17. 56. 15	28. 12. 17	1. 6. 38. 22	12. 45	
	7. 17. 56. 5	8. 26. 5	8. 13. 2. 20	42	
		8. 26. 47	1. 58	28. 12. 17	
			11. 19. 13	11. 20	
			1. 17. 57. 35		
			1. 17. 57. 14		

Hic addita sunt ad orbitam tantum 12'' idque in nodo, ubi fere penitus nihil veri modo additum. Nam nodus 1. 17. Ergo distantia fere 1°. Facta est ergo additio per 14 1/2

1596.	9. 2. 28. 51	2. 23. 8. 54	4. 23. 38. 56	27. 58. 50	17. 1. 43 ♂
Nov.	9. 2. 28. 0	28. 14. 6	2. 23. 8. 54	8. 30	2. 34. 0 ☉
	9. 2. 34. 0	1. 24. 54. 48	9. 29. 29. 58	6. 46	45. 32. 17
		1. 24. 55. 47	9. 22. 54	28. 14. 6	45. 26. 17
			3. 2. 31. 48	28. 13. 20	
			3. 2. 32. 20	101837 . 98482 = 100	4°

1599.	10. 8. 18. 43	4. 5. 1. 32	4. 23. 41. 8	27. 58. 50	1. 17. 3. 34
d. 18.	10. 8. 18. 0	28. 15. 53	4. 5. 1. 32	17. 3	4. 8. 34. 0
	10. 8. 18. 45	3. 6. 45. 39	11. 11. 20. 24	28. 15. 53	2. 21. 30. 26
		3. 6. 46. 16	10. 20	28. 15. 5	81. 30. 26
			3. 16. 10		81. 29. 41
			4. 8. 17. 42	14955 . 669693 = 100	3°
			4. 8. 19. 57		

Restat nunc explorandum, an ad haec 10 tempora justus motus horarius assumptus, quia eadem etiam ad sequentia conducent.

1580. 12. Nov. h. 10. 50' in 8° 36' 15'' II sine mentione refractionis parallaxeos.

17. Nov. h. 9. 40.
d. 4. h. 22. 50. differentia temporis.
In Stadio die 12. Nov. ♂ in 8. 22. II
die 17. Nov. ♂ in 6. 30. II

Motus 5 dierum 1. 52.

Distantia Solis ab apogaeo die 15. Nov. 154°. Ergo motus diurnus 61. qui biduo ante et retro variatur tantum 2''. Eum serva, utilem futurum in sequentibus. Jam medius ☉ est assumendus. Ergo subtrahere 1° 52' ab 8° 36' 15'' veniet 6° 44' 15'' II ad horam 10. 50' diei 17. Tempus abundat h. 1. 10'.

Motus Martis competens horis 1. 10' est 1' 8''

6. 44. 15.

Quibus rursum additis, prodit . . . 6. 45. 23. II, jam locus Martis veni ad horam praedefinitam in tabula. Illi quoque constituerunt 6° 46' 10'' II. Fecit propter parallaxin.

Anno 82. bis computatur ♂ Martis cum ☉, primum ad horam 11 1/2 d. 28. Dec., ubi deductus fuit locus ♂ in 16° 47' ☉. At dein in adjecta recensita scheda corrigitur aliquid propter refractionem 2' in longitudine et ponitur ♂ 16° 49' 32'' h. 11. 39' 30''.

Distat h. 11. 39. 30.

et 12. 16. 0.

per 36. 30, quantulo tempore motus ♂ est vix dimidium minutum

ut ita ad assumptam tempus \odot fuerit in $16^{\circ} 47'$, correctius in $16^{\circ} 49' \odot$. Et constituerant illi 16. 46. 10. \odot .

Anno 85. 31. Jan. h. 12. Mars in $21^{\circ} 18' 11'' \odot$. Sed per refractionem illic allegatam in $21^{\circ} 20' 11'' \odot$. Ergo horis 7. 35', cum diurno $24' 15''$ venit $7' 41''$. Locus ergo \odot $21^{\circ} 12' 30''$ vel $21^{\circ} 10' 30'' \odot$. Et posuerunt $21^{\circ} 10' 26''$. Apparet de $2''$ refractionis illos jam bis usurpatam opinionem postea rursum dimisisse.

Anno 87. ad 7. Mart. h. 19. 10' deductus locus \odot $25^{\circ} 10' 20'' \mp$.

Tempus assumptum 17. 22.

differ. 1. 48. Et totidem minuta sunt motus horarius. Ergo $25^{\circ} 8' 32'' \mp$. At, ponitur $25^{\circ} 10' 20''$.

A. 89. 15. Apr. h. 12. 5. $3^{\circ} 58' 21'' \mp$ valde diligenter.

Parallaxis vero long. 1. 10. subt.,

3. 57. 11. Differentia horarum $1' 30''$. Minus scrupulorum est, nam diurnus est $22'$. Ergo $3^{\circ} 58' 30''$. Et assumsit $3^{\circ} 58' 10''$.

A. 91. dies 4 habent $1^{\circ} 12' 47''$ motum die 6. h. 12. 20' in $27^{\circ} 15' \times$.

8. 16. 25.

dierum 2. h. 4. 5' habebit motum pro 2 diebus 36. 24.

pro 4 h. 3. 4.

5 m. 4.

39. 32.

Subtrahe: restabit $26^{\circ} 35' 28'' \times$. Ponunt $26^{\circ} 32' 0''$.

A. 93. 24. Aug. h. 10. 30. Mars in $12^{\circ} 38' 0'' \times$. diurn. $16' 41''$

8. 17.

Horarius 0. 5. 48.

12. 43. 48.

Ponunt $12^{\circ} 43' 45''$.

A. 95. 30. Oct. h. 8. Mars in $17^{\circ} 48' \odot$. Diurnus $22' 54''$.

29. 21. 22.

11. 38.

11. 7.

Ergo $17^{\circ} 59' 7''$. Ponunt $17^{\circ} 56' 15''$.

A. 97. 10. Dec. h. 8. 30. \odot in $3^{\circ} 30' \odot$. Diurnus $23\frac{1}{2}$.

13. 13. 35.

3. 5. 5.

Scrupula totidem fere.

Dies 3 habent in Magino 1. 10. 0.

5. 5.

1. 15. 5. sub. Ergo $2^{\circ} 15' 0''$.

Ponere $2^{\circ} 28'$.

A. 1600. Vidi ipsam deductionem ex 13. Jan. h. 11. 40. cum fuit in $10. 39. \odot$. Inde per dies 11 assumptus est motus diurnus $23' 44''$ fere.

A. 1593. die 10. Dec. fuit Mars observatus in nodo ascendenti. Nam post subtractionem latitudinis parallacticae restabant non plus $45''$ latitudinis borealis. Videndum, an nodi moveantur. Id sic haberi poterit, si ante et post integras revolutiones sub fixis consideremus ejus motus. Tempus est 1. 43. 8.

9 Rev. 1. 43. 3.

Epocha mea 5. a. 77. 5. Jan.

Revol. 11. 27.

11. 32. — 78. 23. Nov.

22. 59. — 80. 10. Oct.

34. 28. — 82. 27. Aug.

48. 53. — 84. 15. Jul.

57. 20. — 86. 2. Jun.

1. 8. 47. — 88. 19. Apr.

p. 20. 14. a. 90. 7. Mart.

1. 31. 41. — 92. 23. Jan.

1. 43. 8. — 93. 10. Dec.

1. 54. 35. — 95. 28. Oct.

2. 6. 2. — 97. 14. Sept.

2. 17. 29. — 99. 2. Aug.

Anni prodeunt 4, ad quos sunt obs.: 90. 7. Mart., 92. 93. 95. Sed a. 90. non 7. sed 4. Mart. est observatio.

A. 1590. 4. Mart. h. 7. 10' circ. fuit declinatio Martis 9° 26'. sept. Ascensio recta 22° 35' 10". Cooritur 24° 24' 12" γ, cujus declinatio 9° 29' 27" decl. ♂ 9. 26.

Basis lat. 3. 27.

respondet 24° 22' 56" γ, lat. 3. 12. Hinc computavit Christianus ejus long. 24° 22' 1/4' γ, lat. 0° 3' 20". Dubitatur, sitne septentrionalis an meridiana. Est ergo locus assignatus eclipticae remotus ab aequatore 9. 29. Relinquitur itaque post subtractionem Martis latitudo meridiana. Et post additum excessum supra refractionem, lat. 0' 4" 1/2 merid. Cum ergo a. 90. sit meridiana, a. 93. post integram revolutionem jam septentrionalis, nodi ergo retrocederent. Sed memineris, non esse duas integras revolutiones a 4. Martii in 10. Dec., sed a 7. Martii a. 90. in 10. Dec. a. 93. His tribus diebus haec latitudo potuit absumi, ut sic etiam die 7. Martii esset sept. Quid si die 7. plus esset sept. et 10. Dec. minus, progredierentur nodi.

A. 95. 27. Octob. h. 12. 20' latitudo Martis vera post cautam parallaxin fuit 0° 2' 20" m. Die 28. Oct. itidem post cautam parallaxin vera latitudo fuit 0° 0' 25" s. Hic vides intra eundem diem incidere transitum Martis per eclipticam. Confer hos dies cum Ptolomaei observatione, habita ratione veri loci Martis respectu eccentrici, et habebis motum nodorum.

Die 23. Jan. 92. vesperi h. 10 1/4. fuit ♂ in 11° 34' 1/2 γ, latit. 0° 2' merid. Altitudo Martis circiter 25°. Refractio nulla. Distabant Sol et Mars sextili, longius igitur adhuc a Terra abfuit Mars quam Sol, minor igitur ejus parallaxis paulo. Est Solis in altit. 25°: 2' 38". Estque sectio verticalis et eclipticae pro recto, 120° circiter. Itaque iterum latitudinis parallaxis paulo minor, forte 2' aut minus. Ergo et hic ♂ in ecliptica.

Pro nodo altero h. 7 1/2 matut. — A. 1595. die 4. Jan. cum Mars in altitudine 8° observaretur a Spica ♍ et corde ♀, visa fuit ejus latitudo 0° 3' 45" b. Ibi longitudinis motus fere manet invariabilis, quia etiam cor ♀ fuit humile. Sed portio pro latitudine, seu potius pro declinatione ad eruendam veram latitudinem est corrigenda per parallaxin quidem utrinque, per refractionem in lat. Major autem refractione, non igitur tam altus ♂. Major igitur decl. australis, quam visa, minus igitur sept., ergo aut in ecliptica Mars, aut australis. Haec radix esto:

1. 49. 38.			
1. 43. 3.	Stylo vet. obs.		
6. 35.	1578. 30. Jan.		
11. 27.			
18. 2.	79. 18. Dec.		
29. 29.	81. 4. Nov.		
40. 56.	83. 24. Sept.		
52. 23.	85. 8. Aug.		
1. 3. 50.	87. 26. Jun.		
(6. Maj. lat. 0. 6. 40. b.)			
1. 15. 17.	89. 14. Maj. 6. Maji.		
1. 26. 44.	91. 1. Apr.		
1. 38. 11.	93. 16. Febr.		
1. 49. 38.	95. 4. Jan.		
2. 1. 5.	96. 22. Nov.		
2. 12. 32.	98. 9. Oct.		
2. 23. 59.	1600. 22. Aug. vel 6. Sept.		
	1602. 14. Juli.		

Ex hac tabella apparet, Martem nunquam alias in ecliptica fuisse observatum, nisi valde remote die 6. Maji a. 89. Veniet autem occasio observandi ad futurum 6. Sept. stylo novo. Erit igitur immorandum in hoc nostro die 4. Jan.

Mars fuit in 13. 36 1/2 x.

Refractio in circulo verticali ad gradum 8. altitudinis est 6' 45". Nihil est in longitudine mutandum, quia cor ♀ fuit in aequilibrio horizontis. Et quia ♂ parum fuit a meridiano, ideo tota fere refractione est adimenda altitudini.

Declinatio meridiana fuit . . . 22° 27' 1/2. Latitudo sine refractione

Refract. 6. 45. 1° 50' circiter m.

22. 34. 15. Paral. 2. quibus fit altior

ergo in ecliptica.

Per hanc declin. venit locus ♂ 13. 39. 3. lat. 0° 1' 49" m. Computante Matthia.

Idem etiam hinc probatur. Cum angulus verticalis et eclipticae sit circiter 108° , nam nulla minor verticali erit latitudinis et refractionis parallaxis; forte pro quinta parte. Est autem Mars in vicinia Solis, minor itaque ejus parallaxis. Habet \odot in alt. 8° parallaxin 2. 52. Huic adime circiter sextam partem pro parallaxi \odot , restat $2' 24''$. Et haec est verticalis parallaxis. Et huic adime partem quintam circiter, restabit $2'$ circiter parallaxis latitudinis. Itaque esset ejus lat. bor. $5' 45''$. Jam adime et refractioni partem quintam, restat $5' 24''$, quam ab illa subtrahere, restat $21''$ bor. Ergo hoc die fuit in nodo.

Vide, qualis sit ejus dispositio in eccentrico, ut appareat, ubi sit diameter nodorum.

1594:	7 ^s 28° 25' 39"	4 ^s 23° 35' 8"	prior simpl. 3 ^s 6° 24' 52" anom.
dies 3.	1. 34. 20.	8.	posterior 8. 12. 2. 56.
long. simpl.	8. 0. 0. 0.	3. 6. 24. 52.	5. 5. 28. 4.
prosth.	11. 29. 2.	11. 29. 2.	prior. coaeq. 2 ^s 24° 55' 30"
	7. 18. 31.	2. 24. 55. 50.	8. 23. 26. 2.
Sept. d. 27.	4. 23. 4. 17.	50.	6. 1. 35. 48.
	14. 9. 0.		5. 28. 24. 12.
long. simpl.	1. 5. 38. 56.	4. 23. 36. 0.	Differentia $1^\circ 36'$, quam conficit Mars
prosth.	11. 17. 6.	1. 5. 38. 56.	diebus tribus. At per tantum temporis
long. coaeq.	1. 16. 56. 2.	8. 12. 2. 56.	errari per intricaciones refractionum et
		11. 17. 6.	parallaxium non potuit.
		8. 23. 20. 2.	

Investigatio limitis borei.

	3 ^s 0° 47' 54"	A. 1595.
	2. 24. 55. 50.	Nodi 2 ^s 24° 55' 50"
	11. 24. 7. 56.	4. 23. 35. 8.
ante apog.	5. 52. 4.	7. 18. 30. 58.
	4. 23. 35. 34. Q	8. 23. 20. 2.
limes	17. 43. 30. Q	4. 23. 36.
		1. 16. 56.

His addit Keplerus ulteriorem „speculationem“, qua nititur, loca nodorum inquirendi. Paulo post vero abrumpit stilum addens: „nihil, male accommodatis observationibus,“ et hinc transit ad inquirendam \odot eccentricitatem etc.

36) p. 214. Sphaericorum Theodosii libros tres edidit et scholiis illustravit Vogelinus Viennae 1529, Pena Par. 1557, et Ch. Clavius Romae anno 1586. (Clavii op. tom. I.) De tempore, quo vixit Theodosius, refert Weidlerus (Hist. Astr. p. 146): Strabo, aevi Augustei scriptor, memorat Theodosium Bithynum mathematicum; quare ante aeram Christianam vixisse oportuit. Eapropter eruditi quidam viri (Riccioli, Dechales, Vossius), Theodosium Sphaericorum auctorem ad annum a. Ch. 50. retulerunt. Aliis recentior ejus aetas videtur, atque hi „Bithynium“ a „Tripolite“ distinguunt. Nituntur auctoritate Suidae, secundum quem Theodosius, qui Sphaerica scripsit, etiam in Theudae *Κεφαλαία* commentatus fuit. Theudas vero post Ch. n. vixit (sec. II. p. Ch.).

37) p. 217. Haec et sequentia Martis loca exhibet ex parte collectio observationum Tychonis, inscripta Historia Coelestis. Eadem anni 1580. Maestlini Ephemerides „ab anno 1577. ad annum 1590, supputatae ex Tab. Prutenicis, ad horizontem Tubingensem, cujus longitudo est $29^\circ 45'$, latitudo vero $48^\circ 24'$.“ (Prodiere Tub. 1580) Deinde Ephemerides Jo. Stadii (Colon. 1584), de quo diximus vol. I. p. 363. Ejusdem Stadii opera concinnatae sunt „Tabulae Bergenses“, quae prodierunt a. 1560. Coloniae, quas monet Ricciolus (Almag. praef.) coelo non undique congruere; idem judicium fert Tycho de Stadii Ephemeridibus. (Weidl. Hist. Astr. p. 371.) Dav. Origanus Ephemerides suas (ed. a. 1599) sic inscribit: Ephem. novae annorum 36, incipientes ab a. 1595, quo J. Stadii maxime errare incipiunt &c. et in praefatione haec affert: septimus hic annus agitur, quum has condere coepi Ephemerides, adductus ad hunc laborem his inprimis rationibus, quod posteriores Stadii a calculo tabularum Prutenicarum, unde deductas esse ipse gloriatur, multum aberrare, et M. Maestlinum, mathematicum praestantissimum et prof. acad. Tub. solertissimum, aliis procul dubio occupationibus distractum, Ephemeridas suas ulterius non extendere animadverti.

38) p. 219. In Tychonis Progn. I, p. 414 haec leguntur: Licet parallaxium mensuratio in tribus superioribus planetis vix locum inveniatur, attamen adhibito exactissimo instrumento et has parallaxes experiri licebit, praesertim in Marte, quando acronychius est, cujus ego parallaxes circa id temporis demensus sum; quare convenientiore loco, quid invenerim, manifestabo.

Item p. 661: nos in Marte acronychio alia quidem ratione id (sc. parallaxes superiorum planetarum) experiri et prout speramus satis certe assequi non intentatum reliquimus, ut alibi convenientius aperiemus.

Eadem quae hic, recoquit Keplerus in „Tychonis Hyperaspiste“, nec non in literis ad Dav. Fabricium datis.

Fabricius in postscriptis ad epistolam d. 2/12. Apr. 1605 (v. s. p. 98) scriptam quaerit: In Mysterio Cosmographico ostendis ex proportionibus 5 corporum distantias et proportionibus sphaerarum ad se invicem. Cupio scire, an omnia, praesertim Mars, Sol, Luna, quorum motus perfecte nunc constant, veritati et apparentiis congruant, ut futurum putas, si de vera eccentricitatis proportionibus de illis constet. Quodsi sic, esset miraculi loco, et recte dictum, omnia in numero et mensura consistere.

Keplerus respondit: An adhuc stet Mysterium meum, quaeris? Omnino mihi bisectio eccentricitatis Solis benignissime fecit in diastematibus omnium planetarum, et hoc procul dubio est, quod me torsit fol. 61, ut et 50—53. Mysterii (Vol. I, p. 165 et 153 s.), quod sc. in compensationem alterius partis eccentricitatis Solis, quae mihi ex antiqua persuasione accesserat, Lunam exterminare volui. Nam Luna addita plus justo habui, eliminata minus justo.

Exerceamur: radii orbis Martis 109300, 90700. Si 109300 dat 166666, quid 90700? — 138304, ima ζ . Summa Terrae solius 101800. Jam 100000 dat 79465, radium inscripti icosaëdro, quid 138304? — 109903, radium orbis in dodecaëdro; summa Terrae 101800

Diff. 8103.

Si ergo Terra a Sole distaret talium partium 1018, qualium Luna distat a Terra 81, tunc exquisitissime concordaret Mysterium. Dicamus sic: 81 sunt 60 (semi) diametri Terrae, quid 1018? — 754. Quia ergo certum est observatione, Lunam distare 60 ubi plurimum, Terra igitur secundum hanc analogiam distaret 754 semid. At ponitur distare 1200, sed periculosa et facile erranti methodo, quae nititur aestimatione digitorum eclipticorum. In eccentricitate Solis Ptolemaica est summa Terrae 1021; hoc subtrahere a 1099, restat 78: parum lucrum; est notatu dignum: si Terra distat 754 semid., tunc umbrae Terrae mucro desinit in corpore Martis, si mediocriter distat. —

Et quia in hanc mentionem incidi, consilii capiendi causa, rem magni momenti aperiā.

Tycho perscripsit (locis supra citatis et in Epist. astron. p. 42), se observasse parallaxes Martis majores Solaribus in ζ Solis; perquisivi in observationibus, invenio insignem fallaciam contigisse. Tycho instituerat hoc facere; observationes huic negotio idoneae habitae ex ipsius mente. Ex iis observationibus ego parallaxin invenio nullam, minorem sc. quam ea, quae Soli tribuitur: adeo, ut si quaeratur, ea se intra observandi incertitudinem abscondat. Nec invenio examinatas illas observationes parallaxeos eruendae causa; sed hujus loco invenio schema Copernicanum, numeros et assumpta omnia ex Copernico, casum tamen ex observatione illa, et inde per solutionem triangulorum rectilineorum laboriosissimam computationem parallaxeos Martis, ubi tandem concluditur, majorem esse Solari; idque manu studiosi alicujus. Credo igitur, jussisse quidem Tychonem, quod erat ad rem studiosos vero perperam intellexisse, et deinde factum retulisse quod imperaverat, in verbum vero quod erat suspicatus.

Tu igitur quid suades? Quomodo haec propalanda lectori? Certe in fraudem veritatis reticenda non sunt, ne Deum iratum habeamus.

Si ergo parallaxes ζ tam parvae, erunt et \odot minores, quod etiam eclipsium doctrina confirmabit, ubi ad Hipparchum meum Deo dante accessero; nam aegre 1' retineo inter Solis parallaxes. Alia igitur obliquitas eclipticae &c. Quo vero

altius Solem sustulero, hoc longius a meo Mysterio discegero. — (Ex epistola Kepleri d. d. 11. Oct. 1605. Comp. p. 99.)

Fabricius (d. 20/30. Jan. 1607): Statnis parallaxin Martis non tantam esse, quantum Tycho putat; Solis multo minorem. Respondeo: non potuit per Tychonis instrumenta Solis parallaxis vera latere, et cum \odot medium fere \odot orbem habet, quomodo minorem habeat?

Keplerus (1. Aug. 1607): De parallaxi \odot me non percepisti. Tycho Solis parallaxin nunquam est dimensus suis instrumentis, sed assumpsit demonstratam ex eclipsibus statuitque esse 3'. Hac parallaxi Solis majorem pronunciavit Martis per acronychia; sed ut deceptus sit a ministris calculi, scripsi ante annum. Nam si consulam observata Martis, quae Braheus ipse destinavit Martis parallaxibus inquirendis, invenio minorem parallaxin 3', minorem etiam 2'. Ex hoc ratiocinor ut tu, sed *diventalis*; nimirum assumo veram ex Braheo vel Copernico proportionem orbium. Ergo si Martis parallaxis in opposito Solis est minor 2', Solis parallaxis non erit multo major 1'. Et vere quidem ex eclipsium doctrina nihil aliud quam hoc habetur: non esse nullam Solis parallaxin; item illud: non esse majorem 3 minutis. At inter 0' et 3' incerti relinquimur ab eclipsibus, ut olim probabo, Deo vitam dante, in Hipparcho.

Manuscr. Vol. XIV. haec habet ad „Inquisitionem parallaxeon \odot ex observationibus T. Brahei, quas habuit anno 1583. Januario,“ quaeque referenda sunt ad p. 220.

Die 16. Jan. h. 7. 30' \odot a lucida pedis Erichthonii $23^{\circ} 29'$, bis vel ter, in alt. 51° .
Die 17. h. inter 5. 15' et 5. 30' eadem dist. $23^{\circ} 16'$ ter. Alt. $33^{\circ} 31'$. Stellae lat. est 5. 20 h. Martis paulo minor. Hinc horarius habetur $35''$. h. $7\frac{1}{2}$. — 23. 29.

Die 18. h. 5. 5' dist. 23. 1. 30 ter. $5\frac{1}{2}$. — 23. 16
Prius 5. 20 23. 16 $21\frac{3}{8}$. 13.

24. 15. 14. 30 (: 24. 15') = $36''$ fere. 21. 50|35"
Ergo die 18. mane h. 3. 11 in alt. \odot 29° fuit haec dist. 23. 9' quinquies. 10. 55
Prius 5. 20 „ „ 33. 20 . . . 23. 16 1. 49

horae 9. 51' dant ————— 7' sine parall. 12. 54
 $36 \times 9. 51' = 5. 55$ (deb.). Ergo parall. hic potuit non plus 1' in longum.

Hora 5. 20 — 20° \odot est in nonagesimo, \odot ergo in 10° \odot distat ad ortum 50° . Mane h. 3. 11' est 28° \odot in nonag., \odot ergo distat ad occasum 48° . Alt. 20° \odot est 49 ex Copernico; alt. 28° \odot — 55. Sit altitudinis parallaxis per falsi $60''$, erunt horizontales longitudinis $45'' 17'''$ et $49'' 9'''$, et hinc partes pro distantibus nonag. $34'' 28'''$ et $36'' 25'''$. Summa $71''$; debuimus efficere 65; ergo paulo nimium assumseramus.

In secunda positione sumantur $50''$; prodeunt 29 et $30\frac{1}{2}$, summa $59\frac{1}{2}$. Jam tantum deficit, quantum prius abundabat. Igitur horizontalis est $55''$. Distat vero \odot a Terra minus quam \odot , minor ergo \odot parallaxis.

Idem per Cor \odot ; h. 7. 45 — 44. 6. 30; alt. ultra 35°
15. 30 — 44. 13 — — c. 26.

7. 45 ————— 6. 30
deb. 7. 45 \times 36 ————— 4. 39

1. 51 parallaxis. Et cum haec tempora ab illis multum distent, et brevior sit digressio \odot a nonag., jam igitur ipsi competet alt. parallaxis c. c. $2\frac{1}{2}$.

39) p. 222. Cum in hoc capite Keplerus saepius appellet „Tabulam Parallaxicam“, quam ipse addidit Opticae, nos vero omittendam censuimus (comp. vol. II. p. 434), respicientes ad ea, quae l. c. diximus, unum tantum Kepleri calculum repetimus, ut habeat lector, quo reliquos calculos ponderet.

Pagina 222. inquirens lat. \odot arcum prodit Keplerus circuli declinationis = $3^{\circ} 0' 30''$ et angulum hujus circuli cum ecliptica = $68^{\circ} 59'$. Jam in triangulo sphaerico rectangulo dantur hypot. = $3^{\circ} 0' 30''$ et alter angulus = $68^{\circ} 59'$, quare sin. lat. = sin. $3^{\circ} 0' 30''$
 \times sin. $68^{\circ} 59'$ log. sin. $3^{\circ} 0' 30''$ = 8,7200038
log. sin. $68^{\circ} 59'$ = 9,9701032

8,6901070

Lat. \odot = $2^{\circ} 48' 29''$.

Ut tabula „parallaxica“ uti possit, assumpsit Keplerus $1^{\circ} 0' 30''$ pro $3^{\circ} 0' 30''$ et depre-

hendit in illius columna, quae inscripta est 60 (= 1°) ad angulum in margine 68° quantitatem 55' 38"; differentia inter hqc et aream ad marginalem 69° (56' 1") = 23" dat $\frac{59.23}{60}$ = 22,6; 55' 38" + 22,6" = 56' 0,6". Haec quantitas triplicata (quia angulus 1° pro 3° assumtus fuerat) dat 2° 48' 1,8". Jam adhibitis reliquis 30" prodit tabula in columna, quae inscribitur 30, ad marginem 68 (additis scrupulis proportionalibus pro 59') 28,8", quae addita ad 2° 48' 1,8" exhibent lat. $\delta = 2° 48' 30,6''$.

40) p. 229. 1) Posita distantia Martis C a Sole B = 5, eademque Terrae A a Sole B = 3, erit AB : CB = 3 : 5 = 1 : 1,6668....

Deinde assumpta AD (= $\frac{1}{2}$ AB) = 1, erit AC (= CB) = 3,3333...

$$\text{ergo cos. CAD} = \frac{1}{3,3333},$$

$$\angle CBD = \angle CAD = 72° 33'.$$

Hinc assumpto $\angle CBD = 72\frac{1}{2}°$, $\angle BCA = 180° - 145° = 35°$. Cum autem linea CB vergat in 17° Q, linea CA verget in 4° 17' + 35° = 5° 22°, h. e. 22° TP, sive in 4° 17' - 35° = 3° 12°, h. e. 12° Q.

2) Assumpta proportione AB : CB = 8 : 11 = 1 : 1,375 et posita BD = 1, erit CB = 2,75, ergo cos. CBD = $\frac{1}{2,75}$; $\angle CBD = 68° 40'$, $\angle BCA = 180° - 137° 20' = 42° 40'$. Locus Solis B^{3a} C visus in 17° ∞ , ergo locus Terrae A sive in 10° 17' + 42° 40' = 11° 29° 40' h. e. fere in 0° γ , sive in 10° 17' - 42° 40' = 9° 4 $\frac{1}{2}$ ' h. e. in 4 $\frac{1}{2}$ ' δ , neque vero in 24 $\frac{1}{2}$ ' δ , quem locum obtinebis subtrahens 52° 40' pro 42° 40'.

Locus Solis erit primo casu in 5° 22° + 72 $\frac{1}{2}$ ' = 5° δ p. p.

secundo — 3° 12° - 72 $\frac{1}{2}$ ' = 30° γ . .

tertio — 0° + 69° = 9° Π . .

quarto — 9° 5° - 69° = 26° ∞ . .

sive assumpto loco Martis eo, quem Keplerus exhibet, in 8° 25° - 69° = 16° ∞ . .

41) p. 233. Keplerus ponit $\angle CBE = 6° 7'$, quem in tabella cap. VIII. posuerat = 6° 3'. Adhibita posteriori hac quantitate prodit sin. BCA = $\frac{\sin. 6° 3'}{1,389}$;

$$\angle BCA = 4° 21' 6'' (10'')$$

$$\angle CBE = 6° 3'$$

$$\angle BAC = 1. 41. 54.$$

Assumpto autem $\angle CBE = 6° 7'$ prodit $\angle BCA = 4° 23' 58''$
 $\angle CBE = 6. 7.$

$$\angle BAC = 1. 43. 2''.$$

Ergo, quamquam assumamus 7' pro sphalmate typographico, et ponamus pro 6" numerum rotundum 10", adhuc restat dubium, cum 6° 3' - 4° 21' 10" non sit aequale 1° 42' 10". Tollunt hoc dubium Kepleri manuscripta, quae exhibent AC = 1384. Hinc prodit BCA = 4° 24' 50", qui subtractus a 6° 7' relinquit BAC = 1° 42' 10".

42) p. 233. In editione Heidelb. 1582. pag. 361: „Cum diameter longitudinum mediarum et diameter mutuarum sectionum epicycli et eccentrici diametro sectionis eccentricorum et eclipticae et sic etiam ipsi eclipticae quam proxime semper aequidistant, ideo pro una simplici latitudine haberi possunt, qua sc. planum epicycli, quod in nodis unitur eclipticae, inclinare faciat diametrum illam, quae lineae per utrumque limitem ductae parallela est super diametrum lineae per nodos ductae parallelam.

In locis intermediis diameter nutans sursum respicit, sed inclinationem sustinens transversa ponitur. Hinc latitudines horum planetarum computantur tantum ad positus epicyclorum in limitibus, et postmodum per scrupula proportionalia ad alios situs eccentrici secundum distantias vel majores vel minores a limitibus vel ab ecliptica adaequantur.“

De Rhaetici „Narratione“, quam paulo post affert Keplerus, diximus Vol. I, p. 8. Keplerus spectat conclusionem Rhaetici, ubi, praemissa latitudinis planetarum descriptione, refert: „apud Copernicum nihil prius, nihil antiquius quicquam esse, quam vestigiis Ptolemaei ut insistat“ &c.

43) p. 234. Petrum Apianum (Bienewitz), nat. Leisnigi Misniae a. 1495. Ingolstadiæ matheseos professorem ab a. 1524 († 1552) ejusque opus inscriptum: „Astronomicum Caesareum (Ingolst. 1540) nec non „Cosmographiam“ pluribus dicunt Weidlerus (Hist. Astr. p. 349) et Delambus (Hist. de l'Astr. du moyen age p. 390). Weidlerus Kepleri verba proponens, addit: „Haec quidem omnia (loca stellarum ope astrolabiorum et planetolabiorum orbiculariorum ad quodvis tempus sine calculo invenire, eclipses praedicere &c.) utut ingeniose excogitata nec minore solertia perfecta, et propterea laudem suam habent.

tamen calculorum subtilitatem minime assequuntur." De Globo Apiani refert Keplerus vol. I. p. 79, de illius horologio Chytraeus ib. p. 193. (Cosmographiam pluries editam fuisse a R. Gemma diximus vol. II. p. 419.)

44) p. 235. „Distat \odot a \odot h. e. a puncto opposito Marti, quod est in $8^{\circ} 37' \times$; Sole in $0^{\circ} 45' 36'' \times$ existente, differentia locorum est $8^{\circ} 37' - 0^{\circ} 45' 36'' = 7^{\circ} 51' 24''$.

Motus diurnus compositus Martis et Solis = $1^{\circ} 24'$, ergo $7^{\circ} 51' 24''$ conficiuntur in $\frac{7.86}{1.4} = 5,6142$ diebus = 5 d. 14h. 44'

Observatio facta est Nov. 12. 10. 50

Articulus oppositionis die 18. 1. 34. Novembris.

45) p. 235. Laudes, quas confert hic Keplerus in Lansbergium (comp. Vol. I. p. 65) testantur gratum ipsius animum et liberum de aliis iudicium. Vir toto coelo Lansbergium superans doctrina et ingenii subtilitate, non aspernatur publicas agere gratias auctori tabularum trigonometricarum, quibus uti consueverat in calculis suis astronomicis, quaeque, ut ipse innuere videtur Keplerus, hoc tantum differunt a tabulis aliis illorum temporum, quod introductionem exhibeant quam brevissimam in praxin trigonometricam et tabulas synopticas formularum trigonometricarum. Parum gratiae refert Lansbergius Keplero pro hac ipsius mentione in opere hoc immortalis, postea in libris suis astronomicis affirmans, „Kepleri hypothese non minus laborare falso et absurdo, quam Tyconicas“ (Uranometriae libri III. Middelb. 1631, in proleg. fol. ult.), et novas condens tabulas, quia Tabulae Rudolphinae ipsi non satisfecerunt. (Tab. motuum coel. perpetuae &c. Middelb. 1632), quam ob rem Lansbergium pro merito excepit Jeremias Horroccius Anglus, infra pluribus dicendus.

46) p. 238. Numeri hujus loci non plane consentiunt calculo. Nam si locus Soli oppositus est in $29^{\circ} 4' 53'' \Pi$,
et locus Martis in $3. 45. 30 \odot$

Mars tum abest a puncto oppositionis per $4^{\circ} 40' 37''$, quod dicit Keplerus „distantiam siderum“; deinde cum sit summa diurnorum = $85'$, erit tempus verae oppositionis = $\frac{280,6167}{85}$

= 3,30137 d. = 3d 7h 14.

Tempus observ. Dec. 10. 8. 30

Tempus oppos. Dec. 13. 15. 44, h. e. d. 14. Dec. mane hora 3. 44'. Diebus 3,3 movetur Mars per $1^{\circ} 18' 6''$, ergo locus Martis $3^{\circ} 45' 30'' \odot - 1^{\circ} 18' 6'' = 2^{\circ} 27' 24''$. (In tabella p. 241 : $2^{\circ} 28'$.) Assumpta autem „distantia siderum“ Kepleriana $4^{\circ} 46' 27''$

prodiret quaesitum tempus = $\frac{286,45}{85} = 3,37 = 3d 8h 52' 48''$, omniaque reliqua mutanda

essent. Quare numerus $4^{\circ} 46' 27''$ sphalmati typographico tribuendus erit. — Ad praecedentem locum (Nro. VIII.) notamus, numeros „40' 47'' diei“ prodire calculo „sexagenario“,

de quo aliis locis diximus. Fractionibus usi decimalibus prodit quaesitum tempus = $\frac{56,75}{83,4867} = 0,67975$ d. = 16h 19'.

47) p. 238. Assumit hic Keplerus, ut prius saepius loco citato compendii causam fecerat, triangulum ABC „proxime“ rectangulum ad A, dum ponit arcum AB „proxime“ parallelum eclipticae.

Jam dato arcu AB = $4^{\circ} 43' 30''$, arcu BC = $52^{\circ} 19' 30''$, prodit

$$\cos. AC = \frac{\cos. 52^{\circ} 19' 30''}{\cos. 4^{\circ} 43' 30''} = \frac{9,7861704}{9,9985215}$$

$$AC = 52^{\circ} 10' 26'' = 9,7876489.$$

Keplero prodit AC = $52^{\circ} 14'$, cum arcum AC non $4^{\circ} 43' 30''$ sed = $3^{\circ} 45'$ („ $3\frac{3}{4}$ differentia“) assumerit, quo adhibito prodit quaesitum.

48) p. 239. Parallaxes sine ope „tabulae parallacticae“ (vide s. ann. 39), sic computantur: sin. parallaxeos latitudinis = sin. $5' \times$ sin. $32^{\circ} 30' =$ sin. $2' 41''$. Haec $2' 41''$ addita ad $4^{\circ} 7' 55''$, produnt lat. \odot ex centro $\odot = 4^{\circ} 10' 36''$. Sin. parall. longitudinis = sin. $5' \times$ sin. $57^{\circ} 30' =$ sin. $4' 13''$. Deinde, quia $5^{\circ} \odot$ in nonagesimo et \odot in $13^{\circ} \Pi$, distat \odot a nonagesimo per 38° , ergo sin. parall. long. = sin. $4' 13'' \times$ sin. $38^{\circ} =$ sin. $2' 36''$. $4' 13'' - 2' 36'' = 1' 37''$

Locus \odot in $13^{\circ} 19' 36''$

$13^{\circ} 18' -$ „proxime“.

Locus Soli oppositus eo momento $10^{\circ} 16' 42'' \Pi$

Locus \odot 13. 18. — Π

Distantia „siderum“, h. e. \odot ab opp. $\odot = 3^{\circ} 1' 18''$

49) p. 239. Iterum hic $\triangle ABC$ (Fig. 68) assumitur ad A rectangulum, ergo

$$\cos. AC = \frac{\cos. 8^{\circ} 17'}{\cos. 1^{\circ} 45'};$$

$$AC = 8^{\circ} 6'.$$

Observationes, quas exhibet Keplerus, Fabricius ipsi transmiserat adjunctas literis d. d. 13/23. Martii 1602, addens: mitto observationes acronychii Martis hoc anno fideliter habitas; in 4 et 5 post mittam, ubi vestras accepero literas. Quomodo studia vestra in 6 et aliis succedant, non intermitte quin saepe me certior de iis reddas. Quod maxime rogo, concludit pastor sollicitus, in Augustanae confessionis affectione constans vel hactenus cum tuis maneto. Deus in exilio tuo vobis praevidebit, utque tuam fidem magis exerceas, D. Hunnii libros interdum legito. Vale.

50) p. 243. Solutionem hanc dicit Keplerus in literis ad Fabricium datis „quadratae regulam falsi“ eamque huic declarat. (Vide supra p. 75.) Quae de eodem problemate Herwarto et Magino scripserat, leguntur p. 25, 43.

51) p. 246. Franciscus Vieta (nat. a. 1540 Fontenaii in inferiore Pictorum provincia — Poitou — Ludovico XIII. a. consiliis; mortuus anno 1603.) celeber ob multifariam in mathematicis doctrinam, cujus partem praesertim analyticam excoluit et inter primos analysin algebraicam ad geometriam applicavit algebraeque compendiosiores reddidit inductis literarum signis in aequationibus. In libro inscripto: Apollonius Gallus seu exsuscitata Apollonii Pergaei *περὶ ἑλαφῶν* geometria, ad Aed. Romanum (Par. 1609) „Appendicula II.“ (in editione Operum Vietae curante Fr. a Schooten, Lugd. Bat. 1644, fol. 343) haec dicit Vieta: Ptolemaeus ipse et Ptolemaei paraphrastes Copernicus cum a tribus epochis mediis et totidem apparentibus exquirunt summarum absidum loca, geometras non se produnt, assumentes opus tanquam confectum, quod ideo resolvunt infelicitur. Immo vero Copernicus *ἀρεχγίαν* non solum profitetur, sed docet Cap. 9. lib. III. Revolutionum. Jubet enim, non jam artis sed aleae magister, circulum tam diu revolvitur, donec error, quem ex sua *ἀντιστοιχία* nasci agnoscit, tandem si sors dederit compensetur. Sane infelix logista fuit infelicior geometra Copernicus; itaque omissa a Ptolemaeo omisit, commisit autem quamplurima.

Deinde „appendicula I.“ (fol. 339 dictae editionis): Dixi (in fine libelli inscripti: Fr. Vietae ad problema, quod proposuit Adrianus Romanus, responsum), quaedam esse problemata, quorum geometricam constructionem se nescire ait Regiomontanus, quamquam algebraice, ut loquitur, ea explicet. At algebra, quam tradidere veteres analytiae, omnis geometrica est.

Quae dicit Keplerus de laboribus suis immanibus verissima deprehendet, qui insperet Mss. Petrop. Vol. XIV. Inter multa alia quae hic Keplerus tentavit pro conciliandis observationibus cum calculo, memoriae causa sibi reservata, quaeque typis expressa certe 2 volumina nostrae editionis consumerent, eorum, quae ad hunc pertinent locum, delectionem quandam instituendam censemus. Folio ab initio 546. illius voluminis haec deprehendimus: Revisio pragmatiae, qua eccentricitas, aequatio, distantia centrorum et media longitudo investigantur (in praemissis foliis 66). Causa revisionis est haec: prima vice falsum assumseram. Errorem ipse commisi (in deductione loci 6). Altera vice putavi me fundamentales observationes optime constituisse; at animadverti errorem 4' in una, quem non ipse, sed computator longitudinum et latitudinum commiserat. (prius locus 6 25° 44' 31" mp, jam 25° 48' 24" mp; „computator“ fuit discipulus Tychois, cum Keplerus, desumens data ex observationibus Tychois, loco quo errorem detexit adscripsit: mirum, hic 4' meam ab illorum computatione differre — et nota, hanc esse fundamentalem. — Deinde addit: falsa haec computatio, nam pars proportionalis est 43' 12", quare 25° 42' 30" et per sextantum distantias 25° 43' 30". — Haec his explicantur: paulo supra prodit Keplerus diurnum 6 24' 26" et locum 6 d. 4. Mart. h. 3. 25' in 26° 25' 42" mp; veram 6 6 et 6 die 6. Mart. h. 6. 4', diff. d. 1 h. 18. 39'; hinc computata sunt falso 37' 18" pro 43' 12" motus 6 ad intersectum tempus; 26° 25' 42" — 43' 12" = 25° 42' 30".)

Keplerus pergit: Unde procul dubio factum, quod assumpta et limitata hypothesis discrepaverit a 4 reliquis non assumtis ad constructionem. Necessario igitur est, ut omnia 4 loca ex suis declinationibus et A. R. deducantur.

Initio facto ab a. 1587. sic concludit: haec deductio praeferenda est omnibus prioribus. Omnia bis repeti et ex ipsis observationibus deduxi. — Frustra, quod anno 1602. 15. Jun. apparuit. Nota ergo hunc errorem in sequentibus.

Secunda observatio supra diligenter fuit examinata et constitutum tempus

8. Jun. h. 7. 23', locus \odot $26^{\circ} 42' 3''$ II; \odot $26^{\circ} 43' 3''$ \nearrow . Tertia ex computatione est deducta; longitudo bene habet. Tempus est 25. Aug. h. 16. 52', locus $12^{\circ} 16' 0''$ X. Quarta ad 30. Oct. h. 8. 20', locus $17^{\circ} 47' 15''$ \searrow .

Hinc rem de novo aggressus ponit aphelium $29^{\circ} 0' 35''$ Ω et longitudes: $6^{\circ} 0' 50' 8''$, $9^{\circ} 5' 43' 28''$, $11^{\circ} 9' 54' 18''$, $1^{\circ} 7' 14' 1''$; et calculo absoluto, cum deprehenderet, angulos F et D non in circulum incidere, dimittit aphelium per 11'. Calculus ostendit, 18' aphelium adimenda esse, quo facto summa angulorum ad D non par prodit summae angulorum ad F; item additis $3' 44''$ (comp. fol. 247). „Ratio est, quia erravi, cum statuerem promovere apogaeum, id removere ipsa.“ Iterum vero res non ex voto successit: „apparet, totam hanc repetitionem institutam esse perperam; addidissem potius meae pridem correctae longitudini.

BAE prius	$103^{\circ} 49' 59''$	jam	$106^{\circ} 8' 36''$
CAE —	$101. 43. 45.$	—	$101. 45. 24$
	<u>2. 6. 14</u>		<u>4. 23. 12</u>
			<u>2. 6. 14</u>
			2. 17.

Ergo si $3' 26''$ addita absumunt $2^{\circ} 17'$, quid addendum, ut consumantur $4^{\circ} 23' 12''$? — Resp. $6' 36''$ addendum long. Tychonis. Apogaeum jam $28^{\circ} 57' 19''$, prius $29. 11. 35$, erit c. $29^{\circ} 34''$. Calculus nondum ad scopum perducit, quare iterum iterumque mutando aphelium frustra per 14 folia quaerit optatum, ut denique adscripserit: „Major justo, nescio ubi error.“ Tum, „errorculo“ (1') deprehenso rem de novo aggreditur, cum vero non succedat, „plane, inquit, contrarium est factum ejus, quod intenderam; oportet ergo detrahere apogaeo $1' 58''$. Quod quum nondum sufficeret, addit $7''$, deinde $1' 40''$, denique $2' 30''$. Hinc prodit differentia duorum angulorum ad D et duorum ad F = $4' 25''$. Nondum satisfacit quod positum est, quare repetito calculo, sic incipit: „sequitur ergo sollemnis repetitio eorum, quae sunt supra; utique et ultima esse possit.“ Calculo per 7 folia producto adscribit: „manifeste apparet residua aliqua mendula. Ut autem hic errorculus tollatur, compara priorem eccentricitatem et aphelium cum moderna... Prius plus justo colligebamus c. 8, hic minus justo c. $1\frac{1}{2}$; si utamur parte proportionali, prodit apogaeum $29^{\circ} 0' 35''$, addendum long. mediae $3' 39''$, eccentricitas tota 18557, eccentrici 11613. Haec ergo correctissima hypothesis, quam studiosus aliquis probet. Tunc prodibit $25^{\circ} 44' 30''$ Ω .

Jam demum missa hac inquisitionis methodo aliam ingreditur viam, inquiens: „Discutienda nobis est haec lis per caput 27.“ (28), et iterum consumtis irritis conatibus per 14 folia addit: haec subtilitas tota fuit frustranea, cum hypothesis ipsa plus aberrare possit, quam erramus, si aphelium ponamus in $29^{\circ} \Omega$ (in margine: Minime. Neque n. hypothesis errat, si bene instituat). Illud in genere verum est, ex *apocryphicis* longitudinibus eccentrici eccentricitatem elici non posse. Sed sunt consulendae parallaxes annuae, et quo plures talium distantiarum haberi possunt, hoc melius est. — Hinc transit ad alia nec redit in hoc volumine ad priorem inquisitionem.

52) p. 246. Numeri exhibentes „motum praecessionis“ desumptae sunt e tabulae Cap. VIII. (p. 211) columna penultima sic: Praecessio aequinoctii

a. 1587. = $28^{\circ} 4' 10''$	—	$28^{\circ} 4' 10''$	—	$28^{\circ} 4' 10''$
a. 1591. = 28. 7. 47	a. 1593. 28. 9. 40	a. 1595. 28. 11. 27		
diff.	<u>3' 37''</u>	<u>5' 30''</u>	<u>7' 17''</u>	(K. 18'').


Quibus numeris subtractis a longitudinibus \odot annorum 91, 93 et 95, quas exhibet tabula Cap. XV, reductio ad annum 1587. absoluta est longitudesque Martis mediae supputantur: $6^{\circ} 0' 47' 40''$; $9^{\circ} 5' 40' 18''$; $11^{\circ} 9' 49' 34''$; $1^{\circ} 7' 6' 51''$.

Jam Keplerus incipit calculum duo „ponens“ 1) aphelium \odot esse in $28^{\circ} 44' \Omega$ 2) longitudinibus his mediis addenda esse $3' 18''$. Quam additionem, quamquam perficit, ut accipiat angulos CFA, CGA &c., omittit in inquirendis angulis ad C, praeterquam in angulo FCB, ad reliquos angulos adhibens non auctas long. medias $9^{\circ} 49' 34''$ X &c.

53) p. 247. In $\triangle CAF$, CAG , CAD et CAE dantur $CA = 1$, anguli ad puncta F, G, D, E: $5^{\circ} 7' 58''$; $9^{\circ} 4' 11''$; $2^{\circ} 17' 40''$; $10^{\circ} 14' 15''$; et anguli ad punctum C: $32^{\circ} 6' 56''$; $11^{\circ} 5' 34''$; $53^{\circ} 3' 42''$; $68^{\circ} 22' 51''$.

Quibus datis quaeruntur latera AF, AG, AD et AE.

Fig. 138.



Ergo :

$$\begin{aligned} AF &= \frac{\sin. 32^\circ 6' 56''}{\sin. 5^\circ 7' 56''}; & AG &= \frac{\sin. 53^\circ 3' 42''}{\sin. 9^\circ 4' 11''}; \\ &= 5,9431 & &= 5,0704 \\ AD &= \frac{\sin. 11^\circ 5' 34''}{\sin. 2^\circ 17' 40''}; & AE &= \frac{\sin. 68^\circ 22' 51''}{\sin. 10^\circ 14' 15''}; \\ &= 4,8058 & &= 5,2308. \end{aligned}$$

Lineae AE quantitatem in erratorum indice Keplerus prodit 52307, cum ipsi error calculi a nobis correcti eandem exhiberet 52302, pro quo numero, superveniente mendo typographico, quotientem 48052 appositum invenimus. Cum in sequenti calculo AE ubique = 52302 posita sit, corrigenda quaedam nobis fuere, quae comparata hac cum priori editione patebunt.

Ceterum omisimus, omnes calculi numeros, quos nimis late apposuit Keplerus, repetere in textu, satis ad rem percipiendam habentes, formulas quibus usus est et calculi summam addere ipsumque calculum per logarithmos in notis nostris illustrare, adhibentes numeros modo praemissi calculi, aliquantulum a Keplerianis differentes, quia Keplerus sinus suos nimis decurtavit.

54) p. 247. In triangulis FAG, GAD, DAE, EAF dantur duo latera cum angulo comprehenso, quaeruntur anguli reliqui, adhibitis quantitibus linearum 5,9431, 5,0704, 4,8058, 5,2308, aliquantulum a Keplerianis differentibus.

1) In $\triangle FAG$.	2) In $\triangle ADG$.
$\frac{1}{2} (G+F) = 44^\circ 31' 48'' - 9,9928746$	$\frac{1}{2} (D+G) = 52^\circ 14' 27'' - 10,1109569$
$AF - AG = 0,8727 - 0,9408650 - 1$	$AG - AD = 0,2646 - 0,4225898 - 1$
$AF + AG = 11,0135 - 1,0419254$	$AG + AD = 9,8762 - 0,9945899$
$\frac{1}{2} (G-F) = 4^\circ 27' 25'' - 8,8918142$	$\frac{1}{2} (D-G) = 1^\circ 58' 52'' - 8,5389568$
$\angle G = 48. 59. 13$	$\angle D = 54. 13. 19.$
$\angle F = 40. 4. 23.$	$\angle G = 50. 15. 35.$
3) In $\triangle ADE$.	4) In $\triangle AFE$.
$\frac{1}{2} (D+E) = 57^\circ 23' 4'' - 10,1938815$	$\frac{1}{2} (E+F) = 25^\circ 50' 41'' - 9,6851881$
$AE - AD = 0,425 - 0,6283889 - 1$	$AF - AE = 0,7123 - 0,8526629 - 1$
$AE + AD = 10,0366 - 1,0015866$	$AF + AE = 11,1739 - 1,0482048$
$\frac{1}{2} (D-E) = 3^\circ 47' 9'' - 8,8206838$	$\frac{1}{2} (E-F) = 1^\circ 46' 8'' - 8,4896462$
$\angle D = 61. 10. 13$	$\angle E = 27. 36. 47$
$\angle E = 53. 35. 55.$	$\angle F = 24. 4. 35.$

Keplerus exhibet, iterum commisso errore calculi, $\frac{1}{2} (E-F) = 1^\circ 47' 59''$. Error in eo consistit, quod in ultima multiplicatione productum 3142 pro 3092 prodit (3 . 48438 posit = 19534). Tangens autem 3092 exhibet in tabulis angulum $1^\circ 46' 15''$.

Secundum ea, quae Keplerus huic calculo praemisit, summae binarum differentiarum ad puncta D et F (Nro. 1 et 4; Nro. 2 et 3) aequales sint necesse est, si summa angularum oppositorum aequat 2 R. Quod autem cum non contigerit (differentia ipsi prodiit $29' 15''$, nobis $27' 30''$, concludit, falsam esse „positionem“, per quam addenda sint aphelo $3' 16''$, eamque mutat, ponendo $3' 20''$. Eadem ratione anguli ipsi, quos exhibet praecedens calculus, non ii sunt, ut figura DEFG circulo possit inscribi.

$$\begin{aligned} \angle AGF &= 48^\circ 59' 13'', & \angle AFG &= 40^\circ 4' 23'', & \angle AEF &= 27^\circ 36' 47'', & \angle ADE &= 61^\circ 10' 13'' \\ \angle AGD &= 50. 15. 35, & \angle AFE &= 24. 4. 35, & \angle AED &= 53. 35. 55, & \angle ADG &= 54. 13. 19 \\ \angle FGD &= 99. 14. 48, & \angle EFG &= 64. 8. 58, & \angle FED &= 81. 12. 42, & \angle EDG &= 115. 23. 32 \\ &81. 12. 42 & &115. 23. 32 & & \\ &180. 27. 30 & &179. 32. 30. & & \end{aligned}$$

55) p. 248. Hic quoque sicut antea, omittit Keplerus in 3 posterioribus $3' 16''$, quae addenda esse posuerat. Kepleri calculus hic est.

$$\begin{aligned} \text{Correctum aphelium in } 28^\circ 47' 20'' \text{ } Q \\ \begin{array}{lcl} CF \text{ in } & 0. 50. 56 & \approx \\ CG & 5. 40. 18 & \approx \\ CD & 9. 49. 34 & \approx \\ CE & 7. 6. 51 & \approx \end{array} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Inde HCF} &= 6^{\circ} 0' 50'' 56'' - 4^{\circ} 28' 47'' 20'' = 32^{\circ} 3' 36'' \\ \text{HCG} &= 9. 5. 40. 18 - 4. 28. 47. 20 = 126. 52. 58 \\ \text{HCD} &= 11. 9. 49. 34 - \quad \quad \quad = 11. 2. 14 \\ \text{HCE} &= 0. 7. 6. 51 - \quad \quad \quad = 68. 19. 31 \end{aligned}$$

Jam, datis in $\triangle AFC$, $\triangle ACG$, $\triangle ACD$ et $\triangle ACE$ latere $AC = 1$ et angulis, prodit

$$\begin{aligned} AF &= \frac{\sin. 32^{\circ} 3' 36''}{\sin. 5^{\circ} 7' 56''}; & AG &= \frac{\sin. 53^{\circ} 7' 2''}{\sin. 9^{\circ} 4' 11''}; \\ &= 5,9338 & &= 5,0741 \\ AD &= \frac{\sin. 11^{\circ} 2' 14''}{\sin. 2^{\circ} 17' 40''}; & AE &= \frac{\sin. 68^{\circ} 19' 31''}{\sin. 10^{\circ} 14' 15''}; \\ &= 4,782 & &= 5,2287. \end{aligned}$$

Denique, datis in $\triangle AFG$, $\triangle AGD$, $\triangle ADE$ et $\triangle AEF$ duobus lateribus cum angulo comprehenso, reliquorum angulorum differentiae sic computantur:

1) In $\triangle AFG$	2) In $\triangle ADG$
$\frac{1}{2} (G + F) = 44^{\circ} 31' 48''$	$\frac{1}{2} (D + G) = 52^{\circ} 14' 27''$
$AF - AG = 0,8597$	$AG - AD = 0,2921$
$AF + AG = 11,0079$	$AG + AD = 9,8561$
<hr/>	<hr/>
$\frac{1}{2} (G - F) = 4^{\circ} 23' 36''$	$\frac{1}{2} (D - G) = 2^{\circ} 11' 28''$
3) In $\triangle ADE$	4) In $\triangle AFE$
$\frac{1}{2} (D + A) = 57^{\circ} 23' 4''$	$\frac{1}{2} (E + F) = 25^{\circ} 50' 41''$
$AE - AD = 0,4467$	$AF - AE = 0,7051$
$AE + AD = 10,0107$	$AF + AE = 11,1625$
<hr/>	<hr/>
$\frac{1}{2} (D - A) = 3^{\circ} 59' 20''$	$\frac{1}{2} (E - F) = 1^{\circ} 45' 9''$
$\frac{1}{2} (D - G) = 2. 11. 28$	$\frac{1}{2} (G - F) = 4. 23. 36$
<hr/>	<hr/>
6. 10. 48	6. 8. 45
6. 8. 45	

2' 3" (K. 1' 48"). Differentia inter numeros Kepleri et nostros hic ut prius prodit ob sinus ab ipso nimis curtatos. Sic in Nro. 1 tabulae exhibent $\sin. 32^{\circ} 3' 36'' = 0,530807$, $\sin. 5^{\circ} 7' 56'' = 0,89454$; ergo $AF = \frac{530807}{894540} = 5,9338$.

Keplerus vero assumit priorem sinum = 0,53081 et sic dividit:

53081	AF
8945	
44725	5
83560	
80505	9
3055	
2683	3
372	
358	4
14	$\frac{1}{2}$

56) p. 248. Haec sic sunt intelligenda:

Prior differentia summarum erat $29' 15''$
Eadem jam prodit $1. 48$

$$\begin{aligned} \text{Prius fuerat } 6^{\circ} 15' 29'' + 5^{\circ} 46' 14'' &= 12^{\circ} 1' 43'' \\ \text{Jam } 6. 10. 47 + 6. 8. 59 &= 12. 19. 46 \end{aligned}$$

Summa $31^{\circ} (3'')$

$$\text{Diff.} = 18' (3'')$$

$$\begin{aligned} \text{Ergo } 31 : 18 &= 1^{\frac{1}{2}} : 1^{\frac{1}{2}} \text{ sive } 1^{\frac{1}{2}} : 1^{\frac{1}{2}} = 1' 2'' \\ 12^{\circ} 19' 46'' - 1' 2'' &= 12^{\circ} 18' 44'' \text{ iustissima summa.} \end{aligned}$$

57) p. 248. In $\triangle GAE$ dantur latera AG (5,0739) et AE (5,2282) cum angulo comprehenso ($\angle GAE = 140^{\circ} 44' 59''$), quaeruntur $\angle AGE$ et latus GE .

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (G + E) &= 18^{\circ} 57' 30'' - 9,5521517 & GE &= \frac{\sin. 39^{\circ} 15' 11'' \times 5,2282}{\sin. 19^{\circ} 55' 51''}; & 9,8012041 \\ AE - AG &= 0,1543 - 0,1880844 - 1 & &= 9,7039 \text{ (K. 9,7041).} & 0,783522 \\ AE + AG &= 10,3021 - 0,0129257 & & & 9,5326085 \\ \frac{1}{2} (G - E) &= 0^{\circ} 48' 21'' - 7,7273104 & & & 0,9869478 \\ & 19. 37. 30 & & & \\ \angle AGE &= 19. 55. 51. & & & \end{aligned}$$

58) p. 248. Datis in \triangle GBE angulis GBE ($128^{\circ} 26' 14''$), BGE ($25^{\circ} 46' 53''$) et latere GE (9,7039), prodit BG = BE = $\frac{\sin. 25^{\circ} 46' 53''}{\sin. 128^{\circ} 26' 14''} \times 9,7039$; $\frac{9,6384279}{0,9869463}$; $\frac{9,8939224}{0,7314518}$

Keplero prodit BE = 5,3860 ob errorem calculi in multiplicatione commissum.

In \triangle BGA dantur duo latera cum angulo comprehenso, quaeritur angulus BAG.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (A + B) &= 87^{\circ} 4' 29'' - 11,2915779 \\ BG - AG &= 0,3144 - 0,4974625 - 1 \\ BG + AG &= 10,4622 - 1,0196230 \\ \frac{1}{2} (A - B) &= 30^{\circ} 27' 33'' - 9,7694374 \end{aligned}$$

Keplero prodeunt $30^{\circ} 17' 8''$ quia BE falsum habet.

87. 4. 29

\angle BAG = 117. 21. 37 (vera quantitas = $117^{\circ} 32' 2''$).

59) p. 249. In \triangle CFA, CGA, CDA, CEA dantur anguli ad C: (\angle HCF = $32^{\circ} 3' 36'' - 1' 30''$, \angle GCI = $53^{\circ} 7' 2'' + 1' 30''$, \angle DCF = $11^{\circ} 2' 14'' - 1' 30''$, \angle ECI = $68^{\circ} 19' 31'' - 1' 30''$); deinde \angle CFA = $5^{\circ} 7' 56'' + 30''$, \angle CGA = $9^{\circ} 4' 11'' + 30''$ (Keplerus $21''$ addit); \angle CDA = $2^{\circ} 17' 40'' - 30''$, \angle CEA = $10^{\circ} 14' 15'' - 30''$. Deinde, cum AC = 1 assumpta sit, computantur latera AF &c. etc:

$$\begin{aligned} AF &= \frac{\sin. 32^{\circ} 2' 6''}{\sin. 5^{\circ} 8' 26''} ; \frac{9,7246338}{8,9523046} & AG &= \frac{\sin. 53^{\circ} 8' 32''}{\sin. 9^{\circ} 4' 41''} ; \frac{9,9031588}{9,1980516} \\ &= 5,9201 & &= 5,0711 & &0,7051072 \end{aligned}$$

Assumpta autem quantitate anguli CGA, quam Keplerus ponit ($9^{\circ} 4' 32''$), prodit AG = 5,0725. Keplero 5,0775, quia sinum $9^{\circ} 4'$, neglectis $32''$ adhibuit.

$$\begin{aligned} AD &= \frac{\sin. 11^{\circ} 0' 44''}{\sin. 2^{\circ} 17' 10''} ; \frac{9,2810750}{8,6008595} & AE &= \frac{\sin. 68^{\circ} 18' 1''}{\sin. 10^{\circ} 13' 45''} ; \frac{9,9680784}{9,2494082} \\ &= 4,7887 & &= 5,2321 & &0,7186702 \end{aligned}$$

Dantur in triangulis AFG, AGD, ADE, AFE duo latera cum angulis comprehensis, unde computantur angulorum reliquorum differentiae. Kepleri numeris, parum a nostris differentibus, usi accipimus:

1) In \triangle AFG.	2) In \triangle AGD.
$\frac{1}{2} (G + F) = 44^{\circ} 31' 48'' - 9,9928746$	$\frac{1}{2} (D + G) = 52^{\circ} 14' 27'' - 10,1109569$
AF - AG = 0,8428 - 0,9256215 - 1	AG - AD = 0,2888 - 0,4605972 - 1
AF + AG = 10,9976 - 1,0412980	AG + AD = 9,8662 - 0,9941499
$\frac{1}{2} (G - F) = 4^{\circ} 18' 36'' - 8,8771981$	$\frac{1}{2} (D - G) = 2^{\circ} 9' 52'' - 8,5774042$
3) In \triangle ADE.	4) In \triangle AFE.
$\frac{1}{2} (D + E) = 57^{\circ} 23' 4'' - 10,1938815$	$\frac{1}{2} (E + F) = 25^{\circ} 50' 41'' - 9,6851881$
AE - AD = 0,4435 - 0,6468936 - 1	AF - AE = 0,6879 - 0,8375253 - 1
AE + AD = 10,0209 - 1,0009067	AF + AE = 11,1523 - 1,0473645
$\frac{1}{2} (D - E) = 3^{\circ} 57' 24'' - 8,8398684$	$\frac{1}{2} (E - F) = 1^{\circ} 42' 41'' - 8,4753489$

De reliquis compara nostram annotationem Nro. 54.

60) p. 249. In triangulis CFA, CGA, CDA, CEA augentur vel minuuntur anguli C per $38''$, ut fiant \angle HCF = $32^{\circ} 2' 44''$, \angle GCA = $53^{\circ} 7' 54''$, \angle DCA = $11^{\circ} 1' 22''$ et \angle ACE = $68^{\circ} 17' 23''$ (quippe apothema HC fuit in $28^{\circ} 48' 8''$ Q, jam, subtractis $38''$, in $28^{\circ} 48' 30''$ Q. Angulus HCF, qui antea correctus fuerat $32^{\circ} 2' 6''$, jam fit $32^{\circ} 2' 44''$ &c.)

Hinc lg. AF = lg. sin. $32^{\circ} 2' 44'' -$ lg. sin. $5^{\circ} 8' 26'' = 0,7724572$; AF = 5,9216
lg. AG = lg. sin. $53^{\circ} 7' 54'' -$ lg. sin. $9^{\circ} 4' 32'' = 0,7051659$; AG = 5,0718
lg. AD = lg. sin. $11^{\circ} 1' 22'' -$ lg. sin. $2^{\circ} 17' 10'' = 0,6806267$; AD = 4,7932
lg. AE = lg. sin. $68^{\circ} 17' 23'' -$ lg. sin. $10^{\circ} 13' 46'' = 0,7186270$; AE = 5,2315.

Lineam AG Keplerus iterum falsam habet, quia sicut antea sinum anguli $9^{\circ} 4'$ pro sine $9^{\circ} 4' 32''$ e tabula excerptis.

Pergimus, neglecto hoc errore, numeris usi Kepleri.

$$\begin{aligned} AF + AG &= 10,9988; AG + AD = 9,8700; AE + AD = 10,0248; AF + AE = 11,1536 \\ AF - AG &= 0,845; AG - AD = 0,2838; AE - AD = 0,4386; AF - AE = 0,6902 \end{aligned}$$

Inde compendio usus, sic pergit Keplerus, quotientes formans praemissarum summarum et differentiarum, eosque comparans cum prioribus:

62) p. 249. Prius (p. 246) longitudines mediae (Tychonis) auctae sunt per 3' 16'', deinde (p. 248) per 30'', denique hoc loco per 9'', summa = 3' 55''.

Aphelium initio fuit in 28° 44' Q, cui addita sunt (p. 247) 3' 20'', ut fuerit in 28° 47' 20''; cum autem calculus (p. 248) hanc quantitatem 12'' majorem ostenderit, diminutum per haec 12'' reponitur in 28° 47' 8''. Continuatione calculi apparebat, ut quadrangulum stet in circulo, promovendum esse aphelium per 2' (p. 248 in fine), ut sit in 28° 49' 8''. Penultimus calculus (p. 249) ostendit, aphelium per 38'' retrahendum esse, h. e. in 28° 48' 30''. Ultimus denique calculus promovet aphelium per 25'', ita ut jam inventus sit locus aphelii in 28° 48' 55'' Q.

63) p. 249. In $\triangle BGA$ dantur anguli BGA (5° 43' 57'') et BAG (117° 43' 23'') et radius BG.

$$\lg. \sin. 5^\circ 43' 57'' = 8,9994966$$

$$\lg. \sin. 117^\circ 43' 23'' = 9,9470446$$

$$\lg. BA = 0,0524520 - 1$$

$$BA = 0,11283.$$

Initio hujus computationis (p. 246) assumpta est linea AC = 1 (10000) inde deducta BG = 5,3866 (5,3866 p. 248). Quam ut ad eandem cum radio BG mensuram, hanc ponit proportionem Keplerus: 5,3866 : 1 = 1 : AC, AC = $\frac{1}{5,3866} = 0,18564$.

Jam dantur: BG = 1, AC = 0,18564, AB = 0,11283, ergo BC = AC - AB = 0,07281.

64) p. 250. Cum circiter tertia parte prioris correctionis nunc latera BG, AG et anguli BGA et BAG mutati sint, tertias differentiarum partes addit vel subtrahit Keplerus horum laterum et angulorum, et redintegrato prioro calculo invenit AC = 0,18570. BA = 0,11332.

Posterior autem numerus falsus est. Nam si Keplerus sequentes ponamus sin. 5° 41' 32'' = 0,09919, sin. 62° 8' 37'' = 0,88414, erit AB = $\frac{0,09919}{0,88414} = 0,11218$. Numerus 0,11332 prodit commisso a Keplero errore calculi, cum ipsi primum residuum divisionis sit 11776 pro 10776. Correcto hoc errore prodit BC = 0,07846.

Delambros (Hist. de l'Astr. mod. I, p. 410-417) totum hunc calculum (pag. 246 hucusque), repetiit correctis Kepleri erroribus (comp. annot. 53), ipsique praecedunt:

$$AC = 0,18570$$


$$AB = 0,11387$$

$$BC = 0,07183.$$

65) p. 251. Numeros hos frustra quaeres in Ptolemaeo, cum is perpetuo numeros suos ad numerum 60 reduxerit. Levis ceterum calculus exhibet numeros hosce a Keplero proditos.

66) p. 255. Ut melius pateat, qua ratione Keplerus hanc tabulam confecerit, primam

Fig. 138.



columnam (anni 1580) sic ad calculos vocavimus: Si punctum H in aphelio, ergo in 4° 28' 42' 13''; F in 1° 25' 53' 26'', erit $\angle FCH = 87^\circ 11' 13''$ BC = 0,07232.

Jam datis in $\triangle BCF$ radio BF = 1, BC = 0,07232 et $\angle BCF = 87^\circ 11' 13''$, erit sin. BFC = sin. BCF . BC

$$\lg. \sin. 87^\circ 11' 13'' = 9,9994763$$

$$\lg. 0,07232 = 0,8592584 - 2$$

$$\lg. \sin. BFC = 8,8587347$$

$$BFC = 4^\circ 8' 33''.$$

$\angle ABF = \angle BCF + \angle BFC = 87^\circ 11' 13'' + 4^\circ 8' 33'' = 91^\circ 19' 46''$, quare $\frac{1}{2} (BAF + BFA) = 44^\circ 20' 7''$.

deinde cum sit per superiora BA = 0,11332 (comp. annot. 64) et BF = 1, erit BF + AB = 1,11332.

$$BF - AB = 0,88668$$

$$\lg. \text{tg. } 44^\circ 20' 7'' = 9,9899220$$

$$\lg. 0,88668 = 0,9477600 - 1$$

$$\lg. 1,11332 = 0,0466200$$

$$\lg. \text{tg. } \frac{1}{2} (A - F) = 9,8910689$$

$$\frac{1}{2} (A - F) = 37^\circ 53' 19'' \text{ (K. 22'', ad tangentem 778160, quae dat } 19'')$$

$$\frac{1}{2} (A + F) = 44^\circ 20' 7''$$

$$\angle BAF = 82^\circ 13' 26'' \text{ (89).}$$

$$\begin{aligned} \text{Cum sit } H & \text{ in } 148^{\circ} 42' 13'' \\ \angle HAF & = 82. 13. 26 \quad (29) \\ \text{erit longit. } F & 66^{\circ} 28' 47'' \quad (44) \\ \text{h. e. in } & 6^{\circ} 28' 47'' \quad \text{II.} \end{aligned}$$

Haec Martis longitudo sicut etiam reliquae comparantur cum longitudinibus, quas exhibet tabula in fine Cap. XV. De Kepleri calculo hoc tantum notamus, multiplicationes peractas esse ratione ea, qua hodie utimur multiplicantes fractiones decimales methodo, quam dicunt, curtata.

67) p. 256. Numeri hi non plane iidem e Tychonis tabula computantur. Ad distantiam ab apogaeo 135° exhibet tabella, quae inscribitur: distantia Solis a Terra in partibus, qualem semidiameter eccentrici 100000, numerum 97498, et ad distantiam ab apogaeo 65° 101567. Cum autem apogaeum \odot anno 1585. \approx in $3^{\circ} 5' (28' 30'')$, anno 1593. in $3^{\circ} 5' (34' 30'')$ (Tycho l. c. p. 57), Sol vero datis temporibus appareat in $21^{\circ} \infty$ et in 12° III , Solis distantiae ab apogaeo tum fuere 134° et 67° p. p. ergo pro 97498 numero, quem Tychonis tabula exhibet, ponit K. numerum rotundum 97500; sic de Tychonis numero 101567 pro 2° detrahendae fuissent particulae 114, Keplerus pro residuo ponit 101400.

Datis jam in $\triangle BDA$ latere $BA = 97500$, $\angle BDA = HBD - BAD = 4^{\circ} 32' 10'' - 1^{\circ} 49' 30'' = 2^{\circ} 42' 40''$ et $\angle DBA = 175^{\circ} 27' 50''$ (compl. visae latitudinis), erit $DA = \frac{97500 \cdot \sin. 175^{\circ} 27' 50''}{\sin. 2^{\circ} 42' 40''} = 163023$, sive assumpta $BA = 1$, $DA = \frac{163023}{97500} = 1,672$.

$$\begin{aligned} 68) \text{ p. 257. Angulus } AEC \text{ (Fig. 71)} & = \angle ECL - EAC = 6^{\circ} 3' - 1^{\circ} 39' = 4^{\circ} 24' \\ AC & \sin. ACE \\ AE & = \frac{AC \cdot \sin. ACE}{\sin. AEC}; \quad \lg. AC = 0,0060380 \\ & \lg. \sin. ACE = 9,0228254 \\ & \lg. \sin. AEC = 8,8849031 \\ & \lg. AE = 0,1439603 \\ & AE = 1,393 \end{aligned}$$

$$AC \text{ posita} = 1, \text{ erit } AE = \frac{1,393}{1,014} = 1,3738.$$

Aphelium \odot anno 1585. in $4^{\circ} 28' 46' 41''$, ergo $4^{\circ} 28' 46' 41'' - 4^{\circ} 21' = 7^{\circ} 46' 41''$ (circiter 8°), quibus competunt in linea AD „circiter“ 150 particulae. Sic aphelium \odot in $10^{\circ} 28' 55' 43''$, ergo $11^{\circ} 12' - 10^{\circ} 28' 55' 43'' = 13^{\circ} 46' 41''$ (id est 13°), quibus competunt in linea AE c. 300 particulae.

Ita, inventa longitudine lineae ED = 302150 vel 304430 eaque bisecta in K, prodit eccentricitas $AK = DA - \frac{1}{2} DE = 12075$ vel 15135, et inde, radio eccentrici DK = 1 assumpto, prodit $AK = \frac{12075}{151075}$ vel $\frac{15135}{152215} = 0,07992$ (0,08) vel $= 0,09943$.

69) p. 260. Numerus hic 15371 falsus est, nam $166928 - 151697 = 15231$. Assumpta eccentricitate 15231, prodit, si posteris KL = 1, $AK = \frac{15231}{151697} = 0,1004$; assumpto vero Kepleri numero 15371, prodit $AK = \frac{15371}{151697} = 0,1013$.

70) p. 268. In editione „Mechanicae“ anni 1602 (Norib. apud Levinum Holsium. Comp. Vol. I, p. 191) folio G. 3^b haec leguntur: circuitum illum annuum, quem Copernicus per motum Terrae in orbe magno, veteres secundum epicyclos excomparant, variationi cuidam obnoxium esse perspeximus.

Litterae „tomo I. Epistolarum“ datae sunt d. 8. Feb. 1597 ad Wilhelmum Hassiae Landgravium. In postscriptis haec addit Tycho: nolui omittere quo minus C. T. significarem, stellam Martis, quae alias plus ceteris planetis calculum astronomicum eludit, in postremo acronychio situ (d. 9. Jun.) circa perigaeum Solare quam prokime accessisse ad calculum Copernicaeum, ita ut hic vix $\frac{1}{2}^{\circ}$ aberrarit, cum tamen in numeris Alphonsinis circiter $4\frac{1}{2}^{\circ}$ abundaverint. Quod nihilominus in aliis oppositionibus Solis et Martis, quarum aliquot observavi, non accidit: ea in Marte antea, cum pernox esset circa γ et ω initia, in medio quasi loco inter apogaeum et perigaeum Solare consideravi, eum a Copernici calculo circ. $2-3^{\circ}$ deflexisse, idque in partes contrarias; prout ferebat eccentricitatis Solaris ratio. Necdum etiam consistere potuit Alphonsina supputatio. Unde facile advertitur, adhuc aliam latere inaequalitatem, e Solari forte eccentricitate vel aliunde² proveniente, quae sese apparenti planetae motui insinuet.

Hinc concludit Tycho, suas hypotheses de mundo solas cum apparentis concordare et neque Ptolemaicas neque Copernicaeas hic sibi opus esse. „Nam inaequalitatem hanc convenienter expugnare nequeunt.“

71) p. 272. Quantitates angularum ad praemissam computationem pertinentium desumtae sunt e capite praecedente hunc in modum: Fig. 74. est $\angle FCD$ (FCE) angulus commutationis = $64^\circ 23' 30''$, DFC $36^\circ 51'$ (in Mscto $51^\circ 3'$); $\angle EFC = 38^\circ 5'$, ubi notandum, pro $21^\circ 34' 11$ ponendum esse $21^\circ 33\frac{1}{4}' 11$. (In Mscto = $21^\circ 33' 41''$). In $\triangle FCD$ et FCE, cognitis duobus angulis, non latebunt reliqui, scilicet FDC = $78^\circ 45' 30''$ (K. $27''$) $\angle FEC = 77^\circ 31'$. Quibus datis, et assumpto latere FC = 1, prodit

$$\begin{aligned} DC &= \frac{\sin. 36^\circ 51'}{\sin. 78^\circ 45' 27''} = \frac{9,7779501}{9,9915852} \\ &= 0,61146 \\ &\quad 0,61148 \text{ (K.)} \\ CE &= \frac{\sin. 38^\circ 5' 30''}{\sin. 77^\circ 31'} = \frac{9,7902298}{9,9806095} \\ &= 0,63186 \quad 0,8006203 - 1 \end{aligned}$$

Jam in fig. 75. respondent lineae EC et CD lineis modo inventis DC et CE fig. 74. et angulus ECD aequat summam angularum ECF et FCD = $2 \times 64^\circ 23' 30'' = 128^\circ 47'$, quibus addit Keplerus $19''$.

Non tam expedite Keplerus in manuscripto procedit; consumtis calculo 7 foliis inquit: Vitium! Ponitur ECN $63^\circ 35'$, at is est, ut vides fol. 107 (Mscto) $33^\circ 7' 32''$. Erroris occasio, quod „signum“ (s.) pro sexagena fuit habitum. Quod „vitium“ corrigit sequentibus foliis 6, eandemque prodit quantitatem quam textus habet. Inquirentes calculum Kepleri, qui sequitur, deprehendimus CB = 0,01142, vel ad BD 1, CB = 0,01835. Manuscripta habent 1140 et 1832.

Speculationem, quam Keplerus Capite XXII. proponit, adiit (alia quidem spectans) cum non succederet inquisitio latitudinum Martis, quam his concludit verbis: nisi haec pragmatiam suspendam, multa quae interea inciderant incommode mittenda erant. Itaque hoc jam agamus: in Sole aequantem collocare hac lege, ut ubi jam Sol, ibi centrum sit aequantis. Sol medio loco eccentricitatis nullum affert incommodum; nam differentia non major est $1' 10''$ in anomalia 135° . At si tale quid sit in Sole, turbabitur omnis nostra operatio, dum aequalem semper assumimus radium orbis annui, qui inaequalis est ad centrum assumtum. Id quidem saepius jam tentavi explorare, sed nullum aliud est medium id tentandi, quam si possint haberi in eodem eccentrici Martis loco duae oppositae parallaxes, quando commutationis angulus est idem.

Jam Keplerus his innixus principiis comparat observationes Tychois (v. s. p. 270. et retinens illas annorum 1585 et 1591 calculum absolvit ea quam modo diximus ratione 72) p. 274. Fig. 76. exhibet in „forma Copernicana“ positiones Terrae propositis temporibus in ϑ , η , ϵ et ζ , arcibus $\vartheta\eta$, $\eta\epsilon$, $\epsilon\zeta$ aequalibus; Solis locum in β , eundem Martis in α ; $\alpha\beta\epsilon$ lineam apsidum Terrae, ϵ in $5\frac{1}{2}^\circ \vartheta$, $\alpha\lambda$ lineam apsidum Martis; apogaeum in $23\frac{1}{2}^\circ \vartheta$.

I. Anno 1590 est locus γ in $4^\circ 38' 50'' \vartheta$, aequatio = $11^\circ 14' 55''$, ergo longitudo coaequata = $1^\circ 4^\circ 38' 50'' + 11^\circ 14' 55'' = 1^\circ 15^\circ 53' 45''$.

$$\text{Differentia medii motus Solis et Martis} = 10^\circ 18' 19' 56'' \\ 11. 14. 55.$$

$$\angle \vartheta\alpha x, \text{ sive commutatio coaequata} = \frac{10^\circ 7' 5' 1''}{180^\circ} = 6''$$

$$4^\circ 7' 5' 1'' = 127^\circ 5' 1''.$$

Locus γ visus ex ϑ Terra in $25^\circ 6' \gamma$, ex puncto α in $15^\circ 53' 45'' \vartheta$

$$\text{ergo } \angle \vartheta\alpha x = 15^\circ 53' 45'' - 0^\circ 25' 6' = 20^\circ 47' 45''$$

$$\vartheta\alpha x = 127. 5. 1.$$

$$\text{ergo } \alpha\vartheta x = 180^\circ - 147^\circ 52' 46'' = 32^\circ 7' 14''.$$

$$\text{Inde, posito radio } \alpha x = 1, \vartheta\alpha = \frac{\sin. \alpha x \vartheta}{\sin. \alpha \vartheta x} = 0,66774.$$

II. Anno 1592 adduntur longitudini coaequatae priori $1' 38''$, prodit $1^\circ 15^\circ 55' 23''$. ergo commut. coeq. sive $\angle \eta\alpha x = 8^\circ 24' 10' 34''$

$$180^\circ = 6''$$

$$84^\circ 10' 34''$$

$$\angle \eta\alpha x = 1^\circ 15^\circ 55' 23'' - 0^\circ 10' 9' = 35^\circ 46' 23''$$

$$\angle \alpha\eta x = 180^\circ - 119^\circ 56' 57'' = 60^\circ 3' 3''$$

$$\text{Hinc } \eta\alpha = \frac{\sin. \eta\alpha x}{\sin. \alpha\eta x} = 0,67467.$$

III. Anno 1593 iterum aucta long. coaeq. per 1' 38" prodeunt anguli $\varepsilon\alpha x = 41^\circ 16' 16''$, $\varepsilon x\alpha = 42^\circ 21' 30''$ et $x\varepsilon\alpha = 96^\circ 22' 14''$, ergo

$$\varepsilon\alpha = \frac{\sin. \varepsilon x\alpha}{\sin. \alpha\varepsilon x} = 0,67794.$$

IV. Anno 1595: $\angle x\alpha\zeta = 1^\circ 38' 5''$, $\zeta x\alpha = 3^\circ 23' 5''$ et $x\zeta\alpha = 174^\circ 58' 50''$

$$\alpha\zeta = \frac{\sin. \zeta x\alpha}{\sin. \alpha\zeta x} = 0,67479.$$

73) p. 277. Ut probemus numeros Kepleri, integrum repetimus calculum.

I. In $\triangle \vartheta\alpha\eta$ dantur latus $\alpha\vartheta = 0,66774$, $\alpha\eta = 0,67467$ et $\angle \vartheta\alpha\eta = 42^\circ 52' 47''$.

$$\text{Ergo } \alpha\eta + \alpha\vartheta = 1,34241$$

$$\alpha\eta - \alpha\vartheta = 0,00693$$

$$\frac{1}{2}(\vartheta + \eta) = 68^\circ 33' 36''$$

$$\text{hinc } \frac{1}{2}(\vartheta - \eta) = 0^\circ 45' 11''$$

$$\frac{1}{2}(\vartheta + \eta) = 68^\circ 33' 36''$$

$$\alpha\vartheta\eta = 69^\circ 18' 47''$$

$$\vartheta\eta = \frac{\alpha\eta \cdot \sin. \vartheta\alpha\eta}{\sin. \alpha\vartheta\eta} = 0,4907 \text{ (K. 0,49169)}$$

II. Jam datis in $\triangle \alpha\eta\varepsilon$: $\alpha\eta = 0,67467$, $\alpha\varepsilon = 0,67794$, et $\angle \eta\alpha\varepsilon = 42^\circ 52' 47''$, computatur $\angle \alpha\varepsilon\eta$ sic: $\alpha\varepsilon\eta + \alpha\eta\varepsilon = 180^\circ - 42^\circ 52' 47'' = 137^\circ 7' 13''$;

$$\frac{1}{2}(\eta + \varepsilon) = 68^\circ 33' 36''; \alpha\varepsilon - \alpha\eta = 0,00327, \alpha\varepsilon + \alpha\eta = 1,35261; \text{hinc}$$

$$\frac{1}{2}(\eta - \varepsilon) = 0^\circ 21' 10''$$

$$\frac{1}{2}(\eta + \varepsilon) = 68^\circ 33' 36''$$

$$\angle \alpha\varepsilon\eta = 68^\circ 12' 26''$$

III. In $\triangle \vartheta\alpha\varepsilon$ dantur: $\alpha\vartheta = 0,66774$, $\alpha\varepsilon = 0,67794$, $\angle \vartheta\alpha\varepsilon = 85^\circ 45' 34''$

$$\alpha\varepsilon + \alpha\vartheta = 1,34568$$

$$\alpha\varepsilon - \alpha\vartheta = 0,01020$$

$$\frac{1}{2}(\vartheta + \varepsilon) = 47^\circ 7' 13''$$

$$\text{hinc } \frac{1}{2}(\vartheta - \varepsilon) = 0^\circ 28' 3''$$

$$\angle \alpha\varepsilon\vartheta = 46^\circ 39' 10''$$

$$\angle \vartheta\varepsilon\eta = \angle \alpha\varepsilon\eta - \alpha\varepsilon\vartheta = 68^\circ 12' 26'' - 46^\circ 39' 10'' = 21^\circ 33' 16'', \vartheta\beta\eta = 2^\circ \vartheta\varepsilon\eta = 43^\circ 6' 32''.$$

IV. In $\triangle \vartheta\beta\eta$ aequicrurio dantur latus $\vartheta\eta$ (N. I.) et $\angle \vartheta\beta\eta$ (N. III.), quare $\vartheta\eta\beta = 90^\circ - 21^\circ 33' 16''$.

$$\text{Hinc } \vartheta\beta = \frac{\vartheta\eta \cdot \sin. \vartheta\eta\beta}{\sin. \vartheta\beta\eta} = 0,66917 \text{ (K. 0,66923)}.$$

V. In $\triangle \beta\vartheta\alpha$ ex $\vartheta\beta = 0,66923$, $\alpha\vartheta = 0,66774$, $\angle \vartheta = 52^\circ 2''$ (nam in N. I. inventus est $\angle \alpha\vartheta\eta = 69^\circ 18' 46''$ ex N. IV. $\angle \beta\vartheta\eta = 68^\circ 26' 44''$, et $\beta\vartheta\alpha = \alpha\vartheta\eta - \beta\vartheta\eta$) computatur $\frac{1}{2}(\alpha + \beta) = 8^\circ 22' 37''$

$$\frac{1}{2}(\alpha - \beta) = 8^\circ 33' 59''$$

$$\vartheta\alpha\beta = 97^\circ 56' 36'' \text{ (K. } 97^\circ 50' 30'') \text{ h. e. } 3^\circ 8' \text{ p. p.}$$

$$\text{Cum vergat } \alpha\vartheta \text{ in } 5^\circ 22' 59''$$

$$\angle \vartheta\alpha\beta = 3^\circ 7' 56' 36''$$

$$\text{vergit } \alpha\beta \text{ in } 2^\circ 15' 2' 24'' \text{ (K. } 15^\circ 8' 36'') \text{ II}$$

$$\text{Apogaeum } \odot \text{ Tych. } 3^\circ 5\frac{1}{2}'$$

$$\text{diff. } 20^\circ \text{ c.}$$

$$\text{Denique in eodem } \triangle \vartheta\alpha\beta \text{ computatur } \alpha\beta = \frac{\alpha\vartheta \cdot \sin. \vartheta}{\sin. \beta} = 0,01023.$$

$$\text{Si } \vartheta\beta, \text{ supra (N. IV.) inventa} = 0,66923, \text{ ponatur} = 1, \text{ prae} \alpha\beta = \frac{0,01023}{0,66923} = 0,01530.$$

74) p. 279. Sit in fig. 80. ϑ locus \odot datis temporibus, $\delta, \varepsilon, \zeta, \eta$ loca Terrae eadem temporibus, ut appareat α Sol, ex Terra δ inspectus, anno 1590 in $24^\circ 0' 25''$ \times \odot δ, ϑ , in $24^\circ 20' \gamma$. Sic \odot ab α Sole in $14^\circ 16' 4''$ \odot δ &c.

erit	$\angle \alpha\delta\vartheta = 12^\circ 24' 20''$	$- 11^\circ 24' 0' 25'' = 30^\circ 19' 35''$;
Sic anno 1592.	$\angle \alpha\varepsilon\vartheta = 12^\circ 9' 24''$	$- 10^\circ 10' 17' 8'' = 59^\circ 6' 52''$;
anno 1593.	$\angle \alpha\zeta\vartheta = 12^\circ 3' 4' 30''$	$- 8^\circ 25' 53' 24'' = 97^\circ 11' 36''$;
anno 1595.	$\angle \alpha\eta\vartheta = 13^\circ 19' 42''$	$- 7^\circ 11' 41' 34'' = 188^\circ 0' 26''$;
et	$\angle \vartheta\vartheta\alpha = 14^\circ 15' 4''$	$- 0^\circ 24' 20' 0'' = 19^\circ 55' 4''$;
„	$\angle \varepsilon\vartheta\alpha = 1^\circ 14' 18' 40''$	$- 0^\circ 9' 24' 0'' = 34^\circ 52' 40''$;
„	$\angle \zeta\vartheta\alpha = 1^\circ 14' 18' 16''$	$- 0^\circ 3' 4' 30'' = 41^\circ 13' 46''$;
„	$\angle \eta\vartheta\alpha = 1^\circ 19' 42''$	$- 1^\circ 14' 18' 52'' = 5^\circ 22' 8''$.

Deinde assumatur $\alpha\delta = 1$, prodeunt:

$$\begin{aligned} 1) \alpha\delta &= \frac{\sin. \alpha\delta\delta}{\sin. \alpha\delta\delta} \lg. \sin. 19^\circ 55' 4'' = 9,5323354 \\ &= 0,67469 \lg. \alpha\delta = 0,8291084 - 1 \\ 2) \alpha\epsilon &= \frac{\sin. \epsilon\delta\alpha}{\sin. \alpha\epsilon\delta} \lg. \sin. 34^\circ 52' 40'' = 9,7572652 \\ &= 0,66632 \lg. \alpha\epsilon = 0,8236796 - 1 \\ 3) \alpha\zeta &= \frac{\sin. \zeta\delta\alpha}{\sin. \alpha\zeta\delta} \lg. \sin. 41^\circ 13' 46'' = 9,8189355 \\ &= 0,66429 \lg. \alpha\zeta = 0,8223593 - 1 \\ 4) \alpha\eta &= \frac{\sin. \eta\delta\alpha}{\sin. \alpha\eta\delta} \lg. \sin. 5^\circ 22' 8'' = 8,9711259 \\ &= 0,67171 \lg. \alpha\eta = 0,827513 - 1 \end{aligned}$$

Keplero prodit $\alpha\eta = 0,67220$ major justo; quia autem calculus deest, erroris hujus causa nequit proponi. In manuscripto hunc quidem calculum non deprehendimus, inest vero illi longa series irritorum conatuum deprehendendi justas distantias. Longum est omnes illos recensere conatus, quare unum ex his elegimus, qui loco sit reliquorum. Animus fert, inquit, per 4 observationes Martis extra situm $\alpha\eta\delta\delta\delta\delta\delta\delta$, Marte semper eodem eccentrici loco sub fixis existente, probare dimidiationem eccentricitatis Terrae... Sunt loca et distantiae \odot et δ ad haec tempora: 1590: \odot 24' 0' 19'' δ , 24' 22' 30'' γ ; 1592: \odot 10' 17' 7'' δ , 9' 25' 0'' γ ; 1593: \odot 25' 53' 26'' δ , 3' 2' γ ; 1595: \odot 11' 41' 36'' η , 16' δ .

Constitutio angulorum: $\alpha\delta\delta = 30^\circ 22' 11''$, $\alpha\epsilon\delta = 59^\circ 7' 53''$, $\alpha\zeta\delta = 97^\circ 8' 34''$, $\delta\alpha\epsilon = 43^\circ 43' 12''$, $\epsilon\alpha\zeta = 44^\circ 23' 41''$, $\zeta\alpha\eta = 44^\circ 11' 50''$, $\delta\alpha\eta = 132^\circ 18' 43''$ (+ 5' 10'' pro praecessa.) = $132^\circ 23' 53''$, $\alpha\delta\epsilon = 36^\circ 31' 33''$, $\alpha\delta\delta = 21^\circ 32' 20''$, $\eta\alpha\delta = 4^\circ 18' 24''$, $\alpha\eta\delta = 171^\circ 57' 21''$, $\alpha\delta\zeta = 42^\circ 56' 16''$, $\alpha\delta\eta = 3^\circ 44' 15''$.

$$\begin{aligned} \eta\delta &= \frac{\sin. \eta\alpha\delta}{\sin. \alpha\eta\delta} = 68318; \alpha\delta = \frac{\sin. \alpha\delta\delta}{\sin. \alpha\delta\delta} = 72617; \alpha\zeta = \frac{\sin. \zeta\delta\alpha}{\sin. \alpha\zeta\delta} = 68653; \\ \alpha\epsilon &= \frac{\sin. \alpha\delta\epsilon}{\sin. \alpha\epsilon\delta} = 69340; \alpha\eta = \frac{\sin. \alpha\delta\eta}{\sin. \alpha\eta\delta} = \frac{3497}{10993} = 3... \text{ Vides, } \alpha\eta \text{ prodire admodum} \end{aligned}$$

brevem, ergo $\alpha\delta\eta$ augendus, ut sit $\alpha\delta$ in $14^\circ \delta$. Iteratus calculus prodit $\alpha\delta = 66152$, $\alpha\epsilon = 66031$, $\alpha\zeta = 66036$, $\alpha\eta = \frac{6983}{10993} = 63... \text{ Facile patet, adhuc nimis esse brevem, nam praescio, longiorem esse quam } \alpha\epsilon. \text{ Sit } \alpha\delta \text{ in } 13^\circ 50' \delta. \text{ Hic duo peccantur, } \alpha\delta \text{ fit brevior quam } \alpha\epsilon, \text{ et haec brevior quam } \alpha\zeta. \text{ Sit } \alpha\delta \text{ in } 13^\circ 55' \delta... \text{ Hic eadem peccantur. Error in deductione, nam in } \delta \text{ retrogradus fit } \delta. \text{ Et tamen } \alpha\eta \text{ fit brevior quam } \alpha\epsilon. \text{ Itaque vitium est in assumtis; vel } \eta\delta \text{ vel } \eta\alpha \text{ non recte habent.}$

Post correctionem adhibitam apparet, verum inter 16 et 14 versari.

Sit $\alpha\delta$ $15^\circ \delta$; $\alpha\delta\delta = 20^\circ 32' 20''$, $\alpha\delta\epsilon = 35^\circ 31' 33''$, $\alpha\delta\zeta = 40^\circ 56' 16''$, $\alpha\delta\eta = 4^\circ 44' 15''$ prodit $\alpha\delta = 69395$; $\alpha\epsilon = 67696$; $\alpha\zeta = 67356$ $\alpha\eta = 60...$

Haec nimis brevis prodit, ergo adime ipsi loco $\alpha\delta$.

Sit $\alpha\delta$ $14^\circ 50' \delta$; $\alpha\delta = 670$... $\alpha\epsilon = 670$... $\alpha\eta = 61$ Perge ulterius.
Sit... 14. 40. $\alpha\epsilon = 67$... $\alpha\eta = 63$ Ultra.
14. 30. $\alpha\epsilon = 66$... $\alpha\eta = 65$.
14. 25. $\alpha\delta = 67$... $\alpha\epsilon = 667$... $\alpha\zeta = 66$... $\alpha\eta = 66260$ Ultra.
14. 27. = 67397... 66644... 66543... 66674.

Jam quatuor triangulorum anguli ad basin quaerendi &c.

75) p. 281. Ut Kepleri calculus probetur, apponimus integrum hujus loci calculum.

numeri usi, qui prodierunt annot. praeced.

$$\begin{aligned} 1) \text{ In } \triangle \delta\alpha\zeta \text{ dantur } \angle \delta\alpha\zeta &= 88^\circ 10' 13'', \alpha\delta = 0,67469, \alpha\zeta = 0,66429 \\ \text{ergo } \frac{1}{2} (\zeta + \delta) &= 45^\circ 54' 54''; 10,0138734 \quad \delta\zeta = \frac{\alpha\zeta \cdot \sin. \alpha}{\sin. \delta} = 0,8223577-1 \\ \alpha\delta - \alpha\zeta &= 0,01040; 0,0170333-2 \quad \frac{1}{2} (\zeta - \delta) &= 0^\circ 27' 34'' \\ \alpha\delta + \alpha\zeta &= 1,33898; 0,1267742 \quad \frac{1}{2} (\zeta + \delta) &= 45. 54. 54. \\ \lg. \text{tg. } \frac{1}{2} (\zeta - \delta) &= 7,9041325 \quad = 0,93159. \lg. \delta\zeta &= 0,9692255-1 \\ \frac{1}{2} (\zeta - \delta) &= 0^\circ 27' 34'' \\ \frac{1}{2} (\zeta + \delta) &= 45. 54. 54. \\ \angle \alpha\delta\zeta &= 45^\circ 27' 20'' \end{aligned}$$

II) In $\triangle \delta \alpha \eta$, datus $\angle \delta \alpha \eta = 182^\circ 23' 39''$, $\alpha \delta = 0,67469$ et $\alpha \eta = 0,67171$ computetur angulus $\alpha \eta \delta$.

$$\begin{array}{rcl} \frac{1}{2} (\eta + \delta) = 23^\circ 48' 11'' & 9,6445590 & \frac{1}{2} (\eta - \delta) = 0^\circ 3' 21'' \\ \alpha \delta - \alpha \eta = 0,00298 & 0,4742168-3 & \frac{1}{2} (\eta + \delta) = 23^\circ 48' 11'' \\ \alpha \delta + \alpha \eta = 1,34640 & 0,1291741 & \angle \alpha \eta \delta = 23^\circ 41' 32'' \\ & 6,9895952 & \end{array}$$

III) In $\triangle \zeta \alpha \eta$ prodit angulus $\alpha \eta \zeta$ ex datis $\zeta \alpha \eta = 44^\circ 13' 26''$, $\alpha \zeta = 0,66429$ et $\alpha \eta = 0,67171$

$$\begin{array}{rcl} \text{sic: } \frac{1}{2} (\zeta + \eta) = 67^\circ 53' 17'' & 10,3911523 & \frac{1}{2} (\zeta - \eta) = 0^\circ 46' 59'' \\ \alpha \eta - \alpha \zeta = 0,00742 & 0,8704039-3 & \frac{1}{2} (\zeta + \eta) = 67^\circ 53' 17'' \\ \alpha \eta + \alpha \zeta = 1,33600 & 0,1258065 & \angle \alpha \eta \zeta = 67^\circ 6' 18'' \text{ (K. } 3' 12'') \\ & 8,1357497 & \end{array}$$

IV) $\delta \eta \zeta = \alpha \eta \zeta - \alpha \eta \delta = 67^\circ 6' 18'' - 23^\circ 41' 32'' = 43^\circ 14' 46''$ (K. $12' 32''$)
 $\delta \gamma \zeta = 2 \delta \eta \zeta = 86^\circ 29' 32''$

Propter hunc angulum datur in $\triangle \delta \gamma \zeta$ latus $\delta \zeta = 0,93159$ (N. I.) et, cum sit $\triangle \delta \gamma \zeta$ aequilaterum $\angle \gamma \zeta \delta = 90^\circ - 43^\circ 14' 46'' = 46^\circ 45' 14''$

$$\begin{array}{rcl} \text{ergo } \delta \gamma = \frac{\delta \zeta \cdot \sin. \gamma \zeta \delta}{\sin. \delta \gamma \zeta} & 0,9692248-1 & \\ & 9,8623803 & \\ & 9,9991855 & \\ & = 0,67986 & \lg. \delta \gamma = 9,8324196-1 \\ & \text{(K. } 0,68141) & \end{array}$$

V) In $\triangle \gamma \delta \alpha$ deprehendimus $\angle \delta = \gamma \delta \zeta$ (N. IV.) $- \alpha \delta \zeta$ (N. I.) $= 1^\circ 17' 54''$ deinde dantur $\delta \alpha = 0,67469$ et $\delta \gamma = 0,67986$.

$$\begin{array}{rcl} \frac{1}{2} (\alpha + \gamma) = 89^\circ 21' 3'' & 11,9457478 & \\ \delta \gamma - \delta \alpha = 0,00517 & 0,7184905-3 & \\ \delta \gamma + \delta \alpha = 1,35455 & 0,1317951 & \\ \frac{1}{2} (\alpha - \gamma) = 18^\circ 36' 59'' & 9,5274432-4 & \\ & 89. 21. 3 & \\ \angle \delta \gamma \alpha = 70^\circ 44' 4'' & & \\ \alpha \delta \text{ in } 11^\circ 24' 0. 25 & & \\ \alpha \gamma \text{ in } 18^\circ 16' 21'' & & \end{array}$$

Sive Kepleri usi numeris:

$$\begin{array}{rcl} \frac{1}{2} (\alpha + \gamma) = 89^\circ 19' 47'' & 11,9318479 & \\ \delta \gamma - \delta \alpha = 0,00674 & 0,8286599-3 & \\ \delta \gamma + \delta \alpha = 1,35608 & 0,1322855 & \\ & 9,6282223 & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{1}{2} (\alpha - \gamma) = 23^\circ 1' 3'' & & \\ \frac{1}{2} (\alpha + \gamma) = 89. 19. 47 & & \text{Keplerus:} \\ \angle \delta \gamma \alpha = 66^\circ 16' 44'' & - & 88^\circ 26' 7'' \\ \text{Cum vergat } \alpha \delta \text{ in } 11^\circ 24' 0. 25 & - & 11^\circ 24' 0. 25'' \\ \text{verget } \alpha \gamma \text{ in } 287^\circ 41' 41'' & - & 285^\circ 34' 18'' \\ \text{h. e. } 17. 41. 41 & - & 15. 34. 18 \end{array}$$

VI) Cum Keplero prodeat $\gamma \delta = 0,68141$, $\alpha \delta \gamma = 1^\circ 20' 26''$ et ponatur $\delta \alpha \gamma$ pro $\delta \gamma \alpha = 68^\circ 26' 7''$ erit $\alpha \gamma = \frac{0,68141 \times \sin. 1^\circ 20' 26''}{\sin. 68^\circ 26' 7''}$

$$\begin{array}{rcl} \text{sive, posita } \gamma \delta = 1, & & \\ \alpha \gamma = \frac{\sin. 1^\circ 20' 26''}{\sin. 68^\circ 26' 7''} & 8,3691225 & \\ & 9,9684843 & \\ & = 0,02516 & 0,4006382-2 \end{array}$$

Adhibitis autem numeris, qui prodierunt in calculo nostro usque ad N. V., prodit $\alpha \gamma = 0,024$.

In manuscriptis, quorum partem illuc pertinentem annot. 74. addidimus, Keplerus hanc prodit quantitatem angulorum: $\delta \alpha \epsilon = 43^\circ 43' 12''$, $\delta \alpha \zeta = 88^\circ 6' 53''$, $\eta \alpha \epsilon = 88^\circ 35' 31''$, $\eta \alpha \zeta = 44^\circ 11' 50''$ et numeris usus, quos ultima positione $\alpha \delta$ computaverat, exhibet angulum $\alpha \delta \epsilon = 67^\circ 20' 22''$, $\alpha \delta \zeta = 45^\circ 33' 58''$, $\alpha \eta \epsilon = 45^\circ 41' 29''$, $\alpha \eta \zeta = 67. 46. 2$

$$\begin{array}{rcl} \epsilon \delta \zeta = 21. 46. 24 & & \epsilon \eta \zeta = 22. 4. 33 \end{array}$$

Deinde pergit: Non sunt pares. Requiritur ergo ad η minusculum longior $\alpha \eta$ vel brevior $\alpha \delta$. Supra autem, ante triduum, huic itidem loco defuit aliquid.

Quare jam hoc novum praestabimus, ut ex hypothesi nostra computemus 4 loca, nam etiam in neglecta praecessione est nonnihil. — Jam iterato per aliquot folia calculo, cum is non succederet, addit: Quid denique facias his observationibus, quae nullo pacto officium faciunt? Nempe hoc agam: semel atque iterum assumam $\alpha\delta$ in certa quantitate, et computabo, quales debuerint esse visiones. (Calculus). In his error, quod eccentricus δ non bene et ex hypothesi mea habeat, ut quidem habere putabam. Ut tamen certissimus sim de loco δ eccentrico, computabo eum ex hypothesi (calculus). Ego prius per anomaliam coaequantam excerpti, oportuit per simplicem. Prodeunt $14^{\circ} 19' 46''$, $14^{\circ} 18' 10''$, $14^{\circ} 16' 34''$, $14^{\circ} 14' 58''$...

Quid, si fixae 7' essent promotiores? Tunc pro oppositione $\delta\mu\sigma\sigma\upsilon\chi\eta$, cum δ putaretur in $17^{\circ} 47' 45''$, fuisset in $17^{\circ} 54' 45''$, et distitissent sidera per 7 plus. Si 84 dat 24 quid 7? Ergo 2 horis posterius δ , et δ motus, respondens residuo temporis, pro $15' 35''$ fiet $17' 32''$, ergo in $17^{\circ} 36' 43''$. Sed horis 2 medius motus δ est $2' 37''$, quae adde ad $17^{\circ} 31' 40''$ putatum, ut sit putatus $17^{\circ} 34' 17''$, qui est vere $17^{\circ} 36' 43''$; diff. $2' 26''$, quae adde etiam ad nostra loca. Prodit $\alpha\delta 30^{\circ} 29' 31''$, $\delta\alpha 19^{\circ} 47' 28''$, $\alpha\epsilon 59^{\circ} 13' 33''$, $\epsilon\alpha 34^{\circ} 48' 20''$, $\alpha\zeta 97^{\circ} 8' 56''$, $\zeta\alpha 41^{\circ} 15' 16''$, $\alpha\eta 8^{\circ} 9' 45''$, $\eta\alpha 5^{\circ} 29' 7''$. Hinc abit ad priora (ann. 74), omittens angulos $\delta\alpha\epsilon$ &c., neque vero rem ad finem perducit.

76) p. 287. Primo momento, Terra in ζ posita, vergit

$$\begin{array}{rcl} \zeta\eta \text{ in } 4^{\circ} 26' 54'' 30'' & \text{sic } \zeta\eta \text{ in } 4^{\circ} 26' 54'' 30'' \\ \zeta\alpha \text{ in } 1. 28. 56. 45 & \alpha\eta \text{ in } 6. 5. 22. 2 \end{array}$$

$$\text{ergo } \angle \alpha\zeta\eta = 87^{\circ} 58' 45'' \quad \angle \alpha\eta\zeta = 38^{\circ} 27' 32''$$

Jam datis in $\triangle \zeta\alpha\eta$ latere $\alpha\eta = 1$ et angulia, non latebit quantitas lineae

$$\alpha\zeta = \frac{\alpha\eta \cdot \sin. \zeta\eta\alpha}{\sin. \eta\zeta\alpha} = 0,62234 \text{ (K. } 0,62227\frac{1}{2}\text{)}.$$

Secundo momento Terra in ϵ posita,

$$\begin{array}{rcl} \epsilon\eta \text{ in } 5^{\circ} 18' 12'' & \epsilon\eta \text{ in } 5^{\circ} 18' 12'' \\ \epsilon\alpha \text{ in } 0. 16. 50. 24'' & \alpha\eta \text{ in } 6. 5. 23. 38'' \\ \angle \alpha\epsilon\eta = 151^{\circ} 21' 38'' & \alpha\eta\epsilon = 17^{\circ} 11' 38'' \end{array}$$

$$\alpha\epsilon = \frac{\sin. \alpha\eta\epsilon}{\sin. \alpha\epsilon\eta} = 0,61674.$$

Tertio momento

$$\begin{array}{rcl} \delta\eta \text{ in } 7^{\circ} 8' 48' 15'' & \delta\eta \text{ in } 7^{\circ} 8' 48' 15'' \\ \delta\alpha \text{ in } 11. 3. 41. 40 & \alpha\eta \text{ in } 6. 5. 25. 14 \\ \alpha\delta\eta = 114^{\circ} 53' 25'' & \alpha\eta\delta = 33^{\circ} 23' 1'' \end{array}$$

$$\alpha\delta = \frac{\sin. \alpha\eta\delta}{\sin. \alpha\delta\eta} = 0,60658.$$

Denique quarto momento, Terra in γ existente, eadem qua priores ratione prodeunt
 $\angle \alpha\gamma\eta = 69^{\circ} 19' 38''$ et $\angle \alpha\eta\gamma = 34^{\circ} 20' 20''$

$$\alpha\gamma = \frac{\sin. \alpha\eta\gamma}{\sin. \alpha\gamma\eta} = 0,60291.$$

77) p. 287. Cum sint $\zeta, \epsilon, \delta, \gamma$ loca Terrae propositis temporibus, et Solis α loca ex Tychoe cognita, prodeunt $\zeta\alpha\delta = 85^{\circ} 14' 5''$, $\epsilon\alpha\delta = 43^{\circ} 8' 44''$, $\epsilon\alpha\gamma = 87^{\circ} 43' 36''$, $\zeta\alpha\gamma = 129^{\circ} 48' 57''$.

Tempus autem inter primum et tertium momentum elapsum = $3\frac{1}{2}$ ann.

$$\begin{array}{rcl} \text{" " " secundum et tertium} & \text{" " "} & = 1\frac{1}{2} \text{ "} \\ \text{" " " secundum et quartum} & \text{" " "} & = 3\frac{1}{2} \text{ "} \\ \text{" " " primum et quartum} & \text{" " "} & = 5\frac{1}{2} \text{ "} \end{array}$$

Praecessio aequinoctiorum annua secundum Tychoem = $51''$, ergo addenda erunt singulis angulis: primo: $3' 12''$, secundo: $1' 36''$ (1. 33), tertio: $3' 12''$, quarto: $4' 48''$, ergo prodibit $\angle \zeta\alpha\delta = 85^{\circ} 17' 17''$, $\angle \epsilon\alpha\delta = 43^{\circ} 10' 20''$, $\angle \epsilon\alpha\gamma = 87^{\circ} 46' 48''$,
 $\angle \zeta\alpha\gamma = 129^{\circ} 53' 45''$.

His usi angulis et quantitatibus laterum $\alpha\zeta, \alpha\epsilon, \alpha\delta, \alpha\gamma$, quas Keplerus prodit, computavimus angulos $\zeta\delta\alpha = 48^{\circ} 9'$, $\epsilon\delta\alpha = 69^{\circ} 37' 3''$, $\epsilon\gamma\alpha = 46^{\circ} 47' 9''$, $\zeta\gamma\alpha = 25^{\circ} 28' 30''$.

$$\begin{array}{rcl} \text{Hinc } \epsilon\delta\zeta & 69^{\circ} 37' 3'' - 48^{\circ} 9' & = 21^{\circ} 28' 3'' \\ \text{et } \epsilon\gamma\zeta & 46. 47. 9 - 25. 28. 30'' & = 21. 18. 39 \end{array}$$

$$\text{Diff. } 9^{\circ} 24'' \text{ (K. } 8^{\circ} 56'').$$

78) p. 290. Keplerus in praemissis iterum computandi rationem plenam exhibet, quam omittimus, exhibentes tantum ea, quae quaerenda proposuit. Ne vero quid ducit, ea

iae in textu omisit, in sequentibus addidit. Notarius autem, in figura 82. aliquid sculptore peccatum esse; circulus scilicet $\epsilon\delta$ debuit ex capite β , neque vero ex α describi. alculus sic se habet:

1) Puncta ϵ et δ respondent observationibus annorum 1585 et 87, quae exhibent loca

Solis 11° 29' 41" 4" et
10. 16. 5. 55.

$\epsilon\delta = 43^\circ 35' 9''$.

Distantia temporum = $1\frac{2}{3}$ anni, ergo $1^\circ 36''$ addenda ob praecessionem aequinoctii, odit angulus $\epsilon\alpha\delta = 43^\circ 36' 45''$. Jam datis in $\triangle \epsilon\alpha\delta$ lateribus $\alpha\epsilon = 0.9977$, $\alpha\delta = 0.98613$, quaeruntur anguli reliqui et latus tertium.

$\frac{1}{2}(\delta + \epsilon) = 68^\circ 11' 38'' - 10.3978366$

$\alpha\epsilon - \alpha\delta = 0.01157 - 0.0633334 - 2$

$\alpha\epsilon + \alpha\delta = 1.98383 - 0.2975045$

8.1636655

$\frac{1}{2}(\delta - \epsilon) = 0^\circ 50' 6''$ (K. 50' 3')

68. 11. 38.

$\alpha\delta\epsilon = 69. 1. 44.$; $\alpha\epsilon\delta = 67. 21. 32.$

$\delta\epsilon = \frac{\alpha\epsilon \cdot \sin. \alpha}{\sin. \delta}$; $\lg. \alpha\epsilon = 0.9990000 - 1$
 $\lg. \sin. \alpha = 9.8387069$
 $\lg. \sin. \delta = 9.9702357$
 $= 0.78701$ $0.8674732 - 1$

2) Cum sit locus Martia η anno 1585 in $4^\circ 11' 48' 20'' (+ 12^\circ)$

locus Solis α " " " 11. 29. 41. 4.

erit $\angle \alpha\epsilon\eta = 132. 7. 16.$

$\angle \alpha\delta\eta = 67. 21. 32.$ (N. 1.)

$\angle \eta\epsilon\delta = \alpha\epsilon\eta - \alpha\delta\epsilon = 64. 45. 44.$

Sic anno 1587 locus Martia η in $6^\circ 4' 41' 48''$

Solis α " 10. 16. 5. 55.

$\angle \alpha\delta\eta = 131. 24. 10.$

$\angle \alpha\delta\epsilon = 69. 1. 44.$

$\angle \eta\delta\epsilon = \alpha\delta\eta - \alpha\delta\epsilon = 62. 22. 26.$

$\epsilon\eta\delta = 180 - (64^\circ 45' 44'' + 62^\circ 22' 26'')$

$= 52^\circ 51' 50''$

Datis in $\triangle \epsilon\eta\delta$ angulis et latere $\epsilon\delta = 0.73701$, prodit

$\epsilon\delta \cdot \sin. \delta = 0.8674734 - 1$

$\epsilon\eta = \frac{\epsilon\delta \cdot \sin. \delta}{\sin. \eta} = 0.9474299$

0.9015692

$= 0.81910.$ $0.9133341 - 1$

(K. 0.81915)

3) In $\triangle \eta\epsilon\alpha$ datis lateribus $\epsilon\eta = 0.81910$ (N. 2), $\epsilon\alpha = 0.9977$ et angulo comprehenso $\epsilon = 132^\circ 7' 16''$ (N. 2) computatur $\angle \epsilon\alpha\eta$ et latus tertium.

$\frac{1}{2}(\eta + \alpha) = 23^\circ 56' 22'' - 9.8473466$

$\epsilon\alpha - \epsilon\eta = 0.1786 - 0.2518815 - 1$

$\epsilon\alpha + \epsilon\eta = 1.8168 - 0.2593071$

8.6399210

$\frac{1}{2}(\eta - \alpha) = 2^\circ 29' 57''$

$\frac{1}{2}(\eta + \alpha) = 23. 56. 22.$

$\angle \epsilon\alpha\eta = 21. 26. 25.$ (K. $21^\circ 26' 32''$); $29^\circ 41' 4''$ $\eta\eta -$

$21^\circ 26' 25'' = 8^\circ 14' 39''$ $\eta\eta.$

$\alpha\eta = \frac{\epsilon\eta \cdot \sin. \epsilon}{\sin. \alpha} = 0.9133369 - 1$

9.8702451

9.5629244

$= 1.6621$ 0.2206578

(K. 1.66208).

4) Locus Solis anno 1583 in $1^\circ 12' 10' 3'' (+ 12^\circ)$

1588 " 9. 1. 44. 53.

Distantia locorum = 130. 25. 10. Dist. temporum = $5\frac{1}{3}$ anni,

ergo praecessio aequin. = 4. 48.

$\angle \zeta\alpha\gamma = 130. 29. 58.$; $\alpha\zeta = 1.01049$, $\alpha\gamma = 0.98203.$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(\gamma + \zeta) &= 24^\circ 45' 1'' - 9,6637124 \\ \alpha\zeta - \alpha\gamma &= 0,02846 - 0,4542349 - 2 \\ \alpha\zeta + \alpha\gamma &= 1,99252 - 0,2994027\end{aligned}$$

$\frac{1}{2}(\gamma - \zeta) = 0^\circ 22' 38''$ (Keplero prodeunt $22' 48''$, ob errorem calculi in divisione commissi.)

$$\begin{aligned}\alpha\gamma\zeta &= 25. 7. 39. \\ \alpha\zeta\gamma &= 24. 22. 23. \\ \zeta\gamma &= \frac{\alpha\zeta \cdot \sin. \alpha}{\sin. \gamma} = \frac{0,0045320}{9,8810491} \\ &= 1,8095 \quad 0,2575663\end{aligned}$$

5) Anno 1583 locus \odot in $4^s 1^\circ 29' 30''$ Anno 1588 \odot in $6^s 13^\circ 35' 40''$

$$\begin{aligned}\odot & \text{ in } 1. 12. 10. 3. \quad \odot & \text{ in } 9. 1. 44. 53. \\ \angle \eta\zeta\alpha &= 79. 19. 27. & \angle \eta\gamma\alpha &= 78. 9. 13. \\ \angle \gamma\zeta\alpha &= 24. 22. 23. (N. 4); & \angle \zeta\gamma\alpha &= 25. 7. 39. (N. 4) \\ \angle \eta\zeta\gamma &= 54. 57. 4. & \angle \eta\gamma\zeta &= 53. 1. 34.\end{aligned}$$

$$\gamma\eta\zeta = 180^\circ - (54^\circ 57' 4'' + 53^\circ 1' 34'') = 72^\circ 1' 22''$$

6) In $\triangle \zeta\eta\gamma$ dantur anguli $\eta = 72^\circ 1' 22''$, $\gamma = 53^\circ 1' 34''$, et latus $\zeta\gamma = 1,8095$, hinc: $\zeta\eta = \frac{\zeta\gamma \cdot \sin. \gamma}{\sin. \eta} = \frac{0,2575663}{9,9024976} = 1,5198$ $0,1818016$

7) In $\triangle \eta\zeta\alpha$ dantur $\zeta\eta = 1,5198$ (N. 6), $\zeta\alpha = 1,01049$ $\angle \alpha\zeta\eta = 79^\circ 19' 27''$ (N. 5). quaeruntur angulus α et latus $\alpha\eta$.

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(\alpha + \eta) &= 50^\circ 20' 16'' - 10,0813916 \\ \zeta\eta - \zeta\alpha &= 0,50931 - 0,7069822 - 1 \\ \zeta\eta + \zeta\alpha &= 2,53029 - 0,4031704\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(\alpha - \zeta) &= 13^\circ 38' 45'' \\ &= 50. 20. 16.\end{aligned}$$

$$\angle \zeta\alpha\eta = 63. 59. 1. = 2^s 3^\circ 59' 1'' \text{ (K. } 63^\circ 55' \text{)}$$

$$\text{anno } 83: \alpha\zeta \text{ in } 7. 12. 10. 3.$$

$$\alpha\eta \text{ in } 5. 8. 11. 2.$$

$$\text{Praecessio } 1. 36.$$

$$\text{„Quod esset in“ } 8. 12. 38. \text{ } \overline{\text{mp}}$$

$$\text{prius in } 8. 14. 32. \text{ } \overline{\text{mp}}$$

$$\text{Diff. } 1. 54.$$

In Kepleri calculo haec mutanda sunt. Cum ipsi prodeat $\frac{\zeta\eta - \zeta\alpha}{\zeta\eta + \zeta\alpha} = 20122$,

multiplicato hoc quotiente in tang. $50^\circ 20' 16''$, exhibet factum

$$24270 = \text{tg. } 13^\circ 38' 39'' \text{ pro } 13^\circ 38' 31''$$

$$50. 20. 16.$$

$$63. 58. 47.$$

$$\alpha\zeta \text{ in } 12. 10. 3. \text{ III (Sol in } \odot, \text{ ergo Terra in III)}$$

$$\text{Ergo } \alpha\eta \text{ in } 8. 11. 16. \text{ } \overline{\text{mp}}$$

$$\text{Praec. } 1. 36.$$

$$8. 12. 52. \text{ } \overline{\text{mp}}$$

$$\text{Prius in } 8. 14. 32.$$

$$\text{Diff. } 1. 40.$$

$$\text{Denique } \alpha\eta = \frac{\zeta\eta \cdot \sin. \zeta}{\sin. \alpha} = \frac{0,1818016}{9,9924169} \text{ (N. 6)}$$

$$= 1,6619 \text{ (K. } 1,66179) \quad 0,2206190$$

$$\text{prius } = 1,6621 \text{ (N. 3)}$$

$$\text{Diff. } 0,0002; \text{ Keplero: } 0,00029.$$

8) In $\triangle \alpha\eta\vartheta$ datis $\alpha\eta = 1,66208$, $\alpha\vartheta\eta = 44^\circ 31' 13''$, $\alpha\vartheta = 0,9877$, prodit

$$\sin. \alpha\eta\delta = \frac{\sin. \alpha\delta\eta \cdot \alpha\delta}{\alpha\eta}; \quad \begin{array}{r} 0,9846251-1 \\ 9,8458181 \\ 0,2206519 \end{array}$$

$$\angle \alpha\eta\delta = 24^{\circ} 37' 28''$$

$$\delta \text{ an. } 1590 \text{ in } 6^{\circ} 2. 57. 20.$$

$$\text{ergo } \alpha\eta \text{ in } 5. 8. 19. 52.$$

Hunc quoque calculum deprehendimus inter manuscripta Kepleri per multa folia extensum, numeris quidem suis cum numeris textus quadamtenus consentientibus, neque vero plane eodem exhibentem. Numeri sc. manusc. sunt: $\alpha\delta = 98628$, $\delta\epsilon = 73706$, $\alpha\delta\epsilon = 69^{\circ} 1' 3\frac{1}{2}''$, $\alpha\epsilon\delta = 67^{\circ} 22' 11\frac{1}{2}''$, $\epsilon\eta\delta = 52^{\circ} 51' 50''$. Deinde $\epsilon\eta = 81823$, $\epsilon\alpha\eta = 21^{\circ} 26' 22''$, $\alpha\eta = 166246$; $\alpha\zeta = 101069$, $\eta\zeta\gamma = 54^{\circ} 57' 44''$, $\eta\gamma\zeta = 53^{\circ} 2' 54''$, $\zeta\gamma = 180870$, $\gamma\eta\zeta = 71^{\circ} 59' 22''$, $\zeta\eta = 152074$. Denique $\alpha\eta = 166284$, prius 166246; diff. 38, „efficit in perigaeo et $\square \odot 1'.$ “

Distantiae Terrae a Sole, quibus superstruxit Keplerus totum hunc praecedentem calculum ($\alpha\zeta = 1,01049$, $\alpha\epsilon = 0,9977$, $\alpha\delta = 0,98613$, $\alpha\gamma = 0,98203$ et $\alpha\delta = 0,98770$) desumptae sunt ex tabula cap. XXX. hunc in modum:

$$\text{Anno } 1583 \text{ distat Sol ab apogaeo per } 3^{\circ} 5^{\circ} 30' - 1^{\circ} 12^{\circ} 10' 3'' = 53^{\circ} 19' 57''$$

$$\text{Anom. coaeq. tabulae} = 53. 9. 56$$

$$\text{exhibet distantiam} = 1,01047;$$

Anno 1585 distat Sol ab apogaeo per $3^{\circ} 5^{\circ} 30' - 11^{\circ} 29^{\circ} 41' 4'' = 95^{\circ} 48' 56''$
 Anom. coaeq. tab. = $94^{\circ} 58' 28''$ exhibet dist. = 0,99796; diff. utriusque anom. = $50' 28''$,
 eadem in tabula = $60' 7''$; diff. distantiarum in tabula = 0,00031, quare subtrahere a
 0,99796 quantitatem $757. 0,00031. 60 = 0,00026$, restat 0,9977.
 15. 3607

Anno 1587. Dist. Solis = $139^{\circ} 24'$, in tabula ad an. coaeq. $139^{\circ} 20' 24''$ dist. = 0,98614.

Anno 1588. Dist. Solis = $176^{\circ} 15'$, tab. exhibet ad an. coaeq. $175^{\circ} 55' 42''$ dist. 0,98204, ad eandem $176^{\circ} 56' 46''$: 0,98202.

Anno 1590. Dist. Solis = 132° ; tab. ad $132^{\circ} 14\frac{3}{4}'$, — dist. 0,98764, ad $131^{\circ} 14' 1''$ dist. 0,98787, differentia exhibet particulas 6 deficientes, ut respondeant 132° dist. 0,9877.

Tabula autem cap. XXX. quomodo computetur, relatum quidem est capite XXIX; ut autem Kepleri verba facilius intelligantur, exemplo rem proponemus:

Sit. (fig. 83) $\angle \delta\alpha\delta = 1^{\circ}$; cognitis in triangulo $\beta x\alpha$ ad x rectangulo angulis et latere $\alpha\beta = 0,018$ (posita semidiametro eccentrici Terrae = 100000, assumit Keplerus eccentricitatem $\alpha\beta = 1800$, ergo posita illa = 1, erit $\alpha\beta = 0,018$), prodit quantitas lateris $\beta x = \sin 1^{\circ} \cdot 0,018 = 0,000314$ et lateris $\alpha x = \cos 1^{\circ} \cdot 0,018 = 0,017997$. Jam dantur in triangulo $\beta x\delta$, item ad x rectangulo, latera $\beta x = 0,000314$ et $\beta\delta = 1$, ergo $\beta x = \sin. \angle \delta = \sin. 0^{\circ} 1' 5''$, quare erit $\angle \delta\beta\delta = \delta\alpha\beta + \alpha\delta\beta = 1^{\circ} 1' 5''$ (Anomalia media tabulae). Porro $\delta x = \cos. x\delta\beta = \cos. 0^{\circ} 1' 5'' = 0,9999999$, ergo $\alpha\delta = \alpha x + x\delta = 1,017997$ (distantia Solis a Terra tabulae = 1,018). Secundo sit $\angle \delta\alpha\delta = 2^{\circ}$, simili processu prodit $\angle \delta = 0^{\circ} 2' 10''$ ergo $\angle \delta\beta\delta = 2^{\circ} 2' 10''$ et latus $\alpha\delta = 1,01799$ &c.

„Anomalia coaequata“ (columnae tertiae) prodit subtractis angulis δ ab angulis $\delta\alpha\delta$; v. c. anom. coaeq. $1^{\circ} = 1^{\circ} - 0^{\circ} 1' 5'' = 0^{\circ} 58' 55''$.

79) p. 297. Appendicem hanc Keplerum addidisse editioni Progymnasmatum, quae prodit anno 1602, prius diximus.

Monet Keplerus in praefatione ad Ephemerides (Lincii 1616) p. 1. haec: Aequationes Solis computavi ex principiis physicis. Itaque in 4 quadrantibus medietatibus provenit mihi hoc nomine Solis aequatio $1'$ auctior vel diminutor, quam si usus essem forma usitata cum Tychone. Qua de re vide cap. XXXI. Comment. de Marte, sed memineris, me ibi, dum corrigo numeros, quos antea prodideram in appendice ad Progymn. Tychonis, potius illos infelici cura pervertisse, ut recte me per epistolam monuit Jo. Ant. Maginus. Operare secundum praescriptum ejus loci et deprehendes ipse, quod dico. Usus est hac differentiola Chr. Severini, Tychonis computator, in examine eclipsium fundamentalium, quae sunt in Tomo I Prog. pag. P.

Maginum libro suo inscripto: Supplementum Ephemeridum &c. adjunxisse literas Kepleri diximus in praefatione et ea, quae illuc pertinebant, lectoribus proposuimus.

Epistola, cujus Keplerus mentionem facit, haec est: Clarissimo et Excellentissimo Viro D. J. Keplero, Mathematico Caesareo.

Doctissime ac praestantissime Vir.

Vidi nuper insigne tuum opus de motu Martis a quodam librario nostro Bononiensi haec pro nobili viro Venetia allatum, et mutuo quidem mihi ad unicam diem concessum percurri breviter, quantum per angustiam temporis mihi concessum fuit.

Inter cetera offendi caput 34, positum pag. 164 (297), in quo proponis, per bisectionem eccentricitatis Solis non turbari sensibilibiter aequationes Solis a Tychone expositas; quod sane cum avide percurrissem invenissemque, tuam rationem a Ptolemaei et Tychonis fundamentis tam in simplici Solis eccentricitate quam in duplicata valde differre, neque ullo pacto convenire posse cum tabula ad simplicem Solis eccentricitatem a Tychone allata, neque cum mea, quam recenter secundum hypothesin aequantis supputavi ad eccentricitatem partium 1792: cognovi tandem, te male angulum anomaliae Solis ad mundi centrum accepisse, cum verius ad eccentrici centrum in simplici Solis theoria, vel ad aequantis centrum in bisecata eccentricitate sit accipiendum, ut ex hac adjecta supputatione clarius veritatem percipies.

Sed mirum minime est, homines tam eximia eruditione praestantes, et gravissimis ac difficillimis speculationibus districtos, interdum a vero tramite deflectere. Ignoscas igitur et in bonam partem haec accipias quaeso, et qua decet animi benevolentia, quia veri et sinceri amici munus gero. Haud illibenter enim fateor, quod etiam mihi soleat idem interdum accidere, quia enim homines sumus, facile errare possumus. Me enim et tibi et tuis amicis, quam diu spiritus meos roget artus, ex asse verum et sincerum esse perpetuo futurum et mansurum, plane ac plene confidas. Sed quam primum ipsum opus tuum mihi allatum fuerit (exspecto enim illud avide ab amico), a capite ad calcem totum summa cum diligentia et assiduitate percurram.

Cosmographicum Mysterium D. V. longo temporis spatio interjecto a me summa cum diligentia quaesitum, nunquam consequi potui, nisi paucis abhinc mensibus, idque a nobili Germano, qui ad nos Bononiam venit, eundemque librum secum attulit, pro quo munere illi „Primum Mobile“ meum gratitudinis ergo obtuli. Et quia in itinere duo priora folia cum titulo et dedicatione corrossa sunt, rogo V. D., ut eadem ad me mittat simul cum tabulis magnis, quae in eodem desiderantur (nulla enim alia exstat, quam tertia tabula, orbium planetarum dimensionem et distantias exhibens); hoc enim erit mihi gratissimum, pro quo certe mea officia promptissima et paratissima prolixo quovis tempore defero et polliceor. His bene et feliciter vale et de Astronomia perficienda bene mereri ne desine. Bonon. d. 15. Jan. 1610. Excell. Tuae studiosiss. Jo. Ant. Maginus Patavinus.

„Supputationis“, quam supra dicit, summa haec est:

Deciperis in assumptione anomaliae 45° et 135° penes angulum FAE (FAD) (fig. 84), qui, cum sit ad centrum mundi, ignotus est, et est re vera FCE (FCD) ad quem refertur circumferentia FE (FD). Bene quidem colligis angulum AEC = $1^\circ 27' 31''$, sed tali pacto neque Ptolemaeus neque Copernicus aut Braheus computavit aequationes Solis, ut videtur est apud Tychonem p. 29, qui assumit cognitum triangulum ACE notorum laterum CE 100000, AC 3584, vel ut tu 3600, cum angulo ACE. Unde adinvenitur $\angle AEC = 1^\circ 25' 20''$. (Tycho habet $1^\circ 24' 56''$); sed si accipiat eccentricitas, qua praecise fuit usus Tycho, nempe 3584, colligitur eadem cum Tychone aequatio $1^\circ 24' 56''$.

In secundo modo computandi aequationes, tu, retento priori angulo falso CAE, confugis primo ad $\triangle BEA$ et colligis $\angle BEA = 0^\circ 43' 46''$. Sed non est ille angulus CAE, sed BCE notus; bene tamen procedit methodus tua illa ad colligendum $\angle BEC$, $43' 46''$; sed si acceperimus eccentricitatem 1792, erit $BEC = 43' 34''$. Postrima etiam pars calculi tui falsa est, dum ex EB, BC cum angulo comprehenso quaeris angulum BEC. Nam vice versa secundum rectum calculum venandus est e prioribus $\angle EBC = 44^\circ 16' 14''$, et jam datis AB et BE lateribus cum ABE indagabitur $\angle AEB = 0^\circ 42' 40''$, et inde totus angulus aequationis AEC = $1^\circ 26' 26''$. Sic quoque expediendo calculum cum praecisore ecc. 1792, est $\angle AEC = 1^\circ 26' 2''$, differtque ab angulo Tychonicae tabulae $1' 6''$. Quare in Progymnasmatum appendice, ubi calculi utriusque differentia prodit $1\frac{1}{2}''$, debet legi $1' 6''$ et non, ut tu ais, $0' \frac{1}{6}''$; nam verisimilius est, Tychonem scripsisse $6''$, et fuisse male transcriptum $\frac{1}{6}$.

Quibus Keplerus haec respondit: Clarissime et praestantissime D. Magine. Quas ad me dedisti Bononia die 15. Jan., accepi 1. Febr. et ἀνθρῳτῳ respondeo. Gratiam inivisti non parvam, quod significasti, tibi meum opus de Marte curae esse. Obsecro propter studia nostra, ut eadem lima totum percurras. In id enim est editum, ut, sicubi erro, tui similium censuris in hoc veluti fundamento sublever, ut quam correctissimum superstruam astronomiae opificium, primum atque mihi a summis difficultatibus aulicae vitae affulserit tranquilla serenitas.

Quod rem praesentem attinet, decepit te ambiguitas meae dictionis, quam

discutiet lectio totius libri. Atque hoc primo modo. Primus modus hic denominatur non a methodi forma, sed a forma eccentricitatis, quae hic assumitur simplex. Nam methodum adhibeo sane aliam et compendiosiore pro hoc instituto (id facio passim in opere). Re ipsa convenimus Tycho et ego. Nam assume anomaliam mediam $46^{\circ} 27' 31''$, invenies coaequatam Tychonis 45° . Deinde quaere anom. med. 45° in tabula (Cap. XXX.), qua anomalia tu uteris in secundo meo modo, quae est bisectae eccentricitatis, ubi exstruis aequationem $1^{\circ} 26' 2''$, invenies ex tabula mea eandem. Ecce: $44^{\circ} 42' 59''$ dat $43^{\circ} 17' 1''$, aequatio $1^{\circ} 25' 58''$
 $45. 43. 45$ " $44. 16. 15$ " $1. 27. 30$.

Proportionaliter igitur 45° dat $1^{\circ} 26' 28''$; sed hoc in tabula mea, quae habet modum tertium. Tu vero in modo secundo constitue anomaliam coaequatam $43^{\circ} 33' 58''$ (subtracta aequatione $1^{\circ} 26' 2''$ a te inventa), et utere mea methodo, invenies mediam 45° , quam et assumsisti. Appendicis ad Progymnasmata ipse auctor sum. Sed fieri potuit, ut in illius computo ego tunc fuero hallucinatus, ita computans, ut tu nunc; hoc est, comparans aequationem, quam mihi dat coaequata 45° , cum aequatione, quam Ptolemaeo dat simplex, seu media anom. 45° .

¶ Par erat, ut Caesar mihi mandaret gratis donare exemplaria mathematicis. At, quia strenue me patitur esaurire, coactus sum vendere typographo sine exceptione. Pro tribus tamen florenis hic Pragae habere possum unum.

Mitto defectus Mysterii petitos, paratus totum mittere; sed quia habes reliqua, postae parcendum duxi.

Vale Vir celeberrime, et perge censendo mihi prodesse.

Pragae d. 1. Feb. 1610.

T. Excell. amicus

Jo. Keplerus, S. C. M. Mathematicus.

E Magini responsione haec desumenda sunt: Vidi ex tua responsione, te non temere, sed studiose et tuo quodam consilio supputasse aequationes Solis, initio facto ab angulo anomaliae verae ignoto, non autem, ut fieri ordinario consuevit, ab angulo anomaliae mediae. Quae ratio quid commodi possit afferre, cum ex ipsa prodeant numeri introitus fractionibus molestis implicati, ignoro. Sicut videre est etiam in tabula tua distantiarum, quae molesta est pro ingressibus.

Non video autem, quomodo ex hac tua supputationis forma aequationes Solis ex hypotesi eccentricitate prodeant in iisdem numeris a te positis. Ex anom. vera penes $\angle EAB = 45^{\circ}$ recte colligis $\angle BEA = 43^{\circ} 46''$; hic additis ad EAB anom. veram, sequitur $\angle EBC = 45^{\circ} 43' 46''$; calculus manifestat $\angle CEA = 1^{\circ} 28' 38''$, non ut tu ponis $1^{\circ} 27' 24''$; quare differt hic modo inventus angulus ab illo secundum simplicem eccentricitatem ($1^{\circ} 27' 31''$) uno minuto et $7''$. Pariter in anom. 135° est totus $\angle CDA = 1^{\circ} 26' 28''$, et non ut tu ponis $1^{\circ} 27' 28''$. Ex tua tabula distantiarum Solis a Terra colligitur cum anom. aequata 45° aequatio Solis $1^{\circ} 28' 38''$, et cum anom. 135° , — $1^{\circ} 26' 20''$. Ex his autem patet, non esse aequales aequationis partes, nempe optica et physica, unde in constructione tabulae ex duplicatione prosthaphaeresis non obtinebitur exactissima aequatio.

Cuperem te cap. 31. correcturum libenter, quamvis lapsus sit exigui momenti.

Quibus addens Maginus quaedam de Origani Ephemeridibus deque corrigendis diametris lunarium, et petens a Keplero tabulas motuum Martis, sic concludit: Has manu propria ob adversam valetudinem, qua 15 plus diebus teneor, exarare minime potui. Tu Vir Excell. vale optime. Bonon. 23. Febr. 1610.

Keplerus in responsione sua (d. d. 22. Martii 1610) refert Magino, cogitare se ante editionem Tabularum Rudolphi scribere Ephemerides ad annos 80, initio facto ab anno 1583, et invitat Maginum, ut operam suam conferat ad illas computandas et communi summe edendas. Quae quum non huc pertineant, ea tantum ex hac epistola desumimus, quae ad hunc locum attinent.

Ex morbo, scribit, te convaluisse gaudeo. Vix tandem tua opera discussi hanc nebulam. Video jam causam nullam fuisse, cur meos numeros in Appendice Progymn. fol. 821. insertos posterioribus curis in Martis fol. 164 (297) corrigerem. Mirum fatum, cum toties operationem repetierim (quippe grave mihi videbatur erratum in Progymn. fateri), adeo constanti me ratione aberrasse. Interdum igitur *δευτεραι φρονιδες ατυχεις και ανητοι.*

In felicitatis parte est, quod is parvus est error, et nihil illi superstructum, ita ut exemptus ex libro ruinam trahat nullam. Nam quod tu inferis, non esse aequales partes aequationis opticam et physicam, id quidem verum est, neque dixeram plane aequales; quod vero addis, in constructione tabulae ex duplicatione prosthaphaeresis non obtineri exactissime aequationem, id tantum abest ut verum dicas, ut potius per hanc tuam correctionem contrarium probes. Nonne enim tu ipse in his literis ex mea tabula ad coaequatam 45° elicis aequationem $1^\circ 28' 38''$, ad $135^\circ - 1^\circ 26' 26''$? At quid tua correctio? Nempe $1^\circ 28' 38''$, et $1^\circ 26' 26''$. Miraberis, quae hae praestigiae? Sed cogita, quod in duplicatione tabulari partes aequationis connectantur ad gradus integros anomaliae non mediae, non coaequatae, sed eccentrici. Non mirum igitur, si quanto minor est optica anomalia eccentrici 45° , quam optica anom. coaeq. 45° , tanto etiam minor sit pars physica, quam sumitur per duplicationem opticae.

Cogita, an haec mihi origo errandi, qui aliam forte methodum computando sum secutus, aliam postea in Commentariis perscripsi, numeris ex illa mutatis. Nam nunc non vacat quaerere.

Ut errorculus hic propaletur, nihil reformido; tantum ut qui id facturus est, totum librum legat. Origanus enim aut quicumque alius, si abusus est hoc meo sphalmate, non impune feret si vixerō. Nam ut nolo meis erroribus praeejudicare veritati, ita ne aliis quidem concedam silentium tenens. In computandis eclipsibus non solae luminarium diametri, sed et alia multa corrigenda sunt, et a me correctā sunt in Hipparcho meo, licet nondum absoluto, ut edi possit.

Tabulas Martis habeo absolutissimas, est mihi et compendium computandi praesto, ut unus aliquis locus Martis, tam in longum quam in latum multo breviori methodo computetur, quam ex Prutenicis; multi vero simul facillima ratione computantur. Nisi tantum circa punctum oppositionis cum Sole, ibi correctiunculis est opus. Sed et in $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{4}$ tabulae sunt perfectae, in \odot et \ominus dimidium earum.

80) p. 306. Primum hanc sententiam de Solis motu circa axem pronuntiavit Keplerus in libro de Nova Stella (Vol. II. p. 673), repetiit in libellis contra Roslinum et Feseum, (Vol. I. p. 508, 570, 590), et confirmatam gloriatur literis ad amicos datis de macula Solaribus, retractans quidem ea, quae de tempore revolutionis somniaverat (Vol. II. p. 780).

81) p. 315. Astant schemati N. 90. in Kepleri delineatione ad punctum α datae forte genios repraesentantes figurae, converso ad circulum $\delta\epsilon\eta\theta$ vultu, altera in manibus tenens circulum et normam, altera librum evolutum. Quod schema quum hinc inde saepius repetatur et adhibeatur ad demonstrationes theorematum hujus libri praecipuorum, opinatur Delambros (Hist. de l'Ast.), significare voluisse Keplerum hoc ornamēto praestantiam illius et praecipuum momentum in inventionibus suis.

82) p. 323. E verbis „ex recentissima recognitione“ concludere licet, Keplerum hic spectare A. Romani opus, quod produsse refert Vossius (de scientiis math.) anno 1607, inscriptum: Methodus cifris exprimendi numerum quantumvis maximum. Item mathematicae analyseos triumphus, in quo enneagoni circulo inscripti ad circulum ratio exhibetur. Ceterum prohibent, Vietam ante Romanum hunc ipsum numerum (ultimam notam habuit 5 pro 6) anno 1579 pronupciasse; A. Romanum vero illum ulterius usque ad 15 notas extendisse in libro, qui prodit anno 1593 inscriptus „Ideae mathem. pars prima.“


83) p. 327. Sit in schemate 132. A nodus, AE ecliptica, B locus Martis, $\angle E = 90^\circ$, erit sin. BE = sin. A. sin. AB = sin. $1^\circ 50' 45'' \times \sin. \left. \begin{array}{l} 41^\circ. BE = 1^\circ 12' 40'' \\ 68^\circ. = 1^\circ 42' 40'' \end{array} \right\}$
 $\cos. AE = \frac{\cos. 41^\circ}{\cos. 1^\circ 12' 40''} = \cos. 40^\circ 59' 7''$, vel $\cos. AE = \frac{\cos. 68^\circ}{\cos. 1^\circ 42' 40''} = \cos. 67^\circ 59' 23''$.
 $41^\circ - 40^\circ 59' 7'' = 53''$; $68^\circ - 67^\circ 59' 23'' = 37''$. Keplero prodeunt $50''$ et $16''$.
 Reductio ad eclipticam prioris loci: $6^\circ 5' 25' 20'' - 50'' = 5^\circ 24' 30''$, etque posterioris: $5^\circ 8' 19' 20'' - 16'' = 5^\circ 8' 3' 4''$ mp. In contextu pro voce „longiora“ ponenda est vox „brevioris“. Ob praecessionem aequin. ab anno 1590 in a. 1595 subtrahuntur a $14^\circ 21' 7'' \odot$: $4' 15''$, ita ut reducat locus \odot in $14^\circ 16' 52'' \odot$; sic pro 2 mensibus (31. Oct. ad 31. Dec. 1590) subtrahuntur $9''$ a $5^\circ 24' 30''$, restat $5^\circ 24' 21''$.
 Jam in triangulo rectilineo rectangulo datis latere uno = 1, et angulo (ad centrum orbis) $1^\circ 12' 40''$, erit alter latus = $\frac{1}{\cos. 1^\circ 12' 40''} = 1,00022$ vel reducendo ad distantiam 1,63100 = $1,00022 \times 1,63100 = 1,63134$. Sic ad angulum $1^\circ 42' 40''$

chordis ad diametrum perpendicularibus, summam harum chordarum esse ad diametrum, ut chorda a termino diametro opposito ad primum sectionum punctum ducta ad chordam alteram diametri terminum conjungentem cum illo puncto. Hoc Archimedis theorema etiam hac forma exprimi potest, assumpto angulo ad centrum insistente arcui per primam sectionem terminato, = a , numeroque sectionum = n et circuli radio = r : $\sin. a + \sin. 2a + \sin. 3a + \dots \sin. na : r = \cos. \frac{1}{2} a : \sin. \frac{1}{2} a$; assumpto $r = 1$, erit $\sin. a + \sin. 2a + \dots \sin. na = \frac{\cos. \frac{1}{2} a}{\sin. \frac{1}{2} a} = \cot. \frac{1}{2} a$.

Hæc ad Kepleri propositionem referentes, e goniometria decumimus theorema: $\cot. \frac{1}{2} a = \operatorname{cosec}. a + \cot. a$, et ponentes $a = 1^\circ, 2a = 2^\circ$ etc. $na = 180^\circ$ erit $\sin. 1^\circ + \sin. 2^\circ + \sin. 3^\circ \dots + \sin. 180^\circ = \cot. \frac{1}{2} 0^\circ = \operatorname{cosec}. 1^\circ + \cot. 1^\circ = \sec. 89^\circ + \operatorname{tg}. 89^\circ$. Rationem hanc Keplerus paucis explicat verbis Fabricio in literis (d. d. 11. Oct. 1605), quas præmisimus p. 106.

87) p. 336. Capite 42 (p. 333) inventa est eccentricitas orbis Martis = 0,1414 assumpto radio terreni orbis = 1, illaque reducta ad radium orbis Martis = 1, proditur = 0,09264.

Fig. 140.



Jam in $\triangle \alpha \gamma x$ datis $\alpha \gamma = 0,09264$ et $x \gamma = 1$, nec non angulo $\alpha \gamma x = 9^\circ 37' 24''$ ($5^\circ 8' 19'' 4'' - 4^\circ 28' 41' 40''$), computatur aeq. optica ($\angle \alpha \gamma x$):

$$\sin. x = \sin. \alpha \cdot \alpha \gamma;$$

$$\angle x = 0^\circ 53' 13''$$

$$\angle \alpha = 9^\circ 37' 24''$$

$$\angle x \gamma \varepsilon = 10^\circ 30' 37'' \text{ (compl. } \angle \alpha \gamma x)$$

Deinde:

$$\alpha x = \frac{\alpha \gamma \cdot \sin. \alpha \gamma x}{\sin. \alpha \gamma}$$

Ut autem radius vector hic referatur ad radium orbis Terræ, in hoc calculo assumitur $\alpha \gamma = 0,1414$, quare

$$\alpha x = \frac{0,1414 \cdot \sin. 10^\circ 30' 37''}{\sin. 53' 13''} = 1,666.$$

Similiter in triangulis $\alpha \gamma \eta$ et $\alpha \gamma \delta$ procedit calculus.

Prius per eccentricitatem = 0,09264 et angulos $\eta \alpha \gamma = 36^\circ 42' 41''$ ($6^\circ 5' 24' 21'' - 4^\circ 28' 41' 40''$), $\delta \alpha \gamma = 104^\circ 24' 48''$ ($4^\circ 28' 41' 40'' - 1^\circ 14' 16' 52''$) aequatio computatur optica: $\sin. \alpha \eta \gamma = \sin. \eta \alpha \gamma \cdot \alpha \gamma$; $\alpha \eta \gamma = 3^\circ 10' 28''$;

Keplero prodit $3^\circ 10' 24''$. Sic $\sin. \alpha \delta \gamma = \sin. \delta \alpha \gamma \cdot \alpha \gamma$;

$$36. 42. 41. \quad \alpha \delta \gamma = 5^\circ 8' 52'' \text{ Kepl. } 5^\circ 8' 47''$$

$$\varepsilon \gamma \eta = 39. 53. 5. \quad 104. 24. 48.$$

$$\varepsilon \gamma \delta = 109. 33. 35.$$


$$\alpha \gamma \delta = 70. 26. 25.$$

Hinc et per $\alpha \gamma = 0,1414$ prodit

$$\alpha \eta = \frac{0,1414 \cdot \sin. 39^\circ 53' 5''}{\sin. 3^\circ 10' 24''} = 0,1638$$

$$\text{et } \alpha \delta = \frac{0,1414 \cdot \sin. 70^\circ 26' 25''}{\sin. 5^\circ 8' 47''} = 0,148539.$$

Fig. 141.



88) p. 346. Figuram, quæ ad hanc pertinet demonstrationem, separatam delineavimus, cum fig. 98 ob multitudinem linearum nimis intricatam præbebat speciem.

Quæ ad constructionem schematis hujus pertinent, cum Keplerus ipse satis luculenta ea exhibeat, non repetenda censemur.

Demonstratio autem hæc est: 1) Cum sit $\beta \gamma = \beta \alpha$, $\beta \varphi = \beta \tau = \alpha \tau$, et $\angle \gamma \beta \varphi = \beta \alpha \tau$, quia $\beta \varphi \parallel \alpha \tau$, ergo $\triangle \gamma \beta \varphi \cong \triangle \tau \beta \alpha$, quare $\gamma \varphi = \beta \tau$, $\gamma \varphi \parallel \beta \tau$ (constr.), ergo et $\gamma \beta = \alpha \tau$ et $\parallel \varphi \tau$, igitur etiam $\alpha \beta = \alpha \tau$ et $\parallel \varphi \tau$.

2) In $\triangle \triangle \beta \alpha \tau$ et

$\tau\varphi\chi$ est $\beta\alpha = \varphi\tau$, $\angle\beta\alpha\upsilon = \tau\varphi\chi$ (anguli oppositi in parallelogrammo $\omega\varphi$) et $\angle\upsilon = \chi$ (R.) ergo $\triangle\beta\alpha\upsilon \equiv \tau\varphi\chi$ et $\alpha\upsilon = \chi\varphi$, $\beta\upsilon = \chi\tau$.

3) $\triangle\tau\chi\beta \equiv \triangle\alpha\omega\xi$, cum sit $\tau\chi = \xi\omega$, $\beta\tau = \alpha\xi (= \alpha\tau)$ et $\angle\chi = \omega$ (R.), quare $\beta\chi = \alpha\omega$ et cum sit $\beta\xi = \upsilon\omega$, erit $\beta\chi - \beta\xi = \alpha\omega - \upsilon\omega$ sive $\xi\chi = \alpha\upsilon = \chi\varphi$ (N. 2), $\xi\chi + \varphi\chi = \xi\varphi = 2\alpha\upsilon$.

4) Cum sit $\beta\varphi$ radius circuli $\varphi\tau$ circa β descripti (r) et $\tau\chi \perp \beta\varphi$; erit $\chi\tau^2 = \varphi\chi$ ($2r - \varphi\chi$) = $2r\varphi\chi - \varphi\chi^2$. $\angle\varphi\chi\tau = R$, ergo $\chi\varphi^2 + \chi\tau^2 = \varphi\tau^2 = \alpha\beta^2$ (N. 1); hinc $\alpha\beta^2 = 2r\varphi\chi = r\xi\varphi = \beta\varphi(\beta\varphi - \beta\xi) = \beta\varphi^2 - \beta\varphi \cdot \beta\xi = \beta\varphi \cdot \xi\varphi$.

Assumptis $\beta\varphi$ et $\beta\xi$ semiaxibus ellipseos $\lambda\pi\delta\xi$ (fig. 98), quam tangit circulus $\lambda\vartheta\delta\varphi$, erit circulus ad ellipsin vel C : E = $\beta\varphi^2 : \beta\varphi \cdot \beta\xi$

$$C - E : C = \beta\varphi^2 - \beta\varphi \cdot \beta\xi : \beta\varphi^2 = \alpha\beta^2 : \beta\varphi^2$$

= circ. radio $\alpha\beta$: circ. rad. $\beta\varphi$ descriptum (C).

C - E = 2 lunulis $\lambda\vartheta\delta D$, ergo 2 lunulae $\lambda\vartheta\delta D$ aequant circulum, cujus radius $\alpha\beta$, sive, cum $\beta\xi$ non est brevior semidiameter ellipseos, sed insensibili ab ea differt, superat circulus radio $\alpha\beta$ descriptus insensibili lunulam utramque resectam.

89) p. 347. Quia, si junxeris puncta ξ et τ , triangulum $\xi\varphi\tau$ simile $\triangle\beta\varphi\tau$, erit $\beta\varphi : \varphi\tau = \varphi\tau : \xi\varphi$ et hinc $\beta\varphi : \xi\varphi = \beta\varphi^2 : \varphi\tau^2$

$$\beta\varphi = 1, \varphi\tau = \alpha\beta = 0,09264; \text{ ergo } \xi\varphi = 0,09264^2 = 0,00858.$$

Sit circulus, cujus radius $\beta\varphi$ est, = C, circulus, cujus radius $\alpha\beta$, = c,

$$\text{erit } C : c = \beta\varphi^2 : \alpha\beta^2 = \beta\varphi : \xi\varphi \text{ (not. 88. a.)}$$

$$\text{quare } c = 0,00858 \times 3,14159$$

$$= 0,02695$$

$$C = 3,14159$$

$$C - c = \text{plan. ooidis} = 3,11464$$

90) p. 349. Sit $\angle\vartheta\alpha\delta = 95^\circ 18' 28''$, quare, quia 360° valet aream 3,1416,

$$\text{valebit area } \vartheta\alpha\delta = \frac{95,3077 \times 3,1416}{360} = 0,83172$$

$$\triangle\vartheta\beta\alpha = \frac{1}{2} \alpha\beta \cdot \vartheta\beta = 0,04632 \times \sin. \vartheta\beta\vartheta.$$

Assumatur arcus $\delta\beta$, quare $\angle\delta\beta\vartheta = 90^\circ$, erit $\triangle\vartheta\beta\alpha = 0,04632$.

$$\text{Area } \vartheta\beta\delta = \frac{1}{2} \cdot 3,1416 = 0,7854$$

$$\text{Area } \vartheta\alpha\delta = \vartheta\beta\alpha + \vartheta\beta\delta = 0,83172 \text{ ut supra.}$$

91) p. 368. In triangulo sphaerico rectangulo dantur hypotenusa = $50^\circ 34'$ (distantia ζ a Spica) et altera cathetarum = $1^\circ 59'$ (latit. Spicae), reliquae cosinus erit

$$\begin{aligned} & \cos. 50^\circ 34' \\ &= \cos. 1^\circ 59' = \cos. 50^\circ 32' 18'' \text{ (eclipticae arcus).} \end{aligned}$$

$$\text{Long. Spicae } 6^\circ 18' 11''$$

$$\text{locus } \zeta \text{ in } 8^\circ 43' 18'' \times$$

addendum pro refractione 3' 36" (medium arithmeticum inter 2' 39" et 4' 34" refractiones longitudinis)

$$\text{prodit } 8^\circ 46' 54'' \times \text{anno 1594.}$$

$$\text{reponetur in } 8^\circ 46' 20'' \times$$

$$\text{locus Solis in } 16^\circ 47' (10)'' \times$$

$$\angle OBM = 38^\circ 0' 40'', OM = 1,54168, OB = 0,98232.$$

$$\text{ergo } \sin. OMB = \frac{\sin. 38^\circ 0' 40'' \cdot 0,98232}{1,54168} = \sin. 23^\circ 6' 11''$$

$$BM \text{ vergit in } 8^\circ 8' 46' 20''$$

$$\text{ergo } OM \text{ in } 7^\circ 15' 40' 9''$$

Anno 1589: locus ζ M in $6^\circ 27' 7' 26''$

$$\odot O \text{ in } 7. 25. 48. 40.$$

$$\angle AMO = 28. 41. 14. - \sin. MAO = \frac{\sin. 28^\circ 41' 14'' \cdot 1,901 \times 1,01365}{1,542}$$

$$OM = 1,542$$

$$OA = 1,01365$$

$$MAO = 18^\circ 23' 39''$$

$$AM \text{ vergit in } 6^\circ 27. 7. 26.$$

$$\text{ergo } OM \text{ in } 7. 15. 31. 5.$$

$$\text{Supra inventa est } OM \text{ in } 7. 15. 40. 9.$$

$$\text{Diff. } 9' 4''.$$

92) p. 374. Dantur in $\triangle DAK$, GAK , FAK et EAK latera KA , nec non latera DA , GA , FA et EA ; anguli ad D , G , F et E puncta sic computantur:

Anno 1589 locus \odot K in $10^{\circ} 15' 25'' 53''$ \odot A in $8. 21. 44. 56$	sin. DKA = $\frac{\sin. 53^{\circ} 40' 57'' \cdot 0,96248}{1,39212}$;
$\angle ADK = 53. 40. 57$	$\angle DKA = 34^{\circ} 39' 23''$
Anno 1591 locus \odot in $10. 1. 27. 18$ \odot in $7. 2. 39. 15$	sin. GKA = $\frac{\sin. 86^{\circ} 48' 3'' \cdot 0,99142}{1,39038}$;
$\angle AGK = 88. 48. 3$	$\angle GKA = 45^{\circ} 28' 25''$
Anno 1593 locus \odot in $11. 8. 53. 51$ \odot in $5. 25. 41$	sin. FKA = $\frac{\sin. 16^{\circ} 47' 9'' \cdot 1,00244}{1,39258}$;
$\angle AFK = 163. 12. 51$ compl. $16. 47. 9$	$\angle FKA = 12^{\circ} 0' 4''$
Anno 1595 locus \odot in $1. 4. 11. 10$ \odot in $4. 7. 59. 52$	sin. EKA = $\frac{\sin. 86^{\circ} 11' 18'' \cdot 1,01467}{1,39045}$;
$\angle AEK = 93. 48. 42$ compl. $86. 11. 18$	$\angle EKA = 46^{\circ} 44' 30''$
DK in $10^{\circ} 15' 25'' 53''$	GK in $10^{\circ} 1' 27' 18''$
$\angle DKA = 34. 39. 23$	$\angle GKA = 45. 28. 25$
AK in $11^{\circ} 20. 5. 16$	AK in $11. 16. 55. 43$
FK in $11^{\circ} 8. 53. 51$	EK in $1^{\circ} 4. 11. 10 (+ 12^{\circ})$
$\angle FKA = 12. 0. 4$	$\angle EKA = 46. 44. 30$
AK in $11. 20. 53. 55$	AK in $11. 17. 26. 40$

93) p. 379. Ratio, qua Keplerus procedit ad computandas distantias $\alpha\beta$, $\alpha\eta$, haec est:
D. 24. Nov. 1582.

Sol ($\beta\alpha$) in $8^{\circ} 11' 40'' 40''$ \odot ($\beta\beta$) in $3. 26. 38. 30$	D. 26. Decembris. $\beta\alpha$ in $9^{\circ} 15' 4' 12''$ $\beta\beta$ in $3. 17. 40. 30$
$\alpha\beta\beta = 135. 2. 10$	$\alpha\beta\beta = 177. 23. 42$
$\alpha\beta$ in $2. 11. 40. 40$	$\alpha\beta$ in $3^{\circ} 15. 4. 12$
$\alpha\beta$ in $3. 0. 42. 42$	$\alpha\beta$ in $3. 16. 6. 23$
$\beta\alpha\beta = 19. 2. 2$	$\beta\alpha\beta = 1. 2. 11$
$\beta\beta\alpha = 25. 55. 48$	$\beta\beta\alpha = 1. 34. 7$
$\alpha\beta = \frac{0,98345 \times \sin. 135^{\circ} 2' 10''}{\sin. 25^{\circ} 55' 48''}$ $= 1,58931.$	$\alpha\beta = \frac{0,98226 \cdot \sin. 2^{\circ} 36' 18''}{\sin. 1^{\circ} 34' 7''}$ $= 1,63089.$
D. 30. Decembr. $\gamma\alpha$ in $9^{\circ} 19' 8' 31''$ $\gamma\eta$ in $15. 16. 0. 30$	D. 26. Januarii 1585. $\gamma\alpha$ in $10^{\circ} 16' 33' 20''$ $\gamma\eta$ in $15. 8. 20. 30$
$\alpha\gamma\eta = 176. 51. 59$	$\alpha\gamma\eta = 141. 47. 10$
$\alpha\gamma$ in $3. 19. 8. 31$	$\alpha\gamma$ in $4. 16. 33. 20$
$\alpha\eta$ in $3. 17. 56. 45$	$\alpha\eta$ in $4. 0. 9. 30$
$\gamma\alpha\eta = 1. 11. 46$	$\gamma\alpha\eta = 16. 23. 50$
$\gamma\eta\alpha = 1. 56. 15$	$\gamma\eta\alpha = 21. 49$
$\alpha\eta = \frac{0,98252 \cdot \sin. 176^{\circ} 51' 59''}{\sin. 1^{\circ} 56' 15''}$ $= 1,58859.$	$\alpha\eta = \frac{0,98624 \cdot \sin. 38^{\circ} 12' 50''}{\sin. 21^{\circ} 49'}$ $= 1,64161.$

Keplero prodeunt: $\alpha\beta = 1,58920$ et $1,63062$; $\alpha\eta = 1,58842$ et $1,64116$.

Deinde comparans longitudes linearum $\alpha\beta$ et $\alpha\eta$, quas „per latitudinem“ praefecerat, sic pergit Keplerus:

$1,63147 - 1,58907 = 0,04240$; $3,22054 + 0,00336 = 3,22390$,
 $1,63147 + 1,58907 = 3,22054$; $3,22054 - 0,00336 = 3,21718$, et horum
dimidia $\alpha\beta = 1,60859$, $\alpha\eta = 1,61195$. Qua ratione $\alpha\eta = 1,61363$ hinc prodire possit,
non intelligimus.

94) p. 382. De tabula, quam in superioribus proposuit Keplerus, haec dedit P. Cragero: Quod locum Martialium p. 263 attinet, accidit praeterea, ut computarem loca Martis accuratius, aliqua et Maginus in Supplemento (Ephemeridum 1615) emendatus f

res circa minima versatur, quae non sunt cura digna.

$$NK^2 = (1 + e \cos. x)^2 \left(1 + \frac{e^2 \sin.^2 x}{(1 + e \cos. x)^2}\right) \\ = (1 + e \cos. x)^2 + e^2 \sin.^2 x \\ = 1 + 2e \cos. x + e^2$$

Cum sit in $\triangle HNE$ ad H rectangulo $HE = 1$, erit $NH (= e) = \sin. NEH = \sin. e$, quare $NK^2 = 1 + 2 \sin. e \cos. x + \sin.^2 e$. — Quae sequuntur relegas apud Delambrium l. c.

98) p. 404. Theorematum, quae praemissa sunt demonstrationi ellipticae viae Martis, inscriptorum „protheoremata“ priora I—XI. haec sunt, loco verborum, quibus Keplerus utitur, literis expressa. Reliqua (XII—XV) cum hac ratione exprimi nequeant, relegantur in textu. Sint R, r , semidiametri ellipseos; C, E areae circuli eique inscriptae ellipseos; y et z ordinatae respondentes circuli et ellipseos; A, a , areae sectorum circuli et ellipseos, KNA et MNA (fig. 118)

erit I.

$$r : R = z : y$$

II.

$$E : C = z : y$$

III.

$$a : A = z : y$$

IV. Peripheria circuli in aequales arcus divisa et a divisionum punctis ordinatis in maiorem ellipseos diametrum ductis, arcus ellipseos his ordinatis inclusi sunt inaequales etc.

V. Peripheria ellipseos = $\pi (R + r)$ „proxime“.

VI. $y^2 - z^2 : R^2 - r^2 = y^2 : R^2$.

VII. Si $BN = R$, erit $HN^2 = R^2 - r^2$.

VIII. Ductis a puncto N diametri AC lineis quibuscunque (n) ad peripheriam circuli ($a, a', a'' \dots$) erit $(a + a' + a'' \dots) > nR$ etc. vide textum. Conclusio: area circuli non est apta ad mensuram summae distantiarum suae circumferentiae.

IX. Si sumantur distantiae diametrales pro circumferentialibus, tunc summa aequat summam earum, quae ex centro ducuntur.

X. Hoc theorema similia continet de arcibus ellipseos, quae N. IV. et VIII. de arcibus circuli dicta sunt.

XI. Demonstratio:

$$KN^2 = KL^2 + LN^2 \\ MN^2 = ML^2 + LN^2$$

$$KN^2 - MN^2 = KL^2 - ML^2 = y^2 - z^2$$

$$y^2 - z^2 : R^2 - r^2 = y^2 : R^2 \text{ (N. VI), ergo}$$

$$KN^2 - MN^2 : R^2 - r^2 = y^2 : R^2$$

$y = \sin. \text{arc. } KA$; $\delta x = \sin. \text{arc. } \delta y$ (schem. 111), similis arcui KA , $\beta y (= NH)$ semidiameter epicycli $\delta y \delta$, ergo

$$y : R = \delta x : \beta y \text{ et}$$

$$y^2 : R^2 = \delta x^2 : \beta y^2 = KN^2 - MN^2 : R^2 - r^2. \text{ Quare}$$

$$KN^2 - MN^2 : R^2 - r^2 = \delta x^2 : HN^2.$$

$$HN^2 = R^2 - r^2 \text{ (N. VII), ergo } KN^2 - MN^2 = \delta x^2$$

$$KN = \delta \alpha \quad \delta \alpha^2 - MN^2 = \delta x^2$$

$$\delta \alpha^2 - \delta x^2 = \alpha x^2 \quad MN^2 = \alpha x^2$$

$$MN = \alpha x \text{ q. e. d.}$$

99) p. 404. In Epit. Astr. Cop. haec leguntur: Triangula singula justissime sunt in proportionem mensurae singulorum suorum arcuum. Demonstratio hujus plenariae aequipollentiae traditur in Comm. Martis Cap. LIX. fol. 291 (404), cujus folii linea „psis longiorem“ (his verbis incipit linea, in qua vox „erit“ est, in originali editione) unica vocula erit magnam obscuritatem induxit. Quam si mutaveris in computaretur, omnia erunt planiora. Quanquam fateor, obscuritas ibi traditam plusque operae natum ex eo, quod distantiae ibi non ut triangula consideratae sunt, sed ut numeri et lineae.

• 100) p. 408. Dato arcu AK , et radio $KH = 1$, deprehendimus aream $KAH = \frac{1}{2} AK$. $\triangle \triangle NHE$ et NHK basin HN communem habent, quare $\triangle NHE : \triangle NHK = EH : KL = 1 : \sin. KA$. $\triangle ENH = \frac{1}{2} NH \cdot EH = \frac{1}{2} \text{eccentr.}$, quare $\triangle NHK (= \triangle NHE \times \sin. KA) = \frac{1}{2} \text{ecc.} \times \sin. KA$. Area $KNA = \triangle KNH + \text{ar. } KHA = \frac{1}{2} \text{ecc.} \times \sin. KA + \frac{1}{2} \text{ecc.}$

101) p. 408. $NM = 1 + LH \times NH = 1 + \text{ecc.} \times \cos. KA$; $LN = NH + LH = \text{ecc.} + \cos. KA$; $\frac{NL}{MN} = \cos. MNL$, quare $\cos. MNL = \frac{\text{ecc.} + \cos. KA}{1 + \text{ecc.} \times \cos. KA}$.

(Comp. ann. 100.)

102) p. 410. In $\triangle VHD$ (Fig. 120) sit $\angle V = 90^\circ$, $\angle VHD = 45^\circ$, $HD = 1$. Cum sit (Fig. 118) $EH : KL = EB : KM$, et $EB = 0,00432$, $KL = DV$ (Fig. 120) = $\sin. 45^\circ$, erit $FD (KM) = 0,00432 \times \sin. 45^\circ$.

$$VF = VD - FD = \sin. 45^\circ (1 - 0,00432)$$

$$= 0,99568 \cdot \sin. 45^\circ$$

$$\frac{VF}{VH} = \text{tg. VHF} = \frac{0,99568 \times \sin. 45^\circ}{\cos. 45^\circ} = 0,99568 = \text{tg. } 44^\circ 52' 19''.$$

Deducentes quaesitum ex formula annot. 101, calculus sic se habet:

Cum sit (Fig. 118) $\cos. MNL = \frac{e + \cos. KA}{1 + e \times \cos. KA}$, prodit

$$\cos. MNL + \cos. MNL \times e \times \cos. KA = e + \cos. KA, \text{ et inde}$$

$$\cos. KA = \frac{e - \cos. MNL}{\cos. MNL \times e - 1} = \frac{\cos. MNL - e}{1 - e \cdot \cos. MNL}.$$

103) p. 410. Ratio calculi Kepleri ad haec redit: Sit eccentricitas $NH = e$, $\angle LNM$, „anom. conequata vera“, = a , $HK = 1$. Deinde, cum sit NM major radio quantitate incognita, signetur NM per $1 + x$; sic linea LH per y , eritque

$$x : y = e : 1, \text{ quare}$$

$$L \quad y = \frac{x}{e}.$$

$$\frac{LN}{MN} = \cos. a; LN = e + y; MN = 1 + x. \text{ ergo}$$

$$\frac{e + y}{1 + x} = \cos. a, \text{ et inde}$$

$$II. \quad y = (1 + x) \cos. a - e.$$

$$Hinc III. \quad \frac{x}{e} = (1 + x) \cos. a - e.$$

$$x = \frac{e (\cos. a - e)}{1 - e \cdot \cos. a} \left(= \frac{\cos. a - e}{1 - \cos. a} \right)$$

Numeri, quibus utitur Keplerus absolvens hunc calculum, sunt: $e = 0,09265$, $\angle a = 30^\circ$, qui applicati ad formulam (III) exhibent

$$\begin{aligned} x &= \frac{0,09265 (0,86603 - 0,09265)}{1 - 0,09265 \times 0,86603} \left(= \frac{0,86603 - 0,09265}{1 - 0,09265 \times 0,86603} \right) \\ &= \frac{0,09265 \times 0,77338}{1 - 0,0802376} \left(= \frac{0,77338}{10,7933 - 0,86603} \right) \\ &= \frac{0,0716536}{0,9197624} \left(= \frac{0,77338}{9,92727} \right) \\ &= 0,077905 \quad (= 0,077905). \end{aligned}$$

Quae cancellis inclusa addidimus, numeri sunt Kepleri, hoc discrimine, ut denominator fractionis penultimae habeat $10,7932 - 0,86603 = 9,92717$, et pro quotiente $0,077905$ quotientem $0,07744$ falsum.

Jam, cum assumtus sit initio radius vector $MN = 1 + x$, quantitas hujus prodit = $1,077905$ (K: $1,07744$).

$$\text{Denique } LH = \frac{x}{e} = \frac{0,077905}{0,09265} = 0,84085 \text{ (K. } 0,83583), \text{ et cum sit } \triangle KHL \text{ ad L}$$

rectangulum, $KH = 1$, erit $\cos. KHL = \cos. \text{arc. KA} = 0,84085 = \cos. 32^\circ 46'$, h. e. anomalia eccentrici = $32^\circ 46'$, quae, adhibita quantitate lineae LH , a Keplero deprehensa ($0,83583$) prodit = $33^\circ 18'$, eadem, quam accipimus subtractis Keplerianis $56^\circ 42'$ a 90° ; unde ipsi prodierint $33^\circ 46'$, conjectando tantum concludimus, justam habuisse in manu scripto quantitatem arcus AK , et immixto posthac errore calculi repetiti, erroneos retinuisse gradus 33 et justa minuta 46 .

Vol. XIV. Mss. Petrop. deprehendimus fragmentum literarum Kepleri, quod quum ex parte quidem hac pertineat, superioribus adjungendum censuimus. . . . Jam aliquid ex astronomia mea. Sunt enim cap. LIX. et LX. crebra vitia in literis, nec omnia in vestro exemplari correctae. Tres mihi sunt anomaliae; media, per tempus data, quam numero in area AKN ; eccentrici, quae est improprie vel area circuli AKH , vel arcus AK , vel angulus AHK , vel denique proprie arcus ellipsos AM . Co-

aequata vero MNA angulus. Data media AKN non habeo modum inveniendi eccentrici anomaliam AK aliter quam per falsi. Pono enim arcum AK et ejus sinum KL, multiplico in valorem areae maximae EHN; qui est 19110 secunda [prodit hic valor ex multiplicatione EH in dimidiam HN eccentricitatem, et comparatione facta ad aream circuli, quam pono valere technice 360°]. Hoc pacto mihi prodit area KHN in scrupulis secundis, quae addo ad positum arcum AK, seu aream AHK [quia eadem jam est mensura] ut prodatur AKN: quae si aequat datam anomaliam mediam, tunc bene posui AK. Tabulis constructis, ut quidem ego jam construxi, jam nulla est amplius in hac positione difficultas. Statim enim excerpitur. Sed ego jam versor in traditione modi computandi aequationem unicam aliquam. Dato arcu AK et LH, cui addo HN eccentricitatem, prodit LN. Ducta KH ejusque perpendiculari NT, erit KT mensura distantiae M planetae ab N Sole. Nam KT et MN sunt aequales. Hoc in Commentariis dixi quidem, sed in hoc schemate cap. LIX. et LX non explicavi.

Jam igitur habetur MN, NL et L rectus, datur igitur MNL anom. coaequata.

Haec ideo jam, quia recolligo memoria, fuisse mihi controversiam tecum, primo quod putabas, incongrue a me dictum, aream AKN metiri distantias, quae sunt lineae, deinde, quia magis tibi arrisit ratio Fabricii. Sed de primo prius. Demonstratum habeo, distantias duas punctorum oppositorum MN, NY junctas aequare diametrum KL. Secto igitur circulo AK in partes aequales quotcunque, constituentur totidem sectores, qui implent circulum. Nec major nec minor est area circuli omnibus suis sectoribus. Atqui MN, NY et reliquae distantiae aequant KT, TL id est KH, HL, duos sectores, et sic sunt distantiae totidem, quot sectores aequales cum illis [in summa] longitudine, quam longitudinem verbotenus patimur habere latitudinem sectorum, re ipsa nullam: quippe etiam in infinita diviso circulo vera etiamnum est affirmatio: ergo area circuli metitur ellipseos punctorum M, Y etc. distantias eam latitudinem habentes, quam sectores. Hunc modum ideo retineo, quia in effectu est optimus. Nam si diviso circulo in 360 computem totidem lineas, res eodem recidit, quia facilis computatu, et quia, quod caput est, physicas causas exprimit. Cum enim in aequalibus arcubus morae sint ut distantiae, area metiens hoc pacto distantias metitur et moras junctas. Distantias autem per se singulas computandi et colligendi in summas labor est immensus.

Jam ad Fabricianam viam. Is educta HD (schema deest), quae sit ipsi KM aequalis, retinet AK circulum, librato centro ex H in D. Tunc erecta ND nova linea apsidum libratili dicit MDF esse mediam anomaliam. Quia enim paralleli sunt KH, MD, sic et HA, DG, angulum GDF, i. e. HND facit aequalem valori areae KHN. Id prope verum est ex hac causa: semper HN est parva, triangulum igitur KHN non multo superat sectorem, cujus angulus HKN, radius HK, inferius minus paulo est. Et areae sectorum sunt ut anguli eorum. Ergo angulus HKN fere metitur aream HKN. Jam HND angulus est fere aequalis angulo HKN. Quippe demonstratum habeo, ut EH ad HN, sic HN esse ad EB. Ut vero HN ad NT, sic EB ad KM, i. e. HD. Quippe ut HN ad NT, sic HK ad KL, ut vero HK, i. e. HE ad KL, sic EB ad KM. Ut igitur HN ad NT, sic EB ad KM, i. e. HD. Quodsi ergo KT esset aequalis ipsi KH, tunc TKN et HND essent simpliciter aequales. Paulo igitur major est HND quam TKN. Atqui etiam paulo major est area HKN in valore suo, quam angulus HKN. Ergo credibile est, plane aequales esse angulum HND vel GDF et valorem trianguli HKN. Quodsi aequales, tunc utrique et mihi et Fabricio per eandem anomaliam mediam prodit eadem anomalia eccentrici, mihi quidem AK impropria, ipsi vero GM: quippe aequales ponuntur MDF et valor areae AKN, aequalia vero et GDF et valor areae KHN, relinquuntur igitur aequalia GDM et valor areae AHD, i. e. angulus AHD.

Verum vide, quibus difficultatibus bonus vir confictetur, quippe cum posset per eccentricitatem HN, i. e. DX computare DMX et postea addere XMN, ut habeat DMN, sicut ego alia aliqua forma calculi interdum computo KNA anomaliam fictitiam coaequatam, postea KNM, eaque ablata habeo MNA vere coaequa-

Liberat se ab incertitudine prima propter insensibilem errorem. Ducit enim sinum FM in eccentricitatem pro habenda HD, cum ego sinu GM, i. e. AK constitutam KM, non aperte sed per KT, i. e. per NZ in NM transpositam. (nil sequitur)

Quia vero iter planetarum non est circulus AKC, sed ellipsis CMA, pro anomalia „fictitia“ AKN, datur area AMN = sect. AMH + \triangle MHN = sect. AMH + $\frac{1}{2}$ e sin. MHA, et reliqua sequuntur eadem ratione ut supra, ita ut hic quoque, ut in circulo, aequatio prodeat, in qua duo, scilicet arcus et sinus anguli ad centrum, quaeruntur et data area sectoris AMN et eccentricitate NH, quod problema solvi non potest, „quia proportionibus inter arcus et eorum sinus infinitae sunt numero.“ Solutio appropinquans per series infinitas diversimode proposita est, quam si cognoscere cupias, quodcumque astronomiae compendium sive librum continentem theorematum altioris mathematicae, sive historiam ejusdem adeas.

$\sin. BCA = \frac{\sin. EBC \cdot AB}{AC};$	$\angle BCA = 4^{\circ} 23' 8''$	Nodus in $1^{\circ} 16' 43' (+12s)$
	$\angle ABC = 173. 57. 30$	Mars in $11. 12. 16$
	$\angle BAC = 1^{\circ} 39' 22''$	Restat $64^{\circ} 27'$

108) p. 423. Mars in $2^{\circ} 40' 48''$ ☿ existens, distat a nodo per $13^{\circ} 16' 43''$ — $11^{\circ} 2^{\circ} 40' 48'' = 74^{\circ} 2'$. Cap. LXII. „inclinatio limitum“ inventa est $= 1^{\circ} 50' 25''$, quare datis in triangulo sphaerico rectangulo altero latere ad rectum et angulo ad hoc latus, non latebit latus huic angulo oppositum:

Jam (Fig. 122) quia $\triangle AKE$ vergit in $11^{\circ} 2^{\circ} 41' 18''$
 $\triangle AKE$ " " $10. 27. 37. 49$
 erit $\triangle EAK$ = $5. 3. 29$
 Sic, quia $\triangle EKE$ vergit in $11. 16. 3$
 $\triangle EAE$ " " $4. 27. 37. 49$
 erit $\triangle KEA$ = $18^{\circ} 25'$

lat. visa = $6^{\circ} 21' 9''$ (K. $14''$).

Jam, datis in $\triangle CAL$ lateribus $AC = 1,01077$, $AL = 1,38261$, et angulo CAL , computatur angulus LCA .

$$\begin{array}{ll}
\frac{1}{2}(C + L) = 87^{\circ} 19' 16''; & \frac{1}{2}(C - L) = 73^{\circ} 14' 22'' \\
AL - AC = 0,37184; & 87. 19. 16 \\
AL + AC = 2,39338; & \hline
& \angle LCA = 160^{\circ} 33' \\
& 180. \\
& \hline
& \text{Compl.} = 19^{\circ} 27'
\end{array}$$

Hinc ut supra: $\sin. \text{lat. visae} = \frac{\sin. 1^{\circ} 46' 10'' \times \sin. 19^{\circ} 27'}{\sin. 5^{\circ} 21' 28''}$; $\text{lat. visa} = 6^{\circ} 19' 10'' \text{ e.}$

107) p. 430 Redit Keplerus ad hanc speculationem in Epit. Astr. Cop. Libro VII, rem quidem aliquantum accuratius inspiciens, neque vero plane scopum attingens, illo quoque tempore, quo librum hunc conscripsit (anno 1621), accuratioribus observationibus destitutus, quanquam tum theoriā suā ad ceteros applicaverat planetas. Haec ibi addit: „Comparet lector ea, quae in Comment. Martis Cap. LXVIII. de situ circellorum horum disputavi; quamque inveniet differentiam, rei ipsius difficultati et penuriae observationum opportunarum tribuat.“

In literis ad Fabricium item de his agit hunc in modum: Motus Solis ab Arietis principio inaequalis, stellarum ab Arietis principio inaequalis, Solis a stellis aequalis. Ergo Arietis principium inaequaliter mobile est, causa utriusque inaequalitatis praemissae. Fixae igitur quiescunt, capita Arietis et Librae ad motum polorum transponuntur sub fixis. Omnino sic cogitandum, motus omnium planetarum tradi posse sine aequatore. Et ego id observarem, si mihi aliquis esset in astronomia instituendus. Perceptis illis, jam denique ultimo omnium traderem doctrinam primi mobilis, ostendens, quomodo poli Terrae axisque inclinentur ad polos eclipticae. Super qua re inspicere schema hoc (N. 131) ex meis in Martem Commentariis, ubi plura videbis, quam hic quaevisisti. A polus eclipticae mediae, seu $\gamma\gamma$ $\delta\delta$ $\epsilon\epsilon$ $\zeta\zeta$ corporis Solaris. Hoc punctum est solum immobile. In circulo E et opposito partibus oppositis circumeunt poli aequatoris, facientes corollas, quarum quaelibet aequat amplitudinem orbis annui, neque tamen in comparatione ad sphaeram fixarum aequant unius minuti latitudinem. AE est $23^{\circ} 42'$ in Prutenicia. In circello I circumit polus orbitae Telluris, seu eclipticae verae, unde fit, ut mutantur stellarum latitudines et declinatio eclipticae ab aequatore. In circello H circumit polus orbitae Martis sub fixis.

Fixarum motum salvari per motum polorum aequatoris, absurdum non est, nec nihil manet stabile in toto universo, cum maximum omnium corporum, sphaera fixarum visibilis, plane quiescat. De aliqua vero sphaera altiore, in qua aequator et poli, nihil constat oculis. Et hac etiam data, quid, quaeso, in ea tibi et Ptolemaeo quiescit, nisi 2 puncta, h. e. nihil? Falleris autem, dum existimas, aliam et aliam fore poli elevationem eodem loco Terrae, si poli aequatoris moveantur. Nam nihil aliud sunt poli aequatoris, quam poli Terrae, cum aequator sit maximus circulus Telluris. Qui vero urbibus variare velit poli elevationes, ei necesse esset, Terram in aliis et aliis sui punctis quasi in torno suspendere. Et haec erat olim mea vana speculatio, olim Tellurem circa illud punctum convolutam, in quo esse perhibetur polus magneticus hodie. Manente igitur eodem puncto, circa quod Tellus convertitur, manet eadem omnibus locis poli elevatio.

Falsam esse hodierni anni quantitatem ex Copernico, legere potes in Progymnasmatis Tychonis; at non ideo falsae sunt omnes hypotheseos partes. In praesenti schemate non est expressa Copernici tota hypothesis, deest ejus intorta corolla, quam ego ex parte transtuli in societatem circellorum E et F; pars ejus altera hic deest. Contra corollae hic expressae desunt in Copernico, sed subintelliguntur sub ratione puncti seu circuli E nudi, propter exiguitatem sui. Et ego per hoc schema aliquam quidem inaequalitatem anni tropici demonstro (seu potius praecessionis aequinoctiorum), non vero tantam vel talem, quanta qualisque apparet ex comparatione saeculi Ptolemaici cum ceteris.

De abstrahendo motu praecessionis, competente tempore inter 2 aeronychia, judica ex iis, quae supra dixi. Omnino abstrahendus est ab angulis, si subtilitatem omnem velimus consecrari. Ego, ne totam praecessionem cogar toties abstrahere, soleo observationes posteriores ad primam reducere, tantum abstrahens ab eorum

longitudinis motu, quantum tempus interlapsum largitur de motu praecessionis. — Deumque haec e litteris Kepleri d. 10. Nov. 1606, in quibus ad quaestiones d. 12. Oct. propositas a Fabricio respondit. Quaestiones autem hae sunt: 1) Anni quantitas hoc tempore multum variat a veritate. Copernici tabulae dant $5^h 55'$, at Tycho $5^h 48\frac{1}{2}'$ supra 365 dies. Cupio scire, an praecessio aequinoctiorum non alia, quam Copernici ratione, salvari possit, ut poli mundi immobiles maneant? 2) De eccentricitate Solis mutabili nonnulli dubitare videntur, nec observationibus veterum non nimium fidendum multa indicant. Tuam sententiam scire cupio &c. (Similem prius conceperat sententiam Keplerus, quam in litteris ad Herwartum proponit. v. annot. p. 448)

106) p. 432. Arzachel, Arabs, celebrer astronomus in Hispania c. a. 1080. W. Snellius (Observ. Hassiacae &c.) hunc astronomum laudibus effert in appendice, quam addit observationibus a se collectis; in disquisitione erudita de eclipticae obliquitate comparat observationes veterum cum recentioribus. „Hipparchus, inquit, et eum secutus Ptolemaeus, tres Solis epochas delegerunt, e quibus per angulos motus apparentis observatos et per peripherias mediorum motuum ex intervallo temporum derivatas locum apogaei et eccentricitatem eruerent.“ Jam, inquisitis rationibus, quas hi astronomi secuti sunt, solstitionum observationes lubricas esse affirmat, nec calculo pervestigabiles, nisi antea locus apogaei sit definitus. Deinde concludit: „hinc adeo planum fit in locis apogaei consignandis, quam lubrico in loco pedem ponant, qui solstitionum epocham huc advocant. Senserunt hanc incertitudinem Alfonsini, ideo quod suae causae inserviret, apogaeum aliquot gradibus in anteriora protruserunt, cum potius retrahere debuissent. Verum eorum audaciam sequens aetas facile refutavit. Ptolemaeum excepit Albategnius, Hipparchaeam plane et Ptolemaicam viam ingressus, et apogaeum non defixum, quod Ptolemaeus existimabat, sed mobile docuit, et inde a Ptolemaei aetate ad suam annis 751 profecisse $16^{\circ} 43'$. Verum minus constans est haec ratio et in errorem proclivis, ut necessitas Arzakeli Hispano imposita sit, alia et tutiore via apogaei investigationem tentandi. Is namque assumtis tribus epochis, in quibus Sol motu diurno notabilem declinationis differentiam induceret, unde ipsius verus locus in ecliptica vel ad scrupulum cognosci posset, locum apogaei non paulo constantius et accuratius definivisse videtur: secutus eam epilogismi formulam, quam in Lunaris apogaei inquisitione Ptolemaeus adhibuit. Arzakel igitur hanc viam secutus apogaei locum in $17^{\circ} 50'$ II deprehendit, cum tamen ante annum 139. Albategnius eidem assignavisset $22^{\circ} 17'$ II, ut omnino intra duo secula $4^{\circ} 27'$ retroiisse oportuerit. Ego, quidem hic vitium Albategnii observationibus oblatum existimo. Certe tam praeclara fuit Arzakelis industria, ut suo seculo hominibus observandi certitudine palmam praeripuerit. Tam illustre testimonium ei perhibet doctissimus Aben Ezra in libro suo cui titulus: Initium Sapientiae; locus exstat in libris viri summi Josephi Scaligeri, quos de Temporum Emendatione inscripuit. *Est etiam* (inquit) *quidam ex illis, qui dicit diminutionem de quadrante, qui unicuique anno computit, esse partem centesimam sextam unius diei* (Albategnium intelligit Cap. 52), *quidam ex illis partem centesimam decimam. Aliqui constat, iuxta seculum nostrum esse partem centesimam tricesimam unam. Nitimur enim loco Solis* (id est aequinoctio) *qui erat tempore Elruphi: cui similem artificem nullum audivimus in epilogismo astrorum. Et ipse quidem ita docuit. Secutus est cum Abraham Elsarakeel* (puto quem vocant Arzakel) *cui nemo temporum suorum comparandus fuerit. Ipse investigavit locum Solis* (aequinoctium) *in seculo suo: qui quidem conveniebat tempori Elruphi.* Unde industrie et naviter omnia ab Arzakele curata liquet, cum Aben Ezra, quemadmodum ipse prodit, ante an. 472. ista scripserit, qui sunt anni post observationem Arzakelis duntaxat 71, ut tanto magis fidem diligentissimus autor mereatur, quanto ab ejus aetate propius abfuerit.

Cum Arzakel inter se et Albategnium tantam discrepantiam deprehendisset, et simul eccentricitatis decrementum observavisset, circellum effinxit, in cuius ambitu centrum eccentrici ita versaretur, ut id modo a Terris propius, modo abeaset longius, et simul ipsum apogaeum repedare posset. Ingeniosum equidem inventum, etiam nimium levi de causa videatur introductum. Quis enim nobis haec definire audeat, istorum motuum lege nondum deprehensa? et cum incertum sit, an omnino apogaeum unquam retrocedat. Difficilis quaestio inter Arzakelem et Albategnium controvertitur, neque est qui eam litem dirimat; nam in tanta caligine et tam alto scriptorum veterum nemo exstat, qui nobis facem ad veri investigationem alluceat. Unum mihi in mentem venit, nec, ut arbitror, omnino contemnendum. Cum Alphonsus, Castiliae Rex vere magnanimus, tabulas fatiscantes et periodorum numeros exorbitantes certis legibus coercere, et planetis suos motus restituere in animum induxisset, nullis pepercit sumptibus, ut undique viros doctos et in isto pulvere subactos convocaret, qui ad tam nobile institutum operas suas tanquam symbolas conferrent. Non possum hic a me ipso impetrare, ut credam, adeo ab omnibus observationibus nudos et imparatos ad rem tam arduam istos se accinxisse, ut ne Solis quidem motum et ejus apogaei locum observare

instituerint, nacti Principem profuse liberalem. Nam cedo, quae eos ratio impulisset apogaeum Ptolemaei tot gradus promovendi, ut motum apogaei cum affixarum motu pari velocitate cierent: hoc si tantum a Ptolemaei observationibus derivare satis credidissent. additis circiter 15° rem factam habuissent, ut apogaeum Solis in aera Alphonsi anno 1252. ex hac formula obtinere debuerit quasi 20 aut 21° II. Quod Arzakelis observatis fuerit consentaneum, cum is ante 180 circiter annos ejus locum in $17^\circ 50'$ assignavisset. Verum longissime hinc absunt, cum apogaeum eo tempore statuunt in $28^\circ 40'$ II. Quod dum faciunt, totum ex Albategnio haurisse videntur, qui stellas fixas 66 annis integro gradu in consequentia signorum suo aevo promoveri demonstrat. Isti apogaeo eundem motum attribuunt; hinc igitur, si secundum istam analogiam apogaei motum concludas et istum numerum ad locum ab Albategnio assignatum adjicias, plane assequeris eundem cum Alphonsinis limitem. Itaque secundum easdem leges apogaeum Ptolemaicum interpolaverunt. Ita Arzakele insuper habito in Albategnii sententiam toti concesserunt.

Quae Keplerus paulo supra (p. 431) affert de aequinoctio bis eodem die observata, ea in Optica pluribus inquirat. Comp. Vol. II. p. 219. De „motu trepidationis“ diximus Vol. I. p. 195.

109) p. 435. In Almagesto Ptolemaei has, quas Keplerus enumerat, observationes deprehendimus: 1) Lib. X. cap. 9: anno 13. secundum Dionysium Capricornionis 25. stella Martis matutina cernebatur boreali Scorpionis incumbere fronti, et est tempus observationis in anno 52. a morte Alexandri, h. e. annus 476. a Nabonassaro Athir (Octobr.) secundum Aegyptios die 20, sequente 21. in mane. 2) Lib. X. cap. 7: Tres cepimus observationes in Marte, quarum primam 15. anno Adriani observavimus Tybi (Decembris) secundum Aegyptios die 26, sequente 27. post mediam noctem una aequali hora, et erat in gradu Geminorum 21. Alteram anno Adriani 19. Pharmuthi (Martii) die 6, sequente 7. ante mediam noctem horis 3, et erat in gradibus Leonis 28. 50'. Tertiam anno Antonini 2. Epiphi (Junii) die 12. sequente 13. ante mediam noctem 2 aequalibus horis, et erat in gradibus Sagittarii 2. 34'.

In aera autem Aegyptiaca fuit mensis Tybi quintus, Pharmuti octavus, Epiphi undecimus ab anni initio, singuli 30 dierum, et annus Antonini secundus fuit quartus ab anno Adriano novemdecimo, quare intervallo sic colliguntur a Ptolemaeo:

I.	Anni 14 dies 146 horae 13
II.	„ 18 „ 216 „ 9
	„ 4 „ 69 „ 20
II.	„ 18 „ 216 „ 9
III.	„ 22 „ 312 „ 10
	„ 4 „ 96 „ 1.

Keplerus, momentum inquirens verae oppositionis, subtractis ab observatione I^a horis 8, a II^a horis 41. 21', a III^a h. 2. 6', illud prodit:

I.	Anni 14 dies 146 horae 5
II.	„ 18 „ 214 „ 15. 39'
III.	„ 22 „ 312 „ 7. 54,

unde intervallo temporum aliquantum a prioribus discrepantia producuntur: 4^{aa}. 68^d 10^h 39' et 4. 97. 16. 15.

FRAGMENTA STUDIORUM KEPLERI ASTRONOMICORUM.

**DESUMTA E MANUSCRIPTIS KEPLERI, QUAE PRIUS
PETROPOLI, JAM PULKOWAE CONSERVANTUR.**

PROOEMIUM

Passim in praemissis operum Kepleri voluminibus occurrit mentio operis, quod conscribendum sibi proposuit Keplerus inscribendumque censuit Hipparchum. Volumina I. et XV. Manuscriptorum Pulkowensium exhibent ea, quae per multos annos Keplerus in his studiis profecit, cum ad formam perducta eam, quae ad typum apta videtur, tum nondum plane perfecta et quasi limanda ad aptius tempus reservata, tum denique fragmenta tantum, parum inter se cohaerentia raptimque conscripta, ut in mentem venerant, adscripto die, quo conscripta sunt, velut signo ad revocandam posthac rei memoriam. Testimonium praebent haec fragmenta cum indefessae Kepleri industriae et summae diligentiae, tum peculiaris libros conscribendi rationis. Millies redit ad eandem rem, si primo impetu eam assequi non potuit, millies repetit numeros, donec ad exoptatum venit finem, quamquam, ut ipse saepius fatetur, conficiendi calculi numerici plurimum ipsi facescebant negotium, et Keplerus hic minus certum se praebuit, quam in philosophicis disquisitionibus, quo in doctrinae genere neminem habuit parem. Intacto antea tramite progressus, parum adjutus observationibus, quibus firmiter inniti posset, rem, quam in Marte feliciter aggressus est, absolvendam sibi proposuit in reliquis planetis, in Sole et in Luna, imitatus Ptolemaei Almagestum. Quantum, hunc spectans finem, insumserit laboris et temporis, quanta perseverantia rem toties tentatam iterum iterumque aggressus sit, non percussus erroribus, quos observationes minus fidae causabantur, quos ipse in calculis committebat, haec enarrant singula fere folia manuscriptorum, quae inspeximus, atque ex his potissimum ea, quae continent libros, quos sequentes exhibent paginae. Iidem vero Keplerum, ut diximus, in libris conficiendis occupatum quasi oculis adspiciendum praebent. Quorum operum priores cum inspexeris paginas, absoluta et plane ad finem perducta censebis; primum occurrit titulus, maxima conscriptus diligentia, ita ut variis coloribus depicti sint singuli versus; nil deest, nisi nomen typographi. Titulum sequitur dedicatio, quasi res sit plane absoluta (non quidem in Hipparcho, at in alio, item non plane ad calcem perducto libello, quem inscripsit: Transformatio hypotheseos et tabularum Lunarum &c); deinde adhuc firma manu scriptae exhibent sequentes paginae operis exordium, subdivisi in capita, theoremata, problemata, adscriptis rite numeris; sed paulo post magis magisque senescit studium, quae obscurant minus clarae, munditia deficit; paulatim deprehendis minorem rationis subtilitatem, tandem subito abruptitur sermo. Singula, quae sequuntur, folia testimonium

praebent conatum rem ulterius continuandi, singula theoremata vel problemata digitum intendunt ad praemissa, omissis vero numeris ordinariis; calculi multiplices his additi sunt ad inceptum pertinentes negotium, donec res plane deseritur.

Si ex his, quae praesto sunt, exemplis, si inspectis passim manuscriptis et comparatis iis, quae ipse affert de ratione procedendi in Comment. Martis (comp. literas Kepleri ad Maestlinum, Fabricium aliosque in praefatione ad hoc opus) si ex his concludere licet de reliquis, quae conscripsit Keplerus, non sine veritatis specie haec de auctore nostro dicamus: Primum, quaecunque occurrebant Keplero notabiliora, cum domi tum in itinere (adscripsit saepius, praeter diem quo lucubrationes chartae mandavit, etiam urbem, v. g. „Monachii“, „Pragae“, „Tubingae“ &c.), inter studia astronomica et in otio, extemplo ubi posset chartis tradebat, vel per literas ad amicos datas dubitationes, quae occurrebant, sibi ipsi eximere studebat. Deinde, quum res ipsum agitare gravis, quum, ut accidit in „Hipparcho“, moliretur editionem cujusdam operis, versabat rem propositam, donec maxima ex parte, ut ita dicam, in conspectu esset, et sive nullas animo praecipiens difficultates, quae objici possent, sive illas se, procedente negotio, victurum fiducia plenus, rem alacriter aggressus, quasi sibi ipsi stimulos subdere vellet, ab initio quanta potuit diligentia rem tractabat, prima jam linea respiciens quasi ad typum, ordinemque servans inde ab initio animo propositum. Sic singulae deinceps libri partes se invicem sequebantur (ut v. c. in Martis Commentariis capita ab initio 52 priora), donec improvisum deprehendens impedimentum gradum sisteat, et, reversus ad exordium, rem et ea quae chartis mandata habebat accuratius inspiciebat, tum demum forte ea, quae de instituenda operis ratione animo comprehenderat, chartis mandans. In „Hipparcho“ difficultates frangunt impetum, et quamquam iterum iterumque rediit, tandem infectum reliquit, partem eorum, quae absoluta fuerunt, „praeceptis“ Tabularum Rudolphinarum accommodans.

Keplerus quam ob rem opus suum inscribendum censuerit Hipparchum, facile conjicient ii, qui, imbuti astronomiae historia, non ignorant, Hipparchum peculiari ratione dimensum esse distantiam et quantitatem Solis et Lunae, singulari in hunc finem usum delineatione, quae „diagramma Hipparchi“ dicitur, apparentes Solis Lunaeque diametros eorumque parallaxes horizontales comparantem, nec non umbrae Terrestris diametrum eo loco, quo secatur per Lunam eclipsatam. Alii autem, minus versati in his studiis, haec habeant: Hipparchus, natus Nicaeae Bithynorum, primus collegit ea, quae priores in coelo observaverant, et, non contentus observationibus siderum per se cum ab illis tum ab ipso diligentissime factis, studium hoc altius accipiens, integrae scientiae conformandae operam dedit (ab anno a. Ch. 160—125). Motum planetarum, Solis et Lunae periodos accuratius constituere sibi proposuit, comparans suas ipsius observationes cum illis veterum, primusque confecit hypothesin vel quod posteriores mundi systema dicebant, orbis planetarum eccentricos ponens, ut salvaret motuum irregularitatem. Anni quantitatem accuratius dimensus est, tabulas constituit motuum Solis et Lunae, catalogum denique confecit stellarum fixarum. Sed studiorum horum gravissimorum documenta omnia fere perierunt temporum injuria, uno tantum excepto libello, quem inscripsit: τὸν Ἀρχαίου καὶ Εὐδόξου Φαινομένων ἐξηγητικὸν βιβλίον γ, quem primum edidit Petrus Victorius Florentiae 1567, et in Latinam versum linguam D. Petavius

addidit collectioni inscriptae: Uranologion, sive Systema variorum authorum, qui de sphaera ac sideribus eorumque motibus Graece commentati sunt (Lut. Par. 1630). Unum fere habemus testem de Hipparchi astronomia Ptolemaeum, qui illius observationibus et hypothesis fundamenti loco usus, superstruxit his librum suum, quem dicit *Μεγάλη Συναξίς*, ab Arabibus ad nostra tempora notum sub titulo Almagestum. Passim hic occurrit nomen Hipparchi maximis additis laudibus. Libri V. capitibus 11—15 illum secutus Solis, Lunae et Terrae diametros &c. comparat Ptolemaeus, schemate usus quod supra dictum est „diagramma Hipparchi“ (Comp Fig. 1. sequentem), theoriā constituens horum corporum.

Keplerus in sequenti libro hanc theoriā, subtilioribus adjunctis observationibus, emendare conatus est, rem vero, quamquam iterum iterumque ad illam reversus, imperfectam reliquit, deficientibus observationibus accuratioribus, quam illae, quae ipsi praesto fuere, nondum sufficerent. Ipse Keplerus passim librum hunc in operibus suis et literis privatis dicit nunc conscribendum, nunc quoque quasi conscriptum, quam ob rem multi aequalium opus hoc ab ipso efflagitabant vel non obtinuisse legendum aegre ferre se publice profitebantur. Jeremias Horroccius inter hos primus dicendus est, cum ob ingenii doctrinaeque subtilitatem, tum ob singularem quam exhibuit Keplero reverentiam, quam testantur ea, quae infra sequuntur, quaeque desumimus ex libro, quem edidit Joannes Wallis, „Geometriae professor Savilianus Oxoniae,“ et inscripsit: „J. Horroccii, Liverpoolensis Angli, ex Palatinatu Lancastriae, Opera posthuma. Videlicet: Astronomia Kepleriana defensa et promota. Excerpta ex epistolis ad Crabtraeum suum. Observationum coelestium catalogus. Lunae theoria nova.“ &c. (Londini 1678.)

Haec igitur Horroccius: Divinissimus Keplerus, feliciter adhibitis speculationibus physicis, veras et naturales motuum coelestium causas atque ideo geminas orbium formas (saltem in sex primariis) in lucem tandem protraxit, atque veris undique hypothesis innititur; in eo solum peccans, quod numeros motuum et planetarum eccentricitates non praecise recte constituit. Sin autem numeros suos (in Tab. Rudolph.) parum commutes, consensum accuratum et constantem observationum et calculi merito miraberis. — Quod autem Keplerus fateatur, se luminarium deliquia aliter observasse, quam exhibet tabularum calculus, tabulas (Rudolphinas) quidem imperfectas arguit, sed animum re vera ingenuum, et veritatis magis, quam immeritae laudis studiosum. Nimirum non erat ille homo tam perfictae frontis, ut absurdas quasvis ampullas magno clamore ignaris divenderet, modo ipse in fucati laboris praemium, brevissimo inanis gloriae flatu, intumesceret, et inter inconditos plaudentium strepitus plaocide sibi adularetur. Tales ego novi (Lanebergium his dicit Horroccius, contra quem, Keplerum longe aliter taxantem, ibi acerrime invehitur. Comp. annot. ad Comm. Martis lro. 45), sed talem nemo novit Keplerum. Modestior fuit mehercule ingenuus ille et ingeniosissimus heros, quam ut, suae ipsius laudis buccinator, apud reliquos nullam merito inveniret. At mihi cum laude licet in Kepleri laude arctiores modestiae limites transilire; licet mihi illum supra mortales admirari; licet egregium, divinissimum aut si quid majus appellare; licet denique, supra totam philosophantium scholam vel unicum Keplerum aestimare. Hunc solum canite poetae, in ipsius laude veritatem nunquam aequaturi, hunc solum terite philosophi, de illo certi, habere istum omnia, qui habet Keplerum.

His praemissis propius adit Horroccius Kepleri opera, praesertim Tabulas Rudolphinas et Harmoniam, errores in illis a Keplero commissos ingenuè recensens: „motus aequales, aphelia, eccentricitates, orbium proportionēs et alia hujusmodi non satis praecise ordinavit. Et hinc factum est, tabulas Kepleri, etsi omnibus aliis praestantiores, apparentiis tamen non posse in minimis satisfacere. Ille autem exiguum hanc dis-

crepantiam, cum non posset ad regulas reducere, in casus physicos conjecit, omnino persuasus, numeros suos exacte esse constitutos. Hoc negans demonstrat Horroccius, „tabularum numeros solos esse in culpa“, differentiam calculi et observationum non in causas accidentarias conjiciendam esse, sed ex observationibus emendandum esse calculum. Observationes priorum, Ptolemaei, Waltheri, Regiomontani, Copernici, ne Tychonis quidem, non esse ubique exactissimos, „non esse ea omnia satis diligenter observata, quae tamen a summis viris tanquam omni exceptione majora venditantur.“ Causam dissensus in observationibus hanc esse dicit, quod „magni viri, inventis propriis nimium confidentes, observationem strictim enarrant, processum autem, quem in observando tenuerunt, minus candide dissimulant. Longe magis ingenue Keplerus, qui non solum observationes, sed et modum observandi candide nobis communicavit. Unde factum est, ut illius observationes sint aliorum omnium certiores, ac proinde a me maximi sunt. Illius igitur exemplo omnes admonitos velim, ut totum observandi processum nobis non invident; sit licet paulo plus laboris, singulas ambages prolixius recensere, nunquam tamen poenitebit veritatem tanti emissee.“

Deinde causas recensens, quae ipsum moverint, ut Copernici mundi theoriam aliis praeferret, maxima ex parte Kepleri secutus Epitomen Astr. Copernicanae, addit Horroccius: haec apud lectorem praefari volui, ut gratias agerem doctissimo Kepleri, cujus muneris esse fateor, quod hic non caecutus; mihi enim cum reliquis erranti aperuit ille oculus, quare illi quidem me ac mea (si qua sunt) deberi nunquam non confitebor. Deo immortal! O. M. ex animo grates ago, quod pulcherrimam hanc atque humanarum omnium suavissimam veritatem amplectendam concesserit.

His similibusque permultis in Keplerum laudibus cumulatis interponit Horroccius inde a primo exordio Lansbergii censuram haud minus gravem, hujus errores semper comparans cum Kepleri meritis, non omittens alios, quorum nomen in astronomicis plus misere inelaurit. In comparandis v. c. astronomicis hypothesebus ipsi sententia stat: „centrum unum mobile est ipsum Solis corpus, fons motus, non autem punctum quodvis mathematicum prope Solem, ut perperam statuunt Copernicus, Braheus, Lansbergius; qui quidem Lansbergius multo magis culpandus est, quam reliqui duo, eo quod videret doctissimum Keplerum opinioni isti adversantem summaque vi ac firmissimis argumentis oppugnantem, nec ipse locum cessit veritati.“ — Sic comparans Tabulas astronomicas contendit, priorum tabulas longissime a veritate abesse, tres tantum esse, quorum tabulae respiciendae sint, Longomontanus, Keplerus, Lansbergius. „Vis, inquit, de his sententiam meam breviter audire? Optima sunt Rudolphinae, proxime illis accedunt Danicae, omniumque ut postremae ita pessimae Lansbergianae. Longomontanus numeros non male ordinat, in hypothesebus solis peccat, Keplerus utrumque rectissime facit, Lansbergius neutrum. Multos errores in astronomia abstulit Longomontanus, longe plures Keplerus, quos omnes restituit Lansbergius. Denique astronomiam emendavit Longomontanus, perfecit fere Keplerus, miserrime perturbavit Lansbergius.“

Lansbergius in „Uranometria“ (Middelburgi 1631) idem, quod Keplerus in „Hipparcho“ suo perficiendum sibi proposuerat, aggreditur, Solis scilicet et Lunae et Terrae magnitudines et intervalla geometricè demonstrare, usus „diagrammate Hipparchi.“ Concludit, quasi re bene confecta, his verbis: Kepleri hypotheses prima fronte videntur praestare Tychnicis, eo quod Hipparchi diagrammati respondent; penitus tamen inspectae non minus absurdae esse deprehenduntur, quam Tychnicae. Facit enim Keplerus semidiametrum umbrae apparentem in transitu Lunae apogaeae 44' 22", putatque hanc veriorē esse ea, quam Tycho in eclipsibus Lunae demonstravit, 43'. Sed valde fallitur opinione sua. Nos demonstrabimus, semidiametrum umbrae in transitu Lunae apogaeae adhuc minorem esse Tychnicam. . . . Unde manifestum est, Kepleri hypotheses non minus laborare falso et absurdo, quam Tychnicas. Haec et alia, quae Lansbergius in „Uranometria“ contra Keplerum increpans affert, Horroccium moverunt, ut illam censuram suam subiceret, itemque „diagramma“ illud ad examen revocaret. Summam inquisitionis suae his complectitur: 1) hypotheses Lansbergii non ubique sibi constant, sed absurdae sunt non minus quam quae maxime, nihilque vitii ab ipso in quovis alio repertum est, quod non in suis etiam hypothesebus invenitur, ac proinde ipse Lansbergius solidam diagrammatis Hipparchi notitiam non habuit. 2) Nemo est astronomorum, quos ille recenset, qui non ea omnia sciverit, quae nos ille docuit; Keplerus autem solus diagrammatis hujus perfectam intelligentiam habuit. 3) Hypotheses L., etsi sibi consentirent, sunt tamen omnium maxime coelo dissentaneae, Keplerianae in omnibus veritati propie-

res. 4) Impossibile omnino est, veram Solis a Terra distantiam hac ratione demonstrare.

Jam, „illustraturus illud diagramma brevi commentario, quod neminem noverit, qui demonstrationes hasce ad umbilicum perduxit“ haec praemittit: Hipparchum Kepleri, librum diu desideratum, nondum mihi contigit videre, forte quia nondum editum. Certo tamen praesumere ausim, totam hanc artem in illo libro perfectissime tradi. Valde metuo auctoris mortem nunquam non praeinaturam nos tanto thesauro privasse. Ut sit, effectum operis, ut ipse testatur, in praeceptis Tabularum Rudolphinarum prodiit ex Hipparcho suo deductis, quae sunt omnino veritati consentanea; hypotheses ejus inde exstructae omnium solae geometriae et sibi undiquaque consentiunt, unde satis intelligenti est manifestum, Keplerum unicum diagrammatis hujus solidam habuisse notitiam. Facile est, a praeceptis suis totam artem addiscere; nihil hac ex parte est, quod in Keplero desideres praeter demonstrationes. Has autem jam tibi exhibeo etc.

Diagramma Hipparchi, pergit Horroccius, est inventum ingeniosissimum, cujus artificio Solis, Lunae et umbrae Terrestris semidiametri et parallaxes geometricae inter se connectuntur. Dicitur Hipparchi, quoniam is (teste Theone) peculiarem tractatum de usu ejus conscripsit, et ex illo magnitudines et intervalla Solis, Lunae et Terrae demonstravit. Primus, quod scitur, diagrammatis hujus auctor et inventor fuit Aristarchus Samius, mathematicus eximius et astronomiae Pythagoricae de Terrae motu sectator, annis 160 a. n. Ch. in Graecia florens. Hujus opus de magnitudinibus et intervallis Solis et Lunae etiamnum exstare dicitur, ego vero nondum illud vidi. (Errat hic in tempore, quo floruisse dicit Aristarchum Horroccius per 100 annos, nisi quem ponit numerus 160, corrigendus in 260, tribuendus est errori typographico. Opus Aristarchi edidit latine versum G. Valla. Ven. 1498.) Diagrammatis proprii usum Aristarchus ignorasse videtur Lansbergio, fortasse quod nec ipse usum ejus perfecte intelligit. Paucis (centum) post Aristarchum annis Hipparchus Rhodius (verius: Bithynus) eandem demonstrationem peculiari tractatu exposuit, unde vocari solet Hipparchi Diagramma. Liber ipse periit, at demonstratio apud Ptolemaeum exstat.

Longomontanus (Astronomia Danica p. 164. 169) hanc veterum demonstrationem ad suas hypotheses, Tychoni maxima ex parte acceptas, applicat. At quoniam non quadrat, eam rejicit, culpam conjiciens in refractiones radiorum Solarium, hanc *παραπαραταύ* irritam facientes.

Lansbergius toto Uranometriae libro usum et praestantiam demonstrationis deprædicat, ubi nescio quae magniloqua de sua ipsius nuda et simplici ejus explicatione, de hypothesium propriarum consonantia mirabili, aliorum absurditate et inter se discrepantia omni fere pagina inculcat, librum suum tanquam Lydium lapidem ad probandas aliorum hypotheses commendans posteris. At pauca iste, praeter speciosos titulos, ad veram diagrammatis hujus naturam exponendam attulit, simul cum demonstratione a veteribus accepta ipsorum etiam errores retinens. Nec quidquam novi in tanta verborum copia nos docuit, praeter unicum theorema paulo faciliiori modo propositum, et totum illud a Keplero suffuratus; cujus divino plane ingenio ignorantiae et absurditatis notam iniquissime inurit, sui ipsius re vera ignorantis absurditatem mihi detegendam relinquens.

Quocirca diagramma illud Hipparchicum sequenti commentario illustrandum censeo, collectis in unum corpus theorematibus praecipuis ab illo enatis; non ad demonstrandam Solis distantiam, quam nunquam hac ratione invenies, sed ad detegendos errores nonnullos, quos ab antiquitate traditos amplectitur adhuc religiosa nimis recentium credulitas; ad cohibendam Lansbergii vanissimam arrogantiam, cujus imperita tractatione miserrime depravatur ingeniosum hoc inventum; ad vindicandam Kepleri famam, immerito a Lansbergio laceratam.

Hic praemissis Horroccius absolvit propositam demonstrationem simili qua Keplerus ratione, theorematibus tredecim, additis problematibus septem, semper respiciens ad Lansbergium et Tabulas Rudolphinas. Haec sequuntur capita 4, in quibus Lansbergii hypotheses accuratius examinat, comparans illas cum Keplerianis, quibus ubique palmam tribuit. Gradum sicut

disputans de Solis distantia et parallaxi, inquisiturus, ut ultimis dicit versibus, refractionem, quae inquisitio desideratur. Huic enim disputationi idem quod Kepleri Hipparcho accidit, cum non absolutam reliquerit illam auctor, repentina abreptus morte. Mortuus est Horroccius, teste Wallisio, d. 3. 13. Jan. 1641, „sub aetatis annum, quantum intelligo, vicesimum secundum“, paucis tantum annis in astronomicis studiis consumtis, cum, eodem teste, „c. annum 1633 animum ad haec studia videatur primum applicuisse“, et prius soli Lansbergio, deficientibus aliorum astronomorum operibus, addictus, ab anno demum 1636 lectis Kepleri operibus totum se Kepleri dedit, et quasi iratus ob errores, quos Lansbergii astronomia ipsi imperito obruserat, eo majore amore Keplerum amplectebatur et faribundus juvenili ardore Lansbergium refutandum sibi proposuit. — Missis hoc loco reliquis Horroccii disquisitionibus quae supersunt astronomicis, quas omnes, ut nobis videtur, in unum corpus redactas meliorem in formam politioremq; transferendas censuerat, ut expletum et perfectum mundi systema innixum Kepleri hypothesibus proponeret, si sic fuisset in fatia, hoc tantum notamus, nomen juvenis excellentissimi astronomi inclaruisse jam ante edita haec opera posthuma. Hevelius scilicet, astronomus ille Dantiscanus, edidit anno 1662 Gedani libellum inscriptum „Mercurius in Sole visus“, cui annexuit: „Venus in Sole visa anno 1639 (d. 24. Nov. st. v.), seu tractatus astronomicus de nobilissima Veneris et Solis conjunctione, Liverpooliae a Jer. Horroxio, nunc primum edita notisque illustrata.“ Wallisius in praefatione de hoc libello haec affert: „quantus vir fuerat (quantus futurus esset, ni praematura morte juvenis obisset) Horroccius noster, testatur elegans illud et aureum opus, de Venere, quod anno sequente (1640) ab ipso conscriptum, delituit (proh dolor!) nimium diu, donec propitia tandem doctissimi celeberrimique Hevelii manu obstetricante post annos 22 aliena procul terra feliciter in lucem prodiiit, quo Venus Anglia Mercurio Dantiscano se comitem sociaret. —

Jam ad Keplerum redeunt haec monemus.

J. Hevelius, quem omnia Kepleri manuscripta obtinuisse diximus (Vol. I. pag. 56.) haec de Hipparcho Kepleri ad academiam Londinensem perscripsit: „inter manuscripta illa eminet Hipparchus, quamquam non sit, ut par est, digestus, qui tamen posset a quopiam harum rerum perito et otio abundante facile in ordinem redigi et absolvi.“ Talis „peritus et otio abundans“ nemo huc usque exstitit, ne sociis quidem academiae Petropolitanae, quibus mandatum fuit hoc munus ab imperatrice Russica Catharina II, tantum otii fuit, ut mandatum hoc curarent. Hanschius quidem, Hevelio mortuo nactus illa manuscripta, omnia typis mandare sibi proposuerat, nil vero praeter Epistolas imprimendum curavit, quamquam peculiari scripto astronomos de edendo Hipparcho certiores fecit. (Mich. Gottl. Hansch, Collegi B. Mariae Virginis in Academia Lipsiensi Collegiati, de opere Kepleriano *avvanzo*, cui Hipparchi nomen est, ad omnes astronomiae consultos ceterosque, qui siderum scientia delectantur, Epistola. Lips. 1709.)

Ex hac „Epistola“ haec apponenda censemus: Quemadmodum divina et philosophi dignissima occupatio est (astronomia), ita etiam praestantissima quaevis omnium temporum ingenia exercuit. Quae inter elapso demum seculo divinum etiam Kepleri illuxit ingenium, quod prout praeclaris ingeniis familiare esse recte sentit Philo, *πολλὰ καινοτομεῖν τὸν αἰὲ ἐπιστημὴν*, relictis Ptolemaicorum tricus methodo multo simpliciori atque evidentiori eclipses Terrae, quas Solares dicimus, determinare docuit, fundamenti loco assumpto systemate planetarum Coperniceo. Methodum ipsam exposuit in Epitome Astr. Cop. eo redeuntem, ut oculi spectatoris in Luna supposito, calculus eclipses Terrestris non secus inatitatur, ac cum Terra Lunarem adspicimus. Cum enim ante Keplerum tenebrae eclipsium Solarium non aliae, ac si veri essent lucis defectus in Sole, tractarentur, calculusque maximo cum taedio longissimoque numerorum apparatu pro larva Lunari unicuique Telluris loco competente peculiariter suscipiendus esset, nulla interim ratione inita, quam tenebrae istae faciem universae Terrarum superficiei inducturae essent, et quo tempore quantaque magnitudine spectandam se praebitura esset eclipsis Solaris cuilibet Telluris tractui: Keplerus contra nullam sibi causam esse arbitratus, cur, Luna Terraque mutuas in subtrahendis Solis radiis sibi vices reddentibus, umbrae penumbraeque (quam primus ipse in astronomiam introduxit) Lunari non eundem effectum in noviluniis tribueret, quam umbrae Terrenae in pleniluniis communis hactenus astronomorum consensus assignasset, hinc utrobique similibus uti principiis non dubitavit, cum oppido manifestum sit, quemadmodum in pleniluniis non Sol, sed Luna re ipsa Sole lumine privatur Terrae interposita, ita et vicissim Terram in noviluniis ab umbra penumbrave Lunari obduci, neutiquam vero Solem lumen suum amittere, adeoque, quod inde consequitur, nec ipsos defectus luminis Solaris in Terra ex Lunae interventu ortos a defectibus ejusdem in Luna a Terrae interposita productis differre. Quae cum ita sint, assumtis Lunarum eclipsium principiis simili prorsus modo Terrenas tractavit, et ante omnia centro Telluris in Lunae centrum mutato quantitates semidiametrorum disci Terrani, nec non umbrae et pen-

umbræ Lunaris, quarum illa totalium, hæc partialium Telluris eclipsium causa existit, determinavit. Ex quorum postea comparatione, advocatis in subsidium ipsis luminarium motibus temporumque currentium momentis, præcipuas eclipsium Terrenarum phases, magnitudines, terminos, loca et durationes ad quodvis novilunium investigare docuit. Cum vero maximum in eo situm esset momentum, ut semidiametrorum disci Terreni, umbræ penumbræque Lunaris, tanquam primariorum Terrenæ eclipseos elementorum determinatae quantitates geometricis demonstrationibus fulcirentur, id ipsum ex diagrammate Hipparcheo præstare aggressus est Keplerus noster in opere, cui nomen fecit Hipparcho, ubi plus fere admirationis meretur ingenium humanum ad cognitionem operum Dei viam moliens, quam opera ipsa naturæ per se bruta. Ipsa vero calculi capita etiam exhibet Ricciolus in *Astronomia reformatâ* et in *Almagesto* suo, in quo simul memorati modo diagrammatis partes aliquas demonstrare annititur. Quemadmodum etiam Keplerianis ulterius excolendis tempus aliquod impendere hand gravati sunt Bullialdus, Paganus, Wardus, Horroccius aliique his recentiores, quorum meditata hic exponere nec spatii nec instituti ratio permittit. Redeo potius ad ipsum Kepleri opus posthumum, in quo se laudati diagrammatis demonstrationem daturum esse jam in *Epitome* sua *Astronomiæ Copernicanæ* promiserat. Sed temporum suorum injuria præpeditus auctor foetum huncce suum in lucem edere non potuit, utut Imp. Matthiæ gloriæ mem. potentibus Consiliariis exhibitum. Hipparchus in duas partes dividitur, quarum prior fundamenta optica eorum, quæ ad doctrinam eclipticam accuratius examinandam pertinet, demonstrat, et generalibus opticae theorematibus præmissis inter alia agit de figura radii et umbræ, de dimensione refractionum, de parallaxibus, de dispersione lucis siderum in Lunam et Terram, in specie lucis Solaris in Lunam, Lunæ in Terram, et Terræ in Lunam; posterior ipsam eclipsium doctrinam exhibet, et Ptolemaicæ methodi pericula, dispendia et errores ostendit, sciometriæ theoremata demonstrat, multaque notata digna proponit de diametris Solis et Lunæ observandis, de motu Lunæ diurno et horario in conjunctionibus et oppositionibus inveniendis, de motu et angulo latitudinis una cum Lunæ parallaxi nova methodo inquirendis, itemque de observatione hujus anguli citra maximæ latitudinis considerationem, de umbræ semidiametro varie inquirenda, de Solis parallaxi, altitudine et proportionem trium illorum corporum varie detegendis, de commodis denique inde in geographiam et in reliquas scientias redundantibus; ut multarum eclipsium tam Solarium quam Lunarum juxta Keplerianam hypothesin examen adjectum taceam. Sed hic liber, immortalitate sane dignissimus, cujus tibi, lector astrophile, argumentum breviter exposui, affectus quidem fuit a Keplero nostro et Imperatori Matthiæ gloriosissimæ memoriæ oblatum, at ob injurias illorum temporum perfici et publicæ luci exponi non potuit. Ut tamen ne ignorares, hoc celeberrimi auctoris monumentum adhuc superesse et in casses meos incidisse, te hisce certiores facere non intempestivum duxi, in me simul recipiens, nihil intermissurum me esse, quod ad editionem præstantissimi hujus operis maturandam ullo modo pertinere videbitur, divina fretus providentia, quæ subsidiis ad studiorum mathematicorum continuationem quam maxime necessariis labores meos sublevabit, quorum hic per omnem vitam finis erit unicus, ut naturæ arcana magis magisque detegantur, atque hac ratione, qua nulla cogitari potest melior, humani generis salus promoveatur. In genere enim judicio illius Verulamii (lib. II. de augm. scient.) pro certo habendum, magnos in rebus naturæ abditis eruendis et reserandis progressus vix fieri posse, nisi ad experimenta Vulcani et Daedali vel cujuscunque alterius generis sumtus abunde suppedientur. Tu vero, mi astrophile, conatibus meis, quos in nobilissimæ scientiæ incrementum et ornamentum tendere hinc facile intelligis, fave et rem tuam ex voto age.

Scribebam Lipsiæ pridie Non. Dec. 1708.

Fragmentum operis inscripti Hipparchus eadem qua occurrit in codice forma typis mandavimus, in proposito susceptoque consilio permanentes, immutata Kepleri opera hac editione colligendi; et quamvis aegre ferendum sit, quod Keplerus inchoatum non absolvit opus, absolvendum illud alii permittendum esse censemus, qui, ut Hevelius dicit, rerum peritus sit et otio abundet; sparsas annotationes, quæ ad rem pertinent, nos sub finem subjungemus.

Quantum temporis Keplerus, semper reversus ad propositum suum, consumserit in conscribendo hoc opere, cum ex inscriptione apparet („Pragæ inchoata a multis annis, Lincii vero continuata, præsertim anno 1616“) tum e singulis foliis in vol. I. et II. manuscriptorum, adscriptis annis diversissimis.

Quæ ipse Keplerus in libris, quos ipse publici juris fecit nec non in literis privatis, quæ ad amicos dedit, de edendo hoc opere scripsit, sequentia exhibent. Primum occurrit nomen Hipparchi in „Peroratione“ Opticæ (Vol. II. pag. 398) h. e. anno 1603, et considerare licet ex his verbis, Keplerum eodem tempore, quo Opticam conscripsit, initium

fecisse Hipparchi. In Optica (II. 362) librum hunc dicit „partem alteram, quae demonstrationes continet restitutionum Lunarum ex eclipsibus.“ Perorationem illam Kepleri in Opticis attingens haec dedit Reinhardus Zieglerus Moguntiacus Id. Jan. 1606 Kepleri: In Opticis certe tuis Paralipomenis ea usus es ingenii felicitate, ut illecti tam perspicua luce praemissae facis Hipparchum tuum quam avidissime expectemus, quo nomine hortor te etiam atque etiam, ne patiaris expectando mathematicorum ex orbe Christiano responsa de Solari hoc deliquio Hipparchum illum tuum diutius publico carere. (Epistolam hic Kepleri Zieglerus dicit eam, quam anno 1605 publici juris fecit inscriptam: Epistola ad rerum coelestium amatores de Solis deliquio d. 12. Oct. 1605.)

Quibus Keplerus (d. 14. Feb. 1606) haec brevi respondit: Hipparchum meum aequum est quam limatissimum prodire, ne honestissimum titulum paulo callidius et arrogantius susceptum foedet.

Anno 1608 (d. 19. Jul.) Herm. Bulderus, „vetus Kepleri amicus“ (comp. Astrologiae Fuud. Vol. I, p. 420) haec Kepleri dedit Treboniis: Expectamus omnes motum Lunae propter eclipses restauratum, quem tumet ipse a Tychoe nondum ad perfectionem adductum judicas. Fac, ne nos diu detineas. Pestis et tumultus praecedentes procul dubio multum te retardarunt: aëre hoc aereo fac, ne ferieris. — Annis 1609, 10 et 12. adhuc intento studio incubuisse Keplerum ad perficiendum edendumque Hipparchum, testantur haec ejus dicta: in Comment. de Motu Martis (1609): . . . „ut in Hipparcho meo probabo;“ in „Dissert. cum nuncio sid.: (1610): opto mihi tuum instrumentum in eclipses Lunaris contemplatione; sperarem ex eo praestantissima praeidia ad expoliendum, est ubi et reformandum totum Hipparchum meum. In epistola ad S. Marium data (10. Nov. 1612) legimus: Ex meo Hipparcho apparebit, doctrinam demonstrandi proportionem corporum Solis, Lunae et Terrae &c. incertissimam esse.“ Eodem autem tempore (18. Mart. 1612) in literis ad Remum datum minus promptus videtur ad edendum Hipparchum, scribens: „ . . . Sed haec est materia Hipparchi mei, quem spero me elaboraturum, ubi me ad quietem composuero Deo vitam largiente. Sic in praefatione ad libellum chronologicum, inscriptam „Bericht, dass unser Herr &c.“ (ed. a 1613): „die Astronomia, mein Hipparchus . . . wissen disen disceptationibus chronicis schlechten Danck, denn sie hiedurch abermahl vmb ein par Monat gegen meinen Todt verschoben worden.“

Posthac vero, (annis 1617—1621) loquitur Keplerus iterum de Hipparcho, quasi si brevi proditurus, vel quasi sit in omnium manibus. In praefatione ad Ephemer. ad annum 1617 N. 19. dicit: . . . vis demonstrationis, quam in Hipparcho meo ejusque parte illa, quae Sciometria dicitur, sum complexus. In Epitome Astronomiae legimus: (p. 482) longo demonstrationis ambitu, quem vide in meo Hipparcho. (p. 874 et 875): Demonstratio in Hipparcho meo, et: demonstratio hujus et adhaerentium est in Hipparcho meo. Remo (1619) scripsit: Memini inter Sciometria mea, in libro cui Hipparcho nomen dedi, problemata varia esse de omnibus membris observatae alicujus eclipsis. . . . Memini quantum temporis quam frustra insumserim. Problemata quidem pulcherrima sunt et digna, quae non praetermittantur, opus ipsum impervium.

Haec denique legimus annis 1624 et 1627 de Hipparcho non edito. Krügeri scripsit Keplerus: . . . Hipparchus ante annos 20 promissus (est). At quis sunt absolutae Rudolphinae, nunc aliter videtur, scilicet Hipparchum hunc non seorsim edendum, sed partem constituendum libri, qui respondeat τῇ Μεγάλῃ Συντάξει Ptolemaei, quod opus post tabulas edetur, si Deus vitam et vires produxerit.

In libello inscripto: Terrentii Epistolium (1627. 1630) ad verba Terrentii: „Non dubito, prodiasse Kepleri Hipparchum,“ haec Keplerus respondit: Prodiit, si effectum respicias, in tabulis Rudolphi, praesertim in foliis de parallaxibus Solis et Lunae, semidiametrisque umbrae et praeceptis eas formandi: non prodiit, si demonstrationes desideres. Sed proxima erit editio, si vitam Deus concesserit. Praecipuam partem occupabit Sciometria, quae constat demonstratio-

nibus geometricis jucundissimis, quibus quantitas diametri umbrae cum parallaxis Solis et Lunae et semidiametro Solis arctius connectitur; quod hactenus fuit neglectum ab artificibus. —

Finem facientes huic introductioni, antequam ipsum lectoribus proponimus fragmentum, prioribus subjungimus partem epistolae Kepleri ad Vincentium Blanchium (alias: Comes Alerani; comp. Hansch. p. 600. 603) datae, ut ipsius verba testimonio sint eorum, quae supra diximus de Kepleri studiis et lucubrationibus.

Cujus (cunctationis in operibus, quae sub manibus habebat) excusationes multae sunt et variae. Primum calamitates aulae sub Rudolpho, turbatum statum regni et mala domestica, quibus per aliquot annos sum impeditus (scripsit haec Keplerus a. 1619), non teneor praestare. Quorum externorum praecipuum hoc est quod, cum adscriptum mihi sit salarium sane quam honestum a Caesare, id tamen non solvitur; nisi a communitate hujus provinciae Ordinum modicum acciperem, ne domum quidem sustentare possem, sed dum cum dedecore principum extraneam opem implorassem. Ex hoc sequitur, quod raro amanuensem alo et calculatorem. Est mihi jam sedulus calculator et totius matheseos capax, Janus Gringalletus Sabaudus, qui opus Ephemeridum in annos multos calculare posset in meis audibus: at cum ei non satisfacere possim desertus a Caesareanis, de diuturna ejus praesentia certus nequaquam sum. Rursum igitur in me solum recident omnia; neque sane vel amicis scribendis epistolis interdum sufficio, nedum ad calculationes. Sunt et aliquae morarum causae in meo ingenio: „non omnia possumus omnes.“ Neque ego ordinem tenere possum: extemporaneus sum ego, confusus, et si quid ordinatum a me proficiscitur, decies id repetitum est. Interdum error calculi ex prope ratione commissus longissimo tempore me remoratur. Possem sane infinita effundere; nam etsi deest lectio, superest imaginatio: at non placeo mihi in confusaneis talibus: taedet pigetque; eoque vel abjicio vel reservo, donec revideam, id est donec nova scribam, quod plerumque fit. Peto etiam a vobis amicis, ut ne me totum damnetis in pistrinum calculationum mathematicarum: tempus mihi ad speculationes philosophicas indulgeatis, delicias meas unicas. Irasci mihi nonnullis ob dilatas tabulas Rudolphi, non dissimulavi in prologo libri V. Harmonicorum, dixi scilicet, me tempore abuti ad speculationes harmonicas. Suum cuique pulchrum: alii tabulae et materia genesium, mihi flos astronomiae, politia motuum et ornatus placent. Quid quod ipsae Tabulae causas serunt morarum: nihil de difficultate dicam; ipsa forma calculi jam perfecta tota renovanda est secundum logarithmos, ut superveniens alius principiis meis assumtis commodiorem illum modum novis tabulis exprimat. Denique si perfectae Tabulae essent, possent tamen impedire Braheani editionem, quia, cum observationes Brahei ex ipsorum habeam concessu, vicissim illis obstrictus sum.

Inscripsit Keplerus fasciculum, qui continet Hipparchum similique: „Restitutionum Lunarium adversaria“, ipsum autem opusculum inscriptionem prae se fert:

HIPPARCHUS

SEU

DE MAGNITUDINIBUS ET INTERVALLIS TRIUM CORPORUM SOLIS, LUNAE ET TELLURIS.

*Haec Pragae inchoata a multis annis, sic etiam exhibita Imp. Matthias,
petentibus consiliariis,*

Lincii vero magna parte continuata, praesertim anno 1616.

SCIAMETRIA.

Theorema I.

Angulus parallaxeos supremi marginis Solis in horizonte positi, et angulus dimidii mucronis umbrae Terrae juncti simul aequant angulum semidiametri Solis apparentis ex centro Telluris.

Centro A (Fig. 1) spatio AD scribatur circulus corporis Solaris. Sit autem distantia centri Terrae a centro Solis AB, et centro B, spatio BE, minore quam AD, scribatur circulus corporis Telluris. Et ducatur recta DE, tangens utrumque circulum in D, E punctis, continueturque ad partes E: connectantur etiam centra A, B, et producta AB secet DE in puncto C. Connectatur etiam B centrum Terrae cum puncto contactus D, et A centrum Solis cum puncto contactus E.

Igitur in $\triangle BDC$ recta BC secat duas DB, DC. Angulus igitur exterior DBA aequalis est interioribus et oppositis BDC, BCD junctis. Sed DBA est angulus semidiametri Solis DA apparentis in centro Terrae B. Angulus vero CDB h. e. EDB est angulus parallaxeos horizontalis puncti D. Nam ED linea visionis tangit circulum BE Terrae in E: itaque visu in E collocato punctum D videtur in horizonte. Denique DCB h. e. ECB est angulus dimidii mucronis umbrae. Ergo parallaxis Solis et dimidius umbrae mucro juncta aequant semidiametrum Solis apparentem in centro Terrae, q. e. d.

Problema I.

Data semidiametro Solis apparente ejusdemque parallaxi horizontali: angulum umbrae Telluris invenire.

Parallaxin Solis horizontalem aufer a semidiametro Solis apparenti, formabisque dimidium umbrae Telluris mucronem.

Corollarium. Quantum crescit semidiameter Solis apparena, tantum-

dem etiam crescit summa ex semimucronibus umbrae Terrae exque parallaxis Solis utrinque collecta.

Theorema II.

Angulus parallaxeos puncti cujuslibet in supremo margine umbrae Terrae in horizonte positae aequat angulum apparentis semidiametri umbrae Terrae, quae semidiameter est apud illud punctum, et angulum dimidii mucronis umbrae Terrae junctos.

In schem. priori sumatur lineae EC punctum F, ex quo descendat in BC perpendicularis FG, et connectantur F cum B et G cum E. Igitur in $\triangle FBC$, producto latere CF, erit exterior EFB aequalis interioribus et oppositis FBC, FCB junctis. Sed angulus EFB et EGB sunt ad omnem sensus subtilitatem aequales. Quare etiam $EGB = ECB + GBF$. Est vero EFB (EGB) parallaxis puncti F in supremo margine umbrae orientis vel occidentis, quia FE tangit corpora Telluris et Solis in E, D, ut ita visu in E posito eadem FE sit horizon; et FBC, h. e. FBG est angulus in centro Terrae apparentis semidiametri umbrae FG, per punctum F ductae; sicut FEG est angulus ejusdem umbrae ex E puncto horizonis visae, rursum ad omnem sensum aequalis angulo FBG. Denique FCB, id est ECB est angulus dimidii mucronis umbrae, q. e. d.

Breviter: Parallaxis Lunae horizontalis aequat semidiametrum umbrae Terrae et ejusdem dimidium mucroneum junctos.

Theorema III.

Junctae parallaxes Solis et puncti certi de umbrae Terrae in horizonte positorum, aequales sunt semidiametris Solis et umbrae Terrae, apud id punctum apparentibus, junctis.


In schemate, quia DBA vel DEA, semidiameter Solis, major est quam BDE, parallaxis Solis, quantitate anguli BCE (qui est semimucro umbrae Terrae, Sole in A posito) per theorema I., et FBG vel FEG (semidiameter umbrae in transitu Lunae FG) est minor quam EFB, parallaxis Lunae horizontalis in puncto F, eadem quantitate anguli BCE per theorema II., illius igitur excessus et hujus defectus sunt aequales. Juncti ergo DEA, FEG sunt aequales junctis BDE, EFB, q. e. d.

Problema II.

Datis parallaxibus luminarium horizontalibus et semidiametro Solis apparente invenire semidiametrum Terrae.

A summa parallaxium Solis et Lunae horizontalium aufer semidia-

Fig. 1.



metrum Solis apparentem, relinquitur semidiameter umbrae Terrae, quanta ea semidiameter est in illo loco, quam Luna monstrat.

Theorema IV.

Si ab aggregato semidiametrorum Solis et umbrae Terrae auferatur parallaxis Lunae a Sole quanta potest esse in horizonte, relinquitur duplum parallaxeos Solis.

Nam per th. III. parallaxis Lunae tota et parallaxis Solis horizontales junctae aequant junctas semidiametros Solis et umbrae Terrae in puncto, quod Luna monstrat suo transitu, apparentes. Sed tota Lunae parallaxis diminuta parallaxi Solis appellatur parallaxis Lunae a Sole. Ergo parallaxis Solis bis, et parallaxis Lunae a Solé aequant semidiametros dictas. Ablata igitur parallaxi Lunae a Sole ab aggregato semidiametrorum Solis et umbrae relinquitur duplum parallaxeos Solis; q. e. d.

Theorema V.

Quanta est differentia semimucronum umbrae diversis Solis elongationibus a Terrae formatorum, tanta est etiam in unoquoque loco transitus Lunae differentia semidiametrorum umbrae Terrae in horizontem exporrectae, affectionis tamen contrariae.

In schemate praemisso appropinquet Sol Terrae usque in K, sitque KL semidiameter aequalis ipsi AD eique parallela, ducaturque nova linea contingens utrumque corpus in E et L, continueturque usque dum secet axem umbrae Telluris in H, ut EHB sit semimucro novus. Secabitur igitur FG linea per EH lineam; secet in I. Quia igitur ECB semimucro pristinus et EHB novus, differentia utriusque est HEC; h. e. IEF. At IEF est differentia angulorum GEF apparentis semidiametri pristinae et GEI novae, in eodem Lunae transitu GF. Aequales igitur differentiae, q. e. d.

Dico autem „in horizontem exporrectae,“ quia si Luna deficiens appropinquet coeli medio, tunc una semidiametro Terrae fit propior visui, quam centro Terrae; tunc igitur theorema non limitatum non exacte verum esset.

Theorema VI.

Si auferas a differentia semidiametrorum Solis apparentium ex diversis ejus elongationibus differentiolam parallaxium Solis horizontalium in iisdem elongationibus, relinquitur differentia semidiametrorum umbrae apparentium, in uno et eodem loco transitus Lunae, respondentium diversis illis Solis elongationibus.

Nam per th. V. differentia semimucronum est differentia semidiametrorum umbrae Terrae in eodem loco transitus Lunae. Sed per coroll. ad th. I. differentia semimucronum est minor quam differentia semidiametrorum Solis differentiola parallaxium Solis horizontalium. Ergo diminuta haec differentiola a differentia semidiametrorum Solis relinquit differentiam semidiametrorum umbrae apparentium, h. e. ejus angulorum.

Corollarium. Cum differentiola parallaxium Solis illa, quae oritur ex Solis eccentricitate, sit pene insensibilis, uti possumus differentia semidiametrorum Solis pro differentia diametrorum umbrae singularum in singulis locis transitus Lunae; ut quantum augetur Solis diameter, tantum diminuat diameter umbrae fere.

Theorema VII.

Proposita certa quantitate anguli apparentis semidiametri Solis et suppositis diversis sub eodem angulo elongationibus ejusdem a Terra, quantum minuitur parallaxis Solis in suppositione majoris elongationis, tantundem minuitur et semidiameter umbrae in quolibet transitu Lunae per eam.


Sit enim in schemate nostro SBD vel TBX unus et idem angulus Solis; et supponatur Solem a Terra distare vel brevius per BA, vel longius per BO, et ducantur contingentes SVC, TVP. Igitur in \triangle STV exterior BSV aequalis est junctis STV et SVT, id est CVP. Sed BSV est parallaxis Solis propioris suppositi; et BTV est parallaxis Solis remotioris suppositi, manente eodem apparentiae angulo in centro B. Denique PVC est differentia semidiametrorum umbrae in eodem transitu Lunae, quae sit FGQ (per th. V.) quia TV producta fit interior (VP), secans GQ in R, et quia TPO est semimucro umbrae a Sole ut remotiore, SCA vero semimucro a Sole ut propiore. Ergo quanto minor est VTB parallaxis, quam VSB, tanto etiam minor est RBG angulus semidiametri umbrae a Sole ut remotiore, quam QBG ejusdem a Sole ut propiore. Q. E. D.

Corollarium. Quanto minores supposueris parallaxes Solis, tanto minus peccatur, si pro differentia semidiametrorum umbrae in uno certo loco transitus Lunae adhibeatur differentia semidiametrorum Solis apparentium illa, quae oritur ex Solis eccentricitate ¹).

Definitio I. Luminis vocabulo utemur technice pro cono umbram Terrae formantis parte illa, quae est inter Solem et Terram, tota luminosa (sicut umbra Terrae est ejusdem cono pars reliqua tenebrosa, ultra Terram in mucronem desinens). Nam si ab it Luna tota ab illo spatio, totum Terrae hemisphaerium Soli obversum toto Solis lumine fruitur. (Horroccius dicit „irradiationem,” quod Keplero „lumen” dicitur.) In schemate praesenti sint A, B centra Solis et Terrae, tangantque illorum corpora duae rectae SV et DE in plano per centra ducto, quae continuatae concurrant inter se et cum axe in C, repraesentantes conum. Ergo cono hujus truncus SVED lumen dicatur, sicut ejusdem mucro VCE est umbra.

Definitio II. Penumbra Lunae est omne illud spatium, in quo particula aliqua de Sole a Luna tegitur. Sit I Lunae centrum, umbra Lunae formetur lineis tangentibus corpora Solis et Lunae SK, DL, concurrentibus in R. In spatio igitur KRL conico nulla particula Solis cerni potest, itaque conus hic est umbra Lunae. Ducantur jam aliae lineae per axem umbrae Lunae AR, tangentes corpora Solis et Lunae in punctis invicem oppositis; ut SXL, DXK, continuatae in P, M, et fiat MXP superficies conica, et secantur lineae omnes plano circuli Terrae B maximi, in quem axis AB perpendicularis, SR, DR in N, O, at XK et XL in M, P. Truncus igitur hujus cono KMPL, in regione intima quidem KNOL est umbra Lunae, in regione reliqua KNM, LQP circulariter circumjecta est penumbra, quia in

Fig. 2.



punctis M, P totoque circulo per illa traducto Sol ultimo totus videri potest. Exinde enim quo magis ingredimur ad interiora, hoc plus de Sole tegitur a Luna, quoad ventum fuerit ad circulum per N, O puncta ductum, ubi totus Sol tegi incipit.

Definitio III. Discus Terrae est circulus prope maximus illuminationis Telluris, axem umbrae Terrae perpendiculariter secans prope Terrae centrum. Discus dicitur, quia fingimus superficiem Telluris illuminatam projectam esse in planum hujus circuli.

Theorema VIII.

Angulus apparentis ex centro Terrae semidiametri luminis in loco transitus Lunae est aequalis parallaxi Lunae horizontali et semimucroni umbrae Terrae junctis.

In schemate 2. sit locus transitus Lunae per lumen HIT, HI semidiameter luminis. Ducatur HB, erit IBH angulus in centro Terrae B. Igitur in $\triangle HCB$ est HBI exterior $= BHC + BCH$, interioribus et oppositis; sed BHC h. e. BHE est parallaxis horizontalis puncti H seu Lunae in eo, et BCH est semimucro umbrae. Q. E. D.

Problema III.

Datis parallaxibus luminarium et semidiametro Solis apparenti, invenire semidiametrum luminis.

Ad parallaxin Lunae horizontalem adde semid. Solis apparentem, a summa aufer parallaxin Solis: vel quod idem est, conjice in unam summam parallaxin Lunae a Sole et semidiametrum Solis, prodit utrinque semidiameter luminis apparens. (Vid. probl. I.)

Theorema IX.

Duplicata Lunae parallaxis in certa distantia Lunae a Terra aequat apparentes in eadem distantia a Terra semidiametros umbrae Terrae et luminis.

Nam semidiameter luminis excedit parallaxin Lunae semimucrone umbrae. (th. VIII.) At semidiameter umbrae minor est Lunae parallaxi eodem semimucrone umbrae: junctae igitur semidiametri luminis et umbrae aequant duas parallaxes Lunae, excessu compensante defectum aequalem. Ergo &c. Brevius ex schemate: IBH superat BHE angulo BCE cum BHE , BFE GBF superatur BFE angulo BCE sint aequales.

Theorema X.

Angulus apparentis semidiametri Lunae ex centro Terrae est aequalis junctis semidiametris, Solis ex centro Terrae visi et umbrae Lunae apud centrum Terrae velut ex Luna visae.

In schemate connectantur puncta L, B. Ergo in $\triangle LRB$ exterior LBI est aequalis interioribus et oppositis BLR , BRL . Sed LBI est semidiameter Lunae ex centro Terrae apparens, et BLR , id est BLO , est semid. umbrae constituta ad centrum Terrae B et apparens ex L puncto Lunae: denique BRL , h. e. ARD est semidiameter Solis ex puncto R apparens, quod semper est proxime B centrum Terrae. Ergo &c. q. e. d.

Corollarium. Summa semidiametrorum Solis et Lunae aequat summam ex diametro Solis et semidiametro umbrae Lunae.

Problema IV.

Datis semidiametris luminarium apparentibus, invenire semidiametrum umbrae Lunae.

Ablata semidiametro Solis a semidiametro Lunae, si major, relinquitur semidiameter umbrae Lunae apparens tanquam ex Luna.

Theorema XI.

Semidiameter penumbrae Lunae cum sua umbra in medio componitur ex semidiametris Solis et Lunae, et ex parallaxis Solis horizontalis tanta portione, quanta est portio diametri Solis apparentis de parallaxi Lunae.

In schemate connexis K cum B, I cum N, quia MP est diameter penumbrae (def. II.), ergo MIB vel MKB est ejus semidiametri apparentiae angulus tanquam ex Luna prospicienti. Habet vero MKB duas partes MKN et NKB, vel NIB, quarum ista quidem est semidiameter umbrae Lunae constituta in disco Terrae, apparens vero ex Luna ut in priori, illa vero, seu MKN angulus aequat angulum SKD apparentiae diametri Solis in puncto Lunae K. Et est ut DM ad DK vel SN ad SK, sic ex adverso angulus SKD ad angulum SBD apparentis diametri Solis ex centro B. Nam in tanta exilitate horum angulorum nihil obstat nobis prop. 8. Opticorum Euclidis. Est vero etiam ut SN ad KN sic e contrario parallaxis Lunae ad parallaxin Solis. Ergo etiam, ut SN ad differentiam SN et KN, sc. ad SK, sic parallaxis \odot ad differentiam parallaxis \odot et parallaxis \ominus , quae est parallaxis \odot a \ominus . Ut igitur parallaxis \odot ad parallaxin \odot a \ominus , sic SKD ad SBD et vicissim: ut parallaxis \odot a \ominus ad parallaxin \odot totam, sic SBD diameter \odot apparens in centro Terrae ad SKD seu MKN partem penumbrae alteram. Sed excessus parallaxis \odot totalis super \odot a \ominus est circiter sexagesima, ergo etiam excessus MKN super SKD est pars circiter sexagesima ac proinde circiter 30" seu semissis parallaxeos Solis. Utroque igitur elemento MKN et NKB in unum MKB compositis, habebimus diametrum \odot , semidiametrum umbrae \odot et semissem parallaxeos Solis circiter. Sed per coroll. th. X. diameter \odot et semidiameter umbrae \odot aequant semidiametros \odot et \odot junctas. Ergo semidiameter penumbrae aequat et semissem parallaxeos \odot et semidiametros \odot et \odot junctim.

Fig. 2.



Problema V.

Datis semidiametris luminarium, definire semidiametrum penumbrae Lunae.

Conjiciantur in unam summam semidiametri luminarium et parallaxeos Solis horizontalis circiter dimidium, ita fiet semidiameter penumbrae.

Problema VI.

Datis parallaxibus horizontalibus luminarium eorumque semidiametris apparentibus, invenire summam semidiametrorum disci Terrae et penumbrae Lunae,

Conjice in unam summam semidiametros luminarium, parallaxin Lunae horizontalem et semissem de parallaxi Solis horizontalis, conflabitur summa semidiametrorum disci et penumbrae.

Theorema XII.

Parallaxis Lunae horizontalis in quolibet puncto distantiae ejus a Terra aequalis est semidiametro disci Terrae apparenti.

Nam quia proportionem quaerimus semidiametrorum disci Terrae et penumbrae, angulos etiam, quibus utraque apparet, eodem loco constitui oportet. Atqui penumbrae et umbrae angulos necessarie constituimus in Luna, quippe a qua dilatatur penumbra (MKN). Quare etiam semidiameter disci Terrae subtendere debet angulum in Luna. At quem in Luna subtendit semidiameter Terrae angulum, is est parallaxeos Lunae horizontalis.

Theorema XIII.

Lineae motus longitudinis \bigcirc a \odot vel latitudinis ab ecliptica, in planum disci Terrae projectae, sunt sub angulis in Luna proportionem eam habentibus ad angulos, quibus ipsae videntur ex Terra, quae est summa parallaxeos Lunae et Solis ad parallaxin Lunae solam.

In schemate 2. sit I punctum orbitae Lunae subjectum eclipticae, LI arcus latitudinis, ducatur AL et continuetur in Z punctum in plano disci. Est igitur ut AI ad IL, sic AB ad BZ. Sed AB est ad AI ut parallaxis \bigcirc et \odot ad parallaxin Lunae solitariam, q. e. d.

Problema VII.

Horarium rite ampliare.

Dividatur parallaxis \bigcirc per parallaxin \odot , quotiens dividat arcum latitudinis vel horarium Lunae et hic quotiens adjiciatur toti.

Theorema XIV.

Duobus circulis inter se inaequalibus se mutuo secantibus, si recta per centra utriusque ducta et continuata ad circumferentias utrinque secta fuerit per rectam sectionum circumferentiarum: siquidem centrum minoris fuerit in circumferentia majoris, quadratum semidiametri minoris aequabit rectangulum sub tota diametro majori et ejus segmento minori per rectam sectionum facto.




Fig. 3.

Sit circulus major AKN, quem secet minor, centro A in circumferentia majoris stante: sectiones sint V, X, et per eas ducatur recta, secans ductam per centra E, A, et continuatam ad B, Y circumferentias: sectio sit D. Dico quadratum semidiametri minoris AB aequari rectangulo sub YA et AD. — Connectatur n. centrum A cum X sectione. Quia igitur ipsi AB aequalis est AX, et DX perpendicularis ad AY, erit ut DA ad AX

sic AX ad AY. In proportionalibus vero continue quadratum mediae aequat rectangulum sub extremis, q. e. d.

Corollarium. Si dixero, rectangulum sub segmentis diametri minoris a circumferentia majoris factis, scil. BA, AC, aequari rectangulo sub segmento minori diametri majoris a linea VX sectionum facto, et sub diametri majoris AY et differentiae partium BA, AC vel summa vel differentia, res eodem redibit. Nam rectangulum BA, AC est idem, quod quadratum BA. Sic differentia segmentorum BA, AC est nihil. Nihil vero subtractum ab AY relinquit AY, nihil additum ad AY facit AY.

Theorema XV.

Ceteris manentibus ut prius, si centrum minoris fuerit intra circumferentiam majoris, rectangulum sub partibus diametri minoris, quas dissepapat circumferentia major, aequale est rectangulo sub segmento diametri majoris minori, quod linea per sectiones facit, et sub differentia inter diametrum majorem differentiamque dictarum minoris partium.

Stet centrum minoris A intra circumferentiam majoris, et sit linea sectionum FG, secans ductam per E, A in puncto I, in qua EA continuata sint puncta circumferentiae majoris N, K, minoris L, M, sintque K, M interiora. Et ipsi LK ex M aequalis versus A centrum extendatur MO, ut KO sit differentia partium LK, KM, et ON differentia ipsarum NK, KO. Dico rectangulum sub LK, KM aequari rectangulo sub KI, ON. Ut hoc sine magna perplexitate demonstretur, considera, quod IF sit communis perpendicularis ex puncto diametri I in utramque circumferentiam F. Quadratum igitur IF aequale est rectangulo sub KI, IN segmentis diametri majoris, aequale et rectangulo sub LI, IM segmentis diametri minoris. Ac proinde rectangula haec utrobique sunt inter se aequalia. Verum quod sub LI, IM majus est eo, quod sub LK, IM quantitate ejus, quod sub KI, IM. Commune auferatur KI, IM. Quod ergo sub LK, IM aequale erit ei, quod sub KI, MN. Rursum autem, quod sub LK, IM minus est eo, quod propositio habet, sub LK, KM, quantitate ejus, quod sub LK, KI. Et similiter, quod sub KI, MN minus est eo, quod propositio habet sub KI, ON, quantitate ejus, quod sub KI, OM, h. e. LK ex constructione. Aequalia igitur aequali aliquo minora sunt iis quae proposita sunt, quodque suo respondent. Igitur et proposita inter se sunt aequalia. *)

Theorema XVI.

Rursum ceteris manentibus ut theor. XIV. si centrum minoris fuerit extra circumferentiam majoris: rectangulum sub partibus diametri minoris, quas dissepapat circumferentia major, aequale est rectangulo sub segmento diametri majoris minori, quod facit linea per sectiones et sub composita ex diametro majore et differentia dictarum minoris partium.

Stet centrum minoris A extra circumferentiam majoris, et sit linea sectionum PQ, secans ductam per E, A in puncto R, sintque in hac per centra ducta puncta circumferentiae majoris N, K ut prius, minoris vero H, S, sed N, S interiora: et ipsi SN aequalis ab H extendatur HZ versus A, ut ZN sit differentia partium HN, NS, et ZK summa ipsarum KN, NZ. Dico rectangulum sub partibus HN, NS aequale esse rectangulo sub RN, KZ. Rursum enim, ut prius mediante communi perpendiculari RP in utroque circulo demonstratur, aequalia rectangula, quod sub SR, RH, et quod sub

NR, RK: sed quod sub SR, RH, minus est eo quod sub SN, RH, quantitate rectanguli quod sub NR, RH. Commune accedat quod sub NR, RH. Quod ergo sub SN, RH, aequale erit ei, quod sub NR et composita ex RK, RH, h. e. KH. Rursum autem, quod sub SN, RH, majus est eo, quod sub SN, NH in propositione nominato, quantitate SN, NR: et similiter, quod sub NR, KH, majus est eo, quod sub NR, KZ in propositione nominato, quantitate NR, ZH, h. e. SN ex constructione. Aequalia igitur aequali aliquo majora sunt, quodque suo respondentem in propositione nominato. Igitur et nominata inter se sunt aequalia. ⁹)

Problema VIII.

Datis semidiametris luminaris et umbrae, et quantitate arcus orae luminaris vel lucidae vel obscuratae, inquirere partes diametri vel luminaris vel umbrae constitutas a linea per sectiones, quarum quae minor apotome vel sagitta luminaris vel umbrae dici potest.

Data enim diametro circuli et arcu, datur et ejus arcus sagitta in eadem dimensione, quae multiplicata in residuum diametri luminaris constituit quadratum semissis de linea sectionum. Id vero quadratum ablatum a quadrato semidiametri umbrae, relinquit quadratum ejus, quod post sagittam ablatam est residuum usque ad centrum umbrae. Quare radix a semidiametro umbrae ablata, ostendit sagittam umbrae. Aliter: Data semidiametro luminaris et dimidio arcus deficientis vel lucidi, datur ejus sinus in eadem dimensione, in qua utraque semidiameter. Dato vero sinu in dimensione semidiametri, datur etiam sinus complementi, qui ablatum a semidiametro constituit sagittam.

Problema IX.

Datis semidiametris disci Terrae et penumbrae et latitudine menisci de penumbra extra discum porrecti, inquirere partes diametri penumbrae, factas a recta per sectiones.

Multiplicetur latitudo menisci in residuum diametri penumbrae, summa dividatur per diametrum disci, diminutam duplo ejus differentiae, quae est inter latitudinem menisci et semidiametrum penumbrae majorem: vel per diametrum disci auctam duplo ejus differentiae, quae est inter latitudinem menisci et semidiametrum penumbrae minorem. (Si meniscus est minori latitudine quam semidiameter penumbrae, duplum hujus defectus aufer a diametro disci; sin major, duplum excessus adde diametro disci; ita habes divisorem. Vel duplica distantiam centrorum, habes divisorem).

Problema X.

Datis diametris luminaris et umbrae et quantitate defectus, inquirere partes diametri umbrae, constitutas a linea per sectiones.

Multiplica latitudinem partis lucidae in latitudinem partis tenebrae, deinde et minorem a majore subtrahe, differentiam, si major est lucida, adde ad diametrum umbrae, sin major tenebrosa, aufer a diametro umbrae; et per hoc sive aggregatum sive residuum divide factum ex prima multiplicatione, prodit segmentum diametri umbrae constitutum a linea sectionis.

Problema XI.

Data quantitate diametri tam luminaris quam umbrae, et arcu deficiente vel lucido, elicere quantitatem defectus.

Quaere sagittas tam luminaris quam umbrae; et quantisper quidem minus semicirculo luminaris est in umbra, adde sagittae umbrae sagittam luminaris, pro quantitate defectus; at si obscurata ora fuerit major semicirculo, tunc pro sagitta luminaris addendum est residuum diametri, semper sc. ea pars diametri, quae in umbra est. (Vel subtrahe sagittam umbrae a sagitta luminaris pro residua parte luminosa.) Ita conflabitur summa scrupulorum deficientium.

Typus operationis per Logarithmos.

Sit residua ora lucida 81°

dimidiae $40^{\circ} 30'$ logar. 43155

Sit semidiameter $\curvearrowright 17' 1''$ — 126000 sexagenarius

logar. 169155 sexag.

Hic ostendit $11' 3''$, quod est dimidium lineae sectionum. Hinc sagittae per antilogarithmos.

Semidiameter umbrae sit $48' 36''$ Antil. 9. 98

Lunae $17' 1''$ Antil. 1. 225 Semissis lineae sectionis $11' 3''$ Antil. 0. 515

0. 515 Ergo resid. semid. $47. 18$ 9. 465

Resid. sem. $12. 57$ 0. 710 Sagitta umbrae $1. 18$

Resid. diam. $29. 58$ quia plus semicirculo in defectu.

1. 18

31. 16, quantitas defectus. *)

Problema XII.

Data diametro luminaris deficientis, quantitate arcus orae vel lucidae vel tenebrosae, et quantitate defectus, indagare semidiametrum umbrae Terrae.


Problema est argutum magis, quam utile. Data enim semidiametro luminaris, erit ut sinus totus ad sinum arcus lucidi dimidiati (schem. 3) LF vel HP, sic haec semidiameter ad FI vel PR semissem lineae per sectiones. Deinde ut idem totus ad sagittam ejusdem arcus, sic semidiameter luminaris ad LI vel HR rectam, quae in lineam per sectiones terminatur. Aufer ab hac linea quantitatem defectus, expressam eadem mensura cum semidiametro luminaris, sc. LK vel HN, residuum erit sagitta umbrae KI vel NR. Ut vero haec ad priorem semissem lineae per sectiones, sc. ad FI vel PR, sic haec ad residuum de diametro umbrae sc. ad IN vel RK.

Theorema XVII.

Si duo circuli inaequales se mutuo secuerint, ducta recta per centra, eique ex centro minoris erecta perpendiculari, ex centro vero majoris ad perpendicularem applicata composita ex utriusque semidiametro, quadratum hujus perpendicularis aequabit rectangulum sub segmento diametri circuli minoris et sub composita ex hoc et ex distantia centrorum duplicata.

Sint duo circuli, major LEM (Fig 4), centro P, minor OFX centro A, secantes se mutuo in VX, et recta per centra PA ducatur, secans circumferentias, majorem in E, minorem ultra centrum in F et cis centrum in O, et ex A ipsi PF perpendicularis erigatur AB, ex P vero in BA terminetur recta composita ex PL, LB, aequalibus ipsis PE et AF junctis, quae sit BP. Dico quadratum ipsius BA aequale esse rectangulo sub EO et sub composita ex una EO et duabus AP. ($BA^2 = EO (EO + 2AP)$)

Fig. 4.



EO et duas AP.

Scribatur enim circulus centro P, intervallo PB, quem secet PF producta in N, Q. Cum igitur QAB sit rectus, quadratum AB aequale erit rectangulo sub QA, AN. Sed QA est aequalis ipsi EO, quia AE est elementum utrique commune, AO vero vel AF et EQ vel LB constitutae fuerunt aequales. AN vero est aequalis compositae ex EO et AP bis. Quia enim EO aequat AQ, AQ vero et AP aequat PQ, quare et EO cum AP aequat PQ, h. e. PN: accedat igitur ad PN ipsa AP secundo: tota AN aequabit

Problema XIII.

Data quantitate defectus et proportionem semidiametri Lunae ad arcum dimidiaae durationis, invenire proportionem ejusdem semidiametri D ad semidiametrum umbrae et ad latitudinis arcum.

Datur proportio OF et ad OE (schemate 4) partem deficientem et ad AB arcum dimidiaae durationis. Igitur quadratum OE auferatur a quadrato AB, residuum transformetur in rectangulum, cujus alterum latus aequet EO bis, reliquum latus erit PA, cui addatur AE, differentia inter AO, OE; vel alterum latus aequet EO, reliquum erit PA bis. Quia enim BA quadratum aequat rectangulum ex OE et composito ex OE et PL duplo, quare communi quadrato OE utrinque ablato, relinquetur illic differentia quadratorum BA et OE, hic OE . 2PA, vel PA . 2OE.

Sit FO = 34' 2"	Deficient 33' 20"	Et sit BA 54' 22"
Ergo PA = 27. 6	Logarithmus 58790	logarithm. 9672
AE = 16. 19	117580 — 18. 31	logarithm. 19744
PE = 43. 25	49. 15	— — 66900
	30' 44"	— — 56710
	FO 34. 2	— — 10190. 1/2
	Duplum PA 54. 12	

Theorema XVIII.

Si circulum majorem contigerint duo circuli minores inter se aequales, alter intra, alter extra ab eadem plaga a centro majoris, connexisque centris minorum et cum centro majoris et inter se per rectam continuatam, ducatur ex centro majoris perpendicularis in illam, rectangulum sub differentia duarum, quae centra minorum cum centro majoris connectunt, et sub composita ex utraque, juncto quadrato ejus, quae inter centrum interioris et perpendiculararem, aequale erit quadrato ejus, quae inter centrum exterioris et eandem perpendiculararem.


Vel: si latus unum trianguli rectanguli secuerit recta ex opposito angulo, triangulum minus constituens intra majus, communi angulo recto: parallelogrammum rectangulum sub differentia hypotenusarum et sub composita ex utraque, una cum quadrato lateris in triangulo minori, aequabunt quadratum lateris in triangulo majori.

Trianguli ABD latus BD secetur in C per rectam AC, ex A angulo opposito ductam, ut sit minus $\triangle BAC$, communi angulo recto B: et in AD determinetur ipsi AC aequalis AE, dico rectangulum sub ED et sub

composita ex DA, AC cum quadrato CB, aequare quadratum BD.

Nam quia B rectus, CA², h. e. AE² = AB² + BC². Sed AD² = DE² + EA² + 2DE . EA; quare si pro EA² substituas AB² + BC², erit AD² = DE² + 2DE . EA + AB² + BC². At vero DE² + 2DE . EA = ED (DA + AE) = ED (DA + AC). Ergo AD² = ED (DA + AC) + AB² + BC². Porro idem AD² = AB² + BD², ergo ED (DA + AC) + AB² + BC² = AB² + BD². Commune aufer AB², relinquetur illic ED (DA + AC) + BC², hic BD², aequalia, q. e. d.

Fig. 5.



Problema XIV.

Data diametro Lunae DE et arcu incidentiae CD, cum arcu dimidia morae CB in eclipsi totali, invenire semidiametrum umbrae AF et latitudinis arcum AB.

Constructio: Addatur arcus incidentiae DC ad arcum dimidia morae CB, ut fiat arcus durationis dimidia DB, et super DB fiat quadratum, unde auferatur quadratum super BC, residuum transformetur in rectangulum latitudine diametri Lunae DE, fiet longitudo aequalis compositae ex DA, AC, seu duplae ipsius AF semidiametri umbrae: deinde ablata ab AF semidiametro Lunae FE et super EA vel CA quadrato facto, exque eo ablato quadrato ipsius CB, residuum in formam quadratam redactum latitudinem sortietur AB, arcum latitudinis.

Sit diameter $\text{DE} = 31' 44''$, arcus incidentiae $\text{DC} = 36' 30''$, arcus morae dimidia $\text{CB} = 39' 46''$. Ergo arcus DB durationis dimidia $1^\circ 16' 16''$, hujus quadratum est $1^\circ 36' 52''$. Sed quadratum morae dimidia (CB) est $26' 22''$

quod aufer $26. 22$

1. 10. 30. Hoc divide per duplum diametri DE

1. 3. 28 provenit $66' 39''$ AF.

Hinc aufer semidiametrum DE 15. 52

relinquitur $\text{AC} = 50. 47$. Cujus quadratum est $42' 58''$

Hinc aufer quadratum morae dimidia $26. 22$

$16' 36''$

et hujus latus $31' 33''$ est latitudo. *)

Problema XV.

Data semidiametro Solis, data etiam semidiametro umbrae a priori, h. e. non per parallaxin Solis, data denique parallaxi Lunae, indagare et parallaxin Solis.

Adde semidiametros \odot et umbrae, a summa aufer parallaxin D , relinquitur parallaxis \odot . Nam per th. III. semidiametri \odot et umbrae sunt aequales junctae junctis parallaxibus \odot et D .

Problema XVI.

Manentibus ceteris, pro parallaxi vero D pura data parallaxi D a \odot ex observatione eclipsis \odot , eandem parallaxin \odot indagare.

Adde semidiametros \odot et umbrae ut prius, a summa aufer parallaxin D a \odot , relinquitur duplum parallaxeos \odot .)

Problema. 9)

Data quantitate et loco unius eclipsis septentrionalis et unius australis, utriusque vel pene totalis vel pene nullius, ut sit tanto securior aestimatio, utriusque circa apsidas oppositas, et siquidem utraque ab eadem plaga nodorum fuerit, etiam nodorum locis datis, dato denique angulo latitudinis et diametris Lunae apparentibus, invenire semidiametrum umbrae.

Data sit eclipsis ☾ septentrionalis a. 1620, nocte quae sequitur 26. Junii, Sole in $4^{\circ} 45'$ ☉, quantitate $2' 20''$, anomalia eccentrici existente circiter 15° , nodo in $14^{\circ} 57' 30''$ ☉, semidiametro ☾ $14' 44''$. Et quia centrum umbrae abest a nodo per $10^{\circ} 12' 30''$, angulo existente $5^{\circ} 18'$, erit latitudinis arcus inter centra $56' 31''$. Adde defectum $2' 20''$, conficietur summa semidiametrorum $58' 51''$. Igitur ablata semidiametro ☾ $14' 44''$, relinquitur semidiameter umbrae uno loco, circa sc. apogaeum ☾: $44' 7''$.

Data sit altera eclipsis austr. a. 1620. nocte, quae sequitur 20. Decbr. Sole in $29^{\circ} 2' 34''$ ♄, quantitate digitorum $10\frac{3}{4}$, qui in anomalia eccentrici 169° prope perigaeum, Lunae semidiametro existente $16' 43''$, sunt $29' 43''$, nodo existente in $5^{\circ} 35'$ ♄, qui cum absit a centro umbrae per $6^{\circ} 32' 26''$, manente angulo priori, dat inter centra $36' 27''$. Cui si addatur defectus $29' 43''$, conficietur summa semidiametrorum $1^{\circ} 6' 10''$. Unde subtracta semidiametro ☾ $16' 43''$, relinquitur semid. umbrae circa perigaeum $49' 27''$. Adde hanc prius inventae $44' 7''$, summa $93' 34''$ dimidiata ostendet in long. media semidiametrum umbrae $46' 47''$.

Quodsi nodus utrinque $11'$ fieret anterior manente angulo, latitudo utraque esset $1'$ minor, sic et utraque semidiameter umbrae, et summa igitur $2'$ esset minor, et media denique $1'$ minor, sc. $45' 47''$.

Ita si aestimatio peccasset vel utrobique vel altrobique et si summa peccati esset $2'$ nimia, res per correctionem recideret eodem, manente nodo.

Problema.

Datis iisdem ut in antecedenti, eccentricitatem Lunae arguere; assumpta parallaxi et diametro Solis, et distantiam ☾ a Terra.

Sit enim ut supra semidiameter umbrae in prima $44' 7''$, in secunda $49' 27''$. Adde igitur semidiametrum ☉, illic $15' 0''$, hic $15' 33''$, summae erunt illic $59' 7''$, hic $65' 0''$. Hinc ablata parallaxis ☉, illic $1'$, hic $1' 2''$, relinquit illic $58' 7''$, hic $63' 58''$. Ergo distabat Luna a Terra illic 5914000, hic 5374000. *) Necdum distabat illic longissime, hic brevissime. Nam ut 96593 sinus compl. anom. 15° , et 98153 sinus compl. anom. 169° ad semicirculum, in summa 194746 ad 200000, ita differentia distantiarum 540000 ad totalem 553500. Quodsi summa distantiarum 11288000 valet 194746, in ea dimensione 553500 valebit eccentricitatem duplicem 9550, simplex igitur esset 4775.

Quodsi in defectu primo peccatum esset aestimando, semissisque scrupuli detraheretur de defectu $2' 20''$, ut restet $1' 50''$, vicissim in defectu secundo aestimatus sit defectus non satis magnus, ut si fuisset non $\frac{1}{2}$, sed $\frac{1}{10}$; non $10\frac{3}{4}$, sed $10\frac{1}{2}$ dig. et sic non $29' 43''$, sed $30' 13''$, jam apogaea umbra proveniret tenuior, perigaea crassior, manentibus latitudinibus: paulo igitur altior fieret ☾ in apogaeo, paulo humilior in perigaeo; tandemque eccentricitas hoc pacto conficaretur 6543.

Theorema.

Datis aliquot ☉ eclipsibus cum tempore interlapso, cognoscitur motus latitudinis ☽ crassiori Minerva.

Cum enim non in omni novilunio ☽ subtercurrat Soli, sed plerumque ad latera evagetur, quoties ergo ☽ subtercurrit ☉, necesse est, vicinam esse intersectionibus orbium Solis et sui.

Vicissim cum Solis orbis ab orbe Lunae secetur duobus locis inter se oppositis, si igitur ☉ iisdem diebus anni incurreret in nodos, novilunia vicina praestans ecliptica, eodem coeli loco nodi persisterent, et sic Lunae eadem elongatio esset in latum seu ab intersectionibus, quae est a fixis. Sin vero serius in annis sequentibus eclipses inciderent, argumentum esset, nodos progredi; sin maturius, regredi. Ex quo progressu et regressu necesse est alias esse elongationes Lunae a sectionibus ab iis quae sunt a fixis.

Praxis: Anno 1605. 2/12. Oct. fuit magna Solis eclipsis et rursum a. 1601. 14/24. Dec. Cum igitur a. 1601. eclipsis fuerit 14. Dec., anno vero 1605. 2. Oct., et anno 1608. 11. Julii, apparet igitur sectiones retrocedere.

Et cum a 14. Dec. anni 1601 ad 2. Oct. anni 1605 numerentur menses Lunares 47, dies vero desint orbitae Solis complendae 73, quibus respondent de motu Solis gradus totidem, mensibus ergo 47, sive annis 4 minus quinta parte retrocedit sectio per 73°. Et igitur annis 19 retrocedit sectio per integrum circulum, ut sit retrocessus nodorum in anno uno per 19°, in die paulo plus quam 3'. Itaque motus latitudinis Lunae seu elongatio a nodo auctior 3' in die, quam a fixis.

Caput I.

De diametris Solis et Lunae apparentibus.

Diametri ☉ apparens magnitudo constituta fuit in Astr. parte Optica Cap. XI. prob. 1—3, et inventa fuit citra controversiam in apogaeo 30', in perigaeo vero 31', ubi et consensus artificum excussus fuit.

Diameter ☽ paulo plus exhibet difficultatis. Inventa tamen est in Opticis (cap. XI. pr. 4—13) praecipue observatione eclipsis ☉ a. 1601. 14/24. Dec. 30' 30". Ex qua quantitate per ratiocinationem deducta est etiam perigaea quantitas et constituta vel 33' 20", vel 34', vel 34' 40", non adversante peculiari ejus observatione probl. 4. Sed lubet eandem etiam explorare per observationem eclipsis ☉ magnae, quae fuit a. 1605. 2/12. Oct. De hac exstat publice mea epistola, ex qua constat, me Pragae nubibus impeditum fuisse in accurata diametri Lunaris dimensione. Observarunt tamen eam ad modum probl. 13. Opt. Maestlinus Tubingae, et Jo. Eriksen Londini in Anglia. Sic igitur scribit Maestlinus (in libello de variis motuum apparentium inaequalitatibus, Tubingae edito a. 1606) et de hac eclipsi et de hoc observandi modo Th. 147: Hic modus observandi ut jucundus et facilis est, ita si rite ad usum accommodetur, certissimus. Ibi enim defectus magnitudo nec non diametrorum Solis et Lunae proportio non rudi et oculari tantum intuitu conjectatur, sed mediante circino in opposita tabula, tanquam Sol et Luna manibus contrectarentur, exacte notantur. Veruntamen quam necessariam limita-

tionem, ut ad usum rite adhibeatur, et omnes errores de quibus suspectus semper fui excludantur, postulet, Keplerus primus fideliter monuit, et ingeniosissima demonstratione ob oculos posuit. Proxima igitur, Solari eclipsi d. 2. Oct. deprehendimus (quanta quidem praecisione fieri potuit), diametrorum Solis et Lunae proportionem fuisse quam proxime sicut 13 ad 14.

Locum posui integrum, ut axiomata, quae ex observationibus h. e. ab oculis petuntur, pro demonstrationibus (quibus gaudent theoremata) firmentur testimonio clari artificis, quae propria axiomatum est confirmatio.

Cum igitur diameter Solis eo die fuerit $30' 37''$, sequitur ut 13 ad 14, sic $30' 37''$ fuisse ad diametrum Lunae $32' 58''$, quam ego in epistola dicta usurpavi $32' 59''$, ex jam allegatis meis ratiociniis. Admirabilis quidem consensus et certe suspectus aliquibus futurus, nisi fulciretur observatione Anglicana. Etsi quid opus esset Maestlino, celebri astronomo, adulari suo olim discipulo? An fortassis ipsa mihi adulata est numerorum 13 ad 14 inter se primorum proportio? quae multo promptius oculis ex schemate Solari, quam menti ex calculo sese offert.

Sed et Jo. Ericksen audiamus. „Eclipsin Lunae hic observare non potui, Solis initium propter loci incommoditatem etiam non vidi, sed medium et finem. Confeceram mihi peculiare instrumentum 14 pedum longum paulo aliter atque Kepleri, cum quadrante. (Opt. p. 340.) Distantia tabellarum erat 9168, semidiameter fenestras illarum $4\frac{1}{2}$, radii Solis 45, Lunae 39. Hinc Solis semidiameter $15' 12''$, Lunae $16' 20''$. Ut omnino experientia testetur, Keplerum vere jam antea suspicatum de nimis magna Lunae diametro &c. Communica haec Keplero, qui docuit me hunc modum observandi, ut et hoc testimonio (si forsitan apud vos non fuerit serenum) in speculationibus suis fruatur.“

En tibi Londini in Anglia diametrum Solis $30' 24''$, quam ego usurpavi $30' 37''$, Lunae vero diametrum $32' 40''$, quam eodem momento Maestlinus Tubingae in Suevia observavit $32' 58''$ quam proxime: exque hac collatione diversissimorum locorum, et de certitudine hujus modi observandi et de quantitate hujus Lunae apparentis diametri judica. Major enim consensus peti ab oculis non debet.

Cum autem fuerit anomalia Lunae $4^{\circ} 19'$ sive 139° , ejusque sinus versus 175471, ut igitur hic ad totam diametrum 200000, sic differentia inter quantitatem apogaeam $30' 30''$ et $32' 58''$ hujus loci, id est $2' 28''$ ad totam differentiam inter diametrum apogaeam et perigaeam $2' 49''$. Itaque in ipso perigaeo diameter Lunae $33' 19''$. Quod est consonum meis ratiocinationibus, de quibus paulo supra, et infra Cap. III, ubi limitabitur haec jam ex observationibus constituta quantitas, ut omnia omnibus consentiant, fietque in apogaeo ... in perigaeo...¹⁰) Notandum autem, quod Luna ex ipso Telluris centro, ad quod aequum est ejus apparentes diametros referri, utraque in eclipsi paulo minor fuisset spectata, ut monui Opt. p. 354. Proportio tamen apogaeae diametri ad perigaeam ex his observationibus non variatur sensibili aliqua quantitate, propterea quod utriusque observatio humilibus luminaribus est facta, nec multo altioribus in 19° quam in 3° , eadem utrinque diei hora: tota quippe differentia altitudinum 90° non plus varietatis exhibet, quam $30''$.

Caput II.

De motu Lunae horario in syzygiis.

Cum horarius Lunae ex observationibus fide dignis haberi possit, jure inter principia assumitur.

Sequitur quidem ex hypothesibus artificum aliquis certus horarius in singulis anomaliae Lunae partibus. At causae sunt, cur iis solis hac in speculatione non utendum, neque testimonia observationum de iis negligenda existimem. Nam cupio hanc materiam, quoad fieri potest, per se stare, ut sit et comprehensu faciliior et fide dignior. Latuit enim veteres aliquid circa horarium Lunae in conjunctionibus et oppositionibus: quod posterior Brahei diligentia in lucem extulit. Satisfaciendum itaque sollicitudini geometricorum ingeniorum, quae propter hanc leviusculam differentiam cavendum sibi putabant ab horariis, qui nobis ex auctorum hypothesibus offeruntur.

Maestlinus (Epit. Astron. p. 444) ex hypothesibus Ptolemaicis prodit, in una hora superari Solem a Luna apogaea 27' 52'', mediocri 30' 29'', perigaea 33' 35''
Rheinholdus in Prut. Tab.

(p. 96. 97) ex Copernico sic:	26. 33	—	30. 9	—	35. 7
Tycho Braheus in Tab. Lunaribus (Progymn. p. 128):	27. 12	—	30. 42	—	35. 37.

Sed necesse est, Ptolemaeum et Copernicum in quantitate convenire, cum hypothesibus utantur circa hanc rem aequipollentibus. Etenim quod Copernico praestat epicyclium, retrahens Lunam apogaeam sub Sole transeuntem in antecedentia, et perigaeam promovens in consequentia, plus quam fert ratio majoris epicycli: idem Ptolemaeo praestat apogaeum epicycli medium, semper vicinius lineae per Solem et Terram ductae, quam apogaeum ejusdem epicycli verum vel punctum concavitationis, et perigaeum e contra remotius. Itaque horarii Maestlini nituntur tantummodo simplici consideratione epicycli. Qualem rationem et Braheus in suo horario et diurno ficto sequitur (loc. cit. p. 128.), quo articulos conjunctionum et oppositionum inquit, quia in illis articulis epicyclus et variatio plane nihil turbat. Apogaeae enim Lunae horarium exhibet 27' 43'', perigaeae 33' 24'';

Maestlinus: 27. 52 — 33. 35.

Nec alios quam Copernicus horarios veros exstrueret Braheus ex sua hypothesi Lunae, quippe qui epicyclium Copernicanum plane retinet, situ solum emotum, et ad Terram detractum: nisi superveniret apud ipsum motus, quem ipse variationem dixit, omnes horarios Lunae in copulis auctiores efficiens. Itaque observationum testimonium interponi necesse est, ut appareat, differentiam horariorum hypotheticorum apud diversos auctores ut plurimum minorem esse, quam differentiam ipsarum inter se observationum, aut sicubi majuscula est apud auctores, cuinam igitur ex auctoribus circa horarium fides sit adhibenda.

Ceterum variis modis ex observationibus elicitor horarius. I) Exstat inter problemata Cap. XI. Opt. probl. 26. huic instituto idoneum. Praesupponit autem probl. 24, in quo docetur, quomodo ex observatione eclipsis Solis eruatur longitudo et latitudo visibilis Lunae a Sole. Quatuor enim haec accurate notanda: 1) Certum horae momentum, 2) quantitas defectus, 3) diametrorum Solis et Lunae apparens magnitudo, 4) lineae per

centra Solis et Lunae inclinatio ad circulum verticalem. Quae omnia quomodo habeantur modo observationis admirabili, artificioso et jucundissimo, vide problemata praecedentia ejus libri. Modus quidem sic medium tenet inter opticam et astronomiam, ut nescias, ad utram scientiam potius eum referas. Itaque passim in illo libro nuncupavi hunc, quem hic scribo, partem secundam illius, interdum appendicem: cum ille potius hujus praebulum dici debeat.

His quatuor rebus uno et eodem momento observatis, habetur per probl. 24. longitudo et latitudo visibilis ad illud momentum. Id vero si fiat duobus momentis a se mutuo distantibus justo temporis intervallo: jam probl. 26. superexstruit veram utroque momento longitudinem et latitudinem, proinde et verum motum Lunae a Sole, competentem tempori interjecto, quem horarium dicimus, si quantum de eo competat uni horae, constituitur.

Assumit tamen problema illud 26. hanc conditionem, ut mediocriter sit praecognitus parallaxeos Lunaribus excessus super parallaxin Solis, in quo si quid falsum admittitur, non penitus sanus prodibit horarius. Etsi 2' vel 3' in parallaxi falsitas utrinque eadem parum nocet horario. Deinde si 1' vitietur motus duarum horarum, quod facile fieri potest, propter titubationem manuum et instrumenti, quando observatur inclinatio circulorum aut quantitas eclipsis, dimidio jam minuto vitietur motus unius horae, quantum in Braheanae hypotheseos horario vix peccari potest.

Utamur nos tamen exemplis, non quasi indemonstratis superstructuri demonstrationem, sed ut consensus appareat.

Anno 1601. d. 14/24. Dec. h. 1. 17 $\frac{1}{2}$ ' in eclipsi Solis, cujus exstat descriptio fol. 395. Opt., fuit inter verticalem et circulum per centra 72', cum eclipsis initium notaretur, Lunae centro infra Solis centrum ad occasum. Quantitas defectus exigua: quippe in ipso contactu luminarium, cum qui Solem ipsum intuerentur, nondum quidquam cernerent deficere. Summa semidiametrorum Solis et Lunae erat 30' 40". Itaque distantia centrorum fuerit 30' 40". Tempus annotatum et locus Solis exhibent culminantem 20 $\frac{3}{4}$ ° \mathcal{S} , itaque fuit angulus inter verticalem Solis et eclipticam 76° 9'; cum quo comparatus angulus 72°, qui fuit observatus inter verticalem et circulum per centra, arguit angulum inter eclipticam et circulum per centra 4° 9', qui ex tabula parallactica cap. IX. Opt. sub columnis 30', 40" exhibet visam latitudinem centri Lunae a centro Solis 2' 14", ejus vero complementum 85° 51' longitudinem 30' 40". Ponamus parallaxin Lunae a Sole in horizonte et circulo verticali esse 56', quia ut dictum excessus aliquot scrupulorum in hac fictione nihil nocet praesenti negotio. Cum igitur culminet 20 $\frac{3}{4}$ ° \mathcal{S} , in nonagesimo erit 15 $\frac{3}{4}$ ° \equiv , qui distat a vertice 70° 4' Praegae, in loco observationis. Atque haec distantia 70° 4', quaesita in margine parallacticae, exhibet sub columna 56' parallaxin latitudinis 52' 38", unde ablata visa latitudo Lunae a Sole (austr.) 2' 14", constituit latitudinem Lunae ab ecliptica 50' 24" bor. Ejusdem vero distantiae 70° 4' compl. 19° 56' sub eadem columna exhibet parallaxin longitudinis horizontalem 19' 5".

Cum vero 15 $\frac{3}{4}$ ° \equiv sit in nonagesimo, et Sol in 2° 53' \mathcal{S} , distat igitur a nonagesimo in occasum 42° 52', quae distantia sub columna 19' et 5" exhibet longitudinis parallaxin in occasum seu antecedentia 12' 58", quam aufer a visibili Lunae praecessione 30' 40", prodit quasi vera pra-

cessio Lunae $17' 42''$. ¹⁾ Eodem modo etiam alio momento, sc. hora 3. $9\frac{1}{2}'$ observati sunt digiti $6\frac{1}{2}'$, inclinatio centrorum 14° a verticali ad sinistram. Distantia igitur centrorum per probl. 12. est $10' 28''$. Tum culminat $18^\circ 5'$ \approx et secat verticalis eclipticam angulo $60^\circ 30'$. Itaque circulus centrorum angulo $46^\circ 30'$, dans ex columnis $10'$ et $28''$ latitudinem visam bor. $7' 36''$, ejusque complementum $43^\circ 30'$ dat longitudinem Lunae a Sole visam $7' 26''$. Et quia cum $18^\circ 5'$ \approx versatur in nonagesimo $22^\circ 3'$ \times , distans a vertice $60^\circ 3'$, erit per usurpationem prioris parallaxeos quasi verae latitudinis parallaxis $48' 32''$, cui addita visa latitudo $7' 36''$, quippe borealis, facit Lunae veram latitudinem hoc momento $56' 8''$, complementum vero $29^\circ 57'$ distantiae nonagesimi a vertice dat longitudinis horizontalem parallaxin $27' 57''$. Sed quia Sol abest a nonagesimo per $79^\circ 5'$, ergo sub columnis $27' 57''$, respondet longitudinis parallaxis $27' 27''$ in occasum, cui adde visam Lunae superationem $7' 26''$, prodit quasi vera superatio $34' 53''$. Atque hoc est alterum momentum.

Jam horarium hinc eliciemus, comparato momento utroque. Ablata quippe est ex motu Lunae a Sole parallaxis, relinquitur igitur verus motus Lunae a Sole.

Et quia h. 1. $17' 30''$ Luna praecessit $17' 42''$
hora vero „ 3. 9. 30 secuta est per 34. 53, ergo horis

1. 52 promota est a Sole per $52' 35''$. Itaque horae uni competere-
nt 28' 10'': Luna in apogaeo fuit. Braheus, ut supra dictum, Lunae in apogaeo
dedit $27' 12''$.

Per inclinationum vitium nihil peccari potuit in longitudine. Nam in principio parum mutabantur, in posteriori momento celeriter quidem mutabatur inclinatio, sed distantia centrorum fuit parva, ut unus gradus aberrationis in inclinatione causari potuerit non ultra $8''$. Diametri luminum etiam certae sunt. Superest aestimatio defectus. Ego enim hic ita operatus sum, ac si nihil adhuc defecisset in principio. At si nihil defecisset, ego non agnovissem initium defectus. Quodsi in principio, quando ego agnovi defectum, jam defecit pars Solis tricesima, horarius jam fit dimidio minuto minor. Eadem et de altero momento tenenda. Sed videamus, si $6'$ majorem justo assumissemus parallaxin Lunae a Sole, quantum variaretur horarius Lunae. Utamur pro $56'$, columna $50'$; ergo priori momento cum arcu $19^\circ 56'$ eruitur horizontalis longitudinis $17' 2''$, de qua distantiae a nonagesimo $42^\circ 51'$ competit $11' 35''$. Posteriori vero momento cum distantiae a vertice complemento $29^\circ 57'$ sub columna $50'$ excerpitur $24' 58''$. Sub quibus columnis $21'$ et $58''$ cum distantia Solis a nonagesimo $79^\circ 5'$ excerpitur $24' 30''$ differens a priori parallaxi longitudinis $12' 55''$, cum, usurpata priori parallaxi $56'$, discrepaverint per $14' 29''$, itaque motus ad h. 1. $52'$ minor jam fiet per $1' 34''$. Itaque horario decederent $47''$: et hoc per errorem in parallaxi $6'$, quantum procul dubio in hoc opere non sum commissurus. Unius itaque minuti error in parallaxi hic non plus vitiat horarium quam $8''$ circiter.

Si cum arcubus $70^\circ 4'$ et $60^\circ 3'$ parallaxes eruuntur latitudinis $47'$ et $43' 19''$, quarum differentia $3' 41''$, ablata a summa visarum latitudinum, quia sunt affectionis diversae, sc. a $9' 50''$, relinquit $6' 9''$ variationem verae latitudinis, quae prius erat $5' 44''$.

Alterum exemplum (ex fol. 390. Opt.) sit in eclipsi anni 1600. 30. Jun. vel 10. Jul. Graetii Styriae, alt. poli $47^\circ 2'$. Principium fuit h. 12. 38',

inclinatio $72\frac{1}{2}^{\circ}$, culminabat 27° ☉, angulus verticalis et eclipticae $83^{\circ} 2'$. Ergo angulus eclipticae et circuli per centra $10^{\circ} 32'$. Et quia Solis diameter $30' 2''$, Lunae vero anomalia sig. 8. $14^{\circ} 30'$, Lunaeque ideo diameter $32' 20''$, summa igitur semidiametrorum est $31' 11''$, quae cum angulo dicto ostendit visam latitudinem Lunae a Sole $5' 34''$, long. $29' 56''$. Hora 2. $42'$ inclin. $64^{\circ} 15'$, quantitas defectus in radio fimbriato paulo minor 4 digitis. Itaque distantia centrorum $25' 4''$. Culminabat 28° ☽. Angulus verticalis et eclipticae $55^{\circ} 7'$, ex quo et inclinatione habetur angulus inter centrorum circulum et eclipticam $44^{\circ} 53'$. Itaque latitudo visibilis $17' 40''$, longitudo visibilis Lunae a Sole $17' 42''$, promotaque est Luna ad visum per $47' 38''$ in longitudinem, in latitudinem vero $12' 6''$.

Parallaxin assumam $59'$, ut Luna tribus circiter semidiametris Terrae sit humilior, quam in priori exemplo. In primo igitur momento fuit in nonagesimo $21\frac{1}{2}^{\circ}$ ☉, cujus a vertice distantia $25^{\circ} 40'$ dat parallaxin latitudinis $25' 34''$. In secundo momento fuit in nonag. $14\frac{1}{2}^{\circ}$ ☽, distans a vertice per $32^{\circ} 26'$, itaque latitudinis parallaxis hic $31' 39''$, major quam prior per $6' 5''$. Latitudo igitur vera per $6' 5''$ minus variabatur quam visa, sc. per $6' 1''$ tantum.

Eodem modo per complementa distantiae nonagesimi a vertice $64^{\circ} 20'$, $57^{\circ} 34'$ excerpuntur longitudinis parallaxes horiz. $53' 11''$ et $49' 53''$. De quibus per distantias Solis a nonagesimo $3^{\circ} 22'$ et $26^{\circ} 18'$ ostenduntur parallaxes long. $3' 7''$ et $22' 6''$, quarum differentia $19'$, adjecta promotioni longitudinis a Sole visibilis $47' 38''$, ostendit $1^{\circ} 6' 38''$ promotionem veram Lunae a Sole, tempori competentem inter h. 12.38' et h. 2. 42', horis sc. 2. 4'. Itaque horarius hic esset $32' 12''$, quem exhibet hypothesis Brahei $31' 46''$.

Sic in eclipsi Solis, quae fuit a. 1605. 2/12. Oct., ex observationibus et usurpata parallaxi Lunae a Sole $58' 33''$ inventus est horarius Lunae a Sole nihil differre ab eo, quem prodidit Braheana hypothesis, sc. $34' 10''$. Vide epistolam editam.

In eclipsi Solis anni 1598. 25. Febr. vel 7. Mart., cujus exstat descriptio a fol. 363. in 374. Opt., cum horarius Braheanus esset $33' 38''$, usurparetur vero parallaxis Lunae a Sole $59'$, quamvis incerta observatione, tamen horarius non ultra unum minutum minor evasit, quod vitio observationum tribui potest, quia primi momenti tempus non certo annotatum.

Denique in eclipsi Solis anni 1590. 21. Jul., quae exstat a fol. 374 in 380. Opt. cum usurparetur parallaxis $56'$, ab hora 7. 14' in h. 8. 48', per horas 1. 34' (quantum ex observatione non satis cauta colligi potest) promotio facta est $45' 42''$, horarius igitur $29' 16''$, quem Braheus prodit $27' 56''$. Sed latitudo vera $13'$ variata satis arguit, in observatione vitium inesse.

Sufficit igitur, hoc genus observationum eminus assentiri horario Braheanae hypothesis.

II. Hactenus parallaxin assumi quasi praecognitam. At superest modus, quo, si quis magna ex parvis conjectare velit, et parallaxis Lunae a Sole et horarius una argumentatione ex una Solis eclipsi magna probe observata elici possit, assumto angulo latitudinis, in quo minus inesse dubitationis vulgo putatur. Atque is non absimilis operationi illi, cujus mentio in fine probl. 26. Opt fol. 371. Nam quia uni gradui digressionis Lunae

a nodo (quare 55' digressionis a Sole) respondere putatur augmentum latitudinis circa nodos 5' 13'', parallaxis igitur talis est eligenda, quae latitudinem proferat longitudini ad hunc modulum correspondentem. Quo impetrato certi sumus et de longitudine, i. e. horario, et de parallaxi. Quem ad finem in duobus exemplis supra positis tractavi parallaxes latitudinis, et in primo quidem exemplo longitudinis arcui 52' 35'' latitudinis incrementum competiit 5' 44'', parallaxi 56'. At cum parallaxi 50', digressioni Lunae a Sole 51', respondebat variatio 6' 9'', illa igitur parallaxis verior est, quam haec. In secundo vero exemplo motu a Sole per 1° 6' 38'' Luna deprehenditur latitudinem mutasse per 6' 1'', itaque parallaxis 59' ibi adhibita non multum abesse poterit a vero; et sic et horarius utrinque confirmatur.

Verum plus delectant haec problemata artificio, quam prosunt subtilitate numerorum. Observationes enim nonnisi limatissimae requiruntur, quae vix unquam haberi possunt.

Praeterea supponitur cognitus latitudinis angulus, de quo nihil adhuc dictum. Et quia multo magis prodest hic modus arguendae parallaxi crasiori Minerva, quam horario, pertinet igitur ad sequentia.

Missis igitur his duobus modis horarios observandi, transeamus ad alios, in quibus non tantum nihil indemonstratum praesupponitur, sed etiam magnitudo ejus rei, ex qua ratiocinamur, plenior fidem facit circa id quod ratiocinando concludimus.

Motus Lunae oppositae Soli ad unguem aequales esse motibus ejusdem conjunctae Soli ceteris paribus, tritissimum est apud astronomos. Si ergo prodiderimus horarios in oppositionibus, ii valebunt et in conjunctionibus. Si quis hoc principium negare voluerit astronomis, quod quidem ex omnium illorum hypothesibus sequitur, convinci is poterit consensu horariorum, quos hactenus sub articulo conjunctionum investigavimus, cum iis, qui jam prodibunt ex oppositionalibus. Horarius vero oppositionum habetur facile, si, quantum Luna circa oppositionem progreditur in uno die naturali, exploretur.

III. Diurnos igitur Lunae motus Braheus ut observaret citra mixturam parallaxon, hanc viam est ingressus, ut exploraret, quando Luna esset in nonagesimo gradu a puncto eclipticae oriente. Tunc enim omnis parallaxis in latum abit, nihil in longum. Eo sic facto duobus continuis diebus circa oppositionem, facile patuit Lunae diurnus motus verus.

Anno 1595. 8. Oct. mane fuit oppositio Lunae et Solis, Luna in apogaeo versante. Igitur praecedenti vespera h. 9. 24' circa nonagesimum ab ortu per observationem inventa est in 18° 47' γ , cum latitudine visa 1° 12' meridiana. Sequenti vespera 8. Oct. h. 11. 22', oriente 9° Ω , ipsa observata fuit in 1° 26' $\frac{1}{2}$ δ , distans 8° a nonagesimo. Cum autem 9° δ distaret a vertice circiter 45°, itaque parallaxis $\mu\eta\kappa\omicron\lambda\alpha\tau\eta\varsigma$ 56 in horizonte esset 40' circiter, de qua 8° competunt 5' $\frac{1}{2}$, tantulo promotior erat Luna, quippe quae jam in occidentem propenderet. Sic itaque locus Lunae verus 1° 32' δ . Promota est igitur horis 26 minus 2' per 12° 45', idque a fixis. Interim vero Sol ab iisdem fixis promotus est arcu 1° 2' 20'', Luna igitur a Sole promotus est 11° 42' 40''. Cujus distributione facta in horas 26 minus 2', venit uni horae 27' 3''. Itaque in ipso puncto medio, quando acceleratio (copularum propria) est in summo vigore, plane verisimile est, horarium esse 27' 12''. Potest enim et ratione

diametri Lunae unum fortasse aut alterum minutum abesse in hoc diurno. Nam solet capi distantia marginis Lunae aversi ab arcu diurno, quippe clarioris et integri: postea aestimatione semidiametri Lunae corrigitur distantia Lunae a fixis. Ubi si diameter Lunae nimis magna accipitur (de quo in Opt. Cap. V. fol. 266—268), tunc centrum ejus versus arcum diurnum utrinque introrsum plus justo truditur, et sic arcus iste diurnus brevis efficitur. Parum tamen hoc potest in horarium, quippe omnis error diurni vicesima quarta demum parte attinet horarium. Itaque sat tutus hic modus usque ad sextantem scrupuli.

Sed transeamus etiam ad observationem Lunae motus horarii in perigaeo. Anno eodem 1595. 24. Febr. paulo ante meridiem fuit oppositio Solis et Lunae perigaeae. Praecedente igitur hora 1. 30' post mediam noctem, oriente 29° η distabat occidentalis Lunae limbus ab inferiore capite Π $41^{\circ} 35'$.

Declinatio superioris limbi $15^{\circ} 34' 0''$, centri $15^{\circ} 16'$
 inferioris $14. 58. 40$
 diameter $35. 20$
 semidiameter $17. 40$, certior $16. 40$. vide cap. I. Centrum igitur
 Lunae distabat a capite inferiore Π $41^{\circ} 53'$, certius $41^{\circ} 52'$.

Hinc computatur locus Lunae sic:

Anno 1600. completo fixae asc. recta $110^{\circ} 13'$, declin. $28^{\circ} 55'$
 Annis 6 solidis competit (subtr.) $5\frac{1}{2}$ — (add) $43''$
 Ad nostr. tempus $110^{\circ} 7\frac{1}{2}'$ — $28^{\circ} 55' 43''$
 Complem. declin. fixae: $61^{\circ} 4' 17''$ Compl. dist. $48^{\circ} 8'$ — 74470
 declin. Lunae $15. 16. —$ 12737
 $76^{\circ} 20' 17''$ — 97170 $61733 : 84433 = 73115 =$
 $45^{\circ} 48' 17''$ — 71696 sin. $46^{\circ} 59'$
 25474 $43. 1$
 12737 Fixae Asc. R. $110. 7\frac{1}{2}'$
 84433 $153. 8. 20.$

Cum $153^{\circ} 8' 20''$ cooritur $1^{\circ} 5' 4'' \mp$
 $153. 3. 31$ declin. $11^{\circ} 7' 40''$
 $4. 49$ Decl. Lunae $15. 16. —$
 289 Basis lat. $4^{\circ} 8' 20''$
 $7218 — 7236\frac{1}{2}.$

Ang. $69^{\circ} 8' 25''$ compl. $20^{\circ} 51' 35''$

38105
 $7236\frac{1}{2}$
 26670
 762
 114
 23
 2
 $2757 — 1^{\circ} 34' 48''$ diff. long.
 $1. 5. 4 \mp$
 $29^{\circ} 30' 16''$ \odot locus Lunae in ecliptica.

Locus \odot in $5\frac{1}{6}^{\circ} \chi$. Asc. R. $337^{\circ} 0'$

horae $12. 180. —$
 $1. 15. —$
 $\frac{1}{2}. 7. 30$

$539^{\circ} 30'$
 $360.$

$179^{\circ} 30'$; $29\frac{1}{2}^{\circ} \mp$ in M. C.
 $90. —$

$269. 30$; $29^{\circ} \chi$.

Nocte sequenti post medium h. 2. 56', oriente $14\frac{1}{2}^{\circ}$, fuit orient. limbus \curvearrowright remotus a spica Virginis per $32^{\circ} 26' 20''$			
Declin. fixae	8. 59 A.	Adde semid.	16. 40
	81. 1	Centri remotio	32. 43.
Cent. Lunae	8. 22		57. 17. — 84135
	89. 23 — 99994		2272
	72. 39 — 95460	62. 9. 20	86407 : 97722 = 88421
	4544	27. 50. 40	
	2272	Fixae A. R. 195. 59.	
	97722	168. 8. 20	2. 36
Ang. $67^{\circ} 0' 30''$ compl.	$22^{\circ} 59' 30''$	168. 2. 54 — $17^{\circ} 5' 51''$ η	5. 9. 5
	42430	5. 26.	Declin. 5. 6. 29
	5694		Lun. 8. 22.
	254580000		Basis lat. 3. 15. 31.
	12729000		
	24185		
	25		
	24160 —	1. 23. 4	
		17. 5. 51 η	
		$15^{\circ} 42' 47''$ η locus \curvearrowright in ecliptica.	

Locus \odot $6\frac{1}{2}^{\circ}$ \times A. R. 338
 Horae 14. 210
 Min. 56. 14

	202; 24° \approx in M. C.	15. 8. 43 divide
	90	in 25. 26
	292; 22° \curvearrowright in ortu.	12. 43. — 30
Erat ergo d. 14. h. 1. 30 mane in 29. 30. 16 Ω		2. 25. 43 6
d. 15. h. 2. 56 mane in 15. 42. 47 η		2. 32. 36 Minus
progressa est d. 1. h. 1. 26 per 16. 12. 31		6. 53
vel h. 25. 26		6. 21 30
Aufer motum Solis 1. 3. 48		32 16 17)
	15. 8. 43 divide in 25h 26'.	

Igitur hic horarius in perigaeo prodit $35' 44''$, et minor etiam, quia Luna ultra nonagesimum habuit unius forte minuti parallaxin longitudinis; quae demta horario adimit 2, ut sit $35' 42''$, cum Tychonica hypothesis det $35' 37''$.

In apogaeo observatio prodit paulo minorem horarium Tychonicam, in perigaeo paulo majorem. Id verisimile est sic esse. Braheus enim accelerationem hanc copularum propriam aequalem fecit in apogaeo et perigaeo. At si est physica aliqua ejus causa, oportet eam minus operari in Lunam apogaeam, quam in perigaeam, longius enim illic abest a Terris, voce ipsa testante, quam hic.

Caput III.

De genuina eccentricitate Lunae ad Erythraeos.

Cum non exstent omnium temporum observationes sufficienti diligentia subtilitate habitae, sic ut Lunam in sequentibus demonstrationibus eadem ubique elongatione a centro Telluris usurpare possimus: necessario a nobis inter principia disputandum fuit de metis, inter quas illa vagatur, eaqueque maximo interstitio, ut quid in unaqualibet observatione cavendum

sit, ob aliud et aliud Lunae et Telluris intervallum, nobis versetur ob oculos. Duo vero sunt argumentorum genera, quibus de siderum propinquitate variante ratiocinamur, opticum utrumque. Aut enim quantitas corporis aspectabilis deprehenditur mutari, aut motus. Et postulat priorum capitum series et materia, ut a corpore incipiamus.

Fig. 6.



Sit A Terra, BAD linea apsidum, B centrum Lunae in apogaeo, BC semidiameter: cui aequalis statuatur DE in perigaeo; connectantur extremitates C, E cum A, et sit BAC angulus secundum assumpta capitis prioris $15' 15''$, DAE vero

$16' 40''$; quaeritur proportio linearum DA, AB ad invicem. Cum igitur anguli ad B, D sint recti, et noti qui ad A anguli, scientur etiam C, E anguli residui ad rectum. C quidem $89^\circ 44' 45''$, E vero $89^\circ 43' 20''$. Ut igitur sinus totus ad angulorum E, C tangentes, sic ED vel BC ad lineas DA, BA. Si enim BC vel DE sit 100000, erit BA 22560000, DA vero 20640000. Quibus in unum compositis, fiet BD 43200000. Bisecta vero BD in puncto F, erit BF radius orbis, ut appellant, 21600000. Igitur FA eccentricitas 9600000. Qualium vero FB est 100000, talium AF habebit 4444. Tanto longius abesset Luna, cum abest longissime, quam cum mediocriter. Sed quia plurimum expedit, nos circa rem eandem consensu muniri plurium argumentorum, age et a motu argumentemur. Sic enim apparebit, quid ad illa, quae objici possent, respondendum sit.

Ex motus igitur inconstantia duobus modis ratiocinari possumus de intervallo mutabili: aut enim totos consideramus semicirculos superiorem et inferiorem, aut diurnos motus in ipsis limitibus apogaeo et perigaeo. Prius igitur de totis agemus semicirculis.

Veteres, quo primum tempore coeperunt huic speculationi operam dare, omnem inconstantis motus causam in visum retulerunt, rati, ob hoc solum videri Lunam tardam, quia longius absit a Terra, et velocem, quia vicinior Terra incedat. Hoc posito, ex quantitate temporis, quod inter diversas eclipses Lunae in diversis anomaliae gradibus versantis interlapsum esset, admirabili ingenio eruerunt diametrum epicycli, per quem intervalla Lunae variarentur. Processum omnem explicare non est hujus loci. Quantum vero Luna ceteris planetis (quorum apogaeum non adeo vagum est) assimilari captus causa potest, remitto lectorem imperitiorem ad Cap. X. Opt. p. 336.

Hoc itaque pacto Hipparchus (ut habes Cap. VIII. Opt. p. 313) Lunae distantiam in syzygiis perigaeam exhibuit 71 semidiametrorum Terrae, apogaeam 83, mediocrem 77, igitur eccentricitatem 6, hoc est, qualium radius orbis 100000, talem eccentricitatem 7792, quod est fere duplum ejus, quod ex variata diametro superius erat inventum. Idem Hipparchus, nullo tempore sese corrigens, Lunam in syzygiis citimam pronunciavit abesse 62 semidiametris Terrae, ultimam vero $72\frac{1}{2}$; mediam igitur $67\frac{1}{2}$, et eccentricitatem $5\frac{1}{4}$, h. e. in dimensione consueta 7807. Post hunc Ptolemaeus ista corrigens invenit eccentricitatem 8730, quantus sc. est sinus aequationis maximae Lunae in copulis versantis. Atque hoc longe propius accedit ad duplum ejus, quod ego supra inveni.

Albategnius, retenta quantitate aequationis hujus, nihil etiam in eccentricitate mutare potuit.

Copernicus exiguum aliquid demisit. Nam ejus aequatio maxima copularis in syzygiis $4^{\circ} 56' 20''$ ostendit eccentricitatem 8610. Atque hic modus est investigandae eccentricitatis Lunae idem apud omnes.

Atqui non unum est, quod in hac ratione desiderem. Primum enim innixi sunt principio insufficienti. Non enim omnis variati motus inaequalitas ex fallacia visus oritur: aliquid ipsi etiam Lunae, non minus quam ceteris re vera inest planetis. Quemadmodum enim illorum motus et lentescunt vere, cum a Sole digrediuntur et contrahi in angustum videntur, ob discessum a visu, idque aequalibus propemodum utrisque decrementis, ex quo evenit, ut sinus aequationis maximae non totus, sed parte sui dimidia metiatur eccentricitatem, qua de re vide praeludium loco supra allegato Opt. p. 336, plenissimam vero demonstrationem Commentariis de Marte, cap. XVI. Ad eundem modum et in Luna res habet, ut semicirculus, qui a Tellure longius abest, non tantum minor visui videatur ob remotionem majorem a visu, sed etiam lentius et longiori tempore a sidere decurratur. Quae duae causae compositae cum conficiant aequationem maximam copularem, ut supra dictum, 5° , quaelibet igitur per se causabitur dimidium $2\frac{1}{2}^{\circ}$ circiter: et sic eccentricitati orbis Lunae (epicyclum enim veterum auctorum ego in eccentricum commuto, ut similitum rerum similes etiam sint conceptus) relinquitur non plus quam 4365, dimidium sc. de Ptolemaica: quod minimum abest ab eo, quod ex apparentibus diametris supra invenérām.

Si quis ex me quaerat, qui probem, idem evenire Lunae, quod planetis ceteris, metuatque, ne quid indemonstratum irrepat inter initia: huic ego si analogiam allegem planetarum omnium ipsiusque adeo Solis (Terrae Copernico) causasque physicas, quibus planetae ipsaeque Luna cientur in vacuo aethere nullis revincti orbibus, quarum ingenium hoc est, ut concessa variatione intervalli (quod in Luna certo arguit mutabilis apparentia diametri) necessario et physica motus intentio et remissio sequatur: haec inquam si allegem, repudiabit talis aliquis ut physica ac proinde extranea ab astronomia: perinde ac si contrarium huic axioma de motuum aequabilitate non sit aequae physicum, quod tamen usurpant veteres inter astronomiae principia. Quare, ut litem intempestivam differam, remitto opponentem in Comment. Martis, ubi de Luna peculiare caput Nro. XXXVII. inveniet. In praesentia satis est, coisse nobis duo argumentorum genera in eccentricitatem propemodum eandem, quorum vel solitarium alterutrum probando instituto sufficit.

Braheus, adjutore Christiano Severino (Longomontano) cum videret, causas aequationum ex dimidio esse physicas, idque mihi in Sole succedere, introduxit etiam in Lunam simile quid, more tamen suo, ut qui cum Copernico inaequalitatem motus perosus, aequantes Ptolemaicos seu meas causas physicas speraret, duobus epicycliis exprimi et repraesentari seu salvari posse. Igitur, eccentricitate Ptolemaica, 8700 rotundo numero, ex sinu in tangentem conversa relicta quantitate, pro aequatione $5^{\circ} 1'$ assumpsit $4^{\circ} 58' 20''$, quantum exhibuit numerus 8700 ex tabula tangentium. Eoque secto in partes tres, quod 8700 in tria facile divideretur, et circuli alteri datis 5800, reliquo 2900, effecit ut Luna in apogaeo vel perigaeo versante eccentricitas esset non major quam 2900; quod etiam in partibus tractandis sibi opportunum esse credebat. Vide de hoc et partem primam Comment. de

motu Martis. Verum origine et methodo perspectis, quibus Braheana et quibus mea eccentricitas est exstructa, spero lectorem non magis motum iri Braheana quam Ptolemaica veteri. At non ideo depugnatum est penitus: restat, quod non tantum in veteribus sed etiam in me ipso requiram, ut supra paulo profiteri coeperam. Magnum quidem aliquid est, consentire bisectionem eccentricitatis Ptolemaicae cum variatione diametrorum, ut jure credas, acquiescendum in hac eccentricitate 4360, repellendasque fortiter si quae ingruant objectiones aliae. At primo imbecillis est et timida experientia diametri Lunae apogaeae in speculatione adeo subtili, non alia quidem re, quam ipsa solitudine: optandumque (si impossibilia homini optanda) ut multae hujusmodi existerent, atque ita inter multarum errorculos pro certo sumi posset, quod est medium. Quid enim, si parvo aliquo aberravit non oculus in aestimando, sed longe ante manus in construenda circinoque metienda fenestella et lunula papyracea, quam facile potuit me effugere tertia pars minuti? Quod nolim eo trahi, quasi de toto hoc negotio concederem. In rebus enim minutis, ubi semisses et quadrantes facile est internoscere, ab unciis jam difficultas potest incipere. Sunt igitur hae meae copiolae in hac subtilitate tuenda timidiusculae. Ex adverso vero validus ingruit hostia, magna verisimilitudine pugnans, qui profecto contemni non potest. Quod sic habet. Veteres inaequalitatem motus Lunae extruxerunt ex solis eclipsibus Lunae. Umbra enim Telluris pro instrumento fuit astronomico, arguens verissimum Lunae locum in Solis opposito. In hunc modum constituta ratione inaequalitatis Lunae in oppositionibus, cum postea Ptolemaeus perenderet observata in quadraturis, invenit totius inaequalitatis rationem in quadraturis longe aliam, majorem nempe aequationem maximam, sc. $7^{\circ} 40'$, pro quo Braheus correctius reponit $7^{\circ} 28'$. Igitur quia aequatio effectus est eccentricitatis causa, effectus vero alius in quadraturis, alius in oppositionibus, concluderunt artifices, et causam, id est eccentricitatem, diversam esse in oppositionibus ab ea, quae est in quadraturis. Ptolemaeus quidem causam auctae aequationis commentus est diminutionem intervalli inter Lunam et Terram parte amplius tertia. Quem refutavit Regiomontanus eo, quod Lunaris corporis diameter non ad hunc modulum augeatur, refutarunt et Copernicus et Braheus argumento parallaxium, quae tantae non sunt in quadraturis.

Copernicus igitur et Braheus diversis inter se modis eandem causam dixerunt eo tempore, quo Luna est dividua, majorem esse orbis Lunaris hic eccentricitatem, ille epicyclum. Qua ratione Copernicus in quadraturis effecit distantiam Lunae ultimam semidiametrorum $52\frac{1}{4}$, remotissimam $68\frac{1}{4}$, vagantem per 16 semidiametros. In oppositionibus vero et conjunctionibus non humiliorem 55, sed altiore $65\frac{1}{2}$, discursu $10\frac{1}{2}$ semidiametrorum. Braheus ob causas supra allatas breviora facit spatia, cui in quadris Luna humillima est $52\frac{1}{4}$, altissima $60\frac{3}{4}$, alta, discursu per $8\frac{1}{4}$ semid.; in copulis vero a 55 in 58 variat sua intervalla, multo minus spatia, quam variatio diametri Lunae, qua in eclipsibus utitur, postulabat. Patetur tamen, in quadris minora adhuc spatia, nimirum, ut alibi inveni, non plane 6 semidiametros Telluris tractatū parallaxium effici.

Hunc in modum artifices ex iis quae apparent, Luna versante in quadraturis, rationati sunt de eccentricitate ejus temporis, quo est Luna in quadraturis, si linea apsium coincidat cum linea per Solem et

Terram ducta, in qua aliis diebus copulantur luminaria. At Luna ex quadris digressa inque copulis versante, ponunt istam eccentricitatem reddi minorem et tantam, quanta requiritur ab observationibus copularum.

At dum ego causas motuum ex physica accerso, videor aliam rationem ingredi debere. Si enim eccentricitas hoc nomine fit aequationis causa physica, quia semicirculus superior a fonte virtutis distat longius, eamque virtutem non ita fortem experitur, ut alter humilior: certe, Sole versante circa Lunae apogaeum (quod veteres dicunt epicycli, ego eccentrici), Luna ideo nanciscitur magnam aequationem in quadris, quia non tantum locus apogaei tunc longius a Terra distat, sed ipsa etiam Luna ante octiduum cum Sole, id est in loco apogaei fuerat, multum tunc a Terris re vera remota, ex quo tempore per dies octo in languidiore virtute usque ad quadram promotam, tanto majorem accumulavit differentiam motus seu aequationem. Vicissim, Sole inter apogaeum et perigaeum Lunae medio loco versante, Luna in copula cum Sole ideo minorem habet aequationem, quia non tantum locus apogaei tunc brevius a Terra distat, sed ipsa etiam Luna ante octiduum in quadra, id est in apogaeo illo fuerat, minus a Terris remota quam prius, cum esset apogaeum cum Sole. Hoc itaque pacto plane contrarium evenit ejus, quod putabant artifices priores, ut angustiora sint intervalla Lunae humillimae et altissimae in quadris quam in copulis, cum illi laxiora fecissent, magnaue sit eccentricitas orbis Lunae, non ut apud veteres singulis quadris, sed rarius, nimirum quoties Sol in lineam apsidum Lunae incidit, quod quotannis fit bis paulo minus. Nisi forte causam quis dicat aliam hujus menstruae aequationum differentiae, cujusmodi ego quidem investigare non potui.

Sed ad rem: et posito, quod aequatio $7^{\circ} 28'$ suam ex his causis habeat originem, cum ejus sinus sit 13000, dimidium 6500 esset eccentricitas orbis Lunae, Sole in linea apsidum Lunae versante.

In schemate priori (Nr. 6) sit AF 6500, qualium FB 100000, ut sit AB 106500, AD 93500. Et sit jam angulus BAC $15^{\circ} 8''$. Ut igitur totus ad tangentem BAC 440, sic AB ad BC $468\frac{1}{2}$. Ei vero aequalis est DE. Ut igitur AD ad DE, sic totus ad 501, tangentem anguli $17^{\circ} 13''$. Diametro igitur apogaea in copulis posita $30^{\circ} 16''$, perigaea evaderet $34^{\circ} 26''$ uno scrupulo major quam supra, quum hic apogaeum usurpemus quarta parte minorem quam supra. Neque dubito, si speculationem hanc super eccentricitate comprobem evidentius, quin omnes me jussuri sint cum observationibus diametri Lunae causa errorculi adeo subtilis transigere.

Hic igitur modus est primus ex totis semicirculis circuitus planetarum ratiocinandi de eccentricitate.

Sequitur alter, qui eandem ratiocinationem ex motu horario in apogaeo et perigaeo deducit.

Demonstravi in Comment. de motibus Martis, proportionem diurnorum in aphelio et perihelio (quibus in Luna respondent apogaeum et perigaeum) esse in proportionem dupla eversa linearum, quae ex centro Terrae in apogaei et perigaei loca ducuntur. Assumantur igitur ex capite II. horarius motus apogaei $27^{\circ} 3''$, perigaei $35^{\circ} 42''$, in oppositionibus. Neque nos turbet illa consideratio, quod scimus, admixtam esse accelerationem copularum (Braheo variationem dictam): jam enim vel ipsae observationes docent illam accelerationem in eadem proportionem cum horariis admixtam illis, manet igitur proportio eadem etiam in compositis motibus (Eucl. V. 21).

F. 6. In schemate superiore (Nr. 6) sit A centrum Telluris, B apogaeum Lunae, D perigaeum, F centrum orbis, G centrum aequantis, AF, FG aequales, per ea quae demonstrata sunt Comment. de Marte.

Primum subtrahamus variationem. Minutis 60 distantiae Lunae a Sole competit acceleratio seu variatio $1' 26''$; sed motus apogaei habet tantum $27' 3''$, perigaei $35' 42''$. Acceleratio igitur ad hunc modulum erit illic $39''$, hic $51''$. Et quia hic vigor accelerationis aequalis ponitur in apogaeo et perigaeo, consentaneum vero est inaequalem esse, id igitur in fine notabimus. Ergo: $27' 3'' - 39'' = 26' 24'' = 1584''$; $35' 42'' - 51'' = 34' 51'' = 2091$. Medium proportionale = 1820; tota BD = 3911; dimidia FD = $1955\frac{1}{2}$, differentia AF = $135\frac{1}{2}$. Sin autem ex FD fiat 100000, tunc ex FA fiet 6930, quod paulo superat prius inventam eccentricitatem 6500. Causa cur superet in inaequalem vigorem conferri potest. Sit enim mediocris vigor ut 200000. Si 200000 dat 39 et 51, tunc 6500 eccentricitas (quam jam praesupponamus ut certam, quia priori modo mediocriter fuit praecognita) dat illic $2\frac{1}{2}$, hic $3\frac{1}{2}$. Itaque pro 39 et 51 debuimus usurpare $36\frac{1}{2}$ et $54\frac{1}{2}$, quibus ablatis ab horariis relinquitur $26' 26\frac{1}{2}''$ et $34' 47\frac{2}{3}''$, vel $1586\frac{1}{2}$ et $2087\frac{2}{3}$, manet autem medium proportionale 1820; tota BD = $3907\frac{2}{3}$, FD = $1953\frac{1}{3}$, FA = $133\frac{5}{6}$. Sin autem ex FD fiat 100000, tunc ex FA fiet 6850 circiter, quod propius ad scopum collineat.

Lubet vero et in Tychonis horario eandem experiri rationem, nam qui ex observationibus desumitur, is in minimis non est adeo scrupulose certus. In apogaeo $27' 12'' = 1632$, $1632 - 36\frac{1}{2} = 1595\frac{1}{2}$; in perigaeo: $35' 37'' = 2137$; $2137 - 54\frac{1}{2} = 2082\frac{2}{3}$. Horum medium proportionale est 1823. BD = $3905\frac{2}{3}$, FD = $1952\frac{1}{3}$, FA = $129\frac{1}{6}$. Valet 6649, quod proximum est priori 6500.

Hic ad pleniorē rei fidem indulgebo nonnihil speculationibus physicis, et detegam lectori objectionem aliquam, quae me diu exercuit. Cum adhuc haererem in antecessorum opinione, existimans eccentricitatem Lunae singulis mensibus augeri et minui, mihiq̃ue ex praemissis fundamentis innotuisset, non in copulis minimam, in quadris maximam, sed vicissim in quadris esse minimam eccentricitatem, in copulis maximam, coepit apud me vacillare fiducia, utramque Lunae inaequalitatem ex eccentricitate exstruendi. Hinc in Opt. Cap. XI, probl. 5. fol. 348. unam aliquam constantem eccentricitatem concepi, quae esset media inter 4336 et 6520, scilicet 5428, quae aequationem efficeret mediam etiam $6^{\circ} 15'$. Hanc vero posui variari per aliam aliquam occultam causam physicam, ut vel ad 5° attenuetur in copulis, vel in quadris excrescat in $7^{\circ} 30'$. De observationibus vero meris diametri Lunae dubitavi, an ejus essent subtilitatis, ut de hoc negotio testari possint.

Causa cur diffiderem eccentricitati ad efficiendam utramque inaequalitatem, fuit haec. Nam posita quantacunque eccentricitate, cum Luna apogaea est in copulis, illa certe eccentricitas non poterit prodere aequationem maximam, quia non operatur illa toto tempore periodi, quippe persuasus eram ab antecessoribus, illam decrescere cum successu mensis. Ergo ut exeat haec quantitas $7^{\circ} 30'$ in quadris, oportuisse putabam longe majorem quantitatem institui, in copula per eccentricitatem longe etiam majorem: cum tamen ne hanc quidem eccentricitatem 6520 satis bene cum observatione diametrorum (Opt. p. 348) conciliare potuerim; ~~neque~~ majorem,

itaque quoties horariorum tractatio in copulis de majori eccentricitate, quam est 6520, testari videbatur, toties animi dubius, horariis assentirer an diametris, abjeci totum negotium desperato explicatu. At non me deseruit physica contemplatio, fidissimus mihi comes per totam astronomiam, imo dux sagacissimus. Ex ea enim tandem patuit, non opus esse, ut menstrua ponatur mutatio eccentricitatis, sufficere, ut sit annua: imo ne stare quidem rationes physicas, nisi sit annua. Etenim in opere de Marte demonstratum est, eccentricitatem circuitus planetae existere a vi magnetica globi planetarii, quae lineis rectis toto corpore globi porrigitur constanter toto circuitu in longitudines medias. Fit itaque raptu globi circa Solem, ut tractus magnetici opposita puncta Soli obvertantur, quae ut opposita oppositam etiam vim obtinent. Nam illo extremo, quod in longitudinem mediam priorem vergit, faciunt globum suum fugere a Sole per ascendentem semicirculum, donec transmisso jugo altera extremitas in posteriorem longitudinem mediam obversa per descendentem semicirculum prolectare incipiat globum suum, ut vicissim ad Solem adnaviget. Ascendere enim est, inter gyrationem extrinsecus sibi illatam fugere a Sole: descendere est, raptui circulari extrinsecus sibi illato miscere accessum suum ad Solem intrinsecus ortum. Haec ex Martis Comment. huc transferenda fuerunt: jam ad Lunam accommodabo.

Luna itaque circa Terram a Terrae gyratione menstruo circumactu gyrata easdem cum ceteris planetis affectiones sui corporis obtinet, sed quibus non Solem longinquum, sed vicinam Tellurem, a qua gyratur, vicissim fugit et appetit: quae etiam efficiunt, ut quamvis Tellus a Sole per aetherem rapiatur, nihilominus Luna illam comitetur semper in justa distantia. Haec igitur virtus magnetica corporis Lunaris, quomodo causetur eccentricitatem aliquam a centro Telluris simplicem, mediocriter patet in exemplo planetarum ceterorum, qui a centro Solis fiunt eccentrici. At quomodo virtus haec Lunae magnetica intendi et remitti possit, ut aliis temporibus aliam cansetur eccentricitatem, id difficultatem habet aliquam, nec profiteor, me totum hunc arcanum naturae thesaurum aperturum: non reticebo tamen, quid diutissime quaerens invenerim, quod numeris et observationibus se accommodet. Nimirum si apogaeum Lunae est cum Sole, vel perigaeum, Luna virtuosam lineam eccentricitatis effectricem tum demum in Terram porrigit, cum est in quadrato Solis. At Luna in quadrato Solis versans diametrum aliquam circuli illuminationis sui corporis etiam in Terram porrigit, et sic, quo tempore Sol habet apogaeum vel perigaeum Lunae locum, toto illo mense pars illuminata Lunae a parte obscura dividitur secundum tractum filamentorum magneticorum, sic ut virtus magnetica et lucis terminatio parallelae sint. Contra si Sol obtineat medias Lunae longitudes, circulus illuminationis Lunae secatur omnes lineas virtuosas ad angulos rectos. At testantur observationes, si Sol obtinet apogaeum vel perigaeum Lunae, tunc fieri aequationes maximas, quadrarum scilicet: quod secundum ista principia tantundem est ac si dicam, Lunam in quadris versantem fortius Terram appetere, et vicissim fugere in opposito, ut ita in apogaeo altius pervadat, in perigaeo humiliter. Consentaneum est igitur, cum virtus Lunae magnetica extentis et rectis lateribus objicitur lumini Solis, sic ut circulus seu terminus illuminationis fiat virtuti parallelus, virtutem hanc magneticam per hunc situm ad Solem intendi; nullam vero ejus esse fortificationem, cum virtus magnetica rectis lineis in Solem porrigitur,

eique puncti modo obicitur, ac si quantitatem hujus situs respectu nullam obtineret: quod fit, si Sol medias Lunae longitudes obtineat. Qua igitur mensura punctum hoc enascitur in lineam, eadem par est crescere et eccentricitatem et aequationes. Sed in sinuum proportionem fit illud, quare et hoc in proportionem sinuum distantiae Solis a mediis longitudinibus crescere necesse est.

Transegisse mihi videbar hisce sic constitutis. At postea me deceptum intellexi, nondum quippe transactum erat in solidum. Nam per has quidem extremas apogaei Lunae habitudines ad Solem integrum fuit mihi, secundam hanc inaequalitatem Lunae ab apogaeo ejusdem incipere, atque sic tantummodo unam et eandem virtutem magneticam in corpore Lunae ponere, sed eam postea intendere aut remittere; atque ingenium ejus tale est, observationibus testantibus, ut a linea per Solem et Terram, scilicet a copulis, incipiat. Fieri enim potest per alios situs apogaei ad Solem, ut nulla sit aequatio secunda Luna extra apogaeum versante, sc. cum est in copulis: et vicissim accidit, ut Luna in apogaeo et perigaeo versans habeat tamen aliquam aequationem secundam: quod evidentissimum erat argumentum, non unam, sed duas in Luna esse virtutes magneticas, quarum prior sit constans, posterior cum discessu apogaei vel perigaei a Sole vel ejus opposito deficiat, et cum quadrante distat apogaeum a Sole plane annihilatur. Cum autem haec secunda virtus quasi magnetica faciat similiter ut prior illa Lunam sequi Terram alternis et fugere, constituatque gradus summos sequelae vel fugae in quadris, juga in copulis: in quadris igitur filamenta sua in Terram porriget. At in quadris circulus illuminatorius Lunae in Terram porrigitur, ut supra dictum, fitque ut uterque illuminationis circulus et Lunae et Terrae coincidant in idem planum, perinde ac si duo magnetes aptent filamenta in eandem rectam, capite unius post caudam alterius stante. Ergo conjectura physica subiecit opinionem, virtutem hanc secundam omnino consistere in illuminatione corporum a Sole; non ut supra, quatenus haec illuminatio fortificet priorem virtutem magneticam, et velut in jus ejus transeat, sed per se, suo ipsius separato situ. Hoc enim posito superiora non evertentur. Apogaeo enim Lunae in Solis loco versante coincidunt situ virtus utraque, quod tantundem est, ac si ut supra dicam, alteram ab altera totaliter fortificari.

Quid vero ad hoc sumus dicturi, quod experientia observationum docet, hanc virtutem secundam, aequationis secundae effectricem, interdum evanescere totam, ut cum est apogaeum loco medio inter Solis locum et oppositum; cum contra haec illuminatio corporum a Sole sit perpetua?

Scilicet hoc insuper adhuc limitandum, illuminationem suo quidem separato situ, ut jam positum erat, effici virtuosam, at non se ipsa, sed quatenus a priore virtute magnetica per applicationem ejus capitis vel caudae imbutur. Non igitur in illam transit fortificatione sua, sed potius aliquid de illa sibi privatim appropriat. Nam se ipsa quidem utrinque ad Terram aequaliter habet illuminatio, nec causa est, cur potius Lunam a Terra fugere faciat, quam accedere, curque eadem plaga jam fugiat, jam sequatur. Illa vero prima virtus magnetica diversas sui plagas, caput et caudam diversis illuminationis plagis aliis temporibus aliter applicans, illas imbutit similiter.

Si physicus aliquis credere non potest, lumen adventitium, quod qualitas est, corpori Lunae novam conciliare vim magneticam, imbuique a priore illa vi magnetica, ut alias corpora ferrea imbuuntur a corporum magneti-

corum virtutibus, is igitur statuat intra exteriorem Lunaris globi crustam latere abditam sphaeram aliam convertibilem intus, quae polos et axem conversionis suae habeat in linea per Solem et Terram, quod potest fieri per naturalem $\phi\omega\pi\eta$ poli in Solem, convertaturque sic, ut quoties Sol ab apogaeo Lunae venit in perigaeum ejusdem, toties illius partes dextimae fiant sinistimae: et tunc positione magis physica plane idem obtinebitur.

In his gradum sistit Keplerus et hinc inde plane interruptus est ordo et series disquisitionum Lunarium. Quae alia insunt codicibus Petropolitanis, documento quidem sunt, Keplerum rem ad finem perducere studio nunquam intermisso statuisse, neque vero ex his fragmentis integra deduci potest et compilari Lunae theoria, nisi quis conetur plane novum concinnare opus, cujus nullum videmus usum neque astronomiae neque historiae hujus scientiae. Ceterum inter manuscripta eorum, quae „Hipparchus“ Kepleri comprehensurus erat, exstat index, et volumine XV. Mss. Petrop., quod totum eclipsium calculis refertum est, eclipsium Lunae 46 (ab a. 1572. ad a. 1625) accurata inquisitio, quam forte Keplerus adjungendam censuit „Hipparcho“. Conscripta certe sunt haec folia Kepleri manu ad typum praeparata, loquitur auctor ut „de libro“ perfecto, admonetque „lectorem“ quasi praesentem. Ratione calculi utitur eadem, quam supra (p. 540) proponit, eamque in omnibus his 46 eclipsibus cum Tychois calculo comparat.

„Index“ autem haec habet: Possent fieri distincta capita utpote: 1) De diametris luminarium observandis, indeque et de eccentricitate Lunae in conjunctionibus et oppositionibus.

2) De motu diurno et horario Lunae in conjunctionibus et oppositionibus observando.

3) De motu et angulo latitudinis, h. e. de latitudine maxima, una cum Lunae parallaxi observanda. Et admonitio super inconstantia hujus anguli. Igitur etiam de observatione hujus ipsius anguli, citra maximae latitudinis considerationem, eaque duplici, vel ex eclipsibus simpliciter, vel cum parallaxi, ex Solis eclipsi, per horarium.

4) Sciametria. 5) Semidiametri umbrae variae. 6) Lunae parallaxes variae. 7) Solis parallaxis, altitudo et corporum proportio.

Eclipsium fasciculus hanc prae se fert inscriptionem:

AD MOTUUM LUNAE RESTITUTIONES PERTINENTIA.

DOCUMENTA PRAECIPUE OBSERVATARUM ET PARTIM EXAMINATARUM ECLIPSIIUM.

Pleraeque eclipses Lincii rursum de novo examinatae, quibus accesserunt etiam sequentium annorum eclipses observatae ibidem.

I. Eclipsis Lunae, quae visa est a. 1572. 25. Jun.

Historia observationis. Corn. Gemma in Cosmocritico ad praecedentem diem 24. annotat ventorum tempestatem magnam in Belgia.

Lauterbachius Graetii Styriae in Ephemeridum libro ad diem ipsum 25. adscripsit magnam tempestatem, ad 26. pluviam. Nec Tycho Braheus hac usus est utique quia etiam in ipsius loco coelum nubilum fuerat. Sane ☉ et ☾ retrogradus jungebantur illis diebus in ☐♂. Itaque valde verisimile est, hanc eclipsin nusquam esse observatam.

Maestlinus tamen in Epitome Astronomiae, ubi definit, quanam eclipses usque ad dimidiam diametrum deficiant, addit, hujusmodi fuisse eclipsin a 72. 25. Jun. Nec tamen, addit, a se observatam esse. (In marg : Tantam computavit et pinxit in libro mscr. Obs., ex Tab Alphons. et Prut. paulo minorem. Addit, eam Tubingae videri non potuisse, toto enim illo die aërem nubibus repletum fuisse, imbris crebris; post h. 12 (m. n.) discussas nubes, aërem temperatiorem fuisse.)

Lauterbachius adscripsit in libro Ephem. principium d. 25. Jun. h. 10., medium h. 11. 25', finem h. 12. 50. Sed videtur hoc non ex observatione sed ex computatione desumsisse. Stadius auctor Eph. ponit Antwerpiae initium h. 10. 40'. Diff. vero meridianorum inter Viennam et Antw. in horis 0. 45; esset itaque medium Viennae plane h. 11. 25, ut scripsit Lauterbachius. Graetii enim et Viennae long. propemodum est eadem, Lauterbachiique manu apposita est diff. inter Antw. et Graetium h. 0. 43'. Atque hic idem L. quantitati hujus eclipseos, quam Eph. Stadianae vestibulum prodit dig. 7. 14', supposuit quaternarium, quasi 4 tantum digiti defecerint, non 6.

Sequitur igitur calculus hujus eclipseos; primum ex T. Braheo. Ad h. 9. 46' median Uranib. invenitur medius ☉ motus ab aequinoctio 3° 13' 49' 56". (Anomalia ☉ 8° 36'; prosthaph. 17° 47' locus ☉ 13° 22' 9" Ep.) ☾ a ☉ 3° 13' 40", anom. 4° 17' 52' 53", motus lat. 24. 2. 3. Quare prosth. ☾ 3° 24' 45" subt. et locus ☾ in orbita sua 13° 38' 51" ☾, ut vera ☾ a calculo 10—11' maturius indicetur. quam assumsi. Verus motus lat. 5° 20' 27' 18"; lat. 49' 36"; semid. ☾ 17' 39", umbra 46' 13", cujus variatio nulla, ☉ in apogaeo versante. Summa igitur semid. 63' 52"; ablata latitudine restant 14' 16". Haec scrupula defectus in diametro ☾ 35' 18" faciunt dig. 4. 51" paulo minus ante 10'. Et quia ☉ in 14° Ep versante temporis aequatio Lunaris ex Progymn. est 4' 42", addenda apparenti, quare hac subtracta a tempore medio h. 9. 46', prodit tempus appar. Uranib. h. 9. 41' 18". Jam tabulae geogr. dant diff. merid. c. c. 36. Medium igitur hoc ex calculo Tychoenis cadit Antw. per correctionem oppositionis h. 8. 55'.

Ex quo apparet, tempora Lauterbachii, qui medium cum Eph. Stadiana ponit in h. 10. 40', esse non ex observatione, sed ex nuda accommodatione ejus, quod Stadius posuit, ad merid. Graetiensem.

Nam Graetii si quod Uraniburgi computatur apparuisset, in h. 9. 57' cecidisset, non in h. 11. 25'. Quare nihil est opus etiam durationem addere, ut quae non est observata. Scrupula quidem dimidia durationis essent 39' 30'', horarius a ☉ rerus ex 2. columna Prog. fol. 128 quippe ultra ☿ extensus, esset 33' 50'', itaque dimidia duratio h. 1. 10' 43'', tota 2^h 21' 26'', cum Lauterb. habeat 2. 50'.

Jam subjungo etiam meum calculum, de cujus tamen epocha nostri temporis in hoc libro deliberatur.

Pro ☉. Anno 1572. 16. Jun. h. 16. 23' ☉ in 5. 13. 59 ☿	
25. " " 9. 46	7. 36. 50
8 dies h. 17. 23	41. 20
57. 5	13. 32. ☿
4983	
32294	
37277	
Pro ☿.	
1571. — 27. 0. 41. 7 — — 4. 6. 30. 55 — — 4. 3. 48. 6	
Majus 152.	31. 46
24. 9. 46. 0	1. 46
203. 10. 27. 7	25. Corr.
Revol. VII. 192. 21. 10. 4 — — 0. 21. 29. 22	4. 3. 39. 34
10. 13. 17. 3 — — 4. 15. 24. 2	10. 12. 50
35. 40	☿ 23. 26. 44 ☿
52012	☉ 13. 32 ☿
125820 Requisitus 13. 34. 28	9. 54. 44 lat. 0. 54. 51
177832	2. 28 Reductio
Parall. ☿ 62. 52	Ipsissima oppositio 13. 34. 28 ☿
☉ 0. 59	Aequatio physica mihi 6' 30'' add. hic sub.
63. 51	Ergo h. 9. 39' 30''.
Semid. ☉ 15. 0	
Semid. umbrae 48. 51	
" ☿ 16. 10	
65. 1 — 17. 880	
Latit. 54. 41 — 12. 660	
Scrupula def. . . 10. 20	Haec scrupula sunt digiti paulo minus 4.
" dur. dim. 35. 10 — 5. 220 ⁽¹⁾	Simplex lat. dat ultra 5, ex voto.
Horar. ☿ 37. 10 Duratio h. 2. 0' 40''	
☉ 2. 23	
34. 47	

Quodsi quantitatem Lauterbachius digitorum 4 observavit, equidem hanc omnino repraesentat meus calculus. Quod autem minor mihi fit eclipsis quam Braheo, id fit ob 2 causas concurrentes. Etsi enim tempus idem ego colligo, at angulo lat. majore et nodo in consequentia remotiore utor: qui concursus causarum plus etiam efficeret, nisi vicissim major etiam umbrae semid. mihi fieret, geometricis demonstr. exstructa, quam Braheo, qui solutus his legibus quantitatem hanc experientiae relinquit, quae propter causas opticas non semper est sui similis. Haec igitur eclipsis ☿ retroposito in antecedentia fieret major et annotationi Maestlini vicinior.

II. Eclipsis Lunae anno 1573, nocte quae sequitur diem 8. Decembris.

Historia observationis. Annus est, quo novum sidus toto fulsit, Braheumque in laboribus astronomicis assiduum cumprimis habuit. In hunc annum diarium latino sermone scripsit, luculento cum praeambulo, quod subscriptionem

habet „in Museo nostro Herivadiensi a. 1572 mense Decembri.“ Sequebatur descriptio eclipsis futurae, cum praescriptione altitudinis magnarum stellarum ad praecipua momenta seu phases, idque in horizonte, cui alt. Poli 56° , long. $36^{\circ} 45'$, 10° sc. minor ea, quam Reinholdus assignat Regiomonti Prussiae. Hoc praecambulum longo post tempore inter epistolas Jo. Pratensis Medici suasque mutuas excudendum dedit, initio facto ad Epistolarum Vol. II; sed quod morte praeventus non ultra 12 paginas continuavit. Sed accessit tamen ad id praecambulum annotatio auctoris, in qua refert, eclipsin hanc a se fuisse observatam in Curia sua Knudsdorpiana. Initium paulo prius quam caput inferioris Π elevaretur $14^{\circ} 30'$, totam extinctam fuisse in alt. ejusdem $22^{\circ} 40'$. Cum inciperet egredi Canicula elatam ad $17^{\circ} 50'$, finem non conspectum ob nubes. At hiantibus postea nubibus totam plenam fuisse, cum supremus margo alt. prae se ferret $50^{\circ} 25'$. Has alt. ita prodit, nec attento quod paulo alias praedixisset.

Computabimus igitur tria dicta omenta.			
34. 0	log. 58126	34. 0 — log. 58126	
Inf. Π 61. 2	" 13364	Canis 83. 45 — "	596
27. 2	71490	49. 45	58722
Dist. a V. 75. 30		27. 2 — 71490	49. 45 — 58722
102. 32 — 51. 16 — 24838		67. 20	72. 10
48. 28 — 24. 14 — 89049		94. 22. — 47. 11 — 30988	121. 55 — 60. 57 $\frac{1}{2}$ — 13440
113887		40. 18. — 20. 9 — 106572	22. 25 — 11. 12 $\frac{1}{2}$ — 163800
42397		137560	177240
		66070	118518
108. 0 — 54. 0 21199		91. 54 — 45. 57 33035	67. 8 — 33. 34 — 59259
A. R. 109. 49		109. 49	109. 15
A. R. M. C. 1. 49		17. 55	42. 7
		1. 49	17. 55
		16. 6	24. 12

Hinc prodit tempus incidentiae h. 1. 4' 24" aut quid amplius, quia eclipsis incepit paulo antequam esset alt. stellae primo prodita. Mora fit. h. 1. 37'. In media igitur mora A. R. M. C. $30^{\circ} 1'$. Et quia \odot anno 73. 8. Dec. ad horam est in $28^{\circ} 50'$ χ° c. c., cujus A. R. 266. 37, hinc tempus apparens medii observati emergit 123. 24. seu h. 8. 14. Locus autem ponitur esse 2' orientior Hafnia, igitur Hafniae medium h. 8. 12'. Pro hoc in Progymn. fol. 02. assumsit h. 8. 3'. In chartis restitutionum habet Chr. Severini h. 8. 6'.

Frid. Rittelius, curialis Principis Wirt. doctrinae hujus perquam studiosus, annotavit ex obs. nescio cujus: medium hujus eclipseos Tub. visum esse h. 8. 57', ita diff. meridd. esset 15. ¹⁴) Invenio etiam Lovanii illam incepisse h. 6. Ablata a vera duratione dimidia 1^h 53', venit Hafniae initium h. 6. 19'. At diff. meridd. major est. Non igitur accurata est obs. Lovaniensis, Corn. Gemmae puto.

Sequitur calculus hujus eclipseos ex Tychone.

Huic aequatio est 1' 5" sub. Ergo tempus medium $8^{\circ} 10' 30''$ circ., restat ad meridiem primam anni 1574. non plus quam 23 d. 15^h 49' 30".

D. 23. — \odot 22. 40. 12	9. 10. 23. 14 — 10. 0. 29. 41 — 10. 4. 16. 30
b. 15. 36. 58	0. 7. 37. 9 — 8. 9. 56 — 0. 8. 16. 7
49' 2. 2	24. 53 — 26. 41 — 27. 0
30"	15 — 16 — 17
23. 19. 12	9. 18. 25. 31 — 10. 9. 6. 34 — 10. 12. 59. 54
Completo 73. — 9. 20. 27. 56	3. 14. 7. 54 — 6. 3. 37. 48 — 10. 10. 56. 17
8. 27. 8. 44	5. 25. 42. 23 — 7. 24. 31. 14 — 11. 27. 56. 23
3. 5. 19. 30	4. 2. 42 3. 3 4. 4. 18
Anom. 5. 21. 49. 14	1. 36 4. 4. 18 0. 2. 0. 41
19. 59	5. 29. 46. 41 7. 28. 35. 32 Lat. 10' 28"
1. 48	8. 27. 8. 44 Horarius 33. 5 \odot a \odot
Prosth. 18. 11	\odot 26. 55. 25 Π 59532
\odot 26. 50. 33 Π	\odot 26. 50. 33 251200
	4. 52 191668 Mm. 8. 50.

Igitur calculus Tychonis medium observatum praevertit, statuitque medium h. 8. 1' 40" aequali. In cujus favorem assumptum fuit medium h. 8. 2' aequali. De hoc sane multum non esset contendendum, quia dum agnoscitur phasis, illa jam transiit, interimque dum capitur alt. stellae, labitur alia aliqua pars coeli: quin etiam errorculus in altitudine facile aliquot minuta horae surripit vel obtrudit.

Semid. umbrae est 45' 48", variatio umbrae 56", umbrae igitur semid. correctae 44' 52", Lunae 17' 28" Summa

62. 20 — 18. 440	Scrupula durationis dimidia	61. 27
10. 28 — 00. 470		59532 — 33. 5
15. 970		74910 — 28. 22

Duratio dim. h. 1. 51. 27 15378

Diff. semidd. 27. 24 — 78380

Dimidia mora 49. 42 18848

Tempus incidentiae h. 1. 1. 45. Haec satis bene cum observatis stant: etsi umbra non sit geometricae quantitatis assumpta.

Ex meo calculo sic computo:

Aequatio temporis physica est hoc \odot loco 1' add., astronomica esset 2 subt. Nam epochas, de quibus corrigendis hoc libro deliberatur, usurpo sic, ut aequatio temporis mihi non a 0^o γ sed a 2^o \odot incipiat, ubi Tycho habet 0. 45". Contra ubi ille nihil habet, ego subtraho physice 13' 20" vel addo astron. 8' 12", prout eclipsium suffragia huc vel illuc magis inclinaverint.

Aequale ergo tempus medii est h. 8. 12' 40"

1572. 7. 6. 20. 58 — 5. 19. 29. 30 — — 3. 13. 22. 25

Novb. 334.

D. 7. 8. 12. 40

348. 14. 33. 38

Revol. XIII. 358. 5. 1. 34 — 1. 9. 54. 33 — — 0. 18. 58. 8

9. 14. 27. 58 — 6. 29. 24. 3 — — 2. 24. 24. 17

24. 30 4. 2. 3. 44 28. 36

Parall. \oslash 62. 24 13. 58 2. 56

\odot 1. 1 1. 52 25. 0

63. 25 14 \oslash 25. 20. 49 Π

Semid. \odot 15. 32 4. 2. 19. 48 \odot 26. 51. 14 \times

Umbra 47. 53 \oslash 27. 3. 21 1. 30. 25 Lat. 8. 20. Simplex Ty-

\oslash 16. 3 26. 50. 49 Requisitus 0. 25 Reductio. chonica quasi

Summa 63. 56 — 17. 290 12. 32 — 156700 26. 50. 49 Requisitus. 7' 58"

Latit. 7. 12 — 00. 230 33. 47 — 57400 correctae

17. 060 99300 7. 12.

Horar. \oslash 36. 20 Scrupula

\odot 2. 33 dimidia

\oslash a \odot 33. 47 durationis

57400 63. 30 63. 30

70250 29. 43 Dim. duratio h. 1. 52. 45.

12850 Min. 22. 14 abundamus.

Diff. semid. 31. 50 — 04. 29

00. 23

04. 06

Scrup. morae

dimidia 30. 58

Mora dimidia H. 0. 54. 45

Tempus incidentiae „ 0. 58. 0.

Temporis quidem aequatio sustinet unicum scrupulum de hac discrepantia, cetera sunt, ut in priori quoque eclipsi, ex diversitate aequationum \oslash , ut explicavi in Prolegomenis Ephem. N. 14; tanto enim hic praevenio, quanto ibi sequebar Tychonicum calculum, quia aequatio hic additur, ibi subtrahabatur, utrique mihi major Tychonica.

Quod attinet moram in tenebris, quam ego colligo h. 1. 49. 30, Tycho h. 1. 39. 24, cum sit observata mora 1. 37. 0: monendus est lector identidem, semid.

Colligo igitur ego medium hujus eclipsis h. 7. 50. 26 aequali. Ita Tychonicus calculus $11\frac{1}{4}'$ propior est observationi quam meus. Sed cave lector, triumphum canas ante victoriam. Erit enim ubi contrarium quoque locum habeat.

Tychonicam umbrae non esse geometricam, sed accommodatam legibus opticis, quae non semper eodem modo se habent. Hic enim sese quam proxime accommodant calculo Tychonis, at alias discedunt longius. Quod dixi, probo hujus eclipses exemplo. Tycho parall. \bigcirc infra long. mediam in \bigcirc et \bigcirc luminarium prodit 63' cc.; adde parall. \bigcirc 3' 7'', acervantur 66. 7. Hinc aufer semid. \bigcirc , quam Tycho exhibet 16', restat semid. umbrae 50' 7'', si umbra rectis lineis formata intelligatur. At Tycho jubet hic umbrae semid. statuere minorem quam 45, ita umbra fit 10' angustior, quare ad 18' temporis decedent durationi, quarum tamen partem ipse compensat aliter. Atque hoc est illud, quod Origanus, quod Marius, quod alii publicis scriptis in Tychone desiderant. Ne mireris igitur, mihi durationem in tenebris fieri 12' prolixiorem observata; verissime enim de umbra usurpamus, quod Braheus de \bigcirc corpore dixit (Prog. p. 134), vi luminis margines ejus dilui: quod quomodo fiat, disputo in Opticis, et in Epitome nuper edita summam rei propono.

Confirmat hoc $\pi\alpha\theta\omicron\varsigma$ umbrae etiam duratio temporis incidentiae, quod cum ego prodam 58', Tycho 62, observatio dat plus quam 65. Nimirum latius excurrunt limites illi umbrae dilutae, quorum ingressu Lunae adhuc plenae et clarissimae margo incipit obfuscari, quam illi limites, quibus desertis postremus \bigcirc margo desinit in lumine censi; quidquid est inter hos duplices limites lucis dubiae, id in principio eclipsis pro tenebris habetur, comparatione claritatis in toto reliquo corpore, in fine vero incidentiae id habetur pro lumine, comparatione obscuritatis in toto reliquo corpore. Atque hinc est, quod in hac eclipsi fere tanto longior est mihi dimidia mora quam observatum, quanto brevior exhibeo incidentiam, ut sic dimidia durationi summa sua constet. Adde enim semissem observatae morae in tenebris, sc. 48' 30'' ad incidentiam h. 1. 4. 24, conficies dimidiam durationem observatam h. 1. 53', quantam omnino exhibet meus calculus. Hujus negotii testimonia complura sequuntur ex ipsarum obsa. tractatione.

Interim non dissimulo, si lat. \bigcirc assumatur major transpositione nodi antecedentis in antecedentia, moram penes me diminutum iri, sed sic ut una etiam duratio nonnihil diminuatur deseratque observationem, quam nunc repraesentat.

Observatio Maestlini Tubingae habita.

Initio		Incidentiae	Emersionis	Finis	
Alt. seq. Π	7° 50' —	17. 4	32. 21	42. 25	
Dext. hum. Or.	8. 10 —	18. 56	Canicul. 18. 0	— 26. 18	
17 ^{mae} Π	8. 35 —	18. 56	4 ^{ta} Leon. 10. 58		

h. 6. 4' 45"		h. 7. 9' 15"	h. 8. 41'	h. 9. 45' 36"
Tycho 6. 21		T. 7. 25	T. 9. 2.	

43. 30 — 37345	
55. 15 — 19644 — 56212	
parall. 62. 24 — 3950 — 3950	
15694	52262
51. 17	35. 35
☾ 26. 50.	lat. 7. 12
Visus ☾ 27. 41. 17 Π	42. 47
	semid. 16. 3
	58. 50

Circa medium observavit ☽ jungi 14^{tae} Π .
 erat autem locus ☽ apparenti septentrionalior ad
 dimidiam sui diametrum. Tycho ponit eam a. 1600.
 in 27° 53' Π , lat. 0. 58' austr. Ergo finiente
 anno 73. in 27° 30' Π . Sane lat. projiciebat ☽
 a 26° 50' Π in orientem et in austrum. Ad 266. 37.
 A. R. ☉ add. 119° consurgit 25. 30, oriturque
 13° ☽, ergo ☽ a Nonas. 43. 30. Ang. Or. 55. 15.
 Ergo ☽ mihi 11' superavit stellam, quod si non esset,
 margine suo australi texisset aut strinxisset illam.

III. Eclipsis Lunae anno 1576. 7. Octobris.

Tycho Brahe Uraniburgi nihil nisi finem observavit, tunc Canicula habuit alt. 18° 30'; hora igitur fuit 13. 23' a meridie. Confirmationis causa caput Π meridionalis altum 37° 0' est deprehensum, unde elicitur h. 13. 25', quippe haec obs. posterior est. Et assumsit Severini initium h. 13. 20.

Maestlinus Tubingae initium observavit in alt. Aquilae 27 $\frac{1}{2}$, dig. 10 $\frac{1}{2}$, aestimatione usus possibili. Post finem humerus Pegasi 26° 20' in occ. altus. Illud h. 9. 51' signare ait, hoc 1^h 28'; finem putat h. 0. 20. ante fuisse, ergo h. 1. 5. Ergo diff. merid. 15. 17. vel 12.

Calculus hujus eclipseos ex Tychone.

1575. ☉	☾				
Mss. Sept. 9. 19. 59. 17	0. 3. 22. 39	— 0. 1. 4. 4	— 8. 8. 21. 48	0. 17. 12. 35	
d. 6. 9. 5. 58. 13	5. 23. 24. 34	— 1. 28. 11. 43	— 0. 24. 50. 31	0. 14. 50. 18	
h. 11. 27. 6	5. 35. 15	— 5. 59. 17	— 2. 19. 21. 34	1. 31	
M. 24. 0. 59	12. 11	— 13. 4	6. 3. 49	0. 2. 20. 46	
6. 26. 25. 35	6. 2. 34. 39	— 2. 5. 28. 8	13. 14		
3. 5. 21. 35	4. 27. 14	— 2. 15	11. 28. 51. 56		
3. 21. 4.	1. 3	— 56	6. 2. 34. 39		
1. 56. 27	5. 28. 6. 22	— 7	6. 26. 25. 35		
☉ 24. 29. 8	6. 26. 25. 35	— 4. 28. 17	1. 0. 8. 18		
	☾ 24. 31. 57	— 2. 1. 0. 0	4. 28. 17		
			11. 24. 23. 39	Lat. 31. 9	
			5. 11	2. 2	
			1. 58	29. 7	
			4		

Horarius 28. 50	Summa 59. 37	— 15. 040
Semid. ☾ 16. 31	Lat. 29. 7	— 03. 580
Umbræ 43. 51	Scrupula durat. 52. 2	— 11. 46
Variatio 45	95000	23. 12
Correctæ 43. 6	73281	28. 50

21719 Dimidia duratio h. 1. 48' 17".

Igitur præcessit exacta calculi oppositio 5' c. c. nimirum h. 11. 19 aequali.

Adde dimid. dur. 1. 48. Dur. h. 3. 36. Maestl. 3. 17

Computatur finis 13. 7 (5)

Aequatio Tychonica 7. 16 sub.

Addita igitur ad medium facit tempus apparenis initii h. 13. 14

Obs. habet 13. 23 vel plus.

In Prog. ponitur medium hujus eclipseos quasi observatum h. 11. 32', id est ex Severini charta, qui 2' addidit, medio computato ob tardiolem ingressum, de quo nihil in Progymn., 8' aufert loco aequationis temporis, dimidiam dur. facit h. 1. 50', ut habeat aequale tempus mediae eclipseos h. 11. 24'. Sed ut vides, tabulae editae dant minus. Itaque Tychois calculus hanc eclipsin quoad ultimam phasin c. 9' praevertit.

Ex meo calculo sic computo.

1575. 0. 1. 57. 42	— 9. 22. 17. 22	— 1. 15. 0. 29	☉ Jun. h. 1576. 16. 17. 20	— 5. 18. 11	☉
280. 11. 19			Oct. 7. 11. 19		
Revol. X. 275. 13. 5. 49	— 1. 0. 41. 57	— 0. 14. 35. 29	d. 112. 17. 59	— 18. 28. 58	
5. 0. 10. 53	— 2. 1. 26. 41	— 15. 54		29. 55	
31. 42	5. 45	— 25. 0 Cor.		14. 56	
170700	☾ 24. 31. 45	☉ 0. 34. 6	☉ 24. 30. 6		
63800	Req. 24. 31. 35	☉ 24. 30. 0	60. 47		
234500	10	6. 4. 6. Lat. 33. 34, simpl. 31. 41			
		1. 35 Reductio	29. 6. Digni ultra		
Parall. ☾ 59. 44	50 40	24. 31. 35	☉ requisitus.	11. Hic duratio fiet longior.	
☉ 1. 0	☉ horarius 31. 57				
60. 44	☉ " 2. 30				
Semid. ☉ 15. 18	☉ a ☉ 29. 27	— 71200			
Semid. umbr. 45. 26	21. 13	— 104000			
" ☾ 15. 21		32800			
Summa 60. 47	— 15. 620		Medium h. 11. 19		
Latit. 33. 34	— 04. 760		1. 43		
Scr. dimid. 50. 40	10. 860	Duratio dimid. 1. 43. 14	Finis 13. 2 aequ.		
Sc. def. 27. 13		Dur. 3. 28. 28	Aequatio phys. 5' 23" add.		
6. 48	Digni 10. 38.	Dur. Maestl. 3. 17	ergo subtr. erit h. 12. 56. 37 appar.		

Hanc igitur finis phasin seu tempus ejus minus ego assequor quam Tycho, quamvis in medio eclipsis ad tempus medium plane coincidamus; disto enim per 26' 23", quorum 5 solum sunt ob durationis menae parvitatem, at 12' 40" ob di-

versam rationem aequandi tempus, de qua hoc libro pronuntiandum erit; reliqua 9 sunt mihi cum Tycho communia.

Mirari possis, cur mihi duratio brevior, cum tamen umbrae transitus sit mihi prolixior? Est igitur causa haec, quia mihi vicissim et \bigcirc semidiameter brevior et latitudo major: major autem ista, propter duas causas: quia mihi et elongatior umbra a nodo sequenti, et major angulus excursuum in latitudinem. Sed de hisce parum habet quod testetur eclipsis ista, ut in qua solus finis observatus: nisi quod duratio quanto auctior feret, tanto minus ab observato fine distaremus. Etsi et valde contemptum est utriusque dimidia durationis intervallum 5', et facile in alt. stellae vel minimus defectus tantum efficit et denique in fine mero internoscendo diversorum oculorum multo major est dissonantia, ut in sequentibus apparebit.

Notabimus interim, quod revocato nodo sequente in antecedentia latitudo fiat minor, duratio major.

IV. Eclipsis Lunae anno 1577. 2. Aprilis.

Hujus eclipsis observationes Severinius ex observationibus Tychonis antiquioribus (quae ut rariores et quarta forma compactae cum ceterarum protocollis in folio non jungebantur, eoque in meam potestatem non devenerunt) sic exscripsit, quod principium fuerit in ortu h. 7. 0, non tamen satis discerni potuerit, puto ob vapores c. horizontem turbidiores, totus vero orbis in umbra h. 8. 7', emersus initium h. 9. 42', finis h. 10. 44'. Est igitur medium inter initium et finem h. 8. 52' incertiusculum. At medium inter immersionem totalem et emersus initium esset h. 8. 54½', mora in tenebris h. 1. 35'. Et quia emersio duravit ab h. 9. 42' in h. 10. 44' per h. 1. 2', si tantum est immersione consumtum, statuamus: initium cadet h. 7. 5. Ponitur autem medium in Progymn. h. 8. 50'.

Habeo etiam observationem Barth. Sculteti Goerlicensis, qui postea consulatum in illa urbe gessit, qui initium eclipsis signavit altitudine \bigcirc 5° 56', immersionem totalem in alt. ejusdem 13° 9', quo eodem momento notavit et pulsum in urbe h. 1. noctis, initium emersionis cum sonaret dimidiam tertiam eodem in horologio; et dimidio quadrante posterius h. 10. a meridie in alio horologio. Ex hac mensuratione morae primum illud patet, moram illi visam h. 1. 30' longam, quae Tycho h. 1. 35: quae diversitas post omnem adhibitam diligentiam caveri tamen non potest.

Hinc computanda sunt tempora duplicis initii. Si igitur alt. \bigcirc (centri puto) initio morae fuit 13° 9' parallaxis \bigcirc addita veram exhibet alt. veri loci centri \bigcirc 14° 12' (contemta jam refractione, ut quae tantummodo 9' a Tycho exhibetur). Erat vero tunc \bigcirc 47' ante medium eclipsis, quod illam referebat in 22° 45½' \approx . Cum igitur sit verus \bigcirc horarius 37' 30'', quare 47' intervallo respondent 29' 22'' de vero motu \bigcirc , ut \bigcirc fuerit in 22° 16' \approx , cum lat., ut ex sequenti calculo apparebit, 0. 6' austr., ut fuerit ejus declinatio vera 8° 48' austr., A. R. 200° 35'. Alt. poli Goerlicensis comparatione cum Pragensi ex tab. recentissimis est 51° 20', etsi auctor ipse anno 1577 in descriptione cometae assumeret eam 50° 40', secutus puto fidem tabularum illius temporis. Nam cum Pragae alt. poli sit 50° 6' et distantia itineraria Goerlicium usque milliaria Germ. 21, parum admodum a linea septentrionis deflectens in ortum: computatis 15 mill. in gradum, veniret alt. poli Goerlicensis 51° 30'; quam propter deflectionem dictam et in favorem tabularum relinquo intra 51. 20.

Ex his igitur datis computo horam ut sequitur:

VP	38. 40	47034
SP	98. 48	1184
	60. 8		48218
VS	75. 48		
	15. 40	— 7. 50 —	199295
	135. 58	— 67. 58 —	7584
			206879
			158661
			79331

	53. 47	26. 53½,
AR \bigcirc	200. 35	
\odot	21.	
	125. 48	Horae 8. 23
		Huennae 8. 7
		Esset diff. meridd. 16'

Sic pro initio, si ☽ visa est in alt.
 $5^{\circ} 56'$, vera alt. fuit $6. 59$ sine refractione
 et ☽ in $21^{\circ} 38\frac{1}{2}'$ \simeq , declinatio

98. 33	1118
38. 40	47034
59. 53	48152
83. 1	
23. 8	— 11. 34 — 160690
142. 54	— 71. 27 — 5335
	166025
	117873
	58937

67. 22	33. 41
AR ☽ 200. 35	
☉ 20. 57	
111. 16	Horae 7. 27
	Huennae 7. 5
Easet diff. meridianorum 22'.	

Vides, quantum de duratione seu mora in tenebris Sculteto decesserat, tantum etiam secunda vice accedere differentiae meridianorum, ut pene ausimus pronunciare, Scultetum visus sui conditionibus 5' serius quam Tychonem agnovisse totalem immersionem, atque ita meridianorum diff. esse 16' temporis, quod proxime accedit ad tab. geogr. recentiores. Etenim Praga est Huennae ad ortum c. 5' et Praga Goerlicium proficiscentes deflectunt etiam ad ortum, praesertim egressi angustias et saltum in regni Bohemici limitibus. Sed relinquantur sane paucula minuta temporis in dubio, confirmanda per sequentes eclipses. Quod vero Tycho Prog. II. fol. 375. Goerlicium et Huennam sub eundem meridianum confert, id de effectu differentiae meridianorum est intelligendum in motu diurno cometae, quo de agitur eo loco.

Satis igitur confirmatum habemus ex 2 locis, medium hujus eclipsis Uraniburgi apparuisse h. 8. $54\frac{1}{2}'$; sequitur jam calculus ex Tychone, cujus aequatio temporis 6' 38" S. Ergo obs. tempus medium h. 8. 48'.

1576. 9. 20. 44. 6 — 4. 25. 11. 29 — 3. 12. 51. 5 — 1. 20. 18. 19	
Apr. d. 1. 2. 29. 41. 38 — 0. 29. 21. 29 — 3. 18. 54. 49 — 4. 3. 52. 15	
h. 8. 21. 41 — 4. 3. 48 — 4. 21. 18 — 4. 24. 36	
M. 48. 24. 23 — 26. 6 — 26. 27	
0. 20. 47. 25 — 5. 29. 1. 9 — 7. 6. 33. 18 — 5. 29. 1. 37	
3. 5. 22. 2. 59. 52 4. 13 3. 2. 19	
9. 15. 25. 25 2. 27 2. 17 6. 2. 3. 56 Lat. 10' 46"	
1. 57. 35 0. 20. 47. 25 3. 2. 19	

☉ 22. 45. 0 ☽ 22. 50. 53 \simeq 7. 9. 35. 37

Horarius 34' 17"	Scrump. morae 26. 0	Prodit autem tempus
Semid. ☽ 17. 43	83625 — 28. 0	incidentiae h. 1. $4\frac{1}{4}'$
Umbrae 46. 21	74680 — 28. 26	mora . . . „ 1. 31.
Variatio 25	55970 — 34. 17	tota duratio „ 3. 39' 30",
Umbrae cor. 45. 56	dur. 18710 — h. 1. 49. 45	quae omnia cum obser-
Summa 63. 39 — 17. 140	mor. 27655 — „ 0. 45. 30	vatione conciliantur
Diff. 28. 13 — 03. 370	Tempus incidentiae h. 1. 4' 15".	egregie.
Lat. 10. 46 — 00. 500		
Scrump. durat. 62. 43 — 16. 640		

Meo calculo sic:

1577. ☉	1576. ☽	
16. Jun. h. 23. 35 — 5. 19. 14 ☽	7. 20. 56. 8 — 11. 2. 11. 55 — 0. 26. 2. 21	
2. Apr. 8. 32	91. 8. 32	
75 dies h. 15. 3 — 11. 57. 13	99. 5. 28. 8 — 0. 12. 16. 47 — 0. 5. 50. 12	
58. 32 29. 16	110. 5. 14. 20 11. 14. 28. 42 — 0. 20. 12. 9	
7. 19	10. 23. 46. 12 4. 21. 15. 36 34. 55	
7	35. 17 27. 10 25. 0 Corr.	
12. 33. 55	53100	☽ 22. 45. 56 \simeq ☉ 21. 12. 4 ☽
☉ 22. 45. 19 ☽	26136	☉ 22. 44. 53 ☉ 22. 45. 19
	79236	1. 3
		reductio 26
		22. 44. 53

Medium ergo cadit h. 8. 30' tempore aequali in meo calculo.

lat. 8' 35"
 simplex 8. 6.

7 $\frac{1}{2}$ minutis temporis medii citius, quam in Tychonico, idem effectus cum eo, qui fuit in secunda, propter eandem causam. Vicissim \odot in 22° 45' γ exhibet aequationem temporis physice compositam 19' 46" subtrahendam ab apparenti, quae igitur addita medio efficit apparens h. 8. 50'. Propius igitur ad obs. venio quam Tycho, et omnino proxime; sed in hoc propterea calculus meus non est justificatus.

Parallaxis \oslash 63. 4	Horarius \oslash 37. 30	17. 920
" \odot 1. 0	\odot 2. 27	04. 510
64. 4	\oslash a \odot 35. 3	— 53. 757
Semid. \odot 15. 12	Latitudo 8. 35	— 00. 320
Semid. umbrae 48. 52		17. 606
" \oslash 16. 13	Scrup. durationis 64. 30	04. 190
Summa 65. 5	" dim. morae 31. 28	64542
	29. 27	71166
— 17. 920	Mora dimid. h. 0. 53. 52	10785
Diff. 32. 39	Duratio dimid. h. 1. 50. 25	17409.
— 04. 510		

Rursum igitur ut in eclipsi 3. prodit mihi tempus incidentiae brevius observato, sc. h. 0. 56. 33. Mora vicissim longior h. 1. 47. 44. Duratio vero aequalis proxime observatae h. 3. 40. 50.

Si quaeris, cur jam mihi duratio longior quam Tychoni, in promptu causa est: longior mihi quam illi semidiameter umbrae. Illud potius quaere, cur non multo longior? Nam mea semid. umbrae demonstrativa 48' 52" est multo longior quam Tychonis experientialis 46' 21". Et causa est, quia primo diameter \oslash est mihi brevior, deinde horarius major. Methodum sane construendi horarii in \oslash et \odot vera, qua Tycho usus, ego nunquam vidi. Componi debet ex 3 principiis praeter horarium medium, sc. ex aequatione soluta, aeq. menstrua et variatione. Cumque menstrua in anomalia 90° evanescat, nescio cur horarius ultra \oslash in illa anomalia \odot 18" major sit horario in ipsis articulis, ex sola simplici aequatione confecto; debere namque videtur totum illud excedere, quod de variatione debetur horario illi simplici, ut apud me fit. Recordor quidem in exemplari, unde sunt in typum transsumta Lunaria, fuisse praeter horarium ultra syzygiarum momenta excurrentem ad latus appositum etiam diurnum ejusdem conditionis, qui omisus est ideo, quia folium informi latitudine futurum erat et quia horarius sufficere visus. Qui etsi pars 24^{ta} praecise constitutus fuit diurni, ut ita non ipsi horae \oslash competere, sed c. 6° vel 7° ante vel post conjunctionem: at videtur ei majus aliquid deesse quam quod hinc emergere possit.

Maestlinus in Backnang (alt. poli 48° 52', Tubinga versus Nordost) vidit \oslash in ipso puncto exortus sui deficere incepisse. Stabat quidem ante umbram ad occidentem, projecta vero erat per parallaxin in orientem. Quibus rationibus inter se pensatis, si occasum \odot sumamus h. 6. 41' non errabimus. Tychoni etiam in ipso ortu obscure tamen agnitum initium h. 7. 0'. At correxi h. 7. 5'. Ita diff. meridianorum esset 19 vel 24, enormis.

V. Eclipsis Lunae anno eodem 1577. 26. Septemb.

De hac non invenio quid amplius observatum praeterquam quod h. 13. 56' coeperit emergere e tenebris, referente Severinio, qui etiam hoc ipsum quodammodo vocare videtur in dubium, dum ait, se fidem horologii sequi, dimissis azimuthis, utpote linea meridiana non recte inventa. Non erit igitur magni ponderis eclipsis, si quid sola testetur. Medium statuitur in Prog. h. 13. 3. Computo igitur ad hoc tempus, cujus aequatio 4' 20" subt.

Maestlinus in Backnang sic:

	Initium.	Incident.	Emersio.	Finis.
Lyra	32. 6	— 22. 5	— 10. 50	— 3. 40
Pr. II	14. 22	— 24. 7	— 40. 0	— 50. 46
Hora	11. 7 $\frac{1}{2}$	— 12. 18	— 13. 58	— 15. 6 $\frac{1}{2}$

Calculus Tychonis.

1576.	9. 20. 44. 6	—	4. 25. 11. 29	—	3. 12. 51. 5	—	1. 20. 18. 19
Sept. d. 25.	8. 24. 9. 13	—	0. 27. 7. 13	—	8. 21. 24. 56	—	10. 5. 27. 56
H. 13.	32. 2	—	6. 36. 12	—	7. 4. 37	—	7. 9. 57
•M. 1. 20.	3	—	41	—	43	—	44
	6. 15. 25. 18	—	5. 28. 54. 13	—	0. 11. 19. 55	—	0. 2. 55. 28
	3. 5. 23. 0	—	1. 38	—	5.	—	57. 8
	3. 10. 2. 18	—	55. 30	—	1. 38	—	1. 58. 20
	2. 2. 1	—	6. 15. 25. 18	—	57. 8	—	lat. 10' 18"
⊙ 13. 23. 18	⊃ 13. 22. 25	γ	0. 10. 22. 47	—	—	—	—
			Horarius 27. 14	—	—	—	78990
			Semid. ⊃ 16. 1	—	—	—	—
			" umbrae 43. 2	—	—	—	—
			" Variatio 39	—	—	—	—
			Correcta semid. umbrae 42. 23	—	—	—	—
			Summa 58. 24	—	14. 450	—	—
			Diff. 26. 22	—	02. 950	—	—
			Latit. 10. 18	—	00. 460	—	—
			Scrup. dim. dur. 57. 30	—	13. 990	—	—
			" " mor. 24. 15	—	02. 490	—	90593
			" residua 3. 12	—	—	—	298500
			Mora dimidia h. 53' 28"	—	—	—	11603
			Dim. duratio h. 2. 6' 40"	—	—	—	219510

Prodit tempus aequale h. 13. 1.

Apparens fuit 13. 5. 20

Adde dim. moram 53. 25

Computo initium emersionis h. 13. 58. 45. Sed haec propinquit ad obs. est suspecta, ne forte Severinius id assumserit in dubio, quod calculo magis appropinquavit, quia dimisit azimutha causatus incertitudine lineae meridianae.

Ex meo calculo.

⊙ 1577.	⊃ 1576.
16. Jun. h. 23. 35	— 5. 19. 14
26. Sept. 12. 57	— 7. 20. 56. 8
D. 101. h. 13. 22	— 11. 2. 11. 55
59. 28	— 0. 26. 2. 21
897	268. 12. 57
58529	276. 9. 53. 8
59426 ⊙ 13. 22. 54	275. 13. 5. 49
	— 1. 0. 41. 57
	— 14. 35. 29
	0. 20. 47. 19
	— 10. 5. 3
	— 2. 46
	30. 17
	23. 40
	25. Cor.
	13
	⊃ 13. 22. 48 γ
	⊙ 13. 22. 54
	Requisitus 13. 22. 27
	1. 33. 48
	Lat. 8' 40"
	Red. 27
	Simpl. 8. 11
	Requis. 13. 22. 27

(Ex obs. Maestlini eclipsis haec in 13½, γ venit multo tardius calculi indicio.)

Medium ergo computo tempore aequali h. 12. 56½', non totis 5' ante quam Tycho, quia et minor mihi aequatio subt. c. 1', et meta etiam 1' anterior. Calculus n. Tychonis nihil praecipit de via ⊃ obliqua ad eclipticam. Aequatio temporis physica est 9' add. (hic. sub.), ergo medium apparenti h. 12. 47½'.

Parall. ⊃ 58. 25

" ⊙ 1. 0

59. 25

Semid. ⊙ 15. 16

" umbrae 44. 9

" ⊃ 15. 1

Summa 59. 10 — 14. 820

Diff. 29. 8 — 03. 590

Lat. 8. 40 — 00. 330

Scrup. dim. dur. 58. 30 — 14. 490

" " morae 27. 45 — 03. 260

Horar. 30. 0

⊙ 2. 26

⊃ a ⊙ 27. 34

55. 8

D. resid. 3. 22 Duratio dim. h. 2. 7. 0

Mora " 0. 11 Mora " " 1. 0. 30

Medium appar. " 12. 46. 0

Initium egressus h. 13. 46½. app.

Citius tamen agnoscitur egressus. Itaque haec eclipsis, si fide digna observatio, pulsat aequationem temporis physicam; calculus praevenit. (Notabimus, quod retracto nodo fiat major latitudo, brevior mora, egressus initium adhuc citius.)

VI. Eclipsis Lunae anno 1578. 15. Sept.

Severinius exscripsit ex antiquis obs. Tychonis initium Uranib. h. 12. 27', finem h. 14. 10, medium igitur h. 13. 18 $\frac{1}{2}$, et duratio h. 1. 43, assumitur in Prog. h. 13. 17.

Ex Mss. obs. Maestlini: Initio. Fine
Alt. Lyrae 29. 0 — 13. 50
Post. II 11. 35 — 28. 35
Dext. hum. Or. 30. 48
Hora 12. 7 - h. 2. 1.

In exemplari Ephemeridum Maestlini manu auctoris assignatum reperi medium in Backnang Wirt. h. 13. 9', quod esset Tubingae h. 13. 8., et sic diff. meridd. 10 $\frac{1}{2}$, quod non dissidet a tabulis geogr. Exprimunt Prog. et quantitatem digit. 2 $\frac{1}{2}$. Et Maestlinus in Epit. Astr. professus, se observasse hanc eclipsin, addit picturam cum distinctione digit. in diam. \bigcirc , ubi umbra abscindit 2 $\frac{1}{2}$, ut cogitem, num Tycho hanc quantitatem transcripserit in suum librum? Nec Maestlinus expressis verbis addit, hanc quantitatem sese observasse (in Mss.: „observavimus item ejusdem eclipsis magnitudinem, juxta modum quem Reinholdus tradit. Digni erant 2 $\frac{1}{2}$, nil amplius.“), quam expressit in schemate, quin potius verisimile est, illum in schemate sic adornando respexisse ad calculum vel Prutenicum, ex quo computavit dig. 2. 28', ut vides in Ephemeride anni 1578, vel suum proprium, ex quo plane hoc computavit, quod pictura exhibet, sc. dig. 2. 20, quem calculum auctor in vestibulo operis Eph. praemittit.

Sequitur calculus ex Tycho, cujus aequatio temp. 8' 45" sub.

☉ 2. 18. 4 \approx	☾ 2. 16. 35 γ .	Anom. 10. 19. 50. 31.	Mot. Lat. 0. 6. 15. 31
Horarius 27. 56			3. 21. 28
Semid. \bigcirc 16. 15			0. 9. 37. 19
32. 30 — 61310			5. 8
Umbr. 43. 25			3. 7
Variat. 33			Lat. 49. 48.
Correcta 42. 52	Scrupula durationis dimidia	31. 50	
Summa 59. 7 — 14. 790		27. 56	
Lat. 49. 48 — 10. 500		3. 54 H. 1. 8' 21" dur. dim.	
9. 19	4. 290 sc. dur.	Tota h. 2. 16.	
Scrup. def. 4. 40	31. 50	Vera copula fit h. 13. 18' aequali,	
	255390	seu h. 13. 18' 45" apparenti.	
digit 3. 26	194080.		

Meo calculo.

☉ 2. 17. 34 \approx	☾ 2. 15. 14 γ
☉ 23. 4. 19 \times	
9. 13. 15	Lat. 0. 50. 52
Reductio 2. 20	Simpl. 48. 1
2. 15. 14 \approx	Requisitus.

Ad unguem colligo veram ☉ hora eadem aequali; quanto enim minorem addo aequationem, tantum ob obliquitatem viae Lunae de meta, ad quam calculus Lunae deducit, detraho. Sed aeq. physica temporis est hoc ☉ loco 12' 40" add.

Esset igitur apprens h. 13. 5' 20". Rursum pulsatur hic. aeq. physica temporis, quia calculus praevenit observationem.

Parallax \bigcirc 58. 59	
☉ 1. 0	
59. 59	
Semid. ☉ 15. 15	
Semid. umbra 44. 44	Horarius \bigcirc 30. 51
" \bigcirc 15. 9	☉ 2. 27
Summa 59. 53 — 15. 180	\bigcirc a ☉ 28. 24

Summa	59. 53	—	15. 180	
Lat.	50. 52	—	10. 950	28. 24
Defectus	9. 1.	4. 230,	scrupula durat. dimidia	31. 86
	4. 30 $\frac{1}{2}$,	259000		3. 12
Diam. \bigcirc	30. 18	68300		
Digiti	3. 34	190700	Duratio dimidia h. 1.	6. 30
Major per lat. simpl.			tota „ 2.	13.

Vides in utroque calculo prodire et defectum et durationem majores, quam fuit observatum; atque haec duo cohaerent invicem, ut quamvis certam et confirmatam quantitatis obs. non habeamus, ea tamen plus quam verisimilem habeat probationem a duratione. Atque hoc si fuisset, ad Optices penum hic quoque confugium meditabor. (Vid. Opt. meae fol. 266.) Sit enim duratio dimidia h. 0. 51' 30'', quae ducta in horarium \bigcirc a \bigcirc 28. 24 procreat scrupula dimidia

durationis	24' 24''	—	02. 530
quae cum summa semidd.	59. 53	—	15. 180
creat latitudinem	54. 50		12. 650

Ergo scrupula defectus 5. 3, quae sunt digiti 2. 0. c.

Et haec lat. argueret dist. a nodo 9° 55' etiam in meo magno angulo. Atqui ut locus nodi per 42' retroagatur, id per reliquas eclipses fieri nequit. Quare si plura hujusmodi testimonia eclipsium acervabuntur, concedendum nobis erit, aut \bigcirc motus aequabiles in minimis non esse, nimirum hac vice exorbitasse in septentrionem, aut, quod promptius comminiscimur, umbram Terrae propter aliquam refractionem opticam, quae facta sit in materia inter \bigcirc et \bigcirc interposita, deflexisse in austrum. Non enim sufficit illa refractione, quae fit in aëre nostro: nam etsi illa radios \bigcirc in limites umbrae intromittit, aër ipse tamen projicit umbram nihilo minus, idque rectis a \bigcirc margine lineis, atque ita umbra sentitur initio et fine eclipsium, ut hactenus posuimus. Quanquam si provolemus ad audaces hujusmodi positiones, illa magna difficultas existet, qui caveri potuerit, ut vitiatas \bigcirc altitudines meridianas Tycho nunquam deprehenderit, si interdum interjectu substantiae aetherae omnes circumcirca Terram evadentes radii Solares in eandem plagam mundi refringi possunt. Eadem difficultas occurreret circa stellas, si materiae refractoriae locum quoesiveris inter \bigcirc et \bigcirc Soli oppositam.

Vide infra in eclipsi XII simile quid, ubi non minus quam hic retroactu nodi juvatur. Sic etiam in XLV.

VII. Eclipsis Lunae anno 1580. 31. Jan.

Severinius ex Tyconicis antiquioribus obs. exscripsit initium h. 8. 15'; finem dubium h. 12. 5'. Cum vero dimidia pars obscuraretur, horam fuisse 8. 59', cum iterum dimidiam recuperasset, h. 11. 19'; hinc medium h. 10. 9', ut assumitur in Progymn., et finem h. 12. 3'.

Maestlinus in Baknang principium morae significavit alt. cordis \bigcirc 44° 48', finem morae 48° 36', et oculi \bigcirc alt. 33° 36'; finem totius eclipseos alt. Spicae 15° 20'. In principio morae \bigcirc ora proxima per radium a corde \bigcirc distare visa est 2° 5', mox remotior ab eadem stella 2° 37', ergo \bigcirc centrum quasi 2° 20'.

Fines quidem si comparo, Huennae h. 12. 3', in Baknang h. 11. 52', diff. meridianorum prodit 11' et igitur Tubingae 12', quod bene satis congruit cum praecedenti. At si tempus ex ceteris alt. exstruam, prodit initium morae h. 9. 52', finis morae h. 10. 24' vel certius (quippe ab humiliori stella) h. 10. 21 $\frac{1}{2}$ '. Mora igitur 29 $\frac{1}{2}$ ', dimidia 15'. (Maestlinus computavit ex alt. suis 16. In compendio, postquam, inquit, defecisset tota, brevissimo interposito intervallo lumen iterum recepit), quod ad initium adjunctum ostendit medium morae h. 10. 7', essetque diff. meridd. nil ultra 2', et emersio h. 1. 30': cui si aequalis immersio statuatur, initium veniet h. 8. 22', duratio 3. 30', quae Tycho est 3. 48. Itaque labes est aliqua in observatione principii morae. Quid si namque pro 44° 48' scribendum fuerit 44° 8', tunc sane principium morae cadit in h. 9. 39 $\frac{1}{2}$ ', ut sit mora tota 42', medium h. 9. 0 $\frac{1}{2}$ ', quod satis congruit cum Braheano medio. Viderit Maestlinus.

Quae de colore hujus eclipseos ipse puer quamvis memoria condiderim, vide in Opticis meis fol. 302.

Sequitur calculus ex Tyehone, cui aequatio T. 9' 35" A.

☉ 21° 29' 20" ☾ 21° 29' 3" ♀. Anom. 1° 13' 1' 30". Lat. 23' 35" + 16. 17 = 39. 52. Totalis.

Horarius 28. 0	03. 130	
Semid. ☾ 16. 17	Lat. 23. 35 — 02. 350	
" umbrae 43. 27	Scrutula dim. morae 13. 25 — 00. 780 — 149785	
Var. 53	" " durat. 53. 56 — 12. 310	
Summa 58. 51 — 14. 660	53' 56" — 28' = 25. 56	83900
Diff. 27. 10 — 03. 130	28. 0	76214
	Dimidia mora 28. 45 — 73571	
	" duratio h. 1. 55' 34" — 7686	
	Tempus incidentiae " 1. 26. 49.	

Haec igitur eclipsis fundamentalis fuit assumpta, eique calculus sic accommodatus, ut eam exacte repraesentaret, quoad ipsum medium: cetera tempora morae et durationis superant observata, praesertim morae.

Meo Calculo.

☉ 21° 29' 0" ☾ 21. 28. 43 ♀ Par. ☾ 59. 4		
☉ 26. 26. 32 ☾ Requisite 30. 18	☉ 1. 1	Horar. ☾ 31. 0
4. 57. 32	Diff. 1. 35	" ☉ 2. 32
1. 18 Red. Ang. lat. 27. 30 Semid. ☉ 15. 30	60. 5	☾ a ☉ 28. 28 — 74550
21. 30. 16 Requis. Simplex 25. 55	44. 35	Sc. dur. 53. 3
	" ☾ 15. 11	24. 35 — 89208
	59. 46 — 15. 110	Dur. h. 1. 51. 50 — 14650
	Ang. lat. 27. 30 — 03. 200	Sc. morae 10. 20 — 175900
	Fit totalis. 12. 41	Mora dim. 21' 47" — 101350
	Diff. 29. 24 — 03. 660	Per simplicem paulo longior.
	Scrup. dur. 53. 3 — 11. 910	
	" mor. 10. 20 — 00. 460	

Igitur ego ipsissimum medium subduco ad h. 10. 15' aequalem. Rursum enim hic diminutam quidem aequationem subtrahō, quo nomine calculus plus praevertere debuit, at vicissim fere tantum ad metam mediae et profundissimam immersionem accedit, ut ita solis 4' meus praevertat calculus Tyehonicum. Et cum ☉ in 21½° ☾ physicam aequationem nullam faciat, proinde calculus meus observationem sequitur 6' horae. Moram exacte repraesento nec minus et durationem. Itaque retroactu nodi majorem utramque facerem observatis.

VIII. Eclipsis Lunae anno 1581. 19. Jan.

Severinius ex observationibus Tyehonicis Uranib. exscripsit initium h. 7. 57', incidentiam h. 9. 16', emersionem h. 10. 40', ut totalis fuerit. Praeterea nihil Morata igitur est in tenebris h. 1. 24', cujus dimidium 42' adjectum ad incidentiam constituit medium h. 9. 58' apparenti Uranib. Et adscripta est in Prog. h. 9. 57'. Jam quia ☉ in 10° ☾, aequatio temporis Tyehonica est 9' 52" add.

Hinc calculus Tyehonis sic habet.

☉ 10° 5' 27" ☾ 10° 4' 47" ♀. Anom. 11° 12' 10' 47".	☉ 2° 48' 5"
Semid. ☾ 16. 0	Lat. 14' 33"
Umbrae 43. 1	Horar. 27' 14"
Var. 54	
Summa 58. 7 — 13. 320	Medium igitur indicatur h. 10. 8½'
Diff. 26. 7 — 02. 880	exacto satis consensu cum obs., duratio
Lat. 14. 33 — 00. 910	similiter tantum 3½' fit minor obser-
Scrump. dur. dim. 54. 8 — 12. 410	vata; sed durationem computo h. 1. 35'
" mor. " 21. 33 — 01. 970 — 102400	quae fuit observata h. 1. 24' ob causas
Horarius 27. 14	opticas ut in superioribus.
26. 54	In hac igitur eclipsi apparet.
Mora dim. 47. 28	frustra niti astronomum, qui, ut tem-
Dur. dim. h. 1. 59. 16	pore durationis et morae calculo
	repraesentare quæat, vim facit ipsa

demonstrationibus in constituendis semidiamentris \bigcirc et umbrae. Ecce enim Tycho in gratiam quarundam observatarum eclipsium dimiuit umbrae, auxit \bigcirc semidiamentros; et illas quidem tunc expressit observationes, at jam ne sic quidem obs. hujus eclipseos exprimere potest.

Lubet autem positis hisce: duratione sc. dimidia h. 2. 1' ut observatum, et mora dimidia 0. 42', ut et assumpto horario 27' 14" et semid. \bigcirc 16. 0, lubet, inquam, videre, quanta conficiatur lat., quanta semid. umbrae ex theoremate, quod in Hipparcho demonstro. Nam si horarius tantus, respondebunt scrup. durationi quidem 54' 55", morae vera 19' 4"; horum quadrata sunt 50' 16" et 6' 4", ut horum diff. 44' 12" esset semid. umbrae, unde ablata semid. \bigcirc 16. 0. restaret 28' 12" ejus quadratum 13' 15", unde ablato quadrato 6' 4", restaret 7' 11" quadratum latitudinis, et lat. igitur 20. 46 (v. s. p. 531). Quanta hinc perturbatio, si sic velles corrigere in Tychone semid. et lat. eoque etiam locum nodi? Et a qua tunc standum, si singulae observatae per se peculiarem correctionem poposcerint hac methodo examinatae?

Jam igitur ad meum calculum.

\odot 10. 4. 58 \approx	$2^{\circ} 23'$	Parall. \bigcirc = 58. 26 (+par. \odot = 1' 1") = 59' 27"
\bigcirc 7. 41. 50 \approx		Semid. umbrae = 59. 27 — semid. \odot 15. 29 = 43' 58"
\bigcirc 10. 3. 55 \approx	39 Reduct.	43. 58 + 15' (semid. \bigcirc) = 58' 58" — 14. 710
diff. = 24"	10. 4. 19 Requis.	43. 58 — 15' = 28' 58" — 03. 550
Lat. 13. 11; simpl. 12. 28.		Latit. = 13. 11 — 00. 740
Hor. \bigcirc 30. 0	log. 27' 27" = 78200	Sc. dur. dim. 57. 27 — 13. 970
\odot 2. 33	" 2. 33 = 316	" mor. " 25. 43 — 02. 810
\bigcirc a \odot 27. 27	237800	Dur. dim. h. 2. 5. 34
" 25. 43	= 84700	
	6500. Mora " " 0. 56. 13	

Medium computo h. 10. 6 $\frac{1}{2}$ ' aequali, plane ut Tycho, quia causae varietatem efficientes per se hoc loco sunt exiguae et compensantur; sed physica aequatio addit hoc loco apparenti 2' 30". Ergo vicissim hic ablata relinquit h. 10. 5'. Itaque calculus meus sequitur observationem per 7'. Fit etiam duratio mihi paulo longior, tanto superans observatam, quanto Tychonica deficit ab observata. Morae vero prolixitas major quam Tychonicae causam habet minorem diametrum \bigcirc , majorem umbrae, superatque observatam 28' propter easdem causas ob quas et Tychonica superat per 11'.

Quare hic iterum nodus antecedens in antecedentia translatus latitudinem majorem, durationem minorem, moramque multo breviorum facit.

IX. Eclipsis Lunae anno 1581. 15. Julii.

Tycho Brahe reliquit annotatum, tempus hujus eclipseos abundasse per h. 1. 20', siquidem, ante quam \bigcirc occideret Huennae, dimidiam in umbram ingressam fuisse.

Sole igitur in 2 $\frac{1}{2}$ \bigcirc versante arcus semidiurnus sub alt. poli 56° est h. 8. 7', oritur igitur \odot h. 15. 53'; sed tunc \bigcirc jam occidit, quippe stans adhuc ante oppositum \odot , lat. sept. parva et per parallaxin ultra 1° profundius in occasum demersa, quam ejus locus verus fert. Etsi vero dimidium hujus refractio emendat, eadem tamen et \odot tantulo ante h. 15. 53' apparere facit, ut ita refractio hic emitti possit. Luna igitur c. h. 15. 48' occidit; ante igitur h. 15. 48' dimidia in umbra fuit. Ac cum semid. fuerit 16' 15", horarius a \odot 35' 21", immersioni igitur dimidia, siquidem \bigcirc omni latitudine careret, venirent 27' 35" et jam per hanc lat. veniunt plura, dimidium c. de tempore incidentiae, quod mihi est h. 1. 5' 34"; ablato igitur dimidio 33' de h. 15. 48' restat initium ante h. 15. 15'.

Praeterea annotavit Tycho, horologio a Lunae alt. correcto quartam partem abfuisse h. 15. 22', quo confirmantur priora. Si enim quartam etiam incidentiae, id est 16' auferas ab h. 15. 22', restabit h. 15. 6' pro initio, quod est sane ante h. 15. 15'. Initium tamen Severinius assumit h. 15. 11', et medium in Prog.

expressum est h. 16. 57', quod per Tychonicam aequationem temporis 9' 12" et h. 17. 6' 12".

Sequitur calculus hujus eclipseos ex Tychone.

☉ 2° 43' 29" ♀	2. 42. 6	≈	An. 4° 25' 3' 0"	Motus lat. 4. 48. 41
Horarius ♀ 34. 29	—	55390		Lat. 25. 0
Semid. " 17. 48			Sequitur calculus 3' ergo h. 17 appar.	
Umbrae 46. 29			itaque principium h. 15. 17	"
Var. 4	02. 650		cum assumserint h. 15. 11	"
Summa 64. 13	17. 450			
Scrup. d. dur. 59. 8	—	14. 800		
59' 8" - 34' 29" = 24. 39	—	88950		
Dur. dim. h. 1. 42. 53	—	33560.		

Calculo meo.

☉ 2. 42. 59 ♀	Horarius ♀ 37. 44	Parall. ♀ 63. 12
☉ 2. 42. 10 ≈	☉ 2. 23	" ☉ 59
Requis. 2. 41. 50	☉ a ☉ 35. 21 52900	64. 11
☉ 28. 18. 27 ♂	60. 46	15. 5
4. 24. 32 Lat. 24. 14	25. 25 — 85900	Semid. umbr. 49. 6
1. 9 Red. 23. 3	Dim. dur. 1. 43. 7 33000	16. 15
2. 41. 50		85. 21 — 18. 090
		Lat. 24. 14 — 02. 490
		60. 46 — 15. 610

Durationem computo eandem, quanto enim mihi major umbrae, tanto minor ☉ diameter majorque horarius, in aequalis etiam temporis momento, solis 4 $\frac{1}{2}$ ' Tycho-
nicum supero, superarem autem plus, si non respicerem obliquitatem viae ☉: sane
mihi aequatio versus perigaeum major est et subtracta diminuit locum ☉, ut ei
plus restet ad ☉ ☉. At physica temporis aequatio 15' 24" add. si hic subtra-
hatur, medium tempore app. exhibet h. 16. 58' plane ut vult observatio, initium
ergo h. 15. 15', quod est observationi vicinius, quam quod ex Tychonico prodit.

Hic igitur si nodus retro ageretur, aucta latitudine duratio fieret minor, ini-
tium tardius et ab observatione remotius.

X. Eclipsis Lunae anno 1584. 7/17. Novembris.

Tycho Brahe Tomo I. Epist. fol. 72. initium profitetur h. 11. 12', finem
h. 15. 0. Duratio igitur 3. 48. Medium h. 13. 6, quod in Progymn. expressum est
h. 13. 12. Severinius sane collegit, initium observatum esse h. 11. 16, finem
15. 2; huic igitur medium esset h. 13. 9. Unde haec titubatio circa temporis
minuta, non facile conjectura consequor. Tycho sane verbis utitur confidentibus
„Diligenter deprehendi;“ item: „ex remotione certarum stellarum aequatoria a
meridiano infallibili ratione inquisivi.“ Et tamen in protocollo obs. ad hanc diem
eclipseos nec vola nec vestigium apparet, cum tamen durante ea culminationes
annotatae exstent lucidae γ h. 10. 10 $\frac{1}{2}$, oculi ♂ h. 12. 38 $\frac{1}{2}$, capitis II merid. h.
15. 45 $\frac{1}{2}$: puta quia phases ☉ in scheda seorsim ad horologium annotatae, quae
postmodum errantes tandem perierunt.

Facit Tycho primam dicto loco mentionem medii eclipseos alterutro termino
propioris propter obliquitatem viae ☉ ad eclipticam. Medium enim statuit h. 13. 8',
etsi in Progymn. nihil hac de re praecipit. Ego medium temporis non vario,
sed demitto per perpendicularem viae ☉ ex centro umbrae indicem loci, quem
obtinuit ☉ in medio durationis.

Refert ibidem Braheus etiam Henr. Brucae obs. Rostochii habitam in litore
maris Baltici, quae medium referat in h. 13. 4'. Itaque diff. meridd. deinceps am-
plexus est 2', etsi tunc plane nullam credebat, confusus procul dubio Tab. Geogr.
Jodoci Hondii et nantarum crassiusculis obs., quibus tritissimum iter ex fretis
Haennae circumfuso ad litus Megalopolitanum;

Addit Tycho et Witichii Mathematici perquam ingeniosi et industrii obs. Cassellii Chatterum habitam, sed in quam vitium irrepsit in duratione et mora, ut quam prodit 23' brevior quam Tycho. Sed si ponatur finis recte observatus esse h. 14. 45', finis morae h. 13. 45', diff. meridd. erit 15', quod tabulae exhibent 14'.

Calculus Tychonis, cujus aeq. T. 9' 22" sub.

☉ 23. 49. 10 M	☾ 25. 54. 12 ☾	An. 4. 3. 21. 0	Motus lat. 6. 2. 8. 0	Lat. 11' 0"	00. 530
	49. 10				
33. 6 — 59480	5. 2	Horarius 33. 6	Summa 62. 19 — 16. 430		
61. 41		Semid. ☾ 17. 29	Scr. d. dur. 61. 41 — 16. 100		
28. 35 — 74152		" umbrae 45. 44	Diff. 27. 21	03. 170	
	14672 h. 1. 51. 49 dur. dim.	Var. 54	Scr. mor. d. 24. 57	02. 640	
27. 21	78560	" umb. corr. 44. 50			
	19080				

h. 0. 49' 35" mora dimid.

Calculus praevenit tempus hujus eclipsis 9', durationem colligit 4 1/2' minorem observata, tempus incidentiae h. 1. 2'.

☾ Calculo vero meo sic computo. ☉

1583. 1. 7. 8. 1 — 8. 17. 42. 1 — 8. 10. 20. 22	1584. 16. Jan. h. 19. 15'
Riss. Nov. 305.	7. Nov. " 13. 6.
6. 13. 6.	d. 143. h. 17. 51.
312. 20. 14. 1	5° 28' 35" ☉
Revol. XI. 303. 2. 24. 24 — 1. 3. 46. 9 — 0. 16. 3. 2	19. 37. 27
9. 17. 49. 37	44. 37
34. 35	37
55097	25. 0 corr.
18964	☉ 25° 49' 16" M
74061	
	Diff. 4. 40
	1. 38 Lat. 9' 2" simpl. 8' 32"
	27 Red.
	25. 48. 49 Requis.

Parall. ☾ 62. 28

☉ 1. 1

63. 29

Semid. ☉ 15. 26

Umbrae 48. 3

☾ 16. 4

Summa 64. 7 — 17. 400

Ang. lat. 9. 2 — 00. 350

Scr. dur. 63. 29 — 17. 050

Diff. 32. 0 — 04. 340

Scr. mor. d. 30. 42 — 03. 990

Horar. ☾ 36. 28

☉ 2. 32 67000

☾ a ☉ 33. 56 — 57000

Resid. 29. 33 — 70850

Dur. dim. h. 1. 52. 15 — 13850

Mora dim. 0. 54. 16 — 10000

Colligo tempus mediae oppositionis aequale h. 13. 15' aequali, ita sequor Tychonicum 9'. Aequationem enim aufero majorem versus perigaeum.

Et quia sic physica aequatio est 0' 47" sub., tempus igitur apparens prodit h. 13. 15 1/2. Quantum igitur Tychonicus praevenit observationem, tantum ego sequor eandem. In duratione fere coincido cum Tychonico, colligo 3 1/2 minus quam observatum, tempus incidentiae h. 0. 58, minutis 4 minus quam Tycho, ubi Witichius praecise medium observavit inter utrumque.

Si in duratione calculi jubeantur imitari observationem, latitudinem poscent minorem, eoque nodum, qui antecedit Lunam, promotiorem in consequentia.

XI. Eclipsis Lunae anno 1587. 6/16. Sept.

Observata est haec eclipsis Uranib. coelo nubilo, ita ut neque principii neque finis certum signari potuerit momentum.

H. 7. 53 1/2' in tribus observatoriis distincte pronunciatum; in primo ☾ non satis plena inter nubes; in secundo „videbatur (incerte tamen inter nubes) ☾ talis et addita est pictura, in qua desunt digitus cum besse. In tertio „videbatur

tantum deesse" et pictura habet 3 dig. minus $\frac{1}{4}$ digiti, additurque: „sed inter nubes.“ Hoc igitur momento \bigcirc jam dudum inceperat (sic). Sic h. 11. 25 $\frac{1}{4}$ ' annotatum in duobus observatoriis, \bigcirc totam integram emersisse ex nubibus, additur in uno: „utrum autem prius totaliter egressa, propter densitatem nubium discernere non licuisse.“ Finis igitur fuit ante hoc momentum. Proinde medium fuit ante h. 9. 39'. Hora quidem 9. 44' cum emicuisset \bigcirc , videbatur superesse quasi minus quarta diametri, id esset paulo post medium et concordat cum sequentibus. Nam h. 8. 47' quasi quarta superfuit, iterumque h. 10. 11' quasi quarta, quæ ultima phasis conspecta fuit; inter ista medium est h. 9. 29', quod equidem recte cedit ante h. 9. 39' ut supra. Hoc igitur pro medio usurpari potest. Progymn. ponunt medium h. 9. 16, quod vim facit obs. jam recensitis. Nam additum, tempora, quæ ubique observabantur, esse verificata ad stellas, et consenserunt inter se ex 3 locis intra minutum unicum.

Calculus Tychonicus, cujus aeq. t. 2. 15 Add.

\odot 5. 25. 8. 40	\bigcirc 5. 23. 51. 57	— 10. 1. 23. 5	— 5. 19. 55. 57
3. 5. 30. 0	4. 12. 8	2. 47	4. 11. 4
2. 19. 38. 40	1. 4	1. 4	5. 24. 7. 1
2. 0. 22	4. 11. 4	4. 11. 4	lat. 30' 33"
\odot 23. 8. 18 mp	5. 25. 8. 40	10. 5. 34. 9	
	\bigcirc 23. 11. 41		
	9. 5		
Scr. defectus sunt 29. 55	Diff. 2. 36	Semid. \bigcirc 16. 25	
15. 0 — 138790	Horar. 28. 29	„ umbr. 43. 41	
32. 50 — 60290	307700	Var. 30	
Digiti 10. 56	78500	Umbræ corr. 43. 11	
In Prog. 9. 45 ponuntur	6 — 233200	Summa 59. 36 — 15. 040	
At obs. 9 plus.	h. 9. 22	Lat. 30. 33 — 03. 960	
Residui 3 minus,	h. 9. 16 media.	Sc. dur. 51. 10 — 11. 080	
quod est quasi minus	9. 14 apparenti.	28. 29	74400
quarta diametri.		Resid. 22. 41	97280
			22880
		Dur. dim. h. 1. 47' 44".	

Apparet, calculum Tychonicum id assequi fere, quod ponitur in Prog., atque sic deficit ab observatione ad 15'. Frustra hic Severinius titubabat super certitudine observationum, dum ait, collatione phaenomenon ostendi, incertas esse. Neque enim hæc unica et sola est eclipsis, quæ exorbitat, ut fiducia æquabilitatis motuum fidem oculis nostris detrahamus. Quin potius resumendus animus fatendumque ingenue, nondum nobis esse cognitæ omnium enormitatum talium causas, quod attinget minimos scrupulos.

Ut evidentia major sit hujus dissidii, esto sane medium h. 9. 12', lat. igitur fere 31', summa semidd. 59' 36", scrup. defectus 28' 36" +

28. 36	59. 36 — 15. 040
14. 18 — 143400	lat. 31. 0 — 04. 070
32. 50 — 60290	Sc. dur. 50. 55 — 10. 970
Digiti 10. 27	83110
	Horar. 28. 29 — 74500
	22. 26
	98400
	Durat. h. 1. 47. 15 — 23900

Hæc duratio ab h. 9. 14' ablata, relinqueret h. 7. 27' initio; addita, h. 11. 1' fini. Atqui h. 7. 53' ad summam 3 digiti defecerunt, minus enim habent omnes tres, duo vero illorum minus quam 2. Sunt tamen 3: facile hinc colligemus initium. Nam 3 dig. de diametro \bigcirc sunt sc. 8. 13'', quæ addita ad semid. umbræ 43. 11 faciunt distantiam centrorum 51' 24" — 11. 190

Usurpetur latitudo	34. 0 — 04. 890
Ergo scrupula viae	38. 34 — 06. 300
	28. 29
	178346
	10. 5
	745

108846, dant h. 1. 21' 14".

Ablata igitur h. 1. 21. 14 a dimidia duratione h. 1. 47. 15, relinquuntur 26' et haec ab h. 7. 53 $\frac{1}{2}$ ' ablata, relinquunt h. 7. 27 $\frac{1}{2}$ '. Itaque 3 solidi digiti vix possunt hoc initium, nedum 2 vel 1. Adde, quod duratio tanta non fuit, quia nec quantitas eclipsios tanta.

Sed venio ad meum calculum.

1588.					⊙ 1587.				
22. 10. 3. 20	—	0. 17. 25. 40	—	6. 13. 25. 59	17. Jun. h. 13. 58'	—	5° 29' 44" ⊙		
248. 9. 22.					8. Sept. 9. 22		28. 50. 14		
271. 1. 25. 20							47. 27		
275. 13. 5. 49	—	1. 0. 41. 57	—	0. 14. 35. 29	d. 80 — 18. 24	—	⊙ 23° 7' 26" mp		
4. 11. 40. 29	—	1. 18. 7. 37	—	5. 28. 50. 30			58. 42		
31. 25		1. 24. 37. 3		14. 22			2200		
64700		21. 12		25. 0 Corr.			21278		
39400		⊙ 23. 9. 22	⊗	⊙ 29. 29. 52 mp			23478		
104100	Req. 23. 9. 4	⊙ 23. 7. 25							
Parall. ⊙ 59. 27		6. 22. 27. lat. 0. 35. 14, simpl. 33. 17							
⊙ 1. 0		1. 39 Reduct.							
60. 27		23. 9. 4							
Semid. ⊙ 15. 13		Horar. ⊙ 31. 33							
" umbrae 45. 14		⊙ 2. 27							
" Lunae 15. 17		⊙ 29. 6	72300						
Summa 60. 31	—	15. 490							
Lat. 35. 14		05. 250							
Sc. defect. 25. 17		10. 240	—	49. 12					
12. 39		20. 6	—	109400					
155800				37100					
67400									
Digitum 9. 56' — 88200									
Residui 2. 4.									

Duratio h. 1. 41' 24", minor quam Tychonis, quia et digiti pauciores et observationi propiores, quippe latitudinis quam umbrae major excessus hic. Et quia ⊙ in 23° mp, aeq. temp. physica est 15' 20". Etsi igitur in tempore aequali sequor Tychonicum 8', propterea quod minorem aequationem addo, vicissim tamen apparens tempus prodit mihi h. 9. 6' 40", adhuc 7' citius quam in Tychonico, ut differam ab obs. 22', sitque initium et h. 7. 26', quod tardius fuisse observatione testatur.

XII. Eclipsis Lunae anno 1588. 3/13. Martii.

Nulla unquam eclipsis diligentius opinor operosiusque est observata, idque in 3 observatoriis. In primo observatorio initium animadversum h. 13. 13', horologio per Canem correcto. Tota in umbra h. 14. 20'. Coepit egredi h. 15. 44'. Desiderabatur non multum h. 16. 45': quantitas per nubes discerni non potuit. At h. 16. 50' conjecturando inquit, quod aequaliter undique lumen spargeret, hic desiit, tota plena, quantum per densiores nubes videri potuit. Igitur inter h. 13. 13' et 16. 50' medium est h. 15. 0'. At inter 14. 20 et 15. 44. medium est 15. 2. Hoc igitur translatum est in Progymn. Sic visa est in umbra pars quarta h. 13. 26' et h. 16. 36'; medium h. 15. 1. Sic tertia pars signata est ad h. 13. 30 $\frac{1}{2}$ ' et 16. 28 $\frac{3}{4}$ ', medium h. 15. 0 fere. Et semissis in umbra h. 13. 38' et 16. 28 $\frac{1}{2}$ ', medium h. 15. 3 fere. Satis igitur in hoc observatorio confirmatum est medium h. 15. 0.

At in secundo observatorio h. 13. 45 $\frac{1}{2}$ ' et h. 16. 27 $\frac{3}{4}$ ' aestimatus est semissis deficere; medium est h. 15. 6 $\frac{1}{2}$ '. Sic h. 14. 26' et 15. 40' initium et finis totalis obscurationis, medium h. 15. 3'. Et ab hora quidem 15. 40 videbatur egredi sed obscure, inde dubitatum usque post 13', cum inconsumetum haberet lumen. Itaque prior ille moram habet h. 1. 24', hic jam 1. 14', per 10 minus. Tantum facit diversitas oculorum.

In quantitate melius sto quam Tychonicus per 1 digitum, abundo tamen adhuc c. dimidio digito aut plus super id quod observatum. Nec emendamus nisi aucta latitudine et sequente nodo amplius promoti, quod est contrarium superioribus eclipsibus.

Denique in tertio observatorio penitus immersa videbatur ab h. 14. 31' usque in h. 15. 47' per 1. 16', medium est h. 15. 9'. Etsi et hic 6' citius notavit, jam altera parte lucidiorem \bigcirc fuisse, quasi mox emersuram ex umbra. Plures hac de diversitate querelas vide Astr. Opt. fol. 303, ubi de hac eclipsi pauca a me pro captu puerili observata commemoro.

De observatione latitudinis et distantiae a fixis dicam postea plura. Nunc ad calculum Tychonis, cujus aequatio temporis 2' 20'' Add.

⊙ 11. 20. 49. 23	⊙ 6. 6. 42. 20	3. 20. 2. 43	0. 7. 53. 21	Horarius 31' 48''
3. 5. 30. 30	4. 43. 8	1. 42	4. 43. 8	Sd. \bigcirc 17. 15
8. 15. 18. 53	6. 1. 59. 12	4. 43. 8	0. 3. 10. 13	umbr. 45. 14
2. 0. 13	11. 20. 49. 23	3. 15. 19. 35	Lat. 16. 30	Variat. 41
⊙ 22. 49. 36	⊙ 22. 48. 35	mp	Summa 61. 48	— 16. 150
				01. 160
			Scrupula durationis 59. 31	— 14. 990
			59' 31'' — 31' 48'' = 27. 43	— 77200
				63480
			Duratio dimidia h. 1. 52. 18	— 13720
			Diff. 27. 18	— 03. 160
				01. 160
			Scrup. morae 21. 43	— 02. 000
				101600
			Mora dimid. 40. 58	— 38120

Igitur calculus Tychonis plane assequitur h. 15. 2' apparentem, durationem facit h. 3. 44 $\frac{1}{2}$ ', quae superat observatam per 8' vel plura, moram in tenebris 1. 22', quod congruit.

Cum vero semper hactenus duratio computata consenserit observationi, mora computata superaverit saepe observatam, non injuria causam quaerimus, cur in hac eclipsi durationem computemus prolixiorē? Anne igitur \bigcirc non adeo profunde erat in umbram immersa, sed magis ad latus septentrionis breviori via trajecit? Anne igitur lat. major fuit? Id quidem datur ex observatione discernere. Nam crebro est observata declinatio visibilis cornuum \bigcirc , praesertim toto illo tempore, quo tota delituit in tenebris, et quidem eo ipso momento, quo incidit in gradum ab ortu nonagesimum eclipticae hora sc. 14. 35', supremus margo declinavit 2° 38' 30''; nam inferior videri non potuit; et huic declinationi ceterae ante et post exceptae pro ratione promotionis Lunae angulique eclipticae cum horizonte consentiunt. In alt. vero poli 35° 55', oriente 23° x, angulus seu alt. nonagesimi est 28° 32' et a 22 $\frac{1}{2}$ ' mp latitudo usque in aequatorem 3° 7', angulus circuli latitudinis et aequatoris 66° 40'. Cum ergo supremus margo declinaverit 2° 38' 30'', centrum igitur subtracta semid. \bigcirc Tychonica declinavit 2° 21' 15''. Quare inter centrum \bigcirc et aequatorem in circulo latitudinis superfuit 2° 33' 51'', quod ablatum a 3° 7' relinquit 33' 9'' lat. \bigcirc visibilem australem. In anomalia vero 105° et alt. 28 $\frac{1}{2}$ ' parallaxis Tychonica est 54' 30'', unde ablata lat. visa austr. 33' 9'' relinquit latitudinem veram sept. 21' 21'', cum Tychonis calculus habeat 16' 30''. Ex meis parallaxibus et semid. \bigcirc colligeretur vera lat. ex observatione adhuc uno scrupulo major.

Ex hac igitur observatoria lat. vide quanta exeant tempora eclipseos Tychoi:

Summa semidd.	61. 48	— 16. 150
Latitudo 21. 21	— 01. 930	
Scrup. durationis 57. 57	14. 220	
Horarius 31. 48	— 63480	
26. 9	— 83050	
Duratio dim. h. 1. 49. 20	— 19570	
Diff. semidd. 27. 18	— 03. 160	
Scrup. morae dimid. 17. 0	— 01. 230	
	126113	
Mora dimidia h. 0. 32. 4	— 62633	

Vides, per hanc veram lat. prodire etiam durationem proxime aequalem observatae. Mora vero fit per Tychonicum 10' minor, quam is observavit, quam brevissimam dixit.

Sequitur calculus meus.

1588. Pro ☉	1587. ☽
16. Jun. h. 20. 12 — 5. 30. 47 ☉	Feb. Bis. 1. 21. 43. 11 — 2. 0. 24. 21 — 5. 23. 0. 18
2. Mar. 15. 3 — 12. 28. 14	d. 61. 15. 3.
D. 106. 5. 9 — 12. 48	63. 12. 48. 11
59. 39 ☉ 22. 49. 45 ☿	Revol. II. 55. 2. 37. 10 — 0. 6. 8. 24 — 0. 2. 55. 6
585 + 153900	8. 10. 9. 1 — 2. 6. 32. 45 — 5. 20. 5. 12
= 154485.	33. 48 3. 16. 7. 7 25. 25
Parall. ☽ 61. 43 Horar. ☽ 35. 10	57400 5. 5 1. 20
☉ 1. 0 ☉ 2. 29	189500 22. 44. 57 mp Cor. 25. 0
62. 43 ☽ a ☉ 32. 41	246900 Req. 22. 49. 0 ☉ 20. 3. 27 mp
Semid. ☉ 15. 16 60750	4. 3 ☉ 22. 49. 45 ☿
umbrae 47. 27 28. 46 — 73510	2. 46. 18
☽ 15. 52 27. 35 — 77713	Reduct. 0. 46
Summa 63. 19 — 16. 960 12760	Duratio dim. h. 1. 52. 48
Diff. 31. 35 — 04. 220 16963	Mora dim. 0. 50. 38. Requis. 22. 49. 0
Latitudo 15. 18 — 01. 000	Lat. 15. 18
61. 27 — 15. 960	Simpl. 14. 27
27. 35 — 03. 220	Duratio et mihi

prodit 9' major observata, mora vero 1. 41',
valde magna, quia umbram habeo magnam, diam. ☽ parvam. Sed ubi lat. usurpo eam,
quae congruit observationi, tunc consueta fiunt. —

Mihi igitur tempus ☿ aequale sequitur post 7', quia majusculam aequationem subtraho versus perigaeum. Sed physica temporis aequatio est 10' 40'' subt., quae hic addita constituit medium h. 15. 20¹/₂' apparenti. Convellitur sic temporis aequatio physica.

Lat. 22. 14	16. 960	04. 220
	02. 090	02. 090
	14. 870	02. 130
Ser. dur.	59. 6 60750	Ser. dur. 22' 28'' 98360
	32. 41 82035	60750
	26. 25 21285	37610
	h. 1. 48' 30'' dur. dim.	Mora dim. 0. 41. 11.

Hic plane exprimo utrumque tempus ut est observatum: quasi causae opticae hac vice cessaverint. Apparet ergo, calculum astronomicum non debere accommodari causis opticis, ut fecit Tycho in diminuenda diam. umbrae. Hic igitur non umbra cessit in meridiem, quale quid supra sum suspicatus eclipsi VI; sed plane ☽ exorbitavit in septentrionem aut nodus retroactus est.

Sed considerabo etiam observationes ☽ ad fixas. Cum enim Braheus ad h. 15. 0. app. referat locum centri ☉ in 22° 49' 28'' ☿, erit umbrae centrum, si non vitietur illa per opticas causas, in 22° 49' 28'' mp. Jam vero h. 14. 40' et sic 20' ante id momentum, quo ☽ visa est in ☿ ☉, fuit per 10' 36'' ante centrum umbrae, et illud in 22° 48' 40'' mp. Illo vero momento visus est margo ejus occidentalis distare a corde ☿ 28' 1'', et sic centrum per semid. Tychonicam 28° 18' 15'', cum visa lat. austr. 0° 33' ut prius, et stella habet lat. bor. 0. 26¹/₂'; summa utriusque est 59¹/₂', propter quam haec distantia obliqua in zodiaco fit 1' brevior, sc. 28° 17' 15''. Ac cum ☽ 5' antea fuerit in ipso Nonag., nulla erit parallaxis long. aut perexigua in occasum. Itaque visus ☽ locus in 22° 38' mp. Aufer dist. 28° 17' 15'', veniet locus cordis ☿ in 24° 20' 45'' ☿ aut (posita aliqua parallaxi long.) paulo antea. At Tycho ponit stellam illo anno in 24° 6' ☿, ita invenietur Cor ☿ per 14 vel 15' promotius, quam in calculo Tychonis. Et quia mihi ☽ in obscuratione maxima in 22° 49' mp orbitae, stans e regione 22° 48' 14'' eclipticae, ablato triente horarii mei 11' 43'' relinquitur 22° 36' 31''. Hinc aufer intervallum 28° 16' 15'' (auctum sc. semid. mea), restat etiam 24° 20' ☿.

Circa ipsum medium fuit haec distantia iterata. Nam h. 2. 57 $\frac{1}{2}$ inventa est 28° 9', potius 28° 11' collatione ad praecedentes et sequentes. Et h. 15. 3' fuit 28° 14', igitur ipsa h. 15. 0 fuerit 28° 12 $\frac{1}{2}$. Hic jam prius quaerenda parallaxis long.

Asc. R. ☉	353° 25'				18847
H. 15.	225.			82308	— 10710
	90.				
Asc. obl. hor.	308. 25			67. 12 8137
Latus aequat.	51. 35 — 24397			23. 31 $\frac{1}{2}$	
Alt. aequat.	34. 5 — 57911 — 18847			90. 43 $\frac{1}{2}$	
	82308 — 10710	Ang. orient.	26. 3 $\frac{1}{2}$ —	89. 16 $\frac{1}{2}$ 8
				88. 39	— 28
				28. 39 \mp	
				22. 48 \mp	
				5. 51 —	228352
					402000 — 402000
					712632 412718
					2. 48 55. 30

Cum igitur centrum ☽ distiterit a corde per 28° 29' 45'', diametro ☽ Tycho-
nica, fuerit vero versus occasum et cor ☽ projectior per 2' 48''; locus ejus visus esset
22° 46' \mp . Aufer hinc distantiam dictam uno minuto diminutam propter obliquitatem,
prodit 24° 17' ☽ locus stellae, tribus saltem aut quatuor minutis minus quam prius.
Ita confirmatur nobis long. fixarum promotior per 11'.

Eodem momento fuit inter eundem limbum Lunae et spicam \mp 25° 41' 30''. An-
fer semid. ☽ Tychonicam, erit inter centrum et spicam 25° 24' 15''. Sed lat. spicae
est 1° 59' austr., ablata lat. visa ☽ 33' c., restat 1° 26', ob quam 2' plus sunt dete-
renda de distantia, ut restet 25° 22'; hoc adde ad locum ☽ visum 22° 46' \mp , consur-
git locus spicae 18° 8' \mp . Sed Tycho collocat illam in 18° 5'. Invenitur quidem et
haec stella promotior, sed non tanto quanto spica. Scilicet in medio umbrae difficulter
margo cernitur, quare instrumenti pinnacidia in aliquam partem coeli dirigi consenta-
neum est, non in merum limbum, ut ita comparatus cum coelo fuscus Lunae margo
cerni possit. Hoc pacto illic plus subtrahetur, hic plus addetur, ut medium inter 3 et
11, sc. 7 valeat. Certo igitur fixae hic 7' c. inveniuntur ab aequinoctio promotiores.

Ex iisdem distantis ☽ a fixis licet etiam pronunciare de horario ☽. Nam Tycho-
nicus est 31' 48'', meus 32' 41''. Etenim nocte antecedenti h. 13. 27', quando ☽ in
Nonagesimo fuit, longitudinis parallaxi carens, margo occidentalis visus est distare a
corde ☽ 14° minus $\frac{1}{2}$ '. Hac vero nocte h. 14. 40' idem margo ab eadem stella ab-
fuit 28° 1'. Sic horis 25. 13' ☽ promota fuit per 14° 1 $\frac{1}{2}$ '. Ergo uni horae veniunt
33' 24''; unde aufer horarium ☉ 2' 27'', restant 30' 57''. Et quia ☽ est in descendenti
semicirculo, principio igitur hujus temporis minor fuit horarius, medio tantus, sc. circa
h. 3 $\frac{1}{4}$ diei antecedentis; fine vero, sc. durante ipsa eclipsi, jam fuit major. Recte igitur
majorem uterque exhibet quam 31'. Melior vero meus, quia, quem diximus horae
3 diei accommodari sc. 31', is non est in ipso articulo oppositionis, sed 12 h. ante,
non igitur celerrimus. Datur enim intelligi, si ☽ totis his 25 horis in vigore hoc op-
positionali cucurrisset, plus omnino promoturam fuisse.

XIII. Eclipsis Lunae anno 1590. 6/16. Julii.

Haec eclipsis Uraniburgi non est visa, nam ☽ prius occidit, quam de ea quic-
quam delibaretur. Oritur autem ☉ in 23 $\frac{1}{2}$ ° ☽ Uraniburgi h. 15. 38', et ☽, quippe
adhuc paulo ante ☉, occidit etiam aliquot scrupulis maturius, cum etiam parallaxi
deji iatur in occidentem plus quam a refractione attollitur.

Vicissim de eadem eclipsi scribit sic Maestlinus libello de Eclipsibus anno (96)
97. edito: „Nos hic Tubingae ☉ centro supra horizontem emergente vidimus ☽ ab austro
aliquot digitis jam deficientem 2° c. elevatam; et contra ☽ centro sub occasum descendente
notavimus ☉ supra ortum 2° altitudinem.“

Oritur eo die Sol Tubingae h. 16. 15' et propter refractionem 1° majorem
aliquot minutis maturius. Oportet igitur ☽ Uraniburgi post occasum quidem ad

umbræ marginem venisse, at multo ante h. 16. 26', quia in tanta lat. tarde conficiuntur aliquot digiti.

Calculus Tychonis.

☉ 3. 24. 35. 24	—	6. 2. 38. 17	—	4. 14. 22. 10	—	5. 22. 55. 11
3. 5. 32. 0		3. 39. 16		3. 38		3. 37. 55
19. 3. 24		1. 21		3. 37. 55		5. 19. 17. 16
0. 38. 54		3. 37. 55		4. 10. 44. 15		21. 32
☉ 23. 56. 30	☉	5. 29. 0. 22				5. 19. 38. 48 Lat. 55' 12"
35. 46		3. 24. 35. 24				
Diff. 20. 44		☉ 23. 35. 46	☉			
Horar. 33. 34		Oppositio contigit post 37' 3" h. 16. 57' aeq. Uranib. ☉ 23° 57' 12" ☉				
106250	Semid. ☉	17' 35"		16. 49 1/2 apparenti		
58080	Umbræ 46. 2			56 1/2		
48170		63. 37 — 17. 120		15. 53 initium, Tubingae h. 15. 42'		
	Latit. 55. 12 — 12. 900					
	Scr. defic. 8. 25	4. 220				
	Scr. dur. dim. 31. 34	64220				
	Dur. dim. h. 0. 56. 25	58080				
		6140				
		4. 13	265732			
		35. 10	53425			
			212307			

Digitis 2. 52'

Calculo meo.

☉ 23° 57' 7" ☉	
☉ 23. 52. 33	☉
☉ 4. 43. 26	☉
10. 46. 19 lat. 59' 20", simpl. 56' 1"	
2. 44	
23. 59. 51	
Parall. ☉ 62. 46	
☉ 0. 59	
63. 45	
Semid. ☉ 15. 2	
Umbræ 46. 43	
☉ 16. 8	
64. 51 — 17. 800	
Lat. 59. 20 — 14. 900	
Sc. defectus 5. 31	02. 900

Digitis paulo minus duo.

Sic igitur apparens initium ex meo calculo venit 19' posterius quam ex Ty-
chónico, quadrantem tamen horæ antevertit occasum Lunæ. Hic observatio nos
non discernit: versatur enim hoc initium ab utroque nostrum computatum intra
terminos ab obs. praescriptos, ut et ipsum cadat inter occasum ☉ Huennensem et
Tubingensem, et occasus ☉ cadat inter initium et mediam obscurationem.

Illud vero utrique nostrum objici potest ex Maestlino, majorem per illius verba
repraesentari defectum, quam in nostris calculis. Si enim prius quam maximus
esset defectus, et secundum meum quidem calculum multo prius, „jam aliquot di-
giti erant in defectu," certe quod majus est aliquot digitis, id omnino majus quid
erit 2 digitis a me dictis, majus etiam 3 digitis a Tychone dictis. Anne igitur
Luna ad ☉ iens meridionalior fuit et nodum hunc loco anteriori invenit? et multo
quidem anteriori? Igitur in hac re concurrunt eclipses praecedentes XII, VI et
aliae, contrarium postulantes IX—XI.

XIV. Eclipsis Lunae anno 1590. 30. Dec.
1591. 9. Jan.

Finis hujus deliqui fuit observatus Uraniburgi 2' 40" prius quam sequens

Ergo maxima obscurationis h. 17. 9'
aequali. Minutis 12 sequor Tychnicum
in observatione maxima, quia versus
perigaeum magnam aequationem sub-
traho, simul propter obliquitatem ☉ me-
tam promoveo maximae obscurationis.

Horarius ☉ 36. 57
☉ 2. 24

☉ a ☉ 34. 33 — 55200
Scr. durat. dim. 26. 8 — 83100
Durat. d. h. 0. 45. 23 — 27900
Medium 17. 9

Initium h. 16. 23. 37 aequali.
Aequatio physica 11' 46" add. ergo h. 16. 12'
apparenti. Tubingae vero h. 16. 1'.

humerus Orionis a meridiano in orientem remotus esset $20^{\circ} 41'$ cum stellae asc. recta anno 90. esset $83^{\circ} 18\frac{1}{2}'$, ablato intervallo relinquitur asc. recta M. C. $62^{\circ} 37'$. Hinc aufer $40'$ pro $2^{\circ} 40''$, restant $61^{\circ} 57'$ tempore finis. Sol vero in $19^{\circ} 8' \zeta$ habet asc. rect. $290^{\circ} 43'$, diff. $131^{\circ} 14'$ conficit h. 8. 45'.

Etsi coadjutorum unus ante 3' pronunciaverat \bigcirc totam rotundam, Tychone reclamante, Severinius finem assumsit h. 8. 40'. Viginti figurae distinctarum \bigcirc phasium se invicem sequuntur, annotatis ubique temporibus et inclinatione umbrae, est ubi et altitudine \bigcirc : initium tamen deest, prima enim phasium fuit, quando paulo plus dimidio diametri \bigcirc in umbra et cornuum linea ad perpendicularum erecta pingitur, horologii quidem indicatione h. 6. 5', sed quod tunc ostendit h. 6. 40', quando Aldebaran a meridiano abfuit $30^{\circ} 1'$, i. e. in Asc. R. M. C. $33^{\circ} 8'$, i. e. h. 6. $49\frac{1}{2}'$, ut ita phasis dicta congruat horae 6. $14\frac{1}{2}'$, correctae. Altitudo supremi marginis \bigcirc $20^{\circ} 25'$ cum declinatione $21^{\circ} 2\frac{1}{2}'$ angulum ad polum facit $84^{\circ} 22'$. Etsi vero \bigcirc est vere ante \odot , at visibiliter est projecta in ortum, fere in $\delta \odot$. Et simul habet lat. merid. estque parallaxi adhuc projectior in meridiem. Si igitur ipsum punctum eclipticae \odot oppositum fuisset, hora indicaretur 6. 22'. Sed propter dictas causas aliquot scrupulis minus fuit, ut prius. Inde ad VI. schema dicitur paulo minus quarta parte superfuisse ad h. 7. $13\frac{1}{2}'$ correctam et quidem paulo etiam ante pars residua aestimabatur quasi quarta. Et inclinatio cornu congruebat medio circiter, erat enim quasi 45° , cavitate sursum spectante versus sinistram. Sane h. 7. 33 supina cornua arguebant, jam transisse medium. Et schema X. exhibet h. 7. 46' eandem quantitatem illi, quae in I. schemate, ut hoc pacto medium fuerit h. 7. 0. Exiit umbra versus verticem ad dextram. Medium in Prog. adscriptum est h. 6. 55'.

Calculus Tychonis, cui aequatio est T. 6' 22" add.

\odot 19. 9. 6 ζ .	\bigcirc 19. 11. 35 \ominus .	Anom. 9. 16. 39. 30.	Mot. Lat. 11. 24. 14. 18
51. 57		Horarius 29. 36	5. 11
29. 36 — 70700		Semid. umbrae 43. 16	1. 12
22. 21 — 98600		" \bigcirc 16. 44	2
H. 1. 45. 18 — 28100		60. 0 — 15. 230	Lat. 29' 55"
Dim. duratio 33. 28 — 58400		29. 55 — 03. 795	
15. 3 — 138400		Scrup. def. 30. 5	11. 435
Dig. 10. 47 — 80000		" dur. d. 31. 57.	

Medium ergo calculo Tychonis repraesentatur h. 6. 52', finis h. 8. 37'. Sed utcumque sint ista propinqua observatis, quantitas certe nimia est, ubi superest nihil ultra $1\frac{1}{4}$ dig., cum 3 dig. censiti sint superesse. (Comp. Hist. Coel. p. 423.)

Consulo igitur meum etiam calculum.

169 D. h. 7. 51' \odot 19° 8' 46" ζ \bigcirc 5. 23. 36. 35 — 6. 3. 12. 12 — 3. 24. 38. 22	
1. 1. 15	32. 11 — 2. 13. 40. 59
67200 Parall. \bigcirc 60. 16	62300
52330 \odot 1. 1	49475 \bigcirc 19. 11. 34 \ominus \bigcirc 25. 22. 23 \ominus
119530	61. 17
Semid. \odot 15. 32	111775 Req. 19. 10. 23 \odot 19. 8. 46
" umbrae 45. 45	1. 11
66035 " \bigcirc 15. 30	Medium h. 7. $1\frac{1}{2}'$ aeq. 1. 37 Reduc.
	19. 10. 23
61. 15 — 15. 870	
Lat. 34. 26 — 05. 010	
80500 Scrup. def. 26. 49	10. 860
14465 Digiti 10. 23	50. 40 sc. dur.
	30. 14 — 68500
	20. 26 — 107700
Dim. dur. 1. 40. 33	39200
Medium 7. 1. 30 aequali	
Finis 8. 42.	"

ergo h. 8. 38' 38" apparenti. Temporis aequatio physica est 3. 22 add.

Hic sequitur meus Tychonicum in tempore medii aequali $3\frac{1}{2}'$, quia aequatio quidem mihi est eadem, reductio vero ad metam obscuracionis maximae totum conficit. Latitudinem habeo majorem, quia et angulus mihi major et nodus magis in sequentia a D distans. Hic etiam dimidia duratio mihi minor, essetque multo minor, nisi mihi auctior umbra, diminutior D . Nec multo tamen mihi minor defectus, etsi multo major latitudo. Nam scrupula quidem defectus pauciora habeo, at simul et D diametrum brevior.

Quod vero observationem attinet quantitatis defectus, illa sane utrumque nostrum redarguit fortiter, magis tamen Tychonicum. Minor enim fuit, major igitur latitudo, ac proinde nodus promotior, quippe D sequens. Accedit igitur haec eclipsis ad classem posteriorem, in qua sunt IX, X, XI.

Considerabimus tamen etiam declinationem in prima phasi observatam, an ea nobis adstipuletur. Si enim supremi cornu declinatio fuit $21^{\circ} 2\frac{1}{2}'$, alt. vero $20^{\circ} 25'$, angulus inter azimuthalem et circulum declinationis fuit $36^{\circ} 30\frac{1}{2}'$. Et quia parall. D fuit $60' 16''$ mihi, alt. vero D cornu superioris $20^{\circ} 25'$, ergo parall. altitudinis $56' 30''$. Haec cum sit basis trianguli rectanguli minimi, cujus jam unus angulus expressus est, quare alter angulus erit $53^{\circ} 29\frac{1}{2}'$; huic autem obijcitur parallaxis declinationis: haec igitur fit his principiis $45' 25''$. Vera igitur decl. supremi cornu sept. fuit $21^{\circ} 48'$; aufer partem proportionalem collectam per semid. D secundum me $15' 30''$, sc. $12' 28''$, restat decl. centri $21^{\circ} 35' 32''$. Posito igitur, quod hac vice centrum D visum sit in loco eclipticae penitus \odot opposito, sc. in $19^{\circ} 6' \odot$, cum hic declinet $22^{\circ} 9'$, distaret igitur centrum D ab ecliptica in circulo declinationis $33' 38''$, et quia angulus eclipticae cum hoc circulo est 82° , ideo via brevissima distant per $33'$ et haec esset vera lat. austr. centri. At si parallaxis long. vel asc. recta superaret diff. long. centrorum, ita ut visus locus sit jam ultra \odot , locus ejus eclipticus paulo minus declinabit, proinde lat. vera centri D erit paulo minor quam $33'$. Post horam igitur in medio eclipsis Luna propior nodo facta haberet lat. $30\frac{1}{2}'$ c., quantum proxime dicit calculus Tychonis, cum tamen ipsa quantitatis observatio liquido testata sit, oportuisse tunc lat. esse majorem. Hunc igitur dissensum tribuere possumus difficultati observandi declinationem ipsissimi cornu. Dum enim cavet observator, ne pro margine extremo sumat aliquid de corpore D , eaque de causa splendorem extremum sequitur, qui ex causis opticis latius excurrit, fit ut majorem justo declinationem sumat per unum et alterum scrupulum. Ita rursum diminuta declinatione sept. augetur latitudo merid. centri D .

Multo magis hoc obtinebimus, si refractionem etiam adhibeamus, quae in alt. D 20° statuitur $5' 30''$. Nam haec diminuta de parall. alt. $56' 30''$ relinquit $51'$, proinde portio competens declinationi erit $41'$. Ita centri decl. erit $21^{\circ} 31'$ et lat. $37\frac{1}{2}'$, etsi plane nihil observationis vitio tribuamus. Neque omnino tantam hoc momento latitudinem veram statuo, cum refractionis quantitas non sit semper constantissima: sufficit, quorsum ea tendat, id saltem ostendisse.

Ad comprobanda et limitanda ea, quae jam de parallaxibus sunt dicta, et propter sequens epichirema constituam etiam parallaxes.

Asc. R. \odot $290^{\circ} 43'$	In Nonagesimo $16^{\circ} 46' \text{D}$
Hora 6. $14\frac{1}{2}'$ 93. 38	Ejus altit. 48. 0 — 29685 — 40178
90	Sit D visibiliter in 19. 6 \odot
Asc. obl. horoscopi 114. 21	Dist. a Nonag. 62. 20 — 12142
	Parall. horiz. $60' 16''$ — 404400 — 404400
	446227 — 444578
	„ long. $39' 40''$, lat. $40' 22''$

Lubet nunc etiam ex specie phaseos extruere tam veram dist. D a centro umbrae, quam lat. ejus veram: non quod haec latitudo sit omnium certissima; non est enim annotatum, cornua fuisse ad perpendicularum erecta, sed ita saltem pin-

guntur in primis 2 phasibus pictura rudi et saepe limata, in tertia vero jam subito ad dextram est reclinis species idque evidenter valde.

Data igitur distantia \textcircled{D} a Nonag. visibili et dist. Nonag. a vertice ut prius, et insuper alt. centri \textcircled{D} visa $20^{\circ} 9'$, dabitur angulus inter verticalem et eclipticam praeter propter. Nam \textcircled{D} in austro est, non in ipsa ecliptica, cujus rei causa pro 42° usurpabimus $43^{\circ} 20'$ quasi ducto circulo a puncto oriente per centrum \textcircled{D} . His principiis angulus iste fit $46^{\circ} 58'$. Posito ergo, quod cornua steterint ad unguem erecta, angulus inter diacentron et eclipticam, utpote in triangulo minimo erit $43^{\circ} 2'$. Et quia centrum umbrae dicitur transgressa, minus igitur aliquid interfuit inter centra semidiametro umbrae, minus igitur mihi quidem quam $45' 45''$. Tychoni adhuc minus. De hac vero ut basi secundum angulos jam patefactos respondet longitudini quidem $33' 26''$, lat. $31' 12''$. Minus igitur quam $31'$ fuisset in latitudine, si phasis fuisset exacta, et Tychoni multo minus. Ita ne Tyehonica quidem parvitas sufficeret, cum tamen observatio quantitatis aliquid majus postulet mea etiam magnitudine. Non fuit igitur exacta phasis, sed reclinis jam versus dextram a supra, quod tertium schema manifeste prodit.

Ex eo vero, quod obvenit longitudini, collatae cum parallaxi longitudinis, apparet. Lunae locum visum fuisse jam ultra \textcircled{D} c. $8'$ vel $9'$. Simul autem de medio durationis certius aliquid pronunciare possumus. Horarius enim \textcircled{D} a \textcircled{C} fuit $30' 14''$, quare c. horam abfuit obscuratio maxima aut tanto minus una hora, quanto inclinatio in phasi fuerunt cornua.

Cuperem eadem methodo etiam illas phases tractare, ubi cornua prona pinguntur; sed quantitas defectus deest et in picturis nimio variat: nihil igitur huc conferunt. Et in fine umbra vertici quidem corporis Lunaris pingitur propinqua, at inclinatio non est expressa nec numeris nec verbis, picturae vero nudae non est fidendum.

Satis tamen ex observata quantitate demonstratum est, attestante et declinatione observata, latitudinem omnino augendam nodo promoti, itaque hanc eclipsis accedere classi secundae, in qua sunt IX. X. XI. —

XV. Eclipsis Lunae anno 1592. 14/24. Junii.

Cum \textcircled{C} in $3^{\circ} 15'$ \textcircled{E} occidat Uranib. h. 8. 40', centrum \textcircled{C} occidit, cum \textcircled{D} corpus subobscurum inter densas nubes totaliter supra visibilem horizontem conspiceretur elevatum, nec propter nubes aliquanto spissiores (verba exscribo) discerni potuit, an aliqua ejus particula fuerit in umbra.

Emersit ex nubibus h. 9. 28', quo momento cornua pinguntur erecta, defectus minor semisse corporis \textcircled{D} ; h. 9. 36' adhuc erecta, defectus semissi proximus; h. 9. 57' declinatio est annotata inferioris integri limbi $24^{\circ} 58'$ vel $59'$. Sed \textcircled{D} valde humilis ad 5° et in refractionibus. Inter h. 10. 13' et 10. 25' annotatur defectus plenus, neque tamen minor pars illuminata $14'$ unquam fuisse scribitur, quorum $32\frac{1}{2}$, inventa sunt inter cornuum extrema. Color partis offuscae ferrugineus. H. 10. 46' scrupula lucida 16, cornua exacte supina; h. 11. 58 $\frac{1}{2}$, visa est recuperasse lumen. Statim h. 12. 3 $\frac{3}{4}$ ' medium \textcircled{D} in meridiano cum alt. limbi inferioris $9^{\circ} 1'$ vel $9^{\circ} 0'$. (Comp. Hist. Coel. p. 529.) Igitur si ponas initium h. 8. 50', finem h. 11. 58', erit duratio dim. h. 1. 34', medium h. 10. 24'. Et respondet mediocriter inclinatio ad id momentum. Sin autem tardius inceptit, minor etiam fit duratio, posterius medium. In Prog. ponitur h. 10. 16' certe nimis maturum hoc medium. Sic enim defectus principium sub Terram caderet et \textcircled{D} oriens, si jam per quadrantem horae laborasset ingressu in tenebras, facillime potuisset defectus coargui. Infra ex phasi supinorum cornuum colligetur medium etiam posterius hac h. 10. 24'.

Calculus Tychonis. Aeq. t. 1' 10" add.

☉ 3. 15. 13 ☉	☾ 3. 18. 29 ☾	1° 29' 11. —	6. 9. 16. 7.	Lat. 31. 9
			2. 44. 7	2. 35
Ser. def. 25. 5.	Digiti 9. 25.	Ser. dur. dim. 48. 17.	6. 32. 0	11
	Dim. dur. h. 1. 45' 0".			33. 55 Mer.

Sane calculus id exhibet pro aequali tempore medii, quod est in Progym., at praevenit observationem 7'.

Haec duratio fere per h. $\frac{1}{2}$ superat observationem, et sic finem observatum per accidens assequitur. Quantitatem etiam refutat Braheus, qui non 7 dig. totos observavit. Ergo latitudo major nodusque antecedens remotior fuit in antecedentia. Inserta quidem est protocollo observatio Witebergae habita a Chr. Joh. Ripensi, qui aliquamdiu Tychoi inservierat, sine initio et fine eclipsis, qui cum maximam pingit $9\frac{1}{2}$ dig. ut habet calculus. At pictura haec est in cornibus supinis post medium nec respondent ceterae figurae, nec quicquam de quantitate verbis exprimitur: cum Tycho etiam dimensus sit partem residuam. Ultima illi phasis habet adhuc digitum in defectu, cum Vultur esset orientior medio coeli per $16^{\circ} 15'$, ut fuerit A. R. M. C. $276^{\circ} 20'$, ☉ $93^{\circ} 33'$. Tempus igitur arguitur h. 12. 11', finis igitur c. h. 12. 18', quasi sit diff. meridianorum $20'$, quod multum repugnat tabulis geogr. Non est igitur fide digna observatio.

Calculo meo.

☉ Jun. H. ' 1592. 16. 21. 10 — 5. 35. 0 ☉	☾ 1591. 2. 12. 18. 21 — 7. 13. 6. 40 — 3. 5. 40. 15
14. 10. 25	1. 54. 7 Maj biss. 165. 10. 25
2. 10. 45	25. 33
57. 3 ☉ 3. 15. 20 ☉	167. 22. 43. 21
80300	165. 7. 51. 29 — 0. 18. 25. 11 — 0. 8. 45. 17
5050	2. 14. 51. 52 — 1. 1. 23. 0 — 2. 26. 54. 58
85350	30. 40
	25. 58
	35
	25. 0Cor.

☾ 3. 21. 22 ☾ ☉ 27. 11. 36 ☉
Requis. 3. 13. 46 ☉ 3. 15. 20

Parall. ☾ 58. 44
☉ 0. 59

59. 43
Semid. ☉ 15:

umbrae 44. 43
☾ 15. 5 — 68760

59. 48 15.130
33. 33 04.750

Ser. def. 26. 15 152000
digiti 10. 27. 83240

Ser. dur. dim. 49. 32 10.380
28. 5 — 75917

21. 27 — 102900
dim. dur. h. 1. 45. 48 — 26983

Horarius ☾ 30. 28.
☉ 2. 23

☾ a ☉ 28. 5.

7. 36 6. 3. 44
Red. 1. 34

Requis. 3. 13. 46
Lat. 33. 38,
simpl. 31. 40

Fuit medium h. 10. 9' aequali, aequatio temporis physica 0. 30' A.

Ergo h. 10. 8' 30".

Quod igitur praevenit calculus meus, fit quia minorem subtraho aequationem post apogaeum, simulque anticipo metam obscuracionis maximae. Quod latitudo mihi pene eadem, fit quia ex majori quidem angulo excerpo, at vicissim nodum ☾ propiorem habeo.

Quod nihilo minus digitos uno plures exhibeo, fit quia umbra mihi major, Luna minor. Nec tamen ultra dodrantem scrupuli plus habeo in dimidia duratione, quia minor diameter ☾, major horarius.

Cum igitur quantitas defectus arguat latitudinem utraque nostra multo majorem, age consulamus etiam observatam declinationem statim post finem eclipsis. Si alt. limbi inferioris in meridiano fuit $9^{\circ} 0\frac{1}{4}'$, centri igitur $9^{\circ} 15\frac{1}{4}'$, altitudini huic parallaxis congruit 58', refractio ex Lunaribus 11': superat igitur parallaxis per 47', vera ergo centri alt. $10^{\circ} 2'$. Aequatoris vero alt. est $34^{\circ} 5' 15''$, declinatio igitur vera centri ☾ $24^{\circ} 3' 15''$.

Sed ☾ in fine eclipsis superavit locum ☿ ☉ per 49' 35" ex meo calculo, ergo est in 4° 7' ☿, qui declinat 23° 28'; residua sunt 35' 15" pro vera lat. meridiana. Vides autem ex ipso processu, tantum augeri lat. veram, quanto minuitur haec assumpta refractio; et est quidem in ☉ minor, sc. 10', in fixis 6' eoque non semper constans. Digiti quidem 7 cum mea umbrae semidiametro compositi, latitudinem in medio desiderant 24' 18", distantiam a nodo per meum angulum 7° 40'; itaque ☿ esset hac vice in 25° 35' II, non vero in 27° 12' II; tunc et scrupula durationis erunt pauciora sc. 42' 15" et duratio dim. h. 1. 30', quanta et observata.

Imprimis vero evidens est phasis h. 10. 46' cum cornua exacte supina, et superfuere in lumine 16', quorum tota diameter habuit 32. Centrum igitur ☾ fuit in margine umbrae, et utrumque centrum in eodem verticali fuit. Hic enim distantia centrorum aequavit semid. umbrae 44' 43", nec verticalis valde inclinabatur ad eclipticam. Aufer enim ab ase. recta oppositi ☉ 273° 35' pro h. 1. 14' gradus 18. 30', restat A.R. medii coeli 255° 5' et A.R. horoscopi 345° 5' estque in Nonag. 19° M et distantia ☾ ab eo 45° c., angulus 12° 35', complem. 77° 25', quod augebimus ob lat. ☾ visam austr. ut sit 79°; ita conficimus angulum 82° 11' c., remanentque in latitudine 44' 18", in long. 6' 5", quae ☾ conficit 13': quare medium eclipseos fuisset h. 10. 33', dimidia duratio h. 1. 25'. Et in medio eclipsis ☾ ut prius fere 43'. Omnes igitur circumstantiae adstipulantur magnae latitudini. Et simul eclipsis medium in calculis certe per 16' praecurrit observationem.

XVI. Eclipsis Lunae anno 1592. 8/18. Dec.

Uraniburgi coelum nubilum; per nubila tamen usque ad h. 6. 52' non quidquam orbis rotunditati decedere visum. Deinde conditus in nubem non emicuit ante h. 8. 50' nec tunc quidem ita liber erat, ut de specie defectus pronunciari posset. Hora denique 9. 0' vestigia discedentis umbrae visa sunt in dextro margine inferius.

At Sorae in Seelandia Tycho ipse ☾ quasi mediam in umbra vidit in alt. 34° 45'; finem signavit alt. limbi superioris 42° c., unde tempus elicuit Severinius h. 8. 50', quod Uranib. esse dicit h. 8. 56'. Ita medium caderet c. h. 7. 54', quod in Prog. exprimitur h. 7. 41'.

Calculo Tychonis, cui aeq. temp. 1' 0 sub.

☉ 27° 13' 53" ☿. ☾ 27. 24. 54 II. An. 6. 5. 53. 13. Mot. lat. 0. 10. 0. 52, lat. 51. 51. 13. 53 11. 1.

Colligo medium: h. 7. 41 aequali	Horarius 35. 22.	Semid. ☾ 17' 59", umbrae cor. 46' 2"
Dur. dim. 1. 3½	52900	Summa 64. 1. — 17.340
Finis 8. 44½, aeq.	169500	51. 51. — 11.390
8. 45½, app.	116600	Sc. defect. 13. 10. — 220980
		36. 0. — 51100
		digitū 4. 24. 169880
		Sc. dur. d. 37. 30. — 05.950
		35. 22.
		2. 8. Dim. dur. h. 1. 3. 30.

Calculo meo.

☉ Jun. h.	☾
1592. 16—21—10— 5. 35. 0	1592. 10. 7. 16. 47—8. 23. 1. 13—2. 16. 42. 7
Dec. 8— 8 21. 11. 27	dies 23. 16. 42. 28
27. 40	13. 8. 43. 13—5. 25. 9. 0 25. 0 Cor.
174—10. 50 ☉ 27. 14. 7 ☿	36. 4 25. 58 ☿ 17. 49. 35 II
61. 18	50900 ☾ 27. 25. 15 II ☉ 27. 14. 7
67150	32800 11. 44 9. 24. 32
10230	83700 13. 51 2. 23 Rel.
	Req. 27. 11. 44
	Lat. 51. 54, simplex 48. 7

Conveniunt calculi eodem, licet per diversa quantitatis principia, sed uterque praevenit observationem per 15' c., sicut et in praecedenti.

Certum in 2 observatoriis initium Uraniburgi deprehensum est h. 17. 54' in supremo margine parum versus dextram. Hora 18. 35' Tychoni, at h. 6. 26' Gellio Saceridi dimidia in umbra fuit censita, crevitque defectus, quousque aestimari potuit prae vaporibus, ad 9 digitos h. 18. 45'. Exinde ☽ vaporibus immersa, ☉ coepit oriri h. 19. 12' usque in h. 19. 17', cum tempus seminocturnum postulet. 19. 23': per refractionem quippe tollebatur in altum. In Prog. medium reponitur in h. 19. 26'.

VP	36. 22 —	52264	
SP	106. 10 —	4035	
	69. 48		56298
VS	71. 50		
	141. 38 - 70. 49 -	5713	
	2. 2 - 1. 1 -	403175	
	9. 53	408868	
	19. 46	352569	
A. R.	96. 49	176294	
	116. 35	Resterhaviae.	
At	122. 30	Uraniburgi.	
	5. 55	Diff.	

Cum igitur hoc momento jam transmissum fuerit initium, major sit diff. meridd, quam $5^{\circ} 55'$ vel temporis $24'$. Tycho sane statuit $6^{\circ} 45'$, seu $27'$. Confirmavit tempus distantia Procyonis a meridiano $30'$ temporis circ. Et tunc defectum aestimavit 2 vel $3'$.

Calculus Tychonis. Aeq. T. 9' 15" sub.

\odot 5. 28. 6 m) 5. 32. 37 s — 1. 28. 18. 43 — 11. 24. 7. 0. lat. 30° 33"
 32. 37 59. 25
4. 31 28. 52 sc. defectus.

Sc. dimid. durat. 50. 56. Dur. dim. h. 1. 46. 33. Medium 9½' citius incidit, ergo
h. 19. 16½ app. — 1. 46½ = 17. 30 app. Initium praevertit observationem per 24'.
—

Calculo meo. Aeq. physica temp. 2' 20'' Add.

☉ Jan. h. /	☾								
1594. 17. 9. 38 — 5. 37. 5	☾	— 1593. 17. 2. 15. 13 — 10. 2. 55. 46 — 1. 27. 43. 9							
Oct. 18. 19. 17 — 29. 27. 2		Sept. 17. 290. 19. 17							
d. 123. 9. 39 24. 8		307. 21. 32. 13							
60. 13 6		Revol. xi 303. 2. 24 24 — 1. 3. 46. 9 — 0. 16. 3. 2							
☉ 5. 28. 21	☾	4. 19. 7. 49 — 1. 28. 48. 40 — 1. 11. 40. 57							
Parall. ☾ 59. 37 Hor. ☾ 31. 49		31. 32 4. 2 (B) 15. 16							
☉ 1. 0 ☉ 2. 31		64300 ☾ 5. 34. 37 ☾ 25. 0 Corr.							
60. 37 ☾ a ☉ 29. 18		203600 Requ. 5. 30. 0 ☾ 11. 50. 41 ☾							
		4' 8" — 267900 diff. 4. 37							

60. 37	29' 18"		Ω 11. 50. 41 $\bar{\gamma}$
Semid. \odot 15. 24	71700		\odot 5. 28. 21 \bar{m}
Umbræ 45. 13	107700	— 20' 28"	6. 22. 20
\bigcirc 15. 20	36000	— 41. 51	1. 40 Red.
60. 33. 15. 720			5. 30. 0 Req.
Lat. 35. 14. 05. 250			Lat. 35' 14", simpl. 33' 15".
10. 470	Dim. dur. h. 1. 41. 51		
Sc. dur. dimidia	19. 5	Medium. Exacte cum Tych. compensante reductione parvitatem aequationis. Ergo h. 19. 5.	
49. 44			
29. 18	17. 23.	Initium comput. praevertit per 31'. app.	
Resid. 20. 26			

Et quia defectus usque ad dodrantem crescere animadversus est, quae sunt 23' 6", recte sane fit, quod uterque calculus plura exhibet scrupula defectus, ille quidem fere 29, meus vero 25' 19", etsi Fabricius misit pietam formam deliqui horizontem subeuntis, quae minus habet dodrante, quasi jam transisset medium. Ita non pervenisset ad 10 dig., possetque etiam in ista eclipsi latitudo calculi augeri vel aucto angulo vel promotio nodo sequente in consequentia. Tum etiam duratio minor fieret et finis aliquot scrupulis propinquior fieret observato. Occidit \bigcirc dicto loco oriente \odot h. 19. 15' vel paulo ante ob parallaxin, vicissimque refractio quanto citius facit oriri \odot , tanto tardius facit occidere \bigcirc . Si ergo ab initio observato h. 17. 27' numeraveris minus quam h. 1. 42', dimidiam durationem, pervenies nos usque ad h. 19. 9', et sic supererunt a medio usque ad occasum \bigcirc scrupula aliquot. Quae omnia cum inter se consentiant, patet hanc eclipsin inter illas esse, quae nodum sequentem promotum, calculi tempus prolongatum postulant.

XVIII. Eclipsis Lunae anno 1595. 13/23. Apr.

In hujus eclipseos observatione magna fuit adhibita diligentia, cujus et nos vestigia sequimur praecipue ob testimonium latitudini conquirendum.

Primum in media nocte locus \odot erat $3^{\circ} 8' \bar{\gamma}$, asc. recta $30^{\circ} 54'$. Cum igitur esset cor Ω (cujus asc. r. tunc $146^{\circ} 42'$) occidentale $65^{\circ} 50'$ (h. 12. $6\frac{1}{2}'$), \bigcirc limbus occidentalis removebatur a spica $12^{\circ} 17'$, cujus declinatio $8^{\circ} 59' A.$ Lunae vero declinatio centri erat $12^{\circ} 26' 15''$ aust. per armillas. Hinc datur locus sic:

Compl. decl. maj. $77^{\circ} 33' 45''$ — 2375	Pro parallaxibus, A. R. M. C. 212. 32	Nonag. 23. 23 \bar{m}
C. d. min. 81. 1. 0 — 1234	dissimulata refrac. Angulus Or. 28. 20	\bigcirc 0. 41 \bar{m}
3. 27. 15	3609	tione. 74528
Dist. centri 12. 33. 0		log. 37' 18" = 50089
9. 5. 45 —	4. 33 — 253415	Parall. 63' 9" 399710
16. 0. 15 —	8. 0 — 197204	" lgt. 18. 10 524327
	450819	Vis. loc. 40. 47
	450819 — 3609 = 447010	Ver. " 0. 22. 37 \bar{m}
	12. 16. 40 — 6. 8. 20 — 223505	Parall. lat. 55. 37
Asc. R. Spicae 196. 0		Visa lat. 44. 2
	\bigcirc 208. 16. 40	Vera lat. 11. 35
Commedians 0. 24. 15 \bar{m}	Declin. $11^{\circ} 39'$	sept.
Angulus 69. 25. 30	At \bigcirc 12. 26	
Respondet long. 16. 32	diff. 0. 47	
Ergo locus \bigcirc		
visus	0. 40. 47 \bar{m} , lat. visa 44' 2".	

Pro confirmatione hujus declinationis, quae plurimum confert ad latitudinem, notata est ante quadrantem horae altitudo centri merid. $21^{\circ} 45'$, itaque declinabat $12^{\circ} 20'$, et simul consultae armillae ostendebant $12^{\circ} 22'$. Itaque per hoc vera lat. sept. ad illud momentum statuitur major, sc. $15' 30''$, quod non potissimum ob majorem remotionem a nodo contingit, sed ob difficultatem observandi.

Jam \bigcirc visa est aliquid lucis amittere cum lucida Vulturis (asc. r. $292^{\circ} 45'$) abesset a meridiano $38^{\circ} 5'$. Id igitur fuit h. 14. 54', per 2 observatoria h. 14. 52'. Post 12' distabat occid. \bigcirc limbus (decl. $13^{\circ} 59' A.$) a Vulture $85^{\circ} 25'$, ergo AR. centri \bigcirc sic invenitur $209^{\circ} 39'$; commediat $1^{\circ} 50' \bar{m}$, qui declinat $12^{\circ} 9' 12'' A.$, ita \bigcirc excedit $1^{\circ} 0'$.

Sed si \bigcirc fuit in refractione, ea detracta minor fiet vera lat. sept.

Et cum angulus meridiani cum ecliptica sit $69^{\circ} 42'$, respondet huic long. $20^{\circ} 50''$ et visus igitur \searrow locus $2^{\circ} 10' 50''$ \searrow , visa lat. $0^{\circ} 58' 17''$. Hinc aufer parallaxes dissimulata refractione; est enim AR. M. C $251^{\circ} 40'$ et in Nonag. $25^{\circ} \searrow$, et \searrow ab eo in occasum per $22^{\circ} 49'$, angulus orientis 12° .

12. 0. 0 — 157064	78. 0. 0 — 2209
22. 49. 0 — 94731	1. 3. 9 — 399710
1. 3. 9 — 399710	401919
651505	1. 1. 45 parall. lat.
5. 5 parall. long.	0. 56. 17
2. 10. 50	lat. 0. 5. 28 sept. vera.

\searrow 2. 15. 55 \searrow vere.

Igitur ab h. 12. 6' 30'' in h. 15. 6' per horas 3 deprehenditur \searrow promota per $1^{\circ} 53' 18''$. Et si nulla refractionis subtrahatur, in lat. sept. decrevit per 6'; at proportionaliter debuit decrescere per $10' 24''$, quare si utrinque justa fuit observatio, datur hinc excessus refractionis in \searrow humiliori $4\frac{1}{2}'$ in lat. At si magis fidamus obs. meridianae proximae, quae lat. habuit $15' 30''$, tunc perexiguus relinquitur sensus variatae refractionis. Interim hoc nota de utraque vice, Lunae latitudinem veram detractis refractionibus fore minorem.

Inde h. 15. 48' tota in umbram ingressa visa est per 3 observatoria consensu exacto, consumptis in incidentia $56'$ cum jam illucesceret; nec ex eo quid amplius est observatum, \odot enim h. 16. 42' oritur ea die.

Hanc eclipsin Krabbus Math. Brunswicensis in urbe Brunswigia observavit in alt. Arcturi 43° incipere. Colligitur h. 14. 56'. Esset igitur diff. meridd. $4'$ et Brunswigia orientior, quod repugnat tabulis, ponunt enim illam tanto occidentaliorem et plus etiam. Sed expectabimus plura suffragia. Facile 1° in alt. stellae peccat observator non exercitatissimus.

Eandem et ego Graetii observavi; coepit in alt. Arcturi 44° c. (astrolabio papyraceo), cum et \searrow alt. esset $15^{\circ} 30'$ c. Inde desiit lucula transparere per densum horizontis aërem, cum Arcturi alt. esset 34° , \searrow 6° . Prodit pro initio tempus h. 15. 2'. Vel si \searrow respiciamus, cum eo momento Uranib. fuerit ejus AR. visibilis $209^{\circ} 39'$, decl. $13^{\circ} 59'$ nec multo alia Graetii, ut ea quidem sit utilis ad indagandum tempus; ergo ejus alt. $15^{\circ} 30'$ arguit h. 15. $5\frac{1}{2}'$; ita conficeremus diff. meridd. $10'$ vel $13'$. Posteriori momento colligo vel h. 16. 2' ex Arcturo vel h. 16. 13' ex alt. \searrow posterius sumta: sed inepta est haec incerta observatio ad confirmandam diff. meridd. Medium Progymn. est h. 16. 36' app.

Sequitur calculus Tychonis. Aeq. T. $8' 50''$ S. \odot 3. 24. 32 \searrow . \searrow 3. 23. 59 \searrow . 7. 6. 27. 49; — 6. 1. 20. 19; lat. $6' 59''$ austr.

Horar. $34' 24''$; semid. \searrow $17' 45''$; umbrae $46' 25''$, cor. per var. 46. 5.

Dur. dim. $1^h 50' 37''$, mor. $47' 44''$, incidentia h. 1. 3. Medium eclipsis cadit h. 16. 28' temp. aequali, h. 16. 37' appar.; initium ergo h. 14. $46\frac{1}{2}'$. Sed tempus incidentiae multo computatur longius observato.

\odot Jun. h.		\searrow Calculo meo.	
1595. 17. 15. 53 — $5^{\circ} 38' 8''$	\odot	1594. 23 ^d 21 ^h 13' 40'' — 11. 12. 50. 19 — 1. 8. 45. 52	
Apr. 13. 16. 27		Mart. 102. 16. 27	
D. 64. 23. 26 — 2. 13. 50	d. 12. 126. 13. 40. 40		
58. 10	1. 22	Rev. V. 137. 18. 32. 55	— 0. 15. 20. 59 — 0. 7. 17. 44
\odot 3. 25. 40 \searrow		11. 4. 52. 15	— 11. 28. 11. 18 — 1. 1. 28. 8
Parall. \searrow 63. 9	Horar. \searrow 37. 40	35. 22	4. 24. 12. 10 — 35. 36
\odot 1. 0	\odot 2. 26	52800	30. 49 — 25 — Corr.
64. 9	\searrow a \odot 35. 14	53200	13800
S. \odot 15. 8	Sc. dur. 64. 51	66600	\searrow 3. 28. 19 \searrow ; \odot 2. 28. 44 \searrow
49. 1	29. 37	70600	Requis. 3. 25. 25
\searrow 16. 14	D. d. h. 1. 50. 25	17400	diff. 2. 54 — 0. 57. 0
65. 15			0. 15 Red.
32. 47 — 04.550	32. 18 — 61900		0. 5. 27 lat.
5. 27 — 00.130	8700		Simpl. 4 58.
Sc. mor. 32. 18 — 04.420			

Mora dim. h. 0. 55. 0. Tempus incid. $55' 25''$.

Copulam mediam computo 6' citius quam Tycho, durationem eandem, tempus incidentiae brevius et proximum observato. Sed initium per durationem cadit h. 14. 32' aequali et per aequationem temp. physicam 21' subt., quae hic additur, plane h. 14. 53'. Quod latitudinem attinet, etiamsi refractionem quantam Tycho in γ prodit removeam, manet tamen in medio septentrionalis observata. Proinde vult hic nodus in consequentia promoveri, ut pro meridiana 5' 27" fiat sept. 1' c. c., idque non argumento durationis, quae parum mutatur in eclipsi pene centrali, quacunq; nodum moveas, sed sola observationis fide in declinatione: nisi forte eam quis insolita et valde insigni refractione statuta evertere voluerit. Atqui ne hoc quidem passurae sunt istae observationes. Refractionis enim haec est natura, ut versus horizontem subito crescat, etsi magna admodum fuit refractione in meridiano γ sita, quando fuit altissima totius illius noctis: necesse erat post 3 horas magnam etiam animadverti refractionis hujus diversitatem, Luna quippe jam humiliori multum. Non vero deprehensa est magna refractionis hujus diversitas, sed aut 4' 30" solum, aut plane nulla, ut superius ex ipsis observationibus demonstravimus. Certissimam igitur est, promotiorem hoc loco nodum fuisse. Nihil hic proficeremus anguli autione, solus nodi situs in culpa est.

Pro fixarum locatione nota, quod 12' post principium respectu fixarum inventa sit γ in 2° 16' \mathcal{M} nec multo antea per refractionem, ut quae in hac alt. minima pars est parallaxis, cum ipsa etiam long. parallaxis sit exigua, sc. 5'. Minutis 12 congruunt sc. horarii γ a \odot 7' 3". Et quia γ proxime eclipticam, latitudine non majori quam 5' 23" sept., tota demta de 65' 15" distantia centrorum, relinquit 58' 12". Centrum igitur umbrae respectu fixarum erit in 3. 14. 7 \mathcal{M} . At computatur ex Tycho ad h. 1. 38' ante medium in 3. 21. 35 \mathcal{M} . Vicissim igitur, si centrum umbrae in 3. 21. 35 \mathcal{M} collocetur, fixae sunt promovendae per 6' $\frac{1}{2}$.

XIX. Eclipsis Lunae anno 1595. 7/17. Oct.

Cum 4 c. digiti aut paulo plus in umbra essent, occidit γ centrum, 9' solum postquam primum fuit animadversus defectus aliquis, quem pictura exhibet quantitate $\frac{1}{6}$ de semidiametro, seu digiti $\frac{1}{6}$; itaque 7' c. maturius, i. e. 16' ante occasum γ fuit merum initium. Oritur vero \odot in 24 $\frac{1}{4}$ \approx h. 18. 57' et γ nondum in opposito \odot praeoccidit, nimirum h. 18. 50', ut operose per applicationem parallaxeos et refractionis inveni computatum. Ergo initium fuit h. 18. 34. Prog. ponunt medium h. 20. 29' appar.

Calculus Tychoonis, cui aeq. T. 7' 14" sub.

1594. Oct. d. 6. h. 20. 22' γ .

\odot 6. 26. 12. 46	— 5. 28. 43. 33	— 0. 8. 16. 4	— 0. 2. 15. 56
3. 5. 35. 46	40. 28	5. 1	41. 48
3. 20. 37. 0	1. 20	1. 20	0. 1. 34. 8
1. 56. 46	5. 28. 2. 5	41. 48	5. 12
\odot 24. 16. 0 \approx	6. 26. 12. 46	0. 7. 34. 16	2. 57
	γ 24. 14. 51 γ		5. 13

Hora 20. 24 aequali est vera δ .

Lat. 8. 10

Horarius	27. 13	—	79000	Dimidia dur. h.	2. 7. 16
Semid. γ	16. 0	3. 18. 290000		Medium h. aeq.	20. 24. 0
Umbrae	43. 1	211000	Initium	18. 18. 7	aequali
Var.	44			7. 25	
Correcta	42. 17			18. 25. 32	apparenti
Summa	58. 17	— 14. 390		Praevenit observationem	c. 10'.
Lat.	8. 10				
Sc. dur. d.	57. 44	— 14. 100			
	3. 18	00. 290			

Calculo meo.

Jun. H.	17. 15. 53	— 5. 38. 8	— 1594. 23. 21. 13. 40	— 11. 12. 50. 19	— 1. 8. 45. 52
	7. 20. 22	18. 26. 38	Sept. 279. 20. 22		
	112. 4. 29	11. 11	d. 6. 303. 17. 35. 40		
	59. 50	24. 15. 57	Rv. xi. 303. 2. 24. 24	— 1. 3. 46. 6	— 0. 16. 3. 2
	278		0. 15. 11. 16	— 0. 7. 33. 47	— 0. 22. 42. 50
	167400		30. 16	5. 44	2. 1
	167678	Parall. 58. 25		24. 15. 58	Cor. 25. 0
		1. 0		Requis. 24. 15. 38	23. 5. 49
		59. 25			1. 10. 8
		Semid. 15. 21	Horar. 30. 0		Red. 19
		Umbræ 44. 4	2. 30		24. 15. 58
		15	a 27. 30	— 78000	Lat. 6' 28" 8
		59. 4	55. 0		Simpl. 6. 4.
		Sc. dur. d. 58. 43	58. 43		
dim. h. 2. 8' 7"			3. 43	— 278000	
Hum 20. 22	aequali			200000	
sum 18. 14	aeq. Aeq. phys. 5 1/2 add.,				
	hic subtr. Ergo				

h. 18. 8 1/2 appar.

a praevenit meus calculus observationem 25 1/2', quassaturque aeq. physica, tantam diversitatem efficit: nisi contra excipiam, quod alio tempore eadem ionico calculo contingant.

XX. Eclipsis Lunae anno 1596. 2/12. Apr. vesperi.

observata est Uranib. in 3 observatoriis quantum per nubes potuit. Initium tuit sub densis nubibus. At h. 8. 24' tempore correcto ex stellis in uno torio ut primum emicuit, quintam semidiametri partem deperditam prae se pictura, id est 3' c. In observatorio secundo post 3 1/2' pingitur quasi 1/2 diametri. In observatorio tertio h. 8. 28' pinguntur 2 digiti. Igitur c. h. principium fuit aut 1—2' antea propter ingressum ex obliquo, et sic as illud Severinius. Circa h. 9. 8' per nubes quasi dimidia pars in umbra ur eoque vultu permansit aliquamdiu invariato, cum nubes eam subiere. h. 10. 43' detecta discessu nubium tota rotunda apparuit. Ita finis antea incertum quantum temporis. Medium in Prog. exprimitur h. 9. 29'.

Calculus Tychois, cui aeq. temp. 7' sub.

Mass. Apr. 1. h. 9. 22'					
21. 12. 10	6. 3. 5. 51	— 5. 17. 50. 48	— 6. 11. 1. 35		
5. 36. 10	1. 9. 14	— 5. 15	1. 4. 48		
15. 36. 0	4. 26	4. 14	6. 9. 56. 47		
1. 57. 28	1. 4. 48	12	5. 8		
23. 9. 38	6. 2. 1. 3	1. 4. 48	5500		
	0. 21. 12. 10	5. 16. 46. 0	2458		
antea, sc. h. 9. 16'	23. 13. 13	Horar. 35. 20	251300		
sem h. 9. 23' app.	23. 9. 38	Sem. 17. 58	4. 47		
☉ fuit.	3. 35	Umb. cor. 46. 28	11. 200	0. 46. 38	
		64. 26	— 17. 570	0. 51. 25	Lat.
		Sc. dur. d. 38. 48	— 06. 370		
		3. 26	— 285000		
Initium h. 8. 17. 36		dim. d. h. 1. 5. 54	52950		
dis propinquum observationi.		Latit. 51. 25	232050		
		Scrup. def. 13. 1	faciunt tantum 4 1/2 digitos,		
			cum sint observati 6.		

Calculo meo.

☉ Jun. H. 1596. 16. 22. 7 — 5. 39. 11 ☉	☽ 1595. 3. 2. 53. 31 — 0. 25. 49. 0 — 0. 18. 20. 12
Apr. 2. 9. 16 — 11. 57. 13	Biss. Mart. 92. 9. 16
D. 75. 12. 51	31. 20
58. 32 ☉	23. 10. 38 ☽
2480	Revol. III. 82. 15. 55. 45 — 0. 9. 12. 36 — 0. 4. 22. 39
62470	12. 20. 13. 46
64950	35. 53
Parall. ☽ 63. 35	Horar. ☽ 38. 24
☉ 1. 0	☉ 2. 28
64. 35	☽ a ☉ 35. 56
Semid. ☉ 15. 13	39. 48
Umbræ 49. 22	3. 52
☽ 16. 20	274000
65. 42 — 18. 270	51200
Lat. 52. 17 — 11. 570	222800
Scr. def. 13. 25	dim. dur h 1. 6' 27"
Sc. dim. dur. 39. 48 — 06. 700	9. 16
	Initium h. 8. 9. 33 aequali.
	19. 50
	8. 29. 23 apparenti. Sequor igitur observ. 13'.

In aequali tempore medii plane coincidunt calculi, quia magnam quidem aequationem versus perigaeum subtraho, at vicissim et terminum obscurationis maximae tantundem anticipo. Reliqua igitur sunt ex diversa ratione aequandi tempus. Quodsi minuatur latitudo, ut defectus aequet dig. 6, tunc dimidia duratio fit longior, initium igitur observationi propius et Tycho nicus illud praevenit. Minuetur autem latitudo, si nodus hic antecedens promoveatur in consequentia.

Quando defectus colligitur major observato, locus est suspitioni, quod residuum lucidum ex causis opticis dilatetur. Hic contrarium fit. Si enim residuum ex causis opticis fuisset dilatatum, defectum adhuc majorem colligere debuissimus. Satis igitur fida est attestatio observationis, hac vice promovendum esse nodum.

XXI. Eclipsis Lunae anno 1598. 10/20 Februarii.

Haec ut in multis locis, ita magna etiam varietate est observata temperum et quantitatis. Incipiam ab incertioribus.

Graetii in Styria ego conscendi propugnaculum urbis, in quo, cum instrumentis idoneis carerem, horam a media nocte tertiam in urbico horologio examinavi ad alt. Spicae 33° 20', unde prodit h. 3. 25'. Sed immemor, mediantium coelum altitudines valde late indicare, non satis bene mihi cavi. Etenim si vel unius gradus quadrantem peccaverit observatio, jam 7' temporis in dubio ponuntur. Exiguum hoc est, cum illa nocte h. 6. 47' oriatur ☉, quod sonante h. 6, quod esset h. 6. 25' secundum correctionem, ☽ deficiens adhuc aliquot graduum altitudinem habuit, ut censerem, post 3 horae quadrantes demum occubituram; quae censura si justa fuisset, horologium correctione nulla indignisset. Sic igitur habuit horologium. Jam cum sonaret h. 4. 30' nondum animadverti defectus initium, sed per nubes fieri potuit, ut tunc inciperet. Nam paulo ante h. 5. urbis ☽ nondum ex dimidio obscurata penitus erecta stetit. Paulo vero post quintam dimidia diameter defecit. Luna jam resupinata. Paulo ante sextam tenuissimo cum lumine subduxit se sub nubes, adeo ut videretur adhuc decrescere, lumen omne deperditura. Sesquihoram igitur laboravit hucusque in ingressu, initiumque c. h. 4. 35' urbis, correctione vero praedicta stante, c. h. 5. 0' fuit. Vide meae Astr. partis Opticae fol. 358.

T. Brahe tunc excesserat e Dania haerebatque Wandenburgi. Ad quem Severinius transmisit observationem Rostochii habitam a Wilh. Laurenbergio Doctore per alt. Arcturi cum mediocri quadrante. Sed Severinius summam solum perscripsit.

dicens, quod saltem ex phasibus quibusdam ad ingressum et egressum consimilibus medium enucleaverit h. 18. 4'. At huic consignationi juncta est in protocollo alia, quam Tycho scribit ad se missam a M. Joach. Radenicio, quae idem exhibet medium per consimiles phases ingressus et egressus, et per ejusdem Arcturi altitudinem. Erat enim illa 55° 12' cum quadrans in umbra esset, et 54° 32' cum semissis, et 53° 14' cum bes, et 52° 27' cum dodrans. Inde nubes; at post medium, cum iterum dodrans, alt. \bigcirc fuit 2° exacte. Additur: respondere tempora, h. 4. 44', 4. 51', 5. 9' et pro dodrantibus h. 5. 18' et h. 6. 49'; ut sit medium h. 6. 3½'. Videtur igitur illa ipsa esse observatio, cujus summam Severinius scripsit. Quodsi comparaveris phasin semissis h. 4. 51' cum mea obs. h. 5 paulo plus, vel per correctionem h. 5. 25' paulo plus: dabitur animadvertere diff. meridd. inter Rostochium et Gratium vel 9' plus, vel 34' plus. Unde facile patet, nimiam esse meam correctionem, nec tamen nullam omnino statuendam; tabulae enim requirunt c. 17'.

Jam Tycho Wandesburgi, quod non amplius quam ¼ mill. Hamburgo distat (alt. poli 53° 46', initium signavit alt. superioris limbi \bigcirc 23° 30', itaque constituto visibili loco \bigcirc hinc elicuit h. 16. 12', quod esset Uranib. h. 16. 25' ex fide tabb. Quae comparata cum mea obs. h. 4. 35', vel h. 5. 0' per correctionem, ostendit diff. meridd. 19' vel 43', quae discerne ex superioribus; nam tabulae ponunt 28'. At cum semissis obscuraretur, caput Ophiuchi a meridiano ad ortum fuit 26° 24'; cum igitur sit ejus AR. 259° 2', erit AR. med. coeli 232° 38', hinc ablata AR. \odot 334° 27' relinquit 258° 11'; hora est 17. 13'. Eadem vero phasis Rostochii h. 5. 18' visa scribitur, esset igitur diff. meridd. non major quam 5', quam tabulae faciunt 11'. Scilicet phasis ista semissis in umbra pro diversitate visus aliter ab aliis animadvertitur. Ecce post 36' scribitur superfuisse triens: at Rostochii post 18'; rursus post alia 3' superfuere scr. 9 i. e. fere quadrans, Rostochii post alia 9'. Inde semper minor deprehensa est pars residua usque ad h. 18. 0'; tunc dimensi sunt eam sc. 3; ex eo rursus crevit, ut h. 18. 48' esset quasi 10'. Comparatione igitur cum h. 17. 52', quando 9' superfuere, veniet medium ante h. 18. 20', et Tycho quidem c. h. 18. 0' medium incidisse opinabatur. Oritur ea die \odot h. 19. 0' in dicto horizonte. Atque ex hisce omnibus primum hoc habetur, superfuisse in maximo defectu adhuc sc. 3, ubi tamen adduntur verba dubitationis „quae ullo modo discerni poterant“. Deinde, quoad ipsum medium, illud lato modo fuisse inter h. 18. 0' et 18. 20'; in Progymn. ponitur h. 18. 7'. Opinor tamen c. h. 18. 0' perperam aestimata fuisse residua sola 3' respectu ceterarum phasium: nam subito apparuit residua pars major, et longa nimis videtur dimidia duratio a principio illo indubitato. Adde quod Rostochiana obs. medium suum h. 18. 4' Wandesb. transmittit in horam anteriorem. Huc accedunt observata sequentia.

D. Fabricius in pago Resterhavensi prope Auricum initium eclipseos notavit alt. Reguli 24° 30', ergo h. 16. 1'. Ita emergit diff. meridd. Wandesb. et Aurici 13', quod proxime congruit mappis. Exinde cum in maxima obscuratione esset, lucidi cornu residui lat. erat aestimata 5', sed quod obscurius esset lumen propter vapores circa horizontem, instrumento id metiri non potuit. Fabricius id contigisse ait h. 17. 58½', sed appingit phasin, in qua cornua sunt exacte prona et horizonti obversa; ex qua phasi certum est, id fuisse post medium, quia \bigcirc in quadrante occidentali satis humilis erat; atque id etiam congruit observatis. Si enim Rostochii medium fuit h. 18. 4', convenit secundum mappas, ut Aurici fuerit h. 17. 41'.

Maestlinus vero et Rittelius, quod mireris, totalem observarunt. Principium in alt. \bigcirc 26°, unde elicetur h. 16. 6'; ubi vides, quanto consensu cum mappis Tubinga media cadat inter Auricum et Hamburgum. In principio totalis obscurae, omni vestigio lucis extincto, annotarunt alt. \bigcirc 13°; id est h. 17. 25'; ex eo plus dimidio horae \bigcirc in umbra, cum nubes eam eripuerunt. Credideris illos de alia eclipsi loqui, cum aliorum observatorum consensu superfuerunt aliquot scrupula: nisi ipsorum observatorum verba relinquerent locum dubitandi, num forte loquantur de rubore illo, quem prae se fert Luna in lateribus umbrae. Itaque jam ante

annos 18 in Astr. parte Optica super hac Tychonis observatione provocavi ad Cap. V. fol. sc. 266 et ad Cap. VII. fol. 302 et ad exemplum eclipsis proxime sequentia, de qua fol. 302 dicti libri. In hac exceptione contra observationem scrupulorum residuorum in lumine perstiti in prolegomenis Ephemeridum p. 12, confirmatus exemplo eclipsis simili diversitate observatae, quae infra sequetur (XXXV). Ne tamen quid in partem etiam alteram omittam: potest excipi etiam contra Maestlinum, lucem illam imbecillem seu vere residuam, sive etiam ruboris dicti, quae purioribus horizontibus movit observatorum oculos, eam, inquam, Tubingae in crassiore et aquoso aëre sic delituisse, ut etiam mihi Graetii in consimili dispositione aëris sese subductura videretur, sic ut observatores ex amisso in humore omnis lucis vestigio conjicerent totam in umbram immersam; post semihoram vero non tam Lunam, ut quae latebat antea, sed ipsum illum coeli locum a nubibus densis tectum, sic ut non videre tantum, sed quaerere etiam Lunam desinerent. Hoc interpretamento relinquitur in incerto, restiterit quippiam in vero lumine necne: de quo infra ex latitudinis observatione pronunciabitur.

Ultimus observatorum accedat Gulielmus Janssonius, qui primus globos coelestes ex Tychonis restitutione fixarum sculpsit, rationumque observandi Tychonicarum peritus ex *αὐτοψία* fuit. Scheda ejus ad Tychonem transmissa habet schemata seu phases 14, cum appositis altitudinibus caudae Leonis, Alcmaria in Hollandia captis. In primo 1' abest, alt. stellae 42° 15'. Tempus respondet h. 15. 51'; merum igitur initium h. 15. 49'. Et diff. meridd. Alcmariae et Aurici 10', Tubingae 15, Hamburgi 21, egregia fide mapparum. Circa magnitudinem defectus schemata phasium pro Tychone loquuntur, sed sola pictura sine scriptura, reliquant enim 2' fere, pulchro situs ordine a dextra per summam ad sinistram, sed per 4 schemata circa medium aequali fere quantitate, ante et post subite magna, unde apparet, non tanta cura intentum in quantitatem fuisse. Ultima phasis dodrantem habet in umbra, alt. Arcturi 46° 40', de qua vide in mea observatione, etsi jam magis fida est. Respondet igitur h. 18. 40'. Et quia etiam in alt. caudae 33° 30', id est h. 16. 56' dodrans in umbra esse potuit, indicibus circumstantibus phasibus. Ergo medium caderet in h. 17. 48', quod Tychonico quam Rostochiensi medio propius quadrat.

De iis quae Tycho et Fabricius observarunt circa visam Lunae long. et lat. dicam inferius. Nunc ad calculum Tychonis, cui aeq. t. 8' add.

☉ 2° 32' 47" ♄. ☽ 2° 34' 37" ♀. Anom. 1° 10' 25' 47" Lat. motus 5. 25. 16. 30. Lat. 24' 33". Medium h. 18. 11' aequali, 3' apparenti.

Horar. 27' 54"	76600	
Semid. ☽ 16. 15	53. 22 — 27. 54 = 25. 28. 85700	
Umbrae 42. 32	h. 1. 54. 46 — 9100	Duratio dimidia.
Summa 58. 47 — 14. 620	18. 3' appar. Med.	
Latit. 24. 33 — 02. 560	16. 8' Initium, satis longe recedit ab observatione, sc. 17'.	
Diff. 34. 14	Totalis 34. 46	
Scr. defe. 53. 22	12. 060	
Diff. diam. 42. 32 — 07. 660	27. 54 — 76600	
Sc. mor. d. 34. 46	6. 52 — 217000	
	05. 100	
	Mora dim. 14' 45" — 140400	
	Incidentia h. 0. 40'.	

Calculo meo.

☉ Jun. h. ' 1598. 17. 10. 36 — 5. 41. 7. ☽	1597. 17. 16. 50. 23 — 3. 15. 38. 6 — 11. 10. 23. 56
Febr. 10. 18. 11	Jan. 9. 40. 18. 11
D. 126. 16. 25 — 2. 27. 47	58. 11. 1. 23
60. 17	41. 13
	Rev. II. 55. 2. 37. 10 — 0. 6. 8. 24 — 0. 2. 55. 6
☉ 2. 32. 7 ♄	3. 8. 24. 13
Parall. ☽ 59. 0	30. 53
☉ 1. 1	12. 28
60. 1	90730
	☽ 2. 35. 37 ♀
	66413
	Req. 2. 33. 28
	diff. 2. 9
	157143
	Ω 7. 43. 11 ♄

	60' 1"				♂ 7°43' 11" X
Semid. ☉	15. 31				☉ 2. 32. 7
Umbræ	44. 30				5. 11
☾	15. 10				1. 21
	59. 40 — 15. 070				Req. 2. 33. 28
Lat.	28. 41 — 03. 480				Lat. 28' 41", simpl. 27' 5".
Sc. def.	30. 59.	Totalis et hic, sed pene in	Horar. ☾	30. 52	
Diam. ☾	30. 20	ipso contactu.	☉	2. 29	
Diff. diam.	29. 20 — 03. 640		☾ a ☉	28. 23 — 74860	
Sc. moræ	3. 42 — 00. 080	Dim. mora est		23. 56 — 91800	
Sc. dur. d.	52. 20 — 11. 590	tantum 8'.		17040	
			Dim. dur. h.	1. 50. 35	
			Mediūm	18. 7. 35 aeq.	
			Initium	16. 17	"

Propterea quod ego parvam aequationem post apogaeum subtrahō, praevenit meus calculus Tychoicum $4\frac{1}{2}'$ et paulo plus praeveniret, si non ratione obliquitatis viae Lunae vicissim aliquid adderem.

Aequatio temporis physica est $3' 15''$ subt., ergo hic adde. Ita initium erit h. 16. $20\frac{1}{4}'$ app.; hoc est observationi propinquius. Initium n. visum est h. 16. $12'$; quod esset Uranib. h. 16. $25'$.

Hic calculus uterque totalem exhibet eclipsin, qualem et Maestliniana tradit observatio. Sed quia haec supra in dubium est vocata, age videamus, si quid de Lunae latitudine fuerit observatum insuper, quod discrimen faciat inter totalem et partialem. Nam si vere superfuerunt aliquot in medio scrupula, oportet nodum ☿, qui hic sequitur Lunam, fuisse promotiorem in consequentia, et latitudinem majorem in septentrionem. — Igitur h. $4\frac{1}{2}'$ ante initium eclipsis centrum ☾ in meridiano (nondum tamen exactissime invento) Wandesburgi visum est habere alt. $48^\circ 12\frac{1}{2}'$, cui respondet parallaxis alt. $39' 19''$, vera igitur alt. centri fuit $48^\circ 51' 49''$. Eadem vero nocte observata fuit alt. poli $53^\circ 46'$. Vera igitur declinatio centri ☾ $12^\circ 37' 49''$. Cum igitur h. 18. $6\frac{1}{2}'$ ☾ fuerit vere in opposito ☉, vel in orbitae suae $2^\circ 33\frac{1}{2}'$ ♍, horarius vero ☾ a ☉ sit $28' 23''$, horis c. $6\frac{1}{2}$ conficiantur paulo minus tres gradus. Luna igitur in meridiano erit $12'$ citius quam ☉ oppositum, puta h. 11. $45'$. Temporis igitur intervallo emendato h. 6. $18'$ competit exacte arcus sub fixis $3^\circ 14' 18''$, ut in ipso oppositionis impetu, qui parum admodum remittit 6 h. ante, ut ☾ culminans fere fuerit in $29^\circ 9' \text{ ♍}$ orbitae suae, paulo ulterius. Etsi vero 3 distincti circuli sunt, latitudinis, perpendicularis in orbitam ☾ et denique meridiani, non est tamen hoc loco nimium subtiliter attendendum hoc discrimen, sed potest per positiones ad verum satis propinque venire. Nam declinatio $29^\circ 10' \text{ ♍}$ est $11^\circ 50'$, Lunae fuit $12^\circ 37' 49''$. Si ergo ☾ cum $29^\circ 10' \text{ ♍}$ stetisset in meridiano, inter ipsam et eclipticam in circulo declinationis interfuisset $0^\circ 47' 49''$. Sed quia posterius aliquid commediavit, id praeter propter indagatur ex hac quantitate jam eruta, quamvis non verissima, exque angulo ad $29^\circ 10' \text{ ♍}$, qui est $69^\circ 30'$. Itaque commediavit c. $29^\circ 28'$, cujus decl. $11^\circ 42'$ et verior arcus interceptus $55^\circ 49'$, verior angulus $69^\circ 27'$, quare lat. vera secundum hunc angulum $52' 49''$ vel et $1'$ plus. Haec vero latitudo requirit distantiam a nodo $9^\circ 26'$. Hunc arcum si addideris ad locum ☾ praesentem $29^\circ 10'$, veniet nodus in $8^\circ 36' \text{ ♍}$, quem ego computo in $7^\circ 44' \text{ ♍}$. Certum igitur est, superfuisse minuta c. aliquot latitudinemque fuisse majorem. Nam si jam in ipsa maxima obscuracione promoveris nodum ulterius per $42'$, ea foenerant in latitudine c. $4'$, itaque calculus meus relinquet in lumine scr. 3. $30''$, plane ut observarunt Tycho, Fabricius, Jansonius.

Eandem diligentiam adhibuit etiam Fabricius, paulo post initium dimensus distantias ☾ a fixis ♍ et ♍, ex quibus computavit locum ☾ visum $1^\circ 19' \text{ ♍}$, lat. visam $0^\circ 17\frac{1}{2}'$ austr. Hinc nos extricabimus parallaxes. Erat ☉ h. 16. $2'$ in $2^\circ 28' \text{ ♋}$, asc. recta ☉ $334^\circ 28'$, ergo asc. obliqua horoscopi 306° .

		Latus aequatoris 55° 0' — 19950	
		Alt. " 36. 22 — 52264 — 21662	
Si utimur logarithmo parallaxeos canonico :		72214 — 13453	
72195	13459	67. 6 — 8209	
77050		23. 31 1/2	
406508	406508	90. 37 1/2	
555753	419967	89. 22 1/2	72195 — 6
13' 17"	51 1/2'	88. 53 — 19	13459
In hoc enim log. est proportio sinuum minimorum, in illo prop. arcuum quidem sed minimorum, qui ut rectae considerantur.		Nonag. 28. 53 mp	1681
		1. 19 mp	15140
		27. 34 — 77050	
		Parall.) 59. 0 — 1681	
		long. 13. 16 — 150926	
		Verus) 1. 32' 16" mp	
Parall. lat. 51. 34			
Visa lat. 17. 30			
Vera lat. 34. 4 sept.			

Ergo etiam Fabriciana observatio redarguit latitudinem Tychonicam parvitas, mea vero non adeo multo fit major. Nam quia abhinc usque ad medium eclipsis \supset promovetur minus quam 1° , sunt enim scrup. durationis dimidia $52' 19''$, quibus adde motum \odot , fient $57'$ fere, cum tamen \supset non tam profunde fuerit in umbra eoque brevior hio arcus; quare minus quam per 5 decrescit eoque latitudo, manet ergo in medio plus quam $29'$.

Hic tamen omittendum nequaquam est, distantias quas indicat Fabricius aliam exhibere latitudinem \supset visam. Nam si centrum \supset abfuit a secunda in ala \mp $33^\circ 21' 1/2''$, et simul occidentalis limbus (septentrionalis potius) a cervice \oslash $11^\circ 8'$, semidiameter \supset $17' 1/2''$, ut Fabricius tunc statuit, proinde centri $11^\circ 25' 1/2''$, hinc sane prodit locus centri visus $1^\circ 19' \mp$, ut recte Fabricius: at lat. visa flet $0^\circ 1' \text{ sept.}$, proinde illa $17' 1/2''$, quae exprimit Fabricius venditans ea pro lat. visa aust., videntur hallucinanti excidisse, ut cum videret locum computatum in eclipticam incidere, censuerit semidiametrum \supset $17' 1/2''$, hinc usque ad centrum in austrum porrigi, oblitus se jam antea adjecisse semidiametrum ipsi distantiae limbi $11^\circ 8'$.

Si est, quod dico, tunc sane totis $19'$ flet major latitudo sept., quam ego computo, quod ut valde enorme fidem omnem observationi adimeret, nisi hac re conciliaretur, quod ejus magna pars refractioni, a nobis hic neglectae, tribui potest: cum \supset fuerit humilior cervice \oslash . Ita fluctuantibus causis elevari posset hoc testimonium observationis Fabricianae, si sola esset, ut nobis tantum non commodet. Sed Tychonis observatio \supset culminantis ob magnam ejus latitudinem manet se ipsa vel sola fide dignissima. Itaque cedo tandem exceptione illa in prolegom. Eph. a. 1617. adhibita.

Quantum ad fixas examinabimus eandem Fabricii traditionem. Igitur visum est centrum \supset abesse a secunda alae \mp per $33^\circ 15' 1/2''$ in ecliptica, vere igitur (ablata parallaxi long.) $33^\circ 2'$. Quantum vero abfuerit a centro umbrae, facile colligitur ex eo, quod non ultra $1'$ a principio eclipsis aberat observatio, cum caset lat. vera c. $34'$ aut paulo plus; fuit igitur dist. centrorum paulo minor quam in calculo meo summa semidiametrorum, sc. c. $59' 0''$.

$$59. 0 - 14. 730$$

$$34. 0 - 04. 890$$

$$48. 14 - 09. 840. \text{ Ergo } \supset \text{ ante } \oslash \odot \text{ per } 48' 14''.$$

Si vero latitudo usurpetur $4'$ major, haec long. diff. flet $3'$ brevior. Et quia Solem Tychonicus calculus ad h. 16. 2', quod est Uranib. h. 16. 29', refert in $2^\circ 27' 51'' \times$, hinc ablata $48' 14''$, relinquunt \supset locum in $1^\circ 39' 37''$, vel si major latitudo fuit, $3'$ ulterius. Adde $33^\circ 2'$, prodibit locus stellae in $4^\circ 41' 37'' =$ vel $3'$ ulterius. At Tycho ponit illam in $4^\circ 34' \approx$. Luna tamen hic fuit in nonnulla refractione longitudinis, sic ut non tota $8'$ vel $11'$ locis fixarum adicere audeam ob hanc solam observationem, nisi etiam aliae consenserint.

Ipsæ etiam Braheus observavit ☽ ad fixas, sed ante initium, cum esset ☽ c. nonag. ab oriente, carens parallaxi long. Estque hoc observationis summarium, quod in alt. Procyonis 17° centrum ☽ abfuerit a corde ☾ in consequentia 6° ad visum Wandesburgi. Hinc computabo et tempus et parallaxin longitudinis.

PV. 36° 14'	52581	Latns aeq. 89° 10'	— 11
PS. 83. 48	587	Alt. aeq. 36. 14	— 52581 — 21491
47. 34	53168		52592 — 21485
VS. 73. 0		89. 23 1/2	6
120. 34	— 60. 17 — 14100	23. 31 1/2	
25. 26	12. 43 — 151354	65. 52	9146
	163454		39040 — 30631
	112286		1681
69. 33 1/2 — 34. 46 1/2	56143	☉ 29. 9. 40 — 13552	32312
AR. Proc. 109. 36 1/2		Nonag. 0. 40 1/2 m	
AR. M.C. 179. 10		☽ circ. 0. 20 m	Parall. lat. 43' 25".
		Distantia 0. 20 1/2.	

Cum ergo ☽ sit in ipsissimo Nonag. cum parall. long. nulla, quare visa distantia ejus a corde ☾, quæ fuit 6°, eadem est cum vera distantia.

Jam vero fidendum est horario ☽ a fixis. Nam quia coepit eclipsis h. 16. 12', Ass. R. ☉ 334° 27', erat igitur A. R. M. C. 217° 27'; prius vero 179° 10', ergo diff. 38° 17', vel h. 2. 33', quæ cum horario 30' 52" capiunt portionem 1° 18' 43". Erat vero h. 16. 12' ☽ in contactu umbræ cum lat. 34' aut paulo plus.

Dist. centrorum erat 59' 40" — 15. 070	Respondet igitur longitudini 49' 3"
34. 0 — 04. 890	vel 3' c. minus.
49. 3 — 10. 180	
Locus ☉ 2° 27' 45" m	Lat. ☽ visa austr. 10' et lat. cor-
49. 3	dis ☾ parvula 26' sept. decurtabant
Locus ☽ in principio 1. 38. 42 m vel ultra	distantiam nonnihil reductione ad
1. 18. 43	eclipticam, ut sit 5° 58 1/2.
Locus ☽ verus tempore obs. 0. 20. 0 m vel ultra	
5. 58. 20	

Cor ☾ 24. 21. 40 ☾ vel ultra. Tycho in 24° 15 1/2' ☾ collocat.

Et quia horarius, si peccat, magnitudine peccat, nam horis 5 ante medium et apogæo vicinior fuit ☽ et extra vigorem oppositionis, quare pro portione intervalli minus quam 1° 19' subtrahendum: ita cor ☾ veniet adhuc ulterius. Satis igitur consentiunt hic Fabricius et Tycho.

XXII. Eclipsis Lunæ anno 1598. 6/16. Aug.

Wandesburgi ☽ orta in tenebris, etiam in crasso aëre circa horizontem, ut videri expedite non posset. Coepit umbram egredi in alt. inferioris limbi 3°, centri 3° 18', itaque correcto vero loco Lunæ inque visum redacto per parallaxes et refractiones colligit Severinius tempus h. 7. 51'. Exinde cum stella in eductione candæ Ursæ esset alta 41° 53', limbus ☽ inferior 11° 21', visa est tota plena, splendidior tamen ab orientali parte; arguitur h. 9. 7 1/2', quod etiam aliis fixis confirmatur, observata earum distantia a meridiano. Tempus igitur incidentiæ fuit h. 7. 16'.

Ejusdem eclipsis finem observavit etiam J. Krabbus, mathematicus Ducis Brunswicensis in arce Wolfenbutela prope Brunswicum, in alt. Arcturi 28° hora usualis scioterici 9. 2'. Quodsi utamur alt. poli 52° 30', elicitur hora 9. 1', quasi locus iste fuerit occidentalior Wandesburgo per 6 1/2', cum tamen tabulae differentiam exhibeant contrariam 5'. Sed satis esto, quod auctores intra 11' consentiunt, de minutiori vero præcisione major fides Tychoni debetur, nisi tab. chorographica Germaniæ hic insigniter peccat.

Hujus eclipsis observationem prope Graetium in Styria habitam a me in suburbano

reperiet lector in Optica fol. 302, ubi pro Witebergae lege Wandenburgi. Feci et in prolegomenis Ephem. ejus mentionem, praecipue propter explicationem opticae ruboris, fol. 12. Visa est autem egredi h. 7. 45' urbis paulo ante, impleta est h. 9, ubi tempus quidem emersionis idem est, quod annotavit Braheus, at hora vitiose indicata fuit a machina; nam Wandenburgica observatio semissem horae insuper adjicere jubet. Occidit ea die ☉ h. 7. 1' Graetii. In Progymn. medium et h. 7. 37'.

Calculus Tychonicus, cui aeq. temp. 9' 24" add.

1597. Aug. d. 5. h. 7. 46' 24" — ☉ 23° 20' 10" ♀; ☽ 23° 22' 0" ☾, anom. 6. 11. 32. 56.
Mot. Lat. 11. 25. 24. 55. Lat. 23' 49".

60. 8		Semid. ☽ 17. 58	
35. 24 —	52760	Umbræ 46. 44	02. 410
24. 44 —	88620	64. 42 —	17. 710
Dim. dur. 1. 41. 55 —	35860	Sc. dim. dur. 60. 8 —	15. 300
	131656	Diff. 28. 46 —	03. 510
Dim. mor. 0. 27. 16 —	78896	Sc. mor. dimid. 16. 5 —	01. 100
T. emers. 1. 14. 39			

Ergo computo Uraniburgi h. 7. 33' apparenti obscuracionem mediam, cui adde dimidiam durationem h. 1. 42', provenit finis h. 9. 15', quod esset Wandenburgi h. 9. 3', quam proxime ut fuit observatum, tempore etiam emersionis consentiente: quod celebrat Braheus in libris observationum ad eclipsin seq.

Calculo meo sic:

☉ Jun. h. ' 1598. 17. 10. 36 — 5 41. 17 ☉	☽ 1597. 17. 16. 50. 23 — 3. 15. 38. 6 — 11. 10. 23. 56
Aug. 6. 7. 46 16. 46. 48	Jul. 217. 7. 46. 24
D. 49. 21. 10 50. 55	235. 0. 36. 47
57. 44 ☉ 23. 19. 0 ♀ Rev. IX.	247. 23. 47. 14 — 0. 27. 37. 46 — 0. 13. 7. 56
12563	12. 23. 10. 27 4. 13. 15. 52 10. 27. 16. 0
3870	35. 55 5. 19. 45. 38 41. 16
16433	51314 6. 15 25. 0 Ccc.
Parall. ☽ 63. 38	174770 ☽ 23. 23. 59 ☾ ☉ 28. 22. 16 ☾
☉ 1.	226084 Req. 23. 20. 19 ☉ 23. 19
64. 38	8. 40 5. 2. 16
Semid. ☉ 15. 6	1. 19
Umbræ 49. 32	Horarius ☽ 38. 28
☽ 16. 21	☉ 2. 25
Summa 65. 53 — 18. 370	Lat. 27' 58", simpl. 26. 24.
Diff. 33. 11 — 04. 655	☽ a ☉ 36. 3 — 50940
Latit. 27. 58 — 03. 310	59. 39
Sc. dur. d. 59. 39 — 15. 060	Resid. 23. 36 — 93310
Sc. moræ 17. 47 — 01. 345	17. 47 — 121610
	Dim. durat. h. 1. 39' 17" — 42370
	Dim. mora h. 0. 29. 36 — 70670
	Emersio h. 1. 9. 41.

Medium cadit h. 7. 40' aequali. Physica aequatio ☉ in 23° ♀ est 19' 20" add., hic ergo subtrah., erit apparenter h. 7. 20' 40" Uranib.; adde dur. dim. h. 1. 39' 17", provenit finis h. 9. 0. 0. Wandensb., secundum tabb. h. 8. 48. Hoc igitur loco pulsatur aeq. temporis physica ab obs. Wandenburgica; stabiliretur a Wolfenb. si esset authentica. Tempus emersionis provenit mihi paulo brevius ob minorem ☽ diametrum majoremque horarium. Nec tamen arguitur ab observatione, sed quadrat sic recte ad exceptiones opticas, superioribus exemplis stabilitas. Etsi ne Tychonicus quidem emersionem observatam penitus expressit. Non nocuerit tamen hic observare, quod aucta latitudine, id est promoti ☽ nodo sequente in consequentia, tempus emersionis prolixius fiat, at simul duratio brevior, finis maturior, ubi discedimus ab observatione.

XXIII. Eclipsis Lunae anno 1599. 30. Jan.
9. Feb.

Observata est in pago Longimontano, qui uno milliari in ortum abest a Boveberga, promontorio chersonnesi Cimbricae, quod est obversum oceano Germanico in occasum, ubi alt. poli $56^{\circ} 40'$. Distantia ab Uraniburgo milliarium 40 Germanicorum, quia 10 milliaria sunt Viburgum usque. Quodsi mill. 15 conficiunt 1° circuli magni, sub hoc parallelo igitur 40 milliaria facient differentiam meridd. in tempore $19'$. Et sane mappae ostendunt $18'$.

Verba observatoris Severini sunt ista: Deprehendi ex stellis tum meridianum transeuntibus, tum in eodem verticali constitutis eodem tempore (qua pragmatia fuit utendum, cum instrumentis destituerer) apprehendi, inquam, principium deliquii hujus h. 3. 28' vel 30' adeoque ex diligenti animadversione tum aliarum phasium, tum praecipue ingressus ac primi exitus ex umbra, medium h. 5. 30' vel potius quasi 3' ante. Ergo dimidia duratio h. 1. 59', et emersionis initium h. 7. 29', cum tamen Sol oriatur h. 7. 32', ut verear, ne emersio nequiverit animadverti.

At Tycho Brahe tunc Witebergam usque venerat. Ibi altitudo poli $51^{\circ} 52\frac{1}{2}'$. Initium igitur eclipsis fuit in altitud. capitis Ophiuchi $30^{\circ} 5'$, supremi vero marginis $\searrow 29^{\circ} 45'$. Ex utraque altitudine colligitur h. 15. 54', sed fuit tunc aliqua defectus quantitas, ut ita 2' ante censeretur incepisse. Altitudine Aquilae existente $17^{\circ} 14'$, id est h. 17. 9' tota Luna visa est in umbra et inferior ejus pars lucidior superiore. Tempus igitur incidentiae h. 1. 17'. Plura non invenio observata, puto nubes ortas, quibus etiam Fabricius se excusavit. Sed ex initio constituitur differentia merid. Longimontii et Witebergae 24', proinde esset differentia Uraniburgi et Witebergae orientioris 6' ex supra allegata fide chorographiae Daniae, quod paulo plus est, quam chorographica Germaniae tabula concedit. Itaque non nimium inhaerendum est observationi Longimontanae.

Eandem eclipsin et Krabbus observavit Gröningae 7 milliariibus a Wolfebuttele versus euro-astrum. Igitur altitudo poli fuerit $52^{\circ} 20'$, diff. meridd. Uraniburgi et hujus loci ratiocinatione per Rostochium et viciniorum urbem Magdeburgum facta, circiter 5' in occidentem. Initium notatur altitudine Spicae 27° , cordis $\searrow 25^{\circ}$, h. 16. 24', sed ex calculo per has altitudines hora provenit illic 16. 37', hic h. 16. 40 $\frac{1}{2}'$, quod tempus secundum observationem in vicina Witeberga habitam cedit medium inter initium et totalem immersionem, ita haec observatio nullius est momenti.

Ego Graetii Styriae, ut in Paralip. ad Vitellionem fol. 286 indicavi, principium observavi ad horologium urbis h. 15. 45', cujus hora 16. Jupiter circiter 6° altitudinem habebat, h. 16. 15' jam post montes abierat, nondum tamen sub horizonte. Et tunc nondum dimidium in umbra erat. Occidit ea die \nearrow oriente $10^{\circ} \searrow$, quando A. R. M. C. $14^{\circ} 32'$. Sed A. R. \odot in horis erat 21. 34'. Occidit igitur \nearrow h. 16. 28', pro qua sonuit minus quam in h. 16. 15'. Ita quadrans horae vel plus defuit indicationi temporis, quod illa observatione magis confirmatam fuit, quod h. 6. 45' Sol oriri visus, at ea die h. 7. 5' oriebatur, ergo eclipsis incepit vere h. 16. 5'. Quo pacto differentia meridd. Witebergae et Graetii esset non major 13', quod congruit fere tabulis. Hora urbis 5. 0' tota mergebatur, id esset vere h. 5. 20'. At hoc fuit Tychohi Witebergae h. 5. 9'. Diff. 11' et tempus incidentiae h. 1. 15'.

Plura de hac eclipsi vide dicto libro Paralipom. ad Vitell. f. 302. Nam occidit Luna priusquam ex umbra cerneretur emergere, et id meo tunc iudicio circa medium obscuracionis. Quomodo ad fixas sit observata, dicam ultimo.

Quodsi Longimontii medium fuit fere h. 17. 27', additis 18', veniet Uraniburgi h. 17. 45'. Et assumpta in Progymnasm. h. 17. 50'.

Calculus Tychonis, cui aequatio temp. 9' 36'' add.

☉ 21° 12' 4" ♊; ☾ 21. 12. 40 ♎; anom. 11° 19' 37" 33"; mot. lat. 6. 2. 39. 19
 Medium computatur 11¹/₄' ante h. 18 aequalem. 5. 11

	78990	Horarius	27. 14	3. 17
	99430	Semid. ☾	16. 0	10. 25
	20440	„ Umbrae	43. 1	13. 42
Dim. duratio h. 2.	4' 24"	Variatio	52	lat. med.
„ mora	0. 48. 55	Summa	58. 9 — 14. 230	
Tempus incidentiae	1. 15. 29	Diff.	26. 9 — 02. 910	
Initium igitur h. 15. 54' 15" aequali.		So. dim. dur.	56. 27 — 13. 410	
quod est h. 15. 44. 40 apparenti Urani-		„ „ mor.	22. 12 — 02. 090	
burgi eoque et Witbergae fera ex fide		Resid.	2. 0	

Initium igitur h. 15. 54' 15" aequali.	So. dim. dur. 56. 27 — 13. 410
quod est h. 15. 44. 40 apparenti Urani-	" " mor. 22. 12 — 02. 090
burgi eoque et Witebergae fere ex fide	Resid. 2. 0
tabularum; praeveniens observationem, quia super anticipatione frustra turbatus est Tycho,	
ignarus, in aliis eclipsibus majorem esse.	

Calculo meo sic.

<p> \odot Jun. h 1599. 17. 16. 50 — 5^h 42' 20" \odot Jun. 30. 18 <hr/> 138. 1. 10 — 14. 83. 43 60. 42 2. 57 <hr/> 2. 57 \odot 21. 11. 34 \approx Parall. \odot 58. 25 Horar. \odot 30. 0 " \odot 1. 1 " \odot 2. 32 <hr/> 59. 26 \odot a \odot 27. 28 Semid. \odot 15. 30 " umbrae 43. 56 " \odot 15. 1 <hr/> Summa 58. 57 — 14. 710 Diff. 28. 55 — 03. 540 Lat. 12. 20 — 00. 660 <hr/> 26. 2 — 02. 880 — 57. 37 — 14. 050 54. 56 <hr/> 2. 41 -- — </p>	<p> \odot 1598. 24. 17. 48. 49 — 4. 25. 32. 39 — 10. 21. 25. 49 29. 18 <hr/> 54. 5. 48. 49 Rev. II. 55. 2. 37. 10 — 0. 6. 8. 24 — 0. 2. 55. 6 <hr/> 0. 20. 48. 21 — 5. 1. 41. 8 30. 17 10. 18. 30. 43 10. 5. 3 2. 48 24. 10 Corr. 25. 0 <hr/> 13 \odot 21. 11. 34 \approx 21. 11. 37 Requis. 21. 10. 57 <hr/> 18. 58. 29 \approx \odot 21. 11. 34 \approx 2. 13. 5 Red. 0. 37 <hr/> Req. 21. 10. 57 Lat. 12' 20", simpl. 11' 45". <hr/> 83500 <hr/> 312000 <hr/> 5350 Dim. mora 56' 52" 233850 " dur. 2. 5. 47 <hr/> Tempus incidentiae 1. 8. 55 </p>
---	---

Quod autem tempus incidentiae brevius computatur, id quadrat exceptionibus opticis, ut in priore, quae in hac eclipsi luculentissime confirmantur illa relatione observationis meae, quam inserui in Opticis fol. 302. Est autem mihi brevius quam Tychonico, quia Lunae diameter brevior, horarius paulo longior.

Tentemus etiam, si quid haec eclipsis testetur de locis fixarum. Sic enim observavi. Paulo post urbis h. 4. 15', id est correcte h. 4. 38' nondum erat abscissa dimidia pars circumferentiae, Ψ tunc jam post montes abierat. Et tunc Ψ transierat lineam ex cervice in pectus Ω . Erat autem angulus inter lineas ex pectore Ω et ex Ψ in cor Ω ductus rectus et triangulum ad sensum isosceles. Rursum post semissem horae exacte linea ex cervice per pectus in aliquam longe infra se valedicebat extremo margine.

Hic cum Luna habeat latitudinem veram australem non incertissimae quantitati, facile praeterpropter constituitur visa latitudo; quae cum unum gradum superare non possit, quare aestimatum anguli rectitudinem ad cor tueri nequimus, at posita latitudine visa, sequitur ex imaginatis rectis aliquis locus longitudinis:

☉ A. R. 323° 36'	55669	— 19907	
h. 16. 38' 249. 30	34657	2674	
213. 6	2674	22581	— 47° 54'' latitudo.
A. obl. hor. 303. 6	93000	— 23' 40'' parall. long.	
Latus aeq. 56. 54 — 17707		Vera lat. 9. 6 circ.	
Alt. aeq. 42. 58 — 38335 — 31232		Visa 57. 0 austr.	
56042 — 19727			
11505 — 63° 2' 20''		Jam quia cervix ☉ in	
23. 31. 30		23° 58' ☉, lat. 8° 47'	
180 — 86. 34		bor. et superior pect.	
55669 — 19907		22° 19' ☉, lat. 4° 52'	
373 — — 85. 3		bor. Diff. long. 1° 39',	
Nonag. 14. 57 =		lat. 3° 55'.	
27.		Sed ☉ visa lat. 0. 57 austr.	
34657 — — 45.		8. 47	
		Diff. lat. 9. 44	
Jam quia 3° 55' efficit 1° 39' et 7. 50 — 3. 18		23. 58 ☉	
9. 44	198413	4. 6	
1. 54	253620	19. 52 ☉	
	452033	(3. 18 dat 0. 48; et 9. 44	
	111967	dat. 4. 6 ut in rectis.)	
	340066		

Ergo Luna fuit jam ultra hunc locum visibiliter, et addita parallaxi longitudinis vera fuit ultra 20° 16' ☉.

Et quia nondum deficiebat semissis circumferentiae Lunae, linea vero defectus est arcus introrsum flexus, quam proxime igitur deficiebat semidiameter, et centrum ante locum centri umbrae fuit fere una semidiametro umbrae, quippe latitudo parva est: umbrae igitur centrum si colles trans 43', veniet ultra 20° 59' ☉, sane ☉ hac hora est in 21° 8' = calculo Tychonis: ut probabile sit, etiam hac vice fixas circiter 6 sc. promovendas, ne cogamur id, quo Lunae centrum superavit lineam dictam, nimium statuere.

Sed certiora pollicetur phasis altera, quae fuit post horae semissem.

Latus aeq. 49° 24' — 27540			
42. 58 — 38335 — 31232			
86875 — 15580			
58. 46 — 15652			
23. 31 1/2			
82. 17 1/2 — 908			
63490 — 16488			
77. 32 — 2385			
Non. 12. 28 =	19162	Parall. lat. 49° 32''	
☉ 20. 42 ☉		10. 0 Vera lat.	
51. 46	24144	59. 32 Visa lat.	
	2674		
Parall. long. 24' 19'' — 90308			

Luna semisse horae promovetur per 13' 44'', sequitur ergo centrum per 29' 16'' ex phasi antecedenti.

Et quia lat. visa est 1° austr., stellarum vero altera in pectore habet latit. 4° 52' sept., ergo differentia est 5° 52'. Sed altera stella habet lat. 3° 47' austr. Differentia lat. 8° 39'; long. differentia 3° 40'. Si ergo 8° 39' dat 3° 40', tunc 5° 52' dabit 2° 29'. Quod aufer de loco stellae pectoris 22° 19', relinquitur 19° 50', cui adde parallaxin long., provenit 20° 14' 1/2'. Et quia dicitur Luna extremo margine lineam attigisse, fuit igitur centrum vere in 20° 29' 1/2' ☉, sed centrum umbrae per 29' 1/2' ultra, ergo in 20° 58' 1/2' ☉, quod tamen calculo Solis in 21° 9' ☉ collocatur. Fixae igitur sunt promovendae in zodiaco. Nec error in tempore quidquam nocere potest praeterquam parallaxi longitudinis.

XXIV. Eclipsis Lunae anno 1601. 29. Nov.
9. Dec.

Hactenus eclipses eas absolvi, quas Tycho Brahe in catalogo posuit fol. 02. post 112. Progymnas. Nec diutius vir ille supervixit, mortuus hujus ipsius anni 1601. Octobri mense. Nam quae in Januarium anni 1600 incidit, ea Pragae coelo obscuro et ningido non potuit observari, nec alibi visam comperi.

Hujus vero praesentis observatio Pragensis descripta exstat mense Opt. Astr. fol. 360. Initium h. 5. 23', finis h. 8. 35', medium h. 6. 59'. Cumque in Progymnas. Lunarium fol. 131 pingatur et computetur defectus dig. 11 fere, defectus tamen hic paulo minor visus est. Hora 6. 8' cornua in parallelo horiz. 47°. hora 7. 54 1/2' cum deficeret plus dimidio, phasis erecta stetit.

Krabbus Wolfebuttelaë principium visum tradit h. 5. 24', finem h. 8. 24'; medium igitur h. 6. 49', ex alt. oculi ☉ 14° et 40° 30'. Diff. longit. 10', tabulis 16.

Avarici Biturigum principium est visum h. 4. 15', puto ad urbis horologia. Diff. meridd. ejus loci et Pragae esset h. 1. 8'. Ponit loci longitudinem Joh. Temporarius mathematicus Gallus 21°, Tycho Pragae 38°, diff. 17°, seu plane h. 1. 8'. Observator fuit Arminius Rittelius, nunc Principis Wirtembergiae a secretis. De fixis infra.

Calculus Tychonis, cui aequat. T. 4' 15" subtr. Nam in Progymn. Lun. fol. 131 excerptio est facta per locum Solis simplicem, ubi et diff. meridd. ponit 5'.

☉ 17° 48' 7" x.	☽ 17° 47' 9" II.	Anom. 5. 21. 3. 13.	Mot. Lat. 5. 23. 57. 36.
Horarius 35' 22"	52840	Lat. 31' 20"	
Semid. ☽ 17. 58		Summa 63. 58	
„ Umbræ 46. 55		Sc. defectus 32. 38	
Variatio 55			

Sem. umbr. corr. 46. 0	04. 160	
Summa 63. 58	— 17. 310	
Sc. dim. dur. 55. 45	— 13. 150	
Resid. 20. 32	— 107150	
Dimidia duratio h. 1. 34' 51"	— 54310	

Vera igitur oppositio h. 6. 51' 30" Uraniburgi, sed Pragae h. 6. 56 1/2', aequali: quod propinque admodum accedit ad observationem. Et conveniunt cetera Progymnasmatum computo, excepta duratione, de qua monui in Opticis fol. 360.

Eandem et meo calculo computabo.

☉ Jun. h. 1601. 17. 5. 19 — 5. 44. 26	☽ 1600. 11. 12. 27. 8 — 7. 18. 25. 52	9. 12. 2. 1
Nov. 29. 6. 50 — 12. 0. 11	Oct. 28. 332. 6. 49. 45	
165. 1. 31	3. 52	343. 19. 16. 53
☉ 17. 48. 29 x	Rev. XII. 330. 15. 42. 49	— 1. 6. 50. 21 — 0. 17. 30. 35
	13. 3. 34. 4	— 8. 25. 16. 13 — 8. 24. 31. 26
5' tardius repraesento maximam obscurationem,	35. 56	— 5. 22. 9. 18 — 41. 48
quam Tycho, tempore aequali. Aequatio physica 8' 30" subtr. hic adde, ut sit medium	51270	20. 19
h. 7. 5 1/2' apparenti.	57000	☽ 17. 45. 50 II ☽ 24. 14. 38 x
	108270	17. 50. 9 ☉ 17. 48. 29
Parall. ☽ 63. 40	Horar. ☽ 38. 32	18. 190 (65' 33") Dist. 4. 19
☉ 1. 1	☉ 2. 32	05. 355 (35. 35)
64. 41	☽ a ☉ 36. 0	— 51083
Semid. ☉ 15. 30 (22)	65. 33	114640
„ umbr. 49. 11	Lat. 35. 35	12. 835
„ ☽ 16. 22	Sc. d. dur. 55. 4.	Resid. 19. 4.
65. 33	Dim. dur. 1. 31. 41.	
Lat. 35. 35		
Sc. defec. 29. 58	Durationem computo breviorum Tychonica, cum utraque	
14. 59 — 138740	sit brevior observata.	
Diam. ☽ 32. 44 — 60800		
11 fere — 78140		

Hic considera, quod minus in defectu fuerit observatum, quam est in calculis, et tamen duratio fuit annotata longior; quae duo contradictorie pugnant, nisi horarium bona parte minuamus, quod tamen non concedi potest. Igitur confugiendum est mihi ad causas opticas, quas explicavi, recenti adhuc observatione ista, Optic. fol. 266 lin. 37. Nam in aestimando principio et fine meum visum secutus sum. Mihi itaque citius incipere, tardius desinere visa est, hinc longiuscula duratio.

Quod vero quantitatem defectus attinet, videndum jam erit, quid de vera latitudine testentur observationes. Etenim spatio h. 1. 46 $\frac{1}{2}$ ', cui de motu ☾ a ☉ competunt 1° 3' 54'', de motu vero 1° 8' 20'', ac proinde mutatio latitudinis 6' 18'', hoc, inquam, temporis spatio phasis Lunae deficientis a proña mutata est in erectam. Quodsi circulus verticalis per centrum umbrae secuisset umbram eodem in loco ad utrumque momentum, Luna quadrantem confecisset de circulo umbrae, et si tunc praecise dimidia pars in umbra fuisset, tam umbrae ipsius, quam latitudinis dimensio daretur. At quia et verticalis mutavit et Luna profundius in umbram erat immersa, major igitur nobis opera nascitur inquirendi tam Nonagesimos, quam angulos verticalis, quamvis hac vice parallaxes tractandae non sint. Horae erant prior 6. 8', posterior 7. 54'.

Angulum verticalis et eclipticae ex tempore.

AR. ☉ h. 17. 6' 45''	H. 17. 7' 0''
6. 8.	7. 54
h. 23. 14. 45	H. 1. 1. 0
Nonag. 16° 45' γ	6° 34' ♂
Asc. obl. 41. 2 — Mesolog. comp. 13890	50. 28 — Mesolog. 19109
Centr. umb. 17. 46 ~~~	17. 50 $\frac{1}{2}$ ~~~
NC 58. 59 —	48. 43 $\frac{1}{2}$ —
Log. 15430	28560
29320	9361
VCN 53. 17 —	47. 41
Log. 22117	39567
Sem. umbr. 49. 11 — Log. logist. 19900	19900
Lat. puncti in circulo umbrae ex angulo verticalis . . . 39. 25 — — — 42017	33' 6'' — 59467
	Lat. puncti in circulo umbrae ex compl. anguli verticalis.

Vides exactissime repraesentari debitam mutationem latitudinis Lunae, si utrimque centrum Lunae statuatur in ipso circulo umbrae. Et quia in posteriori angulus minor est, a puncto igitur propiori ipsi ecliptico puncto fit numeratio quadrantis de circulo umbrae, quare arcus a duabus *διακρυφούς* resectus est

$$\begin{array}{r} 84^{\circ} 24', \text{ dim. } 42^{\circ} 12' \quad \text{log. } 39800 \\ \text{umbrae semid. } 49' 11'' - 19900 \end{array}$$

ergo semissis quaesiti 33' 1'' — 59700

Ecce subtensa huic arcui prodit 1° 6' 2'', cum horarius requirat fere idem sc. 1° 3' 54'', scilicet jure paulo minus, hoc est, quia in primo momento annotavi, plus semisse defecisse, itaque centrum Lunae non in circumferentia umbrae, sed interius fuit; in posteriori vero nihil est annotatum de quantitate defectus. Confirmatur igitur mea latitudo contra parvitatem Tychonicae, sed per meam semidiametrum umbrae paulo auctiorem. Nam priori momento latitudo fuit perquam exiguo minor quam 33' 6'': si enim defectus fuisset plane 7 digitorum, jam hoc potuisset discerni, et vero 1 digitus est 2 $\frac{1}{2}$ scrupula et in latitudine vix 2 sc. Abhinc vero 51' sequebatur obscuratio maxima, quibus de motu ☾ respondent 32' et his de lat. 2. 43, ut sic in medio lat. fuerit exiguo minor quam 36', cum meus calculus exhibeat 35 $\frac{1}{2}$ '.

Quod igitur pars in medio residua visa est major uno digito, id rursum ad causas opticas referendum erit, quae lucida solent amplificare; vide locum supra allegatum Opt. meae fol. 266. Sane conveniebat, nos duarum rerum distinctarum, durationis longioris et residui majoris, remedium tale quaerere, quod utrimque juvaret. In astronomia enim et principiis calculi si id quaesivissemus, altero juvando

Si lapsus essem scribendo, ponens bessem supra, qui erat infra, multo longius discederem a locis fixarum. Nihil igitur habeo, quod de observatione dubitem.

stellae vicinae sunt loco eclipsis. Tale quid etiam post annos 18 in eclipsi anni 1619, quae fuit in eodem signo, deprehensum a me fuit.

XXV. Eclipsis Lunae anno 1602. ^{25. Maji}
4. Junii

Exstat observatio mea qualiscunque Pragae habita Astr. parte Optica fol. 359. Etsi enim horologium Tychonicum accommodavi ad altitudinem Solis $4^{\circ} 40'$, quae dat h. 7. 24', quando monstrabatur h. 6. 43', incertus tamen sum, annon intermedio tempore steterit, ut solebat interdum. Cum autem centrum Solis occidat eo die h. 7. 58' sine refractione, supremus vero Solis margo tardius circiter 2', rursumque tardius ob refractionem aliis 4': ita h. 8. 4' circiter vestigium iridis duravit usque ad Tychonicam h. 7. 0', etsi Sol mihi post montem erat: simul nubes colore Solis occasum prodebant. Tunc crassae nubes conspectum Lunae orientis prohibuerunt, praesertim cum immersa tenebris nullo luminis fulgore sibi ipsi adminicularetur. Intra minutum sonuit urbicum horologium horam 24. Inde hora una transiit cum 2', ut esset vere h. 9. 6', cum primum ex nubibus aliquod Lunae vestigium emicuit, et post 11', sc. h. 9. 17' de rotunda Lunae circumferentia sexta pars in umbra restabat. Post 6' nondum omnis desierat, sc. h. 9. 23', at circumferentia omnis visa post 2', h. 9. 25'. Umbra spectabat infra Jovem. Exiit igitur cum exigua latitudine australi vera.

Calculus Tychonis, cui aeq. temp. 5' 34" subtr.

☉ $13^{\circ} 40' 35''$ II.	☾ 13. 44. 13	☿ 10. 27. 16	♄ 52. —	♃ 11. 29. 17.	4
Horar. ☾ 24. 38	Semid. umbrae 43. 16				5. 13
55. 16	Variatio 3				1. 27. Lat. $3' 46''$
59. 16	correcta 43. 13				mer.
4. 0	☾ 16. 10	00. 065			
Dimidia duratio h. 2. 8' 30"	Summa 59. 23	— 14. 930			
Medium h. 7. 0. 0	Sc. def. 59. 16	— 14. 865			
Finis Uranib. h. 9. 8. 30	aequali tempore.				
	5. 34				

9. 14. 0 apparenti.

9. 19. 0 Pragae. Observatio dat h. 9. 25'.

Latitudo in fine exhibetur jam septentrionalis, at umbra infra Jovem spectans sensibilibiter arguit meridianam fuisse. Nam etsi Jupiter habuit latitudinem $1\frac{3}{4}^{\circ}$ sept., Luna per parallaxin latit. nonnullam meridianam, id tamen sensibile nequaquam est in longitudine arcus 60° . Non igitur in ecliptica, sed in austro desiit.

Calculo meo sic.

☉ Jun. h. ' 1602. 17. 11. 33 — 5. 45. 29	☾ 1601. 18. 7. 25. 33 — 8. 28. 20. 25 — 8. 23. 3. 53
Maj. 25. 7. 8 — 21. 53. 30	Apr. d. 24. 144. 7. 8
23. 4. 25	10. 32
57. 13	☉ 13. 41. 27 II
169300	Rev. VI. 165. 7. 51. 29 — 0. 18. 25. 11 — 0. 8. 45. 17
4690	2. 17. 17. 56 — 9. 16. 45. 36 — 8. 14. 18. 36
173990	30. 43
Parall. ☾ 58. 48	Horar. ☾ 30. 34
☉ 59	☉ 2. 23
59. 47	☾ a ☉ 28. 11
Semid. ☉ 15. 2	58. 22
umbr. 44. 45	59. 33
☾ 15. 7	Resid. 3. 11
59. 52	Dim. durat. h. 2. 6. 30
Lat. 6. 31	Medium 7. 8.
Ser. dim. dur. 59. 33	Finis 9. 14. 30
	aequali Uranib.

Versus apogaeum aeq. parvam addo et in loco ☉ abundo sc. uno: item et metae aliquid addo: hae sunt causae postventionis.

Aequatio temporis physica mihi est 10' 40" sub., hic adde, ut sit finis h. 9. 25' 10" Uraniburgi, et Pragae h. 9. 30' 10". Tantum supero observatum, quantum Tycho deficit. Et quia a medio ad finem sunt 59' 33", abest vero \bigcirc a \bigcirc nodo per 1° 10' 47", in fine igitur latitudo adhuc australis fuit, quod congruit observatae plagae umbrae. Melius igitur sto cum latitudine, quam Tychonicus.

XXVI. Eclipsis Lunae anno 1603. 14/24. Maji.

Diligenter est observata Pragae exstatque observatio descripta in Astr. part. Opt. fol. 361, sed et aliis locis est observata.

	Initium	Finis
Mihi Pragae	h. 10. 59'	h. 13. 59' vel 13. 56'
Mario Patavii	" 11. 14'	
Maestlino Tubing.	" 10. 40'	
Frid. Rittelio Stuccard.	" 10. 40'	" 13. 38'
Krabbo in Altershem. 12 milliariibus		
a Wolfeb. in occidentem	" 10. 48'	" 14. 4'
Hydrae altit. 52°, Spicae alt. 2°, in tanta altitudine non bene arguit. Hinc Patavium Praga orientalius per 15', Tubinga occidentalis per 19'; Altershem. occidentalis per 11'. Et quia 12 milliaria sub hoc parallelo latit. 52° 30' faciunt 5' 16", ergo Wolfebutela occidentalis Praga per 6', eclipsis XXIV. dicit per 10', eclipsis vero XXII. melius occidentaliorem facit.		

Potest et finis Krabbo objici, ut intelligamus, defuisse nonnihil ejus diligentiae. Nam quomodo duratio ipsi visa esset tam longa, contra quam alii? Forsan igitur cervicem \bigcirc pro spica habuit in tanta humilitate, spica sub nubibus forte latente.

Dignum observatu fuit, 10' antequam initium mihi videretur, jam me sensisse umbram appropinquantem, et 10' alii postquam finisset adhuc debilitatem luminis \bigcirc a me animadversam ex defectu vibrationis. Alii vero 5' posterius annotarunt initium, quam ego. Reliqua infra.

Calculus Tychonis, cui aeq. temp. 8' 13" sub.

\bigcirc 3. 18. 28 II. \bigcirc 3. 7. 21 \times . Anom. 9. 7. 12. 12. — 0. 7. 25. 38		
Horarius 30' 12"		5. 16
Umbra corr. 44' 24"		2. 8
Semid. \bigcirc 16. 53		36. 19
Post 2' plenaria \bigcirc .	Summa 61. 17 — 15. 890	Dur. dim. 1. 34. 48
	Lat. 38. 27 — 06. 260	Aeq. temp. 8. 13
	47. 43 — 09. 630	5.
	30. 12 — 68650	Finis 14. 5 Pragae. Dim. dur.
	Resid. 17. 31 — 123120	Med. app. 12. 30. 12 h. 1. 34. 48
	54470 — 34' 48"	Tota dur. h. 3. 9. 36

Atqui ego, qui plurimum, nihil ultra h. 3. 0', Maestlinus et Rittelius h. 2. 58', qui vero me observando juvit, solum h. 2. 52' observavit. Sed de hoc posterius.

Calculo meo sic.

\bigcirc Jun. h. ' 1603. 17. 17. 47 — 5. 46. 32 \bigcirc 1602. 25. 2. 24. 0 — 10. 8. 14. 58 — 8. 4. 5. 46		
14. Maj. 14. 12. 15 — 2. 23. 44 Apr. d. 13. 133. 12. 15. 0		
54. 5. 32	13. 14	158. 14. 39. 0
57. 24 \bigcirc 3. 9. 34 II	Rev. VI. 165. 7. 51. 29 — 0. 18. 25. 11 — 0. 8. 45. 17	
146700	6. 17. 12. 29 — 10. 26. 40. 9 — 7. 25. 20. 29	
4450	32. 40	2. 23. 24. 57
151150	6. 32	6. 48
	16	Corr. 25. 0
Parall. \bigcirc 60. 40	\bigcirc 3. 8. 24 \times \bigcirc 26. 6. 51 \times	
" \bigcirc 0. 59	Requis. 3. 7. 46 \bigcirc 3. 9. 34 \times	
61. 39	Ante 2' fuit maxima obscuratio.	
Semid. \bigcirc 15. 4	7. 2. 43	
46. 35	Red. 1. 48	
	Requis. 3. 7. 46	
	Lat. 0. 38. 57, simpl. 38. 46	

46. 35	Med. h. 12. 13
Semid. \bigcirc 15. 36	. d. dur. 1. 33. 50
Summa 62. 11 — 16. 360	13. 46. 50. Uranib. aequali tempore.
Lat. 38. 57 — 08. 420	15. 33. Physica temporis aequatio subtt.,
Sc. dim. dur. 48. 29 — 09. 940	Pro Praga 5 hic add.
Horarius \bigcirc 33. 24	14. 7. 23 Pragae appar.
\bigcirc 2. 24	Medium 12. 33. 33
\bigcirc a \bigcirc 31. 0 — 66000	Uterque calculus proximum observationi tenet.
Resid. 17. 29 — 123300	
Dim. dur. h. 1. 33' 50". — 57300	

Quantitas quanta fuerit, neglexi annotare, sed sperabam posse de ea iudicium fieri ex inclinationibus. Nam in principio declinabat umbra ab infra ad ortum $45\frac{1}{2}^{\circ}$; in fine ad occasum 32° vel 30° . Computavi vero ad haec momenta:

Nonag. $14^{\circ} 6'$ $\frac{1}{2}$	1. 30 $\frac{1}{2}$
Centrum umbrae 3. 6 $\frac{1}{2}$	3. 43 $\frac{1}{2}$
Distantia 49. 0	log. 28142
Dist. Nonag. a vertice 62. 20	Mesolog. 64575
Ang. verticalis cum ecliptica 68. 25	— 92717
Verticalis ergo secavit umbram superius, initio versus occasum, fine versus ortum.	82
Adiunge inclinationes $68^{\circ} 25'$	32. 0
Lineae diacentrum 45. 30	50. 0 vel 52.
Anguli ecl. cum diacentro 22. 55	
Erat vero summa semidd. $62' 11''$ vel $1^{\circ} 2' 11''$.	
Hinc latera triangulorum.	
Lat. $23' 22''$. Long. $55' 16''$. Lat. $45' 57''$ vel $47' 17''$. Long. $38' 34''$ vel $36' 57''$.	
46	1. 50
5	12
24. 18	57. 18
47. 38	— 49. 1
39. 59	— 38. 18

Vides autem omnino vitium esse in his inclinationibus. Nam et latitudinis initialis a finali prodit nimia differentia et horarius prodit nimius.

Cogitabam pulchra quaedam et artificiosa problemata texere, quae datis quatuor praecipuarum phasium inclinationibus, terminorum sc. tam durationis quam morae, insuperque vel diametro \bigcirc vel horario, reliqua omnia sumerent demonstranda. Sed deprehendi lubricum esse negotium observandi inclinationes in Luna exacte et minimo ex errore magnam ruinam sequi. Praetereaque stultum est, semidiametrum umbrae et alia permittere aleae tam periculosae exque minimis colligere maxima, cum ea possis habere certiori via. *Περὶ δὲ τῆς νηπιον ἔγνων*, postquam plurimum temporis frustra perditum.

Alia igitur certiore via de quantitate defectus visi deque latitudine \bigcirc vera in medio eclipsis ratiocinabimur. Cum enim detur horarius ex hypothesi fida, semidiametrorumque summa a priori, et duratio ex observatione: facile datur et arcus latitudinarius rectus in viam \bigcirc . Summa semidiametrorum $62' 11''$. Antil. 16. 360.

Sc. def. 20. 21. Digni paulo minus 8.

Diam. \bigcirc 31. 12. Horis dim. durat. observatae 1. 29' de	
horario debentur 46. 0	08. 960
Lat. 41. 50	07. 400

Major igitur prodit latitudo, quam computamus, eoque nodus Ω antecedens hac vice retroagendus est. Si vero adjutoris mei durationem sequeretur, adhuc major fieret latitudo. — Sed inquiratur haec latitudo etiam per alias phasies. Nam h. 11. 38' deficit dimidium. Fuit ergo centrum \bigcirc in circumferentia circuli umbrae, et fidei causa fuit annotatum h. 11. 49', sc. post $11'$, de circumferentia Lunae decessisse dimidium, tunc igitur plus dimidio fuit in umbra. Cum igitur ab h. 11. 38' usque in h. 12. 28', quando medium, supersint $50'$, quibus debentur de horario \bigcirc a \bigcirc $25' 50''$, et umbrae semidiameter sit $46' 35''$, hinc latitudo ut prius in medio prodit $38' 43''$, scilicet aestimatio cornu lucidi peccat excessu ex causis optiis. Sic cum h. 13. 29' et sic h. 1. 1' post medium censeretur abesse triens

Consideretur tamen etiam evidentissima inclinatio, quomodo illa consentiat cum medio. Ergo h. 12. 25' Luna stabat cernua, demissis aequaliter cornibus. Erat in meridiano 9° \times' . Angulus meridiani cum ecl. 81° c., quae igitur ad eclipticam recta desuper inclinabat ad ortum 9° c. Nec multo aliter fuit cum verticali Lunae et ea quae in centrum Lunae recta ad eclipticam, Luna igitur inequitans umbrae centrum habuit in verticali, ergo ad occidentem, et sic ante medium fuit. Recte. At h. 12. 44' jam occidentalius cornu elevabatur nonnihil, et ita fieri necesse erat et in ipso medio et post medium. Quia tamen haec elevatio non fuit insignis, additum enim est observationi nonnihil, hinc observamus, partes Lunae non aequaliter claras inclinationum fidem in dubium vocare. Cujus rei argumenta etiam infra sequuntur.

Hora 10. 38', 11' antequam culminaret Jupiter, Luna nondum deficiens stabat in eodem præcise verticali cum corde \mathbb{M} , a quo tamen propter motum primum et parallaxin toto durationis tempore recessit iterum in occidentem, ut præcipue apparuit h. 12. 13', quando Luna nondum recta inequitans umbræ spectabat cor \mathbb{M} cornibus, velut ex obliquo versus sinistram. Et h. 12. 25' diserte fuit annotatum, adhuc occidentaliorem fuisse corde \mathbb{M} .


Dist. a Nonag. $53^{\circ} 36'$ log. 21704

74954 Mesol.

Angulus 65. $47\frac{1}{2}$. — $\zeta \epsilon \theta$, $\gamma \epsilon x$ Fig. 8.

Cor III in 4. 21. 48 \nearrow

At Tycho id refert anno 1602 $\frac{1}{3}$ in 4. 15. 0 \nearrow . Deprehenduntur igitur fixae a calculo motus \odot promotores, ut in eclipsibus annorum 88, 98, 99, cum biennio ante nimium essent promotae, sed in opposita zodiaci parte.



*) Cum centrum umbrae esset in $3^{\circ} 9' 34''$ \nearrow , meta obscuracionis maximae, quam tenuit in medio durationis, fuit in $3^{\circ} 7' 46''$ \nearrow , stans e regione loci ecliptici 3. 6. 0 \nearrow .

Hujus rei fidem periclitabor etiam ex h. 12. 25' proxime medium eclipsis, quando locus ☾ in orbita 3° 6' 15", reductus ad eclipticam 3° 4' 27" ✕, cum lat. ex obs. 41' 35", Asc. obl. horosc. 336° 47'

Lat. aequat.	23. 13	—	93087	
Alt.	39. 54		44402	— 26505
			137489	— 3304

52. 27 1/2	—	23201
------------	---	-------

23. 31 1/2	
------------	--

75. 59	—	3023
--------	---	------

106493.	—	6327	Mesol. 100116
---------	---	------	---------------

47. 11	—	30996	403600
--------	---	-------	--------

Non. 12. 49 1/2		409927	Par. lat. 57' 0"
-----------------	--	--------	------------------

☾ 3. 4 1/2 ✕		41. 35
--------------	--	--------

Distantia 20. 15 1/2	105940	Corr.	Visa lat. 0. 15. 25
----------------------	--------	-------	---------------------

403600		105350
--------	--	--------

Parall. long.	7' 15"	—	616033	Ang. 82° 38'	—	20 1/2 66.	Est adhuc ☾ in
---------------	--------	---	--------	--------------	---	------------	----------------

Visus locus ☾	3° 11' 32" ✕		205350		4. 27. 0	quadr. orient.
---------------	--------------	--	--------	--	----------	----------------

0. 32. 40		261600		4. 11. 35	γx
-----------	--	--------	--	-----------	----

3. 44. 12 ✕		466950			
-------------	--	--------	--	--	--

828

466122 (log. 32' 40")

Sic in hunc locum referretur cor ☿, si ☾ in illius verticali fuisset. Refertur ergo ulterius. Recte, et quidem plus quam semidiametro ☾; ergo ultra 4° 2' ✕. Nam si margo ☾ in hoc verticali fuisset, hoc ego procul dubio notassem.

Fine eclipsis fuit angulus inter eclipticam et verticalem, ut supra computatum, 82° 7' et Nonag. inventu facilis. A.R. ☉ 61° 8', h. 13. 57' sunt 209° 5'; ergo A.R. med. coeli 270° 13'. Ita erit 0° 13' ☿ in M. C. et Nonag. paulo ulterius. Ergo dist. Nonag. a vertice 63° 26', quanta potest maxime.

Quare parall. lat. secundum hanc: 11159

4036

414759	—	0° 54' 20"	Lat. observata 46' c.
--------	---	------------	-----------------------

Ergo visa lat. 8' 20" austr., dist. a corde 4° 18' 40" xy

Et quia parallaxis horiz.	62. 11	—	16. 360
---------------------------	--------	---	---------

Et ista 54. 20	—	12. 490
----------------	---	---------

Ergo long. totalis 30' 15"	—	03. 870	Log. 68485
----------------------------	---	---------	------------

Dist. a Nonag. 27° 42'		—	76330
------------------------	--	---	-------

Parall. long. 14. 6	—	144815
---------------------	---	--------

Ad locum ☾ proximum 3° 4' 27" eclipticum adde horarium ad h. 1. 32' a fixis 51' 13", provenit 3° 55' 40" ✕. Et quia jam Luna in occidentali quadrante, aufer parallaxin long., manet 3° 41' 34" ✕ locus ☾ visibilis.

197714

258800

456514	—	0° 35' 50"	aufer a
--------	---	------------	---------

3. 41. 34 ✕

3. 5. 44 ✕

locus cordis ☿, si Luna in ejus verticali ultimo stetisset. Sed quia non est annotatum, reversam illam esse in ejus verticalem ante finem eclipsis, praesumitur igitur, cor ☿ fuisse ulterius. Certe n. si in eodem eclipticae loco visae essent, Luna occidentaliorem tenuisset verticalem. Et vicissim, si in eodem stetissent verticali, oportuisset Lunam in ecliptica fuisse 35' 50" ultra locum eclipticum cordis ☿.

XXVII. Eclipsis Lunae anno 1603. 8/18. Novemb.

Exstat observationis meae Pragensis descriptio Astron. part. Opt. fol. 384.

Ex culminatione fixarum notavi principium h. 6. 21', finem h. 8. 17', duratio igitur h. 1. 56', medium h. 7. 19'. Incepit deficere circiter 65° a vertice ad sinistram, aestimando, desiit ab eadem parte sinistra, id est non plane in vertice. Defecit minus quarta diametri, parte circumferentiae inter trientem et quadrantem, quod priori observationi consentit.

Calculus Tychonis, cui aeq. temp. 9. 21 subtr.

☉ 25. 57. 46 III.	☾ 25. 54. 38 ☿.	Anom. 2. 10. 11. 3.	Mot. lat. 8. 9. 36. 46
Plena ☉ h. 7. 6	Horar ☾ 29. 22		5. 8
Aeq. T. 9. 21	Semid. ☾ 16. 1		3. 4
Pro Praga 5.	Umbra cor. 42. 12		5
h. 7. 20. 21 Pragae temp. app. Summa 58. 13 — 14. 350 46. 38			
49. 47 — 10. 490 49. 47 lat. aurt.			
Sc. defectus 8. 26 Plus quam 3 digiti.			
Sc. dur. dim. 30. 12 — 03. 860			
Dur. h. 1. 1. 50			

Calculo meo sic.

1603. ☉	1602. ☾
Jun. 17. h. 17. 47 — 5. 46. 32	25. 2. 24. 0 — 10. 8. 14. 58 — 8. 4. 5. 46
Nov. 8. 7. 19. 37. 27	7. Oct. 311. 7.
143. 13. 13 33. 28	336. 9. 24. 0 — 1. 6. 50. 21 — 0. 17. 30. 35
☉ 25. 57. 46 III. Rev. XII. 330. 15. 43. 0	2. 10. 28. 12 — 7. 16. 35. 11
Parall. ☾ 60. 8	5. 17. 41. 0 21. 55 18. 14
" ☉ 1. 1	32. 4 ☾ 25. 55. 26 Cor. 25. 0
61. 9	Req. 25. 55. ☉ 16. 41. 57 III
Semid. ☉ 15. 30	38007 62600 ☉ 25. 57. 27
" umbrae 45. 39	100607 9. 15. 30
" ☾ 15. 28	Red. 2. 21
Summa 61. 7 — 15. 800	Requis. 25. 55. 6
Lat. 51. 5 — 11. 070	Lat. 51. 5
10. 2. Paulo minus 4 digitis.	Simpl. 48. 13.
Sc. dim. dur. 33. 26 — 04. 730	Aequatio physica est 0' 48" subtr, hic add.
Horar. ☾ 32. 34	ergo h. 7. 0. 0 app.
" ☉ 2. 32 Duratio h. 1. 6' 48"	Pragae h. 7. 5. "
☾ a ☉ 30. 2.	

Non assequor 14' observationem, 15' calculum Tychonis et pulsatur hic aequatio temporis physica. Nam citra temporis aequationem solis 6' a Tychonico discedo, quia minorem aequationem post apogaeum subtrahō, plus id efficeret in tempore, nisi reductio ad orbitam Lunae aliquid compensaret.

In duratione vero et in quantitate uterque calculus superat observata, quare latitudo major et nodus ☿ antecedens magis in antecedentia promotus hic requiritur. Nec enim licet mederi diminutione diametri umbrae, ut quae in Tychoe oppido est parva jam antea.

Datur vero etiam ex inclinatione periculum latitudinis facere. Nec enim adeo incerta est inclinatio, cum umbra summo vel imo puncto corporis Lunae imminet in extremis durationis.

Asc. recta ☉ in 26° III est 233° 40' h. 8. 17' id est 123° 25'. Ergo A.R. M.C. 356° 55'. Asc. obliq. horoscop. 86° 55'. Oritur 23° 10' ☉.

Angulus orientis 44° 9'. Compl. 45° 51' Mesolog. 2967

Et quia Nonag. 23. 10 ☿ ergo ☾ abest 36. . . . Log. 53139

Ergo angulus verticalis et nonagesimi 60° 16' — — 56106.

Summa igitur semidiametrorum 61' 7'', secundum hunc angulum distributa in longum et latum, dat latitudinem in fine 53' 5'', siquidem umbra praecise fuisset in ipso vertice, majorem vero, quia declinavit adhuc umbra ad sinistram. Et quia summa semidiametrorum in Tychonico tribus scrupulis minor est, latitudo quoque prodibit circiter 50' et paulo major. Esset igitur in medio 46 1/2, minor, quam Tycho computat. Ita haec observata inclinatio commensurationem insuper Tychonicam ad-oritur; meam relinquit intactam, sed tamen majoris latitudinis, quod exspectabam, non plenam fidem facit.

Quia igitur inclinatio non plane determinata est, age subsidio nobis veniat horarius. Observata dimidia duratio est 58', scrupula dim. durationis 29' 1''.

Log. 72650		Summa semidd. 61' 7" — 15.800	
10950		29. 1	03.560
Mes. 61700	Ang. 28. 21	Latit. 53' 46"	12.240. Ecce consensum.
	61. 39		
	5. 18		
	66. 57		
	60. 16		
	8. 41.		

Nam si Luna accipiat scrupula durationis ex observatione et horario ☽ a ☉, latitudo exstruitur sane major, quam si finis eclipsationis in ipso vertice ponatur, eoque oportet declinaverit a vertice Lunarisi disci ad sinistram. Haec enim latitudo 53' 46" competet ipsi medio facietque angulos 28° 21' et 61° 39', si rectus formetur ad orbitam Lunae, sed ipsius orbitae ad eclipticam inclinatio addet alios 5° 18', ut sic linea per centra cum verticali formet angulum 6° 41'. Consentiant igitur inclinatio finalis, duratio et quantitas ad latitudinem calculi augendam retroactu ☿ nodi.

XXVIII. Eclipsis Lunae anno 1605. 24. Mart.
3. Apr.

Hanc David Fabricius observavit sub meridiano civitatis Emdensis in pago Ostela, ubi alt. poli 53° 38'. Initium ex altitudine Sirii 17° fuit h. 7. 16'. Finis ex altit. Arcturi 46° 25' h. 10. 31'. Duratio igitur h. 3. 15' et medium h. 8. 53' 30".

Reliqua, inquit, lucis particula (in media duratione) aestimative digitum unum aequabat, at difficile fuit internoscere. Diametrum Lunae sextante instrumento prodidit 34' 30" et cum cornua erecta stare viderentur, altitudo Sirii fuit ipsi 13° 35'.

Maestlinus Tubingae initium notavit alt. Arct. 18° 12' i. e. h. 7. 20' 30", finem h. 10. 40' 30" ex alt. Arct. 50° 20', ubi duratio h. 3. 20'. Confirmat eandem et Rittelius. Ergo medium h. 9. 0' 30". (Libello de irregularitatibus motuum fol. 89.) Differ. meridd. 7' fere ut in eclipsi XXI. a. 1598. Defectum digitorum 11. 40'; addit quidem „ex observatione,“ sed simul addit etiam „ex computatione per inclinationes tempore ingressus et egressus,“ quae observatio, ut supra dixi, lubrica est.

Krabbus Wolfebutelae initium notavit altitudine Spicae 4°, ergo h. 7. 24'; finem alt. ejusdem 26° ergo h. 10. 48'. Duratio hinc 3. 24' et medium h. 9. 6'. Differentia a Tubinga 5' 30".

Ego Pragae initium h. 7. 38', finem h. 10. 55'.

Duratio h. 3. 17', proxime ut Fabriciana. Medium ergo h. 9. 16' 30'. Differt igitur Praga a Tubinga per 16'. Quoad quantitatem, h. 9. 4' cornuum linea vix erat imaginabilis ob exilitatem cornu. Rursum h. 9. 7' annotatum, superfuisse inaestimabile aliquid. Et tamen h. 9. 19' proxime medium superstes locus circumferentiae fuit agnitus, sic ut linea ex illo per centrum ducta incideret in praecedens genu Bootis, quod erat indicium medii. Ac proinde cum 12' et 15' ante tam parum superfuerit, omnino consentaneum est, ultimam lucem Lunae ex Sole circa medium desiisse in ruboris gradum altissimum, sic ut inter extinctam puram ex Sole lucem et hunc ruborem a refractis Solis radiis ortum discerni non posset articulus transmutationis; itaque penitus immersa esset Luna in umbram, quamvis videretur aliquid superesse, quod Maestlinus triente digiti, Fabricius digito aestimavit; ille, ut apparet, computatione phasium propinquarum, de quibus ego; isto nudi ruboris intuitu, qui quod gradatim oblitteraretur in meras tenebras inter-nosci a Fabricio difficulter potuit. Ita hic aliter pronunciandum, quam supra eclipsi XXI., super eadem observationum diversitate. Et infra pluribus haec exceptio confirmabitur exemplis, ut eclipsi XXXVI. a. 1616.

Calculus Tychonis, cui aeq. t. 4' 33" sub.

☉ 14. 10. 46 γ.)	14. 12. 20 ☾.	Anom. 5. 2. 32. 26.	Mot. lat. 11. 24. 30. 44
Ante 3' fuit ☿.		Horarius 34' 51"	5. 11
		Semid. umbrae 46. 10	2. 39
		") 17. 52	31. 9
Ita haec eclipsis ex calculo		Summa 64. 2 — 17. 350	Latitudo 28. 30
Tychonis valde propinquat obser-		Sc. dim. dur. 57. 20	03. 440
vationi temporis et durationis et		Resid. 22. 29	13. 910
quantitatis.		34' 51" — 54300	Sc. defectus 35. 32
		98100	Semid. ☾ 35. 44
		43800	Proxima totalis.
		Dim. dur. h. 1. 38. 42.	

Calculo vero meo.

1605. ☉ h. ,	1604. ☾
Jun. 17. 6. 16 — 5. 48. 38 ☉	Febr. 12. 3. 2. 17 — 1. 1. 8. 12 — 6. 24. 41. 58
Mart. 24. 9. 7 — 20. 45. 15	D. 23. 82. 9. 7.
84. 21. 9	51. 46
58. 50 ☉ 14. 11. 37 γ	Rev. III. 82. 15. 55. 45 — 0. 9. 12. 36 — 0. 4. 22. 39
1960	11. 20. 13. 32 — 5. 3. 39. 58
12800	35. 37
14760	52100
Parall. ☾ 63. 22	Hor. ☾ 38. 2
" ☉ 1.	☉ 2. 29
64. 22 ☾ a ☉ 35. 33 — 52247	Req. 14. 13. 9
Semid. ☉ 15. 14	Sc. d. dur. 56. 37
umbrae 49. 8	Resid. 21. 2 — 104900
" ☾ 16. 17	52653
Summa 65. 25 — — 18. 110	Dimidia duratio h. 1. 35. 28.
Latit. 32. 45 — — 04. 540	Aequatio temporis physica est 17' 50" sub. hic add.
Sc. defectus 32. 40	13. 570 (56' 37")
Diam. ☾ 32. 34	

Fit totalis praecise.

Hic sequitur meus calculus Tychonicum ratione temporis medii quidem 11', non tantum enim metae addo pro reductione ad orbitam, sed etiam auctam aequationem subtraho. Et quia hic ad medium tempus additur aequatio physica major quam Tychoni, differentia calculorum emergit 24 et calculus meus 21' superat tempus observationis. Pulsatur aequatio temporis physica.

Quoad durationem, ea mihi prodit non longa satis et minor Tychonica, etiam maiorem umbrae semidiametrum habeam. Nam Lunae semidiameter minor summam diametrorum non multo facit maiorem; latitudo contra duobus nominibus mihi major, cum summa illa pauciora jam producit scrupula durationis, quae efficiuntur ab auctiore etiam horario. Et tamen eadem in utroque calculo quantitas defectus, quia mihi simul augentur et latitudo et umbra.

Cum itaque durationem observatam non assequar, id indicio est, Lunam profundius mergendam in umbram: nec quidquam obstat observatio, ut in qua falsa lux pro vera fuit agnita, ut supra dictum. Sit dimidia duratio, ut observavi, h. 1. 38' 30" ergo scrupula durationis 35' 35" — 52247

22. 50	— 96616
58. 25	— 44369 — 38' 30"
	14. 450
65. 25	18. 110
29. 25	— 03. 660

Quae cum summa semidd. comparata, requirunt latit. 29' 25", ita margo ultimus ad 3' recessisset ab umbrae termino: quanto plus autem, si Maestlinianam et si Krabbi durationem sequeretur? Hinc igitur discat, qui minutias exigit, quanta circa eas occurrat varietas. Hic enim, si durationem spectem, nodus ☿ sequens

petit retro agi, sin quantitatem, promoveri. Praestat hic confugere ad visus conditiones. Tale quid enim etiam in XXIV. a. 1601. observatum est.

XXIX. Eclipsis Lunae anno 1605. 16/26. Sept.

Fabricius ad urbem Emden Frisiae, cum c. 2' deficerent, altitudinem (Sirii) invenit 8° 20', unde habetur h. 14. 55', ut initium fuerit h. 14. 51', Maestlinus Tubingae inter nubes idem initium, quantum dabatur, signavit altitudine ejusdem Sirii 13°, unde h. 15. 6' et differentia meridd. 15', multo plus quam in antecedenti. Tabulae dant 9. Etsi in disputatione de irregularitatibus (Maestlini) fol. 19. perperam exprimitur h. 15. 34'. Occidit Luna lumine nondum repleta, ergo duratio longior quam h. 2. 46'. Pragae quidem serenum non fuit.

Rittelius Stuccardiae et indice hoc Marius Hailsbronnae, Krabbusque Wolfbutelae consentiunt, quod mireris, in eandem absurdam observationem, quam ut nimis maturam omitto, majoris facio dictorum mathematicorum annotationes, de quibus mihi certius constat. Et Krabbus altitudine Hirci usus est 70° permagna. Idem et finem eclipseos annotavit h. 17. 58' in altitudine $\supset \frac{1}{2}^\circ$, cum eo die Sol oriatur h. 17. 52', refracte maturius, atqui orto jam Sole Lunam in tanta ad horizontem propinquitate, coelo nubilo, videre et simul discernere, an exacte impleatur, omnino lubrici res est negotii. Et Maestlino occidentaliori occidit Luna nondum repleta.

Calculus Tychonis, cui aeq. temp. 1' 18" sub.

⊙ 3. 52. 55 \simeq , \supset 3. 56. 20 γ , anom. 10. 2. 37. 49. Mot. lat. 5. 23. 34. 56	
Medium h. 16. 37	Horar. 28' 40" — 73861 5. 10
Dim. durat. " 1. 38. 47	Semid. umbrae 43. 13 — 2. 55
Initium " 14. 58. 13 aequali " \supset 16. 28	12
" 1. 18 hic add. Summa semid. 59. 41 — 14. 090	36. 19
Pro Tubing. " 11. Subt. Lat. " 33. 12 — 04. 660	Latit. 33. 12
" 14. 48. 31 Tub. appar. Sc. defect. 26. 29	
Pro Emda " 9. Sc. dim. dur. 47. 12 — 09. 430	
" 14. 39. 31 Emdae. Resid. 18. 32 — 117500	
	Dim. dur. h. 1. 38. 47' 43639

Dissidet ab observatione, tempus ejus antevertens 10 vel 17'.

Calculo meo sic.

⊙ Jun. h. 1605. 17. 6. 16 — 5. 48. 38	⊙ 1604. Aug. 12. 3. 2. 17 — 1. 1. 8. 12 — 6. 24. 41. 58
Sept. 16. 16. 44 27. 37. 56	D. 15. 258. 16. 44.
91. 10. 28 25. 46	270. 19. 46. 17
59. 5 ⊙ 3. 52. 20 \simeq Rev. X. 273. 13. 5. 49 — 3. 41. 57 — 0. 14. 35. 29	
1540	4. 17. 19. 32 — 2. 1. 50. 9 — 6. 10. 6. 29
82986	31. 29 1. 27. 45. 40 15. 1
84526	64500 10. 16 Cor. 25. 0
Parall. \supset 59. 35	112100 \supset 3. 54. 13 γ \supset 10. 46. 30 \simeq
⊙ 1. 0	176600 Requis. 3. 54. 7 ⊙ 3. 52. 20
60. 35	6. 54. 10
Semid. ⊙ 15. 15	Red. 1. 47
" umbrae 45. 20	Requis. 3. 54. 7
" \supset 15. 19	Lat. 38. 0
60. 39 — 15. 560	Simpl. 36. 1.
38. 9 — 06. 160	
Scr. def. 22. 30	Medium h. 16. 44
Sc. dim. dur. 47. 7 09. 400	1. 36. 36
Horar. \supset 31. 44	Initium 15. 7. 24 aequali.
" ⊙ 2. 28 71800	Aeq. physica 12. 10 add. hic subtr.
\supset a ⊙ 29. 16 121200	14. 55. 14 Uranib. app.
Resid. 17. 51 49400	14. 44. 7 Tubing.
Dimid. dur. h. 1. 36' 36"	14. 35 Emdae et Ostelae.

Tardior est calculus meus Tychonico, quia magnam aequationem addit. Cum hoc igitur et cum aequatione temporis physica plane assequor calculum Tychonis; aberramus vero uterque ab observatione. (Nota: Eclipsis D in 4°Y tardior.)

XXX. Eclipsis Lunae anno 1607. $\frac{26. \text{Aug.}}{5. \text{Sept.}}$

Pragae per nubes properatis occasionibus observavi ista: hora arcis 12. culminavit Luna; quae cum fuerit ante $\text{S} \odot 1^\circ 45'$ circiter, vere igitur fuit h. 12. 7', quam correctionem horologii observabo in sequentibus.

Hora arcis 13. index horologii mei domestici monstravit 41'. Inde fluxerunt minuta 37, cum Jupiter in azimutho 37° instrumenti fuit. Ergo cum 31° azimuthum instrumenti staret in meridie, jam 4 in vero azimutho 6° ad occasum fuit. Perperam additum, tunc illum culminasse ibi, ubi hora 12. Luna. Nam hoc si esset, hora tantum 13. 30' prodiret, cum sit 13. 44.

Hora arcis 14. rursum index meus erat in minuto 41. Post 23', quod esset secundum culminationem Lunae h. 14. 30', initium visum in ipso Lunae vertice. Post 3' jam agnosci potuit aliquis defectus, parum ad dextram.

Post alia 20' quarta circumferentiae pars defecit. Post alia 12' fuit altitudo oculi Tauri $45^\circ 37'$, quadrante collocato in azimutho 20° ad ortum in numeratione instrumenti, cujus tamen initium non erat in meridiano, sed 31° contigui quadrantis. Itaque inter meridianum et verticalem erant 51° .

Paulo post hora arcis 15. in meo horologio monstrabatur 42' et post unum quadrantem arcis 57'. Ita vides constantia fuisse horologia.

Hinc pro tempore eliciendo.

Ex altitudine oculi \odot			Ex azimutho		
VP	$39^\circ 54'$	44402	VP	$39. 54$	— 44402 — 26505
PS	$74. 19$	3794	PVS	$51. 0$	— 25213
	$34. 25$	48196			69815 — 14283
VS	$44. 23$				76444 — 12222
	$9. 58$ — $4. 59$	244339		$46. 33$	— 32042
	$78. 48$ — $39. 24$	45455	• PS	$74. 19$	— 3794 — 130815
VPS	$34. 46$ — $17. 23$	289794			5115 — 116532
AR. stellae	$63. 23$			$80. 42$	— 1321
AR. M. C.	$28. 37$	vel plus ex azim.	VPS	$34. 9$	
AR. \odot	$164. 9$		Paulo aliter ex azimutho nonnihil vitato.		
	$224. 28$	vel plus \odot Ergo h. 14. 58 vel ex azimutho h. 15. 0. 80			
		Hinc aufer intermed. 35			35.
		Initium ex alt. stellae h. 14. 23	Ex azim. st. h. 14. 25. 30		

Satis igitur confirmatum est initium h. 14. 29'. Et quia in 23' minus obscuratum fuit, quam quarta diametri, parvus igitur defectus fuit. Uraniburgi igitur fuit h. 14. 24' apparenti, at quia Tychoni aeq. temp. est $5' 24''$ add., quare medium tempus Uraniburgi est h. 14. 29'.

Calculus Tychonis.

\odot 12. 48. 58 mp , D 12. 48. 21 X — 6. 22. 30. 42 — 6. 9. 59. 28. Lat. 51. 43	
Vera S h. 15. 30 aequali. Verus horarius 35. 4. Semid. umbr. corr. 46. 24	
Aufer 1. 5	D 17. 55
Initium 14. 25 aeq. Uranib.	Summa 64. 19 — 17. 500
Appar. Pragae.	Lat. 51. 43 — 11. 330
Exacte satis, ut observatum.	Sc. def. 12. 36
	Sc. dim. dur. 38. 12 — 06. 170
	35. 4
	3. 8
	Dimidia duratio h. 1. 5.

Calculo meo sic.

☉ Jan. h. ,	1608.		
1607. 17. 18. 45 — 5. 50. 44	Jul. 25. 16. 59. 9 — 3. 20. 57. 18 — 5. 16. 45. 43		
Aug. 26. 15. 28 — 6. 6. 49	D. 25. 237. 15. 28.		
69. 20. 43	50. 21	263. 8. 27. 9	
58. 20	☉ 12. 47. 54	Rev. X. 275. 13. 5. 49 — 1. 0. 41. 57 — 0. 14. 35. 29	
14770		12. 4. 38. 40 — 4. 21. 39. 15 — 5. 2. 10. 14	
2817		35. 44	5. 8. 25. 18
17587		51800	23. 3
Parall. ☉ 63. 29		43900	☉ 12. 50. 54 ✕
" ☉ 1. 0		95700	12. 45. 29
64. 29			5. 25
Semid. ☉ 15. 9			9. 34.
Umbræ 49. 20	Ergo h. 15. 18 1/2		2. 25
☉ 16. 18	Aufer 1. 5 1/2		12. 45. 29
Summa 65. 38 — 18. 230	Initium 14. 13 aequali.		Lat. 52. 46
Lat. 52. 46 — 11. 780			Simpl. 50. 58
Ser. def. 12. 52			
Sc. dur. dim. 39. 3 — 06. 450.	Horarius ☉ 38. 12; ☉ 2. 28; ☉ a ☉ 35. 44 — 51800		
	Dimidium dur. h. 1. 5' 35"	Resid. 3. 19 — 289300	
		237500	

Praevenio Tychonicum et observationem 12', et quia demo aliquid metae, et quia magnam aequationem addo. At aequatio physica 17' 48" add., hic subtr., cumulat plane 30', itaque pulsatur hic aequatio physica. — Probetur etiam consensus inclinationis cum latitudine.

AR. ☉ 164. 9.	Sit AR. M. C. 29. 0.	Ergo asc. obliqua horoscopi 119°.
Latus aequatoris 61° 0'	— 13397	
Alt. " 39. 54	— 44402	— 26505
	57799	— 18940
		7565
68. 0		
23. 31 1/2		
44. 28 1/2		36582
Mesolog. 35545	19980	55522
43. 15	— 37819	
Non. 16. 45 ✕		Log. 61084 — 17460
☉ 12. 13 ✕		Summa semid. 395800 — 395800
64. 32	— 10221	1. 5. 38. 456884 — 413280
	399200	lat. 35' 40", long. 55' 10"
Parall. long. 46' 54" — 429401		
11° 28' ✕ locus ☉ visus.		
55. 19 distantia visa.		

Mesolog. 9582
 " 25963 — angulus 37° 39'.

Ecce si in principio umbra stetit praecise in ipso vertice Lunae, tunc intervallum longitudinis fuit 55' 10", cum tamen scrupula durationis dimidia computem tantum 39' 3". Vicissim latitudo vera fuisset 35' 40", cum tamen latitudo computetur 52' 46".

Sit igitur differentia longitudinis 39'; logar. 447900. Hinc aufer logar. summae semidd. 395800, restat 52100; log. arcus 36° 28', cujus complem. 53° 34'.

log. 21750 Lat. 52' 50". Haec quidem consentirent calculo. At quia angulus diacentri cum ecliptica est 53° 34', angulus vero verticalis cum eadem tantum 37° 39', angulus igitur diacentri cum verticali esset 15° 55'. Ita umbra declinasset a vertice ad

dextram fere 16°: quod certe esset non parum, ut annotatum 3' post initium, sed 24. pars de circulo disci Lunae.

XXXI. Eclipsis Lunae anno 1609. 9/19. Januar.

Krabbus Wolfenbutelae principium notavit altitudine Spicae 12° et hora 13. 10' sciotherici, et sane haec altitudo dat h. 13. 8'. Finem altit. Spicae 25°, h. 16. 24'

scioterici. Verum haec inter se multum dissentiunt. Nam haec altitudo dat h. 15. 38', scilicet ipsa Spica in meridiano nequit altius assurgere, quam 28° 45', itaque parvus error in altitudine multum efficit in tempore. Esto tamen principium h. 13. 8' et duratio h. 3. 16', medium h. 14. 46'.

Calculus Tychonis, cui aeq. temp. 8' 50" add.

☉ 0° 19' 4" ☾, ☽ 0. 21. 58 — 9. 14. 8. 37 — 11. 24. 8. 4.	
h. 15. 16 vera oppos.	Horarius 29' 44" lat. 0. 30' 28"
Aufer 1. 44	Semid. umbr. 44. 16
Initium 13. 32 aequali Uranib.	Variatio 55
Aeq. t. 8. 50 hic subt.	Correcta 43. 21
13. 23	Semid. ☽ 16. 46
Pro diff. merid. 10 ex fide tab.	Summa 60. 7 — 15. 280
Wolfebut. h. 13. 13'	Latit. 30. 28 — 03. 930
	Sc. dur. dim. 51. 46
	Residua 22. 4 100000
	Dim. duratio h. 1. 44. 5
	29800 (K. 30800)

Calculo meo sic.

☉ Jun. 1609. 17. h. 7. 13 — 5. 52. 50 ☉	☽ 1608. 12. 17. 37. 27 — 6. 13. 50. 31 — 4. 7. 21. 55
Jan. 9. 15. 22 4. 52. 4	8. 15. 22.
D. 128. 15. 51 39. 37	21. 8. 58. 27
61. 7 44	Revol. I. 27. 13. 18. 35 — 0. 3. 4. 12 — 0. 1. 27. 33
☉ 0. 20. 25 ☾	6. 4. 19. 8 — 6. 16. 54. 43 — 4. 5. 54. 22
	32. 22 2. 16. 22. 20 19. 35
	61700
	114300 ☽ 0. 22. 4 ☽ ☽ 6. 38. 57 ☽
	178000 Req. 0. 22. 2 ☉ 0. 20. 25
Parall. ☽ 60. 24	Horar. ☽ 32. 58
" ☉ 1. 1	" ☉ 2. 32
61. 25	☽ a ☉ 30. 26
Semid. ☉ 15. 30	Sc. dur. d. 50. 38
" umbr. 45. 55	20. 12
" ☽ 15. 32	Dimidia duratio h. 1. 40
61. 27 — 15. 970	15. 22
Lat. 34. 48 — 05. 120	Initium 13. 42 Uranib. aequali.
Sc. dur. dim. 50. 38 10. 850	Aeq. temp. phys. 3. 20 add. hic subt.
	10. Pro Wolfebut.
	13. 28 1/2 Initium Wolfebut.

Propter ☉ aequationem sequor 3', propter reductionem aliis 3', propter aeq. temp. aliis 5 1/2, reliquum propter durationis brevitatem. Sed Krabbi observationum perlaxa est fides. Ego tamen durationem ejus propius exprimo.

XXXII. Eclipsis Lunae anno 1609. 6/16. Julii.

Pragae noctis principio nubes densissimae somnum invitarunt. Itaque phases ceterae si videri potuerunt, a me neglectae. At cum locus medius inter Lunam et ☿ esset in meridiano, jam paulo admodum ante coeperat emergere, lux in margine satis evidenter, quamvis per crassam auram, effulsit. Et quamvis esset in tenebris, videbatur tamen toto corpore clarissime, vix parvula obscuritas ex adverso emersionis. Haec ita discerni poterant, quamvis aura esset admodum crassa. Saturnus erat in 10° ☾, A.R. 312° 30'.

Luna in 24° 20' ☿. A.R. 297° 15' circiter, differ. 15° 15', dimidium 7° 38'. Itaque A.R. M.C. 305° 0' proxime, sed A.R. ☉ 116°, ergo h. 12. 36' fuit, quando jam coeperat emergere.

Culminante ☿, i. e. h. 13. 6' semicircumferentia videbatur emersisse, at nondum dimidium diametri corporis. At post 4' jam dimidium diametri redierat. Post

alia 32', sc. h. 13. 42' finis visus. Propinquitatem tamen umbrae sensi per 26' deinceps. Tempus igitur emersionis h. 1. 5'.

Krabbus Wolfebutelae notavit initio altitudinem Aquilae 42°, quae arguit h. 10. 18', ipse tamen apposuit horam 10. 26', fine altitudinem mediae in cauda Ursae 33°, quae dat h. 12. 48', cum ipse apponat h. 13. 50' et addit durationem h. 3. 44', cum extrema in horologio includant h. 3. 24'. In descriptione colorum disertus est, rufam apparuisse dictitans et fuscam, in circumferentia gilvam et in margine subfuscam.

Rittelius Staccardiae initium morae prodidit h. 10. 45', finem morae h. 12. 41', ergo med. h. 11. 43' ex altitudinibus Aquilae. Quodsi Krabbus h. 12. 48' vidisset finem solius morae, non totius eclipsis, differentia meridd. esset 7'. At quia mihi finis morae h. 12. 36' Pragae vel etiam ante, hinc dubitandi mihi causa est, an omnino sana sit etiam Ritteliana observatio. Etsi in mea quoque observatione invenio annotatum, videndum, an situs instrumenti tenuerit meridiem. Alias bene conveniunt mea tempora, quod cum coeperit ante h. 12. 36', hinc usque ad h. 13. 10' per 34' emerit dimidium, hinc iterum per 32 alia minuta reliquum dimidium.

Calculus Tychonis, cui aeq. temp. 7' 40" add.

☉ 24. 9. 46 ☉, ☽ 24. 10. 3 ☿, anom. 2. 18. 7. 44; mot. lat. 5. 27. 21. 17	
Medium h. 12. 5. 15	Semid. umbrae 44. 18
Aeq. T. 7. 40 hic subt. "	☽ 16. 48 — 00. 830
h. 11. 57. 35 Uranib.	Summa 61. 6 — 15. 800
12. 2. 35 app. Pragae	Diff. 27. 30 — 03. 200
1. 59. 30	Sc. dur. dim. 59. 28 — 14. 970
Finis 14. 2. app.	Sc. mor. dim. 23. 40 — 02. 370
	69800
	93000
	23200
	Lat. 13. 47
	Horar. 29. 52
	Duplum 59. 44
	Dim. dur. h. 1. 59. 30
	" mora 0. 47. 34
	Emerio 1. 12.

Calculo meo sic.

☉ Jun. 1609. 17. h. 7. 13 — 5. 52. 50 ☉	☽ 1608. 12. 17. 37. 27 — 6. 13. 50. 31 — 4. 7. 21. 55
Jul. 6. 12. 6 — 18. 4. 46	186. 12. 6.
D. 19. 4. 53	11. 38
57. 10 ☉ 24. 9. 14 Rev. VII. 192. 21. 10. 4 — 0. 21. 29. 22 — 0. 10. 12. 50	
159200	6. 8. 33. 23 — 7. 5. 19. 53 — 3. 27. 9. 5
4840	32. 31
164040	61360
Parall. ☽ 60. 28	58600
" ☉ 0. 59	119960
61. 27	Horar. ☽ 33. 6
Semid. ☉ 15. 1	" ☉ 2. 23
" umbr. 46. 26	☽ a ☉ 30. 43
" ☽ 15. 32	66900
Summa 61. 58 — 18. 240	
Diff. 30. 54 — 04. 039	
Lat. 17. 0 — 01. 230	
59. 23 — 15. 010	
25. 42 — 02. 809	— 84800
	17900 Mora dimidia h. 0. 50. 10
28. 49	73300 Durat. dimid. " 1. 56. 16
	6400 Emerio " 1. 6.

In tempore aequali consentimus, in tempore emersionis tueor observationem rectius; aequatio temporis physica 11' 53" add., hic subt.

Medium Uranib. h. 12. 6' aeq. Medium Pragae 12. 1 apparenti.
Pro Praga 5

1. 56

Finis 13. 57', sequitur observatum meum per 15'.

Exacte convenit medium computatum cum observatione Ritteliana, si ad h. 11. 43' Staccardiae pro Praga addas 16', ut sit Pragae h. 11. 59'.

XXXIII. Eclipsis Lunae anno 1610. 19/29. Decembr.

Pragae obscurae erant noctes et dies. Observata est a Galileo Florentiae, ut videre est in epistola, quam praefixi Dioptricae meae (II, p. 465): sed tempora nulla addidit. At Frid. Rittelius Stuccardiae principium signavit altitudine Sirii $12^{\circ} 30'$ occid., addidit h. 15. 15', sed haec altitudo dat horam 15. 2'. Finis visus h. 17. 25' urbis et in sciotherico Solari ad Lunam applicato.

Marius Onoldsbachii promit principium h. 15. 16', finem h. 17. 26'. Duratio ergo h. 2. 10', ergo medium h. 16. 21' et differentia meridd. Stuccardiae et Onoldsbachii 14'. Mappae dant 9'.

Calculus Tychonis, cui aeq. temp. 3' 0" add.

Aequatio temp. 3. 0. Hora 16: 32 ♂ vera.		⊙ 8. 26. 52 ♂	⊙ 8. 24. 46 ♂	6. 3. 11. 35.	0. 9. 43. 37
h. 16. 32.		Semid. umbr. 46. 3		5. 10	
16. 29. appar.		" ⊙ 18. 0		10. 740	
Onoldsb. 16. 27. Marius 16. 21		Summa 64. 3		— 17. 360	
Stuttg. 16. 18.		Sc. dur. dim. 39. 34		— 06. 620	
1. 7.		4. 8		Sc. def. 13. 40	
Initium 15. 11. Rittel. 15. 2		Duratio dimidia h. 1. 7' ut Marius observavit.			
Finis 17. 25.					

Calculo meo sic.

⊙ 1611. 17. 19. 42 — 5. 54. 56		⊙ 1610. 26. 7. 34. 19 — 9. 3. 39. 37 — 2. 29. 25. 40	
Antec. Dec. 19. 16. 28 — 27. 19. 15		Compl. 44. 29	
D. 180. 3. 14		ad finem 12. 7. 32. — 6. 4. 44. 19	
61. 19		14. 0. 2. 19	
⊙ 8. 27. 25 ♂		1. 24	
8. 5		35. 57	
8		1. 12	
3		12	
Parall. ⊙ 63. 41		Hora 16. 27. 30 vera ♂	
" ⊙ 1. 1		Horarius ⊙ 38. 33	
64. 42		" ⊙ 2. 33	
Semid. ⊙ 15. 33		⊙ a ⊙ 38. 0	
49. 9		Dimidia duratio h. 1. 6' 40".	
" ⊙ 16. 22			
Summa 65. 31 — 18. 170			
Lat. 51. 43 — 11. 330			
Sc. def. 13. 48			
Sc. dur. dim. 40. 13 — 06. 840.			

Ergo ob reductionem ad orbitam ⊙ differo in tempore aequali medii h. 20. 4', sed aequatio temporis physica est 2' 27" add. hic subtr. Aequale igitur tempus Uraniburgi h. 16. 25', Onoldsbachii h. 16. 23', quod est jam Mario propius. Stuccardiae h. 16. 14'. Aufer dim. durationem, ergo principium h. 15. 7' et observavit Rittelius h. 15. 2'.

XXXIV. Eclipsis Lunae anno 1612. 4/14. Maji.

Eram Selevicii in Moravia. Tonuit, pluit. Frid. Rittelius Stuccardiae finem signavit altitudine Spicae $24^{\circ} 25'$, i. e. h. 11. 55' 30".

Epistola sub Apellis nomine scripta de Maculis Solaribus Monachii dicit hanc eclipsis coepisse ante horam nonam vespertinam dimidio veluti quadrante, desiisse hora noctis duodecima. Quodsi ad coelum correcta horologia fuere, diff. meridd. hinc prodit 2' 30", at Tabulae dant 10. Duratio h. 3. 7' 30". Additur digitorum fuisse minimum octo. At Hafniae in Dania cum plurimum abfuit, digitorum $\frac{1}{2}$ est censum. (Longom. Th. fol. 182.) Ablata duratione h. 2. 43' de h. 12. 6' anet initium h. 9. 23'. At Longomontanus sub Uraniburgico meridiano initium observavit h. 9. 14'. Hinc pulsatur mea aequandi temporis pars physica.

Calculus Tychonis, cui aequatio temp. 9' 32" subtr.

⊙ 24. 16. 14 ☾	⊙ 24. 16. 47 ☿	8. 23. 9. 54.	5. 22. 10. 12
Horarius 31' 11"			5. 10
Semid. umbrae 44. 50			53
" ☾ 17. 8	06. 970		41. 29
	61. 58 —	16. 250	Lat. 40. 36
Sc. dim. dur. 46. 48	—	09. 280	61. 58
	15. 37		Sc. def. 21. 22
			Dim. 10. 41 — 172700
			34. 16 — 56000
			116700
			Digiti 7. 28'
			temp. hic add. 9' 32"
			finis Uranib. h. 12. 5' app.
			Stuccardiae " 11. 54.

Dim. duratio h. 1. 30'. Vera ☿ h. 10. 25' 30", aeq. temp. hic add. 9' 32",
finis Uranib. h. 12. 5' app.
Stuccardiae " 11. 54.

Calculo meo sic.

⊙ Jun. h. ,	⊙ 1612. 17. 1. 56 — 5. 56. 0	⊙ 1611. 5. 13. 14. 10 — 10. 16. 38. 18 — 2. 9. 0. 0
Maj. 4. 10. 26 — 11. 0. 57	Biss. Apr. 124. 10. 26.	
	37. 12 D. 3.	
D. 43. 15. 30 ⊙ 24. 17. 51 ☾	129. 23. 40. 10	
Parall. ☾ 61. 19	Revol. V. 137. 18. 32. 55 —	0. 15. 20. 59 — 0. 7. 17. 44
" ⊙ 1. 0	7. 18. 52. 45 —	11. 1. 59. 17 — 2. 1. 42. 16
	62. 19	33. 22 3. 7. 10. 7 24. 46
Semid. ⊙ 15. 5	58600	29. 22 Corr. 25. 0
" umbr. 47. 14	12878	☾ 24. 19. 48 ☿ ☿ 2. 32. 2 II
" ☾ 15. 46	71478	Req. 24. 19. 57 ⊙ 24. 17. 51 ☾
Summa 63. 0 — 16. 790	Horar. ☾ 34. 30	8. 14. 11
Latit. 45. 30 — 08. 760	" ⊙ 2. 25	Reduct. 2. 6
Sc. def. 17. 30	⊙ a ⊙ 32. 5 — 62600	Requisit. 24. 19. 57
Sc. dim. dur. 43. 35 — 08. 030	43. 35	Lat. 45. 30
Digitis minus 7.	11. 30 — 165200	Simpl. 42. 36
	21. 30 — 102800	Dim. dur. h. 1. 21. 30
		Medium " 10. 26.
		Finis " 11. 47. 30
		Physica temp. aeq. subtr. hic add. " 18. 33
		Finis " 12. 6. 3 Uranib. app.
		11. 55. Stuccardiae.

Conveniunt calculi in tempore aequali medii, compensante magnitudinem aequationis meae addendae reductione ad orbitam. Conveniunt et in fine, compensante brevitatem morae, ob magnam meam latitudinem, aucta aequatione temporis. Cum igitur et plures Monachii digiti et longior duratio sit observata, latitudo vera minor fuisset non mea tantum sed etiam Tychonica latitudine, ac proinde nodus ☿ sequens hac vice fuisset retractior in antecedentia, vide igitur quantum astronomus, qui ad quam plurimas observatas respicit, tribuere debeat affirmationibus observatorum singulorum. Nam si Monachensem in quantitate secutus essem, tunc et adversarium habuissem Hafniensem professione et astronomum et restauratorem scientiae, magnamque ruinam traxisset mutatio nodi.

XXXV. Eclipsis Lunae anno 1613. 18/28. Octobr.

Eferdingae eram, pluviosa et turbida aëris constitutio; Lunae ortum crassissima aura circa horizontem obnubilavit, nec diu post ortum durare potuisset. Nam Frid. Rittelius Stuccardiae notavit in fine alt. centri Lunae non majorem quam 9° 25', cum horologium urbicum (cum solaris consentiens die antecedenti) post 5' circiter sonuisset horam 6. a meridie.

Sed si computes horam ex altitudine Lunae addito de parallaxi Lunae totali 58' 24" ad altitudinem 9° 25', quantum ei competit, sc. 57' 32", ut vera altitudo sit 10° 22' 32" et ad locum ☿ ⊙ 5° 17' ☾ scrupulis dimidiae durationis 59' additis, ut vera longit. Lunae

emergat $6^{\circ} 16'$ ☾. cum lat. $16^{\circ} 30''$ sept. vera, et declinatio $13^{\circ} 49'$. A.R. $33^{\circ} 56'$,
deinde colligimus horam, ut sequitur: VP $41^{\circ} 12'$ 41750

SP 76. 11 2936

34. 59 44686

SV 79. $37\frac{1}{2}$

44. $38\frac{1}{2}$ — 22. 19 — 96800

114. $36\frac{1}{2}$ — 57. 18 — 17251

114051

89365

89. 58 — 44. 59 — 34683

33. 56

Hora 6. $3\frac{1}{2}'$ Stuccardiae.

36

A.R. M. C. 303. 58

A.R. ☉ 213. 5

90. 53

David Fabricius in Prognostico ait, finem fuisse Ostelae ad Emdam Frisiae in altitudine Lucidae γ $23^{\circ} 30'$. At in altitudine ejusdem 20° , cum ad oculum adhuc digitus deficeret, ait se finem perspicilli usu discrevisse. Sed totus ibi loci est in stabiliendo gemino defectu Lunae, quorum unus in corpore Lunaris globi, alter in amictu aëris Lunaris, qui Lunae corpus obnubit. Ego in Prolegomenis Ephemeridum fol. 21 ventilavi hoc dogma (comp. II, 113), nec rem in ipso coelo, sed speciem fortioris lucis diffusorem in oculo, phaenomeni hujus mihi notissimi et in superioribus contestatissimi ream ago. Amplector igitur pro fine eclipseos altit. stellae 20° unde elicitur h. 5. 52'. Et differ. meridd. inter Stuccardiam et Ostelam hinc emergit 11', mappae dant 10. Quod enim Fabricius perspicillo videt initium vel finem eclipsis, idem alii sine perspicillo in commune tenent initium vel finem, nec ego, qui cum Fabricio eodem visus vitio laboro, nisi suspicione tantum et inconstanter defectus durationem ultra ista momenta prorogo. Quodsi vicinas phases, cum adhuc aestimari potest quantitas defectus, inter se comparare datur: facile me ex his insidiis expedio, ut finem cum ceteris spectatoribus eundem agnoscam.

Calculo Tychonis, cui aeq. temp. 9' 14'' sub.

☉ $5^{\circ} 13' 40''$ ♍. ☽ $5^{\circ} 16' 49''$ ☾ — 0. 4. 55. 10. 0. 1. 46. 36

Ante 6' vera ☽ 27. 13

77110 Horarius 27. 45

Semid. umbr. 42. 12

" ☽ 16. 0 00. 220

Summa 58. 12 — 14. 340

Diff. 26. 12 — 02. 920

86750 — 25. 12 — 02. 700

Mora dim. 54' 29'' — 9640 57. 45 — 14. 120

328340 Resid 32. 15

251230 Dur. dim. h. 2. 4' 52''

Media oppos. 3. 58.

Finis 6. 3. aequali Uranib. h. 6. 12' apparetur.

Id est secundum mappas h. 5. 50' Ostelae, h. 6. 1' Stuccardiae.

Calculo meo sic.

1613. 17. 8. 11 — 5. 57. 2 ☽ 1612. 13. 8. 12. 36 — 11. 26. 32. 51 — 1. 20. 1. 52

Oct. 18. 4. 4 28. 26. 50 Sept. d. 17. 290. 4. 4.

D. 122. 19. 53 49. 52 303. 12. 18. 36

60. 12 ☉ $5^{\circ} 13. 44$ ♍ Rev. XL 303. 2. 24. 24 — 1. 3. 46. 9 — 0. 16. 3. 2

0. 9. 52. 12 4. 32. 11 — 1. 3. 58. 50

30. 15 26. 19 1. 19

Parallax ☽ 58. 24 Horarius ☽ 30. 0

" ☉ 1. 0 ☉ 2. 30

☽ 5. 17. 30 ☽ Corr. 25.

Req. 5. 13. 30 ☽ 4. 22. 31 ☽

Semid. ☉ 59. 24 ☽ a ☉ 27. 30

Ante 8' vera ☽

" ☉ 15. 24

" umbrae 44. 0

☉ 5. 13. 44

0. 51. 13

Semid. umbræ 44. 0				Lat. 4. 43
") 15. 0				Simpl. 4. 27
Summa 59. 0	—	14. 730		Red. 14
Diff. 29. 0	—	03. 560		⊙ 5° 13' 30"
Lat. 4. 43	—	00. 100		Medium h. 3. 56. aequali
Sc. moræ dim. 28. 35	—	03. 460		Dim. dur. 2. 8. 15
" dur. dim. 58. 47	—	14. 630		Finis 6. 4. 15
Residuum 1. 5	Mora dim. h. 1. 2' 22"		Aeq. phys. add. hic subt. 2. 24	Pro Tubinga 11.
" 3. 47	Dur. " " 2. 8. 15.			Tubingæ 5. 51.
				Ostelæ 5. 41.

Calculi cetera conveniunt, in sola aeq. temp. est diversitas, statque Tycho cum observatis, et pulsatur mea aequatio physica.

XXXVI. Eclipsis Lunae anno 1616. 16/26. Augusti.

Descriptio observationum hujus eclipsis exstat in Proleg. Ephem. Maestlinus Tubingæ principium prodidit h. 13. 33' ex altit. dextri humeri Orionis 9°. Finem h. 16. 43' ex alt. Sirii 11° 20'. Ergo duratio h. 3. 10' et medium h. 15. 8'. Affirmat, superfuisse aliquid, ut non esset totalis etiam telescopio usus. (v. Hansch. p. 48.)

Romae vero nactus Georgius Herwartus observationem ad me transmisit. Principium h. 13. 43' 30"; finis h. 4. 56' 24". Censuit et hic observator, superfuisse quippiam nec totalem fuisse. Sed addit aliam observationem in aliis aedibus, ubi observatores usi telescopio momentum incidentiae prodiderunt h. 15. 6' 30", emersionis vero h. 15. 33' 45". Ita morata esset in tenebris per 27' 15". Medium ergo h. 15. 20', et duratio h. 3. 13', fere ut et Maestlino visum. Ergo differentia meridd. Tubingæ et Romae 12'.

Observavi eandem eclipsin et ego. Sed cum Lincium montibus sit circumvallatum, ego spe potiundi spectaculi, quo utrumque luminarium diametraliter oppositorum simul in horizonte visui exhibetur, vespera eclipsin praecedente, ut primum serenitatis duraturae fiduciam concepi, porta jam claudenda egressus, collem oppido quam arduum ad septentrionem urbis conscendi, instrumento instructus portabili; regulae quadrantales erant, super circulo azimuthali unius pedis diametrum habente versatiles. Agricolaë metu grassantium tunc incendiariorum nullum ignoto mihi luminis usum intra tecta, vix locum sub dio in novali sulcis aspero, carboneseque vivos concessere, quibus vice lucernae sum usus in dinumerandis instrumenti divisionibus. Trunco tripede duum pedum altitudine sustinebatur instrumentum, inter observandum plerumque supinus jacebam, ut oculus pinnacidiis inferior esse posset.

Principium per nubes sparsas et dehiscentes identidem est conspectum in altit. Lunae, incertum an 29° an 25°: nondum enim inter latera regulae distinxeram. Situs instrumenti fortuito captus azimuth Lunae monstrabat 32°. Umbra in summo Lunae margine, parum admodum declinans ad sinistram. In eo azimutho capitis Andromedae altitudinem probandi azimuthi causa notavi 70° vel 66° 15'. Tunc Luna nondum dimidia in umbra fuit; atque ea, priusquam ala Pegasi in id azimuth incideret, jam ad dextram declinabat.

In eodem azimutho instrumenti ala Pegasi elevabatur 55½°, vel 51½°, Fomahant vero 7°.

Cum umbra declinaret quasi ad 2 superiores in palma vel urna ☽, erat ☽ in azimutho instrumenti 46° 30', altitudo imi marginis latere regulae inferiori quo oportuit 17° 20'. Cum polaris et spira Serpentis eundem obtinerent verticalem proxime, azimuth ☽ fuit 49° 50' in instrumento.

Nondum occidente Aquila Lunae azimuth 51° 30', altit. 16°, linea per medium cornu recta ducta tendebat super remotiorem quinquanguli illius notabilis in constellatione Aquarii, i. e. oris Pegasi. Circa haec tempora Luna fuit obscurissima, superesse tamen aliquid in lumine censebam. Tota rubicunda fuit, magis vero partes contiguæ cornu lucido superiori ad sinistram.

Occidit Luna nondum plene restituta (ut videbatur) in azimutho 74°, cum

Sol jam e regione in azimutho 75° haberet altitudinem $1^{\circ} 20'$. Certe utrumque luminare in semicirculo instrumenti meridionali visebatur. Erat quidem, ut dixi, residui alicujus defectus suspicio in occumbente; at parvo admodum discrimine Luna discernebatur ab aëre circumstante, radiis Solis albescente. Cogitandum igitur, an fuerit tantum debilitas luminis ex illa parte.

Erat igitur Luna adhuc in austro circiter $24'$, parallaxi quidem projectior erat in austrum, at vicissim refractione rursus elevata in septentrionem, cum occideret. Quin et tertia causa fuit, cur australior videretur ab oppositionis linea, quia jam superaverat locum Solis uno fere gradu. Has igitur causas vincere non potuit refractionis utriusque luminis contrarium efficiens, quin adhuc in eandem plagam declinarent ob oppositione luminaria.

Non fuit igitur magna refractionis. Et quia Sol erat fere in $4^{\circ} 0' \mp$ cum declinatione $10^{\circ} 6'$ sept. log. 174087
alt. aequat. log. 40697

133390

Esset ergo pure orientis azimuth $15^{\circ} 17'$.

Sed quia Solis azimuth in instrumento est observatum in alt. $1^{\circ} 20'$, dentur $20'$ refractioni, maneat altitudini 1° . Erit angulus orientis $5\frac{1}{2}^{\circ} \mp 62^{\circ} 24'$ circ. log. 12061
 1° log. 404828
392747

latus eclipticae $1^{\circ} 8'$. Orietur $5^{\circ} 8' \mp$, cujus declinatio $9^{\circ} 40'$; log. 178429

	40697	15. 230
Azimuth $14^{\circ} 37'$	137732	19. 560
Hinc aufer	32	04. 330

Manet azimuth $\odot 14^{\circ} 5'$

et hoc numeratum fuit in instrumento 75° . Proinde in ortu aequinoctiali instrumenti stetit $89^{\circ} 5'$. Inde si numeres primo $0^{\circ} 55'$, deinde 90° , tum 32° , quod fuit azimuth \odot , colligantur $122^{\circ} 55'$, itaque Luna a meridiano removebatur $32^{\circ} 55'$. Erat autem $\odot 3^{\circ} 50' \times$, unde ablatis scrupulis durationis $57'$, restat verus locus $\odot 2^{\circ} 53' \times$, latitudo circiter $0^{\circ} 35'$ merid.

Ut etiam parallaxin adhibeamus, usurpetur ex anticipato tempus principii Romanum h. 13. 43', quod sit secundum tabulas h. 13. 53' Lincii. Quare ad A.R. $\odot 334^{\circ} 55'$ adjectis $28^{\circ} 15'$, qui valent horam cum $53'$, constituitur A.R. M. C. $3^{\circ} 10'$. Et Asc. obliq. horoscopi $93^{\circ} 10'$. Oriturque $26^{\circ} 30' \odot$, angulo orientis $47^{\circ} 57'$ et Luna abest a nonagesimo $53^{\circ} 37'$. 47. 57. — 29765 — 42. 3. — 40081

53. 37. — 21683 — 1. 3. 30 — 399000

Parall. \odot 1. 3. 40 — 399000 439081 — 0. 42. 30

450448 — 0. 38. 0 Parall. lat. 0. 35.

Parall. long. 2. 53. Visa lat. 1. 17. 30 austr.

Visa long. \odot 2. 15. \times

Hic locus conversus in arcum aequatoris 332. 15 quaesitusque inter Asc. rectas, dat in columna eclipticae 330. 9 arcum aequatoris cum angulo $69^{\circ} 19'$ et arcu lat. 11. 38; cui adde 1. 17. 30, fit $12^{\circ} 55' 30''$ — 149750 Antilog 2566

Anguli log. 6662

156412 — $12^{\circ} 4' 40''$. Declinationis Ant. 2236

Ergo arcus aequatoris $4^{\circ} 38'$; hinc A.R. centri $\odot 334^{\circ} 47'$ 328.

Hinc horam colligamus ex declinatione et A.R. visi loci \odot et ex azimutho.

PV 41. 44 — 40697 — 29269

PVS 147. 5 — 60987

101684 — 7012

22257

PS 102. 5

77. 55 — 2240 — 156382

77. $1\frac{1}{2}$ — 149370

102. $58\frac{1}{2}$

VS 66. 9 — 8926

23. 51 altitudo.

58747

67773 (67673)

Discrepat alt. ex observato azimutho computata, discrepat inquam ab alt. observata uno gradu. Et si sequar alt. 25° , jam azimuth erit propius meridiano, tempus maturius.

VPS 30. 31	Sit PV 41. 44	40697	VPS 72068
334. 47	PS 102. 5	1240	PS 1240
5. 18 A.R. M. C.	60. 21	41937	73326
154. 55 A.R. ☉	VS 65. 0		VS 9838
210. 23 H. 14. 1. 32.	5. 21 — 2. 40 $\frac{1}{2}$	306460	PVS 63488 — 32° 0'
	125. 21 — 62. 40 $\frac{1}{2}$	11832	Alt. ☉ dat h. 13. 56',
		318292	azimuth 32° 0'
		276355	a meridie.
	VPS 29. 6 — 14. 33	138178	

Cum autem certior sit observatio per altitudinem, quam per azimuth, quia regulae stantes facile inclinantur ad latus alterutrum: dimitto igitur azimuth 32° 55', dimitto et azimuth 31° 20', quod in Proleg. Ephem. visus mihi eram ex fixarum altitudinibus correxiase, retineo vero altitudine inquisitum tempus initii, nisi quod ob nubes id forte tardiuscule agnovi.

Pro fine, cum Sol oriatur h. 17. 14' fiatque uno gradu altior post 6', ergo h. 17. 20', prodiret mihi duratio h. 3. 24', si certo in ipso occasu Luna restituta fuisset. At si 4' ante, ut in Proleg. concessi, mihi luscioso duratio fiet 3. 20'. Ex comparatione igitur observationum initii differentia Romae et Lincii fiet 13' vel 12', Tubingae et Lincii 23' vel 22'. Medium Lincii circiter h. 15. 32', ut finis fuerit h. 17. 9', Uraniburgi medium h. 15. 22'.

Calculus Tychonis, cui aequat. temp. 7' 37" add.

☉ 3. 55. 4 mp.	☉ 3. 55. 2 mp.	6. 8. 24. 52.	11. 24. 41. 15
Horarius 35' 23"		52800	5. 11
Semid. umbrae 46. 39			3. 26
" ☉ 17. 59	03. 320		7
Summa 64. 38	— 17. 670		31. 9
Ser. dim. dur. 58. 25	— 14. 350		27. 36 lat.
Residua 23. 2		95800	64. 38 summa semidd.
		43000	37. 2 Ser. def.
Dimidia duratio h. 1. 39. 1.			35. 58 diam. ☉
			Totalis sine mora.

Calculo meo sic.

1616. 17. 2. 54 — 6. 0. 11 ☉	1615. 6. 3. 49. 20 — 3. 29. 20. 37 — 11. 21. 39. 57		
Aug. 16. 15. 30	Biss. Jul.		
60. 12. 36 — 57. 23. 17	D. 15. 228. 15. 30.		
58. 3	29. 2		
	234. 19. 19. 20		
	1. 27 Rev. IX. 247. 23. 47. 14 — 0. 27. 37. 46 — 0. 13. 7. 56		
☉ 3. 53. 57 mp	13. 4. 27. 54	4. 26. 58. 23	11. 8. 32. 1
Parall. ☉ 63. 40	35. 56	5. 22. 45. 14	41. 53
" ☉ 1. 0	51200	16. 40	25. 0
64. 40	76600	☾ 3. 56. 27 ✕	☾ 9. 38. 54 ✕
Semid. ☉ 15. 8	127800	Req. 3. 55. 27	☉ 3. 53. 57
" umbrae 49. 32	Horar. ☉ 38. 31		5. 44. 57
" ☉ 16. 22	" ☉ 2. 26		Red. 1. 20
65. 54 — 18. 380	☾ a ☉ 36. 5 — 50851	Requisitus 3. 55. 27	
Lat. 31. 49 — 04. 290	57. 41	Lat. 31. 49	
Diff. semid. 33. 10 — 04. 650	21. 36 — 102000	Simpl. 30. 2	
Ser. dim. dur. 57. 41 — 14. 090	Dim. dur. h 1. 36'	51149	
	00. 380		
Ser. morae dim. 11. 45		163000	

Mora dim. 19' 33" 111851, paulo alia, quam in

Proleg. Eph., quia hypothesis ab eo tempore correctae.

Convenit Tychonicus in tempore medii cum observatione exacte, sed totalem sine mora exhibet. Praevenit mihi ☉ tempus Solis 2' tempore aequali. At si jam cum 4° mp excerpam physicam aequationem 19' 4" add: hic subtrahendam, vera oppositio Uraniburgi tempore apparenti prodiret h. 15. 9'. Ita praeveniret calculus meus 13'.

Mora Romae paulo longior est observata, quare latitudo paulo debet esse minor et nodus hic ☉ sequens retroceditor. Quid vero respondendum sit ad testi-

monia Maestlini, alterius Romani, meumque adeo ipsius, quibus defectus visus est non fuisse totalis: insertum inveniet lector Prolegomenis Ephem. fol. 12. Nam mihi diu admodum et plus quam dimidiam horam Luna visa est cunctari neque diminuens lumen ulterius neque rursum augens; limbus qui superesse censebatur in lumine, fuit oppido brevis respectu corporis Lunae, nec late spargebat lumen in oculis meis, uti solent lucida, nec latitudo aestimari potuit. Erat et inordinatum cornu ad lineam diacentron, inordinatus et rubor circa cornu. Hoc ut probetur, sumatur altitudo Lunae tunc observata, cum hoc cornu obverteretur partibus, quae sunt ore Pegasi in illo situ paulo superiores, scilicet magis in consequentia, inter os et caput. In prolegomenis caput pro ore sumtum perperam: caput nempe non erat remotius, sed os. Cum igitur Luna fuerit in 4° ♄, motu proprio iens a dextra ad sinistram, at vero os Pegasi in $26\frac{3}{4}^{\circ}$ ♄, caput in $1\frac{1}{2}^{\circ}$ ♄ et umbrae plaga transponeretur a sinistra ad dextram: jam igitur umbra vergebat in antecedentia, quippe versus 27° ♄, proinde conveniebat, ut Luna jam ultra centrum umbrae in consequentia esset. Quippe in circulo azimuthali 5° antea vergebat umbra versus duas in palma ♄, quae stabant e regione loci Lunae in 4° ♄, quasi tunc fuisset medium eclipsis. Atqui Lunae altitudo observata 16° diversum arguit.

Addatur de parallaxi \odot $63' 40''$ quantum huic altitudini convenit 398900
et sit altitudo vera $17^{\circ} 0'$.

3951

402851 sc. $1^{\circ} 4'$

Est autem tunc vera longitudo $3^{\circ} 52'$ ♄, lat. $0. 32'$ anstr.

ergo A.R. $335^{\circ} 47'$

48. 44

A.R. M. C. 24. 31

A.R. \odot 155. 48

228. 43. Hora erat 15. 15, in Proleg. 15. 17.

Declinatio vera $10^{\circ} 44'$ fere. VP 41. 44

40697

PS 100. 44

1765

VS 59. 0

42462

73.

14. — 7. 0 . . 210480

132. — 66. 0 . . 9042

219522

177060

VPS 48. 44 — 24. 22 — 88530

Ecce tempus emergit, quod $17'$ antecedit medium eclipsis. At si plaga hujus cornu verum indicium faceret, debuisset ipsa vera oppositio, seu medium eclipsis jam totidem minutis et amplius transiisse. Quare lucidum hoc cornu ab ora Lunae meridionalissima recesserat in ortum. Non derogat igitur calculis, non observationi Romanae per telescopium, observatio mea et ceterorum falsi hujus cornu. Eius vero exemplo, quo in Proleg. Eph. me insuper muniveram, sc. eclipsis anni 1598. hoc in opere rursum cessi, admissio vero cornu in illa residua, in locum tamen ejus dimissi succedit aliud ex anno 1605, quae eclipsis numero XXVIII.

Age vero, ne quid in diligentia nostra desideretur, ventilemus etiam ab inclinatione initiali petitum testimonium, quaesito angulo inter eclipticam et verticalem.

Erat enim in superioribus VPS 29. 6 — 72086

VP 41. 44 — 40697

112783

Et VS 73. 0

4460

106323

Ergo VSP angulus $19^{\circ} 47'$. Sed in illo puncto eclipticae, quod vere obtinebat Luna, sc. in $2^{\circ} 53'$ ♄, angulus eclipticae et circuli declinationis est $68^{\circ} 49'$, residuum ergo inter eclipticam et verticalem est $49^{\circ} 2'$. Pone primo umbram in ipsissimo fuisse vertice.

Summa semidd. $1^{\circ} 5' 54''$ — 395400

395400

40. 58

42217 49. 2

28092

437617

423492

Latus long. $43' 17''$. Latus latit. $49' 46''$

Ille prodiret latitudo valde magna, differentia longitudinis vicissim parva. Sunt enim scrupula durationis dimidia, ex observata duratione dimidia et horario circiter 58'. Bene igitur habet, quod umbra parum admodum dicitur declinasse ad sinistram. Scilicet ipsa duratio calculi consentit cum observata, quare etiam latitudinem calculi ratam esse necesse est, qua stante anguli constituentur in hunc modum:

$$57' 41'' - 408800$$

$$1. 5. 54 - 395400$$

$$13400 \text{ Ang. } 61^\circ$$

Ergo diacentros ad orbitam \bigcirc inclinabatur angulo 29° , ad eclipticam $34^\circ 18'$, ad verticalem igitur angulo $14^\circ 44'$; hoc illud „parum“ est, quo umbra declinavit a vertice ad sinistram. Nihil igitur inclinatio observata repugnat latitudini calculi; nihil defectus quantitati hactenus defensae, quin potius hanc confirmat duratio observata, aut si augenda est ista, ut propius ad meam durationem observatam adducatur, multo profundius Luna in umbram mergetur, nodusque sequens δ in antecedentia revocabitur, ut jam ante dictum. ¹⁶⁾

XXXVII. Eclipsis Lunae anno 1617. 6/16. Augusti.

Finem notavit Frid. Rittelius Stuccardiae altitudine Aquilae, sed quae laxum facit indicium temporis, cum stella meridiano propinquet. Et perperam puto scripsisse alt. poli pro alt. Aquilae. Dimittatur igitur hac vice.

Romae finem observatum esse h. 9. 48' Jo. Remus Quietanus ad me perscripsit: tempus emersus h. 1. 1'. Lincii observavimus illam utcunque. Descriptio exstat observationis in Eph. anni 1617. mense Augusto, examen in vestibulo illius Ephemeridis.

Quantitas refractionis infida, coelo pluvio, aura penitus aquea. Cum Luna eo die oriatur Lincii h. 7. 3' ortu puro, factum est, postquam quatuor distincta horologia nonnullis intervallis invicem insequentia sonuissent h. 7., jam imminente uno quadrante in arcis horologio, factum, inquam, est, ut Luna quasi sub longo tabulato nubium e vaporibus aqueis exorta conspiceretur, habens altitudinem supremi marginis $1^\circ 36'$. Deficiebat plus dodrante. Tenebat azimuth instrumenti $24^\circ 32'$ statimque altius subvecta post illud velum densissimum sese condidit atrarum nubium.

Postquam sonuisset h. 8. 45', incepit ex nubibus emergere, jam initio emersionis ex umbra facto. Cum tardissimum horologium sonuisset h. 9., censebantur lucere 3 digiti. Altitudo \bigcirc erat $18^\circ 15'$, \bigcirc $18^\circ 50'$. Cum sonaret insuper quadrantem in uno, nondum dimidia lucida, cum in altero jam semicircumferentia lucida erat. H. 9. 30' arcis dodrans lucebat, alt. \bigcirc 20° , in azimutho $52^\circ 50'$. H. 9. 45' quasi digitus in umbra restabat, alt. \bigcirc $22^\circ 40'$, azimuth 56° . Paulo post visa est integra Alt. $23^\circ +$, azimutho $57^\circ +$.

Hic ex observationibus tempora initii et finis eliciuntur. Nam quia proditur altitudo Lunae supremi marginis $1^\circ 36'$, centri igitur $1^\circ 20'$; et quia in hac altitudine parallaxis horizontalis $1^\circ 3'$ valet tota, refraction vero ex Tychoe $23'$, adhuc igitur superat parallaxis per $40'$, ut sit vera altitudo centri $2^\circ 0'$. Cum autem Luna tunc $40'$ ante \odot fuerit, et \odot in $23^\circ 42'$ Ω (erat enim summa semid. $65'$, pene recta secundum eclipticam extensa, de qua decedunt $25'$, plus sc. quam dodrans diametri \bigcirc , qui delitescibat in umbra), relinquitur locus \bigcirc $23^\circ 2'$ cum lat. $0^\circ 11'$ sept. ex calculo. Non potest autem in hac altitudine locus designatus elevari 2° , nisi oriatur $28^\circ 30'$, cujus angulus $19^\circ 56'$. Habet autem hic locus amplitudinem ortivam $18^\circ 15'$, et Luna igitur in hac altitudine per alios $5^\circ 5'$ recesserat ab hoc puncto in meridiem, ut esset ejus azimuth ab ortu numeratum $23^\circ 20'$, quod in instrumento numerabatur $24^\circ 32'$. Omnibus igitur azimuthis sunt adimendi $1^\circ 12'$. Oriente vero $28^\circ 30'$, Sole in $23^\circ 42'$ Ω , hora est 7. 14' a meridie: tardius igitur justo sonuerunt horologia.

Hinc jam incidentiae momentum eliciemus sat fido calculo. Restabant enim de Luna minus quam $8' 6''$, cum horarius \bigcirc a \odot sit $35'$.

53900 Minus igitur quam $14'$ post, h. e. ante h. 7. 28' tota incidit. Esto hoc 200300 h. 7. 26'. Atqui paulo post h. 8. 45' urbis, i. e. ut in seq. corrigetur, paulo post 146400 h. 8. 55' jam initium animadversum emersionis. Ergo mora circiter h. 1. 29' et medium h. 8. 20'.

Rursum, si ponamus dodrantem exacte fuisse in umbra, quo tempore horologium tardissimum sonuit h. 7. vel paulo post: visus vere est dodrans in umbra, etiam cum idem sonaret h. 9. Ergo hujus horologii h. 8. aut paulo post medium eclipsis incidit: tardius vero, si corrigatur, nam ex sequentibus adjicienda sunt 10' indicio horologii. Fuit igitur medium iterum paulo post 8. 10'. Tertio: tres isti digiti emergerant per 14', principium igitur emersionis h. 8. 56' correctae, medium ergo h. 8. 11' ut prius fere.

In fine eclipsis, cum notatum sit azimuth $\searrow 57^\circ$, ablata correctione initio stabilita $1^\circ 12'$, restat justum azimuth $55^\circ 48'$. Et quia \searrow jam erat in $24^\circ 53'$ cum lat. $0^\circ 23'$ sept., si nullam commutationem esset passa, abfuisset per hoc azimuthum a meridiano $32^\circ 11'$ in aequatore, habens veram altitudinem $22^\circ 31'$. Per parallaxin igitur habuit altitudinem in hoc azimutho minorem, circiter $21^\circ 30'$, non vero $23^\circ 0'$. Fieri potest, ut connixerit hic hypotenusa mea; ad quod proclivis est, claudendo sc. seu complicando instrumento. Situs ipse instrumenti super fenestra minus impeditus erat ad azimutha, quam ad altitudines capiendas. Si igitur Luna per $32^\circ 11'$ abest a meridiano, Sol aberat per $31^\circ 8'$ fuitque h. 9. 55', vel secundum altitudinem \searrow majorem paulo plus: esto h. 9. 58'. Cui consentiunt etiam altitudines et azimutha antecedentia: postulancia omnia, ut circiter 10' addantur horologiis. Ita emersio est unius circiter horae, quantum et Romani ille observavit. Confirmatur autem hinc differentia meridd. Romae et Lincii 10' circiter.

Calculus Tychonis, cui aeq. temp. 9' 21" add.

\odot 23. 43. 55 \searrow	\searrow 23. 39. 10 \approx	4. 18. 38. 26.	0. 8. 11. 50.	Lat. $16^\circ 38''$
Post 9'.	Horarius 34.	7		
	Semid. umbrae 46.	6		
	" \searrow	17. 42	— 01. 180	
	Summa 63. 48	— 17. 220		
	Diff. 28. 24	— 03. 420		
	Sc. dur. dim. 61. 35	— 16. 040		
	Sc. mor. dim. 23. 0	02. 240	95900	
	Residua 27. 28	78140	
	Duratio dimidia h. 1. 48. 18		21690	
	Mora dimidia " 0. 40. 27		39450	
	Emersio " 1. 7. 51			

Cum igitur medium Uraniburgi statuatur h. 8. 18' aequali, at h. 8. 9' apparenti, id erit Lincii h. 8. 19', itaque hic calculus Tychonis insequitur observationem 9' vel 8'; & etiam emersio 7' prolixior observata.

Calculo meo sic, ex ultima restitutione, quae nonnihil differt ab eo, quod in Ephem. secutus sum.

\odot Jun. h. ,	\searrow				
1617. 27. 9. 8 — 6. 1. 14 \odot	1616. 13. 22. 47. 46 — 5. 9. 15. 10 — 11. 2. 41. 49				
Aug. 16. 8. 9	47. 44. 32	Jul. 217. 8. 9.			
49. 23. 1	3	D. 5. 231. 6. 56. 46			
\odot 23. 45. 49 \searrow	Rev. VIII. 220. 10. 28. 39 — 0. 24. 33. 34 — 0. 11. 40. 23				
	2. 25	10. 20. 28. 7 — 4. 19. 29. 55	10. 21. 1. 26		
\odot 23. 43. 24 \searrow	35. 12	16. 30	34. 31		
\searrow venit ad metam obscuracionis	53300	\searrow 23. 35. 9 \approx	Corr. 25. 0		
maximae post 13'	75800	23. 42. 37	\searrow 20. 51. 55 \approx		
Parall. \searrow 63. 3	129100	7. 28	\odot 23. 43. 24		
" \odot 1. 0	Horar. 37. 22		2. 51. 29		
" 64. 3	2. 25		Reduct. 0. 47		
Semid. \odot 15. 5	34. 57		Requisit. 23. 42. 37		
" umbrae 48. 58	63. 9		Lat. $16^\circ 7''$		
" \searrow 16. 12	Residuum 28. 12		Simpl. 15. 3		
Diff. 82. 46 — 04. 540	75500				
Summa 63. 40 — 17. 970	54040	Dim. dar. h. 1. 48. 55			
Lat. $16^\circ 7'$ — 01. 100	21460				
Sc. morae 28. 30 — 03. 440	74440	Dim. morae h. 0. 48. 55			
Sc. durationis 63. 9	16. 870	20400	Emersio h. 1. 0. 0		

In tempore medio vix 4' Tyconicum sequor, 13' observationem. Sed aequatio temporis physica est 19' 21" add., hic subtr. Igitur h. 8. 3' apparenti Uraniburgi, seu h. 8. 13' Lincii fit obscuratio maxima; ita proxime observatum venio. Etiam emersionem tueor ut est observata.

XXXVIII. Eclipsis Lunae anno 1619. 16/26. Junii.

Frid. Rittelius Stuccardiae principium observavit, cum in arce et curia oppidana simul sonarent horologia h. 11. 45', altitudine centri \searrow 18° 30', qua nihil juvatur, utcumque bona sit, quia Luna vicinissima meridiano.

Maestlinus certi nihil observare potuit ob nubila, nisi quod durationem putat fuisse circiter h. 1. 45'. Erant et Lincii densae nubes, interdum patentes. Hora 12. 30' urbis, cum per raras nubeculas pelluceret, nihil deperdidisse putabatur; quoties vero discessu nubis in sudo conspecta est, visa est quasi rasa superius, ac vix agnoscebatur deflexio defectus ad sinistram, quasi versus Lyram (puto autem legendum versus Aquilam, quia Lyra ex fenestra humili conspici non potuit vertici imminens jamque ultra meridianum ad dextram progressa). — Post quadrantem horae rursum enixa e nubibus, praecise sursum vertebat particulam deficientem. Erat quidem defectus satis latus fere semidiametrum Lunae a margine et cornu quasi occidentali in orientalem; at defectus quantitas nisi infidissime aestimari non potuit. Finem nubes et hiems interceperunt. Discedunt horologia ab invicem Stuccardiana et Lincianum, nam differentia meridd. non est 45', sed tantum 21'. Probabiliter utrique potest adhiberi correctio, additis Stuccardiano 8, ablatis Linciano totidem, ut initium merum sit h. 12. 14' Lincii. Et quia umbra in principio h. 12. 22', sic correcte fuit ad sinistram, quando verticalis per Lunam cum ecliptica proxime rectum formabat angulum; quanto igitur minus agnoscebatur deflexio ad sinistram, tanto minor et defectus fieri potuit. Et quia \odot in 4° 45' \searrow et Aquila in 20° \searrow , umbra ad illam vergens parum adhuc erat in consequentia. Rursum quia post horae quadrantem (h. 12. 33' correcte) defectus stetit in summo, ne tunc quidem medium esse potuit, quia diacentros juncta verticali secabat eclipticam oblique, orbitam Lunae obliquius, annuens infra eclipticam versus occasum, sed parum. Esto enim ex abundanti hora plane 12. 45' sine correctione, fiet Asc. obliq. horoscopi 16° 25', orietur 3° 10' \searrow , distabit Nonag. a vertice 71° 46', a Luna 27° 50'

$$\begin{array}{r} 12295 \\ 116191 - 5151 \\ \hline 128486 \end{array}$$

1167 Angulus sit 81° 16', cum orbita 76°.

Cum hoc angulo deprehenduntur restare ad medium eclipsis sc. 14' 24", quae con-
ficiuntur 32', a principio observationis 47', siquidem tantus omnino angulus fuisset et tempus
tam serum, et umbra exactissime in vertice. Duplicatum igitur esset h. 1. 34' et quia
paulo ante jam defecerat, fere igitur conficeremus 7 quadrantes Maestlini.

Calculus Tyconis, cui aeq. temp. 1' 41" add.

	\odot 4. 44. 35 \searrow	\searrow 4. 46. 7 \searrow	0. 14. 4. 22;	11. 21. 33. 54
H. 12. 35' aeq. est vera \odot		Horarius 27' 16"		1. 17. 1
12. 33. 20 appar.	Semid. umbrae 43. 3			11. 20. 16. 53
12. 43. 20 Lincii	" 16. 1			5. 8
Initium 11. 35. 20 "	Summa 59. 4	— 14. 770		1. 27
11. 14. Stuccardiae.	50. 19	— 10. 710		51. 46
	Sc. defect. 8. 45	Digiti 3. 18'	Lat. 50. 19	
	Sc. dim. dur. 30. 58	— 04. 060		
	Dim. dur. h. 1. 8'; 3. 42.	Haec duratio ad minimum semiasae horae est justo longior.		

Calculo meo, ut is 11. Apr. 1620 correctus, post scriptam jam Ephemerida.

\odot Jun. h.				
1619. 17. 21. 37 —	6. 3. 20	\searrow 1618. 27. 12. 44. 39 —	7. 29. 4. 16 —	9. 24. 45. 34
Jun. 16. 12. 36	57. 3	Maj. 166. 12. 38.		
1. 9.	21. 22	D. 15. 194. 1. 22. 39		
	\odot 4. 44. 55 \searrow			

	194.	1. 22. 39	7. 29. 4 16	— 9. 24. 45. 34
	Rev. VII.	192. 21. 10. 4	— 0. 21. 29. 22	— 0. 10. 12. 50
Aequatio temp. physica	1' 30"	add. hic subtr.	1. 4. 12. 35	14. 7. 25
Ergo h. 12. 48' Lincii, initium h. 12. 4 1/2.			30. 19	6. 18
Parall. ☾	58. 29			4
" ☉	0. 59			25.
	59. 28		☾ 4. 47. 25	☉ 14. 54. 0
Semid. ☉	15.		4. 47. 39	☉ 4. 44. 55
" umbrae	44. 28			10. 9. 0
" ☾	15. 0			Red. 2. 44
Summa	59. 28	— 14. 960		Requis. 47. 39
Lat. 56. 0	— 13. 270			Lat. 56. 0
Sc. def.	3. 28	77800		Simpl. 52. 49
Digiti	1. 24			
Sc. dim. dur.	19. 57	01. 690	110000	
			32200	

Dimidia duratio h. 0. 43' 28". Haec duratio convenit proxime cum observatione et cum quantitate perexigua ante medium observata.

Lubet autem explorare, quanta fuerit illa, ex eo, quod pars obumbrata pene semidiametri longitudinem habuit. Fuit Lunae semidiameter 15', fuerit ergo sectio ista 14'; dimidium 7' est semissium arcuum utriusque communis sinus. Ergo sinus complementi in Luna erit 13' 10", in umbra 43' 56". Distantia ergo centrorum 57' 6", quae differt a summa semidd. per 2' 22", quod est minus uno digito. Fuit autem procul dubio minus aliquid, quia longitudo cornu obscurati non visa esset tanta, nisi lucida sese dilatarent in oculis. Et quia abhinc ad medium eclipsis restat minus quam 14' 24", hinc habetur quantitas defectus in medio 4' 14", sesquidigitus seu 1. 42'. Haec quantitas certo major est ea, quam observatio patitur, quod ex assumtis patet.

Satis etiam apparet, calculos praevenire observationem, magis Tychonicum.

XXXIX. Eclipsis Lunae anno 1619. 10/20. Decemb.

Haec eclipsis quo diligentius observata est, hoc plus exhibuit mihi negotiū. Liber justus fieret, si quaecunque de ea disputavi variis chartis fasciculo colligerem. Causa perplexitatis fuit, quod fixarum loca repugnare vidi observationi, cujus rei exempla plura nondum acquisiveram.

Maestlinus Tubingae per altitudines fixarum ad ortum et occasum consensu exquisito principium notavit h. 13. 55'; finem 16. 59'. Medium igitur h. 3. 27'; duratio h. 3. 4'. Valde exiguum portionem ait remansisse in medio defectus, quae vix unius digiti quadrantem aequaverit, hocque et per telescopia et simplici visu et sibi et filio suo sic visum, consensu inter ipsos mero. (Comp. Hansch. p. 49.)

Jo. Scheineri Soc. J. observationem Oeniponti habitam, ubi A. P. 47° 17'. ad me perscripsit Jo. Remus Quietanus Serenissimi Arch. Leopoldi medicus, principium indubitatum in alt. Arcturi 14° 50', unde computo h. 13. 59'. Finis alt. Arcturi 44° 20', unde horam 16. 55' 30" computo. Esset igitur differentia meridd. Tubingae et Oeniponti 4', cum tabulae statuant 12', eandem quam Monachii fere. Duratio quidem fit h. 2. 57' 30", quam parvitatem magnae altitudini finali Arcturi tribuendam puto. Nam aliter, defluxu arenae, durationem mensus est h. 2. 59'. Digitos censuit 11 cum semisse defecisse. (Comp. Hansch. p. 536.)

Mihi Lincii principium in distantia oculi Tauri a vertice 58", cum horologium domus provincialis sonaret h. 2. post mediam noctem. Sed haec altitudo fixae ostendit h. 14. 15' vel potius h. 14. 18', si alios quadrantes respiciam, quibus ejusdem fixae altitudines notavi. Erat etiam in alio instrumento altitudo 31° 30' et sic minor. Hinc differentia meridd. Tubingae et Lincii 23'. Statim ut instrumento telescopo Lunam inspexi, vidi marginem aliquantulae latitudinis, cum multo quidem adhuc lumine, sed tamen evidenter distinctum a lumine Lunae reliquae. Censebam hunc marginem esse praecise ad sinistram. Stabat Luna super stellis

pedis Geminorum duas claras vicinas invicem, nondum tamen angulus ad priorem stellam rectus erat.

Postea versus quadrantem primum provincialis (correcte versus 'h. 14. 33') cum deficeret quarta pars, angulus hic rectus erat, et plus aberat stella a margine sibi proximo, quam est una diameter Lunae. Nihil accuratius potuit notari, nequibant enim eodem intuitu simul aspici et Luna et stellae ob claritatem Lunae, sed quoties stellae erant respiciendae, tegenda fuit Luna tigillo fenestrae.

Inter h. 14. 48' et h. 15. 3' notatum, quod centrum Lunae jam satis evidenter visum fuerit ultra perpendicularem in lineam stellarum ex stella priore, et quod umbra jam deorsum vergeret et quod dimidium in umbra fuerit. Distantia stellae a proximo margine paulo major diametro Lunae.

Circiter h. 15. 6' correctam, cum bes in umbra censeretur, jam occidentalis margo in dictam perpendicularem incidebat. Linea per apices cornuum nondum erat parallela pedis stellarum lineae: ac ne quidem h. 15. 19'. Quartam restare putabam, quintam Gringalletus adjutor meus. Rubebat Luna in umbra clarissime.

Paulo post circa h. 15. 33', cum parallelae fierent lineae, quod hoc medium eclipsis imminens argueret, consideravi latitudinem residui cornu, quae tertiam partem occupabat ejus, quod ego telescopio meo comprehendo; comprehendo autem nihil ultra 13' seu duas quintas Lunae. Erant ergo 4' 30" circiter.

Nudis oculis inter quintam et quartam partem circumferentiae censui in lumine, Gringalletus ad sextam attenuabat. Latitudo lucidae ad latitudinem obumbratae partis, ut 1 ad 8 circiter; nihil enim accurati dici potuit, etsi pars obscurata in conspectu erat.

Hora 16. 18' correcta linea per cornuum extrema tendebat in secundam ex 2 pedis, ejus vero perpendicularis per centrum tendebat simul in primam, sic ut hae duae rectum formarent. subtensum a recta inter stellas. Confirmabatur haec observatio per aliam, quod ductae ex stellis in centrum Lunae viderentur formare obtusiusculum. Nondum autem distabat Luna aequaliter ab utraque stellarum, discrimine tamen perexiguo. Erat in lumine paulo plus quam quarta diametri.

Inter h. 16. 18' et 16. 33' diacentros in verticalem incidit et distantia Lunae a stellis utrinque aequata fuit.

Hora 16. 48' Luna paulo admodum plus una sua diametro a stella secunda aberat margine proximo; in umbra restare videbatur mihi quidem quarta diametri, Gringalleto plus quam tertia. Altitudo oculi Tauri 9° 20', quae dat horam praescriptam. Hora 17. 18' finis eclipsis. Altitudo rubicundae in Orione 10°.

Inter h. 17. 33' et 17. 48' margo Lunae a secunda dictarum aberat spatio tanto, quasi quod telescopio videtur, puta 14'. Distabat stella versus sinistram deorsum, altior tamen imo Lunae margine, qui h. 18. 3' jam factus erat altior stella. Hora 18. 18' „quantum judicari potuit“ (inquit observatio) quae ex stella versus eclipticae polum tetendit in Lunae centrum.

Igitur ab h. 14. 18' vel 17' in h. 17. 18' duratio a me est animadversa h. 3. 0' vel 3. 1'; medium h. 15. 48' et secundum hoc medium differ. meridd. Tubingae et Lincii 21'.

Sequitur Calc. Tych, cui aeq. temp. 0' 20" add.

☉ 29. 1. 11	☽ 28. 58. 40	II. 5. 18. 33. 23	— 5. 25. 52. 43
Post 6'		Horar. 35' 22"	5. 10
H. 15. 45'		Semid umbrae 45. 59	4. 24 (+ 9")
Sequitur calculus observatum		Lunae 17. 58	36. 19 35. 56 — 51200
tempus 6'.		Summa 63. 57 — 17. 300	Lat. 31. 46 diam. ☽
In duratione et quantitate		Lat. 31. 46 — 04. 270	52900
excedit observationem. Ergo		Sc. defect. 32. 11	16. 6 — 131550
latitudo major fuit.		Sc. dur. dim. 55. 30 — 13. 030	Digit 10. 45' — 80350
		Residuum 20. 8	109200
			56300

Calculo meo sic.

☉	1619. 17. 21. 37 — 6. 3. 20 ☉	☽	1618. 27. 12. 44. 39 — 7. 29. 4. 16 — 9. 24. 45. 34
	Dec. 10. 15. 38		Nov.
	175. 18. 1 — 22. 12. 44		d. 9. 343. 15. 38.
	30. 39		371. 4. 22. 39
	15. 20	Rev. XIII.	358. 5. 1. 34 — 1. 9. 54. 33 — 0. 18. 59. 8
	3		12. 23. 21. 5 — 5. 19. 45. 39 — 9. 5. 47. 26
	☉ 29. 2. 6 ✕		35. 55
Parall. ☽	63. 37		12. 37
" ☉	1. 1		104586
	64. 38		51314
Semid. ☉	15. 33		155900
" umbrae	49. 5	Horarius ☽	38. 30
"	16. 21	" ☉	2. 33
Summa	65. 26 — 18. 120	" a ☉	35. 57 — 51230
Arcus lat.	35. 52 — 06. 440	Residuum	18. 47 — 116130
Sc. defectus	29. 34	Dim. duratio h.	1. 31' 21" — 64900
Sc. dur. dim.	54. 44 — 12. 680	Tota "	3. 3.

Majusculam aequationem subtraho versus perigaeum insuperque reduco ad orbitam Lunae; sequor igitur Tychnicum tempus 5', observationem 11' tempore medio. Sed aequatio physica 1' 17" add., hic iterum subtrahit, ut restent 10'.

In duratione et quantitate consentit calculus meus cum observatione; superant enim 2' 47", quae sunt digitus unus, cum ego plus uno digito, ceteri minus superesse censuissent.

Quantum ad fixas, cum omnes phases notatae consentiant inter sese pulcherrime, ante omnia loca duarum stellarum ex ipsis nudis observationibus computavi denuo. Distantiae sumtae erant ab oculo Tauri et corde Ω et ab inferiore capite Π quibus stellis si relinquo loca sua, uti sunt iis assignata ad completum 1600: stellae istae, dictae planta et calx pedis, cadunt uno minuto antea, et latitudo differt uno minuto plus, quam in catalogo. Ad completum igitur 1619. loca sic habent.

Calcis	29° 59' Π	Lat. 52' 30"	} australis.
Plantae	28. 8 Π	Lat. 58. 30	
Differ.	1° 51'	6'	

seu 111' Mediam 55' 30" semissis de 111'.

Ex hoc apparet, si semicirculus scribatur super lineam stellas connectente, posito quod stellae sint ejusdem latitudinis, hunc ab ecliptica tactum in loco praecise medio. At quia latitudine differunt per 6', quare linea per stellas versus consequentia inclinatur ad eclipticam et semicircellus iste secabitur ab ecliptica, et linea ex stella perpendicularis isti stellarum lineae, ubi usque ad eclipticam ascenderit, inclinabitur a circulo latitudinis dimidio hujus differentiae, scil. 3'.

Cum igitur fuerit annotatum, versus h. 14. 33' centrum Lunae in hac perpendiculari fuisse visibiliter, deficiente parte quarta: dabitur locus Lunae visibilis gemino modo, ac proinde et locus stellarum.

Nam primum distabat hoc momentum a medio eclipsis h. 1. 15', cui intervallo respondent sc. motus Lunae veri 45' 8". Et cum Luna in ipso medio eclipsis h. 15. 48' fuerit in 29° 3' 47" Π ratione orbitae, stans e regione loci ecliptici 29° 5' 28" Π , ablatis igitur 48' 8" restat verus locus Lunae eclipticus 28° 17' 20" Π , cum latitudinis arcu computato 37' 15" sept. Rursum posita hac latitudine et summa semidiametrorum 65' 26", si hinc auferatur quarta pars Lunae diametri 8' 10", relinquitur distantia centrorum 57' 16" — 13.870

37. 15 — 05.860

43. 32 — 08.010.

Vel sic: Lat. 37. 15 — 05.860

Diff. long. 48. 8 — 09.800

Dist. loc. 60. 51 — 15.660

Summa semid. 65. 26

Scr. defect. 4. 35.

Hinc elicitur differentia longitudinis $43' 32''$, ex aestimatione defectus lubrica (et non liquida, non nempe est additum, diametri an circumferentiae quarta defecerit), quae ex temporis intervallo constituta fuit $48'$ fere. Retineamus igitur verum Lunae locum satis comprobatum utraque via. Oportet jam hunc redigere in locum visum.

A.R. M. C. $127^{\circ} 12'$. Nonag. $27^{\circ} 12' \odot$

) $28. 17 \text{ II}$

Dist. a Nonag. $28. 55 - 72660$

Angulus or. $61. 47 - 12651 - 74907$

Parallaxis) $63. 37 \ 399000 - 399000$

$484311 - 473907$

Parall. long. $0. 27. 12$ Lat. $30' 5''$

$28. 17. 20$ $37. 15$

Visa long. in ecliptica $27. 50. 8$ Visa lat. $7. 10$ sept.

Quia igitur centrum Lunae est in septentrione, stella paulo plus $3'$ secuta est hunc locum, ut fuerit in $27^{\circ} 53' 8'' \text{ II}$, quae collocatur in $28^{\circ} 8' \text{ II}$, per $15'$ ultra quam observamus, posito loco Solis vero, ut is ex Tychoe computatur. At secundum aestimatam quantitatem eclipsis ad summum $5'$ fieret fixa promotior, adhuc $10'$ differens a loco ex Progymnasmatibus accepto. Quo posito, oportet phasis tempus $8'$ serius justo esse annotatum.

Convenit autem simul etiam hoc, quod summa latitudinum stellae et visae) efficit $65' 30''$, unde ablata semidiameter) relinquit $49'$ circiter, quae sunt sesquiplum diametri), quod est observationi consentaneum. Distabat enim margo proximus plus quam diametro) dilatatae in oculo ob claritatem.

Consulatur aliud momentum: h. $16. 18'$ distantia nondum penitus par fuit ab utraque stella. Est dimidia stellarum distantia $55' 30''$. Fuit etiam tunc sectio linearum per cornu imaginatarum (quae rectum angulum format), fuit, inquam, in ecliptica, quia singulae lineae in singulas stellas tendebant, et vere angulus rectus stat in semicirculo suae hypotenusae, et hunc semicirculum, ut supra dictum, proxime tangit ecliptica in medio. Si cornu visum in ecliptica, centrum igitur Lunae visum est nonnihil in austro; angulus igitur, qui formatur lineis, quae stellas et centrum connectunt, obtusus erit, et sic sane fuit annotatum. Si centrum Lunae visum fuit in austro, quare etiam cum aequaliter a stellis abfuit, paulo quid minus tribus minutis distat locus ejus visus a loco ecliptico, stellarum intermedio, propter inclinationem lineae stellarum ad eclipticam.

Computetur vera Lunae distantia a centro umbrae vel ex intervallo temporis a medio eclipsis, vel ex annotata quantitate defectus, et redigatur locus verus in visum adhibitis parallaxibus.

Cum igitur h. $15. 48'$ locus Lunae eclipticus fuerit $29^{\circ} 5' 28'' \text{ II}$, unde ad nostrum momentum fluxerunt $30'$, quibus promovetur Luna per $19' 15''$, ergo locus Lunae verus erit $29^{\circ} 24' 43'' \text{ II}$. Latitudo ex meo calculo $34' 2''$. Hunc locum conferam cum annotata quantitate $19. 15 - 01.580$

$34. 2 - 04.900$

Prodit enim ex dicta long. et lat. centrorum distantia $39. 8 - 06.480$

At summa semidd. $65. 26$

Scrup. defectus $26' 18''$. At observatio prodidit paulo minus quam $24' 31\frac{1}{2}''$, quia diameter est $32' 42''$, scilicet lucida nimium sese dilatant in oculo.

A.R. \odot $268. 58$. A.R. M. C. $153. 28$. Nonag. $16. 24 \odot$

. . Distantia a Nonag. $47. 4 - 31177$

Angulus Or. $55. 33 - 19283 - 56976$

Parall.) $399000 - 399000$

$449460 - 455976$

Longit. $38' 24''$ Lat. $36. 0$

$29. 24. 43 \text{ II}$ $34. 2$

Visa long. ecl. $28. 46. 19 \text{ II}$ Visa lat. $2. 2 \text{ lat.}$

Diff. long. stellarum dimidia $55. 30$

$27. 50. 49$

Pro inclinatione lineae ad eclipt. $3.$

Prodit locus stellae $27^{\circ} 53' 49'' \text{ II}$.

Ergo si aequaliter abfuisset Luna ab utraque stella, tunc locus prioris stellae emergeret $27^{\circ} 54' \text{ II}$, sed quia Luna illi adhuc propior, fuit igitur prior stella paulo ultra $27^{\circ} 54' \text{ II}$, sed ponitur in $28^{\circ} 8' \text{ II}$, differimus ut prius per $14'$ paulo minus, nam intra pauca minuta additur, jam aequalem fuisse distantiam.

Consulatur denique etiam h. 18. 18', tunc enim Luna et posterior stellarum ad visum jungebantur secundum longitudinem. Intervallum a medio h. 2. 30', horarius in tanta distantia ab articulo oppositionis paulo minor quam $38' 30''$. Intervallum igitur respondeant $1^{\circ} 35' 45''$, quae adde ad locum Lunae eclipticum in medio, conficitur locus D $0^{\circ} 11' 13'' \text{ E}$, latit. $27' 34''$.

Asc. R. \odot 269. 4. A.R. M. C. 183. 34.

Nonag. 8. 40 mp

D 0. 36 E

Dist. 68. 4 — 7513

Ang. or. 45. 30 — 33797 — 35538

399000 — 399000

440310 — 434538

0. 42. 5 — 44. 33

0. 41. 13 — 27. 34

Visus locus D in ecliptica $29. 59. 8 \text{ II}$ $16. 59.$ Visa lat. austr.

At calcis II locus in $29^{\circ} 59' 0'' \text{ II}$ a Tychone reponitur.

Quod hic intervallum locorum nullum est, id difficultati tribuendum observandi in tanta claritate Lunae, ubi stella non aliter nisi telescopio et sola videri potuit, ubi nec eclipticae polus in conspectu. Et quid si linea non in centrum Lunae tetendit, sed simpliciter in Lunam?

Colligere aliquid ad hujus rei discretionem etiam ex h. 18. 3' poterimus. Tunc enim stella jam erat humilior imo Lunae margine; distabat autem margo paulo plus quam instrumento capio, centrum igitur Lunae circiter $30'$ aberat a stella. Et quia idem altius erat stella plus quam semidiametro Lunae, plus igitur quam $16' 26''$. Quodsi haec altitudinum differentia fuisset $22'$, jam tunc igitur angulus inter verticalem et lineam ex stella in centrum fuisset semissis recti; jam igitur assecuta fuisset Luna stellam; angulus enim hic in hac altitudine siderum est semissis recti.

Ecce. A.R. M. C. 176. 4. Nonag. $2^{\circ} 52' \text{ mp}$. D 0. 32. 6 E , lat. $28' 30'$

Ang. or. 48. 15

Dist. a Nonag. 62. 20 — 76754 — 12142 — 12142

Nonag. a vertice 41. 45 — 29295 — 40664 — 40664 — 29295

Alt. D 69. 45 — 106049 — 6385 — 399000 — 399000

Inter verticalem et eclipticam 45. 13 — 34279 — 451806 — 428295

Intervallum h. 2. 15

Pro long. 37. 30 Pro lat. 47. 28

Horarius 38. 30 Vera long. 0. 32. 6 E Vera lat. 28. 30

1. 17. 0

Visa 29. 54. 36 II Visa 19. 0

9. 38

Locus D ecl. in medio 29. 5. 28

D 0. 32. 6 E

Latit. stellae $52' 30''$ austr.

Prodit dist. centri D , conjuncta secundum long. 33. 30 — 58280 — 58280

$44^{\circ} 47' 0''$ — 35036 — 34281

23. 37'' — 93316 — 92561 — 23. 40''.

Igitur si alt. Lunaris centri visa superasset altitudinem stellae per $23' 46''$, conjunctio fuisset secundum longitudinem. At superatio agnita est major quam $16' 21''$, imo major quam ampliata semid. D in oculo meo; itaque aut non multo alia quam $23' 37''$ aut forte major. Sed visa long. D fuit $29^{\circ} 54' \frac{1}{2}$, igitur etiam stellae tanta fuisset, eratque vere; vel certe minor.

Tribus igitur momentis conficimus, fixas fuisse minimum $5'$, duobus vero certioribus momentis plane 15 vel $14'$ anteriores per calculatum locum centri umbrae ex Tychone. Atque hoc est illud mirabile, quod me tam diu torsit, quodque conquire non potui, priusquam omnes eclipses examinarem. Nam ex observationibus

annorum 1588. 1598. 1599. 1603. patuit, fixas promovendas respectu Solis loci. At postquam examinavi eclipsin anni 1601, in eodem signo II, vidi, tunc vel loco suo fuisse fixas, vel idem accidisse, quod in hac. Vide et eclips. 1620.

Locatione hac fixarum salvatur etiam pulchrum illud et plane geometricum spectaculum, quod h. 16. 18' linea per apices cornuum ducta veniebat in stellam posteriorem, linea huic perpendicularis ex centro in priorem. Nam etsi, quod Maestlinus me per literas monuit, nihil certi sequitur ex hoc angulo linearum recto, cum is in omnibus punctis semicircumferentiae in stellas terminatae stare possit: at simul hoc incidit, ut distantia Lunae a stellis esset quam proxime aequalis; quo simul considerato sequitur jam ultro certus puncti abscessus, in quo puncto secabant sese lineae, quod erat altius centro Lunae; nimirum erat ille quam proxime tantus, quantum dimidium stellarum intervallum sc. 55' 30". Et hic abscessus puncti a linea stellarum, extensus versus eclipticam, pertingit exiguo spatio in septentrionem, quia tanta est latitudo loci inter stellas intermedii, ecliptica vero semicircellum secant versus anteriorem. Recte itaque prodit ex calculo meo latitudo centri visa australis. Optarim tamen paulo majorem illam, quasi minor latitudo Lunae septentrionalis, major defectus, et nodus \cup sequens reductior in antecedentia requireretur.

XL. Eclipsis Lunae anno 1620. 4/14. Junii.

Haec eclipsis Tubingae a Maestlino est observata (ut ab ejus filio ad Landgravium Hassiae Philippum perscriptum fuit) coelo valde nubilo nec oculis astronomicis. Initium ex altit. Arcturi $43^{\circ} 20'$ colligitur h. 11. 36'. Tota immersa alt. Arcturi 32° i. e. h. 12. 45'. Finis morae h. 14. 16', ex alt. Arcturi 17° . Mora igitur fuisset h. 1. 31' et medium h. 13. 30 $\frac{1}{2}$ '. Incidentia h. 1. 9'. Et per analogiam finis eclipsis h. 15. 25'. Duratio h. 3. 49'. Stuccardiae Rittellius principium idem, ejusdem Arcturi alt., 43° , Lunae $16^{\circ} 50'$. Tota immersa in altit. Arct. $30^{\circ} 30'$. Principio emersionis, altit. Aquilae 48° , cum in arce sonuisset h. 2. 15', cum h. 2. 0' Arcturi altitudo fuisset 19° . Quae consentiunt cum observatione Tubing., ubi meridianus proxime idem. Nam si h. 2. Arcturi altitudo fuit 19° Stuccardiae, post 16' omnino erit ejus altitudo 17° Tubingae. Mirum autem, si fortuito fieri potuit, ut utrinque eundem errorem errarent.

Puzbachii contendunt Landgraviani, visum initium h. 11. 18'; immersionem h. 12. 28', ubi tempus quidem incidentiae idem, at in horologio videtur error fuisse, nam locum hunc nihil ultra 3' occidentaliorem esse Tubinga tabulae sinunt.

Sulzae ad Rubeacum in confinibus Alsaciae et Lotharingiae Jo. Remus Quietanus principium notavit h. 11. 23'. Ingressus totalis non animadvertens circa h. 11. 30' propter lucem secundariam, quae duravit usque ad h. 12. 48'. Hora 12. 43' visa est stellula ad 4' vel 5' perpendiculariter infra Lunam. Inde h. 13. 54' per nubes et crassissimum aërem Lunae corpus iterum apparuit. Hinc differ. meridd. Tubingae et Rubeaci vel Sulzae esset 13', at tabulae nihil ultra 8' admittunt. (Comp. Hansch. p. 537.)

Exstat et mea observatio Lincii habita sermone vernaculo conscripta et edita Ulmae. Principium ex altit. Arcturi simplici quidem perspicillo h. 11. 51', at telescopio h. 11. 53' ad sinistram paulo supra medium. Corporis pars obumbrata videri non potuit Superfuerunt autem h. 12. 38' circiter 7', dimidium sc. ejus, quod telescopio meo capio. Hora 13. 0' vix tenue vestigium de lumine Lunae apparuit, quasi stella primae magnitudinis, cum tamen appareret ramus uterque viae lacteae. Hora 13. 6' adhuc quasi fixa obscura in loco, ubi se Luna condiderat, erat propemodum in una recta cum una in humero Sagittarii et una in Sagitta, nonnihil tamen australior. Crediderim, fixam illam fuisse, quam sub Luna vidit Remus, nisi et hoc lucis vestigium paulo post disparuisset. Hic igitur fuisset Luna totaliter immersa, essetque tempus incidentiae h. 1. 9', idem quod ceteris. Luna penitus disparuerat coelo puro, stellis Sagittarii et via lactea apparentibus.

Hora 14. 8' coepit dilucescere. Vidi tamen stellam in capite Ophiuchi usque

ad h. 14. 23'. Tunc h. 14. 32' rursum apparuit tantum lucis, quantum h. 13. 0' idque paulo supra sinistram medium Lunae marginem. Itaque medium esset h. 13. 46', et mora dimidia h. 1. 32', ut et Maestlino fere. Sursum ad sinistram vergebat haec lucula. H. 14. 52' rursum 7' lucebant, ut h. 12. 38'. Per has duas phases medium referretur in h. 13. 45' fere ut prius. Itaque, si quantum est ab h. 11. 51' in h. 12. 38', sc. 47' addideris ad h. 14. 52', finis emerget h. 15. 39'. Sane h. 15. 32' in altit. 3° 20' deerat quinta vel sexta pars diametri, quantum in aurora potuit aestimari, cum Luna post montem abiit. Ita duratio fit h. 3. 48' vel h. 3. 51'.

Considerato igitur initio Lincensi et collato cum ceteris, inveniretur differ. meridd. Tubingae et Lincii tantum 15', Rubeaci et Lincii 28', et tabulae hanc quidem fere admittunt, illam vero 6' augent, ut etiam eclipses ceterae. Concludimus igitur, non repugnantibus ne ipsis quidem observatoribus, Tubingensem observationem post principia factam circiter 6', tunc enim conciliatur cum Rubeaquensi, cum Lincensi et cum tabulis.

Calculo Tychonis, cui aeq. temp. 2' 7" subtr.

☉ 24. 4. 46 II, ☽ 24. 4. 33 x ^r — 10. 23. 56. 32 — 11. 28. 20. 33	5. 12
Medium calculus Tychonis assequitur praecise, duratione	1. 43
et mora excedit observatum.	4
Horarius 27' 45" 77110	10. 25
Semid. ☽ 16. 12	8. 38 Lat.
Semid. umbr. 43. 18 00. 330	
Summa 59. 30 — 14. 980	
Diff. 27. 6 — 03. 110	
Ser. d. dur. 58. 50 — 14. 650	
" mor. 25. 35 — 02. 780 — 85240	
Resid. 3. 20 289037	
Mora dim. 55. 18 8130	
Dur. dim. 2. 7. 12 211927	

Calculo meo sic.

☉ Jan. h. , ☽ 1620. 17. 3. 51 — 6. 4. 23 1619. 6. 18. 24. 30 — 9. 12. 2. 57 — 9. 4. 19. 53	
4. 13. 34 11. 24. 52 Maj. 3. 155. 13. 34.	
12. 14. 17 33. 59 162. 7. 58. 30	
57. 6 ☉ 24. 5. 32 II Rev. VI. 165. 7. 51. 29 — 0. 18. 25. 11 — 0. 8. 45. 17	
4940 2. 23. 52. 59 — 10. 0. 28. 8 — 8. 25. 34. 36	
51900 Fictus diurnus 30. 47 1. 5. 58. 23 9. 32	
56840 66740 27. 12 Corr. 25. 0	
Parall. ☽ 58. 52 12450 ☽ 24. 1. 33 x ^r ☽ 26. 9. 8 x ^r	
" ☉ 59 78190 Requis. 6. 6 ☉ 24. 5. 32	
Semid. ☉ 15. 4. 33 2. 3. 36	
" umbrae 44. 51 Post 10' sequitur ☉ vera, Reductio 34	
" ☽ 15. 8 obscuratio maxima. Req. 24. 6. 6	
Summa 59. 59 — 15. 220 Horarius ☽ 30. 42 Lat. 11' 23"	
Diff. 29. 43 — 03. 735 " ☉ 2. 23 Simpl. 10. 44	
Arcus lat. 11. 23 — 00. 556 ☽ a ☉ 28. 19 Dim. duratio h. 2. 5	
58. 52 — 14. 664 " mora " 0. 58	
27. 23 — 03. 179 Incidentia , 1. 7	

In Sole abundo uno scrupulo, ad metam etiam obscuracionis maximae addo semissem, quibus conficiuntur temporis minuta 3, reliqua 7 sunt ex eo, quod parvam aequationem versus apogaeum addo. Ita Tycho tenet observationem ipsissimam, ego illam insequor post minuta paucula. Nam aequatio temporis physica est mihi 4' 55" subtr. hic add., ita tardius indico medium post 7'.

Sed duratio in utroque calculo magisque in Tychonico est manifeste major justa et observata; incidentia paulo minor, quibus rebus argui videtur latitudo major. Sit enim dimidia duratio h. 1. 51 — 16250

Horarius " 28. 19 — 75100
24. 4 — 81350

Erunt scr. durat. dimidia	53' —	—	11.890	
Summa semidd.	60. —	—	15.230	
Ergo arcus lat.	28. 5	—	03.340	Dist. a n. 1° 24'. Nodus ♀ in
Differentia	29. 43	—	03.735	28° 5' 23" 2.
Scr. morae dimidia	9. 35	—	00.395	
Mora dimidia	— 20			
	1. 51			
Incidentia	1. 31			

Hic incidentia feret nimia. Non potest enim ultra h. 1. 17' ad summum extendi. Praetereaque promotio nodi prodigiosa fieret. Quibus angustiis eo magis adigimur, ut dicamus, umbram Terrae hac vice fuisse parvam praeter solitum. Ac nescio an quid ad rem faciat, quod annotavi, coelum in ortu ferruginei coloris, Lunam rubicundam praesertim occidentem, quodque Luna usque adeo defuit, ut penitus amitteretur. An densior aliqua materia, pellucida tamen, totam Terram amiciebat, quae refractos Solis radios clarissimos ex partibus marginum Terrae adversis in oppositos umbrae margines mitteret, ut in schemate Opticorum fol. 304 $\alpha\epsilon\eta Q\omega\phi\phi$ et $\nu\lambda\gamma\iota Q\psi\chi\tau$ ex parte una, sic $\xi\delta\zeta P\omega\psi\sigma$ et $\mu\kappa\beta\theta P\phi\chi\nu$ ex parte vel plaga altera? ut sic rubor Lunae in densa aura non distinctus fuerit, et Luna B in regione quidem umbrae consistens, extra tamen umbram in lumine censeretur.

Addant etiam inclinationes suum testimonium: nam et principium obscurationis et principium repletionis utrumque vergebat a medio Lunae margine sursum paululum. Atqui in principio ecliptica a meridiano versus Lunam a sinistris appropinquantem tendebat insensibili aliquo deorsum: si ergo margo Lunae superior medio sensibilibiter delibavit umbram, Luna australis fuit sensibilibiter ab ecliptica. In principio vicissim repletionis ecliptica a centro umbrae, quod jam multum transierat ad dextram, tendebat versus sinistram sursum, sensibilibiter valde. Quodsi etiam linea per centra tendit sursum ab eodem centro umbrae sensibilibiter: Luna igitur eclipticae fuit vicina valde, sive in boream transgressa, sive in austro restans. Quantitates non sunt determinatae; supersedeo igitur computatione angularum. Sufficit, inclinationes latitudini (quod non ita magna fuerit, ut duratio per legitimam umbrae diametrum postulare videbatur) testimonium praebere eminus.

Fixam, quam vidit Remus sub Luna, minimarum unam esse puto, quae solo telescopio videntur; nihil igitur conducit ad examinanda loca fixarum.

XLI. Eclipsis Lunae anno 1620. 29. Nov.
9. Dec.

Hanc eclipsin observavi Stuccardiae adjutus a Frid. Rittelio et aliis mathematicis studiosis, exstatque cum superiori impressa.

Luna orta in parte coeli nubila. Ut primum emersit e nube, defecerant digiti 8. Alt. 4 24° 20', hora igitur 4. 54'. Altitudine 4 26° 30' perierant 10 digiti, alt. 4 27° 40' nondum tota erat immersa, sc. h. 5. 15'. At cum esset oculi Tauri altitudo 13° 25', sc. h. 5. 16', jam tota erat in umbra, lucidior tamen ad occasum. Tunc Luna erat alta 11° circiter. Appropinquabat lineae cornuum γ , cui phasi diligenter intenti fuimus.

H. 5. 36' adhuc erat lucidior pars ad occasum, et lumine oculum γ vicinum. H. 6. 30' jam lucidior erat ad sinistram, etiam versus, cum tamen Luna in australi parte umbrae incederet. In altitudine 4 28° 24', h. 10° circiter centrum erat in linea cornuum exacte, hora ex Jove 6. 30', ex Saturno 6. 35' circiter. In altit. 4 42° 30' jam coeperat emergere, mira facie, margo luminosus versus δ et pedem II, rubor versus caput Eriichthonii. In medio angulus ater, meram lucem a rubore discriminans, specie vomeris. Hora indicatur 6. 51. Paulo post alt. oculi γ 30° dedit horam 6. 57'.

Cum oculus γ attolleretur 39°, sc. h. 7. 54' tota emerserat, superius tamen atra macula restabat, et splendor ille superfluus circa Lunam adhuc frangebatur in meis oculis. Melius non pronuntiavit liberam, usus telescopio, usque dum

oculus ☾ attollebatur $39^{\circ} 45'$, id erat h. 7. 59'. Cum igitur h. 5. 16' tota mersa sit, h. 6. 56' coeperit emergere, tempus morae fuit h. 1. 40' et obscuratio summa h. 6. 6', tempus emersionis h. 6. 58'; si tanta et immersio statuatur, principium cadet h. 4. 18' paulo post ortum Lunae, Sol enim pure occidit h. 4. 6'. Ita duratio conficeretur h. 3. 36', sed ex Rittellii indicio h. 3. 46' et tempus incidentiae h. 1. 3'.

Calculus Tychonis, cui aeq. temp. 4' 10'' subt.

☉ 18. 10. 33	☾ 18. 6. 2 II.	— 3. 28. 10. 9 — 6. 1. 46. 37
Horarius ☾ 32. 45	60544
Semid. ☾ 17. 25		5. 12
" umbr. 44. 45		3. 53
		9
Summa semidd. 62. 10	— 16. 400	5. 13
	00. 370 (9' 15'')	Lat. 9. 15
Ser. dur. dim. 61. 33	— 16. 030	
Diff. semidd. 27. 20	— 03. 170	
Ser. morae dim. 25. 40	— 02. 800 — 84915	
Residuum 28. 48	73400
Dim. mora h. 0. 47. 3		24371
Dim. duratio h. 1. 52. 46		12856
Tempus incid. h. 1. 5. 43		

Sequitur vera ☾ observatum 8', duratio sic satis bene convenit cum observatione. Sed mora fit brevior observata, quia diameter umbrae apud Tychonem non est geometrica, sed contractior.

Calculo meo sic.

☉ Jun. h. 1620. 17. 3. 51 — 6. 4. 23	☾ 1619. 6. 18. 24. 30 — 9. 12. 2. 57 — 9. 4. 19. 53
Nov. 29. 6. 13 — 12. 0. 11	Oct. 28. d. 333. 6. 13
165. 2. 22	6. 8
☉ 18. 10. 42	Rev. XII. 330. 15. 43. 0 — 1. 6. 50. 21 — 0. 17. 30. 35
Parall. ☾ 62. 15	9. 8. 54. 30 — 10. 18. 53. 18 — 8. 16. 49. 18
" ☉ 1. 1	34. 25
63. 16	9614
Semid. ☉ 15. 32	55580
" umbr. 47. 44	65194
" ☾ 16. 0	
Summa 63. 44	— 17. 190
Diff. 31. 44	— 04. 270
Latit. 7. 56	— 00. 280
Ser. dur. dim. 63. 14	— 16. 910
Ser. morae dim. 30. 43	— 03. 990 — 66900
Horar. ☾ 36. 7	
" ☉ 2. 33	
☾ a ☉ 33. 34 58100
Resid. 29. 40 70432
Duratio dimid. h. 1. 54. 56	— 8800
Mora dimid. h. 0. 53. 2	12332
Tempus incid. h. 1. 1. 54	

☾ 18. 1. 32 II. ☉ 16. 44. 31
Req. 18. 10. 16 ☉ 18. 10. 40
diff. 8. 44 1. 26. 9
Reduct. 24

Requisitus 18. 10. 16
Lat. 7' 56'', simpl. 7' 29''.

Post 15' obscuratio maxima colligitur. Ita sequor calculum Tychonis 7' in tempore medio, quia versus perigaeum magnam aequationem subtraho. Mora fit longiuscula h. 3. 50' pro h. 3. 36' vel 46', ut et duratio h. 1. 2' pro 0. 58': sed tempus incidentiae sat bene habet. Tolerabilia omnia.

Aequatio temporis physica hic mihi est nulla, quare computo medium Stuccardiae h. 6. 17' apparenti, per 11' serius observato, per 4' serius Tychone.

Ad exploranda loca fixarum ad horam 6. 30' initio constituatur locus Lunae verus. Cum enim h. 6. 6' fuerit in $18^{\circ} 10' 16''$ II secundum orbitam, in ecliptica vero in $18^{\circ} 9' 52''$ II, inde vero ad nostrum momentum sint 24', quae de horario Lunae a fixa 36' 7'' assumunt 14' 26''. Verus igitur locus Lunae fuit $18^{\circ} 24' 18''$ II, latitudinis arcus $9^{\circ} 18''$ merid. :

Quaerantur jam parallaxes: A. R. ☉ 257. 10
Horae 6. 30. 97. 30
354. 40

	354. 40	
Asc. obl. horosc.	84. 40 —	434
Alt. aequat.	41. 12 —	41750 — 28447
		42184 — 28117
	85. 21	330
	23. 31. 30	
	108. 52. 30	
	71. 7. 30	5527
		35690 — 33644
	110. 34 —	6494
Nonag.	20. 34 γ	
	18. 24 Π	
Dist. Nonag.	57. 50 —	16664
		401400 — 401400
	18° 23' 53"	453754 — 435044
Parall. long.	36' 47"	Parall. lat. 44' 25"
Visus locus \supset	19° 0' 40" Π	Vera lat. 9. 18
		Visa lat. 53. 43 merid.

Differunt autem cornua \supset in long. 132' 30", latit. 454, et \supset in lat. differt a cornu austr. 80' 17".

13' 15" — 151035	— 132. 30 — 202100	Ergo differentia longitudinis Lunae et
8. 2 — 201400	80. 17 — 252300	cornu australis est 23. 30. Quae addita ad
352435	454400	visum locum Lunae constituit locum cornu
45. 24 — 27900	454 — 78966	australis 19° 24' Π . At Tycho collocat in
2. 21 — 324535	23. 30 — 375434	19° 29' Π . Fixae igitur hac vice sunt per
		5' loco anteriori. Idem vero et in eclipsi-
		bus annorum 1601. 1619, quae ibidem visae sunt in signo Π , apparuit.

XLII. Eclipsis Lunae anno 1621. 18/28. Nov.

Observata est a me Lincii. Hora 14. 0' horologii provincialis jam animadversa obscuritas in summo, cum tamen hora demum 14. 30' ejus inciperet, quasi ad sinistram de summo margine. Erat alt. Lunae 48° 20', adde 40' parallaxin altitudinis, vera igitur altit. 49° 0'. Et erat hora una ante oppositionem, ergo Luna in 6° 34' Π , lat. 0. 48' circiter austr. Ergo declinatio centri 20° 32' circ., A.R. 64°. Hinc hora correctae 14. 33'. Hora 3. 15' aequiparabam sectionis umbrosae longitudinem quasi basi isopleuri in disco Lunae, et forte major erat. Cum autem sola recta trianguli aequilateri quartam diametri, i. e. tres digitos interciperat, curva igitur sectio umbrae interius penetrans hoc momento plus quam 3 digitos absumserat.

Finis observatus est post usuaalem h. 14. 30' in alt. 29° 30'; adde parallaxin altit. 52' et reliqua ut in principio corrige, proveniet h. 16. 34'. Duratio h. 2. 1' et medium h. 15. 33' 30", Uraniburgi hoc fuit 15. 23. 30".

Calculus Tychonis, cui aeq. temp. 7' 20" subtr.

\odot 7. 6. 12 \times , \supset 7. 4. 48 Π .	2. 7. 40. 0 — 6. 9. 31. 19
	5. 8
	2. 37
Semid. umbrae cor. 43. 5	3
" \supset 16. 38	46. 38
Summa 59. 43	49. 18 lat.
Horarius 29. 14 — 71900	15. 100
33. 45	10. 290
Residua 4. 31 — 258700	defectus 10. 25 — 2444
186800	04. 810
	590
	1854
	Sc. dur. dim. 33. 45. Digni 3. 46.
	Dimidia duratio h. 1. 9' 15". Nimia

Calculo meo sic.

1621. 17. 10. 5 — 6. 5. 26	1620. 14. 13. 22. 56 — 10. 21. 57. 30 — 8. 15. 21. 45
Nov. 18. 15. 16	Oct. d. 17. 321. 15. 16
154. 5. 11	336. 4. 38. 56
61. 2	Rev. XII. 330. 15. 43. 0 — 1. 6. 50. 21 — 0. 17. 30. 35
Parall. ☉ 60. 2	5. 12. 55. 56 — 11. 28. 47. 51 — 7. 27. 51. 10
" ☉ 1. 1	31. 56 — 2. 7. 48. 13
61. 3	63070
Semid. ☉ 15. 30	7020
" umbr. 45. 33	70090
" ☉ 15. 26	Req. 7. 4. 3
60. 59 — 15. 730	1. 48
Arc. lat. 50. 13 — 10. 670	9. 7. 49
Sc. dur. d. 34. 36 — 05. 060	Reduct. 2. 19
Horarius 29. 48	Requis. 7. 4. 3
4. 48	Arcus lat. 50. 13.
	Dimidia duratio h. 1. 9' 40".

Quia parvam aequationem subtraho, ideo praevenit calculus meus Tychonicum ratione temporis medii, tanto magis, quia demo quid metae obscuracionis maximae. Sed physica temporis aequatio 1' subt., hic addita, dat Uraniburgi obscuracionem h. 15. 13', Lincii h. 15. 23', 10' ante observatum, 15' ante Tychonicam oppositionem. In utroque vero calculo et quantitas et duratio nimiae arguunt hac vice latit. majorem, quare nodum ☿ remotionem in antecedentia.

XLIII. Eclipsis Lunae anno 1623. 4/14. Aprilis, post sequentem mediam noctem.

Steti accinctus in jugo montis, vespera enim pollicebatur serenitatem. Verum a media nocte nubes coortae principium obtexerunt. Circa medium vidi cornua sursum versa; nihil potuit aestimari ob raptos intuitus brevissimos. Erat quasi hora una ante Lunae occasum. Finis rursum fuit immersus aëri nubiloso et aquoso, ut nihil de Luna cerneretur. Visa est tamen per nubes praevertisse expectationem cum suo initio.

Calculus Tychonis (vacuum spatium in manuscripto).

Calculo meo sic.

1623. 17. 22. 24. 35 — 6. 7. 10	1622. 0. 14. 1. 13 — 1. 14. 50. 44 — 7. 5. 57. 57
April. 4. 17. 15	Mart. 3. 93. 17. 15
74. 5. 9. 35	94. 7. 16. 13
153600	Rev. III. 82. 15. 55. 45 — 0. 9. 12. 36 — 0. 4. 22. 39
2560	Red. 1. 40
156160	Req. 24. 57. 29
Locus ☉ 24. 57. 31	11. 15. 20. 28
Parall. ☉ 1. 0	35. 37
" ☉ 63. 18	11. 49
Semid. ☉ 15. 6	17
Semid. umbrae 49. 12	☉ 24. 57. 31
" ☉ 16. 16	☉ 1. 23. 21
Summa semidd. 65. 28 — Antil. 18. 130	☉ 24. 55. 49
Diff. 32. 56	6. 27. 32
Latitudo 35. 45 — Antil. 5. 410	Horar. ☉ verus 37. 52
Scr. def. 29. 43 — 70320	" ☉ 2. 26
Diameter 32. 32 — 61208	Lat. 35' 45" merid.
Digiti 10. 57 — 9112	Simpl. 33' 43"
Supersunt 1. 3 in austro.	35. 26 — 52670
	Dim. duratio h. 1. 32. 51
	Medium h. 17. 15
	Finis h. 18. 47. 51 Uranib.
	Diff. meridd. 10
	Aeq. temporis mea 20
	Adde ad medium.
	Finis h. 19. 17. 51 Lincii appaerent.

Si praecisa esset observatio, quod hora una ante ortum Solis cornua essent versa sursum, Sol quidem oritur h. 17. 16'. Cornua vero sursum vertuntur ante medium in quadrante occidentali, medium igitur fuisset post horam 16. 16' paulo. Atqui computo medium h. 17. 45' Lincii. Ergo haec observatio anticiparet calculum meum. Sed nihil certi colligi potuit ex illa solitudine, ademptis stellis et horologiis.

XLIV. Eclipsis Lunae anno 1624. $\frac{24. \text{Mart.}}{3. \text{April.}}$

Pluviae densissimae coelum contexerunt Lincii. Pluviae etiam Stuccardiae erant. Sed tamen ruptis vento nubibus emicuit eo loco Luna orta laborans in umbra colore fusco, subrufo, kesselbraunroth, ut scribit Frid. Rittelius, nequaquam adeo nigra ut alias. Cum inciperet emergere, erat altit. Arcturi 20° , post 2' circiter sonuit septimam in urbis horologio, male, inquit, directo. Cum lucentes 3 digiti, Arcturi altitudo $22^\circ 45'$ circiter. Cum dimidia lucret, alt. Arcturi $24^\circ 18'$ circiter. Finem furtim rapuit detectis ad momentum nubibus. Post 2' circiter sonuit 8. Sed altitudines dant haec momenta $7. 32\frac{1}{2}$; $7. 49\frac{1}{2}$; 8. 0. Finis ergo h. 8. $32\frac{1}{2}$. Pro emersione dimidia habemus $7\frac{1}{2}$, sat bene, et media aliquid arguitur nimia.

Calculus Tychonis (vacuum spatium in manuscripto).

Calculo meo sic.

☉ Jun. h.	☾	
1624. 17. 4. 38. 33 — 6. 8. 12	1623. 7. 8. 59. 40 — 2. 24. 45. 17 — 6. 17. 24. 50 cor.	
Mart. 24. 6. 57	80. 45. 15	83. 6. 57
84. 21. 41. 33	53. 10	90. 15. 56. 40
2000	☉ 14. 29. 47	Rev. III. 82. 15. 55. 45 — 0. 9. 12. 36 — 0. 4. 22. 39
10100	☾ 12. 36. 46	8. 0. 0. 55 — 3. 10. 30. 43 — 6. 13. 2. 11
12100	1. 53. 1.	30 25. 25
	Reduct. 32. Simpl. 9' 52"	6. 14. 29. 6 ☉ 12. 36. 46
	Requisitus 14. 29. 15	14. 29. 15 requisitus.
Parall. ☉ 1. 0	Horar. ☾ verus 34. 43	
" ☾ 61. 27	" ☉ 2. 27	
62. 27	☾ a ☉ 32. 16 — 62030	
Semid. ☉ 15. 30		
" umb. 46. 57	Aequatio temporis mea 18' add. ad medium.	
" ☾ 15. 48	Diff. meridd. 10 adde.	
diff. 31. 9	Ant. 04. 400 Ergo med. h. 7. 25 Lincii apparenter.	
Summa 62. 45	15. 645 Emersio h. 8. 19	
Lat. 10. 24	00. 460 Finis h. 9. 20	
Ser. morae dim. 29. 20 — 03. 640	71562	
Ser. dur. dim. 61. 52 — 16. 185	9532 h. 0. 54. 33 mor. dim.	
32. 16	70670	
29. 30	8640 h. 1. 55. 2 dim. dur.	

Quit haec eclipsis Stuccardiae desinere secundum meum calculum paulo ante h. 9. In additione temporis plus addidi quam Tychon 18 $\frac{1}{2}$. Quodsi bene observavit Rittelius, maturior fuit utroque calculo.

XLV. Eclipsis Lunae anno 1624. 16/26. Sept.

Etsi aer initio visus est aliquando crassior, ab ortu tamen Lunae usque ad finem eclipsis fuit eximia serenitas, sic ut potuerint observari omnes phases. Luna etiam visa est tota propter intensum ruborem partis obscuratae, sic ut margo versus finem videretur, cum non plus 3 digitis in umbra delitesceret. Itaque non erat difficile distinguere inter meram lucem et secundariam, et haec valde fortis fuit. Si vero aer paulo fuisset crassior, procul dubio distingui non potuisset. Initium in altitudine $\angle 10^\circ$. Postquam igitur Luna vero $2^\circ 45' 45''$ γ,

lat. $0^{\circ} 58'$ austr., sequitur circiter hoc tempus locus visus $3^{\circ} 11' \gamma$, lat. $0. 56'$ austr. Ergo declinatio $0^{\circ} 25'$ sept., et A. R. $3^{\circ} 18'$. Hinc Lincii h. 7. $6\frac{1}{2}'$, quae mediocriter confirmabatur etiam per intervallum ex horologio, et altitudine Lunae $3\frac{1}{2}^{\circ}$. Sed et post $30'$ observata est altitudo cornu sinistri Arietis 15° , quae dat h. 7. $37'$ bono consensu. Tum plus quam dimidium diametri erat in umbra. Eadem stella cum elevaretur $20\frac{1}{4}^{\circ}$, indicavit h. 7. $58'$. Post $4'$ sc. h. 8. $2'$ tota incidit, erat tamen, ut dici coeptum, adhuc clarissima toto margine occidentali satis lato, nec multo obscurior reliquo tempore.

Orta postea fuit infima quinquanguli in Heniocho, quae pingitur sub retinaculo, ortus et oculus Tauri super montes, ergo post h. 8. $48'$. Inde abierunt $9'$, sc. versus nonam, cum potior limbi claritudo fuit infra ad sinistram, summa obscuritas inter summum et dextrum. Id erat argumentum summae obscuritatis, sed jam oportebat transire medium, si umbra circumcirca fuisset aequaliter diluta.

Ortum deinde fuit supra montes cornu Tauri posterius, sc. post h. 9. $24'$. Et hinc elapsis aliis $16'$ coepit emergere; post $3'$ fuit altit. $\supset 34\frac{1}{2}^{\circ}$, arguens h. 9. $50'$. Emersio igitur coepit h. 9. $47'$ ad sinistram paulo inferius. Post quadrantem erat liberata semissis circumferentiae; post $3'$ circiter semissis diametri; post alia $19'$ dodrans circiter. Post quadrantem nondum plane finis erat, sed statim est secutus. Et post $2'$ fuit altit. Lunae $39\frac{1}{4}^{\circ}$, qua signatur h. 10. $46'$. Igitur finis erat h. 10. $44'$. Desiit ad dextram paulo admodum superius, ut vix agnosceres. Ita colligitur duratio h. 3. $38'$; mora in umbra h. 1. $45'$.

Calcul. Tych. — — caret.

Calculo meo sic.

1624. 17. 23	6. 8. 12	1623. 7. 8. 59. 40	2. 24. 45. 17	6. 17. 24. 50 cor.
Sept. 16	87. 37. 56	Biss. Aug. 244.		
	9. 36	15. 8. 32		
1600	3. 55. 44	266. 17. 31. 40		
1520	3. 17. 23	R. X. 275. 13. 5. 49	1. 0. 41. 57	0. 14. 35. 29
183320	0. 38. 21	Lat. 3. 32	8. 19. 34. 9	3. 25. 27. 14
	Reductio 10	aust.	34. 3	3. 21. 12. 19
	Requis. 3. 55. 34	γ . Simpl. 3' 20"	17. 5	19. 21
Parall. \odot 1. 0			2. 16	3. 58. 34
" \supset 61. 56	Verus hor. \supset 35. 32			
" \supset 62. 56	" \odot 2. 28			
Semid. \odot 15. 33	" a \odot 33. 4	Aeq. T. phys. 12. 4	Add. Ed ap.	
" umb. 47. 23		Diff. merid. 10. 0	hic subtr.	
" \supset 15. 55		Initium 6. 35. 14		
Summa 63. 18	16. 952	63. 12	Scr. dur. dim.	Ined. 7. 33. 8
Diff. 31. 28	04. 210	31. 18	" por. d. 65070	Medium 8. 29. 56
Lat. 3. 32	00. 055	36. 4	65580	Emersio 9. 28. 44
	14. 897	36. 8	Residua 68820	Finis 10. 24. 58
	04. 155		Mora dimidia 5490	h. 0. 56. 48
			Duratio 9240	h. 1. 54. 42

In medio deficit calculus per $1\frac{1}{2}'$, in mora excedit per $9\frac{1}{2}'$, in duratione excedit per $1\frac{1}{2}'$.

Consideratio morae et durationis. Regrediamur ergo in calculo quae pro investigatione nodi correcti. Et sit duratio ut observavi h. 3. $38'$, dimidia h. 1. $49'$.

59580	— 33. 4
29253	— 49.
79833	— 27. 0
Erunt scr. dim. dur. 60. 4	— 15. 264
Summa semidd. 63. 18	— 16. 952
Scrupula lat. 19. 56	— 01. 688
Diff. semidd. 31. 28	— 04. 210
Scr. morae dimid. 24. 24	— 00. 522
Prodiret 30390.	Mora dimidia 0. 44. 18.

Apparet, quatuor integrorum graduum retroductione nodi nos vix assequi justam durationem, stante hac diametro umbrae. Et tunc mora fieret minor observata. Ergo hic, quia luxatione nodi non possumus juvari, arguitur semidiameter umbrae nimia. Atqui eam non licet nobis mutare per alias eclipses, est etiam revincta demonstrationibus geometricis a parallaxibus et semidiamentris luminarium. Explorabimus tamen, quantum mutetur stante hac latitudine calculi.

Lat.	3' 32"	Antil.	00. 053
Ponantur scr. dur. dim.	60. 4	—	15. 267
Prodit summa semidd.	60. 10	—	15. 320
Sed est semid.	51. 55		
Ergo semid. umbrae	44. 15	cum calculus det majorem.	
Et diff. semidd.	28. 20	—	03. 397
Ergo scr. morae dim.	28. 33	—	03. 450 — 74276
Horarius	33. 4		59580
Mora dimidia	51. 49		14690
paulo minor, quam dat observatio.			

Ita conciliantur quam proxime observatio durationis cum observatione umbrae. Ergo hic valet diminutio umbrae optica, quam nullatenus admittit geometria. Adde nempe ad 44' 15" sic elicita semid. ☉ 15' 33", quae certo non est alia, confabris 59' 48", quae debebat esse summa parallaxium ☉ et ☾, cum tamen sit certo certius, parallaxin solius ☾ hic esse 62' circiter. Est igitur et hoc aequae certum, semidiameter umbrae geometricae esse majorem, quam quanta prodit ex observatione; quia nimirum umbra ob causas physicas et opticas hac vice contractior fuit.

XLVI. Eclipsis Lunae anno 1625. 13/23 Martii nocte seq.

Nubila quidem nulla, sed totus aer adeo crassus erat, ut Jupiter videri non posset, quamvis Lunae vicinus staret hora prima post mediam noctem. Cum jam a dimidio horae quadrante visa esset pallere ad sinistram infra, ut solet ante initium, etiam cum pura est aura, jam tamen discerni non potuit, essetne initium, adeo coelum erat turbidum et quasi nebulosum, sic ut paulatim enasceretur halo circa Lunam; videbatur illa veluti per aquam dilutis marginibus.

Post quadrantem ad sinistram infra pallor quidem erat, obscurum tamen, ex debilitatione an ex aliquo defectu orae rotundae. Post alium quadrantem infra parumper ad sinistram erat pallor vix agnoscendus, aspectu Lunae magis magisque confuso. Post tres quadrantes pallor ferè infra, defectus incertus, nec facile quis aliquid desiderasset, nisi de defectu prius admonitus. Post 10', quamvis nihil certi de defectu, tamen si quis diligentius lustraret, pallor erat quasi in imo. Itaque h. 1. 55' medium fuisset, quia oritur 4° ☾ ut sit ☾ in Nonagesimo. Quadrante post h. 2. adhuc nihil aliud judicari potuit, quam quod pallor sit infra. Post 2 quadrantes ultra, vix conspecta Luna, aer paulatim clarescere.

Calc. Tych. cui aeq. temp. 1' 12" subtr. ab app. hic add. (vacuum spat.).

Calculo meo sic.			
Pro. ☉.	Curr. 1625. Jun. 17 ^d 10 ^h 52' 31"	—	Apog. 6. 9. 15 ☉
	Martii 13. 13. 43		
	Dies 95. 21. 9. 31	—	81. 34. 32
	Ldg. 12600		52. 13
	1290		☉ 3. 42. 30 ☾
	13890		
Pro ☾.	Finiente 1624. 15. 4. 0. 41	—	4. 4. 38. 27 — 5. 28. 26. 20
	Com. 12. Mart. 71. 13. 43		
	simpl. 86. 17. 43. 41		
	Revol. III. 82. 15. 55. 44	—	0. 12. 34 — 0. 4. 22. 39
	4. 1. 47. 57	—	5. 21. 1. 3. 41

4. 1. 47. 57	—	4. 13. 51. 1	—	5. 24. 3. 41
Horarius fictus 31. 12	'	1. 19. 24. 11		12. 57
85370		24. 58		23. 50. 44
22400		3. 40. 10		3. 42. 30
87770		Requis. 3. 40. 1		9. 51. 46
		9"		2. 29
Lat. 54' 21", simpl. 51' 19". Requis. 3. 40. 1				
Tempus correctissimum h. 13. 42' 42".				
Summa semidd. 60' 13"	—	Antilog. 15. 340	Lincii 13° 52' 42"	aequali
Latitudo 54. 21	—	12. 500	54. 6	
Ergo scr. dur. dim. 23. 50	—	2. 840	Initium 12. 58. 36	
Horarius verus 28. 39			Finis 14. 46. 48	
log. 84270		Sc. defectus 5' 52"	—	233300
73920		Semid. 15. 14	—	1540
10350	—	54' 6"	234840	dat dig. 3. 18.
Tempus dim. dur. h. 0. 54. 6.				

Hic caderet medium per aequationem Tychonicam in h. 13. 53' 32", Copernicam in h. 13. 44' 27", meam in 14. 7' 21".

Igitur secundum observationis indicia satis dubia medium incidit h. 13. 55' circiter.

Has 46 eclipsium Lunarium descriptiones et calculos haec sequuntur in Cod. Msc. quae respiciunt eclipses N. 36, 37, 38 et 39, conscripta a d. 5. Apr. ad 6. Maji 1620, ergo ante absolutam totam illam seriem, forte etiam ante constitutam eam, qua jam exstat, formam.

5. April 1620.

Ex eclipsibus Lunae recentissimis hypothesin Lunae probare, tam longitudinis quam latitudinis.

1. Praeponitur forma hypothesis longitudinis ut in ceteris planetis. Et in ipso articulo medii eclipsis sint extinctae inaequalitates menstruae.
2. Sumatur medium eclipsis ex latitudinis rationibus, quando scilicet recta ex centro umbrae perpendicularis est in orbitam Lunae. Hinc sit regula:
3. In omni medio eclipsis temporali et quantitativo Luna propior est modo vicino quam Soli oppositum seu umbrae centrum.
4. Dato igitur momento eclipsis aequalis temporis, et assumpta eccentricitate, datur locus apogaei et aequatio et motus medius. Et vicissim
5. Dato momento eclipsis aequalis temporis et assumpta aequatione, vel apogaeum cum motu medio, datur eccentricitas.
6. Si Luna fuerit circa anomaliam mediam, minima mutatio aequationis dat maximum errorem in apogaeo.
7. Datis momentis duarum eclipsium aequalis temporis, datur motus medii differentia, datur et elongationum verarum a vero loco Solis differentia, scilicet nihil fere. Datur igitur summa vel differentia aequationis utriusque. His si addatur locus apogaei, cogitur certa quantitas eccentricitatis. Et vicissim assumpta eccentricitate, sed ea non libera penitus, cogitur apogaeum. Hic vero utendum est motu apogaei ad tempus interceptum; qui sat certo est cognitus ad hoc tempus.
8. Datis igitur tribus eclipsibus, necessaria fit tota hypothesis.
9. Aequatione temporis utitur trifariam: primum ommissa physica; secundo adhibita physica simpliciter, tertio duplicata physica.

Prima eclipsis.

Anno 1619, nocte quae secuta est 20. Dec., hora Lincii 3. 48' p. m. n. apparenti, Tubingae h. 3. 27' egregio consensu. 3. 48'

subtr. 1' 21"
h. 3. 46. 39. Aequatio astron., sed physica simplex 2. 37, duplicata 5. 14.

Locus ☉ in 29° 2' 34" II.

" ☌ in 29. 4. 16 II.

1. 42

14. 48 compl.

Superatio ☌ 16' 30"

Anom. ecc. 169

Nodus ☌ 5. 35.

Parall. ☉ 1. 2"

" ☌ 63. 37

64. 39

Semid. ☉ 15. 33

Semid. umb. 49. 6

" ☌ 16. 21

65. 27

Inter centra 36. 27 Antil. 18. 120

12. 500 dat. 54' 21"

65. 27 Horar. a ☉ 35. 57 log. 51230

35. 52 Superf. 18. 24 " 118250

29. 35. Dimidia dur. h. 1. 30' 42", 67020

tota h. 3. 1' 24". (in marg.: Haec posterius addita ex correctione 11. Apr. 1620.)

Horarius ☌ a ☉ 35' 28"

Parallaxis ☉ 1. 1

" ☌ 62. 15

Summa 63. 16

Semidiam: ☉ 15. 33

" umbr. 47. 43

" ☌ 17. 1

Summa semidd. 1° 4' 44" Forte et Maestliniana duratio est nimia, quia nos tantum 2. 59' vel 3. 00' invenimus.

Cum igitur duraverit h. 3, respondet motus 1° 46' 24", dimid. 0° 53' 12". Hinc et ex summa semidiametrorum arcus latit. Antilog. 12. 000

17. 74
Antilog. 5. 74 lat. 36; 30"

Posito angulo lat. 5° 29' venit motus

verae lat. 6° 39' 20"

☉ 29. 2. 34

Nodus observ. 5. 41. 54

Ex assumtis sat certis et ex computatis per observationes elicitur etiam quantitas defectus. Subtractis enim sc. arcus latit. 36' 50" a summa semidd. 1° 4' 44", residua 27' 54" ostendunt digitos sc. 27. 54 — log. 78570

diam. 34. 4 — log. 56710

digiti pro 19. 40. 20 — 19860

dim. 9. 50.

restabant 2. 10. Corrigantur jam et haec ex superioribus 0. 35' 10"

logarithmus 70760

56710

1. 4. 44

29. 34

14050 digiti p. 20. 51, dim. 10. 26, rest. 1. 34.

Observatio mea habet: ut 9 ad 1 sic circiter fuisse diametrum ☌ dig. 12 ad lucidam, quae fiet 1. 20. Maestlinus ait, vix unius digiti quadrantem superfuisse. Capaliatur meum eo, quod mihi semper lucida major fuit.

Praedixit et Remus minorem sc. $11\frac{1}{2}$.

Hic mora longior dat latitudinem minorem, digitos pauciores, nodum igitur anteriorem. Maestlinus habet h. 3. 4' durationem, quantam posui in Ephemeride. Haec sane nequaquam consentit cum magnitudine defectus, stante semidiametro umbrae nostra et angulo latitudinis et loco nodi. Etenim in horario non potest esse magnum vitium, eritque $1^{\circ} 48' 44''$, dim. $54' 22''$. Esto jam quantitas defectus dig. 0. 15', ut vult Maestlinus: quaeritur proportio semidd. \bigcirc et umbrae. Est autem ponenda quantitas diam. \bigcirc . Sit ea $34' 2''$ log. 56710. Quadrantis digiti duplum

30' log. 387000

443710. Ergo $\frac{1}{4}$ digitos valet $0' 42''$ et defi-

ciant

33' 20'' log. 58790.

dupl. 117580 — 18. 31 quadr. defect.

Arcus $54' 22''$ log. 9872

19744 dat quadr. 49. 15

quadratum 30. 44 log. 66900

At diametri 34. 2 log. 56710

Ergo arcus 54. 12 — 10190

Ejus dim. 27. 6 est arcus inter centra,

adde 16. 19 quod deficit ultra sem.

Responderet motus latitudinis angulo

magno $4^{\circ} 53' 50''$.

venit sem. umb. 43. 25.

Omissa igitur Maestliniana quantitate defectus, ut nimium exorbitante (forte haeret in eclipsi 1616) consideretur hoc tantum, quibus mediis paulo minor effici possit pars lucida. Valde autem parvus est eorum effectus.

1. Parallaxis \bigcirc major
2. " \bigcirc major
3. Semidiam. \bigcirc minor, et duratio fiet brevior.
4. Minor angulus latitudinis.
5. Nodus anterior.

Igitur ex correctione de 7. Apr. Parall. \bigcirc $1' 2''$

" \bigcirc 64. 45

65. 47

Semid. \bigcirc 15. 33

Umbrae 50. 14

\bigcirc 16. 43

66. 57 Antil. 18. 96

Maestlin. dur. 54. 22 Antil. 12. 51

Inter centra 39. 4 Antil. 6. 45

Scrupula 27. 53 log. 76600

Diam. \bigcirc 33. 26 log. 58510

Pto 20. 1. 13 — 18090

Dim. 10. 0. 36.

Duratio adhuc longior minuet latitudinem, ut focus nodi nostri congruat.

Meus arcus inter centra 36. 27 Antil. 5. 62

\bigcirc 16. 43 13. 34

53. 10 dur. sc. 56. 8

Umbrae 50. 14

Optime! 2. 56 Duratio fit longa.

Vide retro computationem de 11. Apr. 1620 exactiorem.

Secunda eclipsis Lunae. Anno 1619, nocte quae sequitur 26. Junii.

H. $12\frac{1}{2}$, urbis tam parum defuit in summo ad sinistram, ut id per raras nubes non agnosceretur, quasi versus Iyram. H. $12\frac{1}{2}$ urbis stabat defectus praecise supra; aestimari quantitas non potuit. Erat hic igitur paulo ante medium.

Est igitur duratio longior semihora, quae incipit ante h. $12\frac{1}{2}$, et h. $12\frac{1}{2}$ nondum medium. Itaque desiit post h. 13. 0'. Maestlinus dicit durationem

fuisse circiter septem quadrantum horae, quod nimium est. Certi nihil ait observatum ob nubila. Remus praedixit mihi durationem futuram h. 1. 1'.

Pone medium fuisse h. 12. 52', pone etiam correctum fuisse horologium; pone tertio, durationem fuisse h. 1. 45'.

Cum ergo locus \odot sit $4^{\circ} 45' 9''$, et reductio $2' 34''$, erit \odot in $4^{\circ} 47' 43''$. Et \odot post \odot , et quia parallaxis \odot $0' 58\frac{1}{2}''$, \odot $54' 5''$, summa $55' 52''$, et semid. \odot $15' 0''$, ergo semid. umbrae $40' 52''$. Sed semid. \odot $15' 3''$, summa $55' 55''$. Sit ergo dimidia duratio $52' 30''$, et horarius \odot a \odot $27' 17''$: adde logarithmos 13353

	55' 55"	Antil. 13. 20	
veniunt scrupula	23' 53"	—	2. 41.
et lat. arc.	50' 30"	—	10. 79.

Ergo hic arcus lat. $50' 30''$ dat motum latit. a \odot $9^{\circ} 9' 5''$, posito meo angulo latitudinis. Et quia latitudinis arcus esset $50' 30''$, quare hoc ablato a summa diametrorum $55' 55''$, relinquerentur scrupula deficientia $5' 25''$. Digiti plus quam duo, quod certe potuissim aestimare.

In Ephemeride perscriptum exstat, transversam latitudinem defectus pene acquasse semidiametrum \odot . Aequaverit $14'$, dimidium $7' 0''$. Antil. 0. 2073

Semid. umbrae	40. 52	—	7. 120
"	15. 3	—	0. 958
"	40. 15	—	6. 9127
"	13. 19	—	0. 7507

Esset arc. latit. 53. 34

Scrup. defic. 2. 21, Minor uno digito.

Hic est motus latitudinis $9' 43''$. Quodsi latit. $53' 34''$, Antil. 12. 15

et summa semidd. 55. 55 — 13. 2

Erat sc. incid. 16. 45 — 1. 05

Horarius 27. 17 log. 133580

78753

Dim. dur. 34. 51 — 54827

Haec certe duratio h. 1. 10' aut eo minus est verisimilior, quia meae observationi consentit tam in tempore, quam in transversa prolixitate defectus; denique in motu latitudinis est tolerabilior.

Cum autem in calculo meo prodeat minor defectus, imo vix tangatur umbra, prodest causas in numero habere, quibus defectus potest fieri major: 1. si major parallaxis \odot ; 2. si major parallaxis \odot ; 3. si major semidiameter \odot ; 4. si minor angulus latit.; 5. si nodus anteriori loco.

Igitur ex correctione 7. Apr. 1620.

Parall. \odot $57' 30''$

\odot 1. 0

Summa. 58. 30

Semid. \odot 15.

Semid. umbr. 43. 30

14. 44

58. 14 Antil. 14. 35

Mea inter centra 56. 31 — 13. 51 Duratio ultra horam h. 1. 4.

1. 43 0. 84 — 14' 10" sc. incid.

Ex correctione 11. Apr. 1620.

Parall. \odot $58' 29''$

\odot 1. 0

Summa. 59. 29

Semid. \odot 15.

umbr. 44. 29

\odot 15. 0

59. 29. Antil. 14. 970

59. 29. Antil. 14. 970	
Ister cent. 56. 31 — 13. 510	
Sc. defect. 2. 58 — 1. 460 ser. luc. 18. 35	Dim. dur. 40' 30" tota 1. 21'
horar. a ☉ 27. 33	Maestl. 1. 41' certo nimia, ut supra.

Hinc explora latitudinem defectus. Est nempe antilogarithmus tantus subtrahendus, ut residuorum arcus juncti faciant 56. 31.

Antil. 0. 300	
8. 435	
— 0. 952	
8. 135.	43' 41"
0. 652	12. 24

Ergo 0. 255 est antil. dim. sect. 7. 45 — 56. 5
sectio 15. 30;

paulo plus semidiametro ☉. Nec n. in ipso medio vidi; et potuit aestimatio fallere.

Harum 2 eclipsium magna est opportunitas, non quidem propter tempora, quae in altera desunt, sed propter locum Solis certo cognitum et quia ☉ in altera erat apogaeo vicina, in reliqua perigaeo, et quia altera septentrionale latus umbrae signabat, altera meridionale, licet superius. Itaque posito loco ☉ et angulo et diametro ☉, datur crassities umbrae et summa parallaxeos ☉ et ☉ in utraque.

1618. 27. 12^h 44' 39" — 7. 20° 4' 16" — 9. 24° 45' 34"

Majus 151

15. 12. 52	
194. 1. 36. 39	
Revol. VII 192. 21. 10. 4 — 0. 21. 29. 22 — 0. 10. 12. 50	
1. 4. 26. 35 — 8. 20. 33. 38 — 9. 14. 32. 44	
30. 19 — 0. 14. 7. 25 — 3. 43	
13. 18 — 13. 27 — 25	
9 — 4. 54. 30 ×	☉ 14. 54. 1

Ergo medium Huennae h. 12. 38' ×

Lincii 12. 48 aequali

Aeq. astr. 3. 34 sub. hic add.

h. 12. 51' 34" apparenter.

☉ 14. 54. 1
☉ 4. 45. 9
10. 8. 52
2. 34
4. 47. 1

Locus ☉ requis.

Tertia eclipsis ☉ Anno 1617. 16. Augusti.

Luna oriens habuit plus quam dodrantem in umbra, cum esset anomalia eccentrici 138° 39'. Diameter ☉ 32' 56". Hinc ablata pars quarta 8' 14" relinquit 24' 42" et eo plus in umbra. Horarius ☉ a ☉ 34' 21". Ergo conficiuntur ista in 43' 8" unius horae; quare phasis nostra primo oriente Luna plus quam 43 aberat a principio, quando scilicet habuit altit. 1½°, quo notatur hora 7. 14'. Exquiro occasum Solis consensus causa, qui cum esset in 23° 44' ☉, occidit h. 7. refracte h. 7. 6'. Sane Luna in austrum projecta per parallaxin, quae super latitudinem sept., etiamque in consequentia, ultra centrum umbrae, quamvis esset ante, et simul 1° 20' alta, quae secundum aequatorem extensa daret 5', in perpendiculo erecta dare potest 8'. (Ubi tamen haereq. Nam in altit. poli 50° circa 20° 30' ab hora 4½ in h. 5 mutatur altit. puncti eclipticae per 2° 15' circiter. Igitur 1° 20' daret sane 8 temporis vel 9, sed quantitas refractionis est incerta causa penitus aquea.)

Itaque coepit eclipsis ante h. 6. 31', puto circa 6. 25', finis fuit h. 9. 59'. Duratio h. 3. 34', dimidia h. 1. 47'. Medium h. 8. 12'. Aut quia finis concordat cum meo calculo, si etiam duratio concordet, ut initium sit h. 6. 19', erit medium h. 8. 9'.

Haec eclipsis tantum ob tempus erit utilis. Roma scribit illam Romae de-
sisse h. 9. 48'. Lincium vero est orientalius Roma per 10'. Ergo id esset Lincii h. 9. 58'. Egregie. Calculus meus dat h. 9. 59'.

Tempus emersionis definit observatum esse h. 1. 1'. Finis igitur morae fuit h. 8. 47'', Lincii h. 8. 57', calculus meus dat h. 8. 55'.

Sed repetam calculum ex emendatione 7. Apr. 1620.

Sol in $23^{\circ} 43' 45''$ ♀ (infra repeto locum ☉),

♂ in 20. 51

Mot. lat. 2. 52. 45 dat lat. 15' 56''.

Ex emendatione 11. Apr. 1620.

Parallaxis ☉	1. 0	
" ☽	63. 57	
	64. 57	
Semid. ☉	15. 8	
" umb.	49. 49	
" ☽	16. 30	
Summa 1.	6. 19	Antil. 18. 61 —
Lat. 15. 56	—	1. 074 —
Arc. d. dur. 1.	4. 23	17. 536
Diff. 33. 19		4. 696
Arc. dim. mor. 29. 26		3. 622
Horar. 34. 21		— 55774
Arc. dim. d. 1.	4. 23	
Superfluum 30. 2		— 69215
H. 1. 52. 27		— 13441
Arcus dim. mor. 29. 26		— 71233
Mora dim. 51. 25		— 15459
1. 1. 2		

1' 0''		
63. 3		
64. 3		
15. 8		
48. 55		
16. 12		
65. 7	Antil. 17. 850	65. 7
	1. 074	lat. 15. 56
62. 57	sc. d. 16. 776	sc. dur. 49. 11
27. 59	log. 76290	
	54000	
	22390	
	H. 1. 48. 3	dim. dur.
32. 43	— 4. 530 (— 1,074)	
	3. 456	
28. 35	sc. mor. 74160	
Hor. a ☉	34' 57'' 54000	
	20160	
	49. 2	dim. mor.

Hinc tempora ex observ. Romana et Lincensi finis, et morae et durationis.

Finis Lincii h.	9. 50
" morae	8. 52. 27
" Medium	8. 51. 33
Initium morae	7. 14. 31
" Lincii	6. 13. 6

prius:	Lincii ex Romano fine:
9. 59	9. 58
8. 55	8. 59
8. 9	8. 10
7. 23	7. 21
6. 9	6. 22

Emersio 0. 59, Romae 0. 60 $\frac{1}{2}$, obs. Hic omnia egregie concordant quoad durationem.

Tempus emersionis tuor, ut Romae fuit observatum, accurate. Sed prima phasis mea videtur discrepare, quia ex altitudine computavi primam phasin h. 7. 14', quando Luna nondum in tenebris tota, cum tamen hic eadem hora et minuto computetur emersa tota.

Profecto si consideretur observatio, non fuit h. 7. 14'. Nam quia Sol occidit h. 7. 3', pone illum in horizonte, erit et centrum umbrae in horizonte, et ☽ motu vero supra horizontem, quippe ante medium eclipsis. Sub eo quidem per parallaxin, vicissim elevata per refractionem, et quis scit, quam magna ea fuerit? Prae-terea non exprimitur, quanto minus superfuerit in lumine quam quadrans. Amplius, quis mihi dicet, per nubem aqueam qualis lux fuerit, Solaris an lux refracta in Luna occidentali? Cogito nempe, quid mihi acciderit a. 1598. Si vidissem diu, minus esset dubitationis. Conspectus fuit unicus.

Medium igitur dubium est inter h. 8. 33' et h. 8. 9'. Ne nimium fidamus differentiae meridd., ponatur finis secundum obs. meam ad h. 9. 59'. Ergo medium sequamur h. 8. 6' 33''. Temporis aequatio est addenda apparenti, astronomica quidem 3' 10'', mea vero composita 29' 20''. Et duplicata aequatione physica 35' 30''.

Hic repeto locum ☉ et ☽.

☉ anno 1617.	27. Junii, h. 9. 8' in	6° 1' 14'' ☉
	16. Aug. h. 8. 19' in	47. 44. 32
	d. 49.	23. 11. 23. 45. 46 ☽
		49 4. 58
		23. 43. 48 ☽

[illegible]

8. 29. 50 astronomice apparenti Lincii.
Igitur hic 20' temporis ad minimum abundant in calculo, si astronomice aequem. At si physice aequem, tempus apparens Lincii prodest 8° 13' 40". Et quia Luna deberet esse in calculo promotor, ut pauculis minutis citius incideret medium, ideo etiam retracto apogæo et minuta eccentricitatis minuitur subtractoria aequatio.

Quartæ eclipsis Lunæ. Anno 1616. 16/26. Augusti nocte sequente.

Differ. meridd. Tubingae et Lincii 22.

				Medium		Finis		Duratio
Principium	Tubingæ	h.	1. 33	—	3. 8	—	4. 43	— 3. 10
	Romæ	"	1. 43.	30	— 3. 30	—	4. 56.	24 — 3. 13
	Lincii	"	1. 50	—	3. 20	—	5. 20	— 3. 20

Præ de novo computabo hanc eclipsin ex emendatione 11. Apr. 1620.

• Sit Uraniburgi tempus apparens h. 3. 20', astronomica 0' 34" add.

Mea aequatio add. 19. 4

Tempus medium 3. 39. 4

1616. 17/27. Jun. h. 2. 54' 0' \odot in $6^{\circ} 0' 11''$ \odot

16/26. Aug. 15. 39. 4

d. 60.	h. 12. 45.	4	—	57. 23. 17
--------	------------	---	---	------------

10

29. 2

1. 48

Diurnus Solis 58' 3"

© In 9. 54. 28 mp

☾ 1615.	6.	3 ^h 49' 20" —	Apog.	3. 29. 20. 37 —	11. 11. 39. 57	Nodus
Julii biss. 213.				0. 27. 37. 46 —	0. 13. 7. 56	
	15.	15. 39. 4		4. 26. 58. 23 —	11. 8. 32. 1	
	<u>234.</u>	<u>19. 28. 24</u>		5. 22. 45. 14	41. 18	
Rev. IX.	247.	23. 47. 44		11. 53	35	
	<u>13.</u>	<u>4. 18. 50</u>		11. 4. 1. 16	25	Correctio.
		35. 56			11. 9. 38. 54	Nodus.
		<u>11. 59</u>			Locus ☉ 3. 54. 28	
		6			Lat. 31' 47" — 5. 44. 26	

Sic etiam est in prolegomenis Ephemeridum, ubi medium colloco h. 3. 0' 3" apparenti, ergo h. 15. 19' 7" media. Additis enim 1' 30" reductionis ad 4° 1' 16", ut sit locus Lunae 4° 2' 46", superavit Luna Solem per 8' 18". Ablato vero horario 2' 28" a ficto 35' 56", restat horarius 33' 28" fictus, cum quo divisa 5' 18" prodeunt temporaria scrupula 15' 20".

Itaque vera ecliptica conjunctio pro maxima eclipsi fuit 15. 23' 34'', 4' plus.

Videtur in Ephem. prolegomenis errorculus commissus, quem quaeram, ut probem
tabulam diurnorum.

Dies superflui :

13. —	5. 19. 50. 41	—	Ap. 1. 26. 58	Quaeram aequationem etiam ex prima tabula.
4. —	2. 10. 39	—	1. 7	172. 20. 52 — 42' 26
19. —	10. 21	—	* 5	173. 18. 16 — 37. 10
50. —	27		1. 28. 10	57. 24 dat 5. 16 ; — 8. 44
	5. 22. 12. 8			quid 60? seq. 5. 29
	43			43. 40
	5. 21. 29. 8	—	aeq. 43. 0	4. 22
	1. 28. 10			Hic aeq. 43' 4" 48
	5. 22. 57. 18.	Diff. est 1".		Hic igitur tabulae nullum faciunt errorem.

Haec infra ex emend. 11. Apr. 1620. invenies aliter.

Parallaxis ☉	1' 0"	Horarius ☽ a ☉	verus 35' 37" log. 52140
	☽ 64. 50	Superfl. sc. dur. dim.	23. 43 — 92826
	65. 50	Sc. mor. dim.	11. 40 — 163730
Semid. ☉	15. 15	Dim. dur. h. 1.	39. 57 — 40686
Semid. umb. 50. 35		Dim. mor. h. 0.	19. 40 — 111590
" ☽	16. 44		15. 23. 34
Summa 1° 7' 19"	Antil. 19. 17	Initium	13. 43. 37
Latit. 31. 47	Antil. 4. 274	Incident.	15. 3. 54
Semid. ☽	16. 44	Medium	15. 23. 30
Summa min. quam umb. 48. 31		Emersio	15. 43. 14
Diff. semid. umbr. et ☽	33. 51	Antil.	4. 85
Scrup. dur. 59. 20			14. 896
Scr. mor. dim. 11. 40			0. 576

9. April 1620.

Hanc igitur eclipsin computo majorem et longiorem, quam fuit vel Romae vel Tubingae, etsi ad meam magnitudinem observatam, sed procul dubio vitiosam, accedit.

Et nota quod etiam duratio fuerit major observata minutis 12, quae minuta facile conficiuntur latitudine minimum aucta vel umbra minuta. Ut si non per eccentricitatem novam, sed alia ratione conficeretur variatio in copulis. Tunc enim duae primae eclipses manerent propius apud observata et archetypica, semid. ☽ valeret etiam in copulis et incredibilitas minueretur in imbuitione speciei et fortasse variatio cum nutu epicycli posset in unum confari: ut si merus esset aequans, cujus eccentricitas aequalis eccentricitati Lunae simplici. Hic causa patet, cur menstrua dimidium esset solutae, qua caruimus hactenus. Vide in Hipparchi adversariis.

Ad hunc modum emendatis tabulis de 11. Apr. 1620, eccentricitate simplici ☽ in Ap. 15, parallaxi a priori, variatione ad modum Tychois, quantitate majore a priori, ut augeatur horarius, computabo jam hanc eclipsin.

Parallaxis ☉	1' 0"			Duratio 3. 11' 36"
	☽ 63. 40			H. 1. 35. 48
Summa 64. 40		Lincii accommodato medio		51680
Semid. ☉ 15. 15		ad Tub. et Rom. obs.		Log. 50850
Semid. umb. 49. 25		Horar. a ☉ 36' 5"		Initium h. 1. 55' 12"
" ☽	16. 22			Incident. " 3. 15. 55
Summa 65. 47	Antil. 18. 310			Medium " 3. 31. 0
Latit. 31. 47	Antil. 4. 274			Emersio " 3. 46. 5
Semid. ☽	16. 22			Finis " 5. 6. 48
Summa 48. 9	minor quam umbra dat 57' 36"			Log. 102530
Dist. 1. 34	sc. dur. superat 21. 31			
Diff. semidd. 33. 3	Antil. 4. 622			
	0. 348	dat 9' 4" —	Log. 189000	
		sc. mor.	138150	
		Mor. 0. 30. 10.	H. 15. 5.	

1615. 6. 3^h 49' 20" — 3^h 29' 20" 37" — 11^h 21' 39' 57"

Bis. Jul. 213.

15. 15. 39. 4		
234. 19. 28. 24		
Revol. IX. 247. 23. 47. 14	— 0. 27. 37. 46	— 0. 13. 7. 56
13. 4. 18. 50	— 4. 26. 58. 23	— 11. 8. 32. 1
35. 56	5. 22. 45. 14	41. 18 Ad.
115800	11. 18	35 Ad.
51250	4. 1. 51	25. 0
167050		9. 38. 54 *
		3. 54. 28
		5. 44. 26
		1. 30

Astron. aequatio 0' 34".

Add. hic subt.

Requis. 3. 55. 58 *

* Hic Luna paulo post perigaeum per physicam aequationem est per 6' ultra debitum, per astronomicam erit per 6' ante debitum. Et tunc promovebitur retracto apogaeo, ut aequatio ejus adjectoria fiat major. Eccentricitatis mutatio hic nihil juvat.

23. Apr. 1620. Opus ipsum ex 3 eclipsibus struendi hypothesin coeptum 5. Apr. 1620.

Sic fuerunt eclipses:

	Aeq. astron.	Aequali	Sub eclipsa
1616. 26. Aug. st. n. h. 15. 31' apparenti Lincii	0' 34" add.	h. 15. 31' 34"	3° 55' 12" *
1617. 16. " 8. 10 " " 3. 12 " h. 8. 11. 12			23. 42. 21
1619. 20. Dec. " 15. 48 " " 1. 21 subt.		h. 15. 46. 39	29. 4. 16 II
Intervalla d. 354		h. 16. 39. 38	349. 47. 9
Anni 2. d. 126		h. 7. 35. 27	125. 21. 55
3. d. 116		h. 0. 15. 5	115. 9. 4

Hinc colligo motum anomaliae mediae cum motu apogaei.

D. 354	10 ^h 5° 0' 14" 45"	1 ^h 9° 25' 33" 11"			
H. 16	8. 42. 35. 58	4. 27. 17			
M. 39	21. 13. 50	10. 52			
S. 38	20. 41	11			
	10. 14. 4. 25. 14	1. 9. 30. 11. 31			
Anni 2	5. 27. 26. 10. 12	2. 21. 18. 7. 4			
D. 126	6. 26. 11. 16. 26	0. 14. 1. 58. 36			
H. 7	3. 48. 38. 14	1. 56. 56			
M. 35	19. 3. 11	9. 45			
S. 27	14. 42	7			
	0. 27. 45. 28. 45	3. 5. 22. 12. 28			
	11. 11. 49. 53. 58	4. 14. 52. 23. 59			
	0. 27. 45. 28. 45	3. 5. 22. 12. 28			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Igitur primae duae differunt per 10^h 14' 4", posteriores per 27° 45'; quare prima et ultima per 11^h 11' 50'.

Ratione motus medii prima posita in apogaeo, secunda debuit cadere in

3. 55. 12. 4 *
1. 9. 30. 11. 31
10. 14. 4. 25. 14
27. 29. 48. 49
Inventa in 23. 42. 21
Diff. 3. 47. 28.

Atqui posita prima in aphelio, secunda habens anomaliam 10^h 14', haberet aequationem adjectoriam; itaque > esset ultra locum medium. Non est igitur prima in apogaeo. An igitur in perigaeo? Tum secunda anomalia erit 4^h 14' 25" posita igitur eccentricitate 4362, erit aequatio subtractoria 3° 43' 45".

Aut igitur non est in perigaeo prima, aut major est eccentricitas. Sit primae anomalia $6^{\circ} 1' 48''$, aequatio $0. 10' 0''$ add., erit secundae anomalia $4^{\circ} 15' 52' 25''$, aequatio $3. 37. 10$ sub. Sit denique primae aequatio $0. 11. 0$ add., erit secundae anomalia $4^{\circ} 16' 3' 25''$, aequatio $3. 36. 34$ sub.

Sic conciliatae sunt duae, stante hac eccentricitate.

Jam igitur ad tertiam.

Et quia secunda in $23^{\circ} 42' 21''$ ∞	
Adde Ap. 3 ^a 5. 22. 12	Anom. 4 ^a $16^{\circ} 3' 25''$
et an. 27. 45. 29	27. 45. 29
26. 50. 2 II	Anom. tertiae 13. 48. 54
2. 8. 9	Dat aequationem 1. 28. 25 sub.
Esset tertia in 28. 58. 11	Erat secundae aequat. 3. 36. 34 sub.
At est inventa in 29. 4. 16 II	Diff. 2. 8. 9
Tantum 6' deficiamus.	

Minuatur igitur aequatio parte sexagesima, et quia in duabus primis conficere debemus aequationem partium $3^{\circ} 47' 28''$

Adde 3. 47	1618. 11 ^a $29^{\circ} 41' 31''$
3. 51. 15	Nov. 1. 13. 42' 16
Hoc quaerendum et valebit 3. 47. 48	d. 9. 3. 27. 35. 5
Igitur sit primae anomalia	h. 15. 8. 9. 56
6 ^a $4^{\circ} 10'$ aeq. 22. 0 add.	36' 19. 36
Erit 2. anom. 4. 18. 14. 25 aeq. 3. 28. 4 sub.	Huennae aeq. 39. 20
27. 49. 29	5. 19. 28. 44
Tertiae diff. 5. 16. 3. 54 aeq. 1. 16. 20	5. 13. 48. 54
2. 11. 44	5. 39. 50
Haec est minuenda parte 61 ^{ma} 2. 10	Nimio vero minueretur haec anomalia.
2. 9. 34	

Per aequationem maximam $4^{\circ} 55'$ lucrati sumus 1. 26. Ergo deberemus per 25 minuere aequationem, ut lucraremur 6. Esset aequatio $4^{\circ} 35'$.

Ut certum hoc sit, proba etiam augmentationem. Augeatur aequatio parte 60^{ma}. Igitur a requisito ad duas primas $3^{\circ} 47' 28''$

anfer 3. 47	
3. 43. 41.	Hoc valebit $3^{\circ} 47' 28''$
Est igitur primae anom. 6 ^a 0. 0.	aeq. 0. 0
secundae " 4. 14. 4. 25	aeq. 3. 43. 45 sub.
27. 45. 29	
Ergo tertiae 5. 11. 49. 54	aeq. 1. 38. 50 sub.
	Diff. 2. 4. 55
	Auge parte 58 ^{ma} 2. 7
	2. 7. 2

Certum igitur efficitur per has 3 eclipses, aequationem non posse majorem esse quam $4^{\circ} 35'$, stante hac aequatione temporis astronomica.

Igitur secundo utamur aequatione physica:

apparentia tempora				loca secundum	
M.	H.	apparentia tempora	media	aequationes temp. emendata.	
M. 3. 55 π	18. 30 add.	H. 15. 31'	H. 15. 49' 30''	$3^{\circ} 55. 58$	X
23. 43 Q	19. 21 "	8. 10	8. 29. 21	23. 43. 1	∞
29. 4 X	1. 17 "	15. 48	15. 50. 5	29. 4. 23	II
Differentiae				16. 39. 51	
				7. 20. 44	
				0. 0. 35	

Primum igitur intervallum est auctum per 13'', secundum diminutum per 14' 43''. Respondent motus anomaliae 7'' 5''' et 7. 37. 16

Apogaei	4	23. 25
		8. 0. 41
		3. 12
		54
		4. 6

Ergo anomaliae intervalla correcta 10° 14' 4' 25'' 14'''

	7. 5
10. 14. 4. 32. 19	
27. 45. 28. 45	
8. 0. 41	

Alterum 27. 37. 28. 4

Sit prima in perigaeo, secunda habebit anomaliam 4. 14. 4. 32, aeq. 3. 43. 45.

Sit rursum primae anom.	6. 2. 10 aeq. 0. 12. 0	Ergo ad 3. 55. 58 ✕ adda
Secunda habebit 4. 16. 14. 32	— 3. 35. 42	1. 9. 30. 12 et anom.
	27. 37. 28	10. 14. 4. 32
		11. 27. 30. 42

Ergo tertiae anom. 5. 13. 52. 0 — 1. 28. 10

Diff. 2. 7. 32

Hic nos aequatio physica abducit multo longius.

Sed proba, ne erretur.

Anomaliae mediae 6.	2. 10. 0 — 4. 16. 14. 32 — 5. 13. 52. 0
	0. 12. 0 A. 3. 35. 42 S. 1. 28. 10 S.
23. 43. 1	6. 2. 22. 0 A. 4. 12. 38. 50 5. 12. 23. 50
5. 22. 8	3. 55. 58 ✕
27. 37. 28	1. 33. 58 mp 1. 33. 58
26. 42. 37 ✕	1. 9. 30. 12 1. 9. 30. 12
2. 7. 32	4. 12. 38. 50 3. 5. 22. 8
28. 50. 9 ✕	23. 43. 0 m 5. 12. 23. 50
	28. 50. 8 Ecce.

6. Maji 1620.

Cum in his tribus eclipsibus magna vis sit, nec facile negari possit minutum temporis, quo media fuit eclipsis: vide igitur, ne quid istis noceat calculus loci Solis. Nam Rothmannus Tychoni litem movit super vero loco ☉ circa brumale solstitium et in ☾. Et promovit fixas 6' ulterius.

Pensitemus modum:

Per aequationem temporis astronomicam inventa est ☾ in 28° 58' 1/2 II. per Solem in 29° 4' 16'' II. Si per Solem etiam in 28° 58' 1/2 II inveniretur, oporteret apogaeum Solis esse tribus gradibus posterius, ut sic circa perigaeum 6' plus in aequatione subtractoria essent. Hujusmodi nihil vel parum accedit in 28° Q, 4° mp, quia prope long. mediam.

Porro hoc idem videtur cognitionem obtinere cum observatione Lunae ad fixas in eadem eclipsi a. 1619. Nam fixa non implebat 28° II observata per Lunam, quae debebat esse in 28° 9' II. Luna ergo non tantum ratione temporis astronomice aequali, sed etiam ratione loci inter fixas erat anterior. Sed haec non adstipulantur Landgravio, quin potius Tychonem longius adhuc abstraherent ab illo, certe quidem in ✕. Fixae quidem hae etiam tunc consentiunt in quantitate fere, cum aequatione temporis mea utar.

De his igitur cogitandum, exspectanda vero exempla alia.

Notabis tamen etiam futuram quantitatem eclipseos, si Luna antea in umbram incidit.

Alia tractatio harum trium eclipsium.

Ut incipiatur a 2 ultimis.

Quia prima et ultima sunt prope perigaeum, major erit earum emphasis, cito im mutatur aequatio.

prima 3° 55' 12" \times	Apog. 4. 14. 52. 24 —	3. 55. 58 \times —	4. 14. 52. 20
ria in 29. 4. 16 Π	Anom. 11. 11. 49. 54 —	29. 4. 23 Π —	11. 11. 41. 53
Diff. 115. 9. 4	3. 26. 42. 18 —	3. 25. 8. 25	3. 26. 34. 13
	3. 25. 9. 4		3. 25. 8. 25
Summa aequat.	1. 33. 14		1. 26

At cum usurparem anomaliam 5° 13' 48" 54", etiam anomaliam 6° 1' 59' 0", legi 1° 39' 25".

Retrocedendo igitur cum apogaeo per unum gradum conficio hanc summam: 5° 12' 45' dat 1° 34' 6. 0. 55. 6 dat 0. 5. 6.

Hem! praeter opinionem manet ad sensum quantitas eadem, sc. quia loca aque sunt perigaeo valde vicina. Scilicet magna vis est vel in duabus solis. in differentia anomaliarum est 18° 10' 6". Haec ex uno latere perigaei applicata non dat minus quam 1° 39' per 4362. Ex utroque latere aequaliter applicata dat paulo plus quam 1° 40'.

In Tychone dat 1° 36'

1. 32, sed eccentricitate minori.

Per has igitur duas perigaeas arctissime constringimur, ut aut minuaturs entricitas, aut Solis apogaeum promoveatur, aut in aequatione temporis contra aliquid physicae aequationi designetur.

Tunc media facile se praebebit. Nam ibi loci 16' anomaliae dant 1' aequa-
nis.

His, quae ex Vol. XV. Mss. desumimus, interpositis redimus ad Vol. I. Mss. ex illo excerptas, quae diversis conscripta temporibus (saepius, ut in modo praemissis, notato quo illa scripsit Keplerus) aut priora magis minusve attingunt, aut per se stant.

DE LUNA.

(8. Nov. 1601.)

Assumta hac aequationum hypothesi, quod tempora graduum aequalium sint ad invicem ut distantiae a virtutis fonte, erit sinus aequationis maxime dimidiandus pro eccentricitate. Est autem sinus aequationis maxime in copulis 8672. Ergo eccentricitas orbis 4336, quae efficit aequationem eccentrici $2^{\circ} 29' 20''$; aequatio vero aequantis est itidem $2^{\circ} 29' 20''$. In quadraturis est aequantis aequatio praecise dupla, sc. $4^{\circ} 58' 40''$, ut sit tota $7^{\circ} 28'$. Hac itaque ratione speculatio concinna oritur. Centrum aequantis enim in quadraturis duplo altius esse censetur a centro eccentrici in locis intermediis, quae est proportio sinus elongationis a diametro ($\odot \delta$) ad sinum totum, eadem aequationis tertiae (dicatur enim eccentrici aequatio prima, aequantis secunda, phasmatum tertia) ad aequationem secundam. Ut igitur aequales sunt prima et secunda aequatio, ita etiam secunda et tertia. Aequationes autem non maxime ex suo genere censeantur. Nam in aequationibus solis disputatum est, an mediae secentur omnes.

Aliter: bisecetur quadrantalis, et prodibit dimidius sinus 6500, arcus $3^{\circ} 44'$; copularis $4^{\circ} 58' 40''$, diff. $1^{\circ} 14' 40''$, triplum $3^{\circ} 44'$. Itaque quo minus in (diametris) copulis morae essent ut distantiae, pars tertia praecise deesset, tanto sc. esset solito velocior Luna versans in virtuosa diametro. Forte nec hoc inconcinnum.

Aliter tertio. Centrum eccentrici vere discedat a centro Terrae in quadraturis, fiatque altius parte tertia. Sit enim in diametro 4336, foris 6505. Tunc prima et secunda aequatio ubique bisecabuntur, eritque nulla tertia. Tunc sane etiam octantes juvabuntur, forsitan et latitudines. Sed considera melius, maxima quadrantalis ponit centrum in diametro ($\odot \delta$), diametralis in quadrantibus. Ergo centrum in diametro ($\odot \delta$) altum, in quadrantibus humile. Transeamus perspicuitatis gratia ab eccentrico in epicyclum, epicyclus maneat invariatus, sed centrum concentrici, Luna in longitudine media et quadraturis versante, sit in diametro ($\odot \delta$) supra vel infra Terram, sed Luna versante in longitudine media et diametro, sit in centro Terrae. Nam et aestus maris realem videntur appropinquationem requirere (modo non et diurnam). Similiter Luna in apogaeo et quadraturis versante, centrum sit supra vel infra Terram in diametro ($\odot \delta$). Nam haec elevatio nil variat aequationem, quae nulla est. Sed nota, hoc pacto vere octantum inaequalitas, variatio dicta, in quadraturas redundabit, possitque forte per alium et concentricum circulum centri concentrici Lunae circa Solem excusari. Ergo rejiciatur haec permutatio eccentrici et epicycli.

Ergo per se centrum eccentrici describat figuram ovalem circa centrum Terrae motu apogaei, ita ut diameter virtuosa non sit, sed solum centrum Terrae. Contra facit, quod haec inaequalitas a vero loco Solis pendet et quod nova pro octantibus esset confingenda ratio. Ergo de prioribus consulantur dimensiones, an etiam octantes complectantur.

Ponatur centrum in diametro ($\odot \oslash$) altum 4336. Maneat interea ibi (nam vix 13 vel 15 lunationibus periodum absolvit), Luna vero ab apogaeo volvatur in long. mediam et quadraturas. Si virtus maneret eadem, aequatio secunda esset $2^{\circ} 29\frac{1}{2}'$; jam est $4^{\circ} 58\frac{1}{2}'$, ergo 90 radii paulatim a diametro ($\odot \oslash$) elongati et paulatim longiores, sunt per $2^{\circ} 29\frac{1}{2}'$ tardiores, quam totidem manentes in diametro et longiores, et per $4^{\circ} 58\frac{1}{2}'$ tardiores, quam 90 medii, egredientes paulatim a diametro in quadraturas. (Nota Kepleri in margine: „hoc dubium“.) Sed 90 medii egredientes e diametro in quadraturas volvunt 90° , ergo 90 paulatim longiores sunt ad 90 medios, ut 94. $58\frac{1}{2}$, ad 90, et 90 sinus eccentricitatum ad 90 radios sunt ut 4. $58\frac{1}{2}$, ad 90. Ita 90 sinus 90 eccentricitatum sunt ad radium, ut 4. $58\frac{1}{2}$, ad 1. Sed 90 ordine sinus sunt ad radium, ut tangens semiradio auctus ad radium fere, ergo ut $57\frac{1}{10}$, ad 1. Ergo 90 sinus totius eccentricitatis sunt ad 90 sin. totos simplices, et per consequens eccentricitas ad radium ut 4. $58\frac{1}{2}$, ad $57\frac{1}{10}$. Est itaque $\frac{1}{11}\text{ima}$, ratione virtutis. Ergo si censetur $\frac{1}{11}\text{ima}$, erit censita pro 9091, qualium radius 100000; sed ita, ut omnes radii eccentricitatum ratione virtutis sint proportionales suis longitudinibus, quod tamen non est. Nam longiores plus habent virtutis, cum sint propiores diametro.

Ergo aliter. Cum apogaeum est in quadratura, nihil differt verus locus a medio. Inde 90 ordine radii apogaei in quadraturis sunt causa virtutis longiores 90 ordine radiis apogaeis in diametro (nam hic respicimus, ubi centrum habitat, cum virtus ex centrali linea non veniat) per $2. 29\frac{1}{2}$. Faciunt ergo illi tempus 94. $58\frac{1}{2}$, hi faciunt tempus 92. $29\frac{1}{2}$. At quod illos virtuosiores efficit, est distantia \oslash a Terra in quadraturis (Nota K. in margine: „Hic me ipsum confudi et assumi heterogeneam hypothesin“), eaque nonagies ab apogaeo. Ergo si 90 distantiae ab apogaeo in quadraturis dant $2. 29\frac{1}{2}$, quid una mediocris? (facit $\frac{1}{10}$, sc. $1' 40''$ ut ante. Tanto tardior esset \oslash in \square .) Haec subtiliter computentur alias. Jam si 90 dant $2. 29\frac{1}{2}$, quid 1, sc. media fere inter remotionem longissimam et apogaeam? sequitur $\frac{1}{2}$ scrupuli fere, sive $1' 40''$.

Itaque Luna in uno quadraturarum gradu tardior est per $1' 40''$ de 360° tempore revolutionis suae, quam in diametris, quare per $50''$ tardior, et in diametris $50''$ velocior justo. Jam facile computari potest, quantum in octantes redundet. Primo diminuat (securitatis causa) temporis revolutionis Lunae octava pars per $1' 40''$ quadragies quinquies. Deinde colligantur sinus omnes ab uno gradu ad 45. Et dic: si totus valet 100'', quid valet summa 45 sinuum minorum; quod prodit tempus rursum addatur. Ergo ut 45 minores ad 45 totos, sic tardatio ad incitationem, ut igitur excessus 45 totorum super 45 minores, sic incitatio \oslash manens ad incitationem $1' 40''$ quadragies quinquies.

Collige summam omnium sinuum ad gradus integros, incipiens a 0° usque ad 45° , et abjice (si 7 cyphris utaris) figuras 5 posteriores. Relictum sunt scrupula secunda, quae reduc ad prima et gradus, et asserva. Deinde multiplica $1' 40''$ per 45° , prodibit summa major; aufer igitur quod prius servasti ab hac summa majori, et vide, an maneant circiter $45'$ prima.

Dimensio plane convenit. Nam quod in octantes redundant $46\frac{1}{2}$, perpende, quod omnes elongationes a linea virtutis assumerim paulo longiores, sc. tam longas, quam longa est distantia \oslash in loco inter apogaeum et long. mediam intermedio. Si justas assumerem, paulo minor evadet.

Dubitatur, si solus distantiarum excessus a mediocribus efficit $2\frac{1}{2}^{\circ}$, quomodo integrae distantiae tantum $46'$ faciant? Nempe ille excessus consideratur totus in quadraturis, distantiae vero considerantur non totae, sed quantum \oslash distet a

quasi in Terram cadet, ad moram sinus illius, quatenus supra Terram incidit in diametrum. Ergo quia sinus omnes, seu $57\frac{1}{4}$, valent 2. 29, quid sinus unus totus, seu 1, vel tota eccentricitas in quadrantibus semel? — $155'' = 2' 35''$.

Et quia 4336 valent 155'', quid 100000? 3575'' vel $59' 35''$. Ergo quod totus sinus mediocris in quadraturis vernatur, facit temporis 1° fere accrescere, estque pars dimidia, quaeritur quantum faciat accrescere elong. ☾ a ☉ 89'.

Primo ut 100000 ad 99985, sic 3575 ad $3574\frac{1}{2}$; deinde ut
100000 ad 98255, sic $3574\frac{1}{2}$, ad justum 3512.

Multiplica 3575 in omnes sinus ordine, et rejice 7 ultimas, quod prodit multiplica in omnes versos ordine, incipiens a toto vel maximo, et abjice ultimas. Vel multiplica 3575 in summam sinuum 45 majorum, quotientem multiplica in summam sinuum versorum majorum 45 et divide per 45 totos. Habetur summa versorum, si summam sinuum subtraxeris a totidem totis. Summa 45 minorum sinuum est 1713467, summa 90: 5775000, summa 45 majorum: $4061533 (\times 3575) = 145200$, tantum esset, si perpendicularia omnia in Terram caderent, sc. 2420' vel $40^\circ 20'$, 104336 dat 59, quid 100000? — $56\frac{3}{4}$. $56' 45'' + 2' 28'' = 59' 13''$; $56' 45'' - 2' 28'' = 54' 17''$. Haec bene cum quadrantalibus parallaxibus.

Lunae recapitulatio et eclipsium.

Si de novo inciperem restituere motus Lunae, hinc potissimum facerem exordium. Solis diametrum observavi in apogaeo $29' 30''$. Consentit Maestlinus et Tycho cum datis suis: etsi in Progymnasmatibus majorem faciat, sed occasionem alicubi vidi.

Sinus $14' 45'' = 429$; si 100000 fit 101800, quid 429? — 437, sin. $15' 1''$. Itaque in long. media erit $30'$ sine additamento. In apogaeo $29' 30''$, in perigaeo $30' 30''$. Nam hic assumitur eccentricitas ☉ nota 1800. Jam pro scienda diametro Lunae sumatur eclipsis Clavii 9. Apr. 1567 (comp. Opt. p. 316), quando Romae Sol exili circulo supra Lunam eminebat (videat modo Clavius, ut circulus integer fuerit). Sol in $29^\circ \Upsilon$, dist. 66° ab apogaeo. Ergo diameter $29' 48''$. Respectu 100000 diameter ☉ est $29' 48''$, vel 433 (sin. $14' 54''$). At si 100000 fiat 99620, tunc illud fiet 431. Jam ☾ diameter fuit minor; fuerit aequalis, ut videamus, quid sequatur. Nam vel $15''$ diminutioni semidiametri sufficiunt ad sentiendum circulum.

Luna ergo habet anomaliam coaequatam $3^\circ 1' 52' 57''$, estque paulo propior, quam est mediocris. Cum sit aequatio fere 5° , ejus compl. 85° . Sit sane distantia 99620. Si 100000 fit 99620, quid sinus diametri ☉ apparentis 433? ☾ ergo distantiae sinus 431 (sin. $14' 50''$). Ipsa $29' 40''$, etiam cum illi relinquitur diameter aequalis Solari. Compara jam 4336 eccentric. ☾ cum 431; 104336 fit 100000, quid 431? sequitur 418 (sin. $14' 22''$); diameter $28' 44''$. Ergo diameter maxima $31' 20''$. At si minorem sumam etiam perigaeam, minor evadet, itaque non valebit tegere Solem totaliter, quando is habet diametrum $29' 40''$ circiter, mense Augusto. Ipsa vero in perigaeo habet $30' 24''$ minus. (In austro diameter ☾ ceteris paribus apparet major, quam in septentrione. Nam 55 ad 1 est ut 100000 ad 1800. Ergo potest variari dimidio scrupulo, ut in Sole, sc. qui sub polo et qui sub aequatore est.) Subiit igitur animum suspicio, an ille circellus lucidus sit aërium corpus Lunam circumdans, quod vicissim in Luna plena habeatur pro corpore. Esset omnino diminuenda

28. 44	29. 40	31. 20
15	15	15
28. 30	29. 25	31. 5

Nisi forte Lunam altius passuri sinus ascendere, ut per dimidiam aequationem latitudinum $3^\circ 45'$, sinus 6540. Sed et haec et priores paulo aliter sunt constituendae. Qualium distantia 100000, talium diameter ☉, cui jam sit par ☾, 433. Sed distantia non est recte sumta. Nam quia aequatio 5° , vel $7^\circ 30'$, dim. $2^\circ 30'$

vel $3^{\circ} 45'$. Compl. $87^{\circ} 30'$, $86^{\circ} 15'$; sinus 99905 vel 99786, quamvis propter 2 residuos gradus paulo sint breviores, ut 99900 vel 99780. Ergo si 100000 facit 433, quid 99900 vel 99780? sunt ergo $432\frac{1}{2}$, vel 432. Mediae ergo $29' 45''$ vel $29' 43''$. Postea modo priore: 104336 est ad $432\frac{1}{2}$, ut 100000 ad 414; diameter apog. $28' 30''$. Et 95664 est ad $432\frac{1}{2}$, ut 100000 ad 452; diam. $31' 5''$. Rursum posteriore modo: 106540 est ad 432, ut 100000 ad $405\frac{1}{2}$, diam. $27' 53''$. Denique 93460 est ad 432 ut 100000 ad 462, diam. $31' 48''$.

Collectio ex eclipt.: $28' 30''$. $29' 25''$. $31' 5''$. Hisce minores utrique
ex quadrant: $27' 53''$. $29' 43''$. $31' 48''$. sunt assumendi.

Reiteratio hujus considerationis.

Ponamus, cum Luna est in diametro Solis, naturalem observare planetarum ceterorum aequationem. Cum ergo aequatio est 5, sic est, ac si omnes distantias confecisset in diametro, ita cum aequatio est $7\frac{1}{2}$, similiter in quadraturis. Nam puto futuram inaequalitatem, si sic considerares, ut vere conficit distantias: sc. cum aequatio est $7\frac{1}{2}$, longiores conficit in diametro, mediocres in \square . Contra cum est 5, longiores conficit in \square , mediocres in diametro. Quod ergo omnes ordine excessus a maximo ordine elongantur a diametro, et propiores sunt, non tamen proximi: id valet $2\frac{1}{2}$, plus, quam si omnes ordine excessus a minimo ordine elongantur a diametro. Quod enim ipsos mediocres attinet, et qui subjecti sunt excessibus, illi utrique aequales sunt et aequaliter habent. Ergo hoc longe aliud est, non omnes excessus, proxime tamen omnes; in quadratura non ipsa, proxime tamen. Minimum versus diametrum. Ex adversa parte paucissimi excessus, longiores tamen versus diametrum, et propemodum aequaliter sparsi in quadraturas. Hic enim sibi mutuo per intermedia obviant. Longe inquam aliud hoc est, quam omnes excessus in quadraturis hinc inde, omnes in diametro ipsissima.

Illic videtur compensatio non tantum distantiarum, ut manifestissime patet, ductis quadrantibus eccentricis et a \square et a diametro, sed etiam distantiae et virtutis. Nam ubi minima decrementsa distantiarum in diametro, ibi maxima decrementsa, vel celerrimi discessus a diametro, contra ubi maxima decrementsa, ibi minimi discessus. Verum vicissim ex quadraturis contra accidit. Nam accumulatur et tarditas decrescientium distantiarum, et tarditas accessus ad diametrum. Haec ergo duo demonstret mihi aliquis ejusdem esse proportionis. Nam certe distantiae omnes in quadraturis tardiores sunt, quam paulatim sparsae in diametrum minimis. Contra omnes in diametro velociores, quam paulatim sparsae in quadraturas minimis. Major itaque proportio tarditatis unius ad velocitatem alterius, quam re vera. Quodsi continua virtus a diametro in quadraturas esset ad paulatim sparsiore, ut continuus limbus circuli ad lunulam, facilius esset modus computandi. Hoc est, si ita decresceret virtus euntibus a diametro, ut decrescit lunula distantiarum. At nescimus gradus illius virtutis diametralis. Opinamur esse ut decrementsa sinuum a minimo. Si hoc: non eadem est ratio virtutis et distantiarum. Nam illarum decrementsa sunt fere ut decrementsa sinuum a maximo. Hic ergo computandi ratio adhuc impedita est. Illa expeditissima, si distantiae omnes censeantur 1) in quadraturis, 2) in dia-

metro. Et non caret ratione. Nam aliquando apogaeum est in \square . Ab hoc, seu ab epocha post revolutiones integras, quae semper faciunt aequalia, omnes ordine distantiae locantur in \square , et sic fit aequatio $7\frac{1}{2}$. Itaque sint omnes et hic et illic. Et cum hic tempus faciant illius duplum, dupla itaque virtus diametri ad quadraturam? Minime. Nec bene considero, quia non seorsim, sed integrae incitantur. Sint integrae distantiae hic et illic. Et cum faciant hic tempus 95, illic $97\frac{1}{2}$, ut ergo 95 ad $97\frac{1}{2}$, sic virtus una ad alteram. (Hic propemodum apparet utriusque modi aequatio. Illic n. separatim considero distantias et temporum excessus.) Et ut $2\frac{1}{2}$ ad 95, sic excessus virtutis unius ad totam alteram, sed ut $2\frac{1}{2}$ ad 95, sic lunula (vel ei aequale parallelogrammum) semis ad quadrantem circuli plani. Ergo ut triangulum aequatorium ad superpositum auctum quadrantem, sic virtutis excessus ad virtutem alteram. Haec nihil novi habent. In quadrantibus crescunt universis $2\frac{1}{2}$, summa universorum est in plano: et planum dividitur in $92\frac{1}{2}$ sectores et praeterea triangulum, quod itidem valet $2\frac{1}{2}$. Dividitur ergo illud planum in 95 sectores. Uni ergo sectori $1\frac{1}{10}$, competit. Quare quilibet sector in diametro $1\frac{1}{10}$, minus temporis habet. Nempe sub anomalia simplici $58\frac{8}{10}$, in diametro volvitur 60. Jam hinc transitus in octantes quaeratur. Distantiae omnes ordine a diametro in octantes ad omnes a diametro in quadraturas sunt ut segmentum quadrantis ad residuum. Sit circulus 31416, erit quadrans BAD 7854, et BAC 3927; radius AC 100, ejus quadratum 10000, dim. 5000, et $\triangle ACE$ 2500; subtrahere ab ACD (3927) restat ECD 1427. Haec summa digressionum ad octantem. Jam ergo si sector unus (quorum sunt 360) foeneratur $1\frac{1}{10}$, quid 1427? 2253; vides parum prodire.

Fig. 10.

Itaque apparatus, debilitationem hujus virtutis diametralis non esse in incremento sinuum a minimis. Nempe ita debilitatur, ut via Lunae a communi planetarum in transversum inflectitur, itaque ut decrementa sinuum a maximis.

Est ACE 2500, BAC 3927, ergo BAEC 6427; 3716
+ 6427 = 10143. Hic nimum prodit.

(Hic non recte computavi. Si proportionaliter cum tempore decrescit, ergo in 45 addit $\frac{1}{4}$, dimidium et in 1: $\frac{1}{10}$, junctim $\frac{6}{10}$, et hec $22\frac{1}{10}$ — 53; parum absumus.)

Ergone in proportione arithmetica decrescit, seu in tempore, ut quo diutius a diametro abest, hoc fiat debilius? Si nonagies $1\frac{1}{10}$, multiplices, et quartam partem auferas, h. e. si $67\frac{1}{10}$ multiplices. Ne hoc quidem. Nam prodit nimium. Crescunt ergo scrupula cum DE? Ut EA sit in ipso circulo Lunae, DE linea diametralis. Est AE 70711, ergo ED 29289. Minime. Nam sinus versus 1° nimis erit parvus. Ergone ut anguli radii Solis incidentis in curriculum Lunae? At quomodo omnes angulos colliges? Rursum enim plus 45 colligitur usque in 45° .

Supra non recte collegi. Quia inquam tempus ab egressu e diametro aequale additur ei e centro egressui, ergo virtus utraque et diametri et eccentricitatis aequalis est. Iterum non recte computavi, dum de toto dixi, quod de dimidio est verum. Nam si quilibet sector in diametro $1\frac{1}{10}$, minus habet quam in quadraturis, et motus igitur in diametro est auctus, in quadraturis diminutus, in \odot medius. Ergo medius et aequalis alicubi, loco intermedio. Oportet totum in quadrantem prius computare. Est ergo $\frac{1}{10}$ plani in circulo 7854; si sector $87\frac{1}{10}\%$ dat $1\frac{1}{10}$, quid 7854? $12401000 : 8725 = 142$. Totum foenus est $142' c. = 2^\circ 22'$. Minus quam $2^\circ 29'$.

Jam si semper curret in virtute quadrantali, $90 \times 1''_{10}$, decessent, n. 2. 22.




Fig. 10.

motusque $87^{\circ} 38'$. At a diametro in quadraturas accedunt 2. 22; dividendi sunt sic, ut BAD dividitur per CE. Tota BAD dat 142, quid ECD?

$7854 - 142 = 1427? 25\frac{1}{4}; 142 - 25\frac{1}{4} = 116\frac{1}{4}; 70\frac{1}{2}$ excessus, nimis magnus. Num ergo dividitur ut quadrans? Videtur dividendum ut quadrantis residuum. Ut: AE = 70711, ED = 29289 ($- 14270$) = 15019. EDFG = 70711, GCDF = 6427, BGC = 6441. Hic est ratio quadrupla. Totum ergo in 5 dividitur — $\frac{142}{5} = 28\frac{2}{5}$, pene hoc idem est. In progressionem arithmetica sic: $\frac{142}{5}$ summa 2 partium, primae et ultimae, item 2 mediarum. Ergo $\frac{142}{5}$ est una media, et $\frac{20}{5}$ extrema. Junctim ergo $\frac{142}{5} + \frac{20}{5}$; hoc $22\frac{2}{5} = \frac{112}{5} + \frac{20}{5} = 35 + 35$; summa 70, reliquum 52; $90 - 52 = 38$; hic propius accedimus.

Statueretur itaque virtus cum tempore proportionaliter in quadraturis decrescere. At hoc absurdum physicis rationibus, quia tempus in 14 dies excurrit, donec in diametrum redeat. Ergo hoc omnino a decremento anguli inter radium Solis et viam Lunae.

Non est ergo debilitatio propter tempus, sed omnino propter elongationem a diametro. Et quia elongatio a diametro est in linea recta computanda, ergo arcus digressionis non metitur hanc elongationem physicam, sed sinus. Sinus autem physice non bene colliguntur ex aestimatione segmenti, quia stipantur ibi, Luna vero conficit illos sparsim. Esset extendendus quadrans in rectum. Hoc pacto in 45 ab δ ad octantes tarditas ut omnino dimidia esset. Promotio igitur ut prius $52'$ c. ut contra $38'$ c.

Atque tandem progressio arithmetica sola dominabitur. Nam arcus confectus a diametro est complementum anguli, quem facit via Lunae cum radio \odot fere.

Consideretur vero melius. Summa 90 est $2^{\circ} 22'$ vel $\frac{142}{5}$; summa primae et ultimae $1\frac{1}{5}$ vel $\frac{20}{5}$, eadem est summa duarum mediarum in 45° , 46° . Sed illae aequales fere, media ergo $\frac{142}{5}$ fere. Ergo quae in diametro et quae in octante faciunt sinus $\frac{142}{5}$. Harum vero copularum sunt $22\frac{1}{5}$, quanta fiet summa? $45 \times 22\frac{1}{5} = 1012\frac{1}{5}$. $1012\frac{1}{5} : 19 = 53$, ut prius fere.

Illa forma elliptica extensi quadrantis videtur concinnior. Tentemus. Coniice in unam summam sinus 90, item et sinus 45, nam plane bona spes est. Pro arcubus enim sumuntur sinus, qui sunt multo breviores.

Fol. 274 (390) Martialium summa sinuum 45 est 171346716

90 — 578943140. Si 578... dat 142.

quid 1713...? R. $42'$, optime convenit.

Creari ellipsin inde constat, quod iidem sinus, qui in circulo, etiam in hac figura ordinantur. Modus computandi fere hic esse videtur, ut sicut se habet sinus totus in 90° ductus ad $2^{\circ} 21'$, ita se habet sinus temporarius in suum arcum ductus ad portionem temporariam. Nam spatia ellipsium integra sunt ad invicem ut rectangula diametrorum, sic et dimidia. Cur non et reliqua? Proba aequipollentiam in nostro exemplo. $90 \times 100000 = 9000000$, $45 \cdot 70711 = 3181995$. Si ergo 9000000 fit 142, quid 3181995? — $50'$ paulo aliter. Forte non est ellipsis, sed ductior quam ellipsis et acuminata, neque tamen hyperbole, sed incipiens ab hyperbole, desinens in ellipsin. Haec quominus perfecte credam, unicum obstat, quod anno 1588. in eclipsi Lunae deprehenditur motus horarius 40.

De Lunae hypothesi. 26. Sept. 1602.

Postquam in Marte successit demonstratumque, quod duabus vehatur virtutibus: communi ex Sole eaque inaequali, et propria, in se aequali, cer-

tum jam et de Luna, quod ad minimum tribus vehatur. Consentaneum una ex Sole, secunda ex Terra, tertia in se. Sed tamen, quid si duas in se haberet? (ut Terra ipsa habet unam rotandi sese, alteram faciendi gyrum apogaei, in cujus compensationem Luna non rotat.) Videmur in phaenomenis consentanea dicturi, si tribuamus diametro sane ut hactenus vim majorem, at distantias \bigcirc a Sole dicamus ita confici aequalibus temporibus, ut distantias suas Mars conficit. Tunc sane suas a Terra eadem vis conficiet. His positis hoc sequitur, ab \oslash in octantes augeri distantias a Terra, in quadraturis pene coincidere. Nam cito transit \bigcirc in \oslash , vi extrema Solis promota. Parum igitur ad Solem accedit, utpote in parvo tempore. Quodsi multum distat, diu igitur movetur. At initio positum cito transire. Falsum igitur. Nisi dicas cito transire ratione moduli ex Sole, tarde ratione moduli ex Terra.

Exorsi igitur non a sensu, sed ab analogia magis, dicamus, tres illas virtutes esse in Sole, Terra, Luna; in sola Luna aequabilem, in Terra ratione annua variabilem in sese, et variabilem respectu Lunae a Terra ascendentis et descendens; in Sole variabilem ratione accessus et recessus Lunae et in apogaeo et in orbe et in ratione diametri. Primae modus est unus, secundae 2, tertiae 4 (ut 29 ad 30, ut 8 ad 10). Haec enim possunt esse suspiciones. Sed nihil in tertia videtur considerari debere modus tertius (si tertius nihil, ergo nec primus, nec secundus). Nam restitutio inaequalitatis est dupla ad distantiarum circuitum: celeris est enim Luna tam in \oslash quam in \oslash . In secundo vero celeritas illa puto non est animadvertibilis. (Quare neque tertiae primus?) Considerandum est ergo in tertiae modo quarto, quae sit ejus genuina causa. An vere vis in diametro velocior? An est ita quadraturarum retardatio plane non ex Sole, sed ex majore distantia a Terra? Et distantiae variatio ibidem aliunde. At contra Luna potius propius Terram venit, quia crescit ejus latitudo. Sed sit illa variatio latitudinis sane aliunde (forte, quod eadem est proportio totius latitudinis ad hunc excessum, quae orbis Terrae ad orbem Lunae). Jam vide, quid sequatur in longitudinem et apogaeum? Idem nempe, quod jam pridem, dum consideravi sinus elongationis a diametro. Nam si tota distantia \bigcirc a \odot foenerat, portio eccentricitatis non nisi in proportionem foenerabit, parum nempe. Nam illud jam pridem sciebam, et si perpendas, ut Tycho dixit, augeri eccentricitatem in quadraturis, quasi ellipsin tendas a \square in \square , et apogaeitatem proportionaliter augeas.

Nota haec. In quadraturis distantiae sunt semidiametrorum 54, 60, sc. $\frac{1}{10}$ de majori. Si 57 sit 100000, quid 3? — 5263. Subtendit $3^{\circ} 1'$, duplum $6^{\circ} 2'$, tanta non est aequatio Lunae oppositionalis. Sed insensibili juvatur, ut prodeat aequatio oppositionalis, ut si sint distantiae 55, 60. Ita si sint 53, 60, prodibit justus modulus aequationis quadrantalis. Eadem igitur est distantia in quadraturis ex observatione, et \oslash ex ratiocinatione physica simplici. Nec in varianda eccentricitate \bigcirc plus integra Terrae diametro opus habemus, ut physica simplici ratiocinatione utramque aequationis quantitatem servemus.

In aliis de Luna foliis sic statui. Vere decedere aliquid Lunae motui, accedere tempori, cum e diametro Solis egreditur (esto causa, quod inaequalem et transversam ceteris sideribus viam currit). Ibi sequitur, quod semilunula eccentricitatis sit ad quartam circuli plani, ut 5 ad 90, pars $\frac{1}{18}$. Sed praesupponitur hic, quadrantem et lunulam proportionaliter incrementum. Nam concentricus quadrans haberet 90 temporis. At eccentricus habet $97\frac{1}{2}$, de quo $2\frac{1}{2}$ debetur eccentricitati. Repetam hanc considerationem. Esto, ut virtus, quae est ab approximatione diametri \odot , aequali proportionem spargatur in lunulam et in quadrantem. Erit vero

proportio lunulae ad quadrantem ut 1 ad 18. Lunula est quadrans, minus segmento, cui ademptum est parallelogrammum eccentricitatis.

Horarius hypotheseos Tychonicae.

Nota, horarium Tychonis prodere omnino eccentricitatem illam, quae reddit aequationes quadrantales.

Credibile est igitur, Lunae virtutem esse magneticam, quae axem porrigat in longitudes medias. Cum igitur Tellus convertat Lunam remissas in quadris, Luna in quadris diu moratur. Cum ergo apsidum linea est in diametro, axis in quadris tendit ad Terram, fuga et persecutio fit fortis, pervasio fit alta.

Et nota, cum jam ante species corporum stabiliantur, quae omnino fortes sunt in illo sudo et immateriato aethere, non opus videtur positione magneticae virtutis in ☉ et ☿ motoribus: sufficit moveri, nam sicut cum specie carbonis exit species lucis, ut accidentis, ita cum specie Telluris exit species motus. At in motis pro eccentricitate omnino ponendus magneticus vigor.

Jam considerandum, an discessio e diametro proportionetur angulis vigorum mensoribus. Et videtur. An autem maneat ellipsis? Nescio. Videtur tamen et hoc in hoc casu, ubi apsidum linea coincidit cum diametro. Nam paulatim crescit utrumque, et ubi parum ascendit, celeriter transvolat, h. e. parum moratur.

Considera et alterum casum, si linea apsidum in quadris, tunc axis parallelus est diametro. Certe difficile contradicere, facile credere: et hic manere ellipsin.

Hoc unum restat quaerendum, an dicta Tychoni variatio quantitate sua sufficiat moris ad tantum ascensum necessariis? At quis metietur? Quibus principiis?

De physica hypothesi Lunae.

Ponatur hoc: volutionem Terrae circa axem conciliare Lunae motum circa Terram: illam vero virtutem Telluris adjuvari in movenda Luna a virtute Solis; quatenus quidem species immateriatæ Solis et Telluris lineas motuum describunt parallelas. Ubi vero se secant ad rectos, ibi nullum esse adjumentum ex Sole. Videamus, an quid opponi possit huic hypothesi. Cum igitur adjumenti mensura statuatur in angulis linearum, virtus vero angulorum insit in eorum sinibus, considera, quod in quadraturis angulus rectus sit; adjumentum nullum, recti vero sinus totus, residuum itidem nullum. Circa quadraturas angulus recto propinquus habet diu sinum non multo minorem toto, residua ad totum sinum parva, adjumentum etiam parvum. In copulis linearum angulus nullus, sinus nullus, residuum sinus totus, adjumentum maximum. Post copulam anguli orientis sinus subito crescunt, residua subito decrescunt, ut et adjumenta. Sunt ergo colligenda residua sinuum

in unam summam, ut aequale valeat haec toti adjumento. Quodsi ergo nihil est de adjumento in quadraturis, ibi igitur sincera erit virtus solius Telluris. Quare accipiendus erit motus horarius in anomalia 90° et quadrato Solis.

Computetur hic horarius Lunae. Primo propter aequationem sive copularum sive quadrarum in anomalia 90° manet horarius aequalis mediocri. Est vero mediocri $30' 29''$. Jam variatio uni gradui aufert $1' 26''$, ergo huic horario auferet $44''$ circiter. Itaque horarius quadrarum spoliatus adjumento ex Sole relinquitur $29' 45''$. Quodsi in horas singulas absolveretur de Luna arcus $29' 45''$ aequaliter, in bihorio $59' 30''$, in 3: $1^\circ 29' 15''$, in 6: $2^\circ 58' 30''$, in 12: $5^\circ 57'$, in uno die $11^\circ 54'$, tricesima pars orbis, minus $\frac{1}{10}^\circ$. In 30 diebus integer orbis minus 3° . Ergo in 30 d. 6 h. 3' totus orbis. Nimirum adjuvaret Sol circ. 9° uno mense, et in quarta $2^\circ 15'$. Cum autem in una quarta eccentricitas menstrua de 90° possit retardare $2^\circ 30'$, perparum erit, quod de hoc $2^\circ 15'$ retardare possit.

Etsi igitur valet haec hypothesis pro variatione Tychoi dicta, non tamen valet pro augmento aequationis, quod ipsum majus est hoc toto.

Neque sana sunt, quae d. 8. Nov. 1601 disputavi, quod centrum aequantis a centro eccentrici in quadra sit duplo altius. Nam aequantis causa inest in ipso corpore motoris. At concipi mente non potest, qui Terra Lunam, in linea $\odot \oslash$ versantem, tardius apogaeam incitet, si illa non absit longius, velocius perigaeam, si non absistat brevius. Nisi forte inhabilitas in ipso corpore Lunae sit in apogaeo versantis alia, quam si alia esset anomalia; quod incredibile est nec mente concipi potest. Restat igitur ut dicamus, Lunam insita vi corporis, cum in Terram $\delta\chi\sigma\tau\omicron\mu\omicron\varsigma$ porrigit diametrum, valentior esse et sic eccentricitatem causari majorem.

21. Apr. 1616.

Ut recte contempleris variationem, diduc eam per sinus. Nam si sinus totus valet $2^\circ 15'$, dimidius valebit $1^\circ 7\frac{1}{2}'$.

Omnino differemus a Braheo, si variationem retulerimus ad naturam. Nam si naturalis est causa variationis, dispensari debet sinibus versis distantiae a quadris, quod attinet vires in momentis singulis. At versi initio notabiliter, fine insensibiliter decrescunt, cum variatio Braheana aequaliter incipiat desinatque. Maxima igitur erit variatio non in 45° sed in 30° . Addantur in unum, primo sinus totus seu sinus vers. quadrantis, deinde ceteri.

Ex Martialis p. 211 (335): sit tangens $89^\circ = 5729869$

secans 5728996

11458865. Si haec summa valet $2^\circ 15'$,

quid 100000? quid 15? — 1) $4' 42''$; 2) non unum secundum. Variatio igitur $4' 7''$. Si 60 das 55. 53 ($60 - 4' 7''$), quid 30. 29? — $28' 24''$, in quadris mediocri; $32' 35''$ in copulis mediocri. Haec res videtur eclipses \odot et \oslash turbatura.

Videtur simplicior et verisimilior ratio, ut ipsa summa omnium virtutum mensuretur a sinu ejusque locis, et virtutes in momentis aequiparentur differentiis sinuum. Tum si 100000 valet 135, quid 1745 et quid 15? — $2' 22''$ et $1' 12''$. Centies vicesima pars est incrementum finale incrementi initialis, cum in Braheo sit aequale.

Vide, an multo diversum prodeat, si colligamus sinus parallelos diametro, seu sinus distantiae a copula, sic ut quilibet sinus valeat vires momentorum, summa opus confectum. Si 5729432 valet 135, quid 100000? — 2, 36; et quid 1745? — Hic initium plane idem, finis habet incrementum $2'' 30'''$, quasi $\frac{1}{100}$ initialis. Si 30 praestae

diebus rediret ad ☉ Luna, horarius esset 30'. Hoc est, si $\frac{30}{365\frac{1}{4}}$ anni. At si 360 dat 30, 12 dat 1, quid $365\frac{1}{4}$? — $30\frac{1}{12}$, sunt 30 d. 10 h. 30'.

Pone ut natura dederit viribus Terrae puras revolutiones 360, Lunae 12, venientes a puris Terrae revolutionibus; Sol vero incitationibus suis efficiat alias Terrae $5\frac{1}{6}$. Tunc si 360 dant 12, quid $5\frac{1}{6}$? — $\frac{63}{360}$. Terra ad fixas 361^{ies}, ☽ ad fixas 13^{ies}. Sed ☉ addit

in ☉ $5\frac{1}{6}$. Si 361 dant 13, quid $5\frac{1}{6}$? — $\frac{273}{1444} = 68^\circ 3' 39''$. Ergo Luna ultra 13 revolutiones sub fixis agitur per $68^\circ 3' 39''$ a Terra; a ☉ per $5^\circ 40' 18''$, restant $62^\circ 23' 21''$

an. 365^d 4^h 9^m 37^s 23^{ss}
6^h 3. 2. 52

28
4. 12. 40. 43
2. 8. 3. 39

2. 4. 37. 4

64. 37. 4 incitatio ex ☉ sub fixis.

Haec reduce ad ☉ sic: 13 dant 12, quid 64. 37. 4?

pars $\frac{1}{12}$ 5. 23. 5

a ☉ 59. 14

Si ergo Terrae gyratio non incitaretur a Sole, in anno gyraretur 360^{ies}, et circumferret Lunam 12^{ies}. Sed quia incitatur a Sole, in hac proportionem circumferret Lunam amplius per 63 gradus. Residuum usque ad $2^\circ 12' 40' 14''$, sc. $69^\circ 40' 14''$ inclinat Sol Lunam. Divide residuum $69^\circ 40' 14''$ in revolutiones 12 et gradus 63. Si 1. 13. 3 dat $69. 40. 14$, quid 1. 30? — $1^\circ 25' 50''$.

Promovet ergo Sol Lunam in anno per $59^\circ 14'$, id est in revolutionibus ☽ circa ☉ 12 et $62^\circ 23' 21''$; quid accedit uni gradui seu 2 horis? quid uni quadrae, quid uni revolutioni ad ☉? 1. 12. 2. 23. 21

1
1. 13. 2. 23. 21.

Eo igitur tempore, quo de Luna volvendi essent 90, revolvuntur $91^\circ 25' 50''$, nimirum in $7\frac{1}{2}$ diebus. Horarius enim sine incitatione ☉ manet hic 30'. Et quia in 2 horis gradus esset revolvendus, igitur in 2 primis horis a copula ultra gradum revolvitur $1^\circ 1' 29''$, in hora $30' 44\frac{1}{2}''$.

Haec incitatio dupliciter variatur, primo propter apogaeum ☽, deinde propter aphelium ☉. Illa variatio sic comparata est secundum meam intentionem, ut incipiat a linea ex ☉ per centrum eccentrici ☽: quadrans a puncto contactus eccentrici ☽, superiores igitur quadrantes, qui sunt longiores, plus etiam incitantur, cuilibet gradui competit modulus incitationis aequalis, sive supra sive infra sit, modo in aequali propinquitate ad lineam per centrum eccentrici; durat autem incitatio usque ad punctum contactus. Ut si orbis ☽ est $\frac{1}{12}$ orbis ☉, durat incitatio superius usque ad $92^\circ 52'$ utrinque, inferius ad $87^\circ 8'$ utrinque. Sed nec linea per centrum eccentrici recte secat eclipticam nisi in 4 locis, nec puncta contactuum manent eadem, propius n. coeunt, si ☉ in perihelio. Et fortasse fortior est incitatio in inferiori semicirculo, quamvis contrarium speciei motrici.

Quodsi dat 100000 in horam proxime copulam $44\frac{1}{2}$, quid 101800? — $3\frac{1}{2}$. (†) In apogaeo 3'. Vide quid sequatur in distantiam a copula 30, 45, 60? Summa sinuum 179 semicirculi est 11458865 valetque 141, quid $2^\circ 51' 40''$?

Summa sin. 30 45 60
 $\frac{79259831 \times 8503}{11458865} = 58; \frac{171346716 \cdot 8503}{1145 \dots} = 12; \frac{290801743 \cdot 8503}{1145 \dots} = 21$

8 30. 9. 18 8 9 45. 21' 29'' 5 7

60. 43. 34

30. 11. 52	45. 25. 40	60. 43. 34	91. 25. 50
30. 14. 18	45. 42. 55	60. 28. 37	91. 25. 50
35. 4	40. 29	20. 6	0. 0

Hinc apparet, non posse me quadrante praestare, quod Braheus praestat semicirculo. Oportet ergo ab observationibus esse munitos, ut sciamus, non tantum velocem esse diurnum in copula, sed etiam tardum in quadraturis.

Consideratio tertiae partis aequationis temporis.
Anno 1616.

Cum Tellus interim, dum sub idem fixarum punctum circa Solem restituitur, circa suum axem volvatur 365^{ies} cum quarta paulo amplius (cujus argumentum sunt $6^{\circ} 9'$) volvatur vero virtute propria tantum 360^{ies} , reliquae revolutiones 5 h. 6. 9' seu horae 126. 9' h. e. $2^{\circ} 6^{\circ} 9'$ sint ex promotione Solari, et varietur haec Solaris promotio cum distantis Solis a Terra, ut non tanta sit ubi Terra multum distat, quanta est ubi Terra parum distat, sicut ratio distantiarum in promotionum modulis permutetur, et sicut se habet aphelia distantia ad periheliam, sic se habeat perihelium promotionis modulus ad aphelium et vicissim (cum ubi tarda promotio, ibi longa mora), sic etiam se habeat mora apogaea in aequali modulo promoti itineris ad moram perigeam: promotionis igitur totius, quae facit horas $2^{\circ} 6^{\circ} 9'$, summa sic dividitur inter semicirculos anomaliae coaequatae Solis, sicut dividitur summa distantiarum omnium graduum integrorum anomaliae eccentrici inter arcus eccentrici, respondententes anomaliae coaequatae.

At distantiarum dictarum summa sic dividitur inter semicirculos anomaliae coaequatae, sicut dividitur planum eccentrici a linea per Terram in terminos semicirculorum anomaliae coaequatae ducta, qui termini quadrante distant ab apsidibus. Causa est, quia non tantum plures sunt in arcu superiori, sed etiam longiores. Pro eo igitur, quod plures sunt distantiae in arcu superiori, habemus plures etiam sectores, pro eo vero quod longiores, habemus triangulum, quod cum sectoribus constituit planum superius. Planum igitur eccentrici dividitur a linea per Terram et per $6^{\circ} \gamma$, \approx in partes has: $184^{\circ} 7' 32''$ (quanta illi semicirculo anomaliae coaeq. respondet anomalia media) et $175^{\circ} 52' 28''$. Si ergo planum totum 360 vel $6'$ valet $2^{\circ} 6^{\circ} 9'$ promotionem totam, quid valet pars plani $184^{\circ} 7' 32''$ seu $3^{\circ} 4^{\circ} 7' 32''$? patet quod $3'$ valeat $1^{\circ} 3^{\circ} 4' 30''$ horas; residuum $4^{\circ} 7' 32'' \times 2^{\circ} 6^{\circ} 9' : 6' = 1^{\circ} 26' 44'' 23''' 18''''$.

Itaque in uno quolibet quadrante superiori haec pars aequationis efficeret scrupula horae $43' 22''$ addenda, sic ut is tanto esset tardior, quam horae $1^{\circ} 3^{\circ} 4' 30''$ (et revolutiones 92. 3. 44). — Veruntamen hic oculi sunt aperiendi. Nam haec $43' 22''$ minuta temporis diximus addenda ob promotionem Solarem quadrantis superioris ob duas causas: 1) quia major arcus, 2) quia longius distat, h. e. quia plus temporis unicuique gradui competit. Atque etiam vulgo, cum totum compositum tempus ex 360 et ex 5. h. 6. 9' distribuimus inter semicirculos anomaliae coaequatae, tunc iisdem utimur causis. Quare possit alicui videri, nos hac separata divisione dierum 5. h. 6. 9' nihil novi facere? Respondeo, omnino dissimilitudinem esse. Cum enim tempus compositum d. 365. h. 6. 9' dividitur, omnes revolutiones ponuntur aequales esse tempore; cum vero seorsim dividuntur d. 5. h. 6. 9', hoc ipsum quaeritur, quanto sint pauciores horae, quae superiori arcui competunt, sc. quanto tardiores revolutiones.

Discussa hac objectione jam tanto facilius etiam aliam expedimus cautionem, et corrigimus aut confirmamus inceptum. Verum est, quod proportio partium plani composita sit ex proportionibus duabus, una arcuum eccentrici, altera distantiarum. At prius elementum non minuit numerum horarum promotionis Solaris, sed auget, posterius vero minuit, quia revolutiones ipsas totas 24 horarum prolongat in tempore. Ac cum sint elementa proportionis compositae aequalia proxime, sed altera directa, altera permutata, ergo valet compensatio, gignens proportionem aequalitatis. Itaque arcubus tam superioribus quam inferioribus competunt dimidia promotionis Solaris; sc. $1^{\circ} 3' 4' 30''$. Ergo per arcum superiorem contingunt revolutiones 184. 7. 32, i. e. h. 3. 0' 48'', et h. $1^{\circ} 3' 4' 30''$ i. e. revol. 2. h. 15. 4' 30'' junctim rev. 186. h. 18. 5' 18''. At via usitata et simplici:

$$360^{\circ} \text{ an. med.: } 365. 6. 9 \text{ dies} = 184^{\circ} 7. 32 \text{ an. med.: ?}$$

$$6 : 6. 5. 15. 22. 30 = 3^{\circ} 4' 7' 32'' : ?$$

$$\text{Resp.: } 3. 6. 48. 50. 5. 58. 15 = 186. \text{ h. } 19. 32. 2. 23. 18 - 186. \text{ h. } 18. 5. 18 = 1. 26. 44. 23. 18$$

$$\text{Dim. } 43. 22. 11. 39.$$

Revertimur etiam sic ad numeros priores, sc. quia totum, quo superior plani pars abundat, detrahimus promotioni, quae competit superiori semicirculo anomaliae coaequatae secundum viam usitatam. Ergo amplius considera, an hoc fiat recte. Cum numerus revolutionum 365 etc. dividitur inter semicirculos anomaliae coeq., tunc vi hujus divisionis dividuntur etiam supernumerariae eadem proportionem, ut detur superiori h. $1^{\circ} 4' 31' 14''$, secundum proportionem partium plani: poniturque, quod quanto longius distet pars a Sole, tanto etiam plures horas aequales de Solari quidem proportionem Terra in eo moretur. At quia jam supponimus, quanto plus pars distet, tanto etiam lentiores esse horas, quanto igitur plures esse debebant horae aequales, tanto lentiores sunt horae inaequales de promotione quidem Solari. Quanto lentiores vero, tanto et pauciores. Ergo quanto plures esse debebant aequales, tanto pauciores sunt inaequales, quam aequales. Admetiri igitur debemus arcui eccentrici horas de promotione Solari proportionali numero, sed inaequales. Nihil attinet haec inaequalitas horarum ipsius eccentrici arcuum inaequalitatem, et fit per accidens, ut et numero et temporis aequalis summa illis respondeant. Cum ergo unam causam remittimus, distantiam sc. alteram retinemus, quantitatem arcus, dimidiamus omnino suprapositam summulam differentiae.

Ergo arcus eccentrici, respondens quadranti coaequatae superiori est $91^{\circ} 1' 53''$. Si totus eccentricus 360 valet numerum horarum inaequalium $2^{\circ} 6' 9''$, quid 1. 1. 53? R.: $21' 41'' 5''' 50''''$. Ergo de promotione Solari respondent arcui eccentrici 1. 3. 47. 52 ($21' 41'' 5''' 50'''' + 31^{\circ} 32' 15''$ (quarta promotionis Solaris) = $31^{\circ} 53' 56''$, dupl.: 1. 3. 47. 52). At anomaliae mediae h. 1. 4. 31. 14 dist. arcus superioris 43. 22; pro quadrante dim. 21. 41. Porro numerus minutorum horariorum est pars tertia et sexagesima numeri minutorum aequationis eccentrici. Ecce: 1. 1. 53 aeq. ecc. Itaque ex minutis aequationis eccentrici facile tempus hujus tertiae partis aequationis habetur.

$$\begin{array}{r} 20. 38 \text{ Tertia} \\ 1. 2 \text{ sexages.} \\ \hline 21. 40. \end{array}$$

Comparatio Variationis et hujus aequationis temporis.

Terra suum ipsius corpus volvit cominus, Lunam circumagit eminus per speciem sui corporis rotatam. In utroque opere Sol mittit illi suppetias, sed quibus illa utitur arbitrata suo.

Convenientissimum esset, si ut 360 ad 12, sic 5^d h. 6. 9' essent ad $\frac{122}{100}$, quantum Luna currit ultra 12 revolutiones in anno. At non est ita $5\frac{1}{4}$ ad $\frac{11}{10}$, i. e. $5\frac{1}{4}$ ad $\frac{11}{10}$ vel $\frac{11}{10}$ ad $\frac{11}{10}$. Nam illa amplius duplo est major hac.

Ergo summa adjumenti Solaris ad volutionem Terrae non causatur variationis effectus summam, sed sunt isti duo effectus separati ab invicem dimensionibus. Deinde sunt et modis separati motus. Variatio intenditur et remittitur totaliter menstruatim, prout Luna in diametro luminum fuerit, volutionis incitatio continua est magis, nec nisi parum remittit annuatim. Tertio et causis distinguuntur. Virtutem volvendi corpus proprium Sol confortat in Terra per tenuitatem vel densitatem suae speciei: at virtutem circumagendi Lunam Sol confortat in Terra per figuram illuminationis Terrae, et vere per figuram, non per quantitatem circuli, qui insensibiliter variatur: sed neque per fortitudinem vel debilitatem illuminationis. Nam cum variatio praestet gradus 132, praestaret igitur in 6 revolutionibus aestivis per 90^{am} et hujus 30^{am} minus quam dim. 66, quia aequatio eccentrici maxima est 1° 1' 53". Eadem n. est proportio quadrantis ad simplam aequationem, quae semicirculi ad duplam: $90 : 66 = 1^\circ 1' 53'' : x; 45' 22'' 52'''$.

$$1. 30 : 1. 6$$

$$15 : 11$$

Igitur in semestri aestivo per 45' 22" minus colligeremus in variatione. Id vero non apparet; potius enim per 10' plus observamus. Ergo non per fortitudinem illuminationis Sol confortat Terram in volvenda Luna.


Contra per figuram confortari patet ex modo, quia ubi disci species apparens evanescit, ibi et confortatio nulla, utcunque fortiter Terra illuminetur. Superest unica objectio, si Terra movet Lunam per speciem corporis moti, quippe in plagam eandem, annon et per speciem celeritatis moveat celeriter vel tarde. Non hoc quaero, an species haec celeritatis vel tarditatis recipiatur in mentem motoris, ut is eam in motu Lunae exprimat, alias vinceret totum assem aut certe nunquam sineret Lunam tardiolem velociorem fieri suis legibus, materialis mihi species ip. animo est, quae necessitate materiali agat, quae ipsa sit Lunae motor, quae debilitetur attenuatione in latum, non debilitetur attenuatione in longum, compensatione facta attenuationis per laxiorem particulam ambitus, aequae celerem.

Quae hic causa esse possit, cur, cum movendi munus reliquum celeritate sua dispenset, non etiam agat pro celeritatis hibernae et tarditatis aestivae modulis? Praesertim cum ex numeris appareat, superfluos 12° Lunae annuos etiam a 360 volutionibus Terrae pendere, non tamen a superfluis $5\frac{1}{4}$ revolutionibus, quae inaequales ponuntur? Dicendumne, tarditatem speciei compensari tempore longiori, ut tanto sit efficacior quilibet radius (cum latitudine sumtus, ut sector globi) quanto diutius movet, seu quanto diutius tenet Lunam: quod non esset, si totum assem vinceret, tunc enim idem radius semper teneret Lunam, itaque Luna necessario tam celeris vel tarda esset, quam Terra. Nec potuit idem dici de Lunae ipsius tarditate apogaea: quia tunc non est idem radius, quippe tenuior secundum latitudinem, non idem ut sector globi, sed tamen idem ut sector circuli: et quia pondus Lunae gravius. —

Ad haec respondeo 11. Apr. 1620: Terra specie corporis movet Lunam per 349, illuminatione per 11. Illa vis ex se ipsa est aequabilis, haec acceleratio sit sane inaequabilis, sicuti in ipsa Terra est inaequabilis. Cum autem aequatio temporis physica sit adhibenda 21' 41" pro totis

360, de ea 11 sint pars $\frac{1}{11}$, et haec particula sequitur sane incitationem Telluris inaequalem, itaque tota particula sc. 39'' remittenda de aequatione physica, ut maneat 21' 2''. (21' 41'' : 33 = 39)

Fig. 11.



Sit A Sol, B Terra, C centrum eccentrici Lunae in quadris, CE dimidium ipsius CB, libretur autem centrum eccentrici in DC diametro, quae sit ipsi AB parallela. Sit FC motus apogaei ab opposito Solis retrorsum, cujus sinus HC vel BG, qualium BC est sinus totus. Cum autem BC sit dupla ad CE, erit etiam GC dupla ad CD, et centrum eccentrici hac vice in D. Qualium igitur BC est 100000, talium CG est sinus compl. FC, et DC ejus dimidium et tota DG sesqui. Erat vero BG sinus. Ut vero sinus ad sinum complementi, sic totus ad tangentem complementi. Ergo sesquitangens complementi FC quaesitus in tangentibus detegit angulum DBG, cujus compl. est FBD, motus apogaei verus. Pro eccentricitate BD nota: sicut GB sinus ad BC totum, sic totus ad secantem compl. ipsius FC. Rursum ut BG ad BD, sic totus ad secantem anguli DBG, complementi $\angle FBD$: per compositionem ergo, ut BG ad BC, BD, sic totus ad secantes complementorum. Dantur ergo ex secantibus BC et BD in eadem mensura. Atque BC debet esse 4362. Si ergo BC numerus ex secantibus valet 4362, quid BD numerus ex secantibus?

Exemplum: Sit FC 30°, compl. 60°. Tang. 173205, sec. 200000. dim. 84402 $\frac{1}{2}$.

FBD = 21° 33' 13. sec. 259807 $\frac{1}{2}$.
Tang. 68° 56' 57''; sec. 278383 \times 4362 (BC) = 12131.66, dim. 6066 (BD).

Ad probandum, an haec composita eccentricitas 6066 et motus apogaei inaequalis eandem exhibeat aequationes, quas elementa et motus apogaei simplex, maneat igitur haec dispositio

apogaei in 30° ante Solis oppositum. Primo sit Luna in apogaeo, erit aequatio prima 0, et cum sit per 30° ante Solis oppositum, erit ejus aequatio secunda talis. Cum enim Luna crescat appropinquans oppositioni, distantia ☉ ab apogaeo ☾ 210° dat scrupula 51' 58'' adjectoria. Et cum ☉ sit vicinior perigaeo ☾, ergo dist. ☾ ab ☉ ☾ 330° vel 30° dat aequationem menstruum 1° 12' 35''; duc in 51' 58'', aequatio 1° 2' 32'', addenda per elementa aequationis. Per compositam vero aequationem, cum sit apogaeum in 21° 34' ante ☉ ☾ et ☾ per 30°, ergo habet etiam aequationem adjiciendam. Quodsi simplex esset eccentricitas 4362, aequatio esset 0° 44'. Si 4362 dat 44, quid 6066? — 61; ecce fere.

Sit vicissim ☾ in ☉ ☾, erit ejus aequatio secunda 0; prima vero sic habebitur: cum enim distet per 30° ab apogaeo aequabili, habebit aeq. subt. 2° 23', nec ei quicquam adjicitur. Per compositam vero hypothesin ☾ distans ab apogaeo inaequali per 21° 34', haberet per eccentricitatem 4362 : 1. 45 = 105. At si 4362 dat 105, quid 6066? 146 = 2° 26''.

Consideratio hujus hypotheseos exactior.

Cum Luna est apogaea, tunc motu medio esset in N, at propter distantiam a Sole est in M, et hoc quidem loco promotior. Et cum DBC sit $8^{\circ} 26'$, erit etiam KDM tantus; sed KDM est hic compl. anomaliae compositae; quaeritur aequatio MBN. Respondet anomaliae $8^{\circ} 26'$ aequatio $41' 45''$, hic addenda. Et quia \odot distat ab apogaeo $\supset 210^{\circ}$, scrupula longitudinis superiora sunt $46' 48''$, quae duc dimidiata in 41. 45, prodit 58. 2; ergo MBN vel DMB est ex composita eccentricitate $58' 2''$, igitur KBM est $7^{\circ} 27' 58''$.

Quodsi \supset motu medio perrexerit $8^{\circ} 26''$, veniet in K, et hic non egebit aequatione. Nam quantam habuisset aequationem subtrahendam in eccentricitate simplici, tantum est promota per elevationem centri ex C in D. Esset autem aequatio subtrahenda paulo minor quam $58' 2''$, ut apparet ex parallelis, scilicet, quia eccentricitas BC minor, quam BD. Est ergo attendendum, quando \supset motu medio sit in K. Auferendus sc. est hoc loco \angle DBC ab anomalia media, sive ei aequalis KDM. Ergo si fingas centrum in C, Lunam ponis in O, sin illud in D attollitur, Luna erit in K. Per anomaliam vero OCN ex eccentricitate simplici excerptur COB subtractoria aequatio $41' 45''$. Itaque BO erit per $41' 45''$ antierius quam CO vel DK.

Quare qui usurpat OCN h. e. KDM vel KBN pro OBN, ille dicit, quod elevatio CD hac vice effecerit $41' 45''$.

Pone jam \supset in O. Posito igitur centro in C, anomalia PCN daret subtractoriam CPB, sed posito centro in D, anomalia non IDM sed IDK minor dabit aequationem DIB minorem, quamvis per eccentricitatem BD majorem.

Artificialiter: Linea motus apogaei medii est BCN. Linea motus apogaei veri est DM. MDR est anomalia media ut et NCQ; MDK est aequatio anomaliae, KDR anomalia composita, DB eccentricitas composita, DRB aequatio longitudinis \supset . Datur igitur BL, linea motus \odot veri, BCN linea motus apogaei \supset medii, NCQ anomalia media, ut et MDR. CQB aequatio simplex. Datur etiam DC, quae semper est dimidia ipsius HB, si CH perpendicularis, ergo per eam datur KDM vel DBC, quare et KDR, anomalia composita. Quodsi DB aequaret BC, tunc DBR esset aequatio simplex, sed quanto DB superat, tanto major est composita DRB.

Sit commutatio annua $2^{\circ} 20' 46' 21''$, quae dat compositionem anomaliae $4^{\circ} 28'$ subt. Sit anomalia media $4^{\circ} 20' 19' 24''$ ($- 4^{\circ} 28'$) = $4^{\circ} 15' 51' 24''$ ($- 3^{\circ} 40' 42''$) = $4^{\circ} 12' 10' 42''$ An. comm. coaeq.


3. 37. 12 aeq. an. 4. 20. 19	Ap. 6. 20. 21. 25
0. 58 commut. annuae	Compos. add. 4. 28
3. 37. 12 respondent scrup.	11. 7. 0. 7
3. 30	Variatio 33. 11
3. 40. 42	7. 33. 18

Hypothesis Latitudinis.

Cum prima phasis nodum Ω spectat, inclinatio menstrua nulla est, inde prima phasis a nodo Ω it in consequentia, et simul celeriter, modulo sinuum, inclinatio oritur in plagam septentrionis, a qua denominatur, appropinquans phasi primae, limes boreus: denique tardissime modulo sinuum magnorum

consummatur inclinatio borea, cum phasis prima spectat limitem boreum. Tunc inclinationis planorum sectio eadem est cum sectione planorum latitudinis (i. e. orbita \curvearrowright , concentricus \curvearrowright et ecliptica se secant eadem linea). At cum phasis prima digreditur a limite boreo, inclinatio limitis cognominis initio tarde remittit (quo naturae principio?). Tunc sectio eclipticae et orbitae \curvearrowright in consequentia transponitur (antea in antecedentia) crescente initio additamento, fine item decrescente.

Fig. 12.




Sit AC eclipticae circulus, AB orbita ordinaria, CB menstrua. Est BAC 5° perpetuo, ABC est inter $0^\circ 18'$ et $0^\circ 0'$ daturque, et AB est aequalis discessui phasis a limite; quaeritur AC promotio nodi ex BA et angulis A, B.

Cum jam phasis prima spectat nodum \curvearrowright , ab hoc puncto temporis oritur inclinatio in austrum iisdem legibus ut prius. Nunquam boreus semicirculus inclinarius fit austrinus, nec austrinus boreus, sed annuunt et abnuunt mediae orbitae semper lege parvorum sinuum, quoties vel appropinquant vel digredi incipiunt.

Triangulum convenit in Pitisco IV. proportionum axiomati per accidens (pro AB constituitur angulus ex complemento ipsius AB ad semicirculum) et quaeritur primo ACB, inde AC.

Fig. 13.



Sed quia triangulum parum abest a plano, possumus uti ut plano, ut 3 anguli ejus aequent 2 R. At cogita, triangula valde longa fieri. Propter difficultatem igitur transfer oculos ad polos. Sit O polus eclipticae, Q polus orbitae Lunae ordinariae, OQ 5° . Sit QP $0^\circ 18'$. Declinet jam alter circulus ab ordinario, sed ejus limes respectu ipsius digrediat in consequentia, qui si non variaret inclinationem, efficeret quadrantem PSR, sed quia paulatim remittit lege sinuum, igitur pro R venit in Q. Et quia sinus omnes ordine disponuntur ab uno centro terminis alteris in vicinia quadrantis, videntur igitur facere circellum. Id sive sit sive non, certe dantur anguli SQO, et lineae SQ, QO. Erit ergo SO latitudo quovis tempore maxima et SOQ prosthaphaeresis.

Forma processus gemino exemplo. Discesserit \odot a nodo $1^\circ \dots 89^\circ$.

			$0^\circ 0' 19''$	
			5°	
0. 18. 0	Latus minus $0^\circ 18' 0''$		$5^\circ 0' 19''$; sin. $85^\circ 0' 19'' = 99620,27$	
85.	majus 5			99618,66
85. 18. 0		$5^\circ 18'$		1,00
Sin. $85^\circ 18' = 99663,7$		$84^\circ 42'$		80
Sin. $84^\circ 42' = 99572,5$				
	91,2			
	45,1 (45,6)			
Sin. anguli 179 : — 199984,77 \times 45,1 = 90,19313				
		99663,7 — 90,193 = 99573,5 = sin. $84. 42. 21$		
Sin. 91 : — 101745,24 \times 8,02 = 813961,92.				5. 17. 39
(Sin. $85^\circ 19''$) 99620,272 — 0,8139 = 99619,458 = sin. 85° ; compl. $5^\circ. 19'$				
Compendiosius haec investigantur per secantes.				

In gradu 45 maximus est cum ângulus prosthaphaereticus, tum etiam diversitas inter latera et basin distantiae polorum. Nam ad 5° adde 9', ergo rectangulum sphaericum habet haec latera: 5° 9' et 0° 9'.

$$\text{Sec. } 5^{\circ} 9' = 100405.325$$

$$\text{Sec. } 9' = 100000.34270$$

$$\hline 100405.325$$

$$301$$

$$40$$

$$27$$

$$\hline 100405.6687. \text{ Hic secans ostendit tantum}$$

9" plus, ubi maxima differentia.

Ut vero 5° 9' 8" ad totum, ita 0° 9' 0" ad 1° 40' 14". In inferiore sunt paulo minores superioribus.

• Etsi igitur subtensa seu basis tantulo semper est major, potest tamen tato contemni in computando, et scrupula proportionalia latitudinis possunt accommodari ex perfecta lege circuli; et quantitas 9' seu 540" distribui secundum sinus binorum integrorum graduum.

Hypothesis Lunae mutata. 9. Apr. 1620.

Cum eclipses Lunae (assumpta parallaxi apogaea in anomalia soluta a priori) illae sc. quae fuerunt a. 1616 et 1620 videantur respuere eccentricitatem novam in copulis, cogitandum, utrum rationes physicae sic institui possint, ut ea careamus, retenta tamen duplici latitudine. Nam ut ab exemplo latitudinis caveamus, prius illud velitabimus. Si quis diceret, Lunam quidem excurrere in latum, ut facturam latitudines simplices, in lateribus vero appropinquare, ut ângulus 5° appareat 5° 18'; Tang. compl. 5° = 1143005 primum haec appropinquatio superaret ipsam eccentricitatem, deinde consentaneum esset rationibus physicis, ut etiam acceleraretur; in quadris retardata est potius. Non est igitur augmentum latitudinis ex appropinquatione, sed est reale ex inclinatione seu libratione.

Igitur ad longitudinem. In schemate (N. 11) sequitur omnis noster effectus, si in hoc situ centri veri eccentrici, puta in C, computentur quidem aequationes eo mense simplices ex eccentricitate BC per ângulum et aream trianguli. Menstrua vero computetur sic, ut in BL lineam copularum cadat ex C centro eccentrici perpendicularis CH, et H sit centrum novi aequantis linearum BS, ut $\angle SBL$ non valeat, nisi post accessionem temporis a $\triangle BSH$ signati, quod ideo erit paulo minus in semicirculo crescentis vel senescentis, in quo non est apogaeum, quippe brevius, ita ut omnia haec triangula summam faciant minorem, quam omnia semicirculi oppositi senescentis vel crescentis \cap in quo est apogaeum: nec id injuria; cum ipsa per se tempora illius semicirculi etiam sine hac posteriori aequatione sint majora.

Cogitemus nunc de causis. Quomodo potest fieri retardatio sine elongatione a fonte? Sane elongatur: nam dividitur eccentricus a plano circuli illuminationis Terrae in 2 inaequalia. Quia ergo C est elongatum et a corpore Terrae quantitate BC, et a plano circuli illuminationis quantitate CG, h. e. quia fibra magnetica inclinatur et ad lineam ex Terra et ad lineam in plano illuminationis; elevata vero fuit super utrumque per solam fibram

motu simplici, sed duorum respectuum: quatenus igitur simplex, dat unam partem aequationis, opticam, quatenus duorum respectuum, dat duas partes aequationis physicae. Sed quae causa, quod tantundem facit elevatio super corpus, quam super circulum illuminationis? An circulo toti tantundem virium est, quantum Terrae ut corpori? Cur ergo non etiam trahit circulus, quia ponimus eccentricitatem nullam novam fieri? An tractio corporum affectus est, incitatio etiam luminis, sane quia per speciem corporis emanantem, ut et lumen est species? Illa vero tractio est per cognationem internam. Incitat igitur lumen Telluris, prout vel cavitas vel gibbus ab exilitate lineae in amplitudinem ellipticam et denique circularem excrescit. Diceret, incitationem fieri pro ratione phaseos, ut quia in dimidia illuminatione simplex est incitatio, igitur in plena Luna est dupla, et quia in dimidia obscura simplex, in tota igitur obscura dupla. Nam accrescit dimidium eadem proportionem, qua duplum, id est linea per totas ellipses in totum circulum. At obstat hoc dicturo, quod, si obscurae vim tribuo luminosae aequalem, semper igitur cornu obscurum cum gibbo luminoso, et vicissim cornu luminosum cum gibbosae facie obscura faciunt totum circulum. Non igitur ratione duplicati vel luminis vel obscuri conspectus provenit duplicata retardatio, sed ratione inclinationis circuli illuminationis, plane ut in variatione.

An idem sit negotium variationis et nutus? Idem quidem circellus utilis est, in incrementis quidem, sinus FB, CG, in effectum vero BG vel HC: idem etiam circulus illuminationis utrique mensuram praebet eodem modo, nam totus circulus valet in incrementis sinum FB, in effectum nihil, quippe principium, sicut etiam in nutu, ubi totus est circulus illuminationis, ibi apogaeum est aequatio nulla, incrementa maxima. At vicissim haec est differentia, quod in nutu distantia \bigcirc a \odot partes capit, ut de integris 360; in variatione vero partes aliter capi non possent, quam de 11° minus: aut si maxime pro accumulatione sinuum 90 usurparemus sinus totos 90, non plane duplum fiet id, de quo partes caperet nutus. Quaerenda est igitur causa, cur in nutu circulus illuminationis valeat totum (vel dimidium fortasse), in variatione valeat minus quam 20° .

10. Apr. 1620.

Anne variatio deducitur a quadrato ipsius 19, quod est 361? quia non Terrae tantum illuminatio, sed etiam Lunae consideranda, agendumque per sinuum quadrata, ut major fiat motus in copulis, minor duratio eclipsium, quod postulant observationes.

Computa: Acceleratio quadrantis est $2^\circ 40' 59''$ seu 9659'', sit 9660''. Igitur quadrata sinuum 90 valent hanc summam. Quis docebit nos colligere breviter quadrata sinuum? Extendatur quadrans in rectum cum suis sinibus. Videtur rectangulum continere summam quadratorum sinuum. Facile fit periculum. Ang. 30° est $\frac{1}{3}$ de 90° , ejus sinus est $\frac{1}{2}$ de toto. At in rectangulo sinus pars abscissa erit etiam $\frac{1}{3}$, cum tamen quidem ejus sit $\frac{1}{4}$. Peccat igitur triangulum excessu. Sic agemus per logarithmos. Duplicabimus logarithmos omnium integrorum graduum quadrantis, cum iis excerpemus numeros eosque addemus, initio facto a maximo.

Praecise assequimur numerum 90 et prima summula est ultimae pars 45^a . Si acceleratio 200000, quanta est in 1° , sumeretur nonagies, prodiret 18000000, duplum summae ex 90 inaequalibus collectae, quia semper duo,

ut 199970 et 30, item 199848 et 152 faciunt 200000. Est igitur merito praecise dupla acceleratio defectus Terrae.

15. Apr. 1620.

Causae, cur summa sagittarum fiat 90, et cur praestetur in qualitate idem, quod per epicyclium Tychonis libratorium, inveniuntur in epistola ad Maestlinum hoc mense scripta (vide infra p. 676). In praesens tento ulterius conciliare variationem cum prosneusi. Nam etsi verum est, variatione considerata aestimari vim omnem, qua Sol adjuvat Terram in circumagenda Luna, duplo ejus quod nunc est: sc. $21\frac{1}{2}^{\circ}$; at nondum divisa est variatio a prosneusi. Non enim aestimatur prosneusis vis seu illuminatio totalis 360° , si maxime toto mense totalis maneret. Sume ob id horarios fictos, id est, exstructos ab aequatione quadrantum, qui sunt $30^{\circ} 14''$ et $35^{\circ} 57''$. Si Luna circumiret in perigaeo, cursum absolveret in $600\frac{3}{4}$ horis: si in apogaeo tunc in $714\frac{1}{4}$ horis viam longiorem. Nam illa ad hanc esset, ut 95638 ad 104362. Et causa quidem viae longioris in apogaeo circumiret in 657 horis, itaque debilitatio adjicit 57 horas, quae sunt c. 28° .

Sed erit fortasse faciliior consideratio distantiarum. Sicut enim 104362 ad 100000, sic est virtus mediocris ejusque effectus (detracto effectu variationis $10^{\circ} 44'$) sc. $349^{\circ} 16'$ ad virtutem debilem seu ejus effectum $334\frac{3}{4}$, diff. $14^{\circ} 35'$. Si ergo in apogaea virtute maneret, currens viam concentricam mediocrem, in unius mensis moderni tempore minus curreret per $14^{\circ} 35'$.

Esto jam proportio duplicata distantiarum ex eo fundamento, quod aequatio physica copularum est dupla physicae quadrarum, sitque ut 104362 ad 100000 bis, sic virtus mediocris in copulis ejusque effectus 360 ad virtutem debilem seu ejus effectum 335° , diff. 25° . Itaque si ☾ in apogaea debilitate copulari curreret viam concentricam mediocrem, tunc in unico mensis moderni tempore minus curreret per 25° , pars dimidia $12\frac{1}{2}$. Currat etiam in laxiori circulo et triplicetur proportio, veniet effectus $316\frac{3}{4}$, diff. $43\frac{1}{4}$, pars tertia $14\frac{1}{3}$, cujus sesquialtera est $21\frac{2}{3}^{\circ}$. Cur ergo debilitatio illuminatoriae virtutis totaliter computata dat in prosneusi $14\frac{4}{9}$, in variatione $21\frac{2}{3}$? Considera, utrum vere diversi sint modi collectionis, ut ita in variatione dimidium collectum aequet id, quod in prosneusi colligitur? Sane in prosneusi fit collectio per sinus; nam incrementa suas habent mensuras in sinibus, summas vero sinuum metitur sagitta ultimi sinus (15,23). Sinus toti 90 sunt 90000.00, qualium primus est 1745. Sed sagitta 100000.00 valet omnes, qualium 15,23 valet primum 1745,24 fere.

Si ergo 15,23 valet 1745,24 quid valebit 100000,00? — 1146000000.

1745,24 — 15,23 — — — 872,66.

Si ergo 872,66 sumas 90^{ies} — 78539,40, simpliciter sic sinus toti 90 valent $14\frac{4}{9}$ = $15\frac{2}{3}$, quid 1745,24? — (ἀπορον).

Si totus sumitur 90^{ies} , id omnino plus est, quam si 90 addantur toto minores. Hanc summam velim scire.

16. Apr. 1620.

Imo valor maximi trianguli crescit non cum summa sinuum, sed cum eorum differentiis. Multiplica igitur sinum 1° , id est 1745,24 in 90 — 157071,60 dat $14\frac{4}{9}^{\circ}$, quid 100000.0? Sequitur c. 9° . At in variatione

sunt $10\frac{1}{4}$. Haec cum ab invicem non longe distent, quaeritur, utrum co-temperari possint? Primum variationis quantitas est necessaria ex residuo 12 lunationum, atque illa testatur de proportionem dupla accessionis in copulis, confirmat etiam proportionem duplam retardationis in copulis physicae ad physicam retardationem in quadris. Cum autem pars optica aequationis et partes physicae sint pene aequales inter se, videtur dari ex variatione eccentricitas his positus. Sit enim 1° motus \bigcirc a \odot medii in copulis auctus variatione sua, sic ut pro eo sumantur $1^{\circ} 1' 47''$, utque hoc pacto colligatur ex omnibus variationibus 4 quadrantum summa $10^{\circ} 44'$. Quodsi etiam in prosneusi sinus totus colligit per 90 differentias, ex quibus componitur, summam $10^{\circ} 44'$, quid colligit sinus unius gradus? — $2' 48'' 35'''$. Sit ergo ut $60'$ ad $62' 48'' 35'''$, sic 100000 ad 104683. Esset aequatio optica $2^{\circ} 41'$, tota in copulis $8^{\circ} 18' 10''$. Vicissim sit ut 100000 ad 104683, sic 60 ad 62.38, et quadrupletur 2.38, ut sit $10' 32''$; quodsi hoc datur a 1745.24, quid datur a toto? — $36213'' = 10^{\circ} 3' 33''$ pro variatione.

Quasi variatio etiam, ut proportionalitas dierum $365\frac{1}{4}$, 360, $354\frac{1}{4}$, non a toto residuo $132^{\circ} 45'$, sed a diminuto deducenda sit. Nam si 360 dat $10^{\circ} 3' 33''$, quid 12^{ma} 360 cum $132\frac{1}{4}^{\circ}$ vel $1^{\circ} 14' 12'' 45'$? — $124' 25''$; $132^{\circ} 45' - 124^{\circ} 25' = 8^{\circ} 20'$.

24. Aug. 1620.

Exerceamur. Si accumulentur quadrata sinuum 90 ad totidem gradus quadrantis, summa prodit 45^{ma} primi sinus. Atqui variatio primi gradus in quadrante est Tychoni $1' 26''$. Et quia tanta est et retardatio in gradu 90^{ma} quadrantis, qui est quadrae, dupla igitur erit acceleratio gradus primi, ut ita sit nulla in 90° . Ergo acceleratio erit $2' 52''$. Hoc sume 45^{ma} , erit summa accelerationis $2^{\circ} 9'$ in uno quadrante, et $8^{\circ} 36'$ in toto circulo. Quaeritur quantum accumuletur in anno sidereo, in quo sunt Lunae 12 et $132^{\circ} 45'$ de tredecima? $6^{\circ} 0'$ dat 8.36, quid $1^{\circ} 14' 12'' 45'$? Colligimus

1. 0.	1. 26.	1. 14. 12. 45
-------	--------	---------------

$106^{\circ} 22' 16'' 30'''$, pro his datur nobis ex appendice illa 5 dierum anni 127° , ex appendice ad 12 lunationes 132° etc.

Jam in 1 mense synodico volvuntur de anomalia $385^{\circ} 49' 0''$. Ergo gradui periodico respondent $0^{\circ} 56'$ fere synodici. Si autem gradus primus synodicus habet variationem mea forma $2' 52''$, ergo $56'$ habebunt variationem $2' 40\frac{1}{2}''$. Tanta igitur competit gradui periodico. Hanc possumus comparare cum aequatione physica. Primum si $1' 26''$ colligam nonagies, ac si causa intentissima variationis operaretur toto circulo, tunc praecise duplum colligerem in toto circulo ejus, quod prius collegeram, sc. $17^{\circ} 12'$, unde ablata ut prius parte 15^{ma} , restat $16^{\circ} 3'$. An igitur etiam causa aequationis physicae per totum circulum operari passa, efficiet $16^{\circ} 3'$? Aut quia perinde est, si cum unico primo gradu operemur, quia igitur acceleratur Luna in 1° periodico per $2' 40\frac{1}{2}''$, an igitur etiam aequatio physica illius gradus est tanta? Sane ut 100000 ad 104362, sic $60'$ ad $62' 38''$; en additamentum $2' 38''$, cum ibi sit $2' 40\frac{1}{2}''$.

Igitur variatio Tychonica tanta est, quanta aequationis pars physica periodica. Quantum igitur Luna retardatur in apogaeo, tantum acceleratur in copulis, hoc videtur archetypicum, non vero necessitatis.

Hinc jam facilis est comparatio cum aequatione menstrua. Nam in

menae turgido et pleno retardatio in apogaeo aequalis est retardationi menstruae, vel quia 56 synodici respondent periodicis 60, est igitur quindecima parte minor. Imo nihil hic agis. Nam synodici gradus aequatio etiam censenda est in gradibus et minutis synodicis. Igitur gradus unius primi aequatio physica est $2' 38''$, menstrua etiam $2' 38''$, at variatio $2' 52''$ Tychoni, at ex appendice 132 fit mihi $3' 34'' 40'''$. Igitur physica quidem et menstrua teste experientia sunt aequales, at major est variatio.

Si major variatio, non igitur omnem incitationem exhaurit eccentricitas in apogaeo, nec plane duplicat in perigaeo, relinquit enim illic quartam et hic dat $\frac{1}{4}$. Dici sic posset: intervallo quidem medio 100000 etiam fortificari speciem motricem a lumine, at illi cum augmento vel diminutione intervalli accrescere compositum quid ex utraque causa, ut sic et Terrae et Solis ratione debilitetur vel confirmetur, forte ex aequo, at in mense turgente duplo aequationis physicae argui proportionem, quod sc. Sol duas partes, Terra unam faciat. Atque hoc est contra illos $132\frac{3}{4}^{\circ}$. Nota: 2. 52 est ad 2. 38 ut 11 ad 10. Quia igitur per $2' 52''$ colligimus in anno $106^{\circ} 22'$, ergo per 2. 38 colligemus 96° circiter. —

De latitudine Lunae in eclipsibus. 22. Martii 1626.

T. Brahe Progymn. T. I. f. 130. inserto de latitudine D in eclipsibus praecipit sic: Neque enim opus est longis ambagibus, ut alias, siquidem in plenilunio vero prosthaphaeresis nodorum nullam diversitatem inducat. Hoc idem et ego hactenus in computatione eclipsium cum angulo majori sum secutus feliciter. Sed cum prosthaphaeresis nodorum sit Tychoni menstrua, incipiens a copulis veris, mihi annua, incipiens ab obviatione $\odot \Omega$, hinc adeo sequitur, a me prosthaphaeresin nodorum negligi non posse, aut corrigendum esse praeceptum. Si adhibeo prosthaphaeresin nodorum in eclipsibus, magna sequitur ruina in eclipses partiales Solisque totales, ut in quibus plerumque penes nos Luna fit 3 scrupulis in austrum depressior. Est ergo pensicandum praeceptum computandae latitudinis in Rudolphinis, et conferendum cum hypothesis physica. Primum hyp. physica Epitomes f. 620. plane consentit modo computandi, quem hactenus usurpavi in eclipsibus, ut et Tycho computat per suum angulum. Nam pono fibram latitudinis inclinari semper angulo 5° . Sed cum haec inclinatio est in copulis, tunc illam fortificari a lumine, ut fiat expulsio tanquam angulo $5^{\circ} 18'$, quantum etiam Luna tunc assequitur in quadris. Itaque hoc habet hypothesis physica, latitudines provenire ex angulo $5^{\circ} 0'$ vi fibrarum sola, sed vi luminis eas provenire ex angulo $5^{\circ} 18'$. Ne vero quis existimet, si angulus 5° est fibrarum ipsarum, propterea latitudines ipsis copulis provenire ex angulo 5° , quasi nihil adjutas lumine, propterea quia lumen a copulis incipiat. Secus enim se res habet. Computatio quidem incipit a copulis, sequens accumulationis adjumentorum leges. At lumen ampliat angulum toto eo tempore, quo Luna ex quadra per copulam in quadram transit, et ampliat illum pro modulo propinquitatis nodi ad copulam. Cum autem termini ecliptici excurrant usque ad $17^{\circ} 19'$, in tanta remotione nodi a Sole latitudinis angulus fit $5^{\circ} 17' 10''$. Etsi igitur Lunam totos $17^{\circ} 19'$ pateremur a nodo evagari, latitudo ejus non majore modulo quam $15'$ fieret minor; cum vero eclipsationes non longius pateant a copula quam $1^{\circ} 36'$, patet ob id non deteri plena $2''$ ulterius de latitudine in ipsa eclipsatione.

Jam igitur considera, an sit emendandum praeceptum Rudolphinarum. Id jubet (etiam in ipsis copulis) distantiam \textcircled{D} a nodo aequare per prosthaphaeresin nodorum contraria ratione, quam jubent tituli. Distet $\textcircled{\odot}$ a $\textcircled{\Omega}$ per $17^\circ 19'$. Respondet prosthaphaeresis nodorum $55' 22''$, inclinatio limitis $17' 10''$. In copula ipsa distabit etiam ipsa \textcircled{D} a $\textcircled{\Omega}$ per $17^\circ 19'$, ergo a vero nodo per $16^\circ 23' 38''$. Per hanc correctam distantiam jubet me praeceptum excerpere latitudinem tanquam simplicem; excerpo per angulum $5^\circ 18' - 1^\circ 29' 25''$. Hujus quintam $17' 53''$ tanquam scrupula proportionalia jubet me multiplicare in inclinationem limitis $17' 10''$, prodit $5' 7''$; hoc adjectum ad $1^\circ 29' 25''$ dat $1^\circ 34' 32''$. Atque ex tabula latitudinum eclipticarum per distantiam Lunae a nodi loco medio excerpo $1^\circ 34' 32''$ ad unguem idem. Non est igitur opus emendatione praecepti alia, nisi solo vocabulo „simplicis“. Non esset sane opus, si liceret uti angulo $5^\circ 36'$. Cum autem construxerim tabulam latitudinum Lunae compositam, operae pretium est videre, quomodo ea possimus uti.


Videmur igitur ingredi debere in fronte per dist. $\textcircled{\odot}$ a $\textcircled{\Omega}$, in margine per dist. \textcircled{D} a $\textcircled{\Omega}$ eodem medio, ut negligatur prosthaphaeresis. Vere hoc. Nam quod Maginus utitur nodo aequato, id eodem redit, quia illi cum Tychone prosthaphaeresis nodi est menstrua. At contra: sic (enim) semper esset latitudo composita major simplici, quod non est; igitur inutilis est mihi tabula ista, nisi aliter agamus.

Repetatur consideratio de corrigendo praecepto. Quando est aequatus nodus, tunc latitudo excerpitur minor, etiam illa, quae angulo $5^\circ 18'$ erat excerpenda. Et quomodo tunc augebimus illam per inclinationem limitis? aut quo ex fundamento hypotheseos? Nequaquam igitur est adhibenda prosthaphaeresis nodi propter latitudinem, sed tantum propter nodum ipsum. Omnino totum hoc de aequatione nodi est remittendum hypothesei Tychonis, quae statuit illam menstruam. Latitudo illa, quae excerpitur simplex per locum nodi medium, intelligitur fieri super plano diversimodo ad eclipticam inclinato, in copulis existente nodo, valde, in quadris parum. Interdum igitur hoc planum inclinatur nonnihil in austrum, eccentricus ea parte in boream, quando scilicet limes eccentrici austrinus est in illo menstrui semicirculo versus oppositum Solis, nodus descendens ultra Solem; tunc inter Solem et nodum Luna versante, diminuitur latitudo ex eccentrico per latitudinem menstruam. Id in hypothesei physica non videtur locum habere, sed sapit necessitatem solidorum orbium. Nam in hoc casu fibra in copulis non tangit eccentricum, sed secatur inclinis versus Terram quadamtenus, et in borea transiens lineam copularum pergens ad nodum et eclipticam. An dicemus, etiam in hoc Lunam adjuvari a lumine, ut quorsum pergit, eo trudatur? Et in universum, an motus coelestes non loco sed viribus mensurentur et proportionentur, cum vires intensione et remissione aequae subjaceant quantitibus? Itaque dicemus, quantum alias ratione spatii localis declinaret in latus alterutrum, tantum jam declinare per vires consumtas, eo modulo ad totas, quo modulo spatium est ad totum.

Quare praeceptum debet primo dare latitudinem super plano inclini, dein plani ipsius inclinationem; utrumque per simplicem distantiam a nodo aequabili, illic Lunae, hic Solis.

Quaeritur autem, si formatur et prosthaphaeresis aliqua nodi et inclinatio limitis maxima, cur non etiam per ista possimus computare? Omnino etiam per ista computare possumus, si bene intelligamus hypothesein. Tetigi

Cum igitur inclinatio limitis intermedii cum digressione Solis a nodo decrescat tardissime: hinc jam tandem apparet vitium praecepti, quod adhibet prosthaphaeresin nodorum. Distet enim \odot a nodo 18° , erit inclinatio menstrua $17' 7''$ in limite menstruo (sin. 90° : sin. $18' =$ sin. 72° : sin. $17' 8''$), sed in distantia limitis eccentrici a \odot 72° inclinatio est $16' 17''$ (sin. 90° : sin. $17' 8'' =$ sin. 72° : sin. $16' 17''$), itaque respondet angulus maximus $5^\circ 16' 17''$ fore. Probetur tamen; nam forte transversa fit major. Sit ABD ecliptica, A Sol, AFD semicirculus menstruus, F limes menstruus, BF $17' 7''$, FE 18° , FG 72° , HG 80° , HE 5° , ergo CGD 5° et GD 18° et CDG $0^\circ 17' 7''$, quaeritur GC, CD, BCH. Datur latus cum duobus angulis adjacentibus, quaeruntur duo reliqua latera et angulus oppositus. Invenitur ergo GCI vel KL inclinatio limitis intermedii $5^\circ 17' 4''$ et CD 17. 0. 12. Nodorum prosth. 0. 59. 48, quia G est nodus medius, C verus. Et quia D est locus copulae, et LGM orbita \mathcal{D} , et CD ecliptica, sit ergo CDM rectus et C datus. Ut ergo sinus totus ad tangentem anguli C, sic sinus CD ad tang. DM latitudinem $1^\circ 32' 57''$. $18' = 525220$



57''.	18'	—	525220	
GD = 18°		—	11743	
			<hr/> 642658	14
GI 89. 43.			1. 98
IGD 89. 42. 56			1. 24
CGD 58.				
IGC 84. 42. 56			426.
ICG 5° 17' 4"		238488	426. 14
GD 18°			117436	
CGD 5°			244006	
			<hr/> 361442	
CD 17. 0. 12	Mesol.		122954	
ICG 5. 17. 4			238062	
DM 1. 32. 57	Mesol.		<hr/> 361016	

Mira res; omnia repraesentat iste calculus, quae a tabulis repraesentantur, nimirum tantundem per GD 18° , MGD 5° et per CD $17^\circ 0' 12''$, MCD $5^\circ 17' 4''$, utroque modo DM $1^\circ 32' 57''$.

Omnino igitur videtur in copulis esse debere angulus pro ratione distantiae \odot a Ω magnus, at prosthaphaeresis nulla in copulis, sed tamen extra. Imo vide, quid in causa versetur. Hic enim calculus pollicetur exactissimam aequipollentiam cum Tychone, eoque latitudinem in eclipsibus aequae parvam ut Tychonis est, quantumvis praetendamus, angulum esse magnum. Est magnus, at propinquitas nodi tantum demit latitudini. Non solum autem hic calculus, sed et alter per compositionem latitudinis ex simplici et menstrua plane aequipollet Tychonico modo. Ergo omnino verum est, me extra ordinem magnas adhibere latitudines in copulis eclipticis. Eas tamen patiuntur etiamque desiderant omnes eclipses Lunares partiales, quae et majores vellent latitudines. Sed subvenit Tychonicis latitudinibus semidiameter umbrae parva ob causas opticas et ampliationem luminis Solis. Itaque nisi etiam Solares eclipses postulent magnas latitudines, causa haec patebit satis clare.

Examinatis aliquot Solaribus eclipsibus, patet omnino etiam illas desiderare magnum angulum. Quodsi volumus defendere latitudines Tychonis in octantibus et angulum nihilominus magnum in eclipsibus, oportet tamen, \searrow in Ω in octantibus versante, uti prosthaphaeresi; pro dispartiendo vero illo augmento copulari 18 sc. oportet initio quidem illam *κατασκευη* orbium, quae inclinationes reddit, fundamenti loco ponere, at deinde arcus a copulis inceptos oportet respectu hujus augmenti longos censer; ut sicut vigor promovens \searrow per copulas in longum est validus, sic etiam idem vigor inferens latitudinibus hoc augmentum tam in augenda quam in minuenda sit validus. Et omnino sicut est variatio (dupla) 81 ad $2^\circ 9'$ vel 129, totum quod ex Sole est, sic erit quodlibet augmentum ad totum 18. i. e. distribuetur hoc augmentum 18', vel quantum requirit inclinatio limitis, in proportionem sinuum duplicata. Et videtur eadem esse proportio prosth. nodorum. Sed sic agamus. Primi gradus variatio est $1' 26''$, duplum $2' 52''$, ut ergo summa 129 ad $2' 52''$ sic 18' ad augmentum unius gradus in copula, sc. $24''$. Hoc pacto facile colligeretur augmentum latitudinis per rectangulorum quadrantis proportionem. Sed vide quorsum id sic collectum nobis fieret utile. Pone Ω cum \odot et \searrow \odot . Hic nobis sufficit ad augendam latitudinem sinuum proportio simplex, dupla vitiabit latitudines nimis. Ergo hic spe frustramur. An distribuemus quidem latitudinis augmentum pro modulo inclinationis limitis magnum vel parvum, distribuemus id, inquam, primum cum digressu \searrow a Ω vero et aequato per proportionem sinuum distantiae: et deinde addemus huic augmento aliquid in proportionem variationis? Tunc nihil adderemus in \searrow , δ \odot , nihil in \square . Ita non augeretur nobis vicissim lat. in \searrow , δ , quam diminuit prosthaphaeresis nodi.

Sed dices forte, quantum Ω distat a \searrow \odot vel δ \odot , tantae distantiae \searrow a \odot variationem esse adhibendam ad eruendam variationis latitudinariae portionem in copulis. Quid ergo fiet extra copulas? Nonne etiam sic fieret extraordinaria augmentatio in copulis? Quodsi confugiamus ad compositionem latitudinis tabularem: primum notandum, quod illa repraesentet latitudines Tychonicas etiam sine prosth. nodi, si usurpetur secundum praecepta Radolphina. Et fit ingressus per dist. \odot a Ω et \searrow a \odot in tabulam lat. menstruae, sed per dist. \searrow a Ω in tabulam lat. simplicis. Quomodo ergo

efficiemus, ut augmentum fiat majus in copulis, non fiat majus \supset in Ω versante? An ingrediemur per dist. \supset a \odot amplius, quam per variationem incitatum? Tunc vitiabimus lat. \supset in Ω . Nec causa patebit talis augmenti \supset a \odot dist. supra verum. Ergo videmur eo redigi, ut prosth. nodi faciamus menstruam, inclinatione limitis manente annua. Causa est procul dubio in variatione. Nam maxima prosth. nodi est mihi $1^{\circ} 39'$, id est $99'$, duplum vero variationis est $81'$. Sed variatio ex $5\frac{1}{4}$ appendicibus diebus deducta est 51, duplum 102, plane aequale huic prosthaphaeresi. Si tamen duplicanda variatio? Imo non est duplicanda, variatio n. est tantum excessus trunci quadrantis super sectorem. Ac cum quadrans valeat $129'$, sector octans erit $64\frac{1}{2}'$, adde variationem maximam $40\frac{1}{2}'$, coges $105'$, i. e. $1^{\circ} 45'$, cum prosth. nodi sit mihi $1^{\circ} 39' +$ et Tychoⁿi $1^{\circ} 48' +$. Ecce aequalitatem. Ergo Luna per variationem incitata venit ad nodum perinde ac si duplo magis per variationem incitaretur, tunc quidem, quando Ω est in octante, h. e. non incitatur tantum in longum, sed flectit etiam cursum suum in latus utrumque eodem incitationis vigore: si modo vera sunt exempla latitudinis in octantibus apud Tychonem.

Cum igitur haec nodi reciprocatio sit tantum propter latitudines \supset in ipso nodo, non opus est ipsum menstrua libratione semper aequali aequare; sufficit, illum a Luna inveniri ibi, ubi est per annuam nostram librationem. Nam 7 diebus Luna venit a quadra in copulam, octavo Ω in octante, igitur septimo ex tanta libratione vitium est nullum, quod probo ex eclipsibus, quarto itidem nullum, quia Luna tunc invenit libratum annue. Quatriduo ante primum et post septimum Luna venit in limites, ibi etsi vitiatus est nodus, contemptissima tamen fit mutatio latitudinis: et est quidem vitiatus nodus. Nam is Lunam fugit in latus utrumque in eo quadrante, qui habet nodum. Cum igitur est \supset in \square , nodus est medius; illa exeunte versus nodum, nodus fugit versus Solem, et recedit ab illa, ubi illa trajecterit nodum versus Solem; ut ipse revertatur ad locum medium, ubi Luna in \odot venerit. Ergo cum \supset est ante \square in limite, nodus non fugit versus \odot , ubi est per mean librationem annuam, sed e contrario annuit Lunae et, fugit ipsum \odot . Cum igitur observationes eclipsium testentur, die septimo copulari nullum fieri vitium, oportet neque in quadra fieri vitium. Sane etsi fieret, id difficulter esset observabile, cum ob parvitatem, quae destituitur Solaris corporis evidentia, tum ob raritatem occasionum, ubi \supset observata in \square , Ω in octante. Restant dies obviationi \supset Ω proximi. Atque si proximi, erit etiam prosth. nodi proxime eadem, et sic proxime correctae; ut ita solae quadrae maneant in suspensio, ut dictum.

Libri pars altera. De doctrina eclipsium. Cap. XI.

(Haec disquisitio eo conscripta videtur tempore, quo primum de „Hipparcho“ meditabatur Keplerus.)

Eorum quae ad doctrinam eclipticam accuratius examinandam pertinent, fundamenta optica hactenus sunt demonstrata. Restat nobis opus ipsum. Ut autem juvetur lector in discernendo instituto nostro, simul et necessitatem cernat eorum, quae hic repetuntur, praemittenda est synopsis methodi,

et proportio ceterorum et denique ipsius AE ad 360° dabitur. In triangulo igitur sphaerico AED, rectangulo ad E, datur praeterea latus AE et angulus oppositus ADE, quare et AD distantia nodi ab opposito loco Solis dabitur, et ED elongatio Lunae ab illo nodo, quod erat quaesitum. Atque haec est methodus, qua Ptolemaeus initio fuerat usus.

Ceterum aliam viam insistens in Magna Compositione, regressus est ad haec ipsa, quae inter principia assumserat et quae inde deducebantur, redarguenda. Facillime enim error in tam subtili materia contingere potest. Primum dioptra Hipparchum fefellit, nec plane tanta est Lunae diameter. Deinde nec horarius ita certus est, ut omni dubio careat. Duas enim Luna obtinet inaequalitates, quarum quae in coitus luminum desinit admodum haecenus incerta fuit, ut aliter illam Ptolemaeus tradiderit, aliter Copernicus, aliter Tycho. Fieri etiam potuit, ut in eclipseos et morae et digitorum observatione non satis diligentiae sit adhibitum. Nam in defectu Lunae difficile est aestimare quod periit, cum non videatur. Denique latitudinis angulus, ut infra dicetur, dubio non caret. Ut jam non dicam de eo, quod diameter Lunae, etsi in uno epicycli loco recte fuerit observata, in aliis tamen locis vitium contrahat ob nimiam ab Hipparcho suppositam quantitatem epicycli, dum inaequalitas omnis ex epicyclo derivatur, quae dimidia ex parte aliunde venit.

Ptolemaeus ergo in iterationibus pauciora assumpsit et certiora demonstrando motui latitudinis. Binas eclipses, quam potuit invenire longissimo temporis intervallo distantes, elegit sic comparatas, ut utraque esset partialis ejusdem quantitatis, apud eundem nodum, in eadem plaga mundi, denique in eodem loco epicycli, ut constaret, umbram in transitu utrinque ejusdem esse crassitiei. His enim datis certum erat, utrinque aequaliter abfuisse illam a nodo, ac proinde orbes latitudinum consummatos esse atque integros, nihil residuum, nihil deficiens, nec opus fuit ut antea, praecognosci horarium, diametrum Lunae aut umbrae, nec angulum inclinationis, ac ne epocham quidem motus latitudinis. Sufficit scire, Lunam aequaliter a nodo abfuisse utrinque, potuit nesciri, quantum abfuerit. Ut autem et hoc sciretur postmodum, rursum Ptolemaeus, elegit duas partiales eclipses, ejusdem anomaliae plagae et quantitatis, sed alteram nodo descendentem vicinam, alteram ascendentem. Nam tempus interjectum secundum latitudinis motum ante investigatum ostendebat, quanto arcu circuli ab invicem abessent. Certum autem, minus semicirculo distare. Quare residuum ad semicirculum est distantia utriusque eclipseos a suo nodo in unam summam conjecta, quae bisecta prodit secretam singularum a nodo distantiam, quod quaerebatur: angulo latitudinis etiamnum ignorato.

Succincta sane methodus, siquidem quantitas defectus aestimatorum intuitus non fefellerit, et semper in promptu sint tam commodae observationes.


Sed pergamus; quarto itaque Ptolemaeus alteram inaequalitatem Lunae lib. V. aggreditur, quae in novilunia desinit et plenilunia, quam cap. 10. demonstrat citra magnum incommodum in calculo eclipsium omitti posse.

Quinto latitudinem Lunae maximam, quae eadem est cum angulo inclinationis orbis Lunae ad planum eclipticae, Ptolemaeus non minus compendiose inquisivit, exspectato momento, quo Luna in Cancro borealem limitem attingebat. Tunc enim in Alexandrina poli elevatione Luna proxime verticem accedens pene omni se parallaxi exuebat. In hoc quidem situ Ptolemaeus affirmat, se semper eandem Lunae distantiam a vertice quoad

sensum deprehendisse, unde latitudinem maximam colligit 5° . Ceterum totum hoc negotium non una ratione suspectum reddidit. Nam ut Luna in Cancro boreum limitem inveniret, fieri non saepius semel intra unum 19 annorum orbem potuit: annis scilicet 10. et 11. Adriani Caesaris. Et consurgunt quidem observationes Ptolemaicae, quantum earum est in Magno Opere, ab anno 9. dicti principis, sed praeter unam eclipsin anni 10. 11 et aliquot sequentes omnino vacui praetermittuntur. Ultima vero observatio in annum 3. Antonini cadit. Itaque annos non plus 15 complectuntur. Ac relinqua-
mus sane tantam his observationibus culminantis Lunae amplitudinem, ut nodus evehens a $15^\circ \times$ in $15^\circ \gamma$ moveatur, fient omnino ingressus Lunae in Cancrum 18. Inter hos unum tantum est plenilunium, reliqui sub Sole partim latent, partim in quadraturas et ceteras phases concedunt. Jam hac nostra tempestate Tycho infallibili ratione deprehendit, Lunam in quadraturis tertia parte gradus amplius ad boream et austrum concedere in latitudine maxima, quam si plenilunium sit. Fieri ergo non potuit, ut semper deprehenderetur aequalis Lunae distantia a vertice, nisi hodie alia sit forma motuum Lunarum, cujus ansam suspicionis aliam non habemus. Crediderim, non quod factum sit, sed quod fieri debuerit, a Ptolemaeo hic inculcatum, adhibitam vero latitudinem eam, quam in priore opere aliunde transsumserat. Obsecro enim, quando illud fuit, cum speciosioribus hisce insistens vestigiis priores curas correxit? Opinor post initia suarum observationum, post illam igitur Lunae culminantis occasionem. At principio, h. e. cum observare inciperet, circa annum 9. Adriani, Hipparchicis datis contentus astronomiae incubuit. Admodum igitur diligens fuerit, si illas quoque observationes conscripserit, quibus tunc non uteretur. Uno verbo, si vere observavit, cur non unam e lectissimis observationibus apposuit?

Atque haec de methodo latitudinis. Sexto iisdem insidiis Ptolemaeus et diametrum umbrae circumvenit: electa eclipsi Lunae, in qua semidiameter defecisset. Tunc enim in priori schemate centrum Lunae in B cadit.

Fig. 15.



Ducatur ex B parallelus ipsi ED, quia parum refert, tam parvum triangulum in plano fingi, secans eclipticam in H. Erit H nodus in hac Lunae latitudine. Ex tempore igitur et ante demonstratis scitur Lunae remotio ab H nodo, tum et angulus BHA, per doctrinam igitur sphaericorum triangulorum scibitur et BA Lunaris centri distantia ab ecliptica in media eclipsi, quare et umbrae latitudo seu semidiameter. Optima sane

ratio, si et priora certa, quibus hic utitur Ptolemaeus, et eclipsis talis in promptu, et aestimator defectus certus est, nulla ratione falli posse suos oculos, dum Lunam in coelo haerentem sine circino dimidia ex parte deficere censent.

Septimo diametros visibiles Solis et Lunae Ptolemaeus ullo instrumento metiri desperavit, nisi quod hoc ex observatione sumit, Lunae visibilem diametrum, cum in apogaeo est epicycli Soli opposita, proxime aequalem esse diametro Solis. Quanta vero esset utraque, maluit per umbram Terrae

jam pridem dimensam metiri. Elegit igitur eclipsin, cui aequalis esset transitus per umbram, aequalis inquam anomalia cum priore, qua umbram erat mensus. Motus latitudinis paulo alius; sit illa in E. Scitur ergo ED non minus quam prius BH, ex calculo ante exstructo. Et anguli sunt similes ad D et H, item E et B. Latera igitur utraque AE et AB dantur, quare et differentia EB in usitata circuli distributione. Ceterum in aestimatione proportionis ejus, quae est inter BG et GE residuam ex eclipsi semidiametrum, credidit Ptolemaeus oculis, quare et proportio EB ad EG semidiametrum dabatur et EG semidiameter in usitata dimensione. Ad hanc partem rursum dico, quod antea: si oculi tam sunt perspicaces, ut in aestimatione defectuum nihil aberrant, et si cetera hujus demonstrationis principia bene habent, methodus utique bona est, quamvis per ambages et dispendia incedat.

At in omnibus hisce videndum est etiam atque etiam, ne in angulo latitudinis, qui undique concurrat, error lateat. Nam etsi maxima latitudo in oppositionibus hodie eadem est quae olim, nihilque habet dubii, angulus tamen, quem haec latitudo metitur, consistit utique in quadraturis. Quis igitur nos certos reddet, eum angulum, qui est in conjunctionibus et oppositionibus, non mensurari a maxima latitudine quadraturarum? Quare non sufficit, maximas oppositionum, non maximas quadraturarum latitudines metiri, quorum illud Ptolemaeus, hoc Tycho fecit: oportet et angulum ipsum metiri. Parvus enim error in immensum augetur, ubi ad reliqua capita processerimus.

His ergo 7 capitibus instruit Ptolemaeus lectorem ad computanda tempora, moras ingressus et emersus Lunae e tenebris, quantitatem defectus et si placet etiam inclinationes defectus ad varias mundi plagas: quae omnia observatione unius eclipsis vel confirmari vel redargui possunt.

Ad eclipses vero Solares hac methodo pergit Ptolemaeus. Nam octavo parallaxes Lunae per instrumentum investigat, observans quantum Luna in austrum declivis sit, ex calculo inquirens quantum tunc propter latitudinem declivis esse debeat, si ex centro Terrae spectetur: ex horum enim collatione apparet, quanto angulo Luna commutaverit locum ex centro videndum in locum ex superficie visum; ex qua una re postea altitudo Lunae a Terra, et adminiculante umbrae magnitudine cum visibili diametro Solis etiam altitudo Solis a Terra et ejus parallaxis dantur cum appendice de proportionem corporum. Quibus perceptis ad calculum eclipsium Solarium lector accedere potest, computans moras, principia, fines, quantitates et inclinationes diversas in diversis regionibus, quae rursum omnia unius Solaris eclipsis accurata observatione vel confirmari vel redargui possunt.

Hic iterum Ptolemaeus maximas de se suspiciones concitat, quasi observationes adulterinas subornaverit ad theorema expediendum. Cum enim indigeret magna parallaxi in quadraturis, sic ferente ipsius hypothesi et eccentrico Lunae, cujus est in mense dupla revolutio, fingit etiam, se tantam observasse parallaxin, et ex hac fictitia postea veram procul dubio aliunde transsumtam et aliis principiis constitutam in coitus luminum derivat. Esse vero vitiosam illam parallaxin, quam dimensum se fingit Luna in Capricorno et limite boreo versante, testabuntur omnes post Regiomontanum astronomi, testatur maxime Tycho, qui invenit, Lunam etiam in quadraturis cum Sole non propius Terram venire, quam ad 54 semidiametros Terrae, quam Ptolemaeus ex sua parallaxi statuit 33. Quodsi latitudinem Lunae

auctam adhibueris, qualem Tycho deprehendit in quadrantibus, multo major et prodigiosior haec parallaxis evadet. Quin igitur falsum hic loci admitterit, dubitari non debet.

Denique non levis momenti error fuit apud veteres inde ab Hipparcho usque ad Tychonem, quod cum diametros Lunae et umbrae in certa aliqua epicycli parte essent dimensi, ceteris epicycli locis vitiose diametros accommodarent, eo quod epicyclo nimiam tribuerent amplitudinem. Fons huius rei scaturit ex desideratis inaequalitatum causis, et redundat in utriusque luminaris motum. Etenim cum esset in confesso, tardiora videri quae longius abstitissent, eademque celeriora ubi propius accessissent, nec illud ignoraretur, discedere lumina et accedere, veteres illi praepostero aequalitatis studio omnem motus luminum diversitatem in hos abscessus et accessus eorum contulerunt, quae dimidia solum illis debetur, reliqua pars, nec quicquam repugnante Copernico, plane causam habet physicam, ex ipso quidem accessu et recessu sideris resultantem, sed in secundo respectu.

Ac in tribus quidem superioribus haec causa physica sese Ptolemaei manifeste prodiderat indicio, quod amplificatio epicycli optica, quam Alphonsus diversitatem diametri, Prutenicae excessum appellant, non respondebat accessus et recessus magnitudini, quam aequatio eccentrici requirebat, si quis eam unice per centrorum orbis et mundi distantiam niteretur excusare. Qua re coactus Ptolemaeus punctum aequantis introducit, rem plane physicam, si bene considerasset eam auctor. Copernicus abhorrens ab hac inaequalitate physica, quam putabat indignam coelesti natura, transformavit aequantem in epicyclium, gavisus in luminaribus opus illo non esse. Care lector confundaris, non est mihi sermo de menstruae inaequalitatis aequatorio puncto, quod scio Ptolemaeum adhibuisse. De prima inaequalitate loquor, quae a menstruo circuito tempore discernitur. Hanc igitur Ptolemaeus per unum epicyclum excusavit eumque tantum statuit, ut sufficeret toti aequationi. Copernicus mutationem illi nonnullam attulit, sed ita ut iisdem principiis inhaereret, tantum esse oportere epicyclum, quanta esset aequatio quovis tempore. Quare etsi epicyclium adjunxit, quo primarius epicyclus augetur vel minueretur, eo tamen nullam primariae aequationis partem expedit. Nam illud ad menstruam aequalitatem spectat et vice Ptolemaici menstrui aequantis fungitur. Adhuc ergo Copernicus primam inaequalitatem per solam centrorum distantiam (seu epicyclum) expedit, exclusa causa physica; quo nomine et ipsi nimia in differentia sunt Lunae a Terra distantiae, proinde et diametri aspectabiles et transitus per umbram. Tycho Copernici vestigia pressit usque ad annum 1600. Nam illi duo epicycli, quorum alterius diameter statuitur 11000, alterius 22000 (in paginis Witebergae editis a. 1599) mere Copernicani sunt; residui duo ad novas nec a veteribus animadversas inaequalitates referuntur nihilque habent cum prima inaequalitate commercii.

Quod autem Christianus Severini, cuius opera Tycho in ultima correctione usus est, in primam quoque inaequalitatem aequantem introduxit seu more Copernicano epicyclum: id si in Lunam statuere nefas arbitraris vellesque non esse factum a Tycho, mihi adscribito. Nam eo tempore Christiano et spectator et auctor fui ad id audendum. Et sane non tantum in motu longitudinis plurimum Christiano res ista profuit, sed etiam ad parallaxes apprime fuit commoda. Semper aqua haerebat, parallaxis aut repugnantibus hypothesi aut sibi non constantibus. Tandem ubi animum

nduxit vim epicyclo afferre, ad parallaxes examinandas sincero animo accessit, invenitque in quadraturis non esse majorem epicyclo amplitudinem, quam 6 semidiametrorum Terrae. Cujusmodi quidem amplitudo non patitur equationem ad 3° excrescere, cum maxima in quadraturis aequatio $7\frac{1}{2}^{\circ}$ coetulet. Itaque jam et in Luna natura nobis argumentum monstravit causae physicae introducendae, non minus quam prius in tribus superioribus. Quonodo id in theoria Solis quoque probetur, partim Cap. II. dictum, ubi de apparente Solis diametro agebamus, partim differendum est in partem astronomiae physicam, quam una cum demonstratione motuum stellae Martis primo quoque tempore Deo vitam et vires largiente in lucem dabo, hancque inaequalium motuum causam physicam luculenter et legibus quidem geometricis, ne qua metuas calculo, tractabo. In praesentia tantum dicere volui, veteres circa diametros luminarium atque ipsius umbrae in errore esse ob neglectam hanc physicam causam nimisque auctum epicyclum. Iamque et Ptolemaei methodum et quae in illa suspecta sint fere tenes: superest ut ad hujus quoque libelli methodum accedam.

De mea Methodo.

Ingenium tibi lector traditurus eram contexendi operis talis, quale Ptolemaeus appellat *μεγαλη συνταξις*, opus ipsum majori conatu aggressurus. Leges igitur theoremata et problemata extruendae ex eclipsibus astronomiae; sparsa illa nec plane cohaerentia, sed conditionibus aliqua circumscripta. Sed tamen, uti quondam Daedalus suam Venerem, sic ego mea problemata captus amore descriptionis magna ex parte animata reddidi, ut magnam partem operis amplectantur; in quibus methodum hanc notabis:

Primum ostenditur, quanta sit apparens diameter Solis ad haec nostra tempora.

Secundo eandem curam in diametrum Lunae apparentem transferemus.

Tertio necessarium erit explanare, quantum accessus et recessus Solis umbram Terrae variet, ut certum sit, insensibile quippiam id esse.

Quarto latitudinis angulum in ipsis oppositionibus et conjunctionibus eclipticis constituemus.

Quinto motum latitudinis et ipsam latitudinem novis problematis inquirere docebimus.

Sexto. Hinc diameter umbrae in certis locis anomaliae Lunae mensurabitur.

Septimo parallaxes et altitudines Lunae a Terra varie inquirentur.

Octavo, hinc examinabitur proportio corporum.

Nono, hinc motum horarium docebimus invenire, quo rectissime hypotheses aliorum examinentur.

Decimo, quae hinc ad ipsam D hypothesin ad theoriā \odot , ad geographiam &c. redundant, obiter indicabuntur.

Pleraque ex simplicibus et facile comparabilibus observationibus, ut identidem aliis exemplis reiterari et communiora fieri possint, qui praecipuus hujus libelli finis est.

Haec sunt, quae Manuscripta exhibent de conatibus Kepleri, librum quem inscriptione „Hipparchi“ insignitum in locum Almagesti astronomis substituere voluit, perficiendi. Reliqua quae insunt voluminibus I. et XV. Mss. Petrop., testimonium quidem praebent, ut ea quae initio diximus repetamus, nunquam plane omissam esse rem inceptam, superatam vero vastitatem difficultatibus magis magisque incrementibus. Nihil in his voluminibus occurrit, quod praemissis addendum sit, excepta „Transformatione hypotheseos Lunaris,“ quae infra sequitur; reliqua calculis constant omnimodarum eclipsium, cum Solarium tum Lunarum, quibus hypothesin suam emendare vel fulcire studet Keplerus.

Folio 663 Keplerus literas dicit ad Maestlinum datas, quas hic-inserendas censuimus. Ultima quae superest Maestlini ad Keplerum epistola data est d. 11. Mart. 1620. Ex ea apparet, Keplerum a W. Schickardo Tubingensi professore petiisse, ut sibi communicaret eas, quae ipsi et Maestlino praesto essent, observationes eclipsium, praesertim anni proxime exacti. Ad quae respondit Schickardus (Hansch. p. 678) ad Maestlinum recursum. Maestlinus eclipsin describit Lunarem, addens calculum astronomicum, praesertim de parallaxibus; ad calculum suum non adhibet logarithmos „quia fundamentum ego hactenus eruen non potui.“ (Comp. Hansch. p. 50.) Keplerus respondit hunc in modum:

Clarissime Vir. Nuncius me absente literas tuas in meas aedes intulit, cum denunciatione, ut intra praestitutum tempus responderem. Brevis igitur esse studeo; an id sim assecuturus, finis epistolae ostendet. Gratias ingentes ago et pro observatione tua eclipseos et pro examine meae. Opus vero tibi esse puto declaratione quarundam rerum, qua percepta rogo, ut iterum censuram tuam: res enim magna agitur de locis sc. omnium fixarum.

Primum parallaxis $\supset 62' 10''$ nequaquam a me fuit adhibita altitudini 50° , sed est haec parallaxis altitudinis in ipso horizonte. Demonstravi autem ante 16 annos in Opticis Cap. IX. fol. 330, quod, posito uno certo gradu eclipticae in horizonte eoque retento immobili in eo, Luna vero per totum semicirculum eclipticae exstantem eunte in eadem a Terra distantia, semper eadem maneat parallaxis latitudinis. (Sit $24^\circ M$ in ortu, sit etiam eadem distantia \supset a Terra, erit parallaxis latitudinis \supset tanta in $24^\circ Q$ in nonagesimo, quanta in $24^\circ M$ in oriente vel $24^\circ S$ in occidente.) Ut igitur sin. tot. ad sin. distantiae nonagesimi a vertice, ita $62' 10''$ ad parallaxin latitudinis; et ut idem sin. tot. ad sin. altitudinis nonagesimi, ita $62' 10''$ ad parallaxin long. horizontalem; ut vero sin. tot. ad sinum distantiae Lunae a nonagesimo, ita parallaxis horizontalis ad parallaxin longitudinis in proposita altitudine Lunae. Hinc patet, si sin. alt. nonagesimi multiplicetur in sin. distantiae Lunae a nonagesimo, factus in $62' 10''$, ablatis 10 figuris ultimis, confectum iri parallaxin long. horizontalem. Atqui multiplicationes tolluntur additione logarithmorum, ut demonstravit Neperus. Itaque invenies hoc tempore altitudinem $\supset 55$ semidd. Terrae ex mea parallaxi $62' 10''$, puta horizontali altitudinis.

Ut autem tibi per hanc occasionem explicem obiter rationem logarithmorum, attende primo nomen, quod sint aliqui numeri, qui sunt ἀριθμοὶ τοῦ λόγου. Verbi causa sit minima omnium proportio suscepta inter numeros 100000.00 et 99999.99: haec proportio signetur nobis unitate (quantum nimirum est terminorum differentia, et sic logarithmi sunt accuratiores. Nam initium debet fieri a proportionem adhuc longe minori, ita ut haec proportio aequaret nomen paulo majus unitate): jam scis, quod proportio inter 99999.99 et 99999.98 sit major quam illa prior et sequens rursus major, sc. inter 99999.98 et 99999.97 et sic consequenter, sic ut proportio inter 50000.01 et 50000.00 sit major, quam ulla priorum, quae sit proximorum numerorum ordinis naturalis. Quia ergo primae proportionis quantitas est expressa numero 1, secundae quantitas non exprimitur numero 1. sed aliquo paulo majori, et sic consequenter; ipsa denique inter 50000.01

et 50000.00 exprimenda erit numero 2 proxime. Denique ergo si quaeratur, quanta sit proportio 100000.00 et 50000.00, h. e. 2 ad 1 in ea numeratione, quae minima superius fuit 1, respondetur sic: primo si omnes intermedii numeri ordinis naturalis, semper bini et bini unitate differentes, constituerent eandem quantitatem proportionis, tunc, quia inter 100000.00 et 50000.00 intersunt 49999.99 numeri, numerus igitur proportionis 100000.00 et 50000.00 esset 50000.00. Sed quia posterior quoque est major quam 1, ergo numerus proportionis duplae in suscepta dimensione fiet 69314.72; toties nimirum continetur proportio 100000.00 (99999.99 in proportionem 100000.00) ad 50000.00, vel 2 : 1. Haec est factura logarithmorum, cui demonstrandae schemate opus non est.

Jam attende, quomodo per logarithmos aboleatur multiplicatio. Sit ut 100000.00 ad 90000.00 sic 80000.00 ad 72000.00. ($a : b = c : d$). Hic proportio $a : d$ componitur ex proportionibus tribus, scilicet ex $a : b$, et ex $b : c$, et ex $c : d$. Quare etiam numeratio proportionis $a : d$ seu logarithmus ejus componetur ex logarithmis $a : b$ et $b : c$ et $c : d$. Atqui proportio $c : d$ est aequalis proportioni $a : b$, ergo $\log. a : d$ componetur ex 2 $\log.$ ipsius $a : b$ et $b : c$. Sed unus $\log. a : b$ et $\log. b : c$ componunt $\log. a : c$, quia ipsae proportionem $a : b$ et $b : c$ sunt elementa proportionis $a : c$. Ergo unus $\log. a : b$ (1053605 —) et unus $a : c$ (2231436 —) componunt $\log. a : d$ (3285040 +).

Hac demonstratione percepta, non est ut amplius dubites circa logarithmos. Nam optio tibi datur, vel his uti addendo vel pro iis multiplicare sinus expressorum arcuum.

Alterum caput declarandorum est hoc, quod non nititur praecipue mea observatio rectitudine anguli ad Lunam, sed additur, quo momento, qua altitudine Aldebaran angulus ad priorem stellam fuerit rectus et cum centro Lunae et cum margine occidentali: hoc habet magnam certitudinem, quia linea stellarum est pene parallela eclipticae: additur etiam, quo momento vis sit \searrow distare aequaliter ab utraque stella, angulo ad Lunam existente quasi recto. Tertio sic est intelligenda mea observatio, quod uno quasi minuto temporis prius quam Aldebaran distaret a vertice 58° fuerit initium, notavi enim, quod provinciale uno quadrante serius sonuerit per totam durationem. Computavi sane et ego medium ex observatis h. 3. 48', Tübingae h. 3. 27'. Differentia meridd. $5\frac{1}{4}^\circ$, cum ex eclipsi 1617. collegerim $5\frac{1}{2}^\circ$, quanquam per longiusculam et suspectam durationem. Quod igitur angulum eclipticae cum meridiano computas $70^\circ 44'$, ita et ego habeo in Tabulis Epitomes meae, scilicet ad $23^\circ \searrow 70^\circ 50'$, ad $24^\circ \searrow 70^\circ 36'$. Angulo vero eclipticae cum verticali Lunae etsi alias ego non utor, utar tamen nunc. Nam ut sinus totus ad sin. distantiae \searrow a vertice $50^\circ 47'$, ita sinus $62' 10''$ ad sinum parallaxis $\mu\eta\kappa\omicron\lambda\alpha\tau\tau\epsilon\varsigma$ competentis huic distantiae a vertice. Ut vero sin. tot. ad sinum anguli eclipticae et verticalis $39^\circ 14'$, ita haec parallaxis $\mu\eta\kappa\omicron\lambda\alpha\tau\tau\epsilon\varsigma$ ad parallaxin latitudinis. Ex hoc fundamento operabor ego per logarithmos (breves)

1° 2' 10"	Log. 401200	Correcte $43^\circ 38\frac{1}{2}'$ (in margine)
50. 47. 0	" 25520	Log. 37085
39. 14. 0	" 45811	" 25520
0. 30. 38	Log. 472531	" 401200
		Log. 463805

Ad exquirendum consensum etiam meo utar modo. Quia enim ascensio recta medii coeli est a te computata $145^\circ 46'$, oritur igitur $10^\circ 38' \text{ III}$ angulo orientis ex Epitome mea existente $57^\circ 40'$. Distat igitur nonages. a vertice $32^\circ 20'$.

Ergo logarithmus ad $32^{\circ} 20'$ est 62578

Logarith. $1^{\circ} 2' 10''$ 401200

$0^{\circ} 33' 20''$; Logar. 463778

In Meridiano $23^{\circ} 24'$ Q

In Nonages. 10. 38 Q

MN 12. 46 Antil. (h. e. log. compl.) 2502

Deinde culm. $13^{\circ} 46'$

Altit. aeq. 41. 44

55. 30 Log. 19343

Ang. ecl. et hor. 57. 40 idem qui supra. Log. 16841

Opinor si sinum $41^{\circ} 35'$ in foecundum $32^{\circ} 20'$ multiplices, proditurum foecundum arcus $43^{\circ} 38\frac{1}{2}'$, et hanc esse legitimam viam inquirendi angulum eclipticae et verticalis.

Ex his igitur datis etiam probabo angulum eclipticae cum verticali,

Q $29^{\circ} 3' II$

Nonag. 10. 38 Q

41. 35 Logar. 40991

Nonag. a vert. $32^{\circ} 20'$ Mes. 45730 + (Mesologarithmus = log. tang.)

43. $38\frac{1}{2}$ Mes. 4739 +


Omnia consentiunt, angulum eclipticae cum verticali Lunae esse majorem, scilicet non $39^{\circ} 14'$, sed $43^{\circ} 38\frac{1}{2}'$. Quarto quod attinet magnitudinem defectus, mihi insolens non est, eum diversis videri diversum. Ego certe et Gringalletus meus diligentissimi hic fuimus, et usi sumus perspicillis non nimium multiplicantibus, sic ut Luna tota simul videri possit. Et quamvis non accurate potuerit aestimari, non tamen dubitabamus, quin circa medium esset nona pars Lunae in lumine circiter. Sane haec incertitudo observandi digitos fecit me tandem desperare de parallaxi Solis observationibus hisce eruenda, quod non dissimulavi in Comment. Martia, inque Ephemeridum praeambulo. (Comp. Optices meae fol. 320. 349.) Itaque in Epitoma, quae forte edetur, parallaxin Solis constituam a priori, minorem eam faciens quam in Ephemeridibus et omnino tantam, quantam in Commentario Martis suspicatus sum. Nam si hoc axioma usurpem, toties Solem esse majorem Terra, quoties semidiameter orbis ☉ major est semidiametro Terrae, et vicissim toties Terram majorem Luna, quoties semidiameter orbis Lunae est major semidiametro Terrae ejusdem: sequitur assumpto visionis apogaeae angulo $30'$ (qui habet etiam suas rationes a priori) Solem abesse 3469 semidiametris in mediocri distantia, Lunam 59: ergo Solis parallaxis circiter $1'$. Pro concinnitate vero proportionis, quam elegi in Ephem. Num. 7. jam obtineo aliam concinnitatem sane quam mirabilem; scilicet hanc, quod his legibus sphaera Lunae fit medium proportionale inter globum Terrae et sphaeram Solis (seu Terrae) sicut libro de Stella Nova (II, p. 677) sphaeram Saturni, extimi mobilium, feci medium proportionale inter globum Solis motoris et sphaeram fixarum; quod ea re confirmatur, quod sicut motus planetarum ex Sole est, sic etiam motus Lunae est ex Terra, ex utriusque scilicet globi tornatione circa axem. Sed haec obiter. Nunc igitur his dilucidatis, rogo majorem in modum, idque propter bonum publicum et propter honorem professionis nostrae, quae consistit in hoc adjuvando, ut dispicias, quid agendum putes in motu fixarum emendando. Nam similia etiam ex nonnullis observationibus Veneris videor eruere posse, ut ita diurnae ☿ observationes cum proximis Tychnicis nocturnis interventus horarii ☿ non optime convenient.

Haec ultima mea emendatio (pro nunc quidem) non potuit hactenus fieri, priusquam haberem quatuor eclipsium observationes uno loco habitas et observationibus aliorum locorum, scilicet Tubingae et Romae confirmatas. His parallaxibus assumtis et horario (etiam a priori) nonnihil emendato, retento vero angulo latitudinis copulari et loco nodi, ut in Ephemeridibus, eccentricitate vero Lunae reali simplici et diametro \mathcal{D} in apogaeo $30'$, observationes supra vota tueor quoad digitos et durationem. In accommodatione temporis adhuc haereo.

Mitto salutis loco Theoriam Lunae renovatam. A centrum Terrae, B centrum eccentrici Lunae (qui tamen intelligatur ellipticus, ut sunt eccentrici ceterorum planetarum), DE linea apsidum, FG linea copularum, BLMNOPQ circellus respectu copularum annuus in antecedentia, sed respectu fixarum novennalis fere in consequentia; lineae ex A in D, F, H, E, I, G, K lineae sunt veri motus Lunae. Ponamus centrum B in uno mense esse immobile, etsi id movetur versus Q in uno mense per unum signum fere. Ducta igitur ex B perpendiculari in FG lineam copularum, quae sit BC, erit C punctum aequationis menstruae et F veluti apogaeum quoddam, quia D apogaeum est ipsi vicinius quam E perigaeum. Et in FHG aequationes subtractoriae, in GKF adjectoriae. Luna igitur in tali mense in D vel E versante vero motu, nulla est aequatio solutae inaequalitatis. At est aliqua aequatio menstruae inaequalitatis, cujus quantitatem indicat area trianguli CDA, CEA, quae in gradus anomaliae mediae seu temporariae redacta adjicitur ad angulum FAD vel FAE; ita conciliatur angulo visionis FAD vel FAE suum justum tempus denominationis astronomicae. Vicissim sit planeta vero motu (vel prope vero, de variatione enim dicetur ultimo) in F vel G Soli oppositus vel conjunctus. Hic quia lineae AF, CF, item AG, CG coincidunt, menstrua aequatio est nulla, est vero aliqua solutae inaequalitatis, constans duabus partibus, plane ut in planetis ceteris. Pars enim aequationis optica est BFA vel BGA angulus, pars physica est area BFA vel BGA in gradus anomaliae mediae conversa: ut sic Luna in F posita competat angulo FAD tempus seu anomalia media, quantam valet area AFD. Haec enim ratio aequationum ducitur ex ipsissimis causis motuum naturalibus per demonstrationes firmissimas et ineluctabiles, nec est arbitraria, nec potest ulla aequipollentia plane tolli, nec cedit facilitate computandi cuiquam. Id tibi facile erit explorare, si ipsi AB constituas aequalem BR, ut sit R centrum aequantis, angulus quidem RHB non multum differet a valore areae BHA, at longe difficilior computabitur, nec ullatenus intendet digitum in causas physicas, demto hoc unico, quod primo ponendus est arcus eccentrici DF, deinde ex una parte computandus angulus DAF apparentiae, ex altera parte area FDA anomaliae ejus mediae, unica multiplicatione valoris maximi trianguli in sinum arcus FD: ut ita anomalia media FDA data, non sit directus processus ad coaequatam FAD.

Jam vero operae pretium est videre aequationes mixtas, ut si Luna sit in H, I vel K. Hic ego in Ephemeride et hactenus duplicem eccentricitatem adhibui: sed deprehendi eclipses illam non ferre. Nam in copulia

Fig. 16.



retinenda est eccentricitas 4362, et distantiae ad unguem eadem a Terra, quas reperit Braheus in quadris, scilicet a 59 in 54 semid. Terrae. Sit igitur AH linea motus \mathcal{D} prope veri, et DAH angulus anomaliae coaequatae, et DFH anomalia eccentrici, quaeritur media. Quodsi simplex esset aequatio, quaererem aream DFHA per partes suas DHB, HBA. Sed quia accedit menstrua aequatio, illam habeo in area CHA adjicienda ad DFHA, ita conficitur anomalia media, respondens angulo DAH, cum inter apsidum et copularum lineas est hic angulus DAF.

Esto Luna in K, anguli FAD, DAK; respondebit igitur coaequatae DAK media, composita ex areis ADK et ACK.

Esto Luna in I, scilicet inter perigaeum solutum E et perigaeum menstruum G, anguli FAD, DAI. Hic coaequatae DAI (complemento inquam ejus ad circulum) respondet anomalia media ADKI, cui tamen ademptus sit valor areae ACI. Porro facillima est computatio etiam hujus areae CKA, si ad anguli GAK sinum addideris BC in semicirculo apogaei, vel subtraxeris in opposito, pro altitudine justa trianguli CKA, hanc in sinum complementi ipsius FAD et factum in valorem maximi trianguli super AB multiplicaveris: quas multiplicationes duas tollit additio unica trium logarithmorum.

Variationis calculo servire posset hic idem circellus BL, etsi remotior est a causis physicis. Posito enim, lineam motus \mathcal{D} prope veri esse AD (sine respectu apogaei), quae secet circellum in B: quadrata sinuum complementorum omnium usque ad sinum CA in summam redacta indicant portionem accelerationis addendae ad DAF. Hic de quadratis sinuum et summa eorum monuerunt me causae physicae: at effectus in forma est ad unguem idem; qui circelli Tychoniani, motu duplici ipsius distantiae Lunae a Sole. Horum, inquam, duorum principiorum consociatione efficitur tantundem, quantum circello Tychonico libratorio, quod valde me exhilaravit. In quantitate adhuc differo a Tychone, qui variationem facit 41', observavit tamen interdum 46'. Ego vero a priori invenio 51', et tantum postulant etiam justi horarii in copulis pro eclipsibus, ne durationes fiant nimiae.

In Ephemeridum prolegomenis non summa quadratorum, sed ipso sinu BC utebar, ubi defeci a Tychone quantum nunc supero.


Moneo autem obiter, ne frustraneas tibi cogitationes excitem, negotium variationis non nuda additione perfici accelerationis, sed prius aliquid esse subtrahendum aequabiliter. Subtrahuntur singulis gradibus distantiae Lunae a Sole prope verae, scilicet $1' 47\frac{1}{2}''$; adduntur vicissim, in ipsa copula $3' 34\frac{3}{4}''$ praecise duplum, inde minus et minus, prout decrescunt quadrata sinuum; donec in quadris plane nihil additur. Ita in quadris pro uno gradu dist. \mathcal{D} a \odot aequatae bis sumenda sunt propter tertiam aequationem $58' 13\frac{3}{4}''$, in copulis pro uno gradu $1^{\circ} 1' 47\frac{1}{2}''$.

Sed redeo ad priorem aequationem menstruam, in qua vides, si B centrum eccentrici sit in L vel P, puta in copulis, quod tunc Luna in H posita, aequatio optica sit futura angulus LHA, sed physica pars aequationis desumenda sit ex area LHA bis sumta, semel pro constituenda aequatione inaequalitatis solutae, item pro aequatione menstruae inaequalitatis: quia BC tunc absumitur, redacta in punctum C, ut sit triangulorum aequatoriorum, unius pro soluta, alterius pro menstrua aequatione, eadem basis AL. Vicissim quo mense centrum B venit in quadras, ibi perpendicularis ex centro cadit in A centrum Terrae, itaque illo mense (vel quamdin

hoc fit) aequatio menstrua nulla est, ubicunque Luna ipsa sit. Ita satis clarum efficitur, tarditatem ex intervallo aucto esse duplo majorem in copulis, quam vel in planetis ceteris, vel etiam in ipsa Luna, cum ejus apogaeum est in quadris; et id causa quidem hujus menstruae inaequalitatis prioris.

Valde igitur laboravi hactenus, ut variationis negotium cum hac menstrua aequatione ab iisdem causis physicis deducere: sed frustra fui hactenus: alterum ex altero non sequitur, quodlibet est a suo principio. Non dubito $\pi\phi\phi\sigma\sigma\epsilon\nu\sigma\sigma\omega\varsigma$ (sic Ptolemaeus appellat) causam in ipsa Luna esse, sicut in universum eccentricitatis causae insunt in ipsis globis planetarum, variationis vero causam esse in Terra, Lunae motrice, utrumque tamen secundum illuminationem ejusque phases. Itaque consultum puto, variationem, etiam quae menstrua est, a circello BL, qui annuus, removere verbis, illud vero simpliciter affirmare, portiones variationis accrescere gradibus distantiae Lunae a Sole (seu angulis FAD) in proportionem qua sunt quadrata sinuum distantiae Lunae a quadris. Adde demonstrationem inchoatam aequivalentiae. Sit G quadra, N copula, GH, HI, IK, KL, LM, MN partes aequales. NO, OP, PQ, QR, RS, ST totidem partes duplae: sinus ipsi sint NA, MB, LC, KD, IE, HF. Et sint duplorum arcuum sagittae NT, OV, PX, QY, RX, SV. Demonstravit igitur Justus Byrgius, ut AN ad BM, duplam esse proportionem TN ad VO, sicut est dupla proportio quadrati AN ad quadratum BM. Ita linearum A, B, C, D, E, F, quadrata insunt proportionem in lineis TN, VO, XP, YQ, XR, VS, ubi semper duae OV et VS aequant diametrum, sic PX,

Fig. 17.



XX, sic QY, YQ: ut ita facilis sit collectio summae. Ex hoc quadamtenus apparet, quo fundamento nitatur apud Tychonem circellus variationis, sic affixus ad orbitam Lunae, ut NT eam quasi tangat in A; nec tamen NT manet ejusdem longitudinis. Cum enim AT librationem faciat semper 41' in apparentia, erit igitur brevis in perigaeo, longa in apogaeo. *) Ponit autem Lunam in A in ☉, in T in octante gibbae, in A in quadra, in N in octante falcatae, in A rursus in ☌. Ego vero causas physicas eodem ducentes sic explico, ut de annuo motu Lunae a Sole, qui est revolutionum 12 et 132° 45', illas quidem revolutiones 12 aequaliter dispertiar in tempora aequalia, superfluos vero 132° 45' tribuo illuminationis phasibus ut regulae, imo apparenti latitudini circuli illuminationis vel semicirculi (nam de causa ipsa efficiente jubeo considerare metaphysicos, quidnam sit, quod hac regula utatur in movenda Luna, si non volunt credere, luminis ipsius ut rei naturalis hanc esse vim). Jam vero decrescunt phases sic: posita A Terra, NG concentrico, N copula, G quadra, latitudo circuli illuminationis Terrae vel Lunae altrinsecus apparens est in proportionem linearum NA, MB, ... HF. Cumque Terra, quatenus illuminata hoc adjumentitio motu moveat Lunam, itidem quatenus illuminata est illa, eadem vero utrinque

*) Est etiam libratio tempore inaequalis, absolvitur enim a copula in quadram veram semidiameter AT bis, sive brevis haec quarta mensis fuerit, sive longa tempore. Ita etiam Tycho omnibus modis veratur in physica.

sint incrementa phasium, ut quo tempore Terra videt Lunam falcata, eodem Luna videat Terram gibbam &c. Quantam igitur portionem de toto lumine (vel tota parte obscura) possidet una phasis Terrae et una Lunae, tantam de illa phasi portionem Terra habet pro regula admetiendae hujus superfluae celeritatis. Ita valent quadrata linearum BM, hoc est lineae OV.

Haec ego, Clarissime Vir, potius exercendi mei quam tui defatigandi causa de theoriae Lunae reformatione scripsi: tui erit arbitrii, quid ad hanc partem literarum respondeas; illud solum rogo, de fixis quod petii, ut curae habeas utque sic respondeas, uti existimas ex utilitate studii astronomici futurum. Vale. d. 12. Aprilis 1620.

Tuae Excellentiae

observantissimus

Jo. Keplerus.

His addit Hanschius: Posterior literarum pars de nova Lunae theoria emendatior et auctor missa ad Maestlinum d. XXVIII. Maji CIOIOCCX.

Luna igitur versante in linea apsidum anomaliae solutae, hoc est in D vel E (Fig. 16), tunc etsi nulla potest esse prosthaphaeresis anomaliae solutae, est tamen aliqua prosthaphaeresis anomaliae menstruae, quippe puncta D, E versantur extra lineam apsidum anomaliae menstruae FG. Hanc vero prosthaphaeresin prodit area trianguli aequatorii, quod stat super eccentricitate menstruae aequationis CA. Nam Luna in E existente, menstrua aequatio est CEA area. Sit enim vera distantia Lunae ab \odot Solis angulus FAE, tempus huic angulo respondens erit in sua proportionem majus hoc angulo quantitate areae CEA: seu quod est dilucidius, sit notus locus lineae AD sub fixis, Luna igitur existente in ejus oppositione E, tempus respondens angulo DAE (duobus rectis) seu semicirculo orbitae DHE componetur ex area semicirculi DHE et ex triangulo CEA. Et vicissim Luna in D apogaeo versante, quando debebat fieri numerationis temporis initium, seu quando anomalia media debebat esse 0, si nulla esset aequatio menstrua, tunc jam existente hac numeramus tanto minus quam 0, quantum valet area DAC. Ita conciliatur angulo visionis seu verae distantiae Lunae a Sole FAD vel FAE suum justum tempus seu anomalia media. Vicissim sit planeta vero motu (vel prope vero, quia nondum correctus est per variationem, de qua dicetur infra) sit inquam in F \odot vel in G \odot . Hic quia Luna collocatur in apsidibus anomaliae menstruae, nulla est prosthaphaeresis menstrua, at est aliqua prosthaphaeresis anomaliae solutae plane similis planetis ceteris; ostenditur enim et per angulum et per valorem areae trianguli BFA, BGA per suas scilicet partes, physicam et opticam in unum compositas. Angulus enim verae elongationis apogaei Lunae ab \odot scilicet DAF minor est angulo DBF et arcu DF quantitate BFA anguli, eidem vero angulo DAF respondet anomalia media, valor areae DAFD. Sic angulo DAG areae DAGD valor assignat suam anomalam mediam seu complementum ejus ad semicirculum.

Tertio operae pretium est videre prosthaphaereses mixtas ex solutae et ex menstruae anomaliae prosthaphaeresibus. Sit primo Luna inter unius apogaeum et alterius perigaeum, ut in punctis H, K, idque motu prope vero. Hic considerata sunt bina pro uno triangula aequatoria, pro soluta BHA vel BKA, pro menstrua CHA vel CKA. Angulo igitur DAH respondet anomalia media composita ex area DHAD et ex area CAH: et angulo DAK respondet anomalia media composita ex areis DAKD et CAK.

Sit deinde Luna inter duo apogaea vel inter duo perigaea ut in I. Hic triangulum solutae est BAI in semicirculo solutae ascendente, at triangulum menstruae est CAI in semicirculo menstruae descendente; valores itaque triangulorum sunt inter se affectionis contrariae, quare hic angulo DAI respondet anomalia media constans ex valore areae DKIA, sed a quo diminutus sit valor areae CIA. Hactenus retinuimus distantiam DAF Solis oppositi ab apogaeo Lunae unam et eandem: cum tamen separatio sit fere annua. Notandum ergo, si apogaeum sit in δ vel γ \odot , hoc est si coincident AD et AF, tunc B centrum eccentrici erit in L vel P. Tunc igitur posita Luna in H vel K, erit pars aequationis optica, ut hactenus, angulus LHA vel LKA: at physica pars aequationis tam solutae quam menstruae communiter est desumenda ex area LHA vel LKA bis sumta. Quia perpendicularis BC tunc est nulla, quippe absumta in punctum L, ut sic utrumque triangulum tam solutae quam menstruae eandem habeant basin AL. Vicissim si apogaeum D sit in quadris et angulus DAF rectus, tunc perpendicularis BC cadit in A centrum Terrae, quare eccentricitas aequantis AC est nulla, igitur et aequatio menstrua tunc nulla toto orbitae circuitu. Ita satis clarum efficitur, tarditatem sideris ex aucto intervallo esse duplo maiorem circa apogaeum in copulis quam vel in planetis ceteris vel etiam in ipsa Luna circa apogaeum in quadris. Et haec intelligantur de aequationibus ex antiquo cognitis, remota jam variatione Tyconica, de qua huc usque nihil dictum. Sed notanda est haec ratio dupli, quia oculos videtur aperire circa causas motuum physicas indagandas. Hactenus hypothesis renovata. In Ephemeride et per hos annos intermedios duplicem eccentricitatem statui: ut, sicut in soluta prosthaphaereses causatur eccentricitas, partim optice partim physice, sic etiam in menstrua prosthaphaereses dividerentur inter physicam et opticam, et ut physica retardatio solitam suam causam haberet, mutationem scilicet intervalli Lunae et Terrae. Verum sic eccentricitas copularum mihi nata fuit 6543, simplex seu quadrarum 4362. Atqui ex diligenti tractatione eclipsium deprehendi, retinendam esse etiam in copulis simplicem eccentricitatem 4362, ut sint in copulis distantiae ad unguem eadem a Terra, quas reperit Braheus in quadris, semidiametrorum Terrae a 59 in 54. Hoc itaque pacto menstrua prosthaphaeresis nunc habet formam mere physicam, non vero ut illa prior ex dimidio opticam. Et tamen haec physica retardatio causam habet consimilem. Sicut enim in soluta eccentricitas AB, augens distantias Lunae a fonte motus A superius, auget etiam physicos motus: sic nunc in menstrua, quia circulus illuminationis semper perpendicularis ipsi FG rationem fontis habet, eadem eccentricitas AB habet suam certam altitudinem super planum illuminationis, quae altitudo est AC, et operatur elevatio AC physicam retardationem in menstrua maximam circa F, non minus quam in soluta ipsa elevatio B super A operatur retardationem maximam circa D. Itaque triangula CHA &c. quae cum areis suis significant retardationem physicam, non carent sua etiam causa, quod hactenus me torserat adque confingendam peculiarem eccentricitatem adegerat. Omnibus modis, Maestline praestantissime, dives est et sibi ipsi sufficientissima physica speculatio motuum. Sequitur igitur calculus. In eo hoc unum deest, quod data anomalia media non aliter invenitur anomalia coaequata, nisi per falsi regulam, ut in Commentariis Martis luculenter ostendi. Ad Tabulas vero construendas nihil nos impedit incipere ab anomalia eccentrici, quae mihi est quantitate media

inter veteribus dictam mediam et inter coaequatam. Etsi vero tradita est ratio computandi in Marte, tamen ne Te circumcursitare opus sit per varios libros, repetam hic modum, ut videas ejus facilitatem et certitudinem.

Ponatur anomalia eccentrici 60° , quaeritur et quanto tempore (quod est anomalia media) Luna versetur in hoc arcu, et quanto angulo ex Terra spectetur hic arcus orbitae, quae ut in planetis figuram habet ellipticam. Igitur sinus erit 86603, qui multiplicatus in dimidium eccentricitatis solutae, scilicet in 2181, conficit aream trianguli, quae quantum valeat, facile computatur. Nam area totius semicirculi ex Archimede petita valet anomaliam mediam 180° . Et cum initio statim constitui possit, quantum valeat triangulum omnium maximum, quod competit anomaliae eccentrici 90° , scilicet area 218100000, quot valeat gradus, minuta et secunda, seu unico numero quot secunda? puta hic $2^\circ 30' 0''$ circiter, seu 150' seu 9000''. Ergo in omnibus aliis operationibus, posita anomalia eccentrici ut hic 60° , sinus ejus tantummodo multiplicatur in haec 9000'' et prodit valor ipse cujusque trianguli in secundis scrupulis. Igitur hic sunt 7792'' seu $2^\circ 9' 52''$, dico igitur anomaliam mediam quaesitam esse $62^\circ 9' 52''$. Nam sectoris, quae est sub arcu circuli 60° , area valet itidem 60° . Pro coaequata invenienda sic agendum. Hactenus quidem circulus pro ellipsi fuit usurpatus; demonstratur enim haec aequipollentia *γεωμετρικωτάτος*; at nunc propria planetae orbita est adscribenda, ut habeatur vera ejus apparentia ex Terra, seu anomalia coaequata. Id hac ratione obtinetur. Sinui 50000 complementi anomaliae eccentrici 60° addo in praesenti casu eccentricitatem 4362 et fit 54362. Eundem sinum complementi multiplico in eccentricitatem eandem, et prodit portio librationis 2181, adjicienda hoc loco ad 100000, ut conficiatur distantia Lunae a Terra 102181. Igitur 102181 se habet ut secans, et 54362 se habet ut tangens; diviso enim 543620000 per 102181, prodit tangens (seu foecundus) complementi anguli coaequatae. Igitur anomalia coaequata est $57^\circ 51' 31''$, respondens anomaliae mediae $62^\circ 9' 52''$: ut sit aequatio solutae anomaliae tota $4^\circ 18' 21''$. Hactenus igitur Luna fuit similis planetis ceteris. Applicabimus ad schema. Sit DAK angulus $57^\circ 51' 31''$, ut aequatio $4^\circ 18' 21''$ hic intelligatur addenda. Cum igitur schema sic sit pictum, ut distantia \odot Solis ab apogaeo Lunae seu angulus FAD sit 45° ; erit ut 100000 ad BA 4362, sic sinus anguli FAD 70711 ad CB 3085; et ut 100000 ad BA sic sinus complementi FAD ad CA 3085. Trianguli igitur CAK nota est basis CA, nota et altitudo seu colligenda potius sic: FAD vel SBD est 45° , DBK vero 60° . Ergo SBK 105° , cujus sinus 96593 proderet trianguli altitudinem, si ejus basis CA tenderetur ex B in linea SB. At nunc accedit huic altitudini quantitas CB, ut sit 99678, haec ducta in dimidiam CA scilicet 1543 creat 153800000 circiter, ut sic auctarium hoc altitudinis BC non plus efficiat quam 4800000 circiter. Itaque valor areae CKA est $1^\circ 45' 47''$. Et excessus ille altitudinis non plus efficit quam $3' 20''$. In hypothesi priore, ex qua computatae sunt Ephemerides quatuor, colligo $1^\circ 44' 0''$. Cogitabis fortasse, faciliorem esse modum calculandi per hypotheses antiquas. Age igitur ostendam, quomodo hae meae physicae causae etiam in circulos aequantes transferri possint, ut tecum ipse explores, an calculus sit futurus facilior. Manet igitur AB eccentricitas, et in AB continuata ipsi AB aequalis fiat BR et sit R centrum circuli aequantis pro soluta anomalia. Pro eo igitur quod ego computavi valorem areae BKA, computa tu angulum RKB, qui non poterit esse multo alius, sed difficiliorem puto futurum calculum. Altera vero pars aequationis solutae AKB angulus manebit ut prius. Pro menstrua vero anomalia fiet C centrum aequantis menstrui, in cujus circumferentia numerabitur arcus aequalis angulo FAK. Pro eo igitur, quod ego computavi valorem areae CKA altiusculae in semicirculo FKG, in quo est apogaeum solutae, computandus tibi erit angulus CKA acutiusculus. Ita hic circiter 6 vel 7 minutis differemus.

(Fundamenta physica calculi mei, quem hactenus adhibui ad variationem computandam.) Transeo vel tandem ad tertiam Lunae prosthaphaeresin,

quae secunda est ex menstruis, Tychoni variatio dicta, quae mysteriorum et perplexitatis vere est plenissima, ipsoque Tychone teste nihil aliud quam physica acceleratio et retardatio. Hic aliqua videre incipio, discussis tenebris ignorantiae; circa plurima, quae palpitando quaero, adhuc caecutio. Hactenus quidem, ut in Prolegomenis Ephemeridum videre potes Num. XIX, sic censi distribuendam variationem per orbitam Lunae. Primum statui: quae in proportionem sunt ad se mutuo revolutiones integrae duodecim cum appendice $132^{\circ} 45'$, quae accedunt usque ad completionem anni siderei, et seorsim haec ipsa appendix $132^{\circ} 45'$, in eadem proportionem dividendum esse unumquemque gradum distantiae Lunae a Sole coaequatum; ut major quidem pars, in annuo quidem motu revolutiones Lunae 12 integrae, in uno vero gradu $58' 12\frac{1}{2}''$, causam habeant motricem aequabilem in se ipsa, puta revolutionem diurnam corporis Telluris, quae per emissam speciem secum rotat etiam Lunam; at minor pars, puta in anno quidem appendix $132^{\circ} 45'$, in uno vero gradu residua $1' 47\frac{1}{2}''$ causam habeant motricem se ipsa inaequabilem, quam statui esse apparentem ipsi Lunae latitudinem circuli illuminationis Telluris. Non disputo jam, an apparentiae opticae sit aliqua vis physica movendi; sufficit mihi, si sit aliqua causa movens, quae hac apparentiae varietate utatur pro lege et regula seu mensura motus sui. Quodsi igitur haec residua $1' 47\frac{1}{2}''$ de omnibus 90° quadrantis colligantur in unam summam, deinde summa ista rursus in illos 90° distribuatur, admensa scilicet ad sinus distantiae Lunae a Sole vel ab δ Solis, putavi hanc esse bonam distributionem physicam. Sic enim provenerunt mihi in copulis quidem pro uno gradu $61' 1''$, in quadris vero pro uno gradu facta sunt $58' 13\frac{3}{4}''$, quia in copulis sinuum incrementa plus restituebant uni gradui, quam prius ei erat detractum; in quadris vero sinus jam pleni pene nihilo amplius augebantur, nihil igitur perfecta diminutione restituunt.

Haec calculi ratio differebat a Tychonica in forma plurimum, in quantitate nonnihil. Effectus calculi varie Tychonicas variationes nunc antecessit, nunc secutus fuit, nusquam tamen ultra $9'$ facta fuit diversitas. Ego vero meis variationibus malui credere, ut quae ex sinibus lege physica orirentur, cujus legis exempla alia sunt satis evidenter; Tychonicas vero variationes tanquam non physicas deserendas existimavi, quippe quae nascuntur ex libratione in diametro circelli, motus duplicis ad elongationem Lunae a Sole: cum nulla appareret causa physica hujus duplicationis. Haec igitur hactenus fui secutus, usque ad initium hujus anni 1620, quando hypothesin Lunae modo praemisso reformare, eccentricitatem menstruam tollere inque merum (ut ex usitatis hypothesibus loquar) aequantem transformare coactus fui.


Sequitur nunc hujus circa variationem considerationis et calculationis emendatio. Cum enim viderem ratione explicatae superius inaequalitatis menstruae seu *προσνευσας* Ptolemaicae Lunam fieri duplo tardior in apogaeo et copulis, quam in perigaeo et quadris: constituendum mihi videbatur, ubi duplum posset existere lucris vel damni, ibidem et duplum oportere esse sortis: itaque variationem Tychonis et *προσνευσας* Ptolemaei ab una et eadem causa esse deducendam, et tandem esse statuendam variationis accelerationem in copulis, ut damnum ex eccentricitate in copulis ad duplum damni usitati, in quadris apogaeo versante, posset excrescere. Hic cum mea in copulis acceleratio non responderet magnitudine apparenti necessitati physicae, coepi cogitare, quo pacto ea posset augeri. Summa

quidem totius accelerationis per totum quadrantem jam erat mihi praescripta, eadem scilicet quae hactenus. Itaque quanto augerem accelerationes in copulis, tanto videbam diminutum iri ceteras extra copulas. Sinus ergo primorum graduum digressionis Lunae a copulis non erant magni pro mea mensura, sinus vero circa quadras et finem quadrantis nimis erant magni. At sinus primus et incrementa sequentium sunt index apparitionis latitudinis circuli illuminationis Terrae; non ergo ut evanescit circulus hic illuminationis Terrae in Luna, sic etiam minuitur variationis celeritas, sed magis praecipitatis utitur decrementis, orta a majori quantitate totius.

Coepti igitur circumspicere, quidnam esset hic circulus illuminationis Terrae, qui pro motore constituitur, juxta Terram ipsam inaequaliter movens, juxta moventem aequaliter se ipso (?), et quid consentaneum sit ab hoc circulo illuminationis moveri. Nam si eadem est Terra, quae movet duplici respectu, et ratione sui corporis diurno motu rotati et ratione suae illuminationis, eodem modo et de Lunae corpore dicendum esse videbatur, ut eadem esset Luna quae moveretur duplici respectu, et in quantum est solidum in coelo corpus, et in quantum et ipsa illuminatur a Sole. De hujus rei possibilitate et modis et de τῷ διοτι disputent metaphysici, mihi ut supra dictum mensurae motuum tales, quae appareant in rerum natura, ad investigandum sunt propositae et το διοτι. Itaque divisim etiam. Telluris quidem rotatae species, ut solidi corporis, aequabili suarum virium contentione movet Lunae corpus, ut corpus, modificantibus tamen intervallis ut in planetis ceteris: at ejusdem Telluris corpus uti figuratum varie habet adspectum illuminationis suae versus Lunam porrectum, movet ejusdem Lunae corpus, uti et ipsum varie figuratum habet illuminationis suae adspectum versus Terram porrectum. Movet itaque apparens latitudo circuli illuminationis, et quantum ipsa habet in se latitudinis apparentis et quantum ejus invenit in Luna quovis tempore. Atqui eadem sunt incrementa phasium utrarumque: ut quo tempore Terra videt Lunam falcata, eodem Luna videat Terram gibbosam, ut ita circuli illuminationis diametri latitudinum sint semper paralleli, et ejusdem ex inclinatione quantitatis apparentis, in comparatione ad cujusque recte objectae visionem quasi totalem. Ergo non est distribuendum illud auctarium $132^{\circ} 45'$ super 12 Lunae revolutiones integras, non est, inquam, distribuendum secundum mensuram simplicis hujus latitudinis ellipseos seu circuli illuminationis apparentis, sed oportet illam bis adhibere: hoc est, ut geometricè rem eloquar, non incrementa ipsorum sinuum digressionis Lunae ab oppositione vel conjunctione Solis, ut hactenus, sed incrementa quadratorum sinuum debent statui pro mensura accelerationis hujus in copulis.

Porro ut revertar ad initium, talis nascitur forma hujus calculi, ex qua luculentissime appareat, tam variationem Tychois quam προορευων Ptolemaei ex eodem esse fonte. Nam esto in adjecto schemate A centrum

Fig. 18.



Terrae, AB semidiameter illuminationis Terrae, G centrum Lunae, GD semidiameter illuminationis Lunae. Si ergo semper GD et AB parallelae quam proxime, et si sinus GAD multiplicatus in sinum AGB facit numerum, qui metitur


quantitatem seu vigorem accelerationis competentem in tali situ, sic ut factus iste sit maximus in copulis, nihil in quadris: facile apparet, si jam etiam prolongentur lineae AD, BG, per eccentricitatis interventum angulos

GAD diminutum iri, ac proinde accelerationes in toto illo semisse mensis (inchoando a quadris), in quo reperitur apogaeum Lunae, fore minores, id quod supra in schemate 16. praestitit nobis punctum C aequantis menstrui ejusque eccentricitas AC.

Et haec sunt, quae ad hoc usque tempus in lucem eruere potui: at in quantitate utriusque rei concilianda etiamnum haereo. Nam si utraque aequatio est ab eodem fonte, prosneusis quidem Ptolemaei effectum habet maximum (quando apogaeum Lunae est in copulis, Luna ipsa in quadris) $2^{\circ} 30'$, ex hac vero quantitate nascitur jam aliqua etiam variationis quantitas necessaria, sed quae nonnullis scrupulis (non tamen valde multis) distat tam a maxima variatione Tychonica, quam ab ea quantitate, quam meus efficit calculus et assumptio appendicis illius $132^{\circ} 45'$ ad 12 revolutiones in uno anno. Quare vitandae perplexitatis causa finiam hic discursum super causa utriusque physica, et me convertam ad demonstrationem calculi, quae habet aliquot jucunda theoremata et effectum inopinatum. Diminutione enim facta de gradibus singulis distantiae Lunae a Sole vel \odot Solis, vicissim iis accrescere dico accelerationis proportionem seu incrementa decrescentia in ea proportionem, quam servant quadrata sinuum distantiae Lunae a quadris: sicut enim accelerationis vigor est in copulis maximus, sic etiam sinus distantiae copulae a quadra, id est quadrantis, est maximus et totus. Porro quod hic dico idem est cum eo quod supra dixi, sinum primum distantiae Lunae a copulis et incrementa sequentium omnia quadrata esse debere mensuras incrementorum accelerationis decrescentium. Nam

diviso quadrante in partes aequales minimas, ut hic quadrante GN, summa sinuum ad divisiones aequales proxime est in proportionem sagittae cujusque arcus sinus illos continentis: sicut enim summa sinuum ex H, I, K ad sagittam GD, sic summa sinuum ex H, I, K, L, M ad sagittam GB. Hujus prope veri theorematis fundamentum est illud Pappi theoremata simpliciter verum, quod segmenta superficiei sphaericae sint in proportionem suarum axis portionum seu sagittarum GD, GB &c. Posito igitur N loco Lunae in copulis, G loco ejusdem in quadris, si colligam portiones incrementorum, accelerationes decrescentium, servantes proportionem quadratorum de NA, MB &c., summa omnium totius quadrantis eadem erit, quae colligitur, si incipiendo ab eadem portione prima comparem illam quadrato ipsius AB, sinus arcus NM, deinde reliquas portiones admetiar in proportionem BC, CD &c. quadratorum. Cum autem detur mihi summa effectus totius accelerationis per totum quadrantem, ut ea distribui rite possit, opus mihi est summa quadratorum vel NA, MB &c. vel AB, BC &c. et in priori quidem mea vitiosa forma calculi, quando mihi non fuit opus quadratis ipsorum AB, BC, sed ipsis AB, BC, non valde laborandum fuit de summa omnium AB, BC. Nam sinus ipse totus AG continebat partes suas omnes. Itaque summam accelerationis, debitam uni NG quadrantis, tantummodo comparavi sinui toti AG, summam vero debitam arcui NI aequiparavi ejus sinui AE. At quia jam nobis opus est quadratis ipsorum AB, BC &c., nihil nobis prodest totius AG quadratum, quia illud

Fig. 19.



multo est majus summa quadratorum ex omnibus suis partibus. Hic igitur commoda admodum nobis accidit aequipollentia inter NA, MB &c. et inter AB, BC &c. Quia enim indigemus ipsorum NA, MB quadratis, non per se, sed ob mutam eorum proportionem: hic nobis subsidio venit Justus Byrgina, proportionem horum quadratorum exponens in lineis rectis. Sit enim in continuato quadrantis nostri circulo semicirculus NQT, divisus in partes numero aequales partibus quadrantis NG aequalibus, quantitate vero duplas illarum; et sint arcuum semicirculi sagittae ut hic ordine videre est.

Arcus quadrantis	GH	GI	GK	GL	GM	GN	ut horum quadrata inter se: sic hae lineae inter se.
Sinus	HF	IE	KD	LC	MB	NA	
Dupli arcus	TS	TR	TQ	TP	TO	TN	
Sagittae	SV	RX	QY	PX	OV	NT	

Jam vero binae sagittae OV et SV aequant diametrum circuli, sic etiam PX, RX. Quare pro quadratis AN et GG (hoc analogice appello quadratum) sumitur diameter NT, pro quadratis BM, FH diameter alia, pro quadratis CL, EI tertia, denique pro quadrato DK semidiameter YQ. Itaque si, quot sunt partium aequalium quadrantis termini, tot constituam semidiametrorum summam, habeo summam quadratorum omnium sinuum ad illas partes. Et quia terminorum semper uno plus est, quam partium: ideo sciendum est, quo magis minutae multaeque sunt unius quadrantis partes, hoc magis terminum hunc supernumerarium evanescere. Itaque pro 90 partibus quadrantis 90 semidiametri sumtae quam proxime constituunt summam omnium quadratorum. Reliquorum arcuum summae colligendae sunt ex continua additione secantium, ut sciatur quantitas effectus in uno quolibet arcu distantiae Lunae a Sole vel ☉. Hoc itaque pacto fit, ut accelerationem in copulis repraesentet linea NT, et accelerationem in quadris linea O seu nulla. Cum itaque pro primo et pro ultimo gradu quadrantis distantiae Lunae a Sole sumatur linea NT diameter, sit vero de summa omnium sagittarum pars quadragesima quinta: erit igitur valor ejus de summa accelerationis quadrantis debita tantus $3' 34\frac{1}{2}''$. Haec est acceleratio in primo gradu distantiae Lunae a Sole vel ☉. Adde hanc ad modulum virtuti motrici Telluris aequabili debitum, scilicet ad $58' 12\frac{3}{4}''$, conficitur $61' 47\frac{1}{4}''$. Est enim acceleratio $3' 34\frac{1}{2}''$ praecise dupla diminutionis, quae ad hujus calculi formam est necessaria tam in vitiosa quam in emendata forma. Itaque hic in 1^o distantiae Lunae a Sole variatio est $1' 47\frac{1}{4}''$ addenda. Contra in quadris et gradu proximo pro duobus gradibus, uno in copulis et uno in quadris, valet linea NT: illam vero totam vindicat gradus copularum, ut ita nihil relinquatur gradui in quadris. Si gradui in quadris, pro diminutione, quam est passus eandem cum ceteris quadrantis gradibus, nihil vicissim accedit: ergo is manet diminutus, scilicet $58' 12\frac{3}{4}''$. Ergo variatio competens circa quadras est $1' 47\frac{1}{4}''$ subtrahenda. Erat vero in copulis ejusdem quantitatis addenda. Est igitur inopinata aequipollentia mera inter hanc meam ad physicas causas accommodatam calculi formam, interque Tychonicam calculi formam circelli, cujus motus duplo celerior est digressionem Lunae a Sole. Dici non potest, quam valde me exhilaraverit inopinatus hic exitus calculi et demonstratio, quod etiam Tychonis circellus cum suo motu duplici contra quam hactenus credideram causis nitatur physicis. Nam circellum ipsum

per se realem non esse, sed causis niti physicis, Tycho ipse credidit, et sunt in eo tres notae physicarum causarum: prima, quod Luna libratur in ejus diametro tangente orbitam, non vero circumit in circumferentia; secunda, quod circelli motus est inaequalis, tardus in apogaeo eccentrici versans, velox in perigaeo; tertia, quod diameter ejus deberet augeri et minui, si realis esset. Nam semper apparet 40' 30'', sive remota sit in apogaeo, sive propinqua in perigaeo. Demonstratur autem aequipollentia sic, quia gradus singuli apud me sunt diminuti quantitate $1' 47\frac{1}{3}''$, maximum vero incrementum accelerationis est hujus duplum, scilicet $3' 34\frac{2}{3}''$, et hoc comparatur lineae NT. Tycho vicissim non diminuit gradus, additque tantum, quantum indicant NT, OV, diminutae AT, SV, id est quantum indicant NA, OS &c. Atqui summae ipsarum NA, OS, ut prius dictum, insunt in sinibus AC, AF, AG, haec igitur est semidiameter libratoria Tychonis, ut Luna in copulis sit in A, in octante vero in G, in quadra rursum in A, quia idem est, si ille post octantem minuat motum initio non diminutum, ego augeam initio diminutum. Ceterum hoc adhuc desidero in hoc calculo, ut supra etiam dixi, quod, si quantitatem Tychonis $40\frac{1}{2}'$ sequar, tunc neque plane eum concilio cum quantitate $\pi\epsilon\omicron\sigma\upsilon\epsilon\nu\sigma\omega\varsigma$ Ptolemaicae, neque in uno anno conficio $132^{\circ} 45'$, quanta sc. est appendix ad revolutiones 12; et vicissim si conficio $132^{\circ} 45'$, tunc variatio maxima mihi fit non $40\frac{1}{2}'$ ut Tychoni, sed plane $51'$, ubi plus excedo Tychonem, quam in priori vitiosa forma calculi defeceram. Etsi neque observata Tychonis semper modulum $40\frac{1}{2}'$ exprimunt, sed interdum etiam $46'$. Tunc autem augetur mihi horarius in eclipsibus per magnam meam variationem: hoc vero percommode mihi accidit, ne nimiae mihi, ut solebant, prodeant durationes et morae.

Haec ergo, clarissime Vir, potius exercendi mei, quam tui defatigandi causa et scripsi primum, et, cum in nupero discessu Mutschelii nostri literae ad Te scriptae ex incuria ceteris assumtis essent relictæ, transcripsi et copiosius et luculentius. Tui jam esto arbitrii, quid ad hanc posteriorem partem literarum respondeas, quod theoriam Lunæ attinet. Illud solum rogo, de fixis quod petii, ut curae habeas, utque sic respondeas, uti existimas ex utilitate studii astronomici futurum. Et ut melior sit informatio, duo adhuc addo.

1) Cum scias, post annos 18 dies 10 easdem reverti eclipses, eandem sc. anomaliam Lunæ, eundem locum Solis intra 10° , commode accidit, ut ad fixas etiam sociam hujus eclipsidis anni 1619, sc. eclipsin anni 1601. d. 19/29. Nov. Prægae observarem. Exstat observatio in Optica fol. 360. Examina illam, videbis illam testari locum centri umbræ c. 5 scrupulis esse promotiorem quam vult Tycho, et sic conspirare cum Landgravio contra Tychonem. Quidnam igitur hoc est, propter Deum immortalem! quod jam post annos 18 antèius invenio centrum umbræ, quam Tycho vult in theoria Solis? Anne dicemus, præcessionem æquinocetiorum per hos 18 annos quiescere, aut etiam in retrocessionem aliquot secundorum esse mutatam?

2) Circa eandem eclipsin 1619. (Dec.) alia occurrit difficultas. Interim enim dum Mutschelius ivit rediitque, totus in computatione fui observatarum eclipsium. Eclipsidis anno 1616. 16/26. Aug., observata est 3 locis, Tubingæ, Romæ, Lincii consensu egregio. Eclipsidis anno 1619. ^{30. Nov.} 10. Dec. observata est Tubingæ et Lincii consensu iterum optimo, nihil enim te

finxisse puto in gratiam meae observationis. Jam vero utraque circa perigaeum fuit, haec ante, illa post. Differentia anomaliarum est 17° circiter. Quodsi perigaeum penitus mediasset inter utramque anomaliam, summa prosthaphaereseon non potuit esse major quam $1^{\circ} 34'$. At si altera fiat perigaeo propior, minor paulo erit summa. Jam vero non potest valde magnus error esse in distantia locorum Solis in utraque eclipsi. I nunc, et aequa more Tychonico seu meo, seu etiam nulla utere aequatione, nulla ratione efficies, ut Luna his Solis locis opponatur ad observata tempora, nisi valde magno aliquo mutet eccentricitatem Lunae et prosthaphaereseon. Quasi omnino aliquid loco Solis acciderit anno 1619. 6. Dec., ut qui nec Lunae motibus, nec fixis accommodat centrum umbrae. Vides omnibus astronomis etiam atque etiam cogitandum de hac eclipsi anni 1619. Qua adhortatione finiam. Vale. Scripsi 12. Apr., rescripsi 28. Maj. 1620. Lincii. Addideram multa politica, sed illa Deo et politicis curae sunt; nos ut mones precibus nisi, Deo confisi nostra agamus.

Transformatio Hypotheseos et Tabularum Lunarium Tychonis Brahe.

Praemissis disquisitionibus Kepleri de Luna et eclipsibus, quas conscripsit variis temporibus, subiungendam censemus partem opusculi, quod Keplerus plane ad calcem perduxit typisque mandandum sibi proposuit, diversis vero causis motus mutato consilio secum retinuit. Sequentes Herwarti Keplerique epistolae mutuae haec habent ad illam „transformationem“ pertinentia.

Herwartus d. 2. Dec. 1601. scripsit Keplero: ... Ausser dessen (comp. Vol. I. p. 73) füg ich dem Herrn zu vernehmen, dass mir Tycho Brahe in seinem Leben die Verwahnung gemacht, dass er mir seine rationem calculi Eclipsium Solis et Lunae mittheilen wolle. Hat mir darauf seinen I. Partem Progymnasum. Astron. restauratae (der, wie ich verstehe, in kurzem öffentlich publiciert werden solle) geschickt, und noch zu Eingang dieses 1601. Jahrs seine Meinung de motu Lunae, so er „De motu Lunae restituto per novam hypothesin et hinc deductos numeros“ intitult, zugeschickt, darinnen eine tabula aequationis temporis und parallaxium Solis et Lunae. Darüber ich mich nit wenig gefreut. Wie ich aber die Feder angesetzt, hab ich befunden, dass ich noch nit gar damit fortkommen kann, und will mir in calculo. mediorum motuum und in indagazione temporis verae ☉ et ☿ ☽ et ♃ mangeln und ungleich zutreffen.

Derowegen gelangt an den Herrn mein Bitt, er wolle mir behülflich seyn, auch viam demonstriren, damit ich zu meinem Vorhaben gelangen und dadurch sehen möge. Als zum Exempel anno a. Ch. 183 et 180. ☉ Romae tantum defecit, ut coelo sereno tenebrae ingentes fuerint subortae, finde ich ex Tabulis Prutenicis veram ☉ ☽ et ☽ Romae a meridie h. 1. 1' 33'', visam 2^h 9' 38'', ☉ in 22° ∞ defecit digitis 6. 16 tantummodo.

Gleicher weiss find ich ex Tab. Prut. ante Epocham Christi retroactis annis Aegyptiacis, 2 Sexag. 59. annos Aegypt. 31^d 4' 39'' 53''' 16^{iv}, mediam ☉ ☽ et ☽ Borussiae, veram citius h. 11. 29' 19'' sicque Romae apparenter a. m. h. 2. 2' 19'', cum ☉ in 20° 3' 35'' ♀ deficeret dig. 7. 53'.

Da weit ich gern so weit gelangen können, dass ich wissen möchte, wie des Tychonis data und observationes zutreffen. Auch möchte mir der Herr obige 2 eclipses secundum Tychonem supputiren. Ich weiss wohl, dass es ohne sonderbare grosse Mühe nit abgehet, ich wolt es aber gern beschulden und vergleichen.

Wann mir der Herr mit diesem calculo eine oder andere demonstration oder auch delineationes geometricas mit zukommen lassen wollte, wäre mir um so viel mehr gedient, cum, ut fatear quod res est, Davus potius quam Oedipus in hoc genere calculi esse videar. Es delectiren mich gleichwohl alle Mathematische Sachen, ich kann aber, durch Wahrheit zu melden, andere wenig gebrauchen; darum will ich um so viel mehr hoffen und gebeten haben, dass mir der Herr hierinnen wohl verheffen und Satisfaction geben wolle.

Keplerum hoc Herwarti petitum proximo tempore ex parte quidem explevisse, ex hac illius responsione patet (litterae Kepleri desunt): ... Zu meiner von Salzburg wieder Altherkunft hab ich des Herrn Schreiben, den 10. dieses datirt, empfangen, auch die beiden Beilagen, demonstrationem motus Lunae befunden, deren ich mich freundlich bedanke.

Hab mich fürnehmlich erfreut, dass ich aus des Herrn Schreiben vernommen, dass er die beide von mir designirte eclipses Solis secundum Tychonis mentem et tabulas supputirt, mir ehestens wolle zukommen lassen, deren will ich mit sonderem Verlangen seiner Zeit erwarten. Wenn der Herr in calculo ipso andeutet, in was für Puncten der Herr denselben noch für suspect haltet, ist es um so viel besser. Sonsten hat Tycho die motus fixarum und anni quantitatem variatam wohl specificirt, ebenso Solis apogaei motum, eccentricitatis

eclipticae variationem, also dass mich dünkt, man könnte ex his datis eclipses wohl calculiren. Die jüngste geweste eclipsis Solis ist hie nit gesehen worden, dann es gar neblig gewest, sed obscuratio videtur circa quartam p. m. incidisse.

Damit was dem Herrn von mir jeder Zeit lieb und angenehm ist; und bleib dem Herrn angenehme Dienst zu erweisen, neben Wünschung eines eingehenden und vielvolgend glücklich Jar ganz willig und geneigt.

Datum München d. 30. Dec. 1601.

Ineunte anno 1602. transmisit Keplerus Herwarto promissum *calculus*; Herwartus, gratias agens, rescribit (sine die): Hab gern vernommen, dass der Herr es für rätlich achtet, die defectus luminarium circa Christi tempora nachzurechnen, besonders weil wir kein eclipsin Solis haben, die so alt sey, und ab astronomo aliquo observirt, auch wie sie observirt sey, beschrieben worden. Wie auch im Ptolemaeo keine loco exempli beschrieben ist; sondern ich hab auch ex suis datis et assumtis etliche eclipses Solis circa illa tempora calculirt und befunden, dass sie, und zwar auch fürnemlich ratione parallaxium Lunae ex traditis Ptolemaei assumtarum, bei weitem den traditionibus autorum nit zugetroffen. So kann ich die observationes und calculus Tychonis auch dahin nit bringen, dass sie den traditionibus autorum correspondiren. Aber den calculus Prutenicum e fontibus Copernici finde ich trefflich mit den traditionibus autorum correspondiren. Allein dünkt mich, dass je weilen eine eclipsis grösser gewesen, als dieser calculus exhibirt.

Ad haec Keplerus bis rescripsit, calculus forte promissus eclipsium absolvens; e literis vero Herwarti per aetatem anni 1602. in quibus gratias agit pro transmissis calculis aliaque plura tangit (comp. Vol. II. p. 755. III, 28), nil de proposita emendatione theoriae Tychonicae deprehendimus. Ultimo vero die Julii adit Herwartus „Joh. Maenhardus, R. Kais. Mt. Lateinischer Canzley Registratorem“ quaerens: Nachdem ich nit weiss, wo sich anjetzo M. J. Kepler, I. M. Mathematikus, so sich ein Zeit lang bei weiland Tycho Brahe aufgehalten, und bei dessen Erben zu erkundigen, aufhalte oder anzutreffen seyn möchte, als Bitt ich Euch freundlich, Ir wöllet mir so viel zu Gefallen erweisen, und Ins diess inliegend Schreiben zuordnen. Und bleib ich &c.

In literis his subjunctis monet Herwartus, ut Keplerus colligat Tychonis observationes illasque emendet. Deinde, accepta Kepleri responsione, Herwartus (d. 24. Sept.) praemissis adhortationibus, ut evitet discordias cum Tychonis haeredibus, censet emendandum esse motum Solis et Lunae adhibitis veterum auctorum de eclipsibus relationibus additque: Und wolk ich gern wissen, wann einer visa loca ☉ et ☽ hoc seculo exacte praediciren, auch endem methodo eclipses luminarium ex autoribus praeteritorum temporum salviren kann, was doch ime abgehen solte, in diesen Sachen nit allein quoad futura certitudinaliter quoad fieri potest zu praediciren, sondern auch de praeteritis observationibus fundamentaliter zu judiciren.

Der Herr hat mir Ursache zu dieser Anregung geben, indem er mir eine quaestionem chronologicam proponirt.

Aera obitus Alexandri in Ptolemaeo et praesertim Theone ante Ch. annis Aeg.

323.	d. 130.	inde ab Epochā Christi deinceps
883.	„ 116. 53' 45"	ad aequin. autumnale Albategnii

1206 anni Aegypt. 246. 53' 45" dies.

At ante Epocham Christi 81 et post Ep. Ch. 220 dies in hoc spatio intermedio intercalantur, qui conflant d. 301 intercalares, atque consequenter hoc tempus aequinoctii autumnalis ab Albategnio observati incidit ante exactum annum ab epocha mortis Alexandri 1206 Julianam (non Aegypt.). Consimiliter et in fortioribus terminis: ab epocha mortis Alexandri praedictorum ad plenilunium Albategnii d. 23. Jul. 883. Ch. observatum, sunt intermedii anni Aeg. 1206. d. 189. 14' 40". Sed in hoc spatio intermedio ante ep. Ch. 81 et post 220, qui conflant 301 dies intercalares, sunt elapsi, ideoque id ipsum quoque plenilunium merito intra annum a morte Alexandri 1206 collocat, Julianum videlicet. Ego vero hac ipsa in re majorem difficultatem invenio in Tab. Alphonsinis, ubi prope 8 ep. Ch. signatur in meridie currentis ultimi diei Decembris. Et tamen ante eam usque ad initium regni Alex. M. habet annos Aeg. 323. d. 131 integros. Ille etiam epocham ipsam Nabonassari integra die anticipat citiusque ponit, quam Ptolemaeus et Theon et Regiomontanus in Epit. lib. 3. prop. 21. eandem collocat. Refert quidem P. Nonius, Regiomontanum hoc intermedio spatio diem unum Alphonso demere, atque post epocham Ch. usque ad aequinoctium Antonini eandem restituere. Sed non animadvertit, hanc injuriam non tam Alphonso, quam Ptolemaeo, Theoni et observationibus ipsorum contingere.

Quid de observationibus Ptolemaei dicendum, siquidem observationem Agrippae ☿ Lunae et Plejadum d. 29. Nov. a. Ch. 92. optime sane collocat in annum Domitiani 12? At vero observ. Menelai ☿ Lunae et spicae d. 11. Jan. 98. habitam adscribit anno 1. Trajani, cum tamen eo tempore adhuc vixerit Nerva, qui Trajanum pro consorte imperii sibi arrogavit.

Sed sit id ferendum, quoniam tum re vera Trajanus una cum Nerva imperitaverit. Quid quæso reliquis observationibus omnibus ab ipso Ptolemaeo habitis faciamus? Nam æquinocmium autumnale observavit 25. Sept. a. Ch. 132. Idque lib. III. c. 8. adscribit anno 17. Adriani, cum contigerit anno ejusdem 16. Et Lunæ defectum d. 6. Maj. 133. tribuit anno Adriani 17. eidem, qui ejusdem 16. evenit; defectus ☾ 20. Oct. a. 134. adscribitur a. 19. Adriani pro 18. Sic Ptolemaeus observavit ☾ 16. Dec. 138, et libro X. cap. 4. eam observationem assignat anno II. Antonini, cum Idib. Jul. proxime præcedentibus demum inchoavit primus ejusdem annu. Observavit 26. Sept. 139. æquinocmium autumn. et 22. Mart. 140. vernale, sicque utrumque observavit corrente anno 2. Antonini, cum disertis verbis utrumque adscribat anno 3. ejusdem, adeo ut omnes observationes Ptolemaei uno anno citius contingerint, quam ab ipsissimo earum authore inscribantur.

Voluit hanc difficultatem evitare H. Buntingus, ut contra auctoritatem gravissimorum authorum e medio tollendum censuerit consulatum Severiani 2. et Sentii Augurini, qui a. 132. Coss. ordinarii fuere. Will des Herrn Bedenken ratione eclipsium præteritorum temporum gern vernehmen.

Fallet mir zu Gemüth, wie es komme, dass der Herr die differentiam ratione temporis mortis Alexandri M. zwischen Ptolemaeus und Albategnius so fest anziehe, und nit bedenke, dass des Ptolemaeus seine Sachen a Chaldaeis, und die Chaldaei mortem vel saltem monarchiam Alexandri M. ante Ch. 312. desinente vel 311. corrente gesetzt. Dices fortasse, illam opinionem esse absurdam; sed considera, Ptolemaeum et Hipparchum pleraque ex Chaldaeis hausisse; deinde contemplare quæso Livium, ubi de Perseo, ultimo Macedonum rege debellato agit, regnum Macedonicum a summo fastigio usque ad interitum solis 150 annis stetisse affirmat. Ponas itaque juxta Chaldaeos a. a. Ch. 311. Alex. M. Babylonem reversum paulo post obisse, atque a tempore mortis illius, quod Judai quoque anno a. Ch. 310. collocant, subtrahes 150, remanebit utique annus a. Ch. 160, quo contigit eclipsis ☾, quam describit Livius, et cui totalem characterem ratione temporis et durationis tribuit, cui refragari absque calumnia vix atque adeo ne vix quidem aliquis queat.

Dieses Alles in Eil &c.

Datum München &c.

Keplerus respondit (d. 7. Oct. 1602. Comp. Vol. II. p. 77. 755. et III. p. 28):

... Ac cum ipse horteris, ut concordēs simus, dabis veniam, si quæ ad Progymnasmata accesserunt, ab ipsis (haeredibus Tychonis) potius, quam a me Magn. Tuam petere cupiam („Den Appendicem, addit Herwartus monitis suis, libri primi Progymn. wollt ich gern lesen, und wie durch denselben Andeutung geschieht, wird das Werk hiedurch um so viel mehr Nachdenkens bei gelehrten Leuten erwecken.“); mihi enim unicum saltem exemplar est: ab ipsis Magn. Tuæ nomine petere invidiosum. In motu Solis nihil aliud mutatur per appendicem, quam quod ipsa realis eccentricitas dimidio diminuitur, pro reliquo dimidio ratio æquantis substituitur. Ita in solidum eadem manent æquationes, uno forte scrupulo in 19° ☿, 11° ♀ desiderato. Lunæ theoria etiam manet salva et illaesa per appendicem, paucula ad eclipses pertinentia tanguntur. Privatim tamen agito aliquid, non jam ut præcisiorem calculum (qui posteriorum cura erit), sed ut credibiliorem et simpliciorē faciam hypothesin. Difficillima res est: et tamen interdum me scopum penitus tetigisse puto. Id agito (quemadmodum in Marte), ut Luna unum solum habeat epicyclum, quo eccentricitatem conficit; reliquæ inaequalitates, tres numero in longum (ut in Marte meo), sint a causis physicis. Tum non amplius absurdum erit, inaequalitatem menstruam a vero Solis loco pendere. Sed plane uti tu, sic ego quoque sentio, æquationem temporis esse suspectam, quia negligit inaequalitatem additamentorum diurnorum.

Quæstionem chronologicam, si bene percipio, Magnitudo tua bene quidem solvit, sed ita ut tamen duo scrupuli resideant. Summa hæc: Ptolemaeus annos obitus Alexandri intelligit Aegyptios, Albategnius Julianos. Ptolemaeus a 12. Nov. mortem Alexandri præcedente numerat; Albategnius forsitan a solstitio proxime mortem Alexandri secuto perque dies pauculos.

Hæc si concedo in præsens, quaero autem primo, quid causa sit, quod

Ptolemaeus illud aequinoctium autumnale, quod contigit 32. tertiae Calippicae, die 2. Epagomenon, conferat in 178. mortis Alexandri, cum tamen ad complendum 177 ab epocha 12. Nov. superessent duo pene dies. Nec potest dici, vernale praecessisse. Nam quia anni Calippici incipiunt a solstitio, in eo igitur anno praecedit autumnale: utrumque autem assignat eidem 32. anno. Hoc unum est. Deinde si haec ita habeant, equidem Albategnius in intervallo inter Ptolemaeum et se erraverit. Ptolemaeus enim annum Nabonassari tradit, Albategnius Julianum seu tropicum intelligit. Quos igitur ille 743 computat, illi re vera 744 sunt. Id enim animadvertens Buntingus nescio quid dicit. Sed ex ejus computationibus (qua re mihi pergratus est) apparet, Reinholdum Albategnio vim fecisse, quasi 1206 et 1194 intelligendi essent hoc loco de Aegyptiis: cum tamen eo ipso anno Juliano non Aegyptiaco eclipsin collocet: quae character est irrefutabilis. Haec mea ratio cinia si admittenda censes, possunt in futurum esse utilia. Anni tamen quantitas non multo prodit alia. Albategnius enim habet h. 5. 46' 24"; correctus h. 5. 45' 56", adhuc brevior per 28" horae.

De aeris Alphonsi gratias ago quod monuisti. Nam in iis tabulis parum versatus sum, cum id non ferat usus; illud a Tychoe solum andivi, consulendas olim illas, quae aequinoctium praebeant suo Alphonsi tempore; non se dubitare, quin aequinoctium observaverint eique tabulas superstruxerint. De cetero non multa facta est earum mentio. Leovitius nobis vicem earum supplevit ut plurimum. Illud in genere monuit Reinholdus, sine canonum aeras Alphonsi a vera historia multis in partibus plurimum discrepare.

Ceterum in sequentibus ridiculum mihi negotium exhibet Magnitudo Tua, dum me jubet principia defendere. Scilicet omnes Ptolemaei et Chaldaeorum observationes erunt dubiae, si eviceris, quosdam historicos annos regum sub quibus observarunt aliter numerare. Scio, non te ita sentire, sed mei tentandi gratia scribere; sed quia responsum urges, parendum est tanquam in re seria. Dicam primum pro astronomia, deinde pro historia. Quamquam pro astronomia supra dixi, cum illam tuam dubitationem de antiquissimis monarchis ante Alexandrum tangerem.

Hic jam multo aequiorem habeo causam. Supra de magno aliquo annorum numero lis erat, jam de uno anno imperii Adriani, Trajani, Antonini, Domitiani, et ad summum de biennio in annis mortis Alexandri agitur. Nihil haec disceptatiuncula facit ad incertas faciendas observationes. Observationes in universum hae sunt: aequinoctii, Mercurii, Veneris, Lunae, eclipsium. Sic definiendo aequinoctii anno Ptolemaeus mentionem Principis Romani potuit omittere; sufficit ut indicaverit connexionem cum periodo Calippica. In hac connexionem falsus non fuit. Eadem enim Luna, quae Calippo suas periodos, Ptolemaeo suam a Calippicis distantiam patefecit. Nec difficile caput invenire periodi: non quotannis novilunium in 1° ☉ incidit. In Venere et Mercurio, si error in annorum illic 8, hic 13 summa committatur, tantum observatio aberravit, quantum planeta ad summum biduo conficit. Nam post 8 annos Venus, post 13 Mercurius propemodum eodem revolvuntur. At tu praesupponis unius saltem anni aut summum biennii errorem. Quare impossibile est, si annus observationis adulteretur, ut non tanta sit dissonantia observationis cum coelestibus motibus, vulgari saltem et crassa Minerva cognitis, quantam vel coecus palpare possit. Adde quod neutra harum observationum solitarie ponitur, sed illi locus certus

in annis Nabonassari (seu homo jam is, seu fabula fuerit), in quibus et nos hodie certissimum locum invenimus nostri temporis assignatum. Amplius utraque sociam habet aetate Timocharidis conscriptam; quare tam certa est, quam sua socia. Denique utraque per Lunae praesentiam ita certa est facta, ut non possit certior. Ito enim et intra 10° vel 12° vicinitatem Lunae et Veneris aut Lunae et Mercurii conjunctionem talem, quae ad expressum diem mensis Aegyptii expressi quadret, intra non duos vel tres, sed omnino plurimos annos invento aliam, quam est ea quam Ptolemaeus annotavit. De Luna quid verbis opus est? Quando enim quaeso hoc animadversum est, Lunam exacto anno vel Juliano vel Aegyptio rursum eodem die et hora diei, non dicam in eodem gradu vel signi decano, sed omnino in eodem quadrante zodiaci fuisse, quo erat in suscepto temporis principio? Non potest itaque, expressa hora diei, die mensis certi et loco Luna, praesertim conjunctione cum fixa, errari uno vel duobus annis. Novendecim integros intercedere necesse est, vel certe octo. De eclipsibus res est tanto certior, quanto plura concurrunt requisita, quae non quocunque mense possunt accidere, sed ne dies quidem unicus decesse potest observationi Lunae. Dato enim anno et mense cum loco Lunae datur dies, et vicissim die data cum ceteris datur annus. Ita conficitur, ut etsi concedam Ptolemaeum errasse in annis Imperatorum, tamen observationes maneant in suis annis, nec ratione annorum incertae fiant.

Restat, ut de historiis pauca dicam, nec enim est mea professio in his literis. Ac Magn. Tuae iudicium libentius audiam, si Ptolemaeus nobis observationes depromit, quarum a nobis retro distantiam habemus certam, iis vero alios Imperatorum annos attribuit, quam alii historici attribuere videntur (iterum in distantia a nobis retro), utrum faciendum sit: Ptolemaeusne erroris arguendus circa stilum sui seculi, an historici eo posteriores? De aera enim mortis Alexandri causa in confesso est, sita nempe in ignorantia chronologiae. Mihi astronomi certiores temporum characteres in siderum aequabili motu (nisi hunc negaveris), quam historici in suis consulum catalogis habere videntur. Quare malo propter astronomiae certitudinem obloqui factis, quam propter turbatissimorum factorum (quicunque quantumcunque mendicati sint) fiduciam, astronomiae filum Daedaleum e manibus abjicere. Non erat itaque inferendum, omnes observationes Ptolemaei anno uno citius contigisse, quam ab auctore inscribantur, sed hoc potius, omnes Imperatores uno anno tardius coepisse, quam Ptolemaeus tradiderit: siquidem historicis credis et antiquariis contra Ptolemaeum *ἀντιταύτην*, non enim Imperatores mensura sunt motuum coelestium, sed hi Imperatorum et Imperiorum.

Quid Buntingus in ordinatione consulum praestiterit, astronomi parum interesse puto ut sciat, nisi quatenus eclipses aliquae monstrantur, quae postea, dato annorum confinio, quaeruntur ab astronomo, utcunque habente annotatione per consules. Si intempestive omisit illos consules anno 132, quod M. Tuae ex auctoribus fidem facienti credo, continentur ergo, et eorum vice omittatur aliud par abhinc usque ad Constantini tempora. Nam eclipses clare testantur, Mercatorem abundare uno anno inter 59. et 360. Christi. Nec mirum, hoc accidere in consulibus sub Imperatoribus: cum Dion testetur, multos nominatos consules magistratum ob inopiam non gessisse, sed cessasse aliis. Facile hic error irrepit. Sed tu fortasse annos Imperatorum, sub quibus factae observationes, indissolubili nexu cum hisce consulibus circa annum Chr. 132 conjungis. Dicis, non adeo mirandum, quod plus

numeret Ptolemaeus ab Alexandro in observationibus aequinoctiorum, cum pleraque hauserit a Chaldaeis errantibus. Non sum contentus, multo minus quam prius. Si erravit, cur ergo uterque superius ipsum conciliavimus, quasi Aegyptiacos annos a 12. Novembris mortem Alex. antecedente usurpantem. Deinde aequinoctia non a Chaldaeis sed Hipparcho sumit. Nihil igitur huc facit Chaldaeorum error.

Denique epistolam M. Tua claudit propugnatione eclipsis in clade Persei a se inventae, quae septennio abest a clade Persei. Ex errore Chaldaeorum et crassa computatione Livii, duabus scilicet egregiis partibus, unum totum conflatur, cladem Persei 7 annis a vero aberrantem. Characterem putas irrefutabilem 150 annos imperii Persici. Imo refutatur contrario irrefutabili caractere, quod illa eclipsis in hiemem incidit, cum vera et Persei clades contigerit circa solstitium, ut superioribus paginis scripseram. Quin potius ad annum ante Christum 167. addimus illos 150 Livii, quia ex eclipsi constat, Perseum victum anno 167: nec fasti consulares inde a 6. Augusto retro continuati ultra unum annum ab hac computatione abeunt, quibus te hic quoque in summa 6, 7 vel 8 annorum fidem adhibere par est, cum ipsis infra de unico anno contra Ptolemaeum *ἀντομν* credideris. Ergo additi 150 ad 167 faciunt 317, quo anno regnum Macedoniae, interfecto Philippo Arrhidaeo, ad aliam stirpem transiit, Cassandro succedente. An hic quicquam contra Livium? recenset per partes fortunam ejus regni: seorsim antiquissimos reges, seorsim bella civilia successorum, qui ad incerti dominatus certi ex Alexandri gente haeredes fuere: ubi primum Cassandro confirmatum Macedoniae regnum, et occisus Arrhidaeus, ab eo summo fastigio ad ultimum finem annos 150 numerat. Si non placet seorsim commemorata bella civilia, sed inclusa summae annorum CL, quod forte ex textus inspectione dices: ergo aut mecum fateare, Livium crassiori calculo summaria numerorum consecrari omissis minutiis, aut hanc Persei cladem non jam septem annis justo propius Christo admoveas, sed aliis septem annis longius a Christo in antecedentia retrahas. Exspecto utrum velis. An tu putas, summum fastigium regni Macedonici in morte Alexandri fuisse? minime proprie. Fuit is multorum regnorum dominus et monarcha, successor in Monarchia nominatus habens jam fratrem, jam filios. Ab eorum extirpatione demum seorsim de regno Macedonico judicamus. Nisi hoc fiat, non poterimus Macedonum potestatem in clade Persei terminare: superstitibus in Asia Eumene, in Syria Antiochis, in Aegypto Ptolemaeis, Macedonibus.

Sed enim satis feci verborum. Rogo majorem in modum ut Magnitudo Tua mihi libertatem hanc disputandi, quam provocationibus suis auget, in malam partem non interpretetur, et me sibi commendatum habeat. Vale. 7. Octobris Anno 1602.

Magn. Nob. Tuae
officiosissimus

Keplerus.

Postscripta.

Lunae eclipses antiquae ad Solis motum sic possunt esse utiles, si de anno et mense certi simus, et pro die nox sit facta, tunc correctio Prutenicis non tantam eclipsin praebentibus adhiberi potest: ea vel in motibus

Ersueche demnach den Herrn freundlich und dienstlich, Er wolle mir unbeschwerlich den calculum hierüber zukommen lassen.

Dass ich aber sonsten den Herrn ab investigatione motuum reliquorum planetarum abnehmen wolte (v. II, 77), absit, und weil ich disfals vernimme, dass Er in constituenda quantitate anni Solaris laborirt, weiss ich nit, ob der Herr den errorem in calculo observirt, so Tycho in d. Progymn. einkommen lassen. Daneben fällt mir ein, was Rabbi Ben Ezra in initio Sapientiae schreibt: „Est etiam quidam ex illis, qui dixit, diminutionem de quadrante, qui unicuique anno competit, esse partem 106^{am} unius diei (uti Albategnius videlicet), quidam ex illis partem 110^{am}. Atqui constat, juxta seculum nostrum esse partem 131^{am}. Nitimur enim loco Solis (aequinoclii sc.) qui erat temporibus Elzuphi, cui similem artificem nullum audivimus in epilogramo astrorum. Et ipse quidem ita docuit. Secutus est eum Abr. Alzarakeel (Arzakeel) cui nomen temporum suorum comparandus fuerit. Ipse investigavit locum Solis (in aequin.) in seculo suo, qui quidem conveniebat cum observatione Elzuphi.“ Scripsit haec a. m. 4906, a. Ch. 1148. (v. s. p. 507.)

Et quoad planetas, occurrunt mihi 2 observationes ab illo habitae, qui temporibus Caroli M. observavit eclipses luminarium, quas Buntingus calculo exhibuit.

Hic addit Herwartus veterum relata de Marte et Mercurio, quae leguntur Vol. II, p. 789, reditque concludens ad calculum ex Tabulis Tychonis, quem ipsi transmittat Keplerus. (Datae sunt hae literae Monachii d. 20. Oct. 1602.)

Keplerus respondit (12. Nov. 1602): Literas M. Tuae 20. Oct. scriptas 3. Nov. accepi, eas enim Mainhardus per proprium famulum ad me misit.

Maestlini iudicium avide exspecto. Tengenagius literas ad M. T. miserat prius quam has ego acciperem: spero traditas.

Ad quaestionem et de numero anni non habeo aliud quod dicam, quam quod ante dictum est. Verum sic nodum secamus, non solvemus. Errandi occasionem sane Reinholdo Ptolemaeus praebuisse videtur. De Reinholdo affirmavi non ex relatione aut lectione alia, sed ex eventu calculi, qui observationibus Hipparchi, Ptolemaei, Albategnii cen fundamentis nititur. Cum enim Albategnius tradat aequinoctium autumnale in mane 19. Sept. incidens, secundum Albategnianam numerationem annorum Alexandri in 1206, Christi 883, Reinholdus accipit Ptolemaicam annorum Alexandri numerationem, ut incidat in annum Christi 882. Ita ergo format calculum, ut aequinoctium praestet in mane 19. Sept. anno 882, perinde in meridie 19. Sept. anno 883. Bonam vero cautionem mihi monstraveris, si quibus locis exemplaria Ptolemaei varient, per amanuensem describi curaveris.

Ptolemaei observationum ut aliquae teneantur suspicione tua, quod suppositae sint, omnes et antiquissimae teneri non possunt. Quas enim Ptolemaeus mutuatur, illae descriptae exstabant in publicis monumentis Hipparchi, Metonis, Aristarchi etc. Nec omnes erant adhibitae in tentanda aliqua luminarium hypotesi, ut jure quaeratur, cui bono corruptae vel confictae fuerint. Et an fieri possit, ut iis corruptis fortunae tamen ita commendatus error fuerit, ut hodie quam proxime consentiant universali calculo. Quas vero Hipparchus adhibuit, non pensi habuit, si calculo non undiquaque exprimeret, utpote vir ἀληθοειδής, quo eum elogio Ptolemaeus ornat, adeo ut Ptolemaeus Hipparchum ex suis ipsius eclipsibus corrigat ostendatque, quod in calculo erraverit. Ubi hic verecundia, ubi rubor Ptolemaeo, si bonas ab Hipparcho eclipses acceptas prius corrupisset (quod factum latere lectorem Hipparchi non poterat) exque corruptis Hipparchum erroris coarguere voluisset? Exstare dicitur libellus Hipparchi de magnitudine anni in bibliotheca Vaticana. Tale quid et Aristarchi superesse fertur, adeoque typis excusum, in Gemini mathematici opere puto itidem aliqua occurrura. M. V. investiget hos libros publicae fidei causa, si qua in parte miser

Ptolemaeus, qui solus hodie nobiscum loquitur, suscipione mendacii liberari queat.

Gratias ago, quod me monuit M. Tua de loco Rabbi Aven Ezrae. Jam pridem, cum in libro Scaligeri de temporibus id legissem, quaesivi a Judaeis nostris, an posset mihi fieri copia ejus auctoris. Dicunt, amissum in Hispaniis.

Quae jam Keplerus addit de ♀ et ♂ vide Vol. II, p. 755. 789. et III, p. 29. Deinde pergit: Petis denique a me comparationem calculi Tychonici et Prutenici, preposita scilicet verissima hora mediae conjunctionis luminarium ex Prutenicis, quomodo 1) vera loca Solis et Lunae, 2) ipsum sed aequale tempus verae conjunctionis, 3) apparens tempus verae conjunctionis ex sententia Tychonis inveniatur.

I. Locum verum Solis ad quodcunque tempus ante Christum, quod proponitur, invenire, non docent tabulae Tychonis editae.

Nam institutum Tychonis versatur in proximis seculis: de anteactis sententiam nondum dixit, certus rationem illorum temporum esse aliam, quam est hodie, propter mutatam eccentricitatem, de qua minus quam ego dubitavit. Ac in computandis eclipsibus Ptolemaei usus est tabula aequationum Solis Ptolemaica, apogaeo Solis Ptolemaico, praecessione aequinoctiorum itidem Ptolemaica seu ex Ptolemaeo Prutenica, nisi quatenus motum Solis simplicem a fixis nonnihil alteravit, propter suas recentes observationes. Ut haec probem, simul ut exemplo praeceam, si forte imitari velis, quod non puto consultum esse (quando quidem exempla petis): sumatur locus Solis medius anno Christi 133. 6. Maj. h. 11. 15' Alexandriae in prima sc. eclipsi Ptolemaica. Invenio igitur in compendio eorum, quae Christianus Severini Longimontanus in Lunae restitutione laboraverat, annotatum locum Solis verum 1° 13' 14', medium 1° 12' 21'; Ptolemaeus ponit itidem verum Solis ad hoc momentum 1° 13' 15'. Buntingus e Prutenicis verum 1° 13' 15' 22'', medium 1° 12' 20' 7''.

Non esse autem hunc motum medium consentaneum ei motui, quem Tycho prodit in Progymnasmatibus, ex Waltheri et suis observationibus exstructum (ut luculenter testatur fol. 54), poterat etiam sic colligi: tempus completum in forma Tychonica 132. Aprilis simplex d. 5. h. 10. circiter. Adde bissextilem qui me ducat in tabulam resolutorum annorum Tychonis. Sit additio anni 1500

132

1632. Sed Tycho spatium 1500 annorum non est complexus.

Ergo 1632	9° 21' 9" 59''	Sumo quintam partem annorum, sc. 300 (cum sint 75 integra bissexta).
Apr.	3. 28. 16. 39	1500
d. 5.	4. 55. 42	1800
H. 10.	24. 38	300
	1. 24. 46. 58	Quinquies 1500
		9. 22. 18. 36
		11. 33. 0

Motus ergo annorum 1500 est 11° 33' 0'' Ex Prutenicis respondet
Sed locus anno 1632. 6. Maji est 1° 24. 46. 58 comp. 11° 1' 27''.

Ergo locus anno 133. 6. Maji est 1. 13. 13. 58
Ptolemaei simplex a vero aequinoctio: 1. 12. 20. 7
differentia: 53. 51
Sed compositus Solis ex Prutenicis
a medio aequinoctio est 1. 13. 7. 2
differentia: 6. 56.

De apogaeo et aequatione patet, quia consentit ipsorum locus verus et medius cum calculatione Buntingi ex Prutenicis, Prutenicae vero cum Ptole-

maeo. Nam aequatio Tychonis 20 maxime minutis minor est Ptolemaica. Et motus apogaei Tychonici diminutus, adeo ut retrocedat sub fixis per 6 annuatim.

II. Locum Lunae verum computare non potest quisquam, nisi qui de maxima Solis aequatione vel loco apogaei certus est. Quod accipe cum hac distinctione: tria requiruntur, motus simplex \bigcirc et \odot , anomalia \bigcirc , et tabula aequationum. Quod simplicem \bigcirc attinet, eum Tycho expiscatus est ex Ptolemaicis et suis eclipsibus, comparato interjecto spatio. Methodus haec est: in puncto eclipsis maximae Luna est in opposito loco Solis, qui quot contineat gradus vel minuta ejus signi, ad Lunae rationes nihil interest. Ceterum hoc interest ad rationes Lunae, quod in tabulas referendus est motus ejus medius a medio loco Solis. At medius et verus locus Solis non coincidunt. Ergo si Ptolemaeus et ex eo Tycho in priori eclipsi hora $11\frac{1}{4}$, quo momento fuit medium deliquii, dicant aequationem Solis esse 55' ex tabula aequationum Ptolemaica, illa vero sit minor per 12 sc., putabitur utique verus motus Lunae eo momento a Solis medio sc. 55, qui est tantum sc. 43'. Itaque etsi alter terminus penes nos rite constituatur, tamen ad Ptolemaei tempora quantitas mensis Lunaris falleret per 12, et in duplo tempore sub Trojam captam per 24 et sic consequenter. Compensaretur id quidem per aequationem Lunae, quoties eadem anomalia rediret, at in ceteris omnibus anomaliae locis tanto gravius peccaretur.

Jam quod anomaliam attinet, indidem illa petitur, unde et motus simplex. Ad tempora Ptolemaei ex tribus eclipsibus constituitur anomaliae motus. Itemque ad nostra tempora ita comparatione temporis medius anomaliae motus elicitur. Rursum itaque, si Sol sub momentum oppositionis statuatur $13^{\circ} 15' 8''$ per eccentricitatem diminutam, tunc sane 12' illa, quibus aberrari statuimus, adscriberentur aequationi Lunae. Et quia alteraretur verus ejus motus excessusque ejus supra medium, necesse esset ipsam etiam eccentricitatem vel apogaeum alterari. Atque hoc sane nomine gratias tibi ago, quod me in hanc considerationem inducis. Etenim per otium explorabo, an notabile aliquid peccetur in aequatione Lunae maxima constituenda, si alicubi 12' praeter justum accedat. Id ubi sic habere deprehendero et ubi nihilo minus ex Ptolemaei eclipsibus eandem hypothesin exstruxero quam ex recentibus (quod Tycho sane fecit), pro certo affirmabo, eccentricitatem et anni magnitudinem et aequinoctium id fuisse tempore Ptolemaei, quod is nobis assignatum reliquit. Nihil aut parum hic impedit nos, si in horae aliqua parte aberremus: quantum enim in illo spatiolo motui Lunae medio accedit, tantundem fere accedit et vero. Sed haec interjicio. Vides autem, quod motus anomaliae una cum motu Lunae simplici ad tempora a. Chr. pene totus in Ptolemaei arbitrio consistat.

III. Quod tertio tabulam aequationum attinet, aequationes Tychonicae maximae Prutenicas tantum 2' superant, sc. in 90° et 270° . At in 45° differentia est 10', idque propter differentiam hypotheseos. Cum igitur ex disputationibus meis de causis aequationum physicis appariturum sit, ne Tychonicam quidem ordinationem hypotheseos seu applicationem aequantis ex omni parte recte habere: erit et haec revidenda, nec illi in antiquis eclipsibus pertinaciter fidendum.

Puto autem (nunc sine calculo, ex aestimatione), medium quodammodo inter Prutenicas et Tychonicas aequationes esse sequendum. In universum videor mihi sine auctoris injuria, imo secunda ejus voluntate (quantum ex folio 54.

et aliis apparet), monere posse, parum profuturum ejus calculum Solis et Lunae, si quis illum cum omnibus praesuppositis sine delectu temporibus Christi accommodare velit. Quod qui facere volet, ille sequatur praecepta in Progymn. et solvat triangulum, quo locum Lunae quaerit extra veras oppositiones. In ipsis oppositionibus habet compendium per motum horarium Lunae fictitium.

Hinc jam patet, quod supra secundo loco mihi imperabatur: quomodo ad datum mediae conj. tempus verae oppositionis medium tempus inveniatur ad tempora Christi; potest enim fieri dupliciter, prout aequationem hanc vel illam usurpare placuerit: me suasore per anomaliam Solis annuam ex Prutenicis collectam excerptat aequationem Solis itidem Prutenicam, et per anomaliam Lunae ad datum tempus mediae oppositionis excerptat aequationem Lunae, sumendo medium inter Ptolemaicam et Tyconicam, et si utraque et Solis et Lunae sunt diversarum affectionum, colligat illas in unam summam cum titulo, quem Solaris habet aequatio; sin ejusdem sunt affectionis, minorem a majori auferat, residuo titulum faciat, quem habent aequationes ambae, si a Sole stat excessus, contrarium si a Luna. Reliquum praecepti expediam per correctionem textus in Lunaribus folio 126 a linea 16 „Aggregatum autem prosthaphaeresium in casu priori, et differentiam earundem in posteriori in tempus quaesitum sic resolve. Cum iisdem multiplica 24 horas, et summam partire in motum diurnum Lunae a Sole, quantum illum anomaliam Lunae ex columna prima tabulae suppeditat.“ Et tempus seu horas quae prodeunt, pro tituli exigentia quem fecisti, adde vel subtrahe tempori opp. et conj. mediae.

In exemplis propositis, quae illa ipsa sunt, quae jam olim computavi
M. T. petente.

Annis 3 ^o 2 ^o diebus 1 ^o 59 ^o 38' 54"			Annis 2 ^o 59 ^o diebus 31. 4' 40"		
Ex Prut. prosth. orbis absoluta est 1 ^o 35' 35" sub.			2 ^o 18' 51" sub.		
Anom. \bigcirc simplex 4 ^a 17. 10. 35			10 ^a 20. 43. 39		
Aequatio ex Prut. 3. 34. 27 sub.			2. 55. 19 add.		
Ex Tychoe 3. 27. 30			3. 4. 54		
Diff. 6. 57			Diff. 9. 35		
Dim. 3. 28			Dim. 4. 48		
Aequatio secundum me 3. 31. 0 sub.			3. 0. 7 add.		
Solis 1. 35. 35 "			2. 18. 51 sub.		
Residuum: 1. 55. 25 "			Summa 5. 18. 58 sub.		
Horarius ex Tych. 32. 34			Hor. Tych. 28. 18 0		
1. 37. 42 3 ^o			4. 43. 0 10		
17. 43. 0			35. 58. 1		
16. 17. 0 30'			7. 40. 0		
1. 26. 0 2			7. 4. 30 18'		
1. 5. 8			28. 18		
20. 52 8"			7. 12. 15"		
3. 2. 1. 59. 29. 44.			Horae 11. 16. 15 sub.		
Vera conj.			Prodeunt h. 3. 32. 8 add.		
			Sed jam ante epocham		
			addendae sc. 28. 47 $\frac{1}{2}$		
			2. 59. 31. 4. 40		
			2. 59. 31. 33. 27 $\frac{1}{2}$		

Miraberis de mendis in textu. Verum est; aut ego nimium curiosus haeredibus visus fui in alieno, aut haeredes nimis negligentes fuere, ut ideo me ablegaverint et ad typos corrigendos non adhibuerint. In manuscripto

appositus erat diurnus ante suum horarium, ut tres columnae essent. Diurnus fictitius in conj. et opp., diurnus ante et post, et horarius ante et post. Tot ordines numerorum paginae forma ferre non potuit, et per se res eodem recidit. Itaque haeredes privato consilio opera studiosi Jo. Erikson diurnum utrinque removerunt, horarium utrinque substituerunt, ut duae tantum columnae fierent. Id factum sane non male, et monueram de hoc in meis notis, quas a me cum aliis quodammodo extorserunt: sed oportuit et verba praeceptorum mutare et novae formae tabulae accommodare; imo vel sine tabulae mutatione praeceptum alicubi plane corrigere. Sed nec ipsi considerati fuere: dum praecipitantur omnia, nec me arbitrum invitis et offensis, imo et juridicas actiones minantibus ingerere debui. Quae hactenus errata deprehendi. scribam.

P. 02. puto scribendum 1567. Apr. 9. h. 0. 0'. 6 d. 29', nam ita invenio ab ipsis inventum in calculo.

P. 04. Centro B nusquam assignat suum certum situm. Sciendum igitur, AB esse lineam ejus apogaei, quod constituitur, si pro epicyclo scriberetur eccentricus; circumit enim B sub aed. annis circ. 8. Idem p. 024, ubi KC || AB.

P. 06. in calce pro \overline{M} — \overline{C} .

P. 07. 1540 sub tit. Anom. lege 1 sig. 1. 23. 21. Passim eclipsis pro eclipsi. Et 029. in in tit. Nodorum.

P. 120. lege a. 1586.

P. 029. fronti et calci ascribe: Verus motus Lunae a vero Solis.

P. 112 vero: motus lat. verus. Id puto facere ad meliorem Tab. intellectum.

P. 127 l. 12. Verba „ob implicationem annuam“ parenthesi notaveram, in notis monebam, videri ex priori restitutione hic impertinenter restare. At manserunt in textu cum parenthesi: ita signata cum sint, plus lectorem feriunt, quam antea.

P. 128. Luxandi marginales inferiores ad dextr. ascendentes, et cyphra a summo loco in unum detrahenda. Ibid. secundarum ordo sub anom. 5 talis esse debetur: 45. 53. 0. 8. 14. 18. 21. 23. 25. 26. 27.

P. 129. Sub tit. horar. lege 8. — textu l. 5 et 10 adde simplicem; lege mensis 14.

P. 130 l. 5 l. 33' 21": sine l. per motum Lunae hor. ex II. columna.

P. 132 l. 5 iterum adde simpl. l. 12 horarium \rangle ex prima columna, qui est 27' 44".

Fol. 133 l. 30 lege: ut ex secundae tab. columna liquet.

Illi hactenus errores mihi occurrerunt, si M. Tuae aliqui occurrant, praesertim si quid vides in calculo Solis, id mecum rogo communices. Nescio an illum dicas, cujus exstat mentio ineptissima in erratis (ad fol. 22), quam hercle indignabundus lego. Usurpant enim mea verba, quae ego monendi causa adscripseram expectans ut colloqueremur, an et quomodo monendus esset lector. Nam his sane crudis verbis ex musca elephantem faciunt, cum in apogaeo Solis vix duo scrupula efficiat, in ceteris nihil verbo dignum: et possit per aequipollentiam arcuum parvorum cum suis subtensis excusari. Miserrima libri conditio, quem auctor 20 annos parturit, tandem haeredes festinantes ad nudinas abortierunt.

IV. Restat ultimum postulatum, de aequali tempore verae conjunctionis in apparens convertendo secundum Tychonis mentem. At expeditissima ratio est ejus ante et post Christum. Nam differentiola, quae se immiscet ob diversam olim obliquitatem, nullius est momenti, aut si cui lubet *ἀπολογισμός* tolli potest per tabulas primi mobilis Reinholdi.

In primo exemplo \odot est in $23^\circ \odot$, in secundo in $20^\circ Q$. Tychonis aequatio $7^\circ 22'$. It' fiat apparens, fac contrarium titulis. Contra, quia tempora ante epocham, fac iterum contrarium.

3.	2.	1.	59.	29.	44	—	2.	59.	31.	33.	27½	
					7.	22					9.	42

Temp. app. 3. 2. 1. 59. 37. 6 2. 59. 31. 43. 10

Si quis vero nolit negligere aequationis partem alteram a Tychone exterminatam, is adeat Prutenicarum modum aequationis primum. Jam enim non Tychonico, sed Ptolemaico modo aequabit.

Huc usque Keplerus; conclusio literarum in manuscripto deest. Ex Herwarti response, d. d. 20. Nov. 1602, haec tantum ad praemissa pertinent: Dem D. Tegnagel hab ich jüngst geschrieben und wegen Ergänzung des Abgangs dank gesagt.

In assumptione temporis aequinoctii ab Albategnio observati zweifelt mir nit, dass sich Reinhold geirrt und annos tropicos pro aequinoctialibus Ptolemaeo usitatis angenommen, wie ich denn nit wüste, wie es sich sonsten vertheidigen liesse. Das von Ptolemaeus bezieht sich blos auf die errores chronologicos und observationes crassiori Minerva factas.

Von Hipparch ist „de magnitudine anni“ nichts vorhanden. Das so anno 67. zu Florenz ausging, *περι φαινομενων*, ist sein Werk nit.

Für die zugeschickte declaration super calculo Tychonico und der Sphalmata im Druck thus ich mich bedanken.

Deinde Herwartus, pro transmissis Tabulis Kepleri Lunaribus (vide supra pag. 30) gratias agens, addit: Die Tabulas hab ich gar gern gesehen, und hat der Herr den Studios Matheseos hieran gewisslich ein sonderes beneficium gethan. Da sie blos temporales — ab anno 1400 ad 1800 — so sind sie mir zu den finsternissen, so circa tempora Christi et ante Christum sich begeben, als welchen ich allein nachtrachte, nit dienstlich; trag sorg, sie seyen ad tempora ante Christum nit zu extendiren.

Ich halt auch für gewiss, dass wenn diese dilucidatio tabularum gedruckt und den Progymnasmatibus beigelegt würden, es werde zu besserem Abgang der Progymnasmatum dienstlich seyn. Ich wolt auch nit unterlassen, quondam Tychonis haeredes dessen zu avisiren, wann ich wüste, wie solches geschehen solle; denn ich, wer sie eigentlich seyn, nit weiss. Von übrigen bleib ich etc.

Datum München d. 6. Juni 1603.

Kepleri responsio (d. 5. Jul. 1603) exordium exhibimus Vol. I, p. 656. Reliqua haec sunt: In prioribus literis scribis, diu delituisse Lunaria mea, quod miror, nec injuria aliquid suspicor; rogo itaque majorem in modum, ut me certiore faciat M. T., an in lituris quibusdam agnoscat M. T. meam manum. Quod attinet eclipses, non dissimulandum, compendiosius ex tabulis Tychonis inveniri Lunaribus eclipses medium momentum, in Solaribus quidem, ubi Tycho admiscet triangulum suum rectilineum, ex meis compendiosius procedetur. Nam etsi in universum in hoc reputo compendium inesse, quod apogaei et nodi motum ab aequinoctio inquirere doceo, hic tamen modus necessario particularis est, quod consilio feci, ut cum Tychonis Lunaribus pari passu ambularem. Quomodo vero tabulae Tychonis ad antiqua tempora quodammodo possint accommodari, scripsisse me memini superiore anno. Ea accommodatio in his meis tabulis fiet operosior et requirit multa, de quibus nondum certi sunt astronomi, ita inhabiliores sunt hae meae ad antiqua tempora, quam Tychonicae. Ac etsi possunt accommodari, non tamen operae pretium. Ego quidem meum consilium et usum omnem in praefatione explicavi. —

Quod haeredes attinet Tychonicos, unus est instar omnium Fr. G. Tegnagl, nobili genere Westphalus et in praesens Caesareae Majestatis minister aulicus. Mathematicus enim non vult audire. Nihil honoris hac mentione M. T. impono. Volo ut pro mero arbitrio suo M. T. agat cum his tabulis.

Ne vero nihil scripserim, addam compendium expeditissimum quaerendi in Solaribus eclipsibus parallaxes latitudinis. In Copernico exstat tabula angulorum eclipticae cum horizonte; cum hoc igitur angulo (tanquam essent gradus altitudinis Solis) ingredere tabulam parallacticam Tychonis sub convenienti titulo semidiametrorum Terrae, et area statim exhibet parallaxin latitudinis verissimam.

Oriatur $18^\circ \zeta$ sub A. P. 45° . Angulus $32^\circ 32'$. Sit Luna in perigaeo, alt. 55 semidiametrorum. Ergo has in fronte, angulum $32\frac{1}{2}^\circ$ in sinistro margine quaerens invenio $53' 13''$ parallaxin latitudinis Lunae, ubicunque illa sit in zodiaco, modo supra Terram. Et ut propius accommodem ad eclipses, quia sub titulo 55 semid. est horizontalis Lunae parallaxis $62' 30''$ et Solis horiz. $3'$, subtractione facta est parallaxis Lunae a Sole $59\frac{1}{2}'$: hanc quaero e regione 0° altitudinis, et invenio illam fere sub 58 semid.; itaque in hac columna e regione $32\frac{1}{2}^\circ$ datur $50' 27''$ parall. lat. Lunae a Sole. Jam et longitudinis parall. inde habetur. Sit enim DE horizon, BA verticalis, CA ecliptica. Quia BAD est 90° et CAD $32^\circ 32'$, erit BAC $57^\circ 28'$. In triangulo igitur BCA quasi rectilineo, rectangulo in C, dantur angulus A et BA et BC latitudinis parallaxis. Nam BA est in hoc exemplo $59\frac{1}{2}'$, BC est $50\frac{1}{2}'$, quaeritur CA, longitudinis Lunae a Sole parallaxis horizontalis, idque ut lubet, abundamus enim datis: compendiosissime vero, quia CBA fere rectilineum, erit CBA aequalis CAD: ut ergo sinus BCA rectus ad BA $59\frac{1}{2}'$, sic sin. CAD, id est CBA anguli, qui est $32\frac{1}{2}^\circ$ ad CA. Ergo CA in horizonte est 32. At non ut BC sic et CA per omnes eclipticae gradus oriente $18^\circ \zeta$ manet aequalis, sed mutatur. Sit ergo Luna in $19^\circ \mathcal{M}$, distat ab $18^\circ \zeta$ oriente 59° ; per hanc distantiam iterum ingredior tabulam Tychonis in margine, et horizontalem longitudinis Lunae a Sole parall. $32'$ quaero in fronte, jam (quia hic titulus abest, sumo ejus duplum $64'$, quae invenio fere sub 54 semid.) area exhibet $16' 40''$ (hic duplum ejus $33' 19''$), itaque $16' 40''$ in $19^\circ \mathcal{M}$ est parallaxis longitudinis Lunae a Sole oriente $18^\circ \zeta$ in Alt. P. 45° . Sed $50\frac{1}{2}'$ est parall. lat. Lunae a Sole, ubicunque fuerit Luna in π , \mathcal{M} , \times etc., modo cetera maneant.

Ita vides, unica brevissima multiplicatiuncula parall. lat. Lunae a Sole in sinum anguli eclipticae cum horizonte prodire; quod et Tychonis tabula exhibet parall. longit. Lunae a Sole. („Error“ Keplerus in marg. adscripsit.) De latitudinis parallaxi demonstratio est certissima, ad longit. parall. argumentor per analogiam.

In meis Opticis tandem, Deo gratia, ad finem perveni; quatenus titulus patet Astr. Pars Optica, quae additurus sum, usum in exquirenda vera motuum Lunarum hypothese patefacient. Illa vero sunt pars magna astronomiae geometricae, nempe lib. IV, V et VI Operis magni Ptolemaei. Jam et de occasionibus edendi et de extorquendo salario meo cogito, inque his sum occupatus. In theoria Martis cetera sunt expedita, verba adhuc desunt.

Vale magnifice Vir et me amare perge.

5. Juli 1603. Praegae.

Magn. Nob. Tuae
officiosissimus

Johann Kepler.

De Tabulis Kepleri Herwartus haec nunciat Keplero d. 13. Nov. 1603 (simul se excusans ob diuturnum silentium, vid. Vol. I, p. 655): Ich bin verschienenen Tagen zu Augsburg gewesen, u. hab dasselbsten Nachforschung gepflogen, ob u. was Gestalt des Herrn facilitatio calculi Lunae secundum data Tychonis Brahe möchte gedruckt werden. So haben aber die, so anwesend gewesen, so viel Ziffer Characteres nit, und gewart ich von einem, so abwesend gewesen, fernerem Bericht.

Wie es Ime in den unter Handen habenden operibus, und sonderlich ratione theoriae Martis, wie auch sonsten ergehe, vernimb ich gar gerne. Und bleib Ime angenehme dienst und freundlich geneigten Willen zu erweisen, vorders genaigt und gewogen. Dat. München etc.

His exceptis nil amplius deprehendimus in literis Kepleri et Herwarti mutuis de „Tabulis Lunaribus“. Haec autem cum Longomontano egit de iisdem Keplerus. In literis quas diximus p. 32. 443. ille gravissime aggreditur Keplerum propter „nimiam industriam circa refutationem Tychonianae in Lunam hypothesis“. Keplerus in responsione sua (anno 1605) se contra Longomontani objurgationes sic defendit: . . . Tu vero scias, me nullam instituisse refutationem; aliud est transformare, aliud refutare.

Transformatio mea nihil aliud fuit, quam ejusdem restitutionis ampliatio, ut intelligeretur, diversis hypothesibus idem praestari. Tu ipse affirmas, modos tibi sex superesse. Mihi vero ad meum institutum necessaria fuit transformatio, ut id obtinerem, quod agebam, scilicet ut calculum trianguli unius in tabulas conjicerem. Poterit alius forsitan idem praestare retenta hypothesi Tychoniana: ego tunc quidem tam felix non fui, et inclinatum me fateor ad formam physicam, quam amplector prae ceteris, quoties aequae ac ceterae officium facit. Ex praefatione ad Herwartum aliquid fortasse possit excipi, quod refutationem vel omnino insimulationem aliquam sapiat: quasi obscura sit hypothesis et quasi tabulae non sublevent calculum labore triangulari. At primum ego illam praefationem ita immutavi, ut Tegnaglio placuit; deinde nihil ex me dixi, sed ab aliis et ab Herwarto ad me scripta assumsi, ut literis auctorum cuius quovis tempore demonstrare possum. Tu vero, si dubitas me sic in praefatione loqui, pete illam a Tegnaglio; exstat apud illum manu Matthiae (Seiffarti) sine quidem mutatione, qualem scripseram ex me ipso, non qualem ex sententia Tegnaglii immutatam. Posteaquam acceperis, addam ego quae fuerint mutata. Nihil ergo in mea transformatione est, quod mereatur nomen refutationis. . . . Non opinor, te in epistolio meo legisse, quod vehementer mihi applaudam de transformatam hypothesi Tychoniana Lunae. Itaque non aegre mihi faciunt tui sex modi alii; mihi ad institutum meus modus sufficit ac forsitan idem unus ex tuis sex fuerit. Quin hac commemoratione me excusas de ea supervacanea opera, cujus me insimulaveras. Nam si tibi placuit sex modis ludere, placuit et mihi uno. Nec est major gloria, quod tu hoc in proprio labore suscepisti, ego in alieno. Nam quae publici juris sunt, aliena amplius non sunt. Ita Ptolemaei observata Copernicus in suam hypothesin transfudit, ita Maginus Copernicana in antiquas Ptolemaicas hypotheses. Itaque si hic est scriptio tuae scopus, ut dicas, me nihil magni praestitisse, aequis te auribus audio: nunquam magnifeci. Allegavi Herwarto non unam privatam utilitatem, quam ex hoc exercitio percepi. Non magni tamen facio, quia non imprimi curavi hactenus, nec communicavi amicis enixe petentibus.

At hoc pacto non probas, me refutationem Tychonis instituisse, scilicet hoc ipsum refutas. Illud enixius agis, ut mihi scopum potissimum eripias triangularis laboris sublatis. Primum ais, consulto factum a Tycho, ut causa esset, cur adolescentes triangulis operam darent. Si disputandum hoc sumerem, credo, ut est probabilitatis ingenium, dicendo facile efficere, ut tu contrarium ei sentire, quod Tycho sensit. Sed non est opus, praesertim apud te, qui scis, artis nostrae ignoratione fieri, ut potius decem astronomiae valedicere velint, quam ut unus ad triangula veniat astronomiae causa. Illud saltem dicam, propositum hoc mihi ab ipso Tegnaglio suppeditatum. Cum enim sumeret Matthias anno 1602. operam scribendi Ephemerida motuum Lunae ad annum sequentem, triangularis labor plane multum temporis insumsit. Itaque et Tegnaglius et Matthias hoc questi sunt, et, contra quam tu jam, satis quidem se exercitatos esse putarunt in triangulari labore, sed non satis temporis et nimium taedium se habere agnoverunt ad eandem viam toties eundam. Dicebam ego Matthiae, existimare me, citius posse scribi tabulas, quam unius anni Ephemerida. Ille, idem sibi videri, ac perinde, si director esse velim, abrupta Ephemeride, se tabulas prius conditurum. Sed factum est similitudo nostra, ut et Tegnaglius suo ministro solus uti malle videretur (idem enim perlibenter a me audit, posse tabulas

condi faciliter per aliam imaginationem hypotheseos; tantummodo hoc pro jure suo ursit, ut id primum perficeretur, quod sibi esset visum, Ephemeris nempe), et ego id, quod levi mea opera fieri posset, Tegnaglio inviderem, ne is de re non magni momenti et meae inventionis olim gloriari posset. Ita factum simultatibus, ut res, se ipsa ab initio exoptata, postmodum verteretur in fel et acetum; praesertim cum ego opus non prius monstrarem Tegnaglio, quam jam scriptis ad Herwartum literis et postae commendatis, exemplum, quod videbat Tegnaglius, etiam postae commendaturus essem. Nam vix obiter hypothesin Matthiae delineaveram, atque ex eo non verbo uno dicto intra 6 septimanas jam perfectas esse tabulas indicavi. Haec importunitas nova exasperabat antiquas et diurnas simultates. Tegnaglius ipse opera Johannis (Eriksen) et Matthiae tabulas hujusmodi condidit, quibus meas facilitate superet; itaque non res est vitiosa, sed modus agendi: atque utinam scopum facilitatis attigissem propius; certus enim sum, gratias mihi acturos esse multos, contra quam tu.

Altera tua refutatio mei insituti est haec, quod labor triangularis supeditet distantias Lunae a Terra, utiles in astrologia ob particulares parallaxes. Respondeo: calculus Tychonis a me non est sublatus, computet qui volet; nam mea transformatio exhibet easdem distantias. At si quis non quaerat distantias, sed nudam longitudinem, ei taediosum est, triangula consulere et distantias prius adire, quas primario non expetit. Tum autem, quid tu de circello argutaris ejusque effectum in variandis parallaxibus? Quid si in omnibus parallaxibus plus aberrares, quam circellus efficit? Nos plane hoc affirmo, sed sub conditione. Nam si tu diametrum Solis et umbrae mordicus fueris tutatus cum parallaxi Solis, omnino tibi res haec recidet sub contradictionis comminatione, ut parallaxin Lunae evidenter mutare cogaris.

Iam ad alia venis, et si tuam reprehensionem tectam bene percipio, jam tu hanc particulam tituli mearum transformationum adoriris, quod dixi: „pro typo tabularum Rudolphi ad deliberandum propositas.“ Tu ergo miraris, audere me ceteros planetas, de quibus nondum constat, aequiparare Lunae. Non facio, mi Christiane; cur enim „ad deliberandum“ proponerem, si jam esset exploratum? Scio, Lunae esse particularia multa, ac fortassis etiam planetae ceteri inaequalitatum numero et qualitate distinguuntur plus quam hactenus credidi. Unum autem est in tabularum transformatione, quod citra controversiam imitari possumus in ceteris omnibus planetis, si modo consultum fuerit (quod deliberandum esse dixi), ut scilicet per excessum temporis supra momentum, quo planeta in apogaeo eccentrici fuerit, statim excerpatur anomalia eccentrici coaequata; atque huc ego potissimum respexi, quia apogaea et nodi planetarum ceterorum valde tardi sunt, et facili opera computantur. — Quae ad singula eorum, quae praestita in Luna commemoras, dici fortasse possent ab astronomo, mitto, ne novas quaestiones serere videar non finitis veteribus, praesertim cum nihil habeam in praesens nisi conjecturas physicas, nec ex professo tractem Lunae negotium. Quid nunc de me meruit odiosissima illa tua exagitatio insolentiae ejus, quam mihi per nequissimam calumniam tribuisti? (Longomontanus recensitis iis, quae Tycho in Lunae theoria perfecit, addit: talia a te unquam praestari posse vehementer metuo. Id autem non metuo, quod ad praeclaram censuram omnium bonorum et intelligentium virorum de defuncto Tychone haec sordida tua insolentia magis sordescat et odiosa fiat.) Quid enim nisi ut te vicissim et tuam *κακορθεύαν* ex-

agitando tantum paginae spatium occupem, quantum tu occupasti. Sed mitior ero, nec quicquam tibi ad tot convicia regero, nisi ut relegas schedam meam, eaque lecta quod ingenuum virum decet erubescas teque ira et falsa imaginatione literarum absentium praecipitatum doleas. (Ad verba Longomontani supra allata adscripsit Keplerus: Debacchare in larvam a te concinnatam.)

Quod vero ne monitus quidem erroremprehendis, eo te tanto magis errori obstringis. Sed facessat odiosa exprobratio, orta ex contagio tam vicinae calumniae. Dicam ingenue, candide, astronomice. Tu parallaxes Lunae explorasti seorsim, diametrum \odot seorsim, diametrum umbrae seorsim. Ex his nosti Ptolemaeum inquirere altitudinem \odot ex centro Terrae, ex ea parallaxin \odot . Hoc tu neglexisti existimans; sufficere ut a veteribus et Tychone itidem seorsim parallaxis \odot sit assumpta. At si tu Ptolemaeum imitatus (vel non multo aliam methodum, assumptis aliis quam Ptolemaicis) ex parallaxi Lunae in transitu umbrae et latitudine umbrae, itemque ex apparente \odot diametro, qualem assumsisti, quaesivisses tanquam ex genuinis principiis elongationem et parallaxin Solis, non tantum non hanc parallaxin \odot invenisses, quam Tycho ex veteribus retinuit, sed deprehendisses, rem tibi plane ad impossibile redire. Certe ego nunc demum video Ptolemaei consilium, cur ille Lunae et per eam Solis diametrum in eclipsibus per ante notam latitudinem et digitos eclipticos metiri maluerit, quam alia faciliore ratione ex ipsis observationibus deducta. Nam me hercule modus per se absurdus est. Si etiamnum obscurus tibi videor, ad calculos eas, statim omnia tibi fient dilucida, nec me plura verba facere opus. Invenies rationem adeo lubricam, ut intra 900 et 2000 semidiametros nihil certi concludi posse videatur de altitudine Solis. Admodum hilaris sum, postquam ex lacuna contentionum eluctari me videor ad philosophicam disceptationem atque eam meae professionis, qui Optica scripsi. Videbis igitur in meo opere aliqua tibi placentia, aliqua contraria. Illud contrarium tibi, quod si \odot cum \odot (separatis jam parallaxibus) non videbitur alibi plus, alibi per aliam refractionem minus cum \odot , quia refractione non potest divellere visui sidera, quae citra refractionem viderentur conjuncta.

Haec Keplerus, reliqua vide supra p. 32 sq. — Keplerum parum curasse, ut typis exscriberetur libellus, cujus partem (omissis tabulis) sequentes referunt paginae, apparet ex his ad J. Remum anno 1619 datis verbis: Meas transformationes anno 1602 perfectas et Herwarto inscriptas, dignas non judico quae inserantur (Tabulis Rudolphinis), quia nihil de principiis Tychonicis mutant; solummodo aequationes hinc inde pauculis scrupulis variant necessitate hypotheseon, in quas Tychonicam summi transformandam.

Inscripsit Keplerus hoc opusculum:

*Transformatio hypotheseos et tabularum Lunarium, quas
generosus ac magnificus D. D. TYCHO BRAHE,
equus Danus, Dominus in Knudstrupp et Uraniburg &c., nostri
seculi alter Hipparchus, libro primo Progymnasmatum edidit,
qua libri illius usus facilius redditur,*

concinnata Praegae

a M. Joanne Keplero

S. C. M. Mathematico.

Accesserunt Lincii, anno potissimum 1616, sparsim tabulae aliquot novae ad auctoris sensum proprie accommodatae.

Nobili et magnifico viro D. D. Joanni Georgio Herwarto ab Hohenburg, Cancellario Bavariae, illustrissimi Bavariae Principis consiliario et praesidi Suabae, Domino et Fatori meo plurimum colendo.

Si nunquam in Magn. tuae familiaritatem fuissem receptus, poterat me vel sola illa tua egregia in literas voluntas et amor doctorum virorum passim increbescens invitare ad te pro viribus percolendum. Quia vero non tantum creberrimis abs te literis jam per annos aliquot sum cohonestatus, sed etiam re ipsa nec uno in loco tuam in me benevolentiam cum meo commodo expertus sum: equidem jam pridem decuisse arbitror, ut gratitudinem meam aliquo munere literario declararem, si mihi Urania sat propitia fuisset. Cum igitur nuper in hoc qualicumque opusculo tabularum Lunarium mihi videretur successisse, teque insuper cum universae astronomiae tum potissimum doctrinae de eclipsibus studiosissimum scirem: non erat mihi quisquam alius diligendus huic occupatiunculae patronus, idque tanto magis, quod cum nihil hic aliud agam, quam ut summi illius astronomi Tychonis Brahe placita de Lunae motibus, quae in Progymnasmatum tomo nuper sunt publica facta, communiora et ad usum accommodatiora reddam: vix cuiquam id gratius accidere possit, quam tibi, qui et vivam studiose coluisti et mortui monumentis literariis sollicitè faves. Quin et ipsum laboris hujus institutum te potissimum judicem et arbitrum poscere videtur: quod quale sit diligenter explicandum est.

Postquam, quae dixi, Progymnasmata Tychonis et in iis Tabulae Linares prodierunt, diversa duo mathematicorum judicia, partim abs te, partim ab aliis ad me perscripta sunt, hinc alteris intricatam captuque difficilem hypothesin et a natura alienam notantibus, inde aliis querentibus, nondum tabularum muneri satisfactum esse, quando altera menstruarum aequationum etiamnum per doctrinam triangulorum prolixo et taedioso labore solvenda sit. Utrisque hoc labore consulere sum conatus. Etenim si quos movet vel circellorum multitudo vel centri orbis in centrum Terrae semimenstruus ingressus et discessus: illis ostensum est hic, Copernicanum illum duplicem epicyclum in concentrico, quem Tycho tantopere adamavit, ut a tribus superioribus mutatum etiam in Lunam introduceret, nihil esse aliud, quam unum Ptolemaicum (in tribus superioribus) eccentricum, cujus motus circa punctum aliquod aequatorium supra centrum orbis elevatum circinaretur aequabiliter: quam inaequalitatem motus propediem in alio opere, cui fundamenta in meo Prodromo seu Mysterio Cosmographico jeci, physicis principiis convenientissimam demonstrabo et Copernici objectionibus in solidam satisfaciam. Eundem in modum hic demonstratur, circellum illum, quem Tycho per centrum Terrae transire facit, plane coincidere cum Copernicano secundo epicyclo Lunari; nec nisi positione et nonnihil quantitate differre, effectu vero motus aequipollere, quale quid Tycho ipse in explicatione suae hypotheseos monuit. Itaque in universum Lunae theoria, quod longitudinem attinet, totidem constabit orbibus et centris, quot apud Ptolemaeum aliquis ex tribus superioribus: nisi quod praeterea etiam medius Lunae motus in conjunctionibus et oppositionibus parumper acceleratur, quam Tycho Variationem dixit; quae, ut a causa physica profecta, circello peculiari ad speculationem non indiget, cum ab ipsissimo menstruo circuitu nascatur. De hac tamen, ut infra dicetur, nondum penitus liquet. Quemadmodum vero hypothesis Lunae conformis est reddita usitatis Ptolemaicis trium superio-

rum, sic jam et calculus in alterorum, quos dixi, gratiam et ut mathematici in communi labore taediosissimo liberarentur, accommodari facile potuit, composita tabula prosthaphaeresium menstruarum ejus epicycli, quem Tycho collocaverat ad Terram. Hae causae laboris hujus in publicum, de quibus, quod prius dicebam, tu rectissime judicabis, qui tuis hortatibus cunctantem me impulisti cum ad haec tum ad alia incommoda si fieri posset lenienda. Mihi vero privatim causae suppetebant non contemnendae. Primum de tam multiplicibus inaequalitatibus Lunae multa mihi cum Tychone vivo dissertatio fuit; quo hortatore semper aliquid tentabam, ut una quod ajunt fidelia duos parietes dealbarem (una inquam hypothesi utramque inaequalitatem excusarem). Sexcentos tentavi aditus cum plurimi temporis jactura: totiesque jam devorata praedam iterum e faucibus amisi. Nam mihi subinde imponebat circellus ille ad Terram post dumeta triangularis laboris latitans. Tandem igitur in apricum commodioris hypotheseos fuit protrahendus et totus cum omnibus artibus suis in tabulam conjiciendus.

In posterum itaque mihi erit expeditius, variam hujus prosthaphaereseos permistionem cum dicta Tychoni variatione menstrua propius contemplari, et videre an sufficientibus observationum conditionibus suffulta, an (quod interdum suspicor) vel cum variatione Tychonica (cum physicam plane utramque esse necesse sit) vel cum Ptolemaica *ἡμερίσιν* menstrua epicycli commune quid obtineat: sic ut susceptus a Copernico secundus epicyclus et transsumptus a Tychone adque Terram collocatus non plane illam Ptolemaicam *ἡμερίσιν* praestet, contra quam Copernicus lib. IV. cap. 9 demonstrare nititur.

Simul etiam periculum facere volui laboris tabularum Rudolphinarum condendarum: quo nomine (etsi opus ipsum seu irritum seu non necessarium esset) non mediocriter me profecisse censeo.

Quod autem non eam formam tabularum sum secutus, quam Ptolemaeus, Alphonsini, Copernicus et Prutenicae praeiverunt, causa haec est, quia haec mihi forma omnium brevissima videtur loca computandi ex tabulis; quae etsi in Luna nonnihil habet etiamnum laboris, propter apogaei et nodorum celeres motus, in ceteris tamen planetis tanto majori cum fœnore erit. Et tamen in ipsa etiam Luna plurimum expedire puto: non per anfractus et latentes vias longitudinis, anomaliae, motus latitudinis incedere ignarum ubi veriseris, priusquam ad ultimum pervenias ostium: sed ex editiore loco, apogaei scilicet et nodorum tardo motu, prospectum totius itineris semper habere ob oculos. Quare tibi, Vir harum rerum peritissime juxtaque amplissima, exemplar repraesentare volui ejus formae tabularum Rudolphaearum, quam ego animo concepi, ut quia publicum opus futurum est (si Deo placuerit) plurium etiam et intelligentium judicio firmetur. Paratus enim sum, si quisquam mihi compendiosiore viam monstraverit, illam sequi, institutum deserere. Accipe igitur has Tibi proprias chartas, easque ut lubet et expedire tibi videbitur, cum literatis et rerum intelligentibus seu publice seu privatim communica: sic tamen ut virorum doctorum judicia in meum et totius astronomiae commodum vicissim colligere, quâ commode poteris, Tuumque adjungere non negligas. Facies id, quod doctos omnes a Te exspectare diuturna consuetudine docuisti. Vale et me amare perge. Pragae Bohemorum X. Cal. Majas anno vulg. epochae Christi Dei 1603.

Nob. et Mag. tuae

addictissimus

Jo. Keplerus.

Hanc dedicationem sequitur pagina aversa: „Tabula aequationis dierum naturalium ad annum 1616 completum, quo anno apogaeum Solis ponitur in 6° \odot completo: aequatio \odot maxima $2^{\circ} 3' 45''$,“ his adscriptis verbis: „Absolvi 14. Martii 1616. Non usurpavi illam in Ephemeride.“ — Hanc tabulam excipit:

Schema Hypotheseos Longitudinis.

Sit A Terra, B centrum eccentrici Lunae HDK, AB linea absidum, H apogaeum, I perigaeum. Motus hujus lineae est in consequentia a puncto




Fig. 19.

aequinotiali super puncto A seu centro Terrae aequalis, restitutio annorum $8\frac{1}{2}$. Ad novilunia tamen comparatum hoc apogaeum videbitur ab illis retrocedere, quia semper prius ad apogaeum redit Luna, quam ad Solem. In eccentrico moveatur D centrum epicycli FG aequaliter circa C punctum aliquod, quod aequatorium dicunt. Estque qualium BD 100000, talium BA 5074, composita scilicet ex 2900 et 2174 dimensionibus Tychonicis, earundem BC est 5800 et DE semidiameter epicycli 2174 ut apud Tychonem.

Epicycli motus talis est: sit DE diameter in omni situ epicycli parallelus ad HI lineam absidum, monstrans epicycli puncta eccentrici apogaeo et perigaeo respondentia, ut E respondens puncto I perigaeo; quod perigaeum epicycli dicere vereor, quod abusu vocis lectorem nolim confundere, quia D in I transposito E omnium epicycli punctorum longissime ab A aberit, et sic antiqua vocis notione *ἀπογειον* efficietur. In hoc igitur E puncto sit corpus Lunae quoties centrum epicycli D in lineam per A Terram et corpus Solis utrinque productam incidit, in omnibus scilicet noviluniis et pleniluniis. Ab hac linea quantum centrum epicycli D digreditur motu ad A comparato, duplo hujus anguli corpus Lunae ab E versus G digredietur. Ut si linea per Terram et Solem sit AK in antecedentibus signorum, quantus est arcus KHD, si ex A descriptus esset, duplo major erit arcus EGF, et Luna in F. Hanc hypothesin dico satisfacere placitis Tychonicis de Lunae motibus ad sensus subtilitatem. Nam quod Tycho non ipsius D puncti, sed paulo aliam distantiam ab AK adhibet (ut patet, si comparatio instituatur subtilissima), nihil tamen verbo dignum in effectum hinc resultat. Plus fortasse movebit lectorem, quod aequationes eccentrici maximae in quadraturis circiter sesquiscrupulo majores fiunt Tychonicis; idque propter ea quae Copernicus libro V. cap. 4. circa medium demonstravit. Ceterum sciat lector, hoc quicquid est a me non necessitate sed consilio praeteritum. Facile enim id cavere potuissem, si pro 8700, qui Tycho in quadraturis tangens est, sinum 8667 elegissem. At quid opus mihi fuit rudem et asperum numerum repudiato Tychonico adsciscere propter tantillam differentiam sesquiscrupuli, cum Tycho ipse summam scrupulositatem tractabilium et rotundorum numerorum compendiis postposuerit. Nam fortuiti non sunt hi numeri 8700, 5800, 2900, quorum primus tertii triplus est, secundus duplus. Quare malui dimensiones Tychonicas retinere cum calculi compendio, quam ad ipsam effectus Tychonici subtilitatem adspirare sine necessitate praecipua.

Variatio Tychonica proprie est accidens motus medii. Nam qui ceteris planetis motus medius est, Lunae non est. Quoties enim Luna lineae AK per Terram et Solem transeunti appropinquat, etsi plane in concentrico

illam incedere fingas: toties intenditur motus ejus celeritas. Itaque vim quandam movendi obtinet tractus ille. Quod mirum esse minime debet in corporibus coelestibus, quae non externa vi vectium, ventorum aut aquarum, sed nutibus perfectissimarum mentium et geometriae imaginatione topica cientur. Sic igitur habe: nisi inesset in illo tractu vis haec adventitia promovendi corpus Lunae, tantum futurum ejus motum medium, quantum esse solet in quadraturis (ceteris paribus): plures vero in una restitutione horas fore, quam jam obtinet. At quia jam accedit illa motio menstrua, colligi illam necesse est et intendi initio tarde, cum Luna circa quadraturas brevibus passibus ad lineam AK appropinquat; ubi proxime venerit, majora hujus incitationis incrementa sunt, quod Luna e directo in lineam involet, non ut prius ex obliquo. Adeoque quae est proportio sinuum distantiae Lunae a Sole vel ejus opposito, haec est proportio incitamentorum. Quare si usurparemus Lunae motum pro medio, quantus in quadraturis est: semper adderemus illi incitationis aliquid, minimum tamen in quadraturis, plurimum in syzygiis. At quia antiquitus hunc pro medio motu adhibemus, qui existit diviso circulo in dies unius restitutionis, ubi illa altera commisceatur, hinc existit tantus motus, quantus est ceteris paribus medio loco inter quadraturam et copulam, ubi et haec modo descripta acceleratio mediocris est. Is igitur motus quia in copulis parvus est, in quadraturis nimius, consequens est, ut illic augeatur hic minuatur: unde quam prius accelerationem vel incitationem dixi, variationis nomen apud Tychonem obtinet. Haec de hac variatione dicere volui, partim ne circellum ejus viderer neglexisse, qui est tantum ad mensuram susceptus, non ad motus formam, partim ut lectorem mecum paulatim in contemplationem physicam inducerem. Nam idem plane (physicum nempe) judicium ferendum tandem erit et de hoc residuo epicyclo FE, quem parallaxes Lunares a Tychone observatae respuunt nec patiuntur, Lunam per illum etiam attolli vel deprimi. In examine enim parallaxium, quas Luna in quadraturis pateretur, discursitare inveniebatur a 54 semidiametris Terrae in 60 circiter. Quos Tycho terminos hypothesi serviens prorogavit a 52 in 61, quod ipse in capitulo de Lunae parallaxibus innuit. Dubium non est, quin simpliciter tam in quadraturis quam in copulis idem spatium 6 circiter semidiametrorum Terrae ascensu descensuque occupet, idque per eccentricitatem AB seu latentem in eccentrico epicyclum tantae semidiametri.

Explicatio et accommodatio tabularum transformatarum
ad schema.

Tres sunt potissimum tabulae; in prioris prima columna notantur tempora, quibus ante finem adscripti in margine anni centrum epicycli (ceteris paribus) in apogaeo seu puncto H fuerit novamque periodum fuerit auspicatum. In secunda columna notatur locus AH sub ecliptica, in tertia locus nodi.

In secundae tabulae margine sinistro sunt gradus integri anomaliae coaequatae centri epicycli seu HAD anguli, ab AH usque ad AI vel 180° . In prima columna sunt tempora his gradibus respondentia, cum adjunctis differentiis temporum cuilibet integro gradui respondentibus. In secunda est motus apogaei AH, temporibus adscriptis respondens. In tertia motus

nodi in praecedentia; in quarta scrupula proportionalia longitudinis seu differentiae inter lineas AD et AH.

In tertiae tabulae marginibus sunt numeri communes arcubus EGF ab E incepto, et GF ab F incepto. Sequuntur in columna prima anguli DAF (si D fingas in H constitutum), ut F a G per omnes gradus semicirculi epicycli dispositum intelligatur. In secunda sunt excessus illorum angulorum DAF, si D in I perigaeo constituatur. In has 2 columnas introitur cum arcubus GF. In tertia occurrit variatio Tychonica, quam simpliciter transcripsi: in quarta prosthaphaeresis nodorum, quam a Tychone transsumptam titulis mutatis extendi ad duplicem distantiam Lunae a Sole: sicut et de scrupulis latitudinis in quinta columna factum: ut hae quoque ad hanc formam accommodarentur et uno ingressu per EGF arcum exciperentur.

Quartam tabulam addere supervacuum esse putavi, in qua scilicet latitudo Lunae cum excessu et reductione ad eclipticam jungeretur. Nam hae tabulae, quamvis divisae, exstant in libro Progymnasmatum Tychonis, sine quibus hae meae tabulae propemodum erunt inutiles. Levis opera est, ut si tui placeat compendiosus ingressus, is ex suis locis utramque petitam describendo conjungat. (Sequuntur tabulae, quarum si frontem et calcem exhibeamus satisfactum censemus curiosiori lectori.)

I. Epochae aequalium motuum Lunae.

Residuum temporis												
Anni	ad finem anni.				Apogaei eccentrici.			Nodi evehentis.				
	D.	h.	"		S.	G.	"		S.	G.	"	
1400	8.	16.	27.	30	0.	10.	5.	22	6.	10.	12.	17
1420	11.	17.	23.	19	3.	13.	37.	0	5.	13.	32.	1
1440	14.	18.	19.	8	6.	17.	8.	38	4.	16.	51.	45
1520	26.	22.	2.	24	7.	1.	15.	9	1.	0.	10.	39
1800	14.	8.	26.	42	2.	26.	46.	23	0.	13.	51.	45

II. Tabula inaequalitatis primae.

Add. anom. coaeq.		Tempus		Diff.		Add. Motus apogaei ab aequinoctio		Subt. Motus nodi ab aequinoctio		Scrupula
Sig.	Grad.	D.	H.	M.	S.	H.	M.	S.	M.	S.
0.	0	0.	0.	0.	0	2.	2.	57	0.	0
	1	0.	2.	2.	57	2.	2.	56	0.	0
	2	0.	4.	5.	53	2.	2.	55	0.	1
:	:									
6.	0	13.	18.	39.	18	1.	38.	53	43.	48
									60.	0

III. Tabula inaequalitatis menstruae.

Numeri com- munes	Prosthaph. epicycli	Diff.	Excessus sen ampli- ficatio epi- cycli optica	Diff.	Variatio Tychonica		Add. Prosthaph. nodi Tychonis	Scrup. latitud.	Numeri com- munes
					sub.	diff.			
6. 0	0. 0. 0	73"	0. 0	8	0. 0	43	0. 0. 0	60. 0	6. 0
1	0. 1. 13	73	0. 8	8	0. 43	43	1. 48	59. 59	29
2	0. 2. 26	73	0. 16	8	1. 26	42	3. 36	59. 58	28
3	0. 3. 39	73	0. 24	7	2. 8	42	5. 24	59. 57	27
4	0. 4. 52	73	0. 31	8	2. 50	42	7. 11	59. 55	26
:	:								
11. 29	0. 1. 18	78	0. 9	9	0. 43	43	0. 1. 55	1. 55	1
12. 0	0. 0. 0		0. 0		0. 0		0. 0. 0		0. 0

IV. Typus aequationum Lunae implicitarum.

☾ a ☉		0.	45.	90.	135.	180.
Anomalía.	0	0	0. 40 $\frac{1}{2}$ A.	0	0. 40 $\frac{1}{2}$ S.	0
	45	3. 27 Sub.	4. 30 S.	5. 1. 17 S.	4. 1 $\frac{1}{2}$ S.	3. 27 S.
	90	4. 58 $\frac{1}{2}$ S.	5. 41 $\frac{1}{2}$ S.	7. 29 $\frac{1}{2}$ S.	6. 46 S.	4. 58 $\frac{1}{2}$ S.
	135	3. 35 $\frac{1}{2}$ S.	3. 2 S.	5. 35 S.	6. 4 S.	3. 35 $\frac{1}{2}$ S.
	180	0	0. 40 $\frac{1}{2}$ A.	0	0. 40 $\frac{1}{2}$ S.	0
	225	3. 35 $\frac{1}{2}$ Ad.	6. 4 A.	5. 35 A.	3. 2 $\frac{1}{2}$ A.	3. 35 $\frac{1}{2}$ A.
	270	4. 58 $\frac{1}{2}$ A.	6. 45 A.	7. 29 $\frac{1}{2}$ A.	5. 40 $\frac{1}{2}$ A.	4. 58 $\frac{1}{2}$ A.
	315	3. 27 A.	3. 57 $\frac{1}{2}$ A.	5. 1. 17 A.	4. 30 A.	3. 27 A.
	360	0	0. 40 $\frac{1}{2}$ A.	0	0. 40 $\frac{1}{2}$ S.	0

Cum distantia varietur a 97100 in 102900. eccentricitas vero a 4400 in 0, ergo
index proportionis laterum variatur a 91312 in 100000.

Sit tangens gr. 1. — $174550 \times 92000 = 1609$

17455

93 — 1623

94 — 1641

95 — 1658 Hic in principio sunt proportionalia

96 — 1676 citra controversiam.

V. Motus in annis singulis usque ad viginti.

Anni.	Adde	Apog. eccentrici.	Adde	Nodi evehenti.
	Temp. resid. ad fin. anni.		S. G. " "	
1.	6. 18. 58. 26	1. 9. 54. 33	0. 18. 58. 8	
2.	13. 13. 58. 52	2. 19. 49. 5	1. 7. 56. 16	
3.	20. 8. 55. 19	3. 29. 43. 33	1. 26. 54. 22	
...				
19.	22. 19. 15. 58	1. 20. 32. 55	0. 6. 14. 35	
20.	3. 0. 55. 49	3. 3. 31. 38	0. 26. 40. 16	

VI. In diebus et horis integrarum revolutionum.

	Tempus.	Adde	Subtrahe
	Motus apogaei eccentrici.	Motus nodi.	
I.	27. 13. 18. 35	0. 3. 4. 12	0. 1. 27. 33
II.	55. 2. 37. 10	0. 6. 8. 24	0. 2. 55. 6
III.	82. 15. 55. 45	0. 9. 12. 36	0. 4. 22. 39
...			
XVI.	440. 20. 57. 18	1. 19. 7. 9	0. 23. 20. 46

De verae longitudinis Lunae et nodi evehenti ex
hisce tabulis supputatione.

Primum quae Tycho de aequando et reducendo tempore praecepit,
manent invariata. Deinde loco Solis medio hic non est opus. Sufficit
verum teneri idque vel $\epsilon\pi\pi\lambda\alpha\tau\epsilon\iota$: melius tamen, si plane sciatur ad scrupulum.

Tertio cum annis completis excerpantur primum tempora residua ad
finem anni illius, secundo epocha apogaei epicycli, tertio epocha nodi
evehenti.

Quarto, si sic usu veniat, cum numero annorum infra 20 excerpantur similiter 1) tempora, et addantur temporibus prioribus. 2) Motus apogaei et addatur epochae superiori, rejecto integro circulo. 3) Motus nodi et subtrahatur ab epocha superiore, ut ipsi etiam tituli adscripti indicant, adscito, si opus est, integro circulo.

Quinto summam dierum mensis completi, insuper dies tuos completos cum horis et scrupulis adde temporibus hactenus collectis nihil abjecto, etsi modulum unius anni superent.

Sexto haec summa temporum comparatur ad tabellam revolutionum integrarum. Nam alias propior erit proxime minori numero temporum, alias proxime majori.

De primo casu prius. Ergo subtrahe quod est proxime minus a tuis temporibus, motum vero apogaei juxta scriptum adde, motum nodi subtrahe a superioribus, ut prius etiam factum. Cum residuo temporis ingredi tabulam inaequalitatis primae. Nam si residuum tuum praecise inveniatur sub titulo temporis: quod juxta invenis in margine est praecisa anomalia coaequata centri epicycli, in sequentibus duabus columnis motus apogaei et nodi, cum quibus age secundum titulorum requisita, ut tam apogaei quam anomaliae motus addatur motui apogaei superius collecto, motus vero nodi subtrahatur motui nodi superius collecto. Scrupula vero ex ultima columna adserventur. Sin autem residuum tuum temporis non praecise inveniatur, age ut solet fieri, proportionaliter: dividens quod tibi est etiamnum residuum per differentiam temporis juxta adscriptam.*) In motu vero apogaei et nodi aestimatio vel sine divisione perfacilis est. Nam apogaei motus differentia nunquam est major, quam 34" (nodi 16"), nunquam minor 27" (nodi 13").

In casu posteriore, atque si summa temporum collecta plus accedit in tabula revolutionum ad proxime majorem summam temporis: subtrahe vicissim tuam summam a proxime majori, cum adscriptis vero motibus apogaei et nodi age ut prius. Jam vero cum residuo post subtractionem, ubi ex tabula inaequalitatis primae excerpseris anomalam coaequatam, motum apogaei et motum nodi: cum his contrarium titulis erit faciendum. Nam quia prius plus addideras apogaeo, plus subtraxeras nodo quam tua tempora ferebant, jam vicissim quod residuo tuo de anomalia et motu apogaei debetur, subtrahendum apogaeo, quod de motu nodi, addendum nodo. Si te hujus varietatis taedet, facile te expedies duplicatione tabulae inaequalitatis primae, ut procedat usque ad 360. Utroque vero casu colliges hoc pacto locum verum centri epicycli et verum locum nodi, qualis esse solet in eclipsibus.

Septimo. Locum verum Solis (vel oppositi ☉). Nam si distantia superat 6 signa, tunc ex 6 in duplicatione fiunt 12 et abjiciuntur) a loco centri epicycli subtrahe, residuum duplica, ut apud Tychoem, et cum iis excerpe ex tabula inaequalitatis menstruae variationem menstruam et prosth-

*) In motu apogaei nodi et scrupulis longitudinis pars proportionalis habetur. Si in proportionum regula primo loco ponatur differentia temporis, secundo loco differentia apogaei, nodi et scrupulorum, tertio loco residuum temporum, vel si anomalam centri coaequatam in minutis et secundis inveneris, illis minutis primis et secundis quaere partem proportionalem competentem, quod commodius est, quam prior modus, reperitur n. pars proportionalis saltem multiplicatione.

phaeresin nodi, et scrupula latitudinis adservanda. Nam illa Tychonica in hunc usum transtulimus et in has, ut compendiosa esset excerptio.

Octavo. Anomaliam centri coaequatam in casu priore subtrahe ab hac duplici distantia, in posteriori adde (nam erat illa non re vera ipsa anomalia, sed ejus complementum ad circulum). Cum eo quod prodit ex tabula inaequalitatis secundae excerpe prosthaphaeresin epicycli cum excessu, de quo per scrupula longitudinis ex primae inaequalitatis tabulis asservata pars proportionalis addita constituit emendatam prosthaphaeresin, quam una cum variatione pro cujusque titulo adde vel aufer longitudini centri: ita colliges veram longitudinem Lunae. Ubi et nodi prosthaphaeresin prout tituli te docuerint addideris vel abstuleris a loco nodi, verum habes et hujus calculum. Per vera loca Lunae et nodi et scrupula latitudinis ex secunda tabula adservata poteris excerpere ex tabellis Tychonicis latitudinem Lunae veram et reducere locum orbitae ad eclipticam. Nam hic nihil est varietatis a praeceptionibus Tychonis, tantum consulo, ut ex ambabus tabulis unam facias, quo expeditius excerpas.

Ceterum plus est in praecepto verborum, quam laboris in opere. Quare rem exemplis declarabo.

Exemplum prioris casus. Sit tempus aequale in meridiano Uraniburgico 1540. 31. Dec. h. 1. 45'.

Tempus	Apog.	Nodus.
1520. — 26 ^a 22 ^a 2' 24" — 7 ^a 1° 15' 9" — 1 ^a 0° 10' 39"		
19. — 22. 19. 15. 58 — 1. 20. 32. 55 ad. — 0. 6. 14. 35 sub.		
Bias. Novembr. 335. 0. 0. 0		Scrupula longitudinis
Dies compl. 30. 1. 45. 0		1' 12".
Summa: 414. 19. 3. 22		
Revol. XV.: 413. 7. 38. 43 — 1. 16. 2. 57 ad. — 0. 21. 53. 14 sub.		
Residuum: 1. 11. 24. 39	9. 49 ad.	4. 41 sub.
Ex tabula: 1. 10. 46. 11	17. 0. 9 ad.	0. 28. 12. 30 summa sub.
Et residuum: 38. 28		0. 1. 58. 9 Locus nodi simplex.
divisum per diff. 2h 2' 16" prodit — 18. 58 ad.		
Summa est verus locus centri epic. 10. 25. 19. 48		
Verus ☉ 9. 20		
	Distant. 1. 5. 19. 48	
Variatio 38. 14 Add.	duplum 2. 10. 39. 36	Prosth. ☉ 1. 41. 0 sub.
sub.	Anom. centri 0. 17. 18. 58 sub.	0. 0. 17. 9 loc. nodi ver.
Prosth. 0. 57. 50 Exc. 6' 17"	" menst. 1. 23. 20. 38	10. 25. 0. 4 ") verus
Pars prop. 8 sc. 1. 12		10. 24. 42. 55 argum. lat.
Prsth. emend. 57. 58 pars 8		
Resid. supra variationem 19' 44"		Scrup. latit. 20' 35"
10. 25. 19. 48 long. centri	2. 52. 16 lat. respond.	Excess. lat. 10. 56
10. 25. 0. 4 long.) orbitae	10. 56 excess.	3. 39
6. 47 ad. pro reduct.	3. 45 pars.	6
10. 25. 6. 51 ad eclipticam	2. 56. 1 vera latitudo.	3. 45 pars.
locus) ecliptica.		

Aliud exemplum posterioris casus.

Sit tempus aequale in meridiano Uraniburgico 1820, primo Martii in meridie.

Tempus.	Apog.	Nodus.
1800. — 14. 8. 26. 42 — 2. 26. 46. 23 — 0. 13. 51. 45		
19. — 22. 19. 15. 58 — 1. 20. 32. 55 ad. — 0. 6. 14. 35 sub.		
37. 3. 42. 40	4. 17. 19. 18	0. 7. 37. 10

	37. 3. 42. 40	4. 17. 19. 18	0. 7. 37. 10
Febr. bias.	60		
	97. 3. 42. 40		
Revol. IV.	110. 5. 14. 19	— 0. 12. 16. 47 ad.	— 0. 5. 50. 12 sub.
Prox. maj. Resid.	13. 1. 31. 39	— 4. 29. 36. 5	— 0. 1. 46. 58 [titulis.
Ex tabula	13. 0. 30. 48	dat mot. Ap. 1. 27. 15	. . . 41. 30 add. contrar.
Resid.	1. 0. 51	Et An. 5. 19. 36. 52	. . . scr. long. 59' 32"
Divisum per diff.	1. 39. 3	Summa 5. 21. 4. 7 s.	Excessus 4. 48
	Locus centri epic. 11. 8. 31. 58		Pars prop. 4. 40
"	⊙ " 11. 23. Loc. ♀	simp. 0. 2. 28. 28	
	Distantia 11. 15. 31. 58		Add. scr. l. 3. 52
	Dupl. 11. 1. 3. 56	— Prst. nod. 0. 52. 47	8. 18
Variatio 19. 36 sub.	Anomalia centri epic. 5. 19. 36. 52	0. 3. 21. 15	var. loc. modi
	Anom. menstr. 4. 20. 40. 48	11. 7. 22. 16	" ")
Prosth. Ep. 44. 20.	Exc. 4. 48	11. 4. 1. 1	Argum. lat.
Pars 4. 48	Sc. 59. 32	2. 10. 38	Resp. lat.
49. 6	Pars 4. 46	8. 18	Excessus
	1. 9. 42 summa subtrahenda.	32	pars prop.
	11. 8. 31. 58 centri locus epic.	2. 11. 10	Vera latit.
	11. 7. 22. 16 longit.) in orbita.		
	5. 9 add. pro reductione ad eclipticam.		
	11. 7. 27. 25. Locus) eclipticus.		

Addo et hoc exemplum.

Anno 1604. 10. Jan. in meridie Uraniburgico aequato tempore quaeritur locus Lunae verus.

	Temp.	Apog.
1603. —	4. 6. 3. 48	— 11. 21. 13. 39
Compl. dies	9	
Ex tabula	13. 8. 3. 48	Tempus est minus dimidia revolutione, ergo casus prior.
	13. 7. 6. 51	
Residuum	56. 57	dat 1. 28. 59
divisor. h. 1. 38' 57"		et anom. centr.
	5. 23. 34. 36	Sc. long. 59. 50.
	Locus centri 5. 16. 17. 14	
	Locus ⊙ 9. 29. 55. 13	Variatio 40' 27" add.
	Distat 7. 16. 22. 1	1° 10' 28" Ex. 7. 37
	Dupl. 3. 2. 44. 2	Pars 7. 36
	Anom. centr. 5. 23. 34. 36	1. 58. 29
	Anom. menstrua 9. 9. 9. 26	Loc. 5. 16. 17. 14
		Loc.) orb. 5. 18. 15. 43

Porro in hunc modum quaeritur novilunium verum.

Anno 1605. die 2. Oct. magna erit eclipsis Solis, quaeritur verum novilunium et locus medi.

1604. —	12 ^d 3 ^h 2' 15" — 1° 1' 8' 12" — 6° 24' 41' 58"
Sept.	273
dies compl.	1
Summa	286. 3. 2. 15
Revol. X. proxime minus	275. 13. 5. 48 — 1. 0. 41. 57 — 0. 14. 35. 29
Resid.	10. 13. 56. 27 — 2. 1. 50. 9 — 6. 10. 6. 29
	Verus ⊙ in meridie 6. 19. 1. 8
	⊙ diurnus 59' 41".

Hic diebus 10. h. 13. 56' 27" ante meridiem constitutum Luna ἀπογεως est in 2° 1' 50' 9", reducenda est ad verum Solis in 6. 19. 1. 8. Distat adhuc per 4° 17' 11' 0", ergo in tabula inaequalitatis primae quaesita anomalia 4° 16', quae habet adjunctum motum apogaei 1° 11' 43", exhibet tempus 10^d 17^h 27' 5", quod superat nostrum tempus per 3^h 30' 38". Itaque totidem horis post meridiem

diei 2. Octobris. Additur apogaeo in universum $4^{\circ} 17' 11'' 43''$, ut sit longitudo centri ad illam horam 6. 19. 1. 52, scrupula vero sunt $51' 57''$ servanda. Est autem illa hora locus \odot 6. 19. 9. 52, qui subtractus a loco ☾ , relinquit 11. 29. 52. 0. Cujus duplum $11^{\circ} 29' 44'' 0''$ exhibet variationem $12''$ subtrahendam. Subtracta vero hoc loco anomalia $4^{\circ} 16''$ a duplici distantia relinquit 7. 13. 44. 0 anomalam menstruam, quae exhibet prosthaphaeresin epicycli $48' 30''$ add. cum amplificatione 5. 15, de quibus pars proportionalis ad scrupula servata est $4' 33''$. Hinc prosthaphaeresis emendata $53' 3''$ add. Hinc ablata variatio $12''$ relinquit $0^{\circ} 52' 51''$, addendum Lunae, ut sit ejus locus $6^{\circ} 19' 54' 43''$. Itaque vides, quod Luna superaverit locum Solis verum per 44. 51. Quare divide hanc superationem per motum ☾ horarium, qui est ante et post $\text{☿} \text{ ☿}$: et prodibit tempus verae ☿ . At horarius ex tabula Tychonis per simplicem anomalam (quam ex nostra coaequata centri anomalia scripsimus aestimatione crassiuscula) excerpitur $34' 9''$. Ergo distantiae $44' 51''$ respondent h. 1. 18. 14; subtrahere a 3. 30. 3, restat $2^{\text{h}} 11' 49''$, tempus aequale pomeridianum verae conjunctionis.

IN HIPPARCHUM

NOTAE EDITORIS.

1) p. 523. His Kepleri propositionibus subiungimus Horroccii eadem fere cum illis ratione demonstratas, ut comparatione instituta appareat, quam prope ille ad Kepleri sensum penetraverit.

- 1) Semiangulus conii umbrae idem est cum semidiametro Solis vel Terrae apparenti, oculo in mucrone umbrae.
- 2) Semidiameter Solis apparens in Terra major est semiangulo conii umbrae.
- 3) Semidiametri Solis in Terra apparentis et semianguli conii umbrae differentia est parallaxis Solis horizontalis.
- 4) Parall. hor. \curvearrowright in umbra existentis ubique major est semid. umbrae apparente in illo \curvearrowright transitu per umbram.
- 5) Diff. semid. apparentis umbrae et parall. hor. \curvearrowright in umbra sitae est semiangulus conii umbrae.
- 6) Semid. apparens \odot et \curvearrowright (aut cujusvis stellae) ad parall. earundem horizontalem eandem in omni distantia retinent proportionem.
- 7) Diff. inter semid. app. \odot aut \curvearrowright stellaeve, et earum parallaxin horizontalem, non est ubique eadem, sed in majori distantia minor, in minori major.
- 8) Diff. inter semid. app. umbrae et parallaxin horiz. \curvearrowright in umbra (h. e. semiangulus conii umbrae) in eadem Solis distantia semper est eadem, nec per varium \curvearrowright et Terrae intervallum variatur.
- 9) Semid. umbrae vera non est ubique ejusdem quantitatis; sed major in minore a Terra intervallo, minor in majori; manente eadem Solis et Terrae distantia.
- 10) Semid. umbrae apparens non habet ubique eandem proportionem ad parall. horiz. \curvearrowright .
- 11) Neque tamen datur perpetua proportio inter semid. app. \curvearrowright et umbrae.
- 12) Inaequalis distantia Solis a Terra semidiametrum umbrae apparentem et veram mutat, in eodem \curvearrowright per umbram transitu.
- 13) Stella ea, cujus parall. horiz. major est semidiametro ejus apparente, minor est Terra et contra.

Ad theorema 5. (Keplero II.) haec annotat Horroccius: Ne cujusvis inscitia demonstrationem hanc minus firmam esse contendat, ex eo quod anguli EFB et EGB non sint praecise aequales ut assumitur, ostendam, quam nullius momenti sit in hoc negotio adeo insensibilis differentia. Sit igitur semiangulus conii umbrae BCE 14' (qualis est Keplero in apogaeo Solis. Epit. Astr. Cop.), et ejus tangens 40725; sit item semid. apparens umbrae GBF 50' (qua nunquam est major), et ejus tangens 145454. Angulorum summa est BFE 1° 4', tangentium summa est 186179, cui respondet \angle BGE = 1° 3' 59" 46". Deficit igitur hic angulus a praecedente BFE (cui aequalis assumitur) tantum 14", quae non efficiunt quartam partem unius secundi, nec est ea differentia unquam in hoc negotio major.

Ex hoc theoremate (et tertio) fundamentum habes praecepti 148. Tabularum Rudolphi, quod totam fere dimensionem coelestem in se continet.

2) p. 527. Kepleri demonstratio haec est:

$$\begin{aligned}
 KI \times IN &= LI \times IM (= FI^2) \\
 LI \times IM &= (LK + KI) IM = LK \times IM + KI \times IM, \text{ quare} \\
 KI \times IN - KI \times IM &= KI (IN - IM) = KI \times MN = LK \times IM. \text{ Est vero} \\
 KI \times MN &= KI (ON - OM) = KI \times ON - KI \times OM \\
 \text{et } LK \times IM &= LK (KM - KI) = LK \times KM - LK \times KI \\
 \hline
 KI \times ON - KI \times OM &= LK \times KM - LK \times KI. \\
 \text{Cum autem } OM &= LK, \text{ est etiam } KI \times OM = LK \times KI, \\
 \text{ergo } KI \times ON &= LK \times KM.
 \end{aligned}$$

3) p. 528. $SR \times RH = KR \times RN$
 $SR \times RH = (SN - RN) RH = SN \times RH - RN \times RH$, quare
 $KR \times RN + RN \times RH = SN \times RH$, h. e. $KH \times RN = SN \times RH$.
 $RH \times SN = (NH + RN) SN = NH \times SN + RN \times SN$.
 $KH \times RN = (KZ + ZH) RN = KZ \times RN + SN \times RN$.
 $NH \times SN = KZ \times RN$.

Huic theoremati addit Keplerus hoc problema, ut non numero ita his verbis insignitum:
 „Utile computationi eclipsis Solis universalis.“

Datis semidiametris disci et penumbrae, et distantia centrorum, indagare lineam per sectiones, et quantitatem arcus disci a penumbra intercepti.

Sit primo centrum penumbrae extra discum. Ergo distantiam centrorum duplica; cum duplo divide factum ex scrupulis in disco et scrupulis extra, prodit sagitta disci, quam duc in residuum disci; facti radix est sinus arcus dimidii disci a penumbra incepti.

Sit iterum centrum penumbrae intra discum. Ergo semidiametro disci adde distantiam centrorum, a summa aufer quantum est de semidiametro penumbrae intra discum, scilicet usque ad centrum: cum residuo divide factum ex scrupulis in disco et scrupulis extra, prodit eadem sagitta ut prius.

Demonstrationem, a Keplero omissam, hanc addimus:

1) Sit KAN „discus“, SPH penumbra, centro A extra discum existente. Secundum theor. 16 (comp. initium hujus annot.) est

$$NH \times SN = KZ \times RN, \text{ quare}$$

$$RN = \frac{KZ}{NH \times SN};$$

$$KZ = KN + NZ = 2EN + 2NA = 2EA$$

$$\text{ergo } RN = \frac{NH \times SN}{2EA}$$

$$KR = KN - NR. \text{ Jam, quia}$$

$$PR \perp KN, \text{ erit } PR = \sqrt{KR \times RN} = \sqrt{\frac{(KN - NR)(NH \times SN)}{2EA}}.$$

2) Penumbra LFM ea ratione in discum incidente, ut centrum A sit intra circumferentiam KAN, erit secundum theor. 15 (annot. 2)

$$KI \times ON = LK \times KM.$$

$$ON = KN - KO = 2KE - 2KA = 2AE, \text{ quare}$$

$$KI = \frac{LK \times KM}{2AE}$$

$$FI = \sqrt{KI \times IN} = \sqrt{\frac{LK \times KM \times IN}{2AE}} = \sqrt{\frac{LK \cdot KM (KN - KI)}{2AE}}.$$

In Nro. 1. Keplerus problema in hoc certum numerorum exemplum translatus exhibet:

$$\begin{aligned} \text{Sint scrupula penumbrae in disco (SN)} &= 19' 41'' - 111458 \\ \text{semidiameter penumbrae (SA)} &= 32. 13 \\ &SH = 64. 26 \end{aligned}$$

$$\text{Scrupula penumbrae extra (SH - SN)} = 44. 45 - 29325$$

$$\text{Rectangulum } 14' 41'' - 140783 \text{ (NH} \times \text{SN)}$$

$$\text{Sit dist. centrorum (EA) } 75' 54'', \text{ duplum } 151' 48'' - 92819$$

$$\text{(RN) } 6' 25'' - 233602 (: 2)$$

$$\text{sinus } 18^\circ 7' - 116801$$


$$\text{semidiameter (disci) } 63. 22 - 5471$$

$$\text{Qualium discus } 60 - 17' 40'' - 122272$$

$$\text{Arcus } 17^\circ 7\frac{1}{2}'.$$

Hic Kepleri calculus his illustrandus est: Numeri ad dextram adscripti logarithmi sunt e Tab. Rudolphinis desumpti; quare hoc exemplum, sicut etiam exempla, quae ad Probl. XI. et XIII. pertinent, ex tempore tabularum supremum recognitarum orta videntur.

Tabulae Rudolphinae hac constitutae sunt ratione, ut ad logarithmum 122272 in columna superinscripta „Partes sexagesimae“ deprehendas arcum $17' 40''$, nec non in



columna „Arcus quadrantis“ eundem $17^{\circ} 7\frac{1}{2}'$, quae eadem quantitas prodit, si posueris $60 : 100000 = 17\frac{1}{2} : x$; $x = \frac{530000}{18} = 29444 = \sin. 17^{\circ} 7\frac{1}{2}'$. Etsi hic non de con-

struendis tabulis Kepleri logarithmorum pluribus disserendum est, hoc tamen, respicientes Kepleri calculum supra positum, monendum censemus: Keplerus logarithmos suos maxime seu potius unice ad astronomiae usum conferri voluit; quam ad rem cum magni momenti sint numeri 24 et 60, praeter divisionem semidiametri usitatam partium 100000, aliam illius in 24, aliamque in 60 aequales partes adjecit („partes vicesimas quartas“ et „sexagenarias“), adscripsitque sinibus, quos e tabulis trigonometricis tum usitatis desumit quam maxime rotundos (incipiens a sinu $3' 28'' = 100$, et inde paulatim, unicuique priori sinui addens 100, ascendit ad sin. $90^{\circ} = 100000$), logarithmos. Hac ratione formam tabulae Kepleri nactae sunt longe aliam, quam recentiore aetate consueverunt astronomi, cum sinus quidem crescant plane regularem processum secuti, anguli vero minus exhibeant regularitatem illam, quam tabulae sinuum hucusque usitatae, sicut etiam tabulae logarithmorum Keplerianis brevi succedentes. His dicta ratione constitutis, partes 24ariae et 60ariae adscriptae sunt singulis angulis, quos tabulae exhibuerunt, computatae in hunc modum: Sit v. c. 2200 sinus arcus $1^{\circ} 15' 38''$. Respondentes huic arcui „partes vic. quartae“ sunt $\frac{2200 \cdot 24}{100000} = 0,528^{\circ}$

$= 0^{\circ} 31' 41''$, eadem „sexagenariae“ $= \frac{2200 \cdot 60}{100000} = 1,32 = 1' 19''$, signis adscriptis

„“ alio quam usitato sensu acceptis. Haec de tabulis dicta sunt, quas exhibet liber Kepleri, quem inscripsit „Chiliada“ (prodiit Marpurgi 1624). Tabularum Rudolphinarum pars, eadem quae jam disquirimus continens, simili quidem, sed non plane eadem ratione computata est, quae „Chilias“. Inscripta est „Heptacosias Logarithmorum Logisticorum“, continetque logarithmos tantum sinuum, non sinus ipsos. Ordo in columnis singulis non ut in Chiliade adaptatus est sinibus, sed vice versa „partibus sexagesimis“, quae incipiunt a $0' 0''$, et, crescentes ordine singulae partibus 5, desinunt scrupulis 60, vel, quod ad idem redit, partibus „quadrivicens“, cum haec ad illas, vel illae ad has facillimo hoc calculo reducantur: v. c. partes 7 sexag. $= \frac{7 \cdot 24}{60} = 2^{\circ} 48'$ part. quadrivic. Ex his com-

putantur sinus ad $r = 100000$ sic: $60 : 100000 = 7 : x$; $x = 11666 = \sin. 6^{\circ} 41' 56''$, quem arcum deprehendes in prima columna tabellae, adscriptum partibus sexagesimis $7' 0''$.

His praemissis redimus ad Kepleri calculum: partibus sexag. $19' 41''$, $44' 45''$ &c. adscripti numeri 111458 &c. logarithmi sunt, desumpti ex jam dicta tabula (eo tempore, quo Keplerus hoc exemplum Hipparcho suo adscripsit, nondum typis expressa); processus est idem, qui alibi in usu est, quare nil amplius notandum esset, nisi logarithmi divisorum $151' 48''$ et $63' 22''$ negativo sensu sumendi essent, quod inde evenit, quia utraque quantitas numerum 60 excedit. Hunc in finem tabulae exhibent praeter jam dictas 4 insuper quintam columnam, quae inscripta est: „Partes sexag. privativorum.“ In hac columna numerus $2^{\circ} 31' 48'' (= 151' 48'')$ inquirendus est, quem quidem non ipsum deprehendes, sed $2^{\circ} 31' 35''$, cui adscriptus est in praecedenti columna log. 92676, qui levi operatione in illum commutatur, quem calculus desiderat, quique „privative“ adhibendus est, sicut etiam log. $63' 22''$, qui, ut „privativus“, pro subtractione additione prioribus adjungendus est.

Sexagesimarum autem illarum partium „privativarum“ columna extrahitur ex columna partium sexagesimarum simplici divisione numeri 3600 per scrupula sexagesima; v. c. $23' 45''$ in columna inscripta „sexag. scrupula“ divisa in 3600 $= \frac{3600 \cdot 4}{95} = 151\frac{1}{19}' = 2^{\circ} 31' 35''$.

4) p. 529. Sit (Fig. 3) LM diameter „luminaris“ (Lunae), KN diameter umbrae. FLG = 81° , ergo FL = $40^{\circ} 30'$, LA = $17' 1''$, (= FA) erit FI („dimidium lineae sectionum“) = FA . sin. LF lg. $17' 1'' = \log. 1021'' = 3,0090257$
lg. sin. $40^{\circ} 30' = 9,8125444$

lg. FI = 2,8215701; FI = $663'' = 11' 3''$.
Deinde ducta semid. FE in \triangle IFE dantur latera FI et FE, hinc sin. \angle FEI = sin. arc.
 $\frac{FI}{FE} = \frac{663}{2916}$, unde arcus KF = $13^{\circ} 8' 37''$, ejusque cosinus = 0,9738; quare

$$IE = \cos. \text{arc. FK} \cdot FE = 0,9738 \cdot 48,6 \\ = 47,3' = 47' 18''$$

Keplerus tabula usus „Antilogarithmorum“ (in Rudolphinis p. 23), praeceptumque secutus 29. (ib. p. 25: Datorum laterum antilogarithmos ex tabula excerpe, differentia eorum quaesita per areas tabulae ostendit scrupula lateris quaesiti), compendiosiori via rem ad finem perducit.

Simili calculo deprehendit $IA = 12' 57''$, deinde
 sagittam $IK = EK - EI = 48' 36'' - 47' 18'' = 1' 18''$
 et $IM = AI + AM = 12' 57'' + 17' 1'' = 29' 58''$
 Inde quantitas defectus $= KM = KI + IM = 31' 16''$

5) p. 530. Cum sit (theor. 17): $AB^2 - OE^2 = 2OE \cdot AP$, erit

$$AP = \frac{AB^2 - OE^2}{2OE}$$

$$AB = 54' 22''; 2 \log. 54' 22'' = 3,4706654 = \lg. 49' 15''$$

$$OE = 33' 20''; 2 \log. 33' 20'' = 3,0457574 = \lg. 18' 31''$$

$$AB^2 - OE^2 = 30' 44''$$

$$\log. 30' 44'' = 1,4876098$$

$$2OE = 66' 40''; \log. 66' 40'' = 1,8239087$$

$$0,6637009 - 1$$

$$AP = 0,4610 = 27' 40''$$

Keplero prodit $AP = 27' 6''$, quia pro $2OE$, $2OF$ posuit.

Jam, quia OF (diameter Lunae) $= 34' 2''$, ergo $EF = 34' 2'' - 33' 20'' = 42''$,

prodit AE („arcus latitudinis“) $= AF - EF = 17' 1'' - 42'' = 16' 19''$

et PE (semidiameter umbrae) $= PA + AE = 27' 40'' + 16' 19'' = 43' 59''$.

6) p. 531. Secundum theor. 18. est $DB^2 - CB^2 = ED (DA + AC)$, et cum sit ex constructione probl. 14: $DE = 2EF$, quare

$$DA + AC = 2EF + 2AE = 2AF, \text{ erit}$$

$$DB^2 - CB^2 = ED \cdot 2AF, \text{ et inde}$$

$$AF = \frac{DB^2 - CB^2}{2ED}$$

Jam datis AF et $EF (= \frac{1}{2} DE)$ prodit $AE (= AC) = AF - EF$; denique in $\triangle ABC$ ad B rectangulo $AB = \sqrt{AC^2 - CB^2}$.

Sit $DE = 31' 44''$, $DC = 36' 30''$, $CB = 39' 46''$; hinc $DB = DC + CB = 76' 16''$.

$$2 \log. 76' 16'' = 3,7646694 \dots 1^{\circ} 36' 57''$$

$$2 \log. 39' 46'' = 3,1990382 \dots 26. 22$$

$$DB^2 - CB^2 = 1^{\circ} 10' 35'' = 70' \frac{1}{12}.$$

$$AF = \frac{70' \frac{1}{12}}{63' \frac{7}{15}} = 1^{\circ} 6' 43'', AC = 66' 43'' - 15' 52'' = 50' 51''.$$

$$AB^2 = (50' \frac{11}{20})^2 - (39' \frac{23}{20})^2 = 16' 43'' = 1003''.$$

$$AB = \sqrt{1003} = 31' 40''.$$

7) p. 531. In schemate 1. sit SD Sol, VE Terra, QF linea transitus Lunae per umbram. EFB parallaxis Lunae, BDE eadem Solis, ABD semidiameter Solis visa ex B , centro Terrae, FBG semidiameter umbrae. Ergo $BDC = ABD - BCD$.

$$BCD = BGE - GEC = BFE - FBG$$

$$BDC = ABD + FBG - BFE.$$

Parallaxin „Lunae a Sole“ dicit Keplerus differentiam $EFB - BDE$, quare $ABD + FBG - EFB + BDE = 2BDE$.

8) p. 532. Huc usque Keplerus finem secutus est suum justo ordine. Jam vero per aliquot folia sistens passum constantem, in computandis compluribus eclipsis ad normam problematum modo praemissorum occupatur, iisque adjungit problemata sequentia, omisis numeris continuis.

9) p. 532. Ex annot. 7 sequitur: $ABD + FBG - BDC = BFE$

$$1) 15' + 44' 7'' - 1' = 58' 7''$$

$$2) 15' 33'' + 49' 27'' - 1' 2'' = 63' 58''$$

Hinc distantias Lunae elicit Keplerus per „Tabulam parallacticam“ in Optica.

Ut comprobemus numeros Kepleri, sic calculum institumus: In triangulo BEF (fig. 1) ad E rectangulo datur $BE = 1$, et angulus $BFE = 58' 7''$ ($63' 58''$) quare

$$BF = \frac{BE}{\sin. BFE} = \frac{1}{\sin. 58' 7''} \left(= \frac{1}{\sin. 63' 58''} \right)$$

$$\log. BF = 1,7719939$$

$$= 1,7303452$$

$$BF = 59,115$$

$$= 53,746.$$

10) p. 534. Vacua haec reliquit Keplerus ipse. Cap. III. exhibet diametrum Lunae perigaeae $33' 20''$, apogaeae $30' 30''$.

Motus Lunae horarius = $15^{\circ} 8' 43''$: $25^h 26' = 32' 16''$. Calculum Keplerus ab-
solvens „ratione prosthaphaeretica“, singulari insuper utitur compendio in multiplicatione et
divisione:

$$42430 \times 5684 = 42430 (6000 - 300 - 6) = 254580000 - 12729000 - 254580 = \\ = 24159,6420.$$

Divisio absolvitur „logistica sexagenaria“, hac ratione:

$$\begin{array}{rcl} \frac{15^{\circ} 8' 43''}{25^h 26'} = \frac{1}{2} = 30' & & \frac{2^{\circ} 25' 43''}{25^h 26'} = 6' \\ \frac{1}{2} \times 25.26 = 12^{\circ} 43' & & 6 \times 25^h 26' = 2^{\circ} 32' 36'' (> 2.25.43) \\ 15^{\circ} 8' 43'' - 12^{\circ} 43' = 2^{\circ} 25' 43'' & & 2^{\circ} 32' 36'' - 2^{\circ} 25' 43'' = 6' 53'' \\ & & \frac{6' 53''}{25^h 26'} = \frac{1}{4} = 15'' \\ & & \frac{1}{4} \times 25^h 26' = 6' 21'' \\ & & 6' 53'' - 6' 21'' = 32'' \\ & & \frac{32}{25.26} = 1'' \\ & & \frac{16''}{30' + 6' - 16'' = 35' 44''}. \end{array}$$

13) p. 551. Ut lectores hunc et qui sequuntur calculos facilius comprehendant, haec
addenda censuimus; quanquam quae supra (ann. 3) proposuimus, huc quoque referenda sunt.

Diurnus $\odot = 57' 5''$ multiplicatus in dies 8 prodit $7^{\circ} 36' 40''$; idem in $17^h 23'$
multiplicatus (Keplerus utitur logarithmis ex Tab. Rud. p. 2 sq.) exhibet factum $41' 20''$,
indeque elicitur locus Solis ad d. 25. Junii $13^{\circ} 32' \odot$. Item in Luna numeri maxima ex
parte desumpti sunt e Tabulis Rud. (nondum quidem tum temporis, quo Keplerus haec com-
putavit, ad calcem perductis, sed ad suum usum praeparatis) cum ex tabulis motuum Lunae
(p. 78 sq.) tum e „tabula subsidiaria“ (p. 94). Factum $17' 3'' 35' 40'' = 10' 7''$ com-
putatur per logarithmos (p. 2), numeri 17.880 etc. itidem logarithmi sunt e tabula p. 23.
In loco \odot summa $4^{\circ} 3^{\circ} 39' 34''$ prodit addita „correctione“ $25'$ ad $4^{\circ} 3^{\circ} 48' 6''$, sub-
tractisque $31' 46''$ et $1' 46''$ pro diebus 10 et horis 13. 17', quibus superantur 7 revolu-
tiones Lunae diebus 203 etc. Hinc subtractis $10^{\circ} 12' 50''$ pro 7 revol., prodit locus \odot .
„Calculus ex Tycho“ hic et in sequentibus eclipsibus utitur tabulis, quas Progymn. Pars I.
continet. In computatione Lunae prima columna exhibet longitudinem Lunae a Sole, secunda
anomaliam, tertia motum latitudinis.

14) p. 552. Frid. Rutilius (Rüttelius) Stuttgartiensis „Registrator et Historicus“ multa
per literas egit cum Keplero ab anno 1613 in a. 1625. Affinitate conjunctum fuisse Ruti-
lium cum Keplero significant verba, quibus unamquamque epistolarum inscripsit: „meinem
Herrn Schwager“. In literis Rutilii, quas exhibet Vol. XI. Mss. Petropol., pauca deprehen-
dimus, quae notatu digna sunt; pleraque pertinent ad eclipses, quarum observationes unde-
quaue collectas transmisit Keplero (Riegeri Herbipolensis, Krabbii etc.), deinde ad Kepleri
opera, quibus colligendis frustra operam insumsit Rutilius (a. 1613: des Herrn Schwagers
Opticam kann ich nit bekommen; dann ich unsern Bibliopolis etliche mal memorialia gen
Frankfurt geben, sie haben aber ihrer Sag nach und als ich zu Strassburg fast in allen
Buchläden nachgefragt, und nit bekommen können. Anno 1623: Unsere Buchhändler kaufen
nichts als Pfaffengeränk ein etc.) Thema natale sibi expetens a Keplero natum se scribit
Rutilius d. 11. Oct. 1579 Stuttgartiae.

Quascunque inspeximus Rutilii epistolas, omnes viri exhibent animum hilarem, saepius
forte excitatum jocis Kepleri, quales passim occurrunt inter res serias, quas per literas cum
amicis egit. Unum proponimus pro ceteris. Keplerus certiore fecisse videtur Rutilius
anno 1613 de inito novo matrimonio sicut de studiis in theoriis ceterorum planetarum abso-
luta theoria Martis. Ad haec respondit Rutilius: Ad labores Veneris wünsche ich dem
Herrn Schwager viel Glück; halt wohl dafür, es werde nit viel Krummes bedürfen, denn
die personae femineae faciliores exoratu und zu compesciren, als viri Martiales sein, so wird
auch zweifelsfrey derselbig seiner studiosi Hilf darzu nit bedürfen, sondern nunmehr so viel
selbs gelernt, ein solchs allein zu verrichten, weil es ein amicabile und aspectabile sidus ist,
sonderlich bei Nacht.

Quem supra dicit Keplerus „Pratensem“ referunt scriptores rerum Danicarum medi-
cinam professum esse in academia Havniensi. Mortuus est Havniae a. 1576 annum agens 33um.

15) p. 615. Hanc eclipsin Keplerus his, ex parte iisdem quibus supra verbis, describit
Maestlino, descriptionem addens literis, d. d. 22. Dec. 1616, quarum partem exhibuimus
vol. II, p. 31 seq.:

Observatio Eclipsis Lunae 27. Aug. anni MDCXVI.

In monte Pesting (Poestling) dimidio milliari a Linz versus septentrionem in altum, unde pulsus horologiorum et voces vigilum urbanorum exaudiuntur, nec minus Otensheni et Wilderigae (Wilhering) horologia.

Hora una post mediam noctem subito sunt ortae nubes. Umbra in summo margine parum admodum ad sinistram declinavit. Principium erat in azimuth \searrow fortuito constituto 22° et altitudine $28\frac{1}{2}^\circ$, vel correctius 29° , sed vide ne sit hoc in superiori latere regulae vitioso, pro eo enim sequendum esset indicium inferioris lateris 26° : principium hoc conspectum est per nubes sparsas et dehiscentes identidem, vide itaque, ne paulo prius fuerit merum principium.

Ad probandum hoc azimuth quodnam fuerit, capta est in eo altitudo capitis Andromedae 70° , sed rursum puto fuisse superioris lateris indicium, quando latus regulae inferioris monstravit $66\frac{1}{4}^\circ$. Tunc Luna nondum dimidia in umbra erat. Antequam ala Pegasi veniret in id azimuth, umbra jam ad dextram inclinabat. — Ala Pegasi in illo azimuth habuit altitudinem $55\frac{1}{2}^\circ$ (cave ut supra, nam forte erat $51\frac{1}{2}^\circ$), Fomahant in illo azimuth erat alta 7° . — Cum umbra declinaret quasi ad 2 superiores in urna, erat \searrow in azimutho $46\frac{1}{2}^\circ$, altitudo imi marginis $21\frac{1}{4}^\circ$ vitiose et superiori latere, vere et in inferiori $17\frac{1}{2}^\circ$. Hinc jam discernere coepi inter superius et inferius latus regulae. Cum lucida pars vergeret in lineam inter duas fusionis et cum perpendicularum ex polari demissum caderet proxime spiram Serpentis, quae est versus quadrilaterum minoris Ursae, erat azimuth Lunae 50° minus $\frac{1}{4}^\circ$. Azimuth Lunae $51\frac{1}{2}^\circ$, altitudo 16° . Tunc nondum occidebat Aquila. Tunc linea per \searrow et umbram contendeat paulo super remotiorem claram quinquanguli in ∞ , puta humerum. Nam hoc quinquangulum habet duos humeros ∞ , oculum et os Pegasi et oculum equulei. Hic et supra Luna erat obscurissima, superfuit tamen aliquid.

Luna tota rubicunda fuit, sed magis cornu superius partis constitutae in umbra, quod erat ad sinistram supra lucidam particulam residuam.

Luna nondum plane restituta occidit in azimuth 74° ; \odot in azimuth 75° habuit altitudinem $1\frac{1}{2}^\circ$, certe utrumque luminare in semicirculo meridionali erat. Erat quidem suspicio alicujus defectus residui, sed cogita, an fuerit tantum debilitas luminis ex illa parte.

Causa incertae observationis fuit ista. Cum oppidum Linzium montibus vicinis sit circumvallatum, versus ortum das hocheckh, versus occasum Wienberg und S. Martinsberg, in cujus collo arx altissima omnem prospectum eripiens habitationi meae: ego ut utrumque luminare in horizonte viderem, vespera praecedente, ut primum serenitatis duraturae fides mihi est facta, porta jam jam claudenda erupi et comitibus duobus adscitis in arduum montem per unius horae spatium enisus sum, instrumento instructus non admodum commodo, triangulum erat azimuthali circulo unius pedis diametro impositum, lateribus complicatilibus. Locus observationis sub dio in novali aspero. A rustico vicino per duarum horarum spatium importune et indesinenter pulsando fores et clamando ad ravim usque, vix tandem nec nisi prius convocatis vicinis ab unius atque alterius stadii intervallo (cum nuncium clam per posticum emisisset) admissi sumus; nec amplius aliquid impetravimus, quam tripedem truncum duorum pedum altitudine, in quo erigeremus instrumentum.

Candelam aut faculam nullis omnino precibus extorsimus, nec ignis accendendi, licet eminus in agro, copia nobis facta, metu incendiariorum; itaque carbone ardente notas in instrumento inquisivimus, virgultis et assulis pro forcipe sumus ut in apprehendendo carbone, denique supinus in agro prostratus oculum pinnacidis supposui notavique cerussa observationes in papyro humida ob rorem, ad lumen vel Lunae vel carbonis.

Cum sit anomalia \searrow $6^\circ 6' 42''$, est semidiameter \searrow $17' 4''$ vel paulo major. Nam si diametrum in apogaeo statuerem $30' 30''$, ut ante annos 12, perigaeae prodiret major quam $34' 8''$; umbrae semidiameter $49' 8''$. Est autem et distantia a nodo $5^\circ 45'$ secundum me, et latitudo angulo magno $5^\circ 18'$ est $31' 50''$. Summa

ex lat. et semidiametro $\searrow 48' 54''$, quod est insensibili minus quam $49' 8''$. Si autem parum augeatur diameter \searrow , jam excedit umbram. Certe partem residuam aestimare non potui, praesertim in circumstantia limbi illustrati a radiis refractis et rubentis.

Finis Tubingae h. 4. 43'
Oritur \odot in alt. P. $48\frac{1}{4}$ h. 5. 14'

Diff. 31'. Si ergo finita fuisset eclipsis in ipso exortu Solis Lincii, dist. meridianorum esset 31'.

Maestlini observatio legitur in Hanschio p. 48.

16) p. 660. Barth. Pitisci, Grunbergensis Silesii, Trigonometriae, sive de dimensione triangulorum libri quinque (Aug. Vind. 1608. Primum prodit hoc opus Frankof. a. 1599, postea ib. a. 1612). „Axioma“ IV, quod dicit Keplerus, inest libro IV. et sic se habet: si duo latera sigillatim quadrantibus minora primum ipsa inter sese, deinde latus minus cum complemento majoris componas, et sinui arcus compositi posterioris sinum complementi arcus compositi prioris subtrahas vel sinum excessus addas, est ut radius ad medietatem rectae per illam sive subtractionem sive additionem factae, ita sinus versus anguli a dictis duobus lateribus comprehensi ad rectam, qua subtracta de sinu arcus compositi posterioris, relinquitur sinus complementi tertii lateris; vel de qua subtractus sinus arcus compositi posterioris relinquit sinum excessus tertii lateris.

Huic „axiomati“ addit Pitiscus in capite quod inscripsit: „Usus praecedentium axiomatum: quarto proportionum axiomati per accidens conveniunt (obliquangula triangula), in quibus vel ex datis tribus angulis latus aliquod, vel ex datis duobus angulis cum latere ipsis interjacente tertius angulus inquiritur.“ In demonstratione respicit ad lib. I, prop. 61, ubi demonstratur, „Trianguli sphaerici latera in angulos et contra permutari posse; complementis ad semicirculum pro latere et angulo maximo hinc inde desumptis.“

Si haec quae ex Pitisco praemisimus respexeris, facile rationem quam secutus est Keplerus percipies, inspecta fig. 12, ubi in $\triangle ABC$ dantur $\angle A = 5^\circ$, $\angle B = 0^\circ 18'$, latus $AB = 1^\circ$; $BD \perp AD$ vel $AE \perp CE$. Compl. $AB = 89^\circ$, compl. $\angle A = 85^\circ$.

17) p. 674. In „Appendice“ ad Tychonis Progymnasmatum partem primam (ed. ann. 1602, p. 818) Keplerus haec refert: Quamvis initio non statueret (Tycho) hoc libro de Luna ex professo agere, tamen cum absoluta restitutione Solari superessent in alphabeto paginae aliquot, intereaque in Luna succederent operae, visa illi est praeclara res, Soli sororem Lunam adjungere. . . . Reliquit ille nobis impressa omnia exceptis Lunaribus, quam pragmatiam non semel de novo a primis repetitam principiis tandem anno 1600 et 1601 sic plane ut jam prodit absolvit, plurima usus opera Ch. Severini Longomontani, viri ingeniosi et perquam industrii, qui astronomiam Braheanam Uraniburgi, et in convictu ipsius per 10. prope continuos annos hausit; cujus honorificam mentionem, quod parens proposuerat, nos merito facimus.

EPISTOLA DE SOLIS DELIQUIO

quod die 12. Oct. 1605 contigit.

PRAEFATIO.

Keplero inde ab eo tempore, quo observationibus astronomicis operam dabat, non contigit, ut totalem, quam dicunt, Solis eclipsin conspiceret, neque tales conquirere potuit observationes magnarum eclipsium priorum temporum, quibus tuto fidere vel calculum, qualem optabat, superstruere posset. Quare omni quo potuit studio astronomos nec non qualesquales alios „rerum coelestium amatores“ provocavit, admonens illos de eclipsi, quae ad d. 12. Oct. 1605 hora circiter meridiana expectabatur. In Opticis (Vol. II, p. 288 et 353) monet, hanc eclipsin (Luna perigaea) commodam fore, ut quaestio de luce Lunae propria decideretur, deinde ut observata Lunae diametro „certi quid de vera Lunae eccentricitate concludi possit“. In libro de Nova Stella (II, p. 696) hanc eclipsin affert, ut probet „coeli materiam alterabilem esse“. In literis privatis viros adiit Keplerus astronomica doctrina claros, ut in hunc quem diximus finem attenti essent eclipsi futurae et quum minus quam cupiebat responsi acceperit, publica epistola cum petitionem suam repetiit tum suam ipsius observationem exhibuit. Volumini XV. Mss. Petropol. inest conspectus eorum, quibus transmisit Keplerus opusculum suum, qui sunt:

„Galliae Agenti 2, gehn Paris; Iesuitis 4 gehn Rom. in Nederland, Clavio, Hispaniam. Wackerio 2, Barwitio 5 gehn Rom. in Nederland; Gotfried 2 gehn Francford; Bodemio 2, Herwardo gehn München; Schnueckart 2 gehn Amsterdam; von Polheim 2 gehn Heidelberg; Odontio 1 gehn Altorf; Bacchatio 1, Byrgio 1, Memhardo 1, Maestlino 1, Besoldo 1, Maestlino 1, und 1 zu Galliam per Fleinerium.

Wackerio 25 alia, Bonevilio (?) 4 alia, Corraducio 1, Veneto 4, Florentino 3, Gallo 3, Corraducio 3, Maximiliano 1, Palatino Neub. 3, Heller. 3 Italo Secr., Magino, 2 Fleiner, Leoni in Frisiam 8. Lehmanno Helvet., Rolando ad Lipsiam, Wagger, Poltzins. Fabricio, Schele, Francio, Ritterhusio, Brunowsky; Basileam 1, Casalio 4.“

Idem Volumen exhibet responsum Casalii hunc:

Edler Hochgelerter . . . geliebter Herr!

Mein willigste dienst neben wünschung aller wolffahrt.

Das ich dem Herrn in langer Zeit nicht geschrieben, ist nit die Vrsach, dass ich seiner vergessen hette oder in seinen dienst nit gewöst wäre. Sondern die vnanföliche

Brichtungen neben mir die Zeit also hinwekh, dass Ich mich gegen meine guten Freunde mit Briefen der Nothdurfft nach nit erzaigen möge.

Aus beyliegenden drey ansehnlicher Leütte Briefen hat der Herr zu sehen, wie lang es sey, dass sein opus durch mich an frembde Orth vberschickht und publicirt worden sey. Dessen sich nun der Herr zu erfreuen und beynebens zu getrösten, er werde mit sollicher Beschreibung an vielen orthen viel guetts und Ime selbst ein merkhliches Lob verrsacht haben.

Wais Er mich in seinen Diensten ferner zu brauchen, so hat Er mich darzue ganz willig. Gottes Segen mit vns allen.

Grätz d. 12. Tag Julii 1606.

Des Herrn dinstwilliger

P. Casal.

Inscr. Dem Edlen und Hochgel. Herrn J. Keplern der Röm. Kais. Maj. Mathematico, meinem sonders freundl. und geliebten Herren Praag.

Epistolae, quas dicit Casalius, datae sunt a Ferd. Contarini d. 8. Apr. 1606, Comofratra Cardinali d. Roma 7. Jan. 1606, et a medico J. G. Göpel, Martio 1606 (comp. vol. II, p. 829). Quae Serarius et Zieglerus responderunt leguntur in Hanschio p. 349 et 351. Responsio Kepleri vol. II, p. 828. Observationem Fabricii addito Kepleri calculo exhibuimus vol. II, p. 103 sq. Alii quorum literas Keplerus secum retinuit, sunt: Stanisl. Crzistanovic (comp. vol. II, p. 829), Aegidius Martini, advocatus Antwerpiensis, Dieterus et Malleolus Argentinenses. Eberhardus Schele, legatus Lüneburgensis, haec dedit Keplero:

S. P. D.

Clarissime Keplere.

Redditae mihi sunt hoc mane literae a Joh. Leone scriptae Pragae 3. Dec., quibus adjuncta erant septem exemplaria epistolae tuae de Solis deliquio proxime praeterito ad rerum coelestium amatores scriptae, quae quidem suis locis reddi curabo. Meditationes tuas super directionibus Fabricio nostro communicaram, verum ille nondum (saepius licet admonitus) remisit, alioquin dudum remissem. Faciam tamen, quam primum ab ipso recepero (comp. I. 356). Totus is namque nunc est in refigendo iudicio suo de nova stella, quod tertium nunc edidit inscriptum Henr. Julio Duci Brunsw. et Luneb. Praeterea Calendaria et prognostica scribit et edit. De quibus cum meum non sit judicare, supersedeo. Epigramma solummodo in ipsius honorem a me scriptum addo:

Arte laboratas vestes aurumque domosque

Suspicit insipido pectore vulgus iners.

At coeli Solisque vias positusque facesque

Sidera quas faciunt, Cinthia quasque facit,

Solus is observat, cujus Sapientia mentem

Lustrat et ad Jovae facta notanda rapit.

FABRICI, hinc capiunt famam tua scripta perennem;

Spernit humum et coelum gloria vera petit.

Intra quadriduum ille mihi aderit, tum ipse epistolam tuam et cetera tradam.

Interea (postquam ex epistola tua intelligo, te etiam despecta et vili narratione contentum fore atque de ipsis quoque nubibus certiore fieri cupere, quae tempore eclipsis Solaris conspectae sunt) hoc quoque te scire volui, me tametsi instrumentis mathematicis destitutum eclipsin tamen illam diligenter et curiose oculis adspexisse (nam tantum Dei gratia visu adhuc valeo, ut apertis quoque oculis Solem intueri possim) atque initium ejus in hoc meo praedio observasse hora 12. 30' fere post merid. Finis a me exacte observatus fuit, cum umbra in sciotherico notaret horam 2. 45'. Medium sive ἀκμην observare non potui deceptus tempore a te et aliis in Calendariis et Ephemeridibus notato, tum etiam nubium concursu, quae ante medium eclipseos frequentes Solem obtegebant, sic tamen, ut subinde eluceret, post medium vero coelum serenum, clarum et omni nubecula quasi purgatum cernebatur. Tum ipse quoque ☉ in eclipsi tantum splendoris retinebat, quantum Luna nova post triduum emergens, sic ut nec stellae ullae hic visae sint, imo a plerisque ex vulgo non animadvertum sit, eclipsin ullam fuisse. Haec rudi Minerva annotare tibi communicare volui. A Fabricio accuratiora et certiora habebis, qui duobus abhinc miliaribus eandem observavit instrumentis adhibitis ad eam rem conducentibus.

Hipparchum tuum ubi edideris, mihi quaeso communicato una cum Opticis tuis Paralipomenis. Delector nempe hoc studio tametsi rudis in ea arte et ἀγνοῦμεντος.

Vale mi Keplere et saepius ad me scribito, literis solummodo traditis Jo. Leoni nostro. Celeri ut vides calamo scripta in praedio meo Tunumano XXIX. Dec. stilo vet. anni prope finiti 1605.

T. Eb. Schele.

Herwartus post biennium ab eclipsis tempore haec nunciat:

Ehrenvester, Hoch und Wolgelerter. Dem seind meine willige Dienst bevor, sondern lieber Herr und guetter Freund.

Es schreibt mir ein Engellendischer Graf e genere Talbotiorum, so rerum astronomi-
carum praesertim calculi eclipsium luminarium admodum guarus, vnder anderem so vill, das
Er die Eclipsin Solis de anno 1605 in Anglia mit Fleiss, und aber jedoch absque instru-
mentis mathematicis observiert und so vill befunden, quod sub lat. 53° et long. $20\frac{1}{2}^{\circ}$ Angliae
circiter juxta Cal. Nov. d. 12. Oct. h. $0\frac{1}{2}$ c. defecerint digiti \odot $9\frac{1}{2}$ a borea. Tempus
autem incidentiae fuerit unius horae plus minus.

Das hab Ich dem Herrn zu wissen füegen wollen vnd bleib lme angenehmen dienst
und frödl. willen zu erweisen allezeit gewogen.

Datum München den 27. Nov. 1607.

Des Herrn

dienst: und guetwilliger

Hans Görg Herwart von Hohenburg.

Observationem eclipsis Londinensem, „habitam a Jo. Erikkenio Hamburgensi, quondam
Tychoonis Brahei ministro, nunc ejus generi Fr. G. Tengnagel nomine Caesaris ibi praesentis“
integram inserendam censeamus, cum quia accuratior fuit reliquis, tum ob annotationes a
Keplero ipso adscriptas.

Observatio eclipsis Solis a. 1605, 2. Octob. stil. vet. Londini Britanniae.

Horologium pro intercapedinebus: nam ex altitudine patet ejus aberratio per $23'$.

Horologium post merid.	Correcte	Altitudo	Declinatio circuli p. centra a verticali.	Digiti	Pars lucida in particulis distantiae.
H. M.	H. M.				
0. 44	1. 7	29. 30	0	2. 12	
0. 50		29. 0	5 ad sinist.	2. 12	
0. 52 $\frac{1}{2}$	1. 15	28. 45	7 ad dextr.		
0. 58		28. 30	43	2. 20	
1. 2		28. 15	47	2. 40	10

Cum lucida pars propter opticam rationem semper justo major sit, corrigam in sequentibus
omnia et ponam veram partem lucidam in particulis distantiae.

1. 9		27. 45	60	3. 30	19 $\frac{1}{2}$
		27. 30	exacte observ.	4. 0	
1. 20		27. 0	71	4. 40	29
1. 24		26. 45	76	5. 20	34 $\frac{1}{2}$

Hic paululum movebam instrumentum ad dextram, ut quadrans libere posset pulsare.

1. 27	1. 50	26. 30	65	8	40
				correcte 6 $\frac{1}{2}$	
1. 30	—	26. 20	68	8. 30	44
1. 33	1. 56	26. 0	77	7	48
1. 38	—	25. 45	80	7. 40	55
1. 40	—	25. 30	74	8	56
1. 42 $\frac{1}{2}$	—	25. 20	78	8. 20	59
1. 48	—	24. 50	77	9	64
—	—	24. 40	84	9. 15	66
1. 53	—	24. 30	80	10	72
1. 55	—	24. 20	83	10 plus paulo.	73
1. 59	—	23. 50	85	10. 40	78
2. 10	—	23. 45	85	Totus lucidus.	

Circulus rotulae papyraceae aequabat partes 12, sed radius Solis etiam per foramen
ampliatu aequabat $10\frac{1}{2}$. Hinc corrige.

Hactenus verba observationis; sequuntur nunc notae Kepleri.

Et primo praemisit observator Ericius summam quandam observationis in
litteris ad Matthiam Seiffardum, qui mihi communicavit 13. Dec. Summa haec erat:
Instrumenti longitudo 14 pedes, etc. v. s. p. 534; maxima obscuratio 11 digitorum
h. 1. 7' p. m.; declinatio a vertice ad sinistram mihi post tabulam stanti 5° :
finis h. 2. 21'. Inclinatio paulo ante 85° ad dextram. Polus hic $51^{\circ} 32'$.

Primum quod tempora attinet. Observator tam in scheda observatoria, quam in literis Pragae scriptis addidit ubique 23' ad horologium. Probabo ego fidem correctionis ex observatis altitudinibus.

Phasi secunda.

Compl. declinationis ☉	82° 29' 43"	—	7° 30' 17"	Alt. ☉	29° 0' —	48481
Alt. aeq.	38. 28		38. 28			
	120. 57. 43	—	45. 58. 17	—	71899	— 71899
	30. 57. 43				51449	120380
					123348	
					61674	

$$\frac{120380}{61674} = 195188; 95188 = \sin. 72^\circ 9' 12''$$

$$\begin{array}{r} 17. 50. 48 \text{ h. } 1. 11. 23 \\ \text{Horolog. } 0. 50 \\ \hline \text{Differentia } 21' 23'' \end{array}$$

Computus temporis finis.

$$\begin{array}{r} \text{Alt. ☉ } 23^\circ 45' — 40275 \\ 71899 \\ \hline 112174 \end{array}$$

$$\frac{112174}{61674} = 181882; 81882 = \sin. 54^\circ 58'$$

$$\begin{array}{r} 35. 2 \text{ h. } 2. 20' 8'' \\ \text{Horolog. } 2. 0 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{Differentia } 20. 8''.$$

Ergo observator nimium addidit addens 23', debuit tantum 20', quia parvis altitudinibus potius fidendum, quam meridianis, quae parum variantur.

De declinationibus circuli per centra notandum, magnam esse irregularitatem; non satis enim diligens hic fuit observator. Et est valde lubrica ratio observandi. Primum nota, si facies obvertatur tabellae, eadem esse nobis dextra in tabella, quae dextra sunt in coelo, spectantibus Solem ipsum. Atqui in coelo occasus ad dextram est, unde ingruit Luna, ortus ad sinistram, qua exit Luna. Cum ergo sine haesitatione tam in scheda quam in literis inclinatio initialis ad sinistram ponatur, finalis ad dextram: diligenter nota, quod hoc velit intellectum de situ corporis sui. Mihi, inquit, post tabulam stanti. Nimirum spectavit et coelum et tabulam, sed illud suspexit supinus; hanc superinhians despexit corpore prono non converso. Itaque quae sunt in coelo dextra, erant illi in tabula, sic stanti, sinistra. Fuissent sane dextra, si tergum Soli obvertisset, faciem tabulae.

Confirmat hoc quantitas. Nam intra $2\frac{1}{2}'$ temporis a 5° sinist. mutatio est facta ad 7° dext. per 12° , quae celeritas omnino convenit eclipseos medio; tunc nempe celerrima est mutatio. Accidunt enim fere proportionalia in sequentibus. Nam a tempore $52\frac{1}{2}'$ in $58'$, quod est prioris intervalli triplum fere, mutatio facta est a 7° in 43° , per 36° , quod est prioris itidem triplum. Nihil igitur dubitandum, quin sub titulo inclinationum ad primam phasin per errorem sit adscripta figura 0. Sive dubitaverit observator in prima trepidatione, quorsum inclinet umbra, sive posterius addiderit illam, existimans naturalem esse consecutionem a 0 ad 5° et 7° et cetera, cum non respiceret ad diversos titulos sinistr. dextr. Nam cur nihil erroris admitteremus in ipso observationis principio, cum videamus in sequentibus errores omnino insignes?

Sic autem corrigo sequentes. In fine solet esse tardissima mutatio: credo ergo hisce 60. 71. 74. 85. 85, falsi sunt ceteri. Ausim etiam manus admove-
re ipsi 43 et pro eo scribere 40. Ut in 4' mutatio 7°; in 7' sequentibus mutatio
13° fieret, ad illam exactam observationem 60. Inde per 11' competant 12° et
scribatur 72° pro 71°. Inde per 4' competant 3° et scribatur 75° pro 76°. Ex
eo sunt 4 saltus per trina minuta; scribo igitur 76½ pro 65; et 78 pro 68 et
79 pro 77. Succedunt 5', quibus cedant 2°, scribaturque 81 pro 80, inde 2' cedat
dimidius et scribatur 81½ pro 74, sequentibus 2½ iterum dimidius scribaturque
82 pro 78, sequentibus 5½ detur 1 et scribatur 83 pro 77. Maneat 84 et ponatur
84½ pro 80, sic 85 pro 83.

Typus correctionis.

Scripti: 0. 5 sin. 7 dext. 43. 47. 60. 71. 76. 85. 88. 77. 80. 74. 78. 77. 84.
80. 83. 85. 85.
Correcti: 0. 5 sin. 7 dext. 40. 47. 60. 72. 75. 76½. 78. 79½. 81. 81½. 82. 83. 84.
84½. 85. 85. 85.

De digitis.

Adscripsit observator latitudinem residuae lucentis partis et admonuit in fine
de quantitate sui digiti. Nam in circulo rotulae papyraceae dividerat diametrum
in digitos 12, sed totus Sol aequavit eorum tantum 10½. Et hinc jubet corrigere
digitos omnes residuos. Verbi causa, si 10½ mensurae valent 12 Solis (Solem
enim dividimus in 12) quid valent 2½? R. 2⅓.

Ergo fimbriatae speciei Solis superfuerunt in medio digiti 2⅓. Quia igitur
in literis posita est quantitas defectus 11 digiti: videamus nos certitudinem.

Enucleatio cornu residui 2⅓.

In principio schedae tribuitur semidiametro radii Solaris fimbriati 45, duplum
90. Hinc aufer diametrum foraminis 9, et restat diameter puri Solis 81, atque is
dividendus est in digitos 12. Ergo 6½ valent digitum in puro Sole.

Jam quantitas cornu residui fimbriati ponitur 2⅓, qualium totus Sol fimbriatus habuit 12.

Si 12 valent 90 quid 2⅓ vel ⅔? R. 18⅓. In particulis distantiae fimbriatum
cornu fuit 18⅓.

A fimbriato cornu 18⅓ aufer fimbriam 9, restat purum cornu 9⅓. Sed 6½ valent
digitum. Superfuit digitus 1 cum ⅓, vel 1. 25'.

Quantitas igitur defectus dig. 10° 35', quod observator in literis dixit 11° 0'.

De particulis distantiae, quibus definita est pars lucida. Harum
series ultima non potest esse ex observatione, sed est ex observatoris computatione.
Est autem tam primus numerus 10 quam sequentes, post admonitionem, intelligenda
de vera parte lucida: quod sic patet.

Nam si fimbriatus 10½ valet 90, quid 2½? sequitur 22½. Aufer fimbriam
9 a 22½, restant 13½, et ecce 10 est adhuc minus. Itaque tam 10 quam 13½
sunt intelligendi de enucleata specie.

Error autem trium particularum inest in omnibus numeris. Nam etiam in fine,
cum debeat enucleatus radius Solis habere 81, habet tantum 78.

Erroris occasio videtur haec esse, quod pro Solis semidiametro 45 perperam
arripuit Lunae diametrum 39, cujus duplum 78. Nam si 10½ dat 78, quid 2½?
seq. 19½, unde ablata fimbria 9 relinquit 10½.

Nihil igitur nos turbet series ultima, quae est ex computatione.

Longitudo visa \searrow a \odot in fine eclipsis.

Ex Praecepto Rudolphi.				Primum inquiratur Nonagesimus.	
		ad occasum		A.R. \odot 197. 37	Competens loco \odot in con-
Latus aequat.	37. 21	— 49975		Tempora	junctione vera, quod parum
Alt.	38. 28	— 47472	— 24466	p. m. 35. 2	nocet etiam in fine usur-
		97447	— 7680	— 232. 39	pari.
	57. 43	—	16786	Asc.obliq. 322. 39	Cooritur 20. 39 δ
	23. 31 $\frac{1}{2}$				Nonages. 20. 39 \approx
	81. 14 $\frac{1}{2}$		1173	Luminaria sunt in quadrante occidentali	
		90950	— 8853		
	69. 34	— 6497			
Nonag. 20. 26	\approx				

Pro angulo inter eclipticam et verticalem.

Angulus hic supra ad sinistram est paulo minor recto, infra paulo major. Inquiritur hic facile ex data Solis altitudine et distantia ejus a Nonagesimo.

Alt. \odot 23. 45	Tang. 44001
Compl. dist. \odot a Nonag. 88. 27	Tang. 3695600
44001	
3695600	= 1190 = sin. compl. anguli 0. 41

Angulus infra 90. 41

Aufer angulum inter diacentron et verticalem 85. 0 in coelo etiam infra.

Angulus inter diacentron et eclipticam 5. 41. Latitudo erit austr.

Distantia centrorum.

Etsi observator habet diametrum \searrow 32' 40" et ego in epistola 32' 59", sit tamen illa 33' 32", quantam statuo in ultima correctione Hipparchi. Nam semidiameter habet tantum 26" plus observata, quod notabimus.

Semid. \odot 15. 16
" \searrow 16. 46

Distant. centror. 32' 2" vel 31' 36" observatori.

Hinc angulo 5° 41' respondent pro latitudine australi infra centrum \odot 3' 10" vel 3' 8"; parall. 54' 57"; 54. 57 — 3. 10 = 51. 47.

Pro longitudine \searrow a \odot visa respondeat angulo 84° 19' vel 31' 50" vel 31' 24".

Vera longitudo \searrow a \odot .

Altit. Nonag. est 23° 41', paulo sc. minor quam alt. \odot . Assumta igitur parallaxi 60, respondet angulo 66. 19 parallaxis latitudinis 54' 57", longitudinis angulo 23° 41' respondet 24' 5" in horizonte, unde in distantiam \searrow a Nonagesimo 1° 2' (quia Luna est illi propior quam Sol per 32 circiter) competit 0' 26" in occasum. Ergo Luna hoc momento motu vero fuit per 32' 16" vel per 31' 50" ultra locum Solis visibilem.

Ex fine articulus conjunct. verae. Superatio		32. 16	Tempus
Horarius Lunae a Sole est in Tychone		34. 10	
		1. 42. 30	
Tempus finis fuit h. 2. 21. 8		32. 28. (30)	
aufer	56. 40	31. 54. 20	56' vel 55'
	h. 1. 24. 28 vel h. 1. 25. 16.	21. 40	52"
Tempus quo Luna Soli centraliter conjuncta fuit		10. 45	
Londini. In Sole parallaxis long. nulla fuit, in		10. 46	40"
Luna non ultra 2"		21. 81	

Longitudo visa ☾ a ☉ in phasi primae proxima.
 Rursum ut prius A.R. ☉ 197. 37
 Temp. p. m. 17. 51
 A.R. M.C. 215. 28
 Asc. obliq. horosc. 305. 28. Cooritur 2. 5 ☾
 Nonages. 2. 5 ☾
 Luminaria in quadr. orient. 19. 6
 17. 1.

Pro angulo inter eclipticam et verticalem.

Alt. ☉ 29° Tang. 55431.
 Compl. dist. ☉ a Non. 72. 58½. Tang. 326526.
 55431
 326526 = 16976 = sin. 9° 48' compl. anguli.

Est igitur angulus supra ad dextram seu occidentem 80° 14'. Infra ad dextram versus occidentem 99° 46'. Sed inclinatio spectata fuit superius 5° ad sinistram, cum desuper in radio spectaret observator, ergo infra ad dextram in coelo sc. ad occidentem. Aufer igitur 5° a 99. 46, prodit 94. 46. Ergo angulus inter diacentron et eclipticam est 85° 14', jam versus ortum; Luna ergo fuit visibiliter ultra Solem.

Distantia centrorum.

Erant supra in cornu enucleato particulae 9⅞, qualium 81 in toto Sole. Sed totus Sol habet 30' 24". Ergo pars nona 3. 23 et hujus sedecima 12½". Superfuerunt igitur 3' 36".

Adde residua 3. 36 ad semidiam. ☾ 16. 46, veniunt 20. 22 vel 19. 56, aufer semid. ☉ 15. 12, restat dist. centr. 5. 10 vel 4. 44.

Lat. visa	5' 9"	4' 43"	
Parallaxis assumpta	51. 40	51. 40	
Lat. vera	46. 31	46. 57	Respondet igitur angulo 85° 14' visibilis latitudo
Fine	51. 47	51. 47	5' 9" vel 4' 43", angulo 4° 46' visibilis longitudo
	5. 16	4. 50	0' 25" vel 0' 24" in ortum, ultra visibilem Solis.

Vera longitudo ☾ a ☉ visibili.

Altitudo Nonagesimi est 30° 33', cui de parallaxi 60 respondet longitudinis tota 30' 30" et huic distantiae a Nonagesimo 8' 56". Latitudinis vero 51' 40". Haec parallaxis est in ortum, auferenda igitur motui Lunae, quae est ultra Solem visa per 0. 0' 25". Aufer 25" ab 8' 56", restat 8' 30", tantum est Luna ante ☉ vere, posita parallaxi Lunae a Solis vera.

Hinc articulus ☽ verae.

Superatio 8. 30	
Horarius 34. 10	15. Tempus 14' 56".
8. 32. 30	
2. 20	
Tempus phaseos erat h. 1. 11. 23	
Adde min. 14. 56	
h. 1. 26. 19	

Comparatio.

Ex secunda phasi ☽ vera h. 1. 26. 19. Hac parallaxi minore diametro.

Ex ultima h. 1. 25. 16.

Memineris igitur, quod phasi secunda altitudo 1 minuto plus addebat horologio quam in fine, et nos diximus, fidem fini potiore habendam. Omnino igitur reputatur medium Londini in horam 1. 25. 30.

Reductio ad meridianum Uraniburgicum.

Hondius Londino dat long. $27^{\circ} 32'$ circ.

Uraniburgo 41. 45

Differentia 14. 13. Temp. 57'.

Ergo quod est Londini h. 1. 25. 30

57

id erit Uraniburgi h. 2. 22. 30

Calculus Tychoonis dat h. 2. 13. 37. Tabula mea magna Germaniae habet inter Uraniburgum et Caletum 49. Hinc usque Londinum numerat Origanus 15; summa 64. Sed Origanus perperam, quia non sunt ultra 12° . Mea universalis habet inter Uraniburg. et Londinum $12^{\circ} 45'$ circiter, quae sunt 51'.

In literis ad Nautonnerium et Coignetum datis Keplerus propius adit ea, quae libello suo spectaverit, quam ob rem literas ad utrumque datas subjungimus, omisiss iis, quae p. 457 ex literis ad Nautonnerium excerptimus.

Haec igitur scripsit Keplerus Nautonnerio:

Illustrissime Domine! Liber tuus idiomate Gallico conscriptus Pragae quoque importatus est, et in bibliothecas doctissimorum virorum, quos habet aula Caesarea, acquisitus. Ejus mihi legendi copiam fecit Ill. D. M. Wackerius a Wackenfels, S. C. M. a consiliis aulae Imperialis. Quo minus jam totum evolverim impedimento fuit idiomatis pertenuis cognitio, vel olim a Gallis pueris in Germania hausta vel usu librorum interea acquisita. Lecta epistola, in qua lectores alloqueris, valde fui exhilaratus similitudine studii, quo suum uterque negotium agimus, tu magneticum, ego eclipticum. Itaque et dignam tuam petitionem judicavi, cui quantum in me esset satisfaceret, et maxime te idoneum, cui vicissim meum negotium communicarem. Quo quidem ex animi sententia confecto, plus ad tuum afferre potero subsidii, quam si Lunares meras curarem et sequerer eclipses. — Petis observationes Lunarium eclipsium; eas ex fide instrumentorum et diligentiae adhibitae accipe hac conditione, ut earundem observationes vicissim vestras et ego nanciscar.

Anno 1603. 18. Nov. Praegae Bohemorum ad Muldavam fluvium, quae in Albim incurrit (quidam Casurgim Ptolemaei esse existimant, alii negant), eclipsis coepit $10'$ postquam culminasset dexter humerus Aquarii; desiit $3'$ postquam culminasset caput Andromedae; initium ergo h. 6. 21', medium h. 7. 19', finis h. 8. 17', ut annotatum invenies in Optica fol. 412 (II, 384). Anno 1605. 3. Apr. eclipsis Lunae accurate observata est duobus locis: Praegae et in Frisiae orientalis pago Ostelae, prope Auricum comitis oppidum. Initium Praegae h. 7. 38'. Ostelae 7. 14'

Medium " " 9. 17. " 8. 52.

Finis " " 10. 56. " 10. 30.

Consensus causa annotavi, quod paulo ante h. 9. 20' linea ex superstite loco circumferentiae per centrum Lunae ducta inciderit in praecedens genu Bootis. Hinc differentia meridianorum ad summum $6\frac{1}{4}^{\circ}$. In Optica posui plures eclipsium observationes (ut et illas, quas petis, a. 1601. 9. Dec., medium h. 6. 59', et a. 1603. 24. Maji, medium h. $12\frac{1}{2}'$. Sed fol. 372 (360) est hallucinatio calculi, ex suis principiis etiamnum restituenda; duratio enim Tychoonica est etiamnum minor (comp. II, 439). Et fol. 374 (361): hic locus h est ex Magino. Nam ex posita observatione sequitur $0^{\circ} 4' x$), etiam Solarium.

Ibi et methodum meam videbis, quomodo citra omne periculum parallaxes removeam, atque inde ex principio et fine per diversa loca observatis differentiam longitudinum eliciam. Hoc modo cum et magnam illam Solis eclipsin superiori Octobri observassem, et dimissis chartis meis (quarum hic habes exemplum) ex Londino Angliae responsum quale volui accepissem, didici diff. long. inter 11° et 12° citra omne majus dubium certissime versari, quam chartae 16° — 19° faciunt. Utinam toto illo districta, quo visa est, in hunc modum fuisset observata; una enim eclipsis tibi cumulatissime satisfecisset. Finem in Anglia observarunt h. 2. 21', ego Pragae h. 3. 28', diff. h. 1. 7' dat sane $16\frac{3}{4}^{\circ}$, si non consideremus parallaxin. At quia per parallaxin Luna mihi occidentalior est facta quam Anglo, serius deseruerit Solem, ita vides minorem fieri differentiam meridianorum quam $16\frac{3}{4}^{\circ}$. Quod autem de 1° dubito causa est, quia Anglus principium non observavit, medium vero, quod ille prodidit ex inclinatione ducto argumento, a fine aliter abest, quam apud me fuit separatis utrinque parallaxibus. De majori autem quam de 1° dubitatio plane nulla est. . . .

. . . . Interim commendo Tibi negotium meum eclipticum quam possum diligentissime. Literas, si quibus me fueris dignatus, puto te rectissime procuraturum, si via Parisiana inclusae deferantur ad agentem Regis Galliarum, qui Pragae apud aulam Caesaris perpetuo versatur. Illud unice peto ut discam, an in aliquibus partibus ultimae Galliae eclipsis totalis fuerit; et si accesserit verum initium et finis, cumulatissime mihi erit satisfactum. Sed quid ego multis, cum capita quaesitorum diligenter fuerint in „Epistola“ inculcata, quae rogo sedulo excutias, et hac etiam in parte seu ex te ipso narrando seu ex aliis percontando philosophiam juves. Celebrabunt id studium posterum et Deus ipse approbabit. Vale. Datae Pragae Bohemorum a. d. IV. Non. Febr. 1606.

Michael Coignetius, Belgii ordinum mathematicus († 1623) conscripsit quaedam de arte navigandi (Antw. 1581); deinde tractatum de eclipsi Solis anni 1605, quo Keplerus motus Nicolaum Serarium (e Soc. Jesu, Moguntiae) adiit, ut certiore se faceret de illo viro. Accepta responsione („Dominus ille Coignetius albus an ater esset, nescivi hactenus. Sed hisce diebus, cum iter huc haberet clarissimus et summus mathematicus, D. Adrianus Romanus, duo mihi significabat: unum, virum esse in astronomicis laudatum, alterum, virum esse, quem alio aliquando abripiant alia.“) literas dedit Keplerus Coigneto quaerens varia de illa eclipsi Solis aliaque astronomica.

Scheibelinus (Einl. zur Math. Bücherkenntnis) ad annum 1606. librum de stella nova verbo tangit, Claramontium secutus, auctore Michaeli „Cognato“, dicens forte Coignetum.

Praeter haec nil nobis de Coigneto innotuit, donec inspecto vol. manuscr. Petropolitano deprehendimus inter ea, quae Keplerus collegit ad Stereometriam, „M. Coigneti opus gallicum de usu 12 divisionum,“ quod ait multa habere ad suum scopum pertinentia. In Stereometriae editione Germanica (N. 98) Keplerus dicit Coignetum: „Ertzh. Mathematicum zu Brüssel,“ ablegans lectores ad ejusdem „französische Instruction über die Proportional Circeln, die mir nur schriftlich zu sehen worden.“

Coigneti observatio ecl. 1605 valde turbavit Keplerum, cum eam suae ipsius observationi non congruam inveniret (comp. II, 426) ita ut Vinc. Blancho (1616) haec dederit: Eclipsis a. 1605 observationes a tribus praestantissimis mathematicis, Ericio Tychonis discipulo Londini, Coigneto et Fabricio, meam observationem, Pragae in viridario Caesaris inter turbas aulicorum habitam, erroris aut hortulanum malae fidei arguunt, qui non diligenter arcuerit ab instrumentis turbatores. Nam initium in „Epistola“ adscripsi h. 1. 6' p. m., quod per tria dictorum locorum observata inter se consentientia fieri non potest.

Ipsam Coignetum his adiit Keplerus literis: Concessit mihi ill. Hispaniae Regis legatus scriptum tuum breve de eclipsi Solis anni 1605. Ex cujus

pensitatione nata mihi est dubitatio, a nemine praeter te rectius dissolvenda. Pulchre consentit observatio tua cum Anglicana Londini habita, si differentiam longitudinum (quae non potest non esse certissima propter navigationes creberrimas) et una Parallaxin Lunae a Sole utroque loco convenienter applies. Harum utraque si cum mea observatione comparetur, cujus descriptum publicis typis excusum tibi transmissum puto, intervallum Pragae inter et utrumque locum valde breve efficitur. Ecce typum operationis: posita parallaxi horiz. \odot a \odot 58' 33'', in alt. poli 50° 5' hora 1. 6' fit parall. long. 8' 33'' in ortum; simul autem adscitis diametris \odot 30' 30'', \odot 32' 59'' et summa semidiametrorum 31' 45'', in principio Luna visa est ante Solem 30' 40'', et addita parall. long. 39' 13'' vere ante \odot . Ad eundem modum posito, quod azimuth Solis sumseris praecise in ipso eclipsis principio, neque fortasse paulo tardius, ut fieri solet, ergo h. 0. 33' in alt. poli 51° 12' parallaxi \odot a \odot in ortum est 14' 14'' major quam mihi, quia Luna etiam longius abest a nonagesimo. In principio vero eclipsis Luna pene ut mihi visa est ante Solem stare 30' 40'', ergo addita parallaxi in universum 44' 54'' vere ante Solem fuit. Oportet tempus eligere, quo tempore Pragae quoque \odot per 44' 54'' fuerit ante \odot , nempe 5' 41'' plus quam in Pragensi principio; tunc enim tantummodo per 39' 13'' fuit ante Solem. Cum autem horarius verus \odot a \odot sit 34' 10'', ergo 5' 41'' confecta sunt per 10' temporis; itaque h. 0. 56' Pragae Luna ibi fuit, ubi h. 0. 33' Antwerpiae. Diff. 23', quae faciunt 5° 45'. Eodem pacto inveni inter Pragae et Londinam paulo minus 13°. Nam ex observatione medii prodiit 12° 40', ex finis observatione pene idem. Coepi itaque credere, tabulae geographicae Germaniae ad litus oceani et per Saxoniam occidentalem nimiam esse latitudinem. At me revocat eclipsis alia Lunae, ea quae 3. Apr. contigit. Ejus initium hic Pragae fuit 14' prius quam Spica attolleretur 8° 33', cessavit 58' postquam Spica fuit alta 24° 1'. Hinc colligitur medium h. 9. 17. Jam in Ostfrisia meridiano Emdensi, pago Ostelae, cujus alt. poli 53° 38', animadversum initium in alt. Sirii 17°, finis in alt. Arcturi 46° 25' (comp. II, 102), itaque duratio prodiit brevior mea merito: nam sunt causae opticae, quas explicavi in libro meo. Sed medio comparato cum Pragensi medio existit diff. meridianorum 6° 10'. (In margine:) At quid opus eclipsi Lunae? Haec ipsa Solis est observata ab eodem. Finis in alt. \odot 18° 10', ergo h. 3. Tunc parall. long. 5' 25'' in occasum, adde 31' 40'' superationem \odot a \odot , est igitur vera superatio 37' 5''. In Anglia vero Londini sc. h. 2. 21' fuit vera superatio 32' 7'', igitur h. 2. 30' fuit ibi etiam 37' 5''. Ergo inter Auricum et Londinum 30' horaria vel 7° 30''; at inter Londinum et Pragae 12° 40', ergo inter Auricum et Pragae 5° 10'. Hic igitur Antwerpia solis 40' esset occidentalis Aurico Frisiae. Horum si utrumque verum, etsi Emda cum Antwerpia sub eodem est meridiano, imo 20' occidentalis, res mira erit. Quis enim credat, in Belgio nesciri situm Belgii? Cui verisimile fieri potest, falli nautas, qui litus omne Seelandiae Hollandiaeque, maxime vero Frisiae occidentalis a septentrione declinant versus orientem? Ego certe credere ista non possum; et tamen, ubi lateat error, non video. Meam observationem confirmat perpetuus consensus calculi Tythonici cum observatis Pragensibus, mediocris is quidem. Nam initium computaveram h. 1. 11', medium h. 2. 21'. Tuam observationem confirmat Anglicana, Fabricianam vero Ostfrisiae meamque Pragae habitas confirmat ratio itineraria per loca mediterranea. Nam

igitur exemplo cernite primum Hipparchi industriam, qui in onicorum motuum tumultibus per decies centena passuum milliarum Lunarum indagavit, cum esset astronomiam super hoc delirurus.

rate amplius, nequaquam ista perfici aliter potuisse, nisi reges Aegypti, quamvis tunc de rerum summa inter sese conrime terraque et mari grassantes, in unius tamen privati unanimes consensissent iterque tutum illi artis praeclarissimae itissent, forsitan et sumtibus juvissent.

o ad haec nostra revoco tempora, quibus post jacta per Tycho-olidissima fundamenta id unice agitur, ut astronomiam quam n habeamus; et quod meam partem attinet, tempus forsitan et nicula mihi defuerint, animus certe nunquam deest, successus t, observationes adsunt in copia, quales quaevis temporum et litio exhibet: sola haec Hipparcho usurpata occasio hactenus defectum Solis diversis locis accurate observatum eadem in-expeditius, quae aliunde quoque innotuere per longiores am-e consensus veritati praeberet testimonium. Quodsi seculum emplemur, rarissimas videbimus hujusmodi occasiones.

544 magna fuit eclipsis et alicubi totalis et mediocriter adulta, ut Gemma Frisius adnotavit, inferior Solis pars defecerit ridionalibus igitur locis alicubi totus Sol post Lunam latuit. tunitas, sed neglecta, forte quod tunc astronomiae restauratio at, observationibus accuratioribus nondum consignatis.

560 eclipsis Solis et totalis et in meridie fuit in Lusitania, et passim per Germaniam, digitorum tamen numerus sola aesti-artificio proditus; itaque non majorem ad certitudinem nota est, quam Hipparchum sua perduxit. Adde quod et haec 1567 sequuta est, Romae in meridie centralis, astronomos in erunt sententias super quantitate diametri Lunae; quam contropticis meis explicavi cap. VIII. Ita fides illarum observationum is est. Sperant autem mecum multi fore, ut qui utramque psium memoriae consignavit, Christophorus Clavius, vir de his e meritis, luculenta aliqua narratione seu publica seu privata, hac vita, jam senex admodum, discedat, nos ex iis ambiguit, in quibus nos ex lectione allegati loci meorum Opticorum eri videt.

meum institutum redeo et pergo ad sequentes eclipses. Quas s commemoravi, meum ortum omnes praeverterunt. Anni 1579 a quidem, sed Sole nimium inclinato ad occasum, instituto non fuit idonea. Anno 1590 minor fuit obscuratio, quam ut per Europam, qua Christianus porrigitur orbis, quaeri posset. mbra Lunae vix extremum et inhospitum attigit septentrionem, plane propter Terram intactam transierit.

600 umbra Lunae in remotissimo meridie quaerenda fuit. mbra Lunae longius etiam quam anno 1598 a mediatullo faciei sus septentriones aberravit.

o nulla nobis exspectanda eclipsis magna usque ad annum 1621, entium annorum deliquia magna iis commendo, qui tunc victuri ejus anni 1605 eclipsis, quod observatio mea docuit, sic est

comparata, ut vobis, viri docti, interpretibus genus humanum illa docere possit, quae hodie quaeruntur ab astronomis. Primum fuit meridiei vicina Galliae praesertim et Hispaniae; deinde magna fuit et nobis inferiorem Solis partem texit, ut impossibile sit, quod his pagellis demonstro, quin alicubi in Gallia vel Hispania, ubi pax, ubi commercia, ubi Christianorum imperia, qua facilis vobis rei investigatio, centrorum visa sit conjunctio; denique Luna fuit loco Terris pene proximo, ubi majore angulo cernitur.

Haec cum ita habeant, equidem opto mihimet potestatem esse, iter in illa loca suscipiendi passimque omnes percontandi coram, atque ita in rem praesentem veniendi. Qua potestate quia careo, vos ego jam viri docti per haec stupendae divinae sapientiae opera, per fidem, qua Creatori estis obligati, per amorem posteritatis, per vestras delicias, quas vobis viri philosophi jam olim non absimili studio atque cura peperere, vos inquam obsecro atque obtestor, uti hanc levissimam operam lubentes volentes sumatis, et quae quisque vidit, quae memoria complexus est, quae a vicinis, doctis, indoctis, modo fide dignis audivit, imo quae ab iisdem singulari studio et dedita opera explorare etiamnum poterit, ea brevi epistolio consignata, dum recens est memoria, veredariis committat, Pragae Bohemorum ad Regum et Principum vestrorum legatos et procuratores, aut si mavultis Francofurtum ad Claudium Marnium indeque ad me transportanda.

Sunt autem capita quaesitorum ista. Quibus locis aliqua de Sole particula in supremo Solis margine, cum esset eclipsis medium, superfuerit, quibus vicissim aliqua in imo margine; et quibus locis totus Sol fuerit tectus; tum quae facies diei, quanta tenebrae, quae species aëris circa Solem circumfusi, an integer circulus lucidus circa Lunam, isque vel terminatus intra et extra, vel exterius evanidus incerto fine; qui Lunae sub Sole tecto consistentis color; quae stellae visae; et quae cuique ultro praeter istam admonitionem occurrent. Nulla adeo despecta et vilis erit narratio, dummodo fida et candida, quam ego non ingenti gratiarum actione sum suscepturus. De ipsis etiam nubibus discere cupio, non quod hae ad rem faciant, sed ut in me sitim hanc inquirendi exstinguant, si constiterit, conspectum Solis alicubi per has ereptum.

Si qui sunt mathematici ex professo (nam hactenus alloquebar universos), qui coelo sereno usi sese ad hujus deliquii observationem eo artificio compararunt, quod ante annum ipsis in Opticis editis descripsi, adhortatus mature omnes ad diligentem hujus defectus observationem, illi quamvis non eo in tractu versati, qui totum Solem tectum vidit, nihilominus de quantitate diametri Lunae ipsiusque defectus vel me privatim vel publice omnes edocebunt, quibus vicissim ego hoc quantulum est mearum observationum hisce pagellis communico, ut videant, quanta me nubes opportunitate priverint, suasque liberiores tanto libentius in compensationem mei damni ad me transmittant. Quibus quidem Hipparchus meus, qui jam in procinctu est, hanc unicam eclipsin a vobis auctarii loco exspectans plurimum se debere lubens fatebitur.

Rogo autem imprimis viros literis celebres, quorum sese ad remota loca porrigit notitia, uti ea jam utantur ad percontandos idoneos, ad monendos Magnates; rogo Magnates, quos harum rerum cura tangit, ditionibus potentes, quemlibet pro dignitatis suae conditione, ut exemplo Monarcharum, quorum prius facta mentio, qua quisque ratione commodissime potest, plurimum hujus narrationis conquirat eoque me per suos literatos impertiat.

Equidem et spero et fatentur omnes, totum hoc et quae superstruere cogito, Deo conditori, cujus de gloria agitur, fore gratissimum.

Si quis paulo iniquior insanire me clamabit, qui orbem Terrarum longe gravioribus occupatum negotiis e solio regio ad meos pulveres geometricos detraham, ratus scilicet, ad hoc conditum esse genus humanum, huc referendas omnium cogitationes, ut agro colendo se mutuo expellant, sanguinem mutuum fundant, alter alterum servituti mancipet, Dei vero perennia isthaec opera et hanc scientiam vel rideant vel probro habeant et quasi quoddam dedecus aut aperte fugiant aut privatim occultent: hujusmodi objicientibus equidem aliud quod respondeam non habeo, quam quod olim Diogenes dolium suum versans deteriori quidem jure respondit: scilicet in tanto universorum fervore, tanta suarum actionum fiducia, me quoque a partibus instaurandae astronomiae stantem aut non oportuit aliter facere, aut quid me aliud oportuerit facere, neque ego neque consultores mei intelleximus. Veniam itaque dabunt imbecillitati nostrae. Valet et ne mihi sumtus et opera frustra perierit, crebris responsorum nimbis efficite. Pragae Bohemorum, Martinalibus anni 1605.

*Observatio Defectus Solis,
qui contigit die 12. Octobris anni hujus 1605,
Pragae Bohemorum habita.*

Nox praecedens pluvia fuit et mane turbidum. Hora tamen undecima pulsae nubes et Sol per unam atque alteram horam purus luxit. Principium h. 1. 6' ex azimutho et horologio Tychonis primorum et secundorum indice. Id initium animadverti in tabella clare, cum nemo qui Solem adspexisset quicquam animadverteret. Hoc adeo perpetuum, oculos clara luce Solis in agnoscendo minimo defectu impediri, ut in Opticis demonstravi.

Inclinatio instrumento ostendebatur paulo supra medium rotundi radii. Sit ergo angulus inter eclipticam et circulum per centra 85° aut plus, in coelo igitur Luna fuit Sole inferior, ut in Opticis docetur, et angulus 95° aut paulo minus. Angulus vero inter eclipticam et verticalem per Solem fuit eo momento $79^{\circ} 55'$ ex doctrina primi mobilis, qui subtractus a 95° relinquit $15^{\circ} 5'$, angulum inter circulum per centra et eclipticam aut paulo minus. Assumatur diameter Solis $30' 37''$, Lunae vero $32' 59''$. Summa semidiametrorum, quae jam metitur distantiam centrorum, est $31' 47''$. Luna ergo secundum praxin in Opticis declaratam fuit ante Solem $30' 40''$ c., habens lat. austr. $8' 16''$ c. Illud certissimum, angulum majorem fuisse 90° , quia Luna visa est inferior Sole, et latitudinem apparentem majorem quam $5' 33''$.

Tunc ortae denuo nubes identidem dehiscentes, sed nunquam tantisper, dum observatio repeti posset, usque ad horam 1. 40' 30'', quo momento angulus verticalis et eclipticae est $85^{\circ} 46'$. Tunc observati sunt in radio rotundo super tabellam meam digiti $4\frac{2}{3}$. Et quia digiti 12 habebant particulas $109\frac{1}{2}$, ergo digiti $4\frac{2}{3}$ habebant particulas $42\frac{1}{2}$. Foraminis vero amplitudo cepit particulas $17\frac{1}{2}$, ergo radius enucleatus habuit 92 (et obiter addendo, ut 10368, distantia tabellarum, ad 92, vel semidiametrum radii enucleati 46, sic sinus totus ad 443.6, qui tangit arcum $15' 16''$, ut Solis

diameter sit $30' 32''$, quantam fere ex Opticis meis assumsi). Ut igitur 92 ad $42\frac{1}{2}$, sic $30' 37''$ ad $14' 9''$ deficientia Solis minuta, quae ablata a summa semidiametrorum relinquunt distantiam centrorum $17' 38''$.

Fuit tunc inclinatio 69° , umbra superius a medio versante, inferius igitur in coelo et angulus 111° , unde ablati angulus $85^\circ 46'$ relinquit $25^\circ 14'$; quare parallactica meorum Opticorum exhibet $15' 57''$, distantiam Lunae a Sole in ecliptica, et $7' 31''$ latitudinem visibilem.

Lunula mea habens particulas 74 , quae additis $17\frac{1}{2}$, foraminis faciebant summam $91\frac{1}{2}$ et definientes diametrum lunulae $30' 20''$, haec igitur fuit multo minor justo. Lunae ergo diameter multo fuit major $30' 20''$, major igitur Solari. Eclipsis igitur omnino alicubi totalis. Quo vero tempore diametrum hanc Lunae exacte mensurus eram circa medium eclipsis, densissima nubes diutius integra hora Solis conspectum soli urbi Pragae eripuit, campis circumcirca clarescentibus luce Solis. Itaque hac a multo tempore exspectata occasione frui non potui.

Hora 3. $13' 30''$, quae in hac altitudine poli $50^\circ 5'$ ostendit angulum inter eclipticam et verticalem versus orientem $81^\circ 50'$, hoc inquam momento rursum nonnihil dehiscentibus nubibus digiti superfuerunt 3 in meo fimbriato radio, aut eo minus aliquid, scilicet minus quam particulae 27, quae sunt $9' 6''$, et haec a summa semidiametrorum $31' 47''$ ablata relinquunt distantiam centrorum $22' 41''$ et plus etiam, siquidem minus quam 3 digiti superfuere. Inclinatio fuit 85° a supra, ergo in coelo 95° , et Luna inferior Sole; aufer $81^\circ 50'$, remanet angulus $13^\circ 10'$ et compl. $56^\circ 50'$ ($76^\circ 50'$), quibus indicatur latitudo plus quam $5' 10''$ austr. et superatio Lunae seu distantia ecliptica a Sole plus quam $22' 5''$.

Hora 3. $30'$ dispulsae sunt nubes, et spectatores nullum potuerunt amplius agnoscere defectum. At illis non potest certo credi, quia oculi ut et initio minimum in Sole defectum non agnoscunt: me vero in instrumento contemplaturum praevenere nubes subito coeuntes iterum.

Hora 3. $34'$ rursum purus Solis radius, quo momento certo jam evanuerat defectus in tabella mea.

Exploratio, an tres hae observationes secum ipsae et cum veritate consentiant.

Non satis muniti sumus frequentia phasium, ut suffragiorum multitudine agi possit. Atque haec ipsa tria momenta per nubium importunitatem properatissima sunt, nec satis fida. Itaque nisi ultra consentanea et secum ipsa consentientia fuerint, compositione nobis et quadam quasi transactione utendum erit.

Prima phasis h. 1.	6' 0''	cum \supset	$30' 40''$	ante Solem.
Secunda " " 1.	40. 30	" "	15. 57	" " "
Intervallum	34. 30	cui	14. 43	motus apparens competit.
Jam secunda h. 1.	40. 30	cum \supset	15. 57	ante Solem.
Tertia phasis " 3.	13. 30	" "	22. 5	+ post "
Itaque intervallo " 1.	33	motus	38. 2	+ respondet.

At si mansit idem motus apparens tantulo intervallo, oportuit posteriorem motum ad normam prioris esse $39' 40''$. Hic itaque quoad longitudinem non stamus male, nam observatio dat plus quam $38' 2''$. Ut vero et horarius Tychonis cum his observatis comparetur, et idem periculum fiat et in latitudine, tractandae sunt parallaxes ad haec tria momenta. Assu-

namus parallaxin Lunae a Sole maximam in verticali circulo 58' 33'', quantam in Hipparcho meo constitui; parum enim refert ad longitudinem, etsi uno aut altero scrupulo plus minusve sumserimus. Itaque secundum doctrinam meorum Opticorum Cap. IX. adminiculo parallacticae exhibentur parallaxes in hunc modum:

Phasi	Longitudinis.	Diff.	Latitudinis.	Diff.
1.	In ortum: 8' 33''	4' 52''	49' 32''	1' 48''
2.	In ortum: 3. 41	Summa	51. 20	
3.	In occasum: 7. 44	11. 25	54. 51	3. 31

Cum igitur horarius Tychonis sit 34' 10'' et primo intervallo competat portio 19' 39'', secundo 52' 57'', parall. long. aufert illic 4' 52'', hic 11' 25'', manetque illic 14' 47'', hic 41' 32''; nos vero habemus 14' 43'', 39' 40''. Ergo apparens noster horarius est minor Tychonis; id non est causa vitiosae assumptae parallaxeos, unum enim vel alterum minutum in has differentias nihil sensibile accumulatur; nec peccavimus assumptione majoris diametri Lunae, quam est Tychonica, quin potius nobis profuerit etiamnum augere Lunae diametrum, et Tychonica huc applicata augebit hoc horariorum dissidium; sed sunt causae quaerendae alibi.

Jam latitudinis consensus exquiratur. Parallaxes lat. hae fuere:

49' 32''. 51' 20''. 54' 51''.

Aufer 8. 16 c. 7. 31. 5. 10 +, latitudinem sc. apparentem.

Restat 41. 16 c. 43. 49. 49. 41 — vera latitudo.

Hic si parallaxis totalis augetur, augetur pene aequaliter et latitudo vera ubique. Habet vero aliam difficultatem, quod intervallo primo variatur latitudo per 2' 33'', secundo per 5' 52'' minus. At non potest tanto variari. Nam si ad motum intervallorum ex Tychone etiam desumptum addideris motum Solis, ut sit motus Lunae a nodo 18' 4'' et 47' 10'', invenies latitudinem variandam per 1' 33'' et 4' 1''. Tribus itaque scrupulis abundat nostrum incrementum. Causa videtur primae phaseos indeterminata inclinatio, tertiae indeterminata quantitas. Itaque sic transigemus: quia in principio Luna fuit inferior Sole, certo itaque plus quam 5' 33'' in visa latitudine; quare posito, quod est certius, latitudinem scilicet non plus variari quam per 1' 32'' et 4' 1'', certo igitur latitudines verae (posita vera parallaxi) minores quam 44' 0'', 45' 32'', 49' 33'', quare duae reliquae latitudines apparentes certo majores quam 5' 48'', 5' 18''. Esto igitur ut aberraverint oculi inter properandum alicubi, atque ita visae latitudines sint 6' 33'', 6' 18'', et inclinatio principii, quam non satis definitive expressi, habuerit plus quam 85°.

Probatur et finis eclipseos, et corrigitur annotatio phaseos tertiae.

Quia a prima phasi ad ultimam horis 2. 8' confecta 52' 45'' plus, h. e. 54' 23'' analogos, et in ultima phasi Luna superavit Solem per 12' 5'' plus, eclipsis vero tunc desiit, cum in latitudine 5' 30'' indice nostra parallactica Sol per 31' 18'' superatur: ergo restant ad finem 9' 13'' minus, quae faciunt minus 28' 45'' temporis, quae adde ad tempus ultimae phaseos, exsurgit pro fine hora 3. 35' 15'' minus. Igitur ante h. 3. 35' desiit: eja, nam h. 3. 34' jam nihil amplius videbam.

Quid autem? Si vere h. 3. 30' nihil amplius superfuisset? Tunc

omnino argueretur erroris quantitas phasis tertiae sic, ut quam annotavi minus 3 digitos, ea fuerit minus 2 digiti, qui sunt particulae $18\frac{2}{3}$, et scrupula Solis $6' 13''$. Itaque distantia centrorum $25' 34''$, quae per angulos supra constitutos dat superationem $24' 52''$, latitudinem apparentem $5' 49''$ plus, quod convenit superiori argumentationi ex principii latitudine deductae; quod est unum argumentum. Deinde propius accedimus ad horarium Tychonis. Nam supra cum apparente motu ex Tychone $41' 22''$ non habuimus plus quod compararemus, quam $38' 2''$ plus, et $39' 40''$ ad summum. Hic jam ex $22' 5''$ plus fit $24' 52''$ plus, itaque $2' 47''$ accedunt nostro tam parvo horario, ut fiat $40' 49''$ plus. Tertio jam et finem observatum tenemus rectius. Cum enim hoc pacto subtractis $24' 52''$ a $31' 18''$ restent $6' 26''$ minus, et horis 2. 8' jam debeantur $55' 31''$ plus, itaque residua illa $6' 26''$ minus analogon conficiuntur $15'$ minus, quae adde ad horam ultimae phaseos 3. $13' 30''$, exsurgunt h. 3. $28' 30''$ minus pro fine: ex voto. In hac igitur incertitudine nos reliquit solum finis momentum, nubium invidia nobis ereptum.

Quando fuerit eclipsis medium?

Medium illud est, cum centrum Lunae apparet in circulo latitudinis per centrum Solis traducto.

Quandoquidem igitur h. 1. $40' 20''$ Luna fuit ante Solem per $15' 57''$, igitur ex analogia motus, qui fuit observatus in intervallo primo, ista residua $15' 57''$ fuere confecta $37' 32''$, quae addita ad 1. $40' 20''$ ostendunt medium h. 2. $18'$.*)

Duravit igitur a principio hucusque per h. 1. $12'$, quod est tempus incidentiae; cui si aequale constituero tempus emersionis, finis recidet in h. 3. $30'$; sed quia celerior emersio quam incidentia, finis igitur ante h. 2. $30'$, quod rursum confirmat, me ultimo vidisse non 3 sed 2 digitos. Duratio itaque h. 2. $22'$.

Quis verae conjunctionis articulus?

Ex doctrina primi mobilis et meis Opticis h. 2. $18'$ coelum mediabat $24^\circ 29'$ \mathfrak{M} , oriebatur $22^\circ \zeta$ et $22^\circ \approx$ nonagesimus ab ortu, itaque luminaria in occidentali quadrante. Quaeritur parallaxis. Igitur angulus eclipticae et meridiani hic est $25^\circ 11'$, titularis igitur parallaxis longitudinis in horizonte est $24' 54''$ (per totalem $58' 33''$), et quia Luna abest 3° a nonagesimo, ideo parall. long. in occasum est $1' 18''$; apparet vero hoc momento juncta Soli, est igitur per $1' 18''$ vere ultra Solem, ergo 3' ante fuit vere in circulo latitudinis per Solem. Id fuit hora 2. $15'$.**))

*) Kepleri manu in margine adscripta: Per horarium Tychonis.

15' 57''	28. Siquidem nullam parallaxis mutationem attulisset.
34. 10	
15. 54. 40	

**) K. in marg.: Phasi secunda erat \curvearrowright ante \odot visa per $15' 57''$
Parallaxis corr. 3. 41

	19. 38	
Hora 1. 40. 30	34. 10	34'
34. 28	5. 40	
2. 15. Vera \odot .	19. 16	
	16 28''	

Quantitas eclipsis.

Latitudo visa ex supra dictis in medio proportionaliter fuit 6' 30'' vel 6' 0''; sit autem 6' 30''. Haec ablata a summa semidiametrorum 31' 47'' relinquit scrupula obscurata 25. 17'', quae faciunt digitos proxime 10. Superfuerunt digiti 2. Et tamen cum Pragam inter et Solem unica sola nubes esset, coelo circumcirca patenti, campis illustratis, lumen diurnum notabiliter fuit imminutum, quasi advesperasceret aut praegnans imbre nubes totum coelum occupasset; credibile igitur, ubi totus Sol tectus, meram fuisse noctem.

In ipso verae conjunctionis articulo ubi Sol totus fuerit tectus?

Ad hoc nobis opus est cognitione verae latitudinis Lunae. Ac cum hactenus usus sim parallaxi ex Hipparcho meo, utar jam quoque. Sed duplicem is exhibet hoc situ Lunae parallaxin, alteram sub conditione anguli inter plana eclipticae et viae Lunae $4^{\circ} 58'$, alteram, si hic angulus mensuretur quadrantali latitudine Lunae $5^{\circ} 17' 30''$, quam suspicionem foveo. Illa est $58' 13''$, haec $62' 16''$. Itaque si assumserimus apparentem in medio latitudinem $6' 30''$, vera latitudo prodibit vel $46' 30''$ vel $49' 44''$. Hipparchus meus vult illic $48' 5''$, hic $49' 57''$.) Confirmat igitur haec eclipsis angulum magnum.

Cum igitur h. 2. 15' Pragae fuerit vera conjunctio, quae horae faciunt 33° 45' tempora, igitur in meridiano, qui est occidentalior Pragensi per 33° 45' fuit tunc merides, et cum declinatio Solis sit 7° 30' austr., ergo in latitudine loci 7° 30' australi fuit Sol verticalis. Is igitur locus fuit in oceano Atlantico, vel Guineae, ante insulam Ascensionis.

Hic igitur terminus est, a quo computandum. Nam ibi quidem Sol obscuratus minime fuit; Luna enim habuit et apparuit habere latitudinem 46' 30'' vel 49' 44'' septentrionalem.

Centro S, quod loca Soli perpendiculariter subjecta indicat, scribatur circulus maximus globi Telluris PE, in quo sit SE tractus Terrarum subjectus eclipticae hoc momento. Et quia S est $19^{\circ} 6'$, sit igitur A 0° , et AT Terrae aequator, qui in hoc situ apparet in figura ellipseos, et sit SL ad SE rectus; erit tractus subjectus circulo latitudinis, in quo Luna. Quaeritur, quantum sit progrediendum in SL, donec latitudo Lunae $46' 30''$ a parallaxi horizontali $58' 33''$, vel latitudo $49' 44''$ a parallaxi $62' 16''$ absorbeatur, itaque centra Solis et Lunae juncta sint. Parallaxica Opticorum ostendit arcum $52^{\circ} 35'$ vel $53^{\circ} 0'$; is sit SL, et L locus quaesitus. Quaeritur ejus longitudo et latitudo geographica. Sit ergo P polus aequatoris Terrae, quamvis is in hac facie globi non sit, sed infra nonnihil sit absconditus, et ex puncto P descendant arcus circularum magnorum, PS secans aequatorem in R, et PL, secans aequatorem in T. Est igitur PR meridianus Solis $33^{\circ} 45'$ occidentalior Pragensi, PL vero est meridianus loci quaesiti, et RT differentia

meridianorum, et LT altitudo loci aequalis altitudini poli. In triangulo igitur PSL datur PS $97^{\circ} 20'$, quia RS est declinatio Solis et PR quadrans, et SL $52^{\circ} 35'$ vel $53^{\circ} 0'$; sit $53^{\circ} 0'$, et angulus PSL ex doctrina primi mobilis vel ex tabula anguli eclipticae et meridiani; nam RS est meridianus et ASR $67^{\circ} 38'$, ergo RSL complementum est $22^{\circ} 22'$. Tribus igitur datis invenitur et LP $40^{\circ} 48'$ et SPL vel RT $23^{\circ} 44'$. Sed PR est $33^{\circ} 45'$ occidentalior Praga, ergo PLT est $10^{\circ} 1'$ occidentalior Praga.

Locus est in sinu Balearico, inter Marsiliam et Minoricam. Tunc autem numerabant horam $1^{\circ} 35''$, quia nos Pragae h. 2. 15'. Si autem Tycho Brahe justiore prodidit latitudinem, quae est $49^{\circ} 33''$, tunc umbra Lunae ad Marsiliam propius accedit.

Quot horarum spatio centrum umbrae Lunaris in facie Telluris fuerit?

Etsi Tellus continue aliam atque aliam faciem Soli offert, quaecunque tamen illa fuerit, maneat ejus centrum S. Et cum ex E spectantibus Luna oriens appareat per $58^{\circ} 33''$ vel $62^{\circ} 16''$ ultra Solem eodem momento, quo spectantibus ex S apparet sub Sole (tanta enim est Lunae parallaxis), quoad igitur Luna vero motu trajicit $58^{\circ} 33''$ vel $62^{\circ} 16''$, semper ejus umbrae centrum in aliquo puncto SE haeret, si contingat tractum illum per S transire. Jam vero declinat ab S et transit per L. Ducatur per L recta MN non plane parallelus ipsi ES, quia Lunae orbita ad Solarem angulo 5° c. inclinatur; et sit inclinatio ad partes E occidentis, quia crescit latitudo Lunae septentrionalis. Quaeritur proportio MN ad ES. Sit ac si MN esset parallelus ipsi ES, nam parva est differentia et minuitur labor, ne ex S cogamur ducere perpendicularem in MN. Cum ergo SL (considerata jam ut una recta in plana facie Telluris) sit aequalis latitudini Lunae $46^{\circ} 30''$ vel $49^{\circ} 44''$, quam parallaxin exhibet arcus SL 53° , ergo arcus 37° , complementum ad priorem, secundum doctrinam Opticorum exhibet longitudinem LM, LN sub iisdem titulis $35^{\circ} 15''$ vel $37^{\circ} 28''$. Tantisper ergo moratur Luna in superficie Telluris, donec vero motu horum arcuum dupla conficit. Ac cum sit horarius ex Tychone $34^{\circ} 10''$, ergo vel h. 2. 4' vel h. 2. 12'' manet centrum umbrae in Terra seu in linea MN.

Quo loco Terrarum umbra Lunae globum Telluris invaserit, quo rursum deseruerit?

Horae 1. 2' vel 1. 6' sunt $15^{\circ} 30'$ vel $16^{\circ} 30'$; et quia Sol in ipso medio est in meridiano $33^{\circ} 45'$ occidentaliori quam Praga, ergo principio totalis per universam Terram durationis Sol est per $18^{\circ} 15'$ vel $17^{\circ} 15'$, et fine per $49^{\circ} 15'$ vel $50^{\circ} 15'$ occidentalior Praga. Initio igitur Sol est medio fere loco inter insulam S. Helenae et aequatorem in oceano australi verticalis; fine stat super promontorium S. Augustini et Fernambuco, in orientali litore Brasiliae.

Atqui hic centrum est faciei Telluris; inquirendus jam et situs eclipticae et quo loco terminentur quadrantes a puncto Solis. Cum enim $19^{\circ} 3'$ ☉ declinet $22^{\circ} 9'$, ergo haec est lat. loci sub ecliptica, ubi Sol in principio oritur. Sic per $19^{\circ} 9'$ ☿ ejusque decl. $22^{\circ} 10'$ habetur lat. aust. loci, ubi Sol in fine occidit. Et cum a $19^{\circ} 3'$ ☉ in $19^{\circ} 3'$ ♌ coascendant in sphaera recta $86^{\circ} 56'$, et a $19^{\circ} 9'$ ♌ in $19^{\circ} 9'$ ☿ coorientur $93^{\circ} 4'$, ergo loca sub ecliptica, quibus Sol oritur, sunt per $105^{\circ} 11'$ vel $104^{\circ} 11'$ occi-


dentaliora, et quibus in fine occidit, per $43^{\circ} 49'$ vel $42^{\circ} 49'$ orientaliora quam Praga. Illic igitur signantur septentrionalia Cubae insulae prope Havanam, hic oceanus orientalis prope Madagascar inter insulas Romero et S. Mariae.

In figura sequenti centro R scribatur circulus magnus faciei Telluris EP, polum Terrae P transiens, et sit A sub principio ϖ , AR asc. recta

Solis, tractus ASE sub ecliptica, S sub Sole, sitque principium, ut S sit in oceano post Africam, et E sinistrum in Cuba, ubi Sol oriens, eclipsis nulla, quia Luna borealis. Ducatur arcus circuli magni EL, rectus ad ES, quo toto tractu Sol spectatur oriens. In eo tractu punctum L sit locus, ubi Luna sub Sole, et connectatur LP. In triangulo igitur LEP datur EP $67^{\circ} 51'$ ex declinatione 19° ☉, et LEP $8^{\circ} 5'$ ex tabula anguli eclipticae SE et meridiani EP, et LE invenitur per initialem latitudinem Lunae, quae itinere $35' 15''$ vel $37' 28''$ a Sole, h. e. $37^{\circ} 50''$ vel $40^{\circ} 10''$ a nodo per $3' 13''$ minor

fit quam in medio, quare vel $43^{\circ} 17''$ vel $46^{\circ} 31''$. Haec inquam latitudo absorbetur a parallaxi, cum ab E per 48° itur in L. Tribus itaque cognitis et PL patebit $21^{\circ} 53'$, et EPL $14^{\circ} 54'$. Fuit autem E inter et Pragmam $105^{\circ} 11'$ vel $104^{\circ} 11'$, ergo inter L et Pragmam est $90^{\circ} 17'$ vel $89^{\circ} 17'$, et lat. L $68^{\circ} 7'$, quibus describitur zona frigida, Americae incognita pars sub meridiano Hispaniolae. Sic in figurae dextra parte, quae servit fini, sit E post Madagascarem, S in Brasilia; datur PE $112^{\circ} 20'$ ex declinatione $19^{\circ} \text{ } \text{Z}$, LEP iterum $8^{\circ} 5'$, EL $58^{\circ} 30'$, quia in tanta discessione ab E parallaxis aequat D lat. $49^{\circ} 33''$ vel $53^{\circ} 9''$ (quae rursum per $3' 13''$ differt ab ea, quae in medio, major jam, sic exigente motu Lunae), datur ergo PL $54^{\circ} 13'$ et LPE $8^{\circ} 50'$, quae aufer ab arcu $43^{\circ} 40'$ vel $42^{\circ} 49'$ differentiae long. Pragae et E, manet diff. long. Pragae et L 35° vel 34° , lat. $35^{\circ} 47'$, qualem habet Mesopotamia et quae Antiochiam Syriae versus orientem sequuntur. Atque haec loca omnium postrema viderunt Solem totum a Luna tegi jam occidentibus luminaribus.

Fig. 2.



Tractus umbræ Lunaris.

Dato medio et extremis, sequuntur interjecta. In America intra arcticum umbra Lunae ad Terram accessit, inde per ostia fluminis Nivosi, per insulam Brasiliam dictam, per intimum oceani Aquitanici angulum, per Pyrenaeum et confinia Galliae et Hispaniae, per Bajonam, relicta a dextris Pampelona, Cordova, Barcelona, a sinistris Burdegala, Narbona, per Lunarium promontorium, per sinum Balearicum, inter Marsilium et Minoricam, per Calarim Sardiniae, per Tyrrenum, per Syracusas Siciliae, per Peloponnesum, per Spartam, per mare Nauplium, Creticum et Triopium insulas-

que interjectas, per Rhodum et qui hanc sequitur sinum Issicum, per Cypri litora et per Antiochiam in Mesopotamiam se recepit et prope Euphratem Terras iterum deseruit.

Quicquid igitur Terrarum ab hoc limite in septentriones vergit, ut Italia et tota fere Europa, iis aliqua de Sole particula a septentrione supra residua visa est, cornua sub medium eclipseos deorsum porrigens, quicquid vero in austrum, ut Hispania ultima, hoc Solis aliquam particulam inferius versus austrum vidit exstantem, et cornua sursum versa, idque constante mea latitudine. Secundum Tyronicam vero latitudinem omnino Romae et in praecipuis locis Italiae totus Sol fuerit tectus. Haec vero omnia populari etiam animadversione facile discernuntur.

OPERUM KEPLERI

QUAE VOLUMEN III. CONTINET DISPOSITIO.

	Fol.
1. <i>Astronomia Nova seu Comment. de motibus stellae Martis</i>	1
Notae editoris	443
2. <i>Fragmenta studiorum astronomicorum e Mss. Pulkovensibus.</i>	
a) <i>Hipparchus</i> (fragm.)	511
b) <i>Calculi eclipsium Lunae</i>	550
c) <i>De Luna</i> (fragm.)	644
d) <i>De Tabulis Lunaribus</i>	691
Notae editoris	718
3. <i>Epistola de Solis deliquio</i>	726

CONSPECTUS

EPISTOLARUM KEPLERI,

QUAE INSUNT VOLUMINI III.

Ad Anonymum. s. l. et d. (fragm.)	14
" Vincentium Blanchium (Alerani) d. Lincii d. 13. Mart. 1619	503
" " " d. Lincii 1616	519
" Brenggerum d. Praegae d. 4. Oct. 1607	734
" " " d. 30. Nov. 1607. 5. Apr. 1608	31
" Coignetum d. Praegae 1606	32
" Crügerum d. Lincii d. 18. Feb. 1624	735
" " " d. 9. Sept. 1624	659. 662
" D. Fabricium d. Praegae d. 1. Oct. 1602	451. 500. 518
" " " " d. 2. Dec. 1602	12. 64
" " " " d. 4. Jul. 1603	72
" " " " d. 7. Feb. 1604	77
" " " " d. 18. Dec. 1604	13. 87
" " " " d. 11. Oct. 1605	95
" " " " d. 1. Aug. 1607	99. 458. 474
" " " " d. 10. Nov. 1608	108. 475
" Joh. Fabricium d. Praegae anno 1608	125. 462. 506
" Sam. Hasenrefferum d. Praegae d. 16. Nov. 1606	462
" Hegulontium (Heydonum) d. Praegae 1605	8
" Herwartum d. Graetii d. 12. Jul. 1600	37
" " Praegae d. 7. Oct. 1602	23
	11. 28. 693

Ad <i>Horwartum</i> d. Pragae	d. 12. Nov. 1602	11.	29.	698
" " " "	d. 12. Jan. 1603			445
" " " "	d. 1. Maji 1603		30.	449
" " " "	d. 5. Jul. 1603		12.	703
" " " "	d. 13. Jan. 1606			30
" " " "	d. 5. Jun. 1606			30
" " " "	d. 2. Jan. 1607			454
" " " "	mense Apr. 1607			456
" " " "	d. 24. Nov. 1607			30
" " " "	d. 18. Oct. 1608			31
" <i>Longomontanum</i> d. Pragae	anno 1605		32.	704
" <i>Maestlinum</i> d. Pragae	d. 8. Febr. 1601			46
" " " "	d. 20. Dec. 1601			50
" " " "	d. 14. Dec. 1604			55
" " " "	d. 5. Mart. 1605			56
" " " "	d. 10. Jun. 1606			60
" " " Lincii	d. 22. Dec. 1616			724
" " " "	d. 12. Apr. in 28. Maj. 1620			676
" <i>Maginum</i> d. Pragae	d. 1. Jun. 1601			37
" " " "	d. 1. Febr. 1610			494
" " " "	d. 22. Mart. 1610			495
" <i>Nautonnerium</i> d. Pragae	d. 9. Febr. 1606		457.	733
" <i>Odontium</i> d. Graetii	d. 5. Aug. 1605			444
" <i>Pistorium</i> d. Pragae	d. 12. Jun. 1607			444
" <i>Prasidem curiae Imper.</i> d. Pragae	d. 25. Aug. 1608			10
" <i>Remum</i> d. Pragae	d. 18. Mart. 1612			518
" " d. Lincii	Oct. 1619			518
" <i>Zieglerum</i> d. Pragae	d. 14. Febr. 1606			518

